






YMP-4147

<样品信息>


色谱柱: LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 1.0ml/min
 柱 温: 30°C 波 长: 220nm/240nm
 数据文件名: TWKSS\$YMP-4147 - 31-41/31-960-2 - YMP-4147-twsf-1-PTFE-600z-tj.lcd
 方法文件名: TWKSS\$YMP-4147 - YMP-4147-twsf-新-FX280.lcm
 批处理文件名: TWKSS\$YMP-4147 - YMP-4147-20251210-TWSF-FX280.lcb
 样品瓶号: 1-9
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/10 10:15:35 实验者: xiexinhui
 处理时间(V2) : 2025/12/11 08:46:09 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>

mV



mV



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

检测器A Ch2 240nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图1 曲安奈德益康唑乳膏体外释放HPLC图谱-
PBS7.4:乙醇 (50:50) 介质-600转-溶剂




YMP-4147

<样品信息>


色谱柱: LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 1.0ml/min
 柱 温: 30°C 波 长: 220nm/240nm
 数据文件名: TWKSS\$YMP-4147 - 31-41/31-961-2 - YMP-4147-twsf-1-PTFE-600z-dzp1-1.lcd
 方法文件名: TWKSS\$YMP-4147 - YMP-4147-twsf-新-FX280.lcm
 批处理文件名: TWKSS\$YMP-4147 - YMP-4147-20251210-TWSF-FX280.lcb
 样品瓶号: 1-18
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/10 10:20:59 实验者: xiexinhui
 处理时间(V2) : 2025/12/11 08:46:13 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>

mV



mV



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.402	3016745	100.000	326154	5196	1.980	--
总计		3016745	100.000	326154			

检测器A Ch2 240nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.770	213020	100.000	32977	8349	1.271	--
总计		213020	100.000	32977			

图2 曲安奈德益康唑乳膏体外释放HPLC图谱-
PBS7.4:乙醇 (50:50) 介质-600转-对照品溶液1-1




YMP-4147

<样品信息>


色谱柱: LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 1.0ml/min
 柱 温: 30°C 波 长: 220nm/240nm
 数据文件名: TWKSS\$YMP-4147 - 31-41/31-962-2 - YMP-4147-twsf-1-PTFE-600z-dzp1-2.lcd
 方法文件名: TWKSS\$YMP-4147 - YMP-4147-twsf-新-FX280.lcm
 批处理文件名: TWKSS\$YMP-4147 - YMP-4147-20251210-TWSF-FX280.lcb
 样品瓶号: 1-18
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/10 10:26:23 实验者: xiexinhui
 处理时间(V2) : 2025/12/11 08:46:16 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>

mV



mV



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.392	3025041	100.000	327126	5185	1.987	--
总计		3025041	100.000	327126			

检测器A Ch2 240nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.771	213744	100.000	33169	8392	1.274	--
总计		213744	100.000	33169			

图3 曲安奈德益康唑乳膏体外释放HPLC图谱-
PBS7.4:乙醇 (50:50) 介质-600转-对照品溶液1-2




YMP-4147

<样品信息>


色谱柱: LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 1.0ml/min
 柱 温: 30°C 波 长: 220nm/240nm
 数据文件名: TWKSS\$YMP-4147 - 31-41/31-963-2 - YMP-4147-twsf-1-PTFE-600z-dzp1-3.lcd
 方法文件名: TWKSS\$YMP-4147 - YMP-4147-twsf-新-FX280.lcm
 批处理文件名: TWKSS\$YMP-4147 - YMP-4147-20251210-TWSF-FX280.lcb
 样品瓶号: 1-18
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/10 10:31:46 实验者: xiexinhui
 处理时间(V2) : 2025/12/11 08:46:18 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>

mV



mV



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.383	3023504	100.000	327649	5184	1.989	--
总计		3023504	100.000	327649			

检测器A Ch2 240nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.769	213793	100.000	33074	8391	1.279	--
总计		213793	100.000	33074			

图4 曲安奈德益康唑乳膏体外释放HPLC图谱-
PBS7.4:乙醇 (50:50) 介质-600转-对照品溶液1-3




YMP-4147

<样品信息>


色谱柱: LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 1.0ml/min
 柱 温: 30°C 波 长: 220nm/240nm
 数据文件名: TWKSS\$YMP-4147 - 31-41/31-964-2 - YMP-4147-twsf-1-PTFE-600z-dzp1-4.lcd
 方法文件名: TWKSS\$YMP-4147 - YMP-4147-twsf-新-FX280.lcm
 批处理文件名: TWKSS\$YMP-4147 - YMP-4147-20251210-TWSF-FX280.lcb
 样品瓶号: 1-18
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/10 10:37:10 实验者: xiexinhui
 处理时间(V2) : 2025/12/11 08:46:21 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>

mV



mV



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.376	3021114	100.000	326954	5193	1.999	--
总计		3021114	100.000	326954			

检测器A Ch2 240nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.768	213382	100.000	32958	8381	1.281	--
总计		213382	100.000	32958			

图5 曲安奈德益康唑乳膏体外释放HPLC图谱-
PBS7.4:乙醇 (50:50) 介质-600转-对照品溶液1-4




YMP-4147

<样品信息>


色谱柱: LP-C18(150mm*4.6mm,5µm) 流 速: 1.0ml/min
 柱 温: 30°C 波 长: 220nm/240nm
 数据文件名: TWKSS\$YMP-4147 - 31-41/31-965-2 - YMP-4147-twsf-1-PTFE-600z-dzp1-5.lcd
 方法文件名: TWKSS\$YMP-4147 - YMP-4147-twsf-新-FX280.lcm
 批处理文件名: TWKSS\$YMP-4147 - YMP-4147-20251210-TWSF-FX280.lcb
 样品瓶号: 1-18
 进样体积: 20 µl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/10 10:42:34 实验者: xiexinhui
 处理时间(V2) : 2025/12/11 08:46:24 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>

mV



mV



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.369	3020576	100.000	327808	5198	1.998	--
总计		3020576	100.000	327808			

检测器A Ch2 240nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.768	213008	100.000	32926	8396	1.284	--
总计		213008	100.000	32926			

图6 曲安奈德益康唑乳膏体外释放HPLC图谱-
PBS7.4:乙醇 (50:50) 介质-600转-对照品溶液1-5




YMP-4147

<样品信息>


色谱柱: LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 1.0ml/min
 柱 温: 30°C 波 长: 220nm/240nm
 数据文件名: TWKSS\$YMP-4147 - 31-41/31-966-2 - YMP-4147-twsf-1-PTFE-600z-30min-gsp1.lcd
 方法文件名: TWKSS\$YMP-4147 - YMP-4147-twsf-新-FX280.lcm
 批处理文件名: TWKSS\$YMP-4147 - YMP-4147-20251210-TWSF-FX280.lcb
 样品瓶号: 1-1
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/10 10:47:57 实验者: xiexinhui
 处理时间(V2) : 2025/12/11 08:46:27 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>

mV



mV



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.414	1267925	100.000	163423	7888	1.656	--
总计		1267925	100.000	163423			

检测器A Ch2 240nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.767	108685	100.000	17040	8478	1.258	--
总计		108685	100.000	17040			

图7 曲安奈德益康唑乳膏体外释放HPLC图谱-参比制剂-24A50B-JS40 -PBS7.4:乙醇 (50:50) 介质-600转-30min供试品溶液-1




YMP-4147

<样品信息>


色谱柱: LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 1.0ml/min
 柱 温: 30°C 波 长: 220nm/240nm
 数据文件名: TWKSS\$YMP-4147 - 31-41/31-967-2 - YMP-4147-twsf-1-PTFE-600z-30min-gsp2.lcd
 方法文件名: TWKSS\$YMP-4147 - YMP-4147-twsf-新-FX280.lcm
 批处理文件名: TWKSS\$YMP-4147 - YMP-4147-20251210-TWSF-FX280.lcb
 样品瓶号: 1-10
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/10 10:53:20 实验者: xiexinhui
 处理时间(V2) : 2025/12/11 08:46:30 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>

mV



mV



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.420	1022351	100.000	135392	8443	1.591	--
总计		1022351	100.000	135392			

检测器A Ch2 240nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.767	90978	100.000	14168	8419	1.270	--
总计		90978	100.000	14168			

图8 曲安奈德益康唑乳膏体外释放HPLC图谱-参比制剂-24A50B-JS40 -PBS7.4:乙醇 (50:50) 介质-600转-30min供试品溶液-1




YMP-4147

<样品信息>


色谱柱: LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 1.0ml/min
 柱 温: 30°C 波 长: 220nm/240nm
 数据文件名: TWKSS\$YMP-4147 - 31-41/31-968-2 - YMP-4147-twsf-1-PTFE-600z-30min-gsp3.lcd
 方法文件名: TWKSS\$YMP-4147 - YMP-4147-twsf-新-FX280.lcm
 批处理文件名: TWKSS\$YMP-4147 - YMP-4147-20251210-TWSF-FX280.lcb
 样品瓶号: 1-19
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/10 10:58:43 实验者: xiexinhui
 处理时间(V2) : 2025/12/11 08:46:32 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>

mV



mV



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.418	929199	100.000	124435	8671	1.563	--
总计		929199	100.000	124435			

检测器A Ch2 240nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.767	80175	100.000	12639	8535	1.244	--
总计		80175	100.000	12639			

图9 曲安奈德益康唑乳膏体外释放HPLC图谱-参比制剂-24A50B-JS40 -PBS7.4:乙醇 (50:50) 介质-600转-30min供试品溶液-1




YMP-4147

<样品信息>


色谱柱: LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 1.0ml/min
 柱 温: 30°C 波 长: 220nm/240nm
 数据文件名: TWKSS\$YMP-4147 - 31-41/31-969-2 - YMP-4147-twsf-1-PTFE-600z-30min-gsp4.lcd
 方法文件名: TWKSS\$YMP-4147 - YMP-4147-twsf-新-FX280.lcm
 批处理文件名: TWKSS\$YMP-4147 - YMP-4147-20251210-TWSF-FX280.lcb
 样品瓶号: 1-28
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/10 11:04:06 实验者: xiexinhui
 处理时间(V2) : 2025/12/11 08:46:35 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>

mV



mV



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.393	1522450	100.000	190759	7382	1.727	--
总计		1522450	100.000	190759			

检测器A Ch2 240nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.768	134366	100.000	21012	8481	1.260	--
总计		134366	100.000	21012			

图10 曲安奈德益康唑乳膏体外释放HPLC图谱-自制品25120201批-PBS7.4:乙醇(50:50)介质-600转-30min供试品溶液-1




YMP-4147

<样品信息>


色谱柱: LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 1.0ml/min
 柱 温: 30°C 波 长: 220nm/240nm
 数据文件名: TWKSS\$YMP-4147 - 31-41/31-970-2 - YMP-4147-twsf-1-PTFE-600z-30min-gsp5.lcd
 方法文件名: TWKSS\$YMP-4147 - YMP-4147-twsf-新-FX280.lcm
 批处理文件名: TWKSS\$YMP-4147 - YMP-4147-20251210-TWSF-FX280.lcb
 样品瓶号: 1-37
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/10 11:09:28 实验者: xiexinhui
 处理时间(V2) : 2025/12/11 08:46:38 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>

mV



mV



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.390	1490001	100.000	187922	7447	1.719	--
总计		1490001	100.000	187922			

检测器A Ch2 240nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.767	125030	100.000	19549	8484	1.262	--
总计		125030	100.000	19549			

图11 曲安奈德益康唑乳膏体外释放HPLC图谱-自制品25120201批-PBS7.4:乙醇(50:50)介质-600转-30min供试品溶液-1




YMP-4147

<样品信息>


色谱柱: LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 1.0ml/min
 柱 温: 30°C 波 长: 220nm/240nm
 数据文件名: TWKSS\$YMP-4147 - 31-41/31-971-2 - YMP-4147-twsf-1-PTFE-600z-30min-gsp6.lcd
 方法文件名: TWKSS\$YMP-4147 - YMP-4147-twsf-新-FX280.lcm
 批处理文件名: TWKSS\$YMP-4147 - YMP-4147-20251210-TWSF-FX280.lcb
 样品瓶号: 1-46
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/10 11:14:50 实验者: xiexinhui
 处理时间(V2) : 2025/12/11 08:46:41 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>

mV



mV



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.383	1590606	100.000	198352	7265	1.747	--
总计		1590606	100.000	198352			

检测器A Ch2 240nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.767	135051	100.000	21248	8523	1.256	--
总计		135051	100.000	21248			

图12 曲安奈德益康唑乳膏体外释放HPLC图谱-自制品25120201批-PBS7.4:乙醇(50:50)介质-600转-30min供试品溶液-1




YMP-4147

<样品信息>


色谱柱: LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 1.0ml/min
 柱 温: 30°C 波 长: 220nm/240nm
 数据文件名: TWKSS\$YMP-4147 - 31-41/31-972-2 - YMP-4147-twsf-1-PTFE-600z-30min-gsp7.lcd
 方法文件名: TWKSS\$YMP-4147 - YMP-4147-twsf-新-FX280.lcm
 批处理文件名: TWKSS\$YMP-4147 - YMP-4147-20251210-TWSF-FX280.lcb
 样品瓶号: 1-2
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/10 11:20:13 实验者: xiexinhui
 处理时间(V2) : 2025/12/11 08:46:44 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>

mV



mV



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.404	901399	100.000	121879	8765	1.555	--
总计		901399	100.000	121879			

检测器A Ch2 240nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.767	72495	100.000	11431	8554	1.253	--
总计		72495	100.000	11431			

图13 曲安奈德益康唑乳膏体外释放HPLC图谱-自制品25082001-30 2Y批-PBS7.4:乙醇(50:50)介质-600转-30min供试品溶液-1




YMP-4147

<样品信息>


色谱柱: LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 1.0ml/min
 柱 温: 30°C 波 长: 220nm/240nm
 数据文件名: TWKSS\$YMP-4147 - 31-41/31-973-2 - YMP-4147-twsf-1-PTFE-600z-30min-gsp8.lcd
 方法文件名: TWKSS\$YMP-4147 - YMP-4147-twsf-新-FX280.lcm
 批处理文件名: TWKSS\$YMP-4147 - YMP-4147-20251210-TWSF-FX280.lcb
 样品瓶号: 1-11
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/10 11:25:36 实验者: xiexinhui
 处理时间(V2) : 2025/12/11 08:46:47 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>

mV



mV



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.399	1034496	100.000	137418	8452	1.601	--
总计		1034496	100.000	137418			

检测器A Ch2 240nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.770	83937	100.000	13234	8513	1.250	--
总计		83937	100.000	13234			

图14 曲安奈德益康唑乳膏体外释放HPLC图谱-自制品25082001-30 2Y批-
PBS7.4:乙醇(50:50)介质-600转-30min供试品溶液-1




YMP-4147

<样品信息>


色谱柱: LP-C18(150mm*4.6mm,5µm) 流 速: 1.0ml/min
 柱 温: 30°C 波 长: 220nm/240nm
 数据文件名: TWKSS\$YMP-4147 - 31-41/31-974-2 - YMP-4147-twsf-1-PTFE-600z-30min-gsp9.lcd
 方法文件名: TWKSS\$YMP-4147 - YMP-4147-twsf-新-FX280.lcm
 批处理文件名: TWKSS\$YMP-4147 - YMP-4147-20251210-TWSF-FX280.lcb
 样品瓶号: 1-20
 进样体积: 20 µl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/10 11:30:59 实验者: xiexinhui
 处理时间(V2) : 2025/12/11 08:46:50 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>

mV



mV



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.405	874442	100.000	118800	8849	1.547	--
总计		874442	100.000	118800			

检测器A Ch2 240nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.772	71667	100.000	11279	8517	1.263	--
总计		71667	100.000	11279			

图15 曲安奈德益康唑乳膏体外释放HPLC图谱-自制品25082001-30 2Y批-
PBS7.4:乙醇 (50:50) 介质-600转-30min供试品溶液-1




YMP-4147

<样品信息>


色谱柱: LP-C18(150mm*4.6mm,5µm) 流 速: 1.0ml/min
 柱 温: 30°C 波 长: 220nm/240nm
 数据文件名: TWKSS\$YMP-4147 - 31-41/31-975-2 - YMP-4147-twsf-1-PTFE-600z-30min-gsp10.lcd
 方法文件名: TWKSS\$YMP-4147 - YMP-4147-twsf-新-FX280.lcm
 批处理文件名: TWKSS\$YMP-4147 - YMP-4147-20251210-TWSF-FX280.lcb
 样品瓶号: 1-29
 进样体积: 20 µl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/10 11:36:22 实验者: xiexinhui
 处理时间(V2) : 2025/12/11 08:46:52 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>

mV



mV



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.422	425314	100.000	60742	9865	1.392	--
总计		425314	100.000	60742			

检测器A Ch2 240nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.773	51806	100.000	8157	8526	1.252	--
总计		51806	100.000	8157			

图16 曲安奈德益康唑乳膏体外释放HPLC图谱-参比制剂-24A50B批-PBS7.4:乙醇(50:50)介质-600转-30min供试品溶液-1




YMP-4147

<样品信息>


色谱柱: LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 1.0ml/min
 柱 温: 30°C 波 长: 220nm/240nm
 数据文件名: TWKSS\$YMP-4147 - 31-41/31-976-2 - YMP-4147-twsf-1-PTFE-600z-30min-gsp11.lcd
 方法文件名: TWKSS\$YMP-4147 - YMP-4147-twsf-新-FX280.lcm
 批处理文件名: TWKSS\$YMP-4147 - YMP-4147-20251210-TWSF-FX280.lcb
 样品瓶号: 1-38
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/10 11:41:44 实验者: xiexinhui
 处理时间(V2) : 2025/12/11 08:46:55 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>

mV



mV



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.410	633508	100.000	88282	9414	1.471	--
总计		633508	100.000	88282			

检测器A Ch2 240nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.774	70794	100.000	11067	8501	1.275	--
总计		70794	100.000	11067			

图17 曲安奈德益康唑乳膏体外释放HPLC图谱-参比制剂-24A50B批-PBS7.4:乙醇(50:50)介质-600转-30min供试品溶液-1




YMP-4147

<样品信息>


色谱柱: LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 1.0ml/min
 柱 温: 30°C 波 长: 220nm/240nm
 数据文件名: TWKSS\$YMP-4147 - 31-41/31-977-2 - YMP-4147-twsf-1-PTFE-600z-30min-gsp12.lcd
 方法文件名: TWKSS\$YMP-4147 - YMP-4147-twsf-新-FX280.lcm
 批处理文件名: TWKSS\$YMP-4147 - YMP-4147-20251210-TWSF-FX280.lcb
 样品瓶号: 1-47
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/10 11:47:06 实验者: xiexinhui
 处理时间(V2) : 2025/12/11 08:46:58 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>

mV



mV



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.402	745725	100.000	102644	9137	1.508	--
总计		745725	100.000	102644			

检测器A Ch2 240nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.772	82804	100.000	13118	8528	1.244	--
总计		82804	100.000	13118			

图18 曲安奈德益康唑乳膏体外释放HPLC图谱-参比制剂-24A50B批-PBS7.4:乙醇(50:50)介质-600转-30min供试品溶液-1




YMP-4147

<样品信息>


色谱柱: LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 1.0ml/min
 柱 温: 30°C 波 长: 220nm/240nm
 数据文件名: TWKSS\$YMP-4147 - 31-41/31-978-2 - YMP-4147-twsf-1-PTFE-600z-60min-gsp1.lcd
 方法文件名: TWKSS\$YMP-4147 - YMP-4147-twsf-新-FX280.lcm
 批处理文件名: TWKSS\$YMP-4147 - YMP-4147-20251210-TWSF-FX280.lcb
 样品瓶号: 1-3
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/10 11:52:29 实验者: xiexinhui
 处理时间(V2) : 2025/12/11 08:47:01 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>

mV



mV



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.378	1285309	100.000	166614	7918	1.670	--
总计		1285309	100.000	166614			

检测器A Ch2 240nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.771	86164	100.000	13708	8571	1.231	--
总计		86164	100.000	13708			

图19 曲安奈德益康唑乳膏体外释放HPLC图谱-参比制剂-24A50B-JS40 -PBS7.4:乙醇 (50:50) 介质-600转-60min供试品溶液-1




YMP-4147

<样品信息>


色谱柱: LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 1.0ml/min
 柱 温: 30°C 波 长: 220nm/240nm
 数据文件名: TWKSS\$YMP-4147 - 31-41/31-979-2 - YMP-4147-twsf-1-PTFE-600z-60min-gsp2.lcd
 方法文件名: TWKSS\$YMP-4147 - YMP-4147-twsf-新-FX280.lcm
 批处理文件名: TWKSS\$YMP-4147 - YMP-4147-20251210-TWSF-FX280.lcb
 样品瓶号: 1-12
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/10 11:57:52 实验者: xiexinhui
 处理时间(V2) : 2025/12/11 08:47:03 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>

mV



mV



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.382	1115855	100.000	147710	8284	1.620	--
总计		1115855	100.000	147710			

检测器A Ch2 240nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.772	81547	100.000	12765	8486	1.269	--
总计		81547	100.000	12765			

图20 曲安奈德益康唑乳膏体外释放HPLC图谱-参比制剂-24A50B-JS40 -PBS7.4:乙醇 (50:50) 介质-600转-60min供试品溶液-1




YMP-4147

<样品信息>


色谱柱: LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 1.0ml/min
 柱 温: 30°C 波 长: 220nm/240nm
 数据文件名: TWKSS\$YMP-4147 - 31-41/31-980-2 - YMP-4147-twsf-1-PTFE-600z-60min-gsp3.lcd
 方法文件名: TWKSS\$YMP-4147 - YMP-4147-twsf-新-FX280.lcm
 批处理文件名: TWKSS\$YMP-4147 - YMP-4147-20251210-TWSF-FX280.lcb
 样品瓶号: 1-21
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/10 12:03:15 实验者: xiexinhui
 处理时间(V2) : 2025/12/11 08:47:06 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>

mV



mV



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.384	961341	100.000	129412	8651	1.575	--
总计		961341	100.000	129412			

检测器A Ch2 240nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.771	71871	100.000	11309	8515	1.260	--
总计		71871	100.000	11309			

图21 曲安奈德益康唑乳膏体外释放HPLC图谱-参比制剂-24A50B-JS40 -PBS7.4:乙醇 (50:50) 介质-600转-60min供试品溶液-1




YMP-4147

<样品信息>


色谱柱: LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 1.0ml/min
 柱 温: 30°C 波 长: 220nm/240nm
 数据文件名: TWKSS\$YMP-4147 - 31-41/31-981-2 - YMP-4147-twsf-1-PTFE-600z-60min-gsp4.lcd
 方法文件名: TWKSS\$YMP-4147 - YMP-4147-twsf-新-FX280.lcm
 批处理文件名: TWKSS\$YMP-4147 - YMP-4147-20251210-TWSF-FX280.lcb
 样品瓶号: 1-30
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/10 12:08:38 实验者: xiexinhui
 处理时间(V2) : 2025/12/11 08:47:09 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>

mV



mV



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.347	1902776	100.000	232055	6759	1.809	--
总计		1902776	100.000	232055			

检测器A Ch2 240nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.768	151755	100.000	23420	8446	1.287	--
总计		151755	100.000	23420			

图22 曲安奈德益康唑乳膏体外释放HPLC图谱-自制品25120201批-PBS7.4:乙醇(50:50)介质-600转-60min供试品溶液-1




YMP-4147

<样品信息>


色谱柱: LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 1.0ml/min
 柱 温: 30°C 波 长: 220nm/240nm
 数据文件名: TWKSS\$YMP-4147 - 31-41/31-982-2 - YMP-4147-twsf-1-PTFE-600z-60min-gsp5.lcd
 方法文件名: TWKSS\$YMP-4147 - YMP-4147-twsf-新-FX280.lcm
 批处理文件名: TWKSS\$YMP-4147 - YMP-4147-20251210-TWSF-FX280.lcb
 样品瓶号: 1-39
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/10 12:14:00 实验者: xiexinhui
 处理时间(V2) : 2025/12/11 08:47:11 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>

mV



mV



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.345	1904926	100.000	231931	6747	1.815	--
总计		1904926	100.000	231931			

检测器A Ch2 240nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.768	140218	100.000	22013	8513	1.250	--
总计		140218	100.000	22013			

图23 曲安奈德益康唑乳膏体外释放HPLC图谱-自制品25120201批-PBS7.4:乙醇(50:50)介质-600转-60min供试品溶液-1




YMP-4147

<样品信息>


色谱柱: LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 1.0ml/min
 柱 温: 30°C 波 长: 220nm/240nm
 数据文件名: TWKSS\$YMP-4147 - 31-41/31-983-2 - YMP-4147-twsf-1-PTFE-600z-60min-gsp6.lcd
 方法文件名: TWKSS\$YMP-4147 - YMP-4147-twsf-新-FX280.lcm
 批处理文件名: TWKSS\$YMP-4147 - YMP-4147-20251210-TWSF-FX280.lcb
 样品瓶号: 1-48
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/10 12:19:23 实验者: xiexinhui
 处理时间(V2) : 2025/12/11 08:47:14 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>

mV



mV



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.338	2047746	100.000	246492	6531	1.836	--
总计		2047746	100.000	246492			

检测器A Ch2 240nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.768	153770	100.000	24298	8580	1.243	--
总计		153770	100.000	24298			

图24 曲安奈德益康唑乳膏体外释放HPLC图谱-自制品25120201批-PBS7.4:乙醇(50:50)介质-600转-60min供试品溶液-1




YMP-4147

<样品信息>


色谱柱: LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 1.0ml/min
 柱 温: 30°C 波 长: 220nm/240nm
 数据文件名: TWKSS\$YMP-4147 - 31-41/31-984-2 - YMP-4147-twsf-1-PTFE-600z-60min-gsp7.lcd
 方法文件名: TWKSS\$YMP-4147 - YMP-4147-twsf-新-FX280.lcm
 批处理文件名: TWKSS\$YMP-4147 - YMP-4147-20251210-TWSF-FX280.lcb
 样品瓶号: 1-4
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/10 12:24:46 实验者: xiexinhui
 处理时间(V2) : 2025/12/11 08:47:17 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>

mV



mV



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.368	1285336	100.000	167183	7952	1.664	--
总计		1285336	100.000	167183			

检测器A Ch2 240nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.774	99213	100.000	15414	8453	1.280	--
总计		99213	100.000	15414			

图25 曲安奈德益康唑乳膏体外释放HPLC图谱-自制品25082001-30 2Y批-
PBS7.4:乙醇(50:50)介质-600转-60min供试品溶液-1




YMP-4147

<样品信息>


色谱柱: LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 1.0ml/min
 柱 温: 30°C 波 长: 220nm/240nm
 数据文件名: TWKSS\$YMP-4147 - 31-41/31-985-2 - YMP-4147-twsf-1-PTFE-600z-60min-gsp8.lcd
 方法文件名: TWKSS\$YMP-4147 - YMP-4147-twsf-新-FX280.lcm
 批处理文件名: TWKSS\$YMP-4147 - YMP-4147-20251210-TWSF-FX280.lcb
 样品瓶号: 1-13
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/10 12:30:09 实验者: xiexinhui
 处理时间(V2) : 2025/12/11 08:47:19 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>

mV



mV



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.364	1369918	100.000	177096	7776	1.683	--
总计		1369918	100.000	177096			

检测器A Ch2 240nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.774	104706	100.000	16671	8596	1.229	--
总计		104706	100.000	16671			

图26 曲安奈德益康唑乳膏体外释放HPLC图谱-自制品25082001-30 2Y批-
PBS7.4:乙醇(50:50)介质-600转-60min供试品溶液-1




YMP-4147

<样品信息>


色谱柱: LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 1.0ml/min
 柱 温: 30°C 波 长: 220nm/240nm
 数据文件名: TWKSS\$YMP-4147 - 31-41/31-986-2 - YMP-4147-twsf-1-PTFE-600z-60min-gsp9.lcd
 方法文件名: TWKSS\$YMP-4147 - YMP-4147-twsf-新-FX280.lcm
 批处理文件名: TWKSS\$YMP-4147 - YMP-4147-20251210-TWSF-FX280.lcb
 样品瓶号: 1-22
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/10 12:35:32 实验者: xiexinhui
 处理时间(V2) : 2025/12/11 08:47:22 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>

mV



mV



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.362	1294304	100.000	168748	7928	1.662	--
总计		1294304	100.000	168748			

检测器A Ch2 240nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.772	98997	100.000	15712	8560	1.236	--
总计		98997	100.000	15712			

图27 曲安奈德益康唑乳膏体外释放HPLC图谱-自制品25082001-30 2Y批-
PBS7.4:乙醇(50:50)介质-600转-60min供试品溶液-1




YMP-4147

<样品信息>


色谱柱: LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 1.0ml/min
 柱 温: 30°C 波 长: 220nm/240nm
 数据文件名: TWKSS\$YMP-4147 - 31-41/31-987-2 - YMP-4147-twsf-1-PTFE-600z-60min-gsp10.lcd
 方法文件名: TWKSS\$YMP-4147 - YMP-4147-twsf-新-FX280.lcm
 批处理文件名: TWKSS\$YMP-4147 - YMP-4147-20251210-TWSF-FX280.lcb
 样品瓶号: 1-31
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/10 12:40:55 实验者: xiexinhui
 处理时间(V2) : 2025/12/11 08:47:25 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>

mV



mV



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.386	684200	100.000	95478	9309	1.478	--
总计		684200	100.000	95478			

检测器A Ch2 240nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.775	60512	100.000	9533	8563	1.251	--
总计		60512	100.000	9533			

图28 曲安奈德益康唑乳膏体外释放HPLC图谱-参比制剂-24A50B批-PBS7.4:乙醇(50:50)介质-600转-60min供试品溶液-1




YMP-4147

<样品信息>


色谱柱: LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 1.0ml/min
 柱 温: 30°C 波 长: 220nm/240nm
 数据文件名: TWKSS\$YMP-4147 - 31-41/31-988-2 - YMP-4147-twsf-1-PTFE-600z-60min-gsp11.lcd
 方法文件名: TWKSS\$YMP-4147 - YMP-4147-twsf-新-FX280.lcm
 批处理文件名: TWKSS\$YMP-4147 - YMP-4147-20251210-TWSF-FX280.lcb
 样品瓶号: 1-40
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/10 12:46:18 实验者: xiexinhui
 处理时间(V2) : 2025/12/11 08:47:28 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>

mV



mV



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.378	890614	100.000	121874	8880	1.542	--
总计		890614	100.000	121874			

检测器A Ch2 240nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.777	75937	100.000	11815	8492	1.272	--
总计		75937	100.000	11815			

图29 曲安奈德益康唑乳膏体外释放HPLC图谱-参比制剂-24A50B批-PBS7.4:乙醇(50:50)介质-600转-60min供试品溶液-1




YMP-4147

<样品信息>


色谱柱: LP-C18(150mm*4.6mm,5µm) 流 速: 1.0ml/min
 柱 温: 30°C 波 长: 220nm/240nm
 数据文件名: TWKSS\$YMP-4147 - 31-41/31-989-2 - YMP-4147-twsf-1-PTFE-600z-60min-gsp12.lcd
 方法文件名: TWKSS\$YMP-4147 - YMP-4147-twsf-新-FX280.lcm
 批处理文件名: TWKSS\$YMP-4147 - YMP-4147-20251210-TWSF-FX280.lcb
 样品瓶号: 1-49
 进样体积: 20 µl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/10 12:51:41 实验者: xiexinhui
 处理时间(V2) : 2025/12/11 08:47:30 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>

mV



mV



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.374	861042	100.000	118333	8936	1.529	--
总计		861042	100.000	118333			

检测器A Ch2 240nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.775	72151	100.000	11458	8628	1.229	--
总计		72151	100.000	11458			

图30 曲安奈德益康唑乳膏体外释放HPLC图谱-参比制剂-24A50B批-PBS7.4:乙醇(50:50)介质-600转-60min供试品溶液-1




YMP-4147

<样品信息>


色谱柱: LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 1.0ml/min
 柱 温: 30°C 波 长: 220nm/240nm
 数据文件名: TWKSS\$YMP-4147 - 31-41/31-990-2 - YMP-4147-twsf-1-PTFE-600z-90min-gsp1.lcd
 方法文件名: TWKSS\$YMP-4147 - YMP-4147-twsf-新-FX280.lcm
 批处理文件名: TWKSS\$YMP-4147 - YMP-4147-20251210-TWSF-FX280.lcb
 样品瓶号: 1-5
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/10 12:57:04 实验者: xiexinhui
 处理时间(V2) : 2025/12/11 08:47:33 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>

mV



mV



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.367	1047614	100.000	140594	8518	1.589	--
总计		1047614	100.000	140594			

检测器A Ch2 240nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.776	67759	100.000	10798	8672	1.224	--
总计		67759	100.000	10798			

图31 曲安奈德益康唑乳膏体外释放HPLC图谱-参比制剂-24A50B-JS40 -PBS7.4:乙醇 (50:50) 介质-600转-90min供试品溶液-1




YMP-4147

<样品信息>


色谱柱: LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 1.0ml/min
 柱 温: 30°C 波 长: 220nm/240nm
 数据文件名: TWKSS\$YMP-4147 - 31-41/31-991-2 - YMP-4147-twsf-1-PTFE-600z-90min-gsp2.lcd
 方法文件名: TWKSS\$YMP-4147 - YMP-4147-twsf-新-FX280.lcm
 批处理文件名: TWKSS\$YMP-4147 - YMP-4147-20251210-TWSF-FX280.lcb
 样品瓶号: 1-14
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/10 13:02:27 实验者: xiexinhui
 处理时间(V2) : 2025/12/11 08:47:36 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>

mV



mV



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.373	867743	100.000	119248	8921	1.534	--
总计		867743	100.000	119248			

检测器A Ch2 240nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.774	65346	100.000	10180	8470	1.271	--
总计		65346	100.000	10180			

图32 曲安奈德益康唑乳膏体外释放HPLC图谱-参比制剂-24A50B-JS40 -PBS7.4:乙醇 (50:50) 介质-600转-90min供试品溶液-1




YMP-4147

<样品信息>


色谱柱: LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 1.0ml/min
 柱 温: 30°C 波 长: 220nm/240nm
 数据文件名: TWKSS\$YMP-4147 - 31-41/31-992-2 - YMP-4147-twsf-1-PTFE-600z-90min-gsp3.lcd
 方法文件名: TWKSS\$YMP-4147 - YMP-4147-twsf-新-FX280.lcm
 批处理文件名: TWKSS\$YMP-4147 - YMP-4147-20251210-TWSF-FX280.lcb
 样品瓶号: 1-23
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/10 13:07:50 实验者: xiexinhui
 处理时间(V2) : 2025/12/11 08:47:38 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>

mV



mV



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.375	768266	100.000	106756	9157	1.497	--
总计		768266	100.000	106756			

检测器A Ch2 240nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.775	59836	100.000	9435	8591	1.242	--
总计		59836	100.000	9435			

图33 曲安奈德益康唑乳膏体外释放HPLC图谱-参比制剂-24A50B-JS40 -PBS7.4:乙醇 (50:50) 介质-600转-90min供试品溶液-1




YMP-4147

<样品信息>


色谱柱: LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 1.0ml/min
 柱 温: 30°C 波 长: 220nm/240nm
 数据文件名: TWKSS\$YMP-4147 - 31-41/31-993-2 - YMP-4147-twsf-1-PTFE-600z-90min-gsp4.lcd
 方法文件名: TWKSS\$YMP-4147 - YMP-4147-twsf-新-FX280.lcm
 批处理文件名: TWKSS\$YMP-4147 - YMP-4147-20251210-TWSF-FX280.lcb
 样品瓶号: 1-32
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/10 13:13:13 实验者: xiexinhui
 处理时间(V2) : 2025/12/11 08:47:41 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>

mV



mV



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.345	1699234	100.000	213083	7201	1.755	--
总计		1699234	100.000	213083			

检测器A Ch2 240nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.779	134500	100.000	21057	8523	1.262	--
总计		134500	100.000	21057			

图34 曲安奈德益康唑乳膏体外释放HPLC图谱-自制品25120201批-PBS7.4:乙醇(50:50)介质-600转-90min供试品溶液-1




YMP-4147

<样品信息>


色谱柱: LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 1.0ml/min
 柱 温: 30°C 波 长: 220nm/240nm
 数据文件名: TWKSS\$YMP-4147 - 31-41/31-994-2 - YMP-4147-twsf-1-PTFE-600z-90min-gsp5.lcd
 方法文件名: TWKSS\$YMP-4147 - YMP-4147-twsf-新-FX280.lcm
 批处理文件名: TWKSS\$YMP-4147 - YMP-4147-20251210-TWSF-FX280.lcb
 样品瓶号: 1-41
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/10 13:18:35 实验者: xiexinhui
 处理时间(V2) : 2025/12/11 08:47:44 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>

mV



mV



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.340	1801932	100.000	223858	7021	1.775	--
总计		1801932	100.000	223858			

检测器A Ch2 240nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.779	132457	100.000	20857	8555	1.251	--
总计		132457	100.000	20857			

图35 曲安奈德益康唑乳膏体外释放HPLC图谱-自制品25120201批-PBS7.4:乙醇(50:50)介质-600转-90min供试品溶液-1




YMP-4147

<样品信息>


色谱柱: LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 1.0ml/min
 柱 温: 30°C 波 长: 220nm/240nm
 数据文件名: TWKSS\$YMP-4147 - 31-41/31-995-2 - YMP-4147-twsf-1-PTFE-600z-90min-gsp6.lcd
 方法文件名: TWKSS\$YMP-4147 - YMP-4147-twsf-新-FX280.lcm
 批处理文件名: TWKSS\$YMP-4147 - YMP-4147-20251210-TWSF-FX280.lcb
 样品瓶号: 1-50
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/10 13:23:58 实验者: xiexinhui
 处理时间(V2) : 2025/12/11 08:47:47 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>

mV



mV



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.334	1843986	100.000	228023	6951	1.785	--
总计		1843986	100.000	228023			

检测器A Ch2 240nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.776	136212	100.000	21559	8632	1.239	--
总计		136212	100.000	21559			

图36 曲安奈德益康唑乳膏体外释放HPLC图谱-自制品25120201批-PBS7.4:乙醇(50:50)介质-600转-90min供试品溶液-1




YMP-4147

<样品信息>


色谱柱: LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 1.0ml/min
 柱 温: 30°C 波 长: 220nm/240nm
 数据文件名: TWKSS\$YMP-4147 - 31-41/31-996-2 - YMP-4147-twsf-1-PTFE-600z-90min-gsp7.lcd
 方法文件名: TWKSS\$YMP-4147 - YMP-4147-twsf-新-FX280.lcm
 批处理文件名: TWKSS\$YMP-4147 - YMP-4147-20251210-TWSF-FX280.lcb
 样品瓶号: 1-6
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/10 13:29:21 实验者: xiexinhui
 处理时间(V2) : 2025/12/11 08:47:51 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>

mV



mV



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.359	1147686	100.000	152912	8337	1.615	--
总计		1147686	100.000	152912			

检测器A Ch2 240nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.778	91751	100.000	14297	8509	1.272	--
总计		91751	100.000	14297			

图37 曲安奈德益康唑乳膏体外释放HPLC图谱-自制品25082001-30 2Y批-PBS7.4:乙醇(50:50)介质-600转-90min供试品溶液-1




YMP-4147

<样品信息>


色谱柱: LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 1.0ml/min
 柱 温: 30°C 波 长: 220nm/240nm
 数据文件名: TWKSS\$YMP-4147 - 31-41/31-997-2 - YMP-4147-twsf-1-PTFE-600z-90min-gsp8.lcd
 方法文件名: TWKSS\$YMP-4147 - YMP-4147-twsf-新-FX280.lcm
 批处理文件名: TWKSS\$YMP-4147 - YMP-4147-20251210-TWSF-FX280.lcb
 样品瓶号: 1-15
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/10 13:34:44 实验者: xiexinhui
 处理时间(V2) : 2025/12/11 08:47:53 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>

mV



mV



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.350	1246352	100.000	164628	8098	1.635	--
总计		1246352	100.000	164628			

检测器A Ch2 240nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.774	96707	100.000	15419	8652	1.227	--
总计		96707	100.000	15419			

图38 曲安奈德益康唑乳膏体外释放HPLC图谱-自制品25082001-30 2Y批-PBS7.4:乙醇(50:50)介质-600转-90min供试品溶液-1




YMP-4147

<样品信息>


色谱柱: LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 1.0ml/min
 柱 温: 30°C 波 长: 220nm/240nm
 数据文件名: TWKSS\$YMP-4147 - 31-41/31-998-2 - YMP-4147-twsf-1-PTFE-600z-90min-gsp9.lcd
 方法文件名: TWKSS\$YMP-4147 - YMP-4147-twsf-新-FX280.lcm
 批处理文件名: TWKSS\$YMP-4147 - YMP-4147-20251210-TWSF-FX280.lcb
 样品瓶号: 1-24
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/10 13:40:07 实验者: xiexinhui
 处理时间(V2) : 2025/12/11 08:47:57 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>

mV



mV



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.353	1163349	100.000	155426	8298	1.609	--
总计		1163349	100.000	155426			

检测器A Ch2 240nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.776	93913	100.000	14712	8567	1.257	--
总计		93913	100.000	14712			

图39 曲安奈德益康唑乳膏体外释放HPLC图谱-自制品25082001-30 2Y批-
PBS7.4:乙醇(50:50)介质-600转-90min供试品溶液-1




YMP-4147

<样品信息>


色谱柱: LP-C18(150mm*4.6mm,5µm) 流 速: 1.0ml/min
 柱 温: 30°C 波 长: 220nm/240nm
 数据文件名: TWKSS\$YMP-4147 - 31-41/31-999-2 - YMP-4147-twsf-1-PTFE-600z-90min-gsp10.lcd
 方法文件名: TWKSS\$YMP-4147 - YMP-4147-twsf-新-FX280.lcm
 批处理文件名: TWKSS\$YMP-4147 - YMP-4147-20251210-TWSF-FX280.lcb
 样品瓶号: 1-33
 进样体积: 20 µl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/10 13:45:30 实验者: xiexinhui
 处理时间(V2) : 2025/12/11 08:47:59 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>

mV



mV



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.377	624494	100.000	88580	9540	1.439	--
总计		624494	100.000	88580			

检测器A Ch2 240nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.780	53658	100.000	8529	8621	1.234	--
总计		53658	100.000	8529			

图40 曲安奈德益康唑乳膏体外释放HPLC图谱-参比制剂-24A50B批-PBS7.4:乙醇(50:50)介质-600转-90min供试品溶液-1




YMP-4147

<样品信息>


色谱柱: LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 1.0ml/min
 柱 温: 30°C 波 长: 220nm/240nm
 数据文件名: TWKSS\$YMP-4147 - 31-41/31-1000-2 - YMP-4147-twsf-1-PTFE-600z-90min-gsp11.lcd
 方法文件名: TWKSS\$YMP-4147 - YMP-4147-twsf-新-FX280.lcm
 批处理文件名: TWKSS\$YMP-4147 - YMP-4147-20251210-TWSF-FX280.lcb
 样品瓶号: 1-42
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/10 13:50:52 实验者: xiexinhui
 处理时间(V2) : 2025/12/11 08:48:02 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>

mV



mV



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.366	739422	100.000	103415	9245	1.480	--
总计		739422	100.000	103415			

检测器A Ch2 240nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.776	62656	100.000	9814	8560	1.256	--
总计		62656	100.000	9814			

图41 曲安奈德益康唑乳膏体外释放HPLC图谱-参比制剂-24A50B批-PBS7.4:乙醇(50:50)介质-600转-90min供试品溶液-1




YMP-4147

<样品信息>


色谱柱: LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 1.0ml/min
 柱 温: 30°C 波 长: 220nm/240nm
 数据文件名: TWKSS\$YMP-4147 - 31-41/31-1001-2 - YMP-4147-twsf-1-PTFE-600z-90min-gsp12.lcd
 方法文件名: TWKSS\$YMP-4147 - YMP-4147-twsf-新-FX280.lcm
 批处理文件名: TWKSS\$YMP-4147 - YMP-4147-20251210-TWSF-FX280.lcb
 样品瓶号: 1-51
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/10 13:56:15 实验者: xiexinhui
 处理时间(V2) : 2025/12/11 08:48:05 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>

mV



mV



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.363	739611	100.000	103885	9243	1.475	--
总计		739611	100.000	103885			

检测器A Ch2 240nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.774	60783	100.000	9653	8625	1.235	--
总计		60783	100.000	9653			

图42 曲安奈德益康唑乳膏体外释放HPLC图谱-参比制剂-24A50B批-PBS7.4:乙醇(50:50)介质-600转-90min供试品溶液-1




YMP-4147

<样品信息>


色谱柱: LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 1.0ml/min
 柱 温: 30°C 波 长: 220nm/240nm
 数据文件名: TWKSS\$YMP-4147 - 31-41/31-1002-2 - YMP-4147-twsf-1-PTFE-600z-120min-gsp1.lcd
 方法文件名: TWKSS\$YMP-4147 - YMP-4147-twsf-新-FX280.lcm
 批处理文件名: TWKSS\$YMP-4147 - YMP-4147-20251210-TWSF-FX280.lcb
 样品瓶号: 1-7
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/10 14:01:38 实验者: xiexinhui
 处理时间(V2) : 2025/12/11 08:48:08 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>

mV



mV



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.358	863188	100.000	119260	8974	1.517	--
总计		863188	100.000	119260			

检测器A Ch2 240nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.775	56618	100.000	9074	8681	1.209	--
总计		56618	100.000	9074			

图43 曲安奈德益康唑乳膏体外释放HPLC图谱-参比制剂-24A50B-JS40 -PBS7.4:乙醇 (50:50) 介质-600转-120min供试品溶液-1




YMP-4147

<样品信息>


色谱柱: LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 1.0ml/min
 柱 温: 30°C 波 长: 220nm/240nm
 数据文件名: TWKSS\$YMP-4147 - 31-41/31-1003-2 - YMP-4147-twsf-1-PTFE-600z-120min-gsp2.lcd
 方法文件名: TWKSS\$YMP-4147 - YMP-4147-twsf-新-FX280.lcm
 批处理文件名: TWKSS\$YMP-4147 - YMP-4147-20251210-TWSF-FX280.lcb
 样品瓶号: 1-16
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/10 14:07:01 实验者: xiexinhui
 处理时间(V2) : 2025/12/11 08:48:10 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>

mV



mV



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.359	741504	100.000	103659	9226	1.481	--
总计		741504	100.000	103659			

检测器A Ch2 240nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.772	55046	100.000	8677	8556	1.259	--
总计		55046	100.000	8677			

图44 曲安奈德益康唑乳膏体外释放HPLC图谱-参比制剂-24A50B-JS40 -PBS7.4:乙醇 (50:50) 介质-600转-120min供试品溶液-1




YMP-4147

<样品信息>


色谱柱: LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 1.0ml/min
 柱 温: 30°C 波 长: 220nm/240nm
 数据文件名: TWKSS\$YMP-4147 - 31-41/31-1004-2 - YMP-4147-twsf-1-PTFE-600z-120min-gsp3.lcd
 方法文件名: TWKSS\$YMP-4147 - YMP-4147-twsf-新-FX280.lcm
 批处理文件名: TWKSS\$YMP-4147 - YMP-4147-20251210-TWSF-FX280.lcb
 样品瓶号: 1-25
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/10 14:12:24 实验者: xiexinhui
 处理时间(V2) : 2025/12/11 08:48:13 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>

mV



mV



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.364	669813	100.000	95126	9440	1.448	--
总计		669813	100.000	95126			

检测器A Ch2 240nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.776	51293	100.000	8102	8636	1.244	--
总计		51293	100.000	8102			

图45 曲安奈德益康唑乳膏体外释放HPLC图谱-参比制剂-24A50B-JS40 -PBS7.4:乙醇 (50:50) 介质-600转-120min供试品溶液-1




YMP-4147

<样品信息>


色谱柱: LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 1.0ml/min
 柱 温: 30°C 波 长: 220nm/240nm
 数据文件名: TWKSS\$YMP-4147 - 31-41/31-1005-2 - YMP-4147-twsf-1-PTFE-600z-120min-gsp4.lcd
 方法文件名: TWKSS\$YMP-4147 - YMP-4147-twsf-新-FX280.lcm
 批处理文件名: TWKSS\$YMP-4147 - YMP-4147-20251210-TWSF-FX280.lcb
 样品瓶号: 1-34
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/10 14:17:47 实验者: xiexinhui
 处理时间(V2) : 2025/12/11 08:48:16 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>

mV



mV



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.328	1602841	100.000	205202	7437	1.714	--
总计		1602841	100.000	205202			

检测器A Ch2 240nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.775	123371	100.000	19488	8645	1.243	--
总计		123371	100.000	19488			

图46 曲安奈德益康唑乳膏体外释放HPLC图谱-自制品25120201批-PBS7.4:乙醇(50:50)介质-600转-120min供试品溶液-1




YMP-4147

<样品信息>


色谱柱: LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 1.0ml/min
 柱 温: 30°C 波 长: 220nm/240nm
 数据文件名: TWKSS\$YMP-4147 - 31-41/31-1006-2 - YMP-4147-twsf-1-PTFE-600z-120min-gsp5.lcd
 方法文件名: TWKSS\$YMP-4147 - YMP-4147-twsf-新-FX280.lcm
 批处理文件名: TWKSS\$YMP-4147 - YMP-4147-20251210-TWSF-FX280.lcb
 样品瓶号: 1-43
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/10 14:23:09 实验者: xiexinhui
 处理时间(V2) : 2025/12/11 08:48:18 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>

mV



mV



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.327	1690864	100.000	214471	7293	1.734	--
总计		1690864	100.000	214471			

检测器A Ch2 240nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.778	125299	100.000	19833	8642	1.240	--
总计		125299	100.000	19833			

图47 曲安奈德益康唑乳膏体外释放HPLC图谱-自制品25120201批-PBS7.4:乙醇(50:50)介质-600转-120min供试品溶液-1




YMP-4147

<样品信息>


色谱柱: LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 1.0ml/min
 柱 温: 30°C 波 长: 220nm/240nm
 数据文件名: TWKSS\$YMP-4147 - 31-41/31-1007-2 - YMP-4147-twsf-1-PTFE-600z-120min-gsp6.lcd
 方法文件名: TWKSS\$YMP-4147 - YMP-4147-twsf-新-FX280.lcm
 批处理文件名: TWKSS\$YMP-4147 - YMP-4147-20251210-TWSF-FX280.lcb
 样品瓶号: 1-52
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/10 14:28:31 实验者: xiexinhui
 处理时间(V2) : 2025/12/11 08:48:21 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>

mV



mV



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.323	1773202	100.000	223210	7142	1.755	--
总计		1773202	100.000	223210			

检测器A Ch2 240nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.776	126722	100.000	20058	8651	1.233	--
总计		126722	100.000	20058			

图48 曲安奈德益康唑乳膏体外释放HPLC图谱-自制品25120201批-PBS7.4:乙醇 (50:50) 介质-600转-120min供试品溶液-1




YMP-4147

<样品信息>


色谱柱: LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 1.0ml/min
 柱 温: 30°C 波 长: 220nm/240nm
 数据文件名: TWKSS\$YMP-4147 - 31-41/31-1008-2 - YMP-4147-twsf-1-PTFE-600z-120min-gsp7.lcd
 方法文件名: TWKSS\$YMP-4147 - YMP-4147-twsf-新-FX280.lcm
 批处理文件名: TWKSS\$YMP-4147 - YMP-4147-20251210-TWSF-FX280.lcb
 样品瓶号: 1-8
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/10 14:33:55 实验者: xiexinhui
 处理时间(V2) : 2025/12/11 08:48:24 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>

mV



mV



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.348	1053127	100.000	143560	8607	1.565	--
总计		1053127	100.000	143560			

检测器A Ch2 240nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.779	82752	100.000	13024	8631	1.256	--
总计		82752	100.000	13024			

图49 曲安奈德益康唑乳膏体外释放HPLC图谱-自制品25082001-30 2Y批-
PBS7.4:乙醇 (50:50) 介质-600转-120min供试品溶液-1




YMP-4147

<样品信息>


色谱柱: LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 1.0ml/min
 柱 温: 30°C 波 长: 220nm/240nm
 数据文件名: TWKSS\$YMP-4147 - 31-41/31-1009-2 - YMP-4147-twsf-1-PTFE-600z-120min-gsp8.lcd
 方法文件名: TWKSS\$YMP-4147 - YMP-4147-twsf-新-FX280.lcm
 批处理文件名: TWKSS\$YMP-4147 - YMP-4147-20251210-TWSF-FX280.lcb
 样品瓶号: 1-17
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/10 14:39:18 实验者: xiexinhui
 处理时间(V2) : 2025/12/11 08:48:26 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>

mV



mV



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.338	1169188	100.000	157845	8374	1.594	--
总计		1169188	100.000	157845			

检测器A Ch2 240nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.776	91423	100.000	14637	8769	1.216	--
总计		91423	100.000	14637			

图50 曲安奈德益康唑乳膏体外释放HPLC图谱-自制品25082001-30 2Y批-
PBS7.4:乙醇 (50:50) 介质-600转-120min供试品溶液-1




YMP-4147

<样品信息>


色谱柱: LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 1.0ml/min
 柱 温: 30°C 波 长: 220nm/240nm
 数据文件名: TWKSS\$YMP-4147 - 31-41/31-1010-2 - YMP-4147-twsf-1-PTFE-600z-120min-gsp9.lcd
 方法文件名: TWKSS\$YMP-4147 - YMP-4147-twsf-新-FX280.lcm
 批处理文件名: TWKSS\$YMP-4147 - YMP-4147-20251210-TWSF-FX280.lcb
 样品瓶号: 1-26
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/10 14:44:41 实验者: xiexinhui
 处理时间(V2) : 2025/12/11 08:48:29 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>

mV



mV



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.334	1131063	100.000	152826	8432	1.588	--
总计		1131063	100.000	152826			

检测器A Ch2 240nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.771	89726	100.000	14185	8628	1.249	--
总计		89726	100.000	14185			

图51 曲安奈德益康唑乳膏体外释放HPLC图谱-自制品25082001-30 2Y批-
PBS7.4:乙醇 (50:50) 介质-600转-120min供试品溶液-1




YMP-4147

<样品信息>


色谱柱: LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 1.0ml/min
 柱 温: 30°C 波 长: 220nm/240nm
 数据文件名: TWKSS\$YMP-4147 - 31-41/31-1011-2 - YMP-4147-twsf-1-PTFE-600z-120min-gsp10.lcd
 方法文件名: TWKSS\$YMP-4147 - YMP-4147-twsf-新-FX280.lcm
 批处理文件名: TWKSS\$YMP-4147 - YMP-4147-20251210-TWSF-FX280.lcb
 样品瓶号: 1-35
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/10 14:50:04 实验者: xiexinhui
 处理时间(V2) : 2025/12/11 08:48:32 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>

mV



mV



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.359	563812	100.000	80774	9661	1.414	--
总计		563812	100.000	80774			

检测器A Ch2 240nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.772	46658	100.000	7407	8603	1.239	--
总计		46658	100.000	7407			

图52 曲安奈德益康唑乳膏体外释放HPLC图谱-参比制剂-24A50B批-PBS7.4:乙醇(50:50)介质-600转-120min供试品溶液-1




YMP-4147

<样品信息>


色谱柱: LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 1.0ml/min
 柱 温: 30°C 波 长: 220nm/240nm
 数据文件名: TWKSS\$YMP-4147 - 31-41/31-1012-2 - YMP-4147-twsf-1-PTFE-600z-120min-gsp11.lcd
 方法文件名: TWKSS\$YMP-4147 - YMP-4147-twsf-新-FX280.lcm
 批处理文件名: TWKSS\$YMP-4147 - YMP-4147-20251210-TWSF-FX280.lcb
 样品瓶号: 1-44
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/10 14:55:28 实验者: xiexinhui
 处理时间(V2) : 2025/12/11 08:48:35 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>

mV



mV



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.356	655700	100.000	93636	9506	1.436	--
总计		655700	100.000	93636			

检测器A Ch2 240nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.776	53336	100.000	8411	8642	1.248	--
总计		53336	100.000	8411			

图53 曲安奈德益康唑乳膏体外释放HPLC图谱-参比制剂-24A50B批-PBS7.4:乙醇(50:50)介质-600转-120min供试品溶液-1




YMP-4147

<样品信息>


色谱柱: LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 1.0ml/min
 柱 温: 30°C 波 长: 220nm/240nm
 数据文件名: TWKSS\$YMP-4147 - 31-41/31-1013-2 - YMP-4147-twsf-1-PTFE-600z-120min-gsp12.lcd
 方法文件名: TWKSS\$YMP-4147 - YMP-4147-twsf-新-FX280.lcm
 批处理文件名: TWKSS\$YMP-4147 - YMP-4147-20251210-TWSF-FX280.lcb
 样品瓶号: 1-53
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/10 15:00:51 实验者: xiexinhui
 处理时间(V2) : 2025/12/11 08:48:37 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>

mV



mV



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.357	644375	100.000	92127	9549	1.432	--
总计		644375	100.000	92127			

检测器A Ch2 240nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.778	51501	100.000	8209	8722	1.225	--
总计		51501	100.000	8209			

图54 曲安奈德益康唑乳膏体外释放HPLC图谱-参比制剂-24A50B批-PBS7.4:乙醇(50:50)介质-600转-120min供试品溶液-1




YMP-4147

<样品信息>


色谱柱: LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 1.0ml/min
 柱 温: 30°C 波 长: 220nm/240nm
 数据文件名: TWKSS\$YMP-4147 - 31-41/31-1014-2 - YMP-4147-twsf-1-PTFE-600z-240min-gsp1.lcd
 方法文件名: TWKSS\$YMP-4147 - YMP-4147-twsf-新-FX280.lcm
 批处理文件名: TWKSS\$YMP-4147 - YMP-4147-20251210-TWSF-FX280.lcb
 样品瓶号: 2-1
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/10 15:06:14 实验者: xiexinhui
 处理时间(V2) : 2025/12/11 08:48:40 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>

mV



mV



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.305	2365884	100.000	282393	6255	1.868	--
总计		2365884	100.000	282393			

检测器A Ch2 240nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.781	163794	100.000	26236	8714	1.216	--
总计		163794	100.000	26236			

图55 曲安奈德益康唑乳膏体外释放HPLC图谱-参比制剂-24A50B-JS40 -PBS7.4:乙醇(50:50)介质-600转-240min供试品溶液-1




YMP-4147

<样品信息>


色谱柱: LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 1.0ml/min
 柱 温: 30°C 波 长: 220nm/240nm
 数据文件名: TWKSS\$YMP-4147 - 31-41/31-1015-2 - YMP-4147-twsf-1-PTFE-600z-240min-gsp2.lcd
 方法文件名: TWKSS\$YMP-4147 - YMP-4147-twsf-新-FX280.lcm
 批处理文件名: TWKSS\$YMP-4147 - YMP-4147-20251210-TWSF-FX280.lcb
 样品瓶号: 2-10
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/10 15:11:38 实验者: xiexinhui
 处理时间(V2) : 2025/12/11 08:48:43 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>

mV



mV



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.305	2011355	100.000	248611	6768	1.797	--
总计		2011355	100.000	248611			

检测器A Ch2 240nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.773	152397	100.000	23899	8576	1.259	--
总计		152397	100.000	23899			

图56 曲安奈德益康唑乳膏体外释放HPLC图谱-参比制剂-24A50B-JS40 -PBS7.4:乙醇(50:50)介质-600转-240min供试品溶液-1




YMP-4147

<样品信息>


色谱柱: LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 1.0ml/min
 柱 温: 30°C 波 长: 220nm/240nm
 数据文件名: TWKSS\$YMP-4147 - 31-41/31-1016-2 - YMP-4147-twsf-1-PTFE-600z-240min-gsp3.lcd
 方法文件名: TWKSS\$YMP-4147 - YMP-4147-twsf-新-FX280.lcm
 批处理文件名: TWKSS\$YMP-4147 - YMP-4147-20251210-TWSF-FX280.lcb
 样品瓶号: 2-19
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/10 15:17:02 实验者: xiexinhui
 处理时间(V2) : 2025/12/11 08:48:45 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>

mV



mV



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.303	1995640	100.000	246857	6779	1.794	--
总计		1995640	100.000	246857			

检测器A Ch2 240nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.772	149305	100.000	23832	8662	1.227	--
总计		149305	100.000	23832			

图57 曲安奈德益康唑乳膏体外释放HPLC图谱-参比制剂-24A50B-JS40 -PBS7.4:乙醇 (50:50) 介质-600转-240min供试品溶液-1




YMP-4147

<样品信息>


色谱柱: LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 1.0ml/min
 柱 温: 30°C 波 长: 220nm/240nm
 数据文件名: TWKSS\$YMP-4147 - 31-41/31-1017-2 - YMP-4147-twsf-1-PTFE-600z-240min-gsp4.lcd
 方法文件名: TWKSS\$YMP-4147 - YMP-4147-twsf-新-FX280.lcm
 批处理文件名: TWKSS\$YMP-4147 - YMP-4147-20251210-TWSF-FX280.lcb
 样品瓶号: 2-28
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/10 15:22:26 实验者: xiexinhui
 处理时间(V2) : 2025/12/11 08:48:48 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>

mV



mV



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.239	4705384	100.000	475803	4127	2.191	--
总计		4705384	100.000	475803			

检测器A Ch2 240nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.771	389367	100.000	60870	8597	1.255	--
总计		389367	100.000	60870			

图58 曲安奈德益康唑乳膏体外释放HPLC图谱-自制品25120201批-PBS7.4:乙醇(50:50)介质-600转-240min供试品溶液-1




YMP-4147

<样品信息>


色谱柱: LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 1.0ml/min
 柱 温: 30°C 波 长: 220nm/240nm
 数据文件名: TWKSS\$YMP-4147 - 31-41/31-1018-2 - YMP-4147-twsf-1-PTFE-600z-240min-gsp5.lcd
 方法文件名: TWKSS\$YMP-4147 - YMP-4147-twsf-新-FX280.lcm
 批处理文件名: TWKSS\$YMP-4147 - YMP-4147-20251210-TWSF-FX280.lcb
 样品瓶号: 2-37
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/10 15:27:50 实验者: xiexinhui
 处理时间(V2) : 2025/12/11 08:48:51 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>

mV



mV



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.242	4916150	100.000	490533	4021	2.219	--
总计		4916150	100.000	490533			

检测器A Ch2 240nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.779	388281	100.000	61158	8653	1.250	--
总计		388281	100.000	61158			

图59 曲安奈德益康唑乳膏体外释放HPLC图谱-自制品25120201批-PBS7.4:乙醇(50:50)介质-600转-240min供试品溶液-1




YMP-4147

<样品信息>


色谱柱: LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 1.0ml/min
 柱 温: 30°C 波 长: 220nm/240nm
 数据文件名: TWKSS\$YMP-4147 - 31-41/31-1019-2 - YMP-4147-twsf-1-PTFE-600z-240min-gsp6.lcd
 方法文件名: TWKSS\$YMP-4147 - YMP-4147-twsf-新-FX280.lcm
 批处理文件名: TWKSS\$YMP-4147 - YMP-4147-20251210-TWSF-FX280.lcb
 样品瓶号: 2-46
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/10 15:33:13 实验者: xiexinhui
 处理时间(V2) : 2025/12/11 08:48:54 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>

mV



mV



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.256	4210038	100.000	438353	4463	2.137	--
总计		4210038	100.000	438353			

检测器A Ch2 240nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.779	333472	100.000	52388	8621	1.252	--
总计		333472	100.000	52388			

图60 曲安奈德益康唑乳膏体外释放HPLC图谱-自制品25120201批-PBS7.4:乙醇(50:50)介质-600转-240min供试品溶液-1




YMP-4147

<样品信息>


色谱柱: LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 1.0ml/min
 柱 温: 30°C 波 长: 220nm/240nm
 数据文件名: TWKSS\$YMP-4147 - 31-41/31-1020-2 - YMP-4147-twsf-1-PTFE-600z-240min-gsp7.lcd
 方法文件名: TWKSS\$YMP-4147 - YMP-4147-twsf-新-FX280.lcm
 批处理文件名: TWKSS\$YMP-4147 - YMP-4147-20251210-TWSF-FX280.lcb
 样品瓶号: 2-2
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/10 15:38:37 实验者: xiexinhui
 处理时间(V2): 2025/12/11 08:48:56 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>

mV



mV



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.240	4921709	100.000	491885	4015	2.209	--
总计		4921709	100.000	491885			

检测器A Ch2 240nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.778	397534	100.000	62399	8651	1.253	--
总计		397534	100.000	62399			

图61 曲安奈德益康唑乳膏体外释放HPLC图谱-自制品25082001-30 2Y批-
PBS7.4:乙醇(50:50)介质-600转-240min供试品溶液-1




YMP-4147

<样品信息>


色谱柱: LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 1.0ml/min
 柱 温: 30°C 波 长: 220nm/240nm
 数据文件名: TWKSS\$YMP-4147 - 31-41/31-1021-2 - YMP-4147-twsf-1-PTFE-600z-240min-gsp8.lcd
 方法文件名: TWKSS\$YMP-4147 - YMP-4147-twsf-新-FX280.lcm
 批处理文件名: TWKSS\$YMP-4147 - YMP-4147-20251210-TWSF-FX280.lcb
 样品瓶号: 2-11
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/10 15:44:01 实验者: xiexinhui
 处理时间(V2): 2025/12/11 08:48:59 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>

mV



mV



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.238	5115893	100.000	505552	3918	2.236	--
总计		5115893	100.000	505552			

检测器A Ch2 240nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.779	434209	100.000	67784	8610	1.253	--
总计		434209	100.000	67784			

图62 曲安奈德益康唑乳膏体外释放HPLC图谱-自制品25082001-30 2Y批-
PBS7.4:乙醇(50:50)介质-600转-240min供试品溶液-1




YMP-4147

<样品信息>


色谱柱: LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 1.0ml/min
 柱 温: 30°C 波 长: 220nm/240nm
 数据文件名: TWKSS\$YMP-4147 - 31-41/31-1022-2 - YMP-4147-twsf-1-PTFE-600z-240min-gsp9.lcd
 方法文件名: TWKSS\$YMP-4147 - YMP-4147-twsf-新-FX280.lcm
 批处理文件名: TWKSS\$YMP-4147 - YMP-4147-20251210-TWSF-FX280.lcb
 样品瓶号: 2-20
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/10 15:49:25 实验者: xiexinhui
 处理时间(V2) : 2025/12/11 08:49:02 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>

mV



mV



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.229	5537958	100.000	535390	3718	2.280	--
总计		5537958	100.000	535390			

检测器A Ch2 240nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.779	446834	100.000	70261	8685	1.253	--
总计		446834	100.000	70261			

图63 曲安奈德益康唑乳膏体外释放HPLC图谱-自制品25082001-30 2Y批-
PBS7.4:乙醇(50:50)介质-600转-240min供试品溶液-1




YMP-4147

<样品信息>


色谱柱: LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 1.0ml/min
 柱 温: 30°C 波 长: 220nm/240nm
 数据文件名: TWKSS\$YMP-4147 - 31-41/31-1023-2 - YMP-4147-twsf-1-PTFE-600z-240min-gsp10.lcd
 方法文件名: TWKSS\$YMP-4147 - YMP-4147-twsf-新-FX280.lcm
 批处理文件名: TWKSS\$YMP-4147 - YMP-4147-20251210-TWSF-FX280.lcb
 样品瓶号: 2-29
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/10 15:54:49 实验者: xiexinhui
 处理时间(V2) : 2025/12/11 08:49:05 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>

mV



mV



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.302	2070979	100.000	255133	6713	1.800	--
总计		2070979	100.000	255133			

检测器A Ch2 240nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.777	154448	100.000	24752	8783	1.215	--
总计		154448	100.000	24752			

图64 曲安奈德益康唑乳膏体外释放HPLC图谱-参比制剂-24A50B批-PBS7.4:乙醇 (50:50) 介质-600转-240min供试品溶液-1




YMP-4147

<样品信息>


色谱柱: LP-C18(150mm*4.6mm,5µm) 流 速: 1.0ml/min
 柱 温: 30°C 波 长: 220nm/240nm
 数据文件名: TWKSS\$YMP-4147 - 31-41/31-1024-2 - YMP-4147-twsf-1-PTFE-600z-240min-gsp11.lcd
 方法文件名: TWKSS\$YMP-4147 - YMP-4147-twsf-新-FX280.lcm
 批处理文件名: TWKSS\$YMP-4147 - YMP-4147-20251210-TWSF-FX280.lcb
 样品瓶号: 2-38
 进样体积: 20 µl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/10 16:00:13 实验者: xiexinhui
 处理时间(V2) : 2025/12/11 08:49:07 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>

mV



mV



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.298	2208131	100.000	268990	6523	1.829	--
总计		2208131	100.000	268990			

检测器A Ch2 240nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.777	168101	100.000	26340	8633	1.252	--
总计		168101	100.000	26340			

图65 曲安奈德益康唑乳膏体外释放HPLC图谱-参比制剂-24A50B批-PBS7.4:乙醇 (50:50) 介质-600转-240min供试品溶液-1




YMP-4147

<样品信息>


色谱柱: LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 1.0ml/min
 柱 温: 30°C 波 长: 220nm/240nm
 数据文件名: TWKSS\$YMP-4147 - 31-41/31-1025-2 - YMP-4147-twsf-1-PTFE-600z-240min-gsp12.lcd
 方法文件名: TWKSS\$YMP-4147 - YMP-4147-twsf-新-FX280.lcm
 批处理文件名: TWKSS\$YMP-4147 - YMP-4147-20251210-TWSF-FX280.lcb
 样品瓶号: 2-47
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/10 16:05:37 实验者: xiexinhui
 处理时间(V2) : 2025/12/11 08:49:10 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>

mV



mV



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.298	2245880	100.000	272721	6465	1.836	--
总计		2245880	100.000	272721			

检测器A Ch2 240nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.779	163291	100.000	26157	8739	1.216	--
总计		163291	100.000	26157			

图66 曲安奈德益康唑乳膏体外释放HPLC图谱-参比制剂-24A50B批-PBS7.4:乙醇 (50:50) 介质-600转-240min供试品溶液-1




YMP-4147

<样品信息>


色谱柱: LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 1.0ml/min
 柱 温: 30°C 波 长: 220nm/240nm
 数据文件名: TWKSS\$YMP-4147 - 31-41/31-1026-2 - YMP-4147-twsf-1-PTFE-600z-360min-gsp1.lcd
 方法文件名: TWKSS\$YMP-4147 - YMP-4147-twsf-新-FX280.lcm
 批处理文件名: TWKSS\$YMP-4147 - YMP-4147-20251210-TWSF-FX280.lcb
 样品瓶号: 2-3
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/10 16:11:01 实验者: xiexinhui
 处理时间(V2) : 2025/12/11 08:49:13 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>

mV



mV



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.285	2628595	100.000	307905	5939	1.908	--
总计		2628595	100.000	307905			

检测器A Ch2 240nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.777	193007	100.000	30901	8763	1.215	--
总计		193007	100.000	30901			

图67 曲安奈德益康唑乳膏体外释放HPLC图谱-参比制剂-24A50B-JS40 -PBS7.4:乙醇 (50:50) 介质-600转-360min供试品溶液-1




YMP-4147

<样品信息>


色谱柱: LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 1.0ml/min
 柱 温: 30°C 波 长: 220nm/240nm
 数据文件名: TWKSS\$YMP-4147 - 31-41/31-1027-2 - YMP-4147-twsf-1-PTFE-600z-360min-gsp2.lcd
 方法文件名: TWKSS\$YMP-4147 - YMP-4147-twsf-新-FX280.lcm
 批处理文件名: TWKSS\$YMP-4147 - YMP-4147-20251210-TWSF-FX280.lcb
 样品瓶号: 2-12
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/10 16:16:25 实验者: xiexinhui
 处理时间(V2) : 2025/12/11 08:49:15 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>

mV



mV



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.297	2147536	100.000	263604	6614	1.812	--
总计		2147536	100.000	263604			

检测器A Ch2 240nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.777	157746	100.000	24835	8686	1.246	--
总计		157746	100.000	24835			

图68 曲安奈德益康唑乳膏体外释放HPLC图谱-参比制剂-24A50B-JS40 -PBS7.4:乙醇 (50:50) 介质-600转-360min供试品溶液-1




YMP-4147

<样品信息>


色谱柱: LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 1.0ml/min
 柱 温: 30°C 波 长: 220nm/240nm
 数据文件名: TWKSS\$YMP-4147 - 31-41/31-1028-2 - YMP-4147-twsf-1-PTFE-600z-360min-gsp3.lcd
 方法文件名: TWKSS\$YMP-4147 - YMP-4147-twsf-新-FX280.lcm
 批处理文件名: TWKSS\$YMP-4147 - YMP-4147-20251210-TWSF-FX280.lcb
 样品瓶号: 2-21
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/10 16:21:49 实验者: xiexinhui
 处理时间(V2) : 2025/12/11 08:49:18 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>

mV



mV



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.298	2241879	100.000	272828	6491	1.832	--
总计		2241879	100.000	272828			

检测器A Ch2 240nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.780	157126	100.000	25150	8742	1.217	--
总计		157126	100.000	25150			

图69 曲安奈德益康唑乳膏体外释放HPLC图谱-参比制剂-24A50B-JS40 -PBS7.4:乙醇 (50:50) 介质-600转-360min供试品溶液-1




YMP-4147

<样品信息>


色谱柱: LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 1.0ml/min
 柱 温: 30°C 波 长: 220nm/240nm
 数据文件名: TWKSS\$YMP-4147 - 31-41/31-1029-2 - YMP-4147-twsf-1-PTFE-600z-360min-gsp4.lcd
 方法文件名: TWKSS\$YMP-4147 - YMP-4147-twsf-新-FX280.lcm
 批处理文件名: TWKSS\$YMP-4147 - YMP-4147-20251210-TWSF-FX280.lcb
 样品瓶号: 2-30
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/10 16:27:13 实验者: xiexinhui
 处理时间(V2) : 2025/12/11 08:49:21 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>

mV



mV



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.323	1321339	100.000	176600	8110	1.621	--
总计		1321339	100.000	176600			

检测器A Ch2 240nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.779	76158	100.000	12301	8813	1.201	--
总计		76158	100.000	12301			

图70 曲安奈德益康唑乳膏体外释放HPLC图谱-自制品25120201批-PBS7.4:乙醇(50:50)介质-600转-360min供试品溶液-1




YMP-4147

<样品信息>


色谱柱: LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 1.0ml/min
 柱 温: 30°C 波 长: 220nm/240nm
 数据文件名: TWKSS\$YMP-4147 - 31-41/31-1030-2 - YMP-4147-twsf-1-PTFE-600z-360min-gsp5.lcd
 方法文件名: TWKSS\$YMP-4147 - YMP-4147-twsf-新-FX280.lcm
 批处理文件名: TWKSS\$YMP-4147 - YMP-4147-20251210-TWSF-FX280.lcb
 样品瓶号: 2-39
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/10 16:32:37 实验者: xiexinhui
 处理时间(V2) : 2025/12/11 08:49:24 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>

mV



mV



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.320	1396422	100.000	185175	7964	1.640	--
总计		1396422	100.000	185175			

检测器A Ch2 240nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.779	71467	100.000	11579	8823	1.192	--
总计		71467	100.000	11579			

图71 曲安奈德益康唑乳膏体外释放HPLC图谱-自制品25120201批-PBS7.4:乙醇(50:50)介质-600转-360min供试品溶液-1




YMP-4147

<样品信息>


色谱柱: LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 1.0ml/min
 柱 温: 30°C 波 长: 220nm/240nm
 数据文件名: TWKSS\$YMP-4147 - 31-41/31-1031-2 - YMP-4147-twsf-1-PTFE-600z-360min-gsp6.lcd
 方法文件名: TWKSS\$YMP-4147 - YMP-4147-twsf-新-FX280.lcm
 批处理文件名: TWKSS\$YMP-4147 - YMP-4147-20251210-TWSF-FX280.lcb
 样品瓶号: 2-48
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/10 16:38:01 实验者: xiexinhui
 处理时间(V2) : 2025/12/11 08:49:26 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>

mV



mV



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.327	1151919	100.000	156713	8471	1.568	--
总计		1151919	100.000	156713			

检测器A Ch2 240nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.779	54065	100.000	8790	8861	1.189	--
总计		54065	100.000	8790			

图72 曲安奈德益康唑乳膏体外释放HPLC图谱-自制品25120201批-PBS7.4:乙醇(50:50)介质-600转-360min供试品溶液-1




YMP-4147

<样品信息>


色谱柱: LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 1.0ml/min
 柱 温: 30°C 波 长: 220nm/240nm
 数据文件名: TWKSS\$YMP-4147 - 31-41/31-1032-2 - YMP-4147-twsf-1-PTFE-600z-360min-gsp7.lcd
 方法文件名: TWKSS\$YMP-4147 - YMP-4147-twsf-新-FX280.lcm
 批处理文件名: TWKSS\$YMP-4147 - YMP-4147-20251210-TWSF-FX280.lcb
 样品瓶号: 2-4
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/10 16:43:25 实验者: xiexinhui
 处理时间(V2) : 2025/12/11 08:49:29 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>

mV



mV



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.274	3022228	100.000	344069	5509	1.964	--
总计		3022228	100.000	344069			

检测器A Ch2 240nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.779	249230	100.000	39070	8615	1.247	--
总计		249230	100.000	39070			

图73 曲安奈德益康唑乳膏体外释放HPLC图谱-自制品25082001-30 2Y批-
PBS7.4:乙醇(50:50)介质-600转-360min供试品溶液-1




YMP-4147

<样品信息>


色谱柱: LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 1.0ml/min
 柱 温: 30°C 波 长: 220nm/240nm
 数据文件名: TWKSS\$YMP-4147 - 31-41/31-1033-2 - YMP-4147-twsf-1-PTFE-600z-360min-gsp8.lcd
 方法文件名: TWKSS\$YMP-4147 - YMP-4147-twsf-新-FX280.lcm
 批处理文件名: TWKSS\$YMP-4147 - YMP-4147-20251210-TWSF-FX280.lcb
 样品瓶号: 2-13
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/10 16:48:50 实验者: xiexinhui
 处理时间(V2) : 2025/12/11 08:49:32 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>

mV



mV



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.294	2110587	100.000	260817	6692	1.794	--
总计		2110587	100.000	260817			

检测器A Ch2 240nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.778	156930	100.000	25331	8825	1.201	--
总计		156930	100.000	25331			

图74 曲安奈德益康唑乳膏体外释放HPLC图谱-自制品25082001-30 2Y批-
PBS7.4:乙醇 (50:50) 介质-600转-360min供试品溶液-1




YMP-4147

<样品信息>


色谱柱: LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 1.0ml/min
 柱 温: 30°C 波 长: 220nm/240nm
 数据文件名: TWKSS\$YMP-4147 - 31-41/31-1034-2 - YMP-4147-twsf-1-PTFE-600z-360min-gsp9.lcd
 方法文件名: TWKSS\$YMP-4147 - YMP-4147-twsf-新-FX280.lcm
 批处理文件名: TWKSS\$YMP-4147 - YMP-4147-20251210-TWSF-FX280.lcb
 样品瓶号: 2-22
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/10 16:54:14 实验者: xiexinhui
 处理时间(V2) : 2025/12/11 08:49:35 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>

mV



mV



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.287	2347440	100.000	283837	6348	1.840	--
总计		2347440	100.000	283837			

检测器A Ch2 240nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.778	179930	100.000	28642	8751	1.226	--
总计		179930	100.000	28642			

图75 曲安奈德益康唑乳膏体外释放HPLC图谱-自制品25082001-30 2Y批-
PBS7.4:乙醇 (50:50) 介质-600转-360min供试品溶液-1




YMP-4147

<样品信息>


色谱柱: LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 1.0ml/min
 柱 温: 30°C 波 长: 220nm/240nm
 数据文件名: TWKSS\$YMP-4147 - 31-41/31-1035-2 - YMP-4147-twsf-1-PTFE-600z-360min-gsp10.lcd
 方法文件名: TWKSS\$YMP-4147 - YMP-4147-twsf-新-FX280.lcm
 批处理文件名: TWKSS\$YMP-4147 - YMP-4147-20251210-TWSF-FX280.lcb
 样品瓶号: 2-31
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/10 16:59:38 实验者: xiexinhui
 处理时间(V2) : 2025/12/11 08:49:37 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>

mV



mV



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.302	1889697	100.000	238606	7061	1.745	--
总计		1889697	100.000	238606			

检测器A Ch2 240nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.781	140174	100.000	22513	8801	1.209	--
总计		140174	100.000	22513			

图76 曲安奈德益康唑乳膏体外释放HPLC图谱-参比制剂-24A50B批-PBS7.4:乙醇(50:50)介质-600转-360min供试品溶液-1




YMP-4147

<样品信息>


色谱柱: LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 1.0ml/min
 柱 温: 30°C 波 长: 220nm/240nm
 数据文件名: TWKSS\$YMP-4147 - 31-41/31-1036-2 - YMP-4147-twsf-1-PTFE-600z-360min-gsp11.lcd
 方法文件名: TWKSS\$YMP-4147 - YMP-4147-twsf-新-FX280.lcm
 批处理文件名: TWKSS\$YMP-4147 - YMP-4147-20251210-TWSF-FX280.lcb
 样品瓶号: 2-40
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/10 17:05:02 实验者: xiexinhui
 处理时间(V2) : 2025/12/11 08:49:40 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>

mV



mV



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.297	1957361	100.000	246010	6944	1.756	--
总计		1957361	100.000	246010			

检测器A Ch2 240nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.779	148391	100.000	23569	8731	1.228	--
总计		148391	100.000	23569			

图77 曲安奈德益康唑乳膏体外释放HPLC图谱-参比制剂-24A50B批-PBS7.4:乙醇(50:50)介质-600转-360min供试品溶液-1




YMP-4147

<样品信息>


色谱柱: LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 1.0ml/min
 柱 温: 30°C 波 长: 220nm/240nm
 数据文件名: TWKSS\$YMP-4147 - 31-41/31-1037-2 - YMP-4147-twsf-1-PTFE-600z-360min-gsp12.lcd
 方法文件名: TWKSS\$YMP-4147 - YMP-4147-twsf-新-FX280.lcm
 批处理文件名: TWKSS\$YMP-4147 - YMP-4147-20251210-TWSF-FX280.lcb
 样品瓶号: 2-49
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/10 17:10:26 实验者: xiexinhui
 处理时间(V2) : 2025/12/11 08:49:43 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>

mV



mV



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.300	1885108	100.000	238492	7085	1.743	--
总计		1885108	100.000	238492			

检测器A Ch2 240nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.781	140645	100.000	22640	8819	1.202	--
总计		140645	100.000	22640			

图78 曲安奈德益康唑乳膏体外释放HPLC图谱-参比制剂-24A50B批-PBS7.4:乙醇(50:50)介质-600转-360min供试品溶液-1




YMP-4147

<样品信息>


色谱柱: LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 1.0ml/min
 柱 温: 30°C 波 长: 220nm/240nm
 数据文件名: TWKSS\$YMP-4147 - 31-41/31-1038-2 - YMP-4147-twsf-1-PTFE-600z-480min-gsp1.lcd
 方法文件名: TWKSS\$YMP-4147 - YMP-4147-twsf-新-FX280.lcm
 批处理文件名: TWKSS\$YMP-4147 - YMP-4147-20251210-TWSF-FX280.lcb
 样品瓶号: 2-5
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/10 17:15:50 实验者: xiexinhui
 处理时间(V2): 2025/12/11 08:49:45 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>

mV



mV



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.276	2586523	100.000	306088	6037	1.886	--
总计		2586523	100.000	306088			

检测器A Ch2 240nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.776	180012	100.000	28853	8788	1.204	--
总计		180012	100.000	28853			

图79 曲安奈德益康唑乳膏体外释放HPLC图谱-参比制剂-24A50B-JS40 -PBS7.4:乙醇(50:50)介质-600转-480min供试品溶液-1




YMP-4147

<样品信息>


色谱柱: LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 1.0ml/min
 柱 温: 30°C 波 长: 220nm/240nm
 数据文件名: TWKSS\$YMP-4147 - 31-41/31-1039-2 - YMP-4147-twsf-1-PTFE-600z-480min-gsp2.lcd
 方法文件名: TWKSS\$YMP-4147 - YMP-4147-twsf-新-FX280.lcm
 批处理文件名: TWKSS\$YMP-4147 - YMP-4147-20251210-TWSF-FX280.lcb
 样品瓶号: 2-14
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/10 17:21:14 实验者: xiexinhui
 处理时间(V2) : 2025/12/11 08:49:48 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>

mV



mV



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.286	2374023	100.000	286788	6333	1.841	--
总计		2374023	100.000	286788			

检测器A Ch2 240nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.780	175750	100.000	27825	8709	1.234	--
总计		175750	100.000	27825			

图80 曲安奈德益康唑乳膏体外释放HPLC图谱-参比制剂-24A50B-JS40 -PBS7.4:乙醇 (50:50) 介质-600转-480min供试品溶液-1




YMP-4147

<样品信息>


色谱柱: LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 1.0ml/min
 柱 温: 30°C 波 长: 220nm/240nm
 数据文件名: TWKSS\$YMP-4147 - 31-42/31-1040-2 - YMP-4147-twsf-1-PTFE-600z-480min-gsp3.lcd
 方法文件名: TWKSS\$YMP-4147 - YMP-4147-twsf-新-FX280.lcm
 批处理文件名: TWKSS\$YMP-4147 - YMP-4147-20251210-TWSF-FX280.lcb
 样品瓶号: 2-23
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/10 17:26:37 实验者: xiexinhui
 处理时间(V2) : 2025/12/11 08:51:47 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>

mV



mV



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.301	1721499	100.000	221379	7375	1.707	--
总计		1721499	100.000	221379			

检测器A Ch2 240nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.778	118537	100.000	19158	8846	1.197	--
总计		118537	100.000	19158			

图81 曲安奈德益康唑乳膏体外释放HPLC图谱-参比制剂-24A50B-JS40 -PBS7.4:乙醇 (50:50) 介质-600转-480min供试品溶液-1




YMP-4147

<样品信息>


色谱柱: LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 1.0ml/min
 柱 温: 30°C 波 长: 220nm/240nm
 数据文件名: TWKSS\$YMP-4147 - 31-43/31-1041-3 - YMP-4147-twsf-1-PTFE-600z-480min-gsp4.lcd
 方法文件名: TWKSS\$YMP-4147 - YMP-4147-twsf-新-FX280.lcm
 批处理文件名: TWKSS\$YMP-4147 - YMP-4147-20251210-TWSF-FX280.lcb
 样品瓶号: 2-32
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/10 17:32:02 实验者: xiexinhui
 处理时间(V3) : 2025/12/11 08:56:45 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>

mV



mV



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.343	585323	100.000	84739	9705	1.382	--
总计		585323	100.000	84739			

检测器A Ch2 240nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.780	13270	100.000	2168	8949	1.158	--
总计		13270	100.000	2168			

图82 曲安奈德益康唑乳膏体外释放HPLC图谱-自制品25120201批-PBS7.4:乙醇(50:50)介质-600转-480min供试品溶液-1




YMP-4147

<样品信息>


色谱柱: LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 1.0ml/min
 柱 温: 30°C 波 长: 220nm/240nm
 数据文件名: TWKSS\$YMP-4147 - 31-44/31-1042-4 - YMP-4147-twsf-1-PTFE-600z-480min-gsp5.lcd
 方法文件名: TWKSS\$YMP-4147 - YMP-4147-twsf-新-FX280.lcm
 批处理文件名: TWKSS\$YMP-4147 - YMP-4147-20251210-TWSF-FX280.lcb
 样品瓶号: 2-41
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/10 17:37:26 实验者: xiexinhui
 处理时间(V4) : 2025/12/11 08:57:47 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>

mV



mV



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.341	584181	100.000	84876	9743	1.382	--
总计		584181	100.000	84876			

检测器A Ch2 240nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.780	12367	100.000	2025	8967	1.171	--
总计		12367	100.000	2025			

图83 曲安奈德益康唑乳膏体外释放HPLC图谱-自制品25120201批-PBS7.4:乙醇(50:50)介质-600转-480min供试品溶液-1




YMP-4147

<样品信息>


色谱柱: LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 1.0ml/min
 柱 温: 30°C 波 长: 220nm/240nm
 数据文件名: TWKSS\$YMP-4147 - 31-44/31-1043-4 - YMP-4147-twsf-1-PTFE-600z-480min-gsp6.lcd
 方法文件名: TWKSS\$YMP-4147 - YMP-4147-twsf-新-FX280.lcm
 批处理文件名: TWKSS\$YMP-4147 - YMP-4147-20251210-TWSF-FX280.lcb
 样品瓶号: 2-50
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/10 17:42:50 实验者: xiexinhui
 处理时间(V4) : 2025/12/11 08:57:50 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>

mV



mV



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.347	490700	100.000	72017	9897	1.349	--
总计		490700	100.000	72017			

检测器A Ch2 240nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.780	9196	100.000	1510	8886	1.163	--
总计		9196	100.000	1510			

图84 曲安奈德益康唑乳膏体外释放HPLC图谱-自制品25120201批-PBS7.4:乙醇(50:50)介质-600转-480min供试品溶液-1




YMP-4147

<样品信息>


色谱柱: LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 1.0ml/min
 柱 温: 30°C 波 长: 220nm/240nm
 数据文件名: TWKSS\$YMP-4147 - 31-42/31-1044-2 - YMP-4147-twsf-1-PTFE-600z-480min-gsp7.lcd
 方法文件名: TWKSS\$YMP-4147 - YMP-4147-twsf-新-FX280.lcm
 批处理文件名: TWKSS\$YMP-4147 - YMP-4147-20251210-TWSF-FX280.lcb
 样品瓶号: 2-6
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/10 17:48:14 实验者: xiexinhui
 处理时间(V2) : 2025/12/11 08:51:58 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>

mV



mV



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.314	1094037	100.000	151031	8612	1.537	--
总计		1094037	100.000	151031			

检测器A Ch2 240nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.773	52919	100.000	8461	8768	1.211	--
总计		52919	100.000	8461			

图85 曲安奈德益康唑乳膏体外释放HPLC图谱-自制品25082001-30 2Y批-
PBS7.4:乙醇(50:50)介质-600转-480min供试品溶液-1




YMP-4147

<样品信息>


色谱柱: LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 1.0ml/min
 柱 温: 30°C 波 长: 220nm/240nm
 数据文件名: TWKSS\$YMP-4147 - 31-42/31-1045-2 - YMP-4147-twsf-1-PTFE-600z-480min-gsp8.lcd
 方法文件名: TWKSS\$YMP-4147 - YMP-4147-twsf-新-FX280.lcm
 批处理文件名: TWKSS\$YMP-4147 - YMP-4147-20251210-TWSF-FX280.lcb
 样品瓶号: 2-15
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/10 17:53:39 实验者: xiexinhui
 处理时间(V2) : 2025/12/11 08:52:02 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>

mV



mV



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.334	734825	100.000	104642	9362	1.434	--
总计		734825	100.000	104642			

检测器A Ch2 240nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.778	29458	100.000	4795	8867	1.183	--
总计		29458	100.000	4795			

图86 曲安奈德益康唑乳膏体外释放HPLC图谱-自制品25082001-30 2Y批-
PBS7.4:乙醇(50:50)介质-600转-480min供试品溶液-1




YMP-4147

<样品信息>


色谱柱: LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 1.0ml/min
 柱 温: 30°C 波 长: 220nm/240nm
 数据文件名: TWKSS\$YMP-4147 - 31-42/31-1046-2 - YMP-4147-twsf-1-PTFE-600z-480min-gsp9.lcd
 方法文件名: TWKSS\$YMP-4147 - YMP-4147-twsf-新-FX280.lcm
 批处理文件名: TWKSS\$YMP-4147 - YMP-4147-20251210-TWSF-FX280.lcb
 样品瓶号: 2-24
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/10 17:59:04 实验者: xiexinhui
 处理时间(V2) : 2025/12/11 08:52:05 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>

mV



mV



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.335	795598	100.000	112821	9238	1.450	--
总计		795598	100.000	112821			

检测器A Ch2 240nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.783	31829	100.000	5101	8767	1.201	--
总计		31829	100.000	5101			

图87 曲安奈德益康唑乳膏体外释放HPLC图谱-自制品25082001-30 2Y批-
PBS7.4:乙醇 (50:50) 介质-600转-480min供试品溶液-1




YMP-4147

<样品信息>


色谱柱: LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 1.0ml/min
 柱 温: 30°C 波 长: 220nm/240nm
 数据文件名: TWKSS\$YMP-4147 - 31-42/31-1047-2 - YMP-4147-twsf-1-PTFE-600z-480min-gsp10.lcd
 方法文件名: TWKSS\$YMP-4147 - YMP-4147-twsf-新-FX280.lcm
 批处理文件名: TWKSS\$YMP-4147 - YMP-4147-20251210-TWSF-FX280.lcb
 样品瓶号: 2-33
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/10 18:04:28 实验者: xiexinhui
 处理时间(V2) : 2025/12/11 08:52:07 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>

mV



mV



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.300	1760628	100.000	225535	7302	1.715	--
总计		1760628	100.000	225535			

检测器A Ch2 240nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.781	129065	100.000	20700	8769	1.203	--
总计		129065	100.000	20700			

图88 曲安奈德益康唑乳膏体外释放HPLC图谱-参比制剂-24A50B批-PBS7.4:乙醇(50:50)介质-600转-480min供试品溶液-1




YMP-4147

<样品信息>


色谱柱: LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 1.0ml/min
 柱 温: 30°C 波 长: 220nm/240nm
 数据文件名: TWKSS\$YMP-4147 - 31-42/31-1048-2 - YMP-4147-twsf-1-PTFE-600z-480min-gsp11.lcd
 方法文件名: TWKSS\$YMP-4147 - YMP-4147-twsf-新-FX280.lcm
 批处理文件名: TWKSS\$YMP-4147 - YMP-4147-20251210-TWSF-FX280.lcb
 样品瓶号: 2-42
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/10 18:09:52 实验者: xiexinhui
 处理时间(V2) : 2025/12/11 08:52:10 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>

mV



mV



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.300	1755402	100.000	225417	7325	1.711	--
总计		1755402	100.000	225417			

检测器A Ch2 240nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.781	131201	100.000	20880	8727	1.220	--
总计		131201	100.000	20880			

图89 曲安奈德益康唑乳膏体外释放HPLC图谱-参比制剂-24A50B批-PBS7.4:乙醇(50:50)介质-600转-480min供试品溶液-1




YMP-4147

<样品信息>


色谱柱: LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 1.0ml/min
 柱 温: 30°C 波 长: 220nm/240nm
 数据文件名: TWKSS\$YMP-4147 - 31-42/31-1049-2 - YMP-4147-twsf-1-PTFE-600z-480min-gsp12.lcd
 方法文件名: TWKSS\$YMP-4147 - YMP-4147-twsf-新-FX280.lcm
 批处理文件名: TWKSS\$YMP-4147 - YMP-4147-20251210-TWSF-FX280.lcb
 样品瓶号: 2-51
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/10 18:15:15 实验者: xiexinhui
 处理时间(V2) : 2025/12/11 08:52:13 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>

mV



mV



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.296	1897952	100.000	241338	7101	1.736	--
总计		1897952	100.000	241338			

检测器A Ch2 240nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.783	136066	100.000	21979	8871	1.190	--
总计		136066	100.000	21979			

图90 曲安奈德益康唑乳膏体外释放HPLC图谱-参比制剂-24A50B批-PBS7.4:乙醇(50:50)介质-600转-480min供试品溶液-1




YMP-4147

<样品信息>


色谱柱: LP-C18(150mm*4.6mm,5µm) 流 速: 1.0ml/min
 柱 温: 30°C 波 长: 220nm/240nm
 数据文件名: TWKSS\$YMP-4147 - 31-42/31-1050-2 - YMP-4147-twsf-1-PTFE-600z-dzp2-1.lcd
 方法文件名: TWKSS\$YMP-4147 - YMP-4147-twsf-新-FX280.lcm
 批处理文件名: TWKSS\$YMP-4147 - YMP-4147-20251210-TWSF-FX280.lcb
 样品瓶号: 1-27
 进样体积: 20 µl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/10 18:20:39 实验者: xiexinhui
 处理时间(V2) : 2025/12/11 08:52:15 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>

mV



mV



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.258	3042496	100.000	348623	5526	1.950	--
总计		3042496	100.000	348623			

检测器A Ch2 240nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.776	214887	100.000	33917	8738	1.225	--
总计		214887	100.000	33917			

图91 曲安奈德益康唑乳膏体外释放HPLC图谱-
PBS7.4:乙醇 (50:50) 介质-600转-对照品溶液2-1




YMP-4147

<样品信息>


色谱柱: LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 1.0ml/min
 柱 温: 30°C 波 长: 220nm/240nm
 数据文件名: TWKSS\$YMP-4147 - 31-42/31-1051-2 - YMP-4147-twsf-1-PTFE-600z-dzp2-2.lcd
 方法文件名: TWKSS\$YMP-4147 - YMP-4147-twsf-新-FX280.lcm
 批处理文件名: TWKSS\$YMP-4147 - YMP-4147-20251210-TWSF-FX280.lcb
 样品瓶号: 1-27
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/10 18:26:03 实验者: xiexinhui
 处理时间(V2) : 2025/12/11 08:52:18 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>

mV



mV



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.268	3023057	100.000	345863	5571	1.961	--
总计		3023057	100.000	345863			

检测器A Ch2 240nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.784	213484	100.000	33580	8742	1.232	--
总计		213484	100.000	33580			

图92 曲安奈德益康唑乳膏体外释放HPLC图谱-
PBS7.4:乙醇 (50:50) 介质-600转-对照品溶液2-1