




# J334

## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(4.6\*50mm,5μm) 流速: 1.8ml/min  
 柱温 : 40°C 波长: 245nm  
 数据文件名 : RC\$J334 - 0-65/7-228-2 - zzp-cq24y-25d-rcd-pH1.0jz-jf50z-rj.lcd  
 方法文件名 : RC\$J334 - J334-rcd-FX256.lcm  
 批处理文件名 : RC\$J334 - 20251223-rcd-FX256.lcb  
 样品瓶号 : 1-9  
 进样体积 : 20μl 版本号: 6.115  
 进样时间 : 2025/12/23 14:30:01 实验者: xiexinhui  
 处理时间 (V2) : 2025/12/24 08:28:44 处理者: xiexinhui  
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX256)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 245nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图1 盐酸伐地那非口崩片溶出度测定长期24月25 HPLC图谱  
自制品-pH1.0介质-浆法-50转  
溶剂

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(4.6*50mm,5µm)	流速	: 1.8ml/min
柱温	: 40°C	波长	: 245nm
数据文件名	: RC\$J334 - 0-65/7-229-2 - zzp-cq24y-25d-rcd-pH1.0jz-jf50z-dz1-1.lcd		
方法文件名	: RC\$J334 - J334-rcd-FX256.lcm		
批处理文件名	: RC\$J334 - 20251223-rcd-FX256.lcb		
样品瓶号	: 1-18	版本号	: 6.115
进样体积	: 20µl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2025/12/23 14:33:24	处理者	: xiexinhui
处理时间 (V2)	: 2025/12/24 08:28:53		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C(FX256)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 245nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.363	362537	100.000	48734	2390	1.164	--
总计		362537	100.000	48734			

图2 盐酸伐地那非口崩片溶出度测定长期24月25 HPLC图谱  
自制品-pH1.0介质-浆法-50转  
对照品溶液-1-1






<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(4.6*50mm,5µm)	流速	: 1.8ml/min
柱温	: 40°C	波长	: 245nm
数据文件名	: RC\$J334 - 0-65/7-232-2 - zzp-cq24y-25d-rcd-pH1.0jz-jf50z-dz1-4.lcd		
方法文件名	: RC\$J334 - J334-rcd-FX256.lcm		
批处理文件名	: RC\$J334 - 20251223-rcd-FX256.lcb		
样品瓶号	: 1-18	版本号	: 6.115
进样体积	: 20µl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2025/12/23 14:43:34	处理者	: xiexinhui
处理时间 (V2)	: 2025/12/24 08:29:16		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C(FX256)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 245nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.362	363221	100.000	49055	2420	1.167	--
总计		363221	100.000	49055			

图5 盐酸伐地那非口崩片溶出度测定长期24月25 HPLC图谱  
自制品-pH1.0介质-浆法-50转  
对照品溶液-1-4

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(4.6*50mm,5µm)	流速	: 1.8ml/min
柱温	: 40°C	波长	: 245nm
数据文件名	: RC\$J334 - 0-65/7-233-2 - zzp-cq24y-25d-rcd-pH1.0jz-jf50z-dz1-5.lcd		
方法文件名	: RC\$J334 - J334-rcd-FX256.lcm		
批处理文件名	: RC\$J334 - 20251223-rcd-FX256.lcb		
样品瓶号	: 1-18	版本号	: 6.115
进样体积	: 20µl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2025/12/23 14:46:57	处理者	: xiexinhui
处理时间 (V2)	: 2025/12/24 08:29:23		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C(FX256)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 245nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.362	362540	100.000	49046	2425	1.166	--
总计		362540	100.000	49046			

图6 盐酸伐地那非口崩片溶出度测定长期24月25 HPLC图谱  
自制品-pH1.0介质-浆法-50转  
对照品溶液-1-5

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(4.6*50mm,5μm)	流速: 1.8ml/min
柱温 : 40°C	波长: 245nm
数据文件名 : RC\$J334 - 0-65/7-234-2 - zzp-2023120221p-cq24y-25d-rcd-pH1.0jz-jf50z-P1-1.lcd	
方法文件名 : RC\$J334 - J334-rcd-FX256.lcm	
批处理文件名 : RC\$J334 - 20251223-rcd-FX256.lcb	
样品瓶号 : 1-1	版本号: 6.115
进样体积 : 20μl	实验者: xiexinhui
进样时间 : 2025/12/23 14:50:20	处理者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2025/12/24 08:29:30	
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX256)	

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 245nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.361	397147	100.000	54225	2471	1.168	--
总计		397147	100.000	54225			

图7 盐酸伐地那非口崩片溶出度测定长期24月25 HPLC图谱  
自制品(2023120221批)-pH1.0介质-浆法-50转-片1  
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(4.6*50mm,5µm)	流速: 1.8ml/min
柱温 : 40°C	波长: 245nm
数据文件名 : RC\$J334 - 0-65/7-235-2 - zzp-2023120221p-cq24y-25d-rcd-pH1.0jz-jf50z-P1-2.lcd	
方法文件名 : RC\$J334 - J334-rcd-FX256.lcm	
批处理文件名: RC\$J334 - 20251223-rcd-FX256.lcb	
样品瓶号 : 1-1	版本号: 6.115
进样体积 : 20µl	实验者: xiexinhui
进样时间 : 2025/12/23 14:53:43	处理者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2025/12/24 08:29:38	
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX256)	

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 245nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.361	396895	100.000	54223	2476	1.169	--
总计		396895	100.000	54223			

图8 盐酸伐地那非口崩片溶出度测定长期24月25 HPLC图谱  
自制品(2023120221批)-pH1.0介质-桨法-50转-片1  
供试品溶液-2

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(4.6*50mm,5μm)	流速	: 1.8ml/min
柱温	: 40°C	波长	: 245nm
数据文件名	: RC\$J334 - 0-65/7-236-2 - zzp-2023120221p-cq24y-25d-rcd-pH1.0jz-jf50z-P2-1.lcd		
方法文件名	: RC\$J334 - J334-rcd-FX256.lcm		
批处理文件名	: RC\$J334 - 20251223-rcd-FX256.lcb		
样品瓶号	: 1-10	版本号	: 6.115
进样体积	: 20μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2025/12/23 14:57:06	处理者	: xiexinhui
处理时间 (V2)	: 2025/12/24 08:29:45		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C(FX256)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 245nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.360	404418	100.000	55162	2474	1.171	--
总计		404418	100.000	55162			

图9 盐酸伐地那非口崩片溶出度测定长期24月25 HPLC图谱  
自制品(2023120221批)-pH1.0介质-桨法-50转-片2  
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(4.6*50mm,5µm)	流速	: 1.8ml/min
柱温	: 40°C	波长	: 245nm
数据文件名	: RC\$J334 - 0-65/7-237-2 - zzp-2023120221p-cq24y-25d-rcd-pH1.0jz-jf50z-P2-2.lcd		
方法文件名	: RC\$J334 - J334-rcd-FX256.lcm		
批处理文件名	: RC\$J334 - 20251223-rcd-FX256.lcb		
样品瓶号	: 1-10	版本号	: 6.115
进样体积	: 20µl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2025/12/23 15:00:29	处理者	: xiexinhui
处理时间 (V2)	: 2025/12/24 08:29:52		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C(FX256)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 245nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.359	404814	100.000	55290	2482	1.173	--
总计		404814	100.000	55290			

图10 盐酸伐地那非口崩片溶出度测定长期24月25 HPLC图谱  
自制品(2023120221批)-pH1.0介质-桨法-50转-片2  
供试品溶液-2

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(4.6*50mm,5μm)	流速: 1.8ml/min
柱温 : 40°C	波长: 245nm
数据文件名 : RC\$J334 - 0-65/7-238-2 - zzp-2023120221p-cq24y-25d-rcd-pH1.0jz-jf50z-P3-1.lcd	
方法文件名 : RC\$J334 - J334-rcd-FX256.lcm	
批处理文件名 : RC\$J334 - 20251223-rcd-FX256.lcb	
样品瓶号 : 1-19	版本号: 6.115
进样体积 : 20μl	实验者: xiexinhui
进样时间 : 2025/12/23 15:03:52	处理者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2025/12/24 08:30:00	
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX256)	

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 245nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.359	406208	100.000	55466	2479	1.171	--
总计		406208	100.000	55466			

图11 盐酸伐地那非口崩片溶出度测定长期24月25 HPLC图谱  
自制品(2023120221批)-pH1.0介质-浆法-50转-片3  
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(4.6*50mm,5µm)	流速: 1.8ml/min
柱温 : 40°C	波长: 245nm
数据文件名 : RC\$J334 - 0-65/7-239-2 - zzp-2023120221p-cq24y-25d-rcd-pH1.0jz-jf50z-P3-2.lcd	
方法文件名 : RC\$J334 - J334-rcd-FX256.lcm	
批处理文件名 : RC\$J334 - 20251223-rcd-FX256.lcb	
样品瓶号 : 1-19	版本号: 6.115
进样体积 : 20µl	实验者: xiexinhui
进样时间 : 2025/12/23 15:07:14	处理者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2025/12/24 08:30:07	
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX256)	

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 245nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.358	406536	100.000	55649	2492	1.173	--
总计		406536	100.000	55649			


图12 盐酸伐地那非口崩片溶出度测定长期24月25 HPLC图谱  
自制品(2023120221批)-pH1.0介质-浆法-50转-片3  
供试品溶液-2



<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(4.6*50mm,5µm)	流速	: 1.8ml/min
柱温	: 40°C	波长	: 245nm
数据文件名	: RC\$J334 - 0-65/7-241-2 - zzp-2023120221p-cq24y-25d-rcd-pH1.0jz-jf50z-P4-2.lcd		
方法文件名	: RC\$J334 - J334-rcd-FX256.lcm		
批处理文件名	: RC\$J334 - 20251223-rcd-FX256.lcb		
样品瓶号	: 1-28	版本号	: 6.115
进样体积	: 20µl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2025/12/23 15:13:58	处理者	: xiexinhui
处理时间 (V2)	: 2025/12/24 08:30:21		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C(FX256)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 245nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.358	424682	100.000	58311	2497	1.175	--
总计		424682	100.000	58311			

图14 盐酸伐地那非口崩片溶出度测定长期24月25 HPLC图谱  
自制品(2023120221批)-pH1.0介质-桨法-50转-片4  
供试品溶液-2

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(4.6*50mm,5µm)	流速	: 1.8ml/min
柱温	: 40°C	波长	: 245nm
数据文件名	: RC\$J334 - 0-65/7-242-2 - zzp-2023120221p-cq24y-25d-rcd-pH1.0jz-jf50z-P5-1.lcd		
方法文件名	: RC\$J334 - J334-rcd-FX256.lcm		
批处理文件名	: RC\$J334 - 20251223-rcd-FX256.lcb		
样品瓶号	: 1-37	版本号	: 6.115
进样体积	: 20µl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2025/12/23 15:17:21	处理者	: xiexinhui
处理时间 (V2)	: 2025/12/24 08:30:29		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C(FX256)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 245nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.358	399551	100.000	54825	2499	1.172	--
总计		399551	100.000	54825			


图15 盐酸伐地那非口崩片溶出度测定长期24月25 HPLC图谱  
自制品(2023120221批)-pH1.0介质-浆法-50转-片5  
供试品溶液-1



<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(4.6*50mm,5μm)	流速	: 1.8ml/min
柱温	: 40°C	波长	: 245nm
数据文件名	: RC\$J334 - 0-65/7-244-2 - zzp-2023120221p-cq24y-25d-rcd-pH1.0jz-jf50z-P6-1.lcd		
方法文件名	: RC\$J334 - J334-rcd-FX256.lcm		
批处理文件名	: RC\$J334 - 20251223-rcd-FX256.lcb		
样品瓶号	: 1-46	版本号	: 6.115
进样体积	: 20μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2025/12/23 15:24:06	处理者	: xiexinhui
处理时间 (V2)	: 2025/12/24 08:30:43		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C(FX256)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 245nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.357	407497	100.000	56149	2507	1.172	--
总计		407497	100.000	56149			

图17 盐酸伐地那非口崩片溶出度测定长期24月25 HPLC图谱  
自制品(2023120221批)-pH1.0介质-桨法-50转-片6  
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(4.6*50mm,5μm)	流速: 1.8ml/min
柱温 : 40°C	波长: 245nm
数据文件名 : RC\$J334 - 0-65/7-245-2 - zzp-2023120221p-cq24y-25d-rcd-pH1.0jz-jf50z-P6-2.lcd	
方法文件名 : RC\$J334 - J334-rcd-FX256.lcm	
批处理文件名 : RC\$J334 - 20251223-rcd-FX256.lcb	
样品瓶号 : 1-46	版本号: 6.115
进样体积 : 20μl	实验者: xiexinhui
进样时间 : 2025/12/23 15:27:29	处理者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2025/12/24 08:30:50	
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX256)	

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 245nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.355	407181	100.000	56034	2494	1.174	--
总计		407181	100.000	56034			


图18 盐酸伐地那非口崩片溶出度测定长期24月25 HPLC图谱  
自制品(2023120221批)-pH1.0介质-浆法-50转-片6  
供试品溶液-2



<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(4.6*50mm,5µm)	流速: 1.8ml/min
柱温 : 40°C	波长: 245nm
数据文件名 : RC\$J334 - 0-65/7-247-2 - zzp-2023120521p-cq24y-25d-rcd-pH1.0jz-jf50z-P1-2.lcd	
方法文件名 : RC\$J334 - J334-rcd-FX256.lcm	
批处理文件名 : RC\$J334 - 20251223-rcd-FX256.lcb	
样品瓶号 : 1-2	版本号: 6.115
进样体积 : 20µl	实验者: xiexinhui
进样时间 : 2025/12/23 15:34:15	处理者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2025/12/24 08:31:05	
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX256)	

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 245nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.356	400859	100.000	55199	2500	1.173	--
总计		400859	100.000	55199			

图20 盐酸伐地那非口崩片溶出度测定长期24月25 HPLC图谱  
自制品(2023120521批)-pH1.0介质-桨法-50转-片1  
供试品溶液-2

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(4.6*50mm,5µm)	流速: 1.8ml/min
柱温 : 40°C	波长: 245nm
数据文件名 : RC\$J334 - 0-65/7-248-2 - zzp-2023120521p-cq24y-25d-rcd-pH1.0jz-jf50z-P2-1.lcd	
方法文件名 : RC\$J334 - J334-rcd-FX256.lcm	
批处理文件名 : RC\$J334 - 20251223-rcd-FX256.lcb	
样品瓶号 : 1-11	版本号: 6.115
进样体积 : 20µl	实验者: xiexinhui
进样时间 : 2025/12/23 15:37:38	处理者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2025/12/24 08:31:12	
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX256)	

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 245nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.356	391221	100.000	53754	2498	1.172	--
总计		391221	100.000	53754			

图21 盐酸伐地那非口崩片溶出度测定长期24月25 HPLC图谱  
自制品(2023120521批)-pH1.0介质-浆法-50转-片2  
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(4.6*50mm,5μm)	流速: 1.8ml/min
柱温 : 40°C	波长: 245nm
数据文件名 : RC\$J334 - 0-65/7-249-2 - zzp-2023120521p-cq24y-25d-rcd-pH1.0jz-jf50z-P2-2.lcd	
方法文件名 : RC\$J334 - J334-rcd-FX256.lcm	
批处理文件名 : RC\$J334 - 20251223-rcd-FX256.lcb	
样品瓶号 : 1-11	版本号: 6.115
进样体积 : 20μl	实验者: xiexinhui
进样时间 : 2025/12/23 15:41:01	处理者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2025/12/24 08:31:20	
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX256)	

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 245nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.356	390741	100.000	53780	2502	1.172	--
总计		390741	100.000	53780			

图22 盐酸伐地那非口崩片溶出度测定长期24月25 HPLC图谱  
自制品(2023120521批)-pH1.0介质-桨法-50转-片2  
供试品溶液-2

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(4.6*50mm,5μm)	流速	: 1.8ml/min
柱温	: 40°C	波长	: 245nm
数据文件名	: RC\$J334 - 0-65/7-250-2 - zzp-2023120521p-cq24y-25d-rcd-pH1.0jz-jf50z-P3-1.lcd		
方法文件名	: RC\$J334 - J334-rcd-FX256.lcm		
批处理文件名	: RC\$J334 - 20251223-rcd-FX256.lcb		
样品瓶号	: 1-20	版本号	: 6.115
进样体积	: 20μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2025/12/23 15:44:24	处理者	: xiexinhui
处理时间 (V2)	: 2025/12/24 08:31:27		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C(FX256)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 245nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.356	390041	100.000	53665	2501	1.172	--
总计		390041	100.000	53665			

图23 盐酸伐地那非口崩片溶出度测定长期24月25 HPLC图谱  
自制品(2023120521批)-pH1.0介质-浆法-50转-片3  
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(4.6*50mm,5µm)	流速: 1.8ml/min
柱温 : 40°C	波长: 245nm
数据文件名 : RC\$J334 - 0-65/7-251-2 - zzp-2023120521p-cq24y-25d-rcd-pH1.0jz-jf50z-P3-2.lcd	
方法文件名 : RC\$J334 - J334-rcd-FX256.lcm	
批处理文件名: RC\$J334 - 20251223-rcd-FX256.lcb	
样品瓶号 : 1-20	版本号: 6.115
进样体积 : 20µl	实验者: xiexinhui
进样时间 : 2025/12/23 15:47:46	处理者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2025/12/24 08:31:34	
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX256)	

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 245nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.356	389768	100.000	53721	2507	1.171	--
总计		389768	100.000	53721			

图24 盐酸伐地那非口崩片溶出度测定长期24月25 HPLC图谱  
自制品(2023120521批)-pH1.0介质-桨法-50转-片3  
供试品溶液-2

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(4.6*50mm,5µm)	流速	: 1.8ml/min
柱温	: 40°C	波长	: 245nm
数据文件名	: RC\$J334 - 0-65/7-252-2 - zzp-2023120521p-cq24y-25d-rcd-pH1.0jz-jf50z-P4-1.lcd		
方法文件名	: RC\$J334 - J334-rcd-FX256.lcm		
批处理文件名	: RC\$J334 - 20251223-rcd-FX256.lcb		
样品瓶号	: 1-29	版本号	: 6.115
进样体积	: 20µl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2025/12/23 15:51:08	处理者	: xiexinhui
处理时间 (V2)	: 2025/12/24 08:31:42		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C(FX256)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 245nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.355	416894	100.000	57525	2508	1.173	--
总计		416894	100.000	57525			

图25 盐酸伐地那非口崩片溶出度测定长期24月25 HPLC图谱  
自制品(2023120521批)-pH1.0介质-浆法-50转-片4  
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(4.6*50mm,5μm)	流速: 1.8ml/min
柱温 : 40°C	波长: 245nm
数据文件名 : RC\$J334 - 0-65/7-253-2 - zzp-2023120521p-cq24y-25d-rcd-pH1.0jz-jf50z-P4-2.lcd	
方法文件名 : RC\$J334 - J334-rcd-FX256.lcm	
批处理文件名 : RC\$J334 - 20251223-rcd-FX256.lcb	
样品瓶号 : 1-29	版本号: 6.115
进样体积 : 20μl	实验者: xiexinhui
进样时间 : 2025/12/23 15:54:31	处理者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2025/12/24 08:31:49	
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX256)	

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 245nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.355	416893	100.000	57539	2510	1.172	--
总计		416893	100.000	57539			

图26 盐酸伐地那非口崩片溶出度测定长期24月25 HPLC图谱  
自制品(2023120521批)-pH1.0介质-桨法-50转-片4  
供试品溶液-2

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(4.6*50mm,5µm)	流速	: 1.8ml/min
柱温	: 40°C	波长	: 245nm
数据文件名	: RC\$J334 - 0-65/7-254-2 - zzp-2023120521p-cq24y-25d-rcd-pH1.0jz-jf50z-P5-1.lcd		
方法文件名	: RC\$J334 - J334-rcd-FX256.lcm		
批处理文件名	: RC\$J334 - 20251223-rcd-FX256.lcb		
样品瓶号	: 1-38	版本号	: 6.115
进样体积	: 20µl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2025/12/23 15:57:54	处理者	: xiexinhui
处理时间 (V2)	: 2025/12/24 08:31:56		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C(FX256)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 245nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.356	399919	100.000	55162	2510	1.171	--
总计		399919	100.000	55162			

图27 盐酸伐地那非口崩片溶出度测定长期24月25 HPLC图谱  
自制品(2023120521批)-pH1.0介质-桨法-50转-片5  
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(4.6*50mm,5μm)	流速: 1.8ml/min
柱温 : 40°C	波长: 245nm
数据文件名 : RC\$J334 - 0-65/7-255-2 - zzp-2023120521p-cq24y-25d-rcd-pH1.0jz-jf50z-P5-2.lcd	
方法文件名 : RC\$J334 - J334-rcd-FX256.lcm	
批处理文件名 : RC\$J334 - 20251223-rcd-FX256.lcb	
样品瓶号 : 1-38	版本号: 6.115
进样体积 : 20μl	实验者: xiexinhui
进样时间 : 2025/12/23 16:01:17	处理者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2025/12/24 08:32:04	
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX256)	

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 245nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.356	399719	100.000	55187	2513	1.171	--
总计		399719	100.000	55187			


图28 盐酸伐地那非口崩片溶出度测定长期24月25 HPLC图谱  
自制品(2023120521批)-pH1.0介质-桨法-50转-片5  
供试品溶液-2



<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(4.6*50mm,5µm)	流速	: 1.8ml/min
柱温	: 40°C	波长	: 245nm
数据文件名	: RC\$J334 - 0-65/7-257-2 - zzp-2023120521p-cq24y-25d-rcd-pH1.0jz-jf50z-P6-2.lcd		
方法文件名	: RC\$J334 - J334-rcd-FX256.lcm		
批处理文件名	: RC\$J334 - 20251223-rcd-FX256.lcb		
样品瓶号	: 1-47	版本号	: 6.115
进样体积	: 20µl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2025/12/23 16:08:01	处理者	: xiexinhui
处理时间 (V2)	: 2025/12/24 08:32:18		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C(FX256)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 245nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.355	394404	100.000	54484	2513	1.171	--
总计		394404	100.000	54484			


图30 盐酸伐地那非口崩片溶出度测定长期24月25 HPLC图谱  
自制品(2023120521批)-pH1.0介质-桨法-50转-片6  
供试品溶液-2



<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(4.6*50mm,5µm)	流速	: 1.8ml/min
柱温	: 40°C	波长	: 245nm
数据文件名	: RC\$J334 - 0-65/7-259-2 - zzp-2023120621p-cq24y-25d-rcd-pH1.0jz-jf50z-P1-2.lcd		
方法文件名	: RC\$J334 - J334-rcd-FX256.lcm		
批处理文件名	: RC\$J334 - 20251223-rcd-FX256.lcb		
样品瓶号	: 1-3	版本号	: 6.115
进样体积	: 20µl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2025/12/23 16:14:48	处理者	: xiexinhui
处理时间 (V2)	: 2025/12/24 08:32:33		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C(FX256)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 245nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.355	403049	100.000	55759	2519	1.171	--
总计		403049	100.000	55759			

图32 盐酸伐地那非口崩片溶出度测定长期24月25 HPLC图谱  
自制品(2023120621批)-pH1.0介质-浆法-50转-片1  
供试品溶液-2

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(4.6*50mm,5μm)	流速	: 1.8ml/min
柱温	: 40°C	波长	: 245nm
数据文件名	: RC\$J334 - 0-65/7-260-2 - zzp-2023120621p-cq24y-25d-rcd-pH1.0jz-jf50z-P2-1.lcd		
方法文件名	: RC\$J334 - J334-rcd-FX256.lcm		
批处理文件名	: RC\$J334 - 20251223-rcd-FX256.lcb		
样品瓶号	: 1-12	版本号	: 6.115
进样体积	: 20μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2025/12/23 16:18:11	处理者	: xiexinhui
处理时间 (V2)	: 2025/12/24 08:32:40		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C(FX256)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 245nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.355	390615	100.000	54019	2521	1.171	--
总计		390615	100.000	54019			

图33 盐酸伐地那非口崩片溶出度测定长期24月25 HPLC图谱  
自制品(2023120621批)-pH1.0介质-桨法-50转-片2  
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(4.6*50mm,5µm)	流速	: 1.8ml/min
柱温	: 40°C	波长	: 245nm
数据文件名	: RC\$J334 - 0-65/7-261-2 - zzp-2023120621p-cq24y-25d-rcd-pH1.0jz-jf50z-P2-2.lcd		
方法文件名	: RC\$J334 - J334-rcd-FX256.lcm		
批处理文件名	: RC\$J334 - 20251223-rcd-FX256.lcb		
样品瓶号	: 1-12	版本号	: 6.115
进样体积	: 20µl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2025/12/23 16:21:34	处理者	: xiexinhui
处理时间 (V2)	: 2025/12/24 08:32:48		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C(FX256)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 245nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.355	390005	100.000	53995	2525	1.170	--
总计		390005	100.000	53995			

图34 盐酸伐地那非口崩片溶出度测定长期24月25 HPLC图谱  
自制品(2023120621批)-pH1.0介质-浆法-50转-片2  
供试品溶液-2

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(4.6*50mm,5µm)	流速	: 1.8ml/min
柱温	: 40°C	波长	: 245nm
数据文件名	: RC\$J334 - 0-65/7-262-2 - zzp-2023120621p-cq24y-25d-rcd-pH1.0jz-jf50z-P3-1.lcd		
方法文件名	: RC\$J334 - J334-rcd-FX256.lcm		
批处理文件名	: RC\$J334 - 20251223-rcd-FX256.lcb		
样品瓶号	: 1-21	版本号	: 6.115
进样体积	: 20µl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2025/12/23 16:24:57	处理者	: xiexinhui
处理时间 (V2)	: 2025/12/24 08:32:55		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C(FX256)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 245nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.355	391652	100.000	54129	2519	1.171	--
总计		391652	100.000	54129			

图35 盐酸伐地那非口崩片溶出度测定长期24月25 HPLC图谱  
自制品(2023120621批)-pH1.0介质-桨法-50转-片3  
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(4.6*50mm,5µm)	流速	: 1.8ml/min
柱温	: 40°C	波长	: 245nm
数据文件名	: RC\$J334 - 0-65/7-263-2 - zzp-2023120621p-cq24y-25d-rcd-pH1.0jz-jf50z-P3-2.lcd		
方法文件名	: RC\$J334 - J334-rcd-FX256.lcm		
批处理文件名	: RC\$J334 - 20251223-rcd-FX256.lcb		
样品瓶号	: 1-21	版本号	: 6.115
进样体积	: 20µl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2025/12/23 16:28:19	处理者	: xiexinhui
处理时间 (V2)	: 2025/12/24 08:33:03		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C(FX256)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 245nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.354	391580	100.000	54182	2524	1.170	--
总计		391580	100.000	54182			

图36 盐酸伐地那非口崩片溶出度测定长期24月25 HPLC图谱  
自制品(2023120621批)-pH1.0介质-桨法-50转-片3  
供试品溶液-2

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(4.6*50mm,5μm)	流速: 1.8ml/min
柱温 : 40°C	波长: 245nm
数据文件名 : RC\$J334 - 0-65/7-264-2 - zzp-2023120621p-cq24y-25d-rcd-pH1.0jz-jf50z-P4-1.lcd	
方法文件名 : RC\$J334 - J334-rcd-FX256.lcm	
批处理文件名 : RC\$J334 - 20251223-rcd-FX256.lcb	
样品瓶号 : 1-30	版本号: 6.115
进样体积 : 20μl	实验者: xiexinhui
进样时间 : 2025/12/23 16:31:41	处理者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2025/12/24 08:33:10	
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX256)	

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 245nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.355	393400	100.000	54512	2528	1.170	--
总计		393400	100.000	54512			


图37 盐酸伐地那非口崩片溶出度测定长期24月25 HPLC图谱  
自制品(2023120621批)-pH1.0介质-浆法-50转-片4  
供试品溶液-1



<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(4.6*50mm,5µm)	流速	: 1.8ml/min
柱温	: 40°C	波长	: 245nm
数据文件名	: RC\$J334 - 0-65/7-266-2 - zzp-2023120621p-cq24y-25d-rcd-pH1.0jz-jf50z-P5-1.lcd		
方法文件名	: RC\$J334 - J334-rcd-FX256.lcm		
批处理文件名	: RC\$J334 - 20251223-rcd-FX256.lcb		
样品瓶号	: 1-39	版本号	: 6.115
进样体积	: 20µl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2025/12/23 16:38:27	处理者	: xiexinhui
处理时间 (V2)	: 2025/12/24 08:33:24		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C(FX256)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 245nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.355	393004	100.000	54430	2522	1.169	--
总计		393004	100.000	54430			

图39 盐酸伐地那非口崩片溶出度测定长期24月25 HPLC图谱  
自制品(2023120621批)-pH1.0介质-桨法-50转-片5  
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(4.6*50mm,5μm)	流速: 1.8ml/min
柱温 : 40°C	波长: 245nm
数据文件名 : RC\$J334 - 0-65/7-267-2 - zzp-2023120621p-cq24y-25d-rcd-pH1.0jz-jf50z-P5-2.lcd	
方法文件名 : RC\$J334 - J334-rcd-FX256.lcm	
批处理文件名: RC\$J334 - 20251223-rcd-FX256.lcb	
样品瓶号 : 1-39	版本号: 6.115
进样体积 : 20μl	实验者: xiexinhui
进样时间 : 2025/12/23 16:41:51	处理者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2025/12/24 08:33:31	
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX256)	

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 245nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.355	393882	100.000	54445	2521	1.170	--
总计		393882	100.000	54445			

图40 盐酸伐地那非口崩片溶出度测定长期24月25 HPLC图谱  
自制品(2023120621批)-pH1.0介质-桨法-50转-片5  
供试品溶液-2

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(4.6*50mm,5μm)	流速	: 1.8ml/min
柱温	: 40°C	波长	: 245nm
数据文件名	: RC\$J334 - 0-65/7-268-2 - zzp-2023120621p-cq24y-25d-rcd-pH1.0jz-jf50z-P6-1.lcd		
方法文件名	: RC\$J334 - J334-rcd-FX256.lcm		
批处理文件名	: RC\$J334 - 20251223-rcd-FX256.lcb		
样品瓶号	: 1-48	版本号	: 6.115
进样体积	: 20μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2025/12/23 16:45:13	处理者	: xiexinhui
处理时间 (V2)	: 2025/12/24 08:33:38		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C(FX256)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 245nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.354	413218	100.000	57126	2519	1.172	--
总计		413218	100.000	57126			

图41 盐酸伐地那非口崩片溶出度测定长期24月25 HPLC图谱  
自制品(2023120621批)-pH1.0介质-桨法-50转-片6  
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(4.6*50mm,5µm)	流速	: 1.8ml/min
柱温	: 40°C	波长	: 245nm
数据文件名	: RC\$J334 - 0-65/7-269-2 - zzp-2023120621p-cq24y-25d-rcd-pH1.0jz-jf50z-P6-2.lcd		
方法文件名	: RC\$J334 - J334-rcd-FX256.lcm		
批处理文件名	: RC\$J334 - 20251223-rcd-FX256.lcb		
样品瓶号	: 1-48	版本号	: 6.115
进样体积	: 20µl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2025/12/23 16:48:36	处理者	: xiexinhui
处理时间 (V2)	: 2025/12/24 08:33:45		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C(FX256)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 245nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.354	413446	100.000	57174	2520	1.173	--
总计		413446	100.000	57174			

图42 盐酸伐地那非口崩片溶出度测定长期24月25 HPLC图谱  
自制品(2023120621批)-pH1.0介质-桨法-50转-片6  
供试品溶液-2

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(4.6*50mm,5μm)	流速	: 1.8ml/min
柱温	: 40°C	波长	: 245nm
数据文件名	: RC\$J334 - 0-65/7-270-2 - zzp-cq24y-25d-rcd-pH1.0jz-jf50z-dz2-1.lcd		
方法文件名	: RC\$J334 - J334-rcd-FX256.lcm		
批处理文件名	: RC\$J334 - 20251223-rcd-FX256.lcb		
样品瓶号	: 1-27	版本号	: 6.115
进样体积	: 20μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2025/12/23 16:51:59	处理者	: xiexinhui
处理时间 (V2)	: 2025/12/24 08:33:52		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C(FX256)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 245nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.354	362046	100.000	49576	2467	1.170	--
总计		362046	100.000	49576			

图43 盐酸伐地那非口崩片溶出度测定长期24月25 HPLC图谱  
自制品-pH1.0介质-浆法-50转  
对照品溶液-2-1

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(4.6*50mm,5µm)	流速	: 1.8ml/min
柱温	: 40°C	波长	: 245nm
数据文件名	: RC\$J334 - 0-65/7-271-2 - zzp-cq24y-25d-rcd-pH1.0jz-jf50z-dz2-2.lcd		
方法文件名	: RC\$J334 - J334-rcd-FX256.lcm		
批处理文件名	: RC\$J334 - 20251223-rcd-FX256.lcb		
样品瓶号	: 1-27	版本号	: 6.115
进样体积	: 20µl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2025/12/23 16:55:22	处理者	: xiexinhui
处理时间 (V2)	: 2025/12/24 08:33:59		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C(FX256)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 245nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.353	362288	100.000	49565	2463	1.169	--
总计		362288	100.000	49565			

图44 盐酸伐地那非口崩片溶出度测定长期24月25 HPLC图谱  
自制品-pH1.0介质-浆法-50转  
对照品溶液-2-2








# J334

## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(4.6\*50mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.8ml/min  
 柱温 : 40 $^{\circ}$ C 波长: 245nm  
 数据文件名 : RC\$J334 - 0-65/7-274-2 - zzp-cq24y-30d-rcd-pH1.0jz-jf50z-dz1-2.lcd  
 方法文件名 : RC\$J334 - J334-rcd-FX256.lcm  
 批处理文件名: RC\$J334 - 20251223-rcd-FX256.lcb  
 样品瓶号 : 2-18  
 进样体积 : 20 $\mu$ l 版本号: 6.115  
 进样时间 : 2025/12/23 17:05:34 实验者: xiexinhui  
 处理时间 (V2) : 2025/12/24 08:34:20 处理者: xiexinhui  
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX256)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 245nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.354	361951	100.000	49573	2465	1.167	--
总计		361951	100.000	49573			

图47 盐酸伐地那非口崩片溶出度测定长期24月30 HPLC图谱  
 自制品-pH1.0介质-浆法-50转  
 对照品溶液-1-2




# J334

## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(4.6\*50mm,5μm) 流速: 1.8ml/min  
 柱温 : 40°C 波长: 245nm  
 数据文件名 : RC\$J334 - 0-65/7-275-2 - zzp-cq24y-30d-rcd-pH1.0jz-jf50z-dz1-3.lcd  
 方法文件名 : RC\$J334 - J334-rcd-FX256.lcm  
 批处理文件名: RC\$J334 - 20251223-rcd-FX256.lcb  
 样品瓶号 : 2-18  
 进样体积 : 20μl 版本号: 6.115  
 进样时间 : 2025/12/23 17:08:58 实验者: xiexinhui  
 处理时间 (V2) : 2025/12/24 08:34:27 处理者: xiexinhui  
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX256)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 245nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.354	362217	100.000	49552	2460	1.167	--
总计		362217	100.000	49552			

图48 盐酸伐地那非口崩片溶出度测定长期24月30 HPLC图谱  
 自制品-pH1.0介质-浆法-50转  
 对照品溶液-1-3




# J334

## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(4.6\*50mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.8ml/min  
 柱温 : 40 $^{\circ}$ C 波长: 245nm  
 数据文件名 : RC\$J334 - 0-65/7-276-2 - zzp-cq24y-30d-rcd-pH1.0jz-jf50z-dz1-4.lcd  
 方法文件名 : RC\$J334 - J334-rcd-FX256.lcm  
 批处理文件名: RC\$J334 - 20251223-rcd-FX256.lcb  
 样品瓶号 : 2-18  
 进样体积 : 20 $\mu$ l 版本号: 6.115  
 进样时间 : 2025/12/23 17:12:24 实验者: xiexinhui  
 处理时间 (V2) : 2025/12/24 08:34:34 处理者: xiexinhui  
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX256)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 245nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.354	361526	100.000	49512	2460	1.167	--
总计		361526	100.000	49512			

图49 盐酸伐地那非口崩片溶出度测定长期24月30 HPLC图谱  
 自制品-pH1.0介质-浆法-50转  
 对照品溶液-1-4




# J334

## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(4.6\*50mm,5μm) 流速: 1.8ml/min  
 柱温 : 40°C 波长: 245nm  
 数据文件名 : RC\$J334 - 0-65/7-277-2 - zzp-cq24y-30d-rcd-pH1.0jz-jf50z-dz1-5.lcd  
 方法文件名 : RC\$J334 - J334-rcd-FX256.lcm  
 批处理文件名: RC\$J334 - 20251223-rcd-FX256.lcb  
 样品瓶号 : 2-18  
 进样体积 : 20μl 版本号: 6.115  
 进样时间 : 2025/12/23 17:15:49 实验者: xiexinhui  
 处理时间 (V2) : 2025/12/24 08:34:41 处理者: xiexinhui  
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX256)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 245nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.354	361689	100.000	49488	2461	1.168	--
总计		361689	100.000	49488			

图50 盐酸伐地那非口崩片溶出度测定长期24月30 HPLC图谱  
 自制品-pH1.0介质-浆法-50转  
 对照品溶液-1-5

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(4.6*50mm,5µm)	流速: 1.8ml/min
柱温 : 40°C	波长: 245nm
数据文件名 : RC\$J334 - 0-65/7-278-2 - zzp-2023120221p-cq24y-30d-rcd-pH1.0jz-jf50z-P1-1.lcd	
方法文件名 : RC\$J334 - J334-rcd-FX256.lcm	
批处理文件名 : RC\$J334 - 20251223-rcd-FX256.lcb	
样品瓶号 : 2-1	版本号: 6.115
进样体积 : 20µl	实验者: xiexinhui
进样时间 : 2025/12/23 17:19:13	处理者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2025/12/24 08:34:48	
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX256)	

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 245nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.354	407794	100.000	56240	2509	1.170	--
总计		407794	100.000	56240			

图51 盐酸伐地那非口崩片溶出度测定长期24月30 HPLC图谱  
自制品(2023120221批)-pH1.0介质-浆法-50转-片1  
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(4.6*50mm,5µm)	流速	: 1.8ml/min
柱温	: 40°C	波长	: 245nm
数据文件名	: RC\$J334 - 0-65/7-279-2 - zzp-2023120221p-cq24y-30d-rcd-pH1.0jz-jf50z-P1-2.lcd		
方法文件名	: RC\$J334 - J334-rcd-FX256.lcm		
批处理文件名	: RC\$J334 - 20251223-rcd-FX256.lcb		
样品瓶号	: 2-1	版本号	: 6.115
进样体积	: 20µl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2025/12/23 17:22:37	处理者	: xiexinhui
处理时间 (V2)	: 2025/12/24 08:34:55		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C(FX256)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 245nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.354	407233	100.000	56203	2511	1.170	--
总计		407233	100.000	56203			

图52 盐酸伐地那非口崩片溶出度测定长期24月30 HPLC图谱  
自制品(2023120221批)-pH1.0介质-桨法-50转-片1  
供试品溶液-2

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(4.6*50mm,5μm)	流速	: 1.8ml/min
柱温	: 40°C	波长	: 245nm
数据文件名	: RC\$J334 - 0-65/7-280-2 - zzp-2023120221p-cq24y-30d-rcd-pH1.0jz-jf50z-P2-1.lcd		
方法文件名	: RC\$J334 - J334-rcd-FX256.lcm		
批处理文件名	: RC\$J334 - 20251223-rcd-FX256.lcb		
样品瓶号	: 2-10	版本号	: 6.115
进样体积	: 20μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2025/12/23 17:26:01	处理者	: xiexinhui
处理时间 (V2)	: 2025/12/24 08:35:02		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C(FX256)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 245nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.354	394957	100.000	54456	2509	1.170	--
总计		394957	100.000	54456			

图53 盐酸伐地那非口崩片溶出度测定长期24月30 HPLC图谱  
自制品(2023120221批)-pH1.0介质-桨法-50转-片2  
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(4.6*50mm,5μm)	流速	: 1.8ml/min
柱温	: 40°C	波长	: 245nm
数据文件名	: RC\$J334 - 0-65/7-281-2 - zzp-2023120221p-cq24y-30d-rcd-pH1.0jz-jf50z-P2-2.lcd		
方法文件名	: RC\$J334 - J334-rcd-FX256.lcm		
批处理文件名	: RC\$J334 - 20251223-rcd-FX256.lcb		
样品瓶号	: 2-10	版本号	: 6.115
进样体积	: 20μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2025/12/23 17:29:25	处理者	: xiexinhui
处理时间 (V2)	: 2025/12/24 08:35:09		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C(FX256)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 245nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.354	395042	100.000	54479	2511	1.169	--
总计		395042	100.000	54479			

图54 盐酸伐地那非口崩片溶出度测定长期24月30 HPLC图谱  
自制品(2023120221批)-pH1.0介质-浆法-50转-片2  
供试品溶液-2




# J334

## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(4.6\*50mm,5μm) 流速: 1.8ml/min  
 柱温 : 40°C 波长: 245nm  
 数据文件名 : RC\$J334 - 0-65/7-282-2 - zzp-2023120221p-cq24y-30d-rcd-pH1.0jz-jf50z-P3-1.lcd  
 方法文件名 : RC\$J334 - J334-rcd-FX256.lcm  
 批处理文件名 : RC\$J334 - 20251223-rcd-FX256.lcb  
 样品瓶号 : 2-19  
 进样体积 : 20μl 版本号: 6.115  
 进样时间 : 2025/12/23 17:32:48 实验者: xiexinhui  
 处理时间 (V2) : 2025/12/24 08:35:16 处理者: xiexinhui  
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX256)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 245nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.354	397181	100.000	54721	2504	1.169	--
总计		397181	100.000	54721			

图55 盐酸伐地那非口崩片溶出度测定长期24月30 HPLC图谱  
 自制品(2023120221批)-pH1.0介质-浆法-50转-片3  
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(4.6*50mm,5µm)	流速	: 1.8ml/min
柱温	: 40°C	波长	: 245nm
数据文件名	: RC\$J334 - 0-65/7-283-2 - zzp-2023120221p-cq24y-30d-rcd-pH1.0jz-jf50z-P3-2.lcd		
方法文件名	: RC\$J334 - J334-rcd-FX256.lcm		
批处理文件名	: RC\$J334 - 20251223-rcd-FX256.lcb		
样品瓶号	: 2-19	版本号	: 6.115
进样体积	: 20µl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2025/12/23 17:36:12	处理者	: xiexinhui
处理时间 (V2)	: 2025/12/24 08:35:23		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C(FX256)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 245nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.353	397468	100.000	54716	2506	1.170	--
总计		397468	100.000	54716			

图56 盐酸伐地那非口崩片溶出度测定长期24月30 HPLC图谱  
自制品(2023120221批)-pH1.0介质-桨法-50转-片3  
供试品溶液-2

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(4.6*50mm,5µm)	流速	: 1.8ml/min
柱温	: 40°C	波长	: 245nm
数据文件名	: RC\$J334 - 0-65/7-284-2 - zzp-2023120221p-cq24y-30d-rcd-pH1.0jz-jf50z-P4-1.lcd		
方法文件名	: RC\$J334 - J334-rcd-FX256.lcm		
批处理文件名	: RC\$J334 - 20251223-rcd-FX256.lcb		
样品瓶号	: 2-28	版本号	: 6.115
进样体积	: 20µl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2025/12/23 17:39:36	处理者	: xiexinhui
处理时间 (V2)	: 2025/12/24 08:35:30		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C(FX256)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 245nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.353	408091	100.000	56245	2508	1.170	--
总计		408091	100.000	56245			

图57 盐酸伐地那非口崩片溶出度测定长期24月30 HPLC图谱  
自制品(2023120221批)-pH1.0介质-浆法-50转-片4  
供试品溶液-1




# J334

## <样品信息>

色谱柱	: XB-C18(4.6*50mm,5μm)	流速	: 1.8ml/min
柱温	: 40°C	波长	: 245nm
数据文件名	: RC\$J334 - 0-65/7-285-2 - zzp-2023120221p-cq24y-30d-rcd-pH1.0jz-jf50z-P4-2.lcd		
方法文件名	: RC\$J334 - J334-rcd-FX256.lcm		
批处理文件名	: RC\$J334 - 20251223-rcd-FX256.lcb		
样品瓶号	: 2-28	版本号	: 6.115
进样体积	: 20μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2025/12/23 17:43:00	处理者	: xiexinhui
处理时间 (V2)	: 2025/12/24 08:35:37		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C(FX256)		

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 245nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.353	407159	100.000	56122	2508	1.170	--
总计		407159	100.000	56122			

图58 盐酸伐地那非口崩片溶出度测定长期24月30 HPLC图谱  
 自制品(2023120221批)-pH1.0介质-浆法-50转-片4  
 供试品溶液-2

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(4.6*50mm,5μm)	流速	: 1.8ml/min
柱温	: 40°C	波长	: 245nm
数据文件名	: RC\$J334 - 0-65/7-286-2 - zzp-2023120221p-cq24y-30d-rcd-pH1.0jz-jf50z-P5-1.lcd		
方法文件名	: RC\$J334 - J334-rcd-FX256.lcm		
批处理文件名	: RC\$J334 - 20251223-rcd-FX256.lcb		
样品瓶号	: 2-37	版本号	: 6.115
进样体积	: 20μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2025/12/23 17:46:23	处理者	: xiexinhui
处理时间 (V2)	: 2025/12/24 08:35:44		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C(FX256)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 245nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.353	404494	100.000	55694	2504	1.171	--
总计		404494	100.000	55694			

图59 盐酸伐地那非口崩片溶出度测定长期24月30 HPLC图谱  
自制品(2023120221批)-pH1.0介质-桨法-50转-片5  
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(4.6*50mm,5µm)	流速	: 1.8ml/min
柱温	: 40°C	波长	: 245nm
数据文件名	: RC\$J334 - 0-65/7-287-2 - zzp-2023120221p-cq24y-30d-rcd-pH1.0jz-jf50z-P5-2.lcd		
方法文件名	: RC\$J334 - J334-rcd-FX256.lcm		
批处理文件名	: RC\$J334 - 20251223-rcd-FX256.lcb		
样品瓶号	: 2-37	版本号	: 6.115
进样体积	: 20µl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2025/12/23 17:49:47	处理者	: xiexinhui
处理时间 (V2)	: 2025/12/24 08:35:51		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C(FX256)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 245nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.353	404487	100.000	55730	2506	1.169	--
总计		404487	100.000	55730			

图60 盐酸伐地那非口崩片溶出度测定长期24月30 HPLC图谱  
自制品(2023120221批)-pH1.0介质-桨法-50转-片5  
供试品溶液-2

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(4.6*50mm,5µm)	流速	: 1.8ml/min
柱温	: 40°C	波长	: 245nm
数据文件名	: RC\$J334 - 0-65/7-288-2 - zzp-2023120221p-cq24y-30d-rcd-pH1.0jz-jf50z-P6-1.lcd		
方法文件名	: RC\$J334 - J334-rcd-FX256.lcm		
批处理文件名	: RC\$J334 - 20251223-rcd-FX256.lcb		
样品瓶号	: 2-46	版本号	: 6.115
进样体积	: 20µl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2025/12/23 17:53:11	处理者	: xiexinhui
处理时间 (V2)	: 2025/12/24 08:35:58		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C(FX256)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 245nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.353	406102	100.000	55931	2508	1.170	--
总计		406102	100.000	55931			

图61 盐酸伐地那非口崩片溶出度测定长期24月30 HPLC图谱  
自制品(2023120221批)-pH1.0介质-浆法-50转-片6  
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(4.6*50mm,5μm)	流速	: 1.8ml/min
柱温	: 40°C	波长	: 245nm
数据文件名	: RC\$J334 - 0-65/7-289-2 - zzp-2023120221p-cq24y-30d-rcd-pH1.0jz-jf50z-P6-2.lcd		
方法文件名	: RC\$J334 - J334-rcd-FX256.lcm		
批处理文件名	: RC\$J334 - 20251223-rcd-FX256.lcb		
样品瓶号	: 2-46	版本号	: 6.115
进样体积	: 20μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2025/12/23 17:56:34	处理者	: xiexinhui
处理时间 (V2)	: 2025/12/24 08:36:05		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C(FX256)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 245nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.353	405898	100.000	55927	2505	1.170	--
总计		405898	100.000	55927			

图62 盐酸伐地那非口崩片溶出度测定长期24月30 HPLC图谱  
自制品(2023120221批)-pH1.0介质-桨法-50转-片6  
供试品溶液-2

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(4.6*50mm,5µm)	流速	: 1.8ml/min
柱温	: 40°C	波长	: 245nm
数据文件名	: RC\$J334 - 0-65/7-290-2 - zzp-2023120521p-cq24y-30d-rcd-pH1.0jz-jf50z-P1-1.lcd		
方法文件名	: RC\$J334 - J334-rcd-FX256.lcm		
批处理文件名	: RC\$J334 - 20251223-rcd-FX256.lcb		
样品瓶号	: 2-2	版本号	: 6.115
进样体积	: 20µl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2025/12/23 17:59:57	处理者	: xiexinhui
处理时间 (V2)	: 2025/12/24 08:36:12		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C(FX256)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 245nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.352	412017	100.000	56636	2494	1.171	--
总计		412017	100.000	56636			

图63 盐酸伐地那非口崩片溶出度测定长期24月30 HPLC图谱  
自制品(2023120521批)-pH1.0介质-浆法-50转-片1  
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(4.6*50mm,5μm)	流速	: 1.8ml/min
柱温	: 40°C	波长	: 245nm
数据文件名	: RC\$J334 - 0-65/7-291-2 - zzp-2023120521p-cq24y-30d-rcd-pH1.0jz-jf50z-P1-2.lcd		
方法文件名	: RC\$J334 - J334-rcd-FX256.lcm		
批处理文件名	: RC\$J334 - 20251223-rcd-FX256.lcb		
样品瓶号	: 2-2	版本号	: 6.115
进样体积	: 20μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2025/12/23 18:03:22	处理者	: xiexinhui
处理时间 (V2)	: 2025/12/24 08:36:20		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C(FX256)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 245nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.352	412416	100.000	56632	2493	1.170	--
总计		412416	100.000	56632			

图64 盐酸伐地那非口崩片溶出度测定长期24月30 HPLC图谱  
自制品(2023120521批)-pH1.0介质-桨法-50转-片1  
供试品溶液-2

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(4.6*50mm,5µm)	流速	: 1.8ml/min
柱温	: 40°C	波长	: 245nm
数据文件名	: RC\$J334 - 0-65/7-292-2 - zzp-2023120521p-cq24y-30d-rcd-pH1.0jz-jf50z-P2-1.lcd		
方法文件名	: RC\$J334 - J334-rcd-FX256.lcm		
批处理文件名	: RC\$J334 - 20251223-rcd-FX256.lcb		
样品瓶号	: 2-11	版本号	: 6.115
进样体积	: 20µl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2025/12/23 18:06:46	处理者	: xiexinhui
处理时间 (V2)	: 2025/12/24 08:36:28		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C(FX256)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 245nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.352	392239	100.000	53867	2493	1.170	--
总计		392239	100.000	53867			

图65 盐酸伐地那非口崩片溶出度测定长期24月30 HPLC图谱  
自制品(2023120521批)-pH1.0介质-浆法-50转-片2  
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(4.6*50mm,5µm)	流速	: 1.8ml/min
柱温	: 40°C	波长	: 245nm
数据文件名	: RC\$J334 - 0-65/7-293-2 - zzp-2023120521p-cq24y-30d-rcd-pH1.0jz-jf50z-P2-2.lcd		
方法文件名	: RC\$J334 - J334-rcd-FX256.lcm		
批处理文件名	: RC\$J334 - 20251223-rcd-FX256.lcb		
样品瓶号	: 2-11	版本号	: 6.115
进样体积	: 20µl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2025/12/23 18:10:10	处理者	: xiexinhui
处理时间 (V2)	: 2025/12/24 08:36:35		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C(FX256)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 245nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.352	392369	100.000	53915	2496	1.170	--
总计		392369	100.000	53915			


图66 盐酸伐地那非口崩片溶出度测定长期24月30 HPLC图谱  
自制品(2023120521批)-pH1.0介质-桨法-50转-片2  
供试品溶液-2

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(4.6*50mm,5μm)	流速	: 1.8ml/min
柱温	: 40°C	波长	: 245nm
数据文件名	: RC\$J334 - 0-65/7-294-2 - zzp-2023120521p-cq24y-30d-rcd-pH1.0jz-jf50z-P3-1.lcd		
方法文件名	: RC\$J334 - J334-rcd-FX256.lcm		
批处理文件名	: RC\$J334 - 20251223-rcd-FX256.lcb		
样品瓶号	: 2-20	版本号	: 6.115
进样体积	: 20μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2025/12/23 18:13:34	处理者	: xiexinhui
处理时间 (V2)	: 2025/12/24 08:36:42		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C(FX256)		

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 245nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.352	399494	100.000	54996	2505	1.171	--
总计		399494	100.000	54996			

图67 盐酸伐地那非口崩片溶出度测定长期24月30 HPLC图谱  
自制品(2023120521批)-pH1.0介质-浆法-50转-片3  
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(4.6*50mm,5μm)	流速	: 1.8ml/min
柱温	: 40°C	波长	: 245nm
数据文件名	: RC\$J334 - 0-65/7-295-2 - zzp-2023120521p-cq24y-30d-rcd-pH1.0jz-jf50z-P3-2.lcd		
方法文件名	: RC\$J334 - J334-rcd-FX256.lcm		
批处理文件名	: RC\$J334 - 20251223-rcd-FX256.lcb		
样品瓶号	: 2-20	版本号	: 6.115
进样体积	: 20μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2025/12/23 18:16:58	处理者	: xiexinhui
处理时间 (V2)	: 2025/12/24 08:36:49		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C(FX256)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 245nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.353	399382	100.000	55042	2508	1.170	--
总计		399382	100.000	55042			

图68 盐酸伐地那非口崩片溶出度测定长期24月30 HPLC图谱  
自制品(2023120521批)-pH1.0介质-桨法-50转-片3  
供试品溶液-2

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(4.6*50mm,5μm)	流速	: 1.8ml/min
柱温	: 40°C	波长	: 245nm
数据文件名	: RC\$J334 - 0-65/7-296-2 - zzp-2023120521p-cq24y-30d-rcd-pH1.0jz-jf50z-P4-1.lcd		
方法文件名	: RC\$J334 - J334-rcd-FX256.lcm		
批处理文件名	: RC\$J334 - 20251223-rcd-FX256.lcb		
样品瓶号	: 2-29	版本号	: 6.115
进样体积	: 20μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2025/12/23 18:20:21	处理者	: xiexinhui
处理时间 (V2)	: 2025/12/24 08:36:56		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C(FX256)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 245nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.352	407344	100.000	56047	2500	1.171	--
总计		407344	100.000	56047			

图69 盐酸伐地那非口崩片溶出度测定长期24月30 HPLC图谱  
自制品(2023120521批)-pH1.0介质-浆法-50转-片4  
供试品溶液-1




# J334

## <样品信息>

色谱柱	: XB-C18(4.6*50mm,5μm)	流速	: 1.8ml/min
柱温	: 40°C	波长	: 245nm
数据文件名	: RC\$J334 - 0-65/7-297-2 - zzp-2023120521p-cq24y-30d-rcd-pH1.0jz-jf50z-P4-2.lcd		
方法文件名	: RC\$J334 - J334-rcd-FX256.lcm		
批处理文件名	: RC\$J334 - 20251223-rcd-FX256.lcb		
样品瓶号	: 2-29	版本号	: 6.115
进样体积	: 20μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2025/12/23 18:23:44	处理者	: xiexinhui
处理时间 (V2)	: 2025/12/24 08:37:03		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C(FX256)		

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 245nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.352	407587	100.000	56100	2506	1.171	--
总计		407587	100.000	56100			

图70 盐酸伐地那非口崩片溶出度测定长期24月30 HPLC图谱  
 自制品(2023120521批)-pH1.0介质-桨法-50转-片4  
 供试品溶液-2

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(4.6*50mm,5µm)	流速	: 1.8ml/min
柱温	: 40°C	波长	: 245nm
数据文件名	: RC\$J334 - 0-65/7-298-2 - zzp-2023120521p-cq24y-30d-rcd-pH1.0jz-jf50z-P5-1.lcd		
方法文件名	: RC\$J334 - J334-rcd-FX256.lcm		
批处理文件名	: RC\$J334 - 20251223-rcd-FX256.lcb		
样品瓶号	: 2-38	版本号	: 6.115
进样体积	: 20µl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2025/12/23 18:27:07	处理者	: xiexinhui
处理时间 (V2)	: 2025/12/24 08:37:10		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C(FX256)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 245nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.351	409904	100.000	56340	2505	1.173	--
总计		409904	100.000	56340			

图71 盐酸伐地那非口崩片溶出度测定长期24月30 HPLC图谱  
自制品(2023120521批)-pH1.0介质-浆法-50转-片5  
供试品溶液-1




# J334

## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(4.6\*50mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.8ml/min  
 柱温 : 40 $^{\circ}$ C 波长: 245nm  
 数据文件名 : RC\$J334 - 0-65/7-299-2 - zzp-2023120521p-cq24y-30d-rcd-pH1.0jz-jf50z-P5-2.lcd  
 方法文件名 : RC\$J334 - J334-rcd-FX256.lcm  
 批处理文件名: RC\$J334 - 20251223-rcd-FX256.lcb  
 样品瓶号 : 2-38  
 进样体积 : 20 $\mu$ l 版本号: 6.115  
 进样时间 : 2025/12/23 18:30:31 实验者: xiexinhui  
 处理时间 (V2) : 2025/12/24 08:37:17 处理者: xiexinhui  
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX256)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 245nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.351	409691	100.000	56368	2505	1.172	--
总计		409691	100.000	56368			

图72 盐酸伐地那非口崩片溶出度测定长期24月30 HPLC图谱  
 自制品(2023120521批)-pH1.0介质-桨法-50转-片5  
 供试品溶液-2

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(4.6*50mm,5µm)	流速	: 1.8ml/min
柱温	: 40°C	波长	: 245nm
数据文件名	: RC\$J334 - 0-65/7-300-2 - zzp-2023120521p-cq24y-30d-rcd-pH1.0jz-jf50z-P6-1.lcd		
方法文件名	: RC\$J334 - J334-rcd-FX256.lcm		
批处理文件名	: RC\$J334 - 20251223-rcd-FX256.lcb		
样品瓶号	: 2-47	版本号	: 6.115
进样体积	: 20µl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2025/12/23 18:33:55	处理者	: xiexinhui
处理时间 (V2)	: 2025/12/24 08:37:25		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C(FX256)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 245nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.351	402664	100.000	55413	2507	1.172	--
总计		402664	100.000	55413			

图73 盐酸伐地那非口崩片溶出度测定长期24月30 HPLC图谱  
自制品(2023120521批)-pH1.0介质-浆法-50转-片6  
供试品溶液-1




# J334

## <样品信息>

色谱柱	: XB-C18(4.6*50mm,5μm)	流速	: 1.8ml/min
柱温	: 40°C	波长	: 245nm
数据文件名	: RC\$J334 - 0-65/7-301-2 - zzp-2023120521p-cq24y-30d-rcd-pH1.0jz-jf50z-P6-2.lcd		
方法文件名	: RC\$J334 - J334-rcd-FX256.lcm		
批处理文件名	: RC\$J334 - 20251223-rcd-FX256.lcb		
样品瓶号	: 2-47	版本号	: 6.115
进样体积	: 20μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2025/12/23 18:37:18	处理者	: xiexinhui
处理时间 (V2)	: 2025/12/24 08:37:32		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C(FX256)		

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 245nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.351	403430	100.000	55478	2507	1.171	--
总计		403430	100.000	55478			

图74 盐酸伐地那非口崩片溶出度测定长期24月30 HPLC图谱  
自制品(2023120521批)-pH1.0介质-桨法-50转-片6  
供试品溶液-2

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(4.6*50mm,5μm)	流速	: 1.8ml/min
柱温	: 40°C	波长	: 245nm
数据文件名	: RC\$J334 - 0-65/7-302-2 - zzp-2023120621p-cq24y-30d-rcd-pH1.0jz-jf50z-P1-1.lcd		
方法文件名	: RC\$J334 - J334-rcd-FX256.lcm		
批处理文件名	: RC\$J334 - 20251223-rcd-FX256.lcb		
样品瓶号	: 2-3	版本号	: 6.115
进样体积	: 20μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2025/12/23 18:40:42	处理者	: xiexinhui
处理时间 (V2)	: 2025/12/24 08:37:39		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C(FX256)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 245nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.350	402648	100.000	55349	2499	1.173	--
总计		402648	100.000	55349			

图75 盐酸伐地那非口崩片溶出度测定长期24月30 HPLC图谱  
自制品(2023120621批)-pH1.0介质-桨法-50转-片1  
供试品溶液-1




# J334

## <样品信息>

色谱柱	: XB-C18(4.6*50mm,5µm)	流速	: 1.8ml/min
柱温	: 40°C	波长	: 245nm
数据文件名	: RC\$J334 - 0-65/7-303-2 - zzp-2023120621p-cq24y-30d-rcd-pH1.0jz-jf50z-P1-2.lcd		
方法文件名	: RC\$J334 - J334-rcd-FX256.lcm		
批处理文件名	: RC\$J334 - 20251223-rcd-FX256.lcb		
样品瓶号	: 2-3	版本号	: 6.115
进样体积	: 20µl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2025/12/23 18:44:05	处理者	: xiexinhui
处理时间 (V2)	: 2025/12/24 08:37:46		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C(FX256)		

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 245nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.351	402677	100.000	55263	2500	1.174	--
总计		402677	100.000	55263			

图76 盐酸伐地那非口崩片溶出度测定长期24月30 HPLC图谱  
 自制品(2023120621批)-pH1.0介质-桨法-50转-片1  
 供试品溶液-2




# J334

## <样品信息>

色谱柱	: XB-C18(4.6*50mm,5μm)	流速	: 1.8ml/min
柱温	: 40°C	波长	: 245nm
数据文件名	: RC\$J334 - 0-65/7-304-2 - zzp-2023120621p-cq24y-30d-rcd-pH1.0jz-jf50z-P2-1.lcd		
方法文件名	: RC\$J334 - J334-rcd-FX256.lcm		
批处理文件名	: RC\$J334 - 20251223-rcd-FX256.lcb		
样品瓶号	: 2-12	版本号	: 6.115
进样体积	: 20μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2025/12/23 18:47:29	处理者	: xiexinhui
处理时间 (V2)	: 2025/12/24 08:37:52		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C(FX256)		

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 245nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.351	395085	100.000	54238	2501	1.172	--
总计		395085	100.000	54238			

图77 盐酸伐地那非口崩片溶出度测定长期24月30 HPLC图谱  
 自制品(2023120621批)-pH1.0介质-浆法-50转-片2  
 供试品溶液-1




# J334

## <样品信息>

色谱柱	: XB-C18(4.6*50mm,5μm)	流速	: 1.8ml/min
柱温	: 40°C	波长	: 245nm
数据文件名	: RC\$J334 - 0-65/7-305-2 - zzp-2023120621p-cq24y-30d-rcd-pH1.0jz-jf50z-P2-2.lcd		
方法文件名	: RC\$J334 - J334-rcd-FX256.lcm		
批处理文件名	: RC\$J334 - 20251223-rcd-FX256.lcb		
样品瓶号	: 2-12	版本号	: 6.115
进样体积	: 20μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2025/12/23 18:50:53	处理者	: xiexinhui
处理时间 (V2)	: 2025/12/24 08:38:00		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C(FX256)		

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 245nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.351	394598	100.000	54238	2505	1.171	--
总计		394598	100.000	54238			

图78 盐酸伐地那非口崩片溶出度测定长期24月30 HPLC图谱  
自制品(2023120621批)-pH1.0介质-桨法-50转-片2  
供试品溶液-2




# J334

## <样品信息>

色谱柱	: XB-C18(4.6*50mm,5μm)	流速	: 1.8ml/min
柱温	: 40°C	波长	: 245nm
数据文件名	: RC\$J334 - 0-65/7-306-2 - zzp-2023120621p-cq24y-30d-rcd-pH1.0jz-jf50z-P3-1.lcd		
方法文件名	: RC\$J334 - J334-rcd-FX256.lcm		
批处理文件名	: RC\$J334 - 20251223-rcd-FX256.lcb		
样品瓶号	: 2-21	版本号	: 6.115
进样体积	: 20μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2025/12/23 18:54:17	处理者	: xiexinhui
处理时间 (V2)	: 2025/12/24 08:38:07		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C(FX256)		

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 245nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.351	406663	100.000	55927	2504	1.171	--
总计		406663	100.000	55927			

图79 盐酸伐地那非口崩片溶出度测定长期24月30 HPLC图谱  
自制品(2023120621批)-pH1.0介质-浆法-50转-片3  
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(4.6*50mm,5μm)	流速	: 1.8ml/min
柱温	: 40°C	波长	: 245nm
数据文件名	: RC\$J334 - 0-65/7-307-2 - zzp-2023120621p-cq24y-30d-rcd-pH1.0jz-jf50z-P3-2.lcd		
方法文件名	: RC\$J334 - J334-rcd-FX256.lcm		
批处理文件名	: RC\$J334 - 20251223-rcd-FX256.lcb		
样品瓶号	: 2-21	版本号	: 6.115
进样体积	: 20μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2025/12/23 18:57:41	处理者	: xiexinhui
处理时间 (V2)	: 2025/12/24 08:38:14		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C(FX256)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 245nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.350	406888	100.000	55935	2498	1.170	--
总计		406888	100.000	55935			

图80 盐酸伐地那非口崩片溶出度测定长期24月30 HPLC图谱  
自制品(2023120621批)-pH1.0介质-桨法-50转-片3  
供试品溶液-2

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(4.6*50mm,5µm)	流速	: 1.8ml/min
柱温	: 40°C	波长	: 245nm
数据文件名	: RC\$J334 - 0-65/7-308-2 - zzp-2023120621p-cq24y-30d-rcd-pH1.0jz-jf50z-P4-1.lcd		
方法文件名	: RC\$J334 - J334-rcd-FX256.lcm		
批处理文件名	: RC\$J334 - 20251223-rcd-FX256.lcb		
样品瓶号	: 2-30	版本号	: 6.115
进样体积	: 20µl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2025/12/23 19:01:04	处理者	: xiexinhui
处理时间 (V2)	: 2025/12/24 08:38:21		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C(FX256)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 245nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.351	402791	100.000	55348	2503	1.172	--
总计		402791	100.000	55348			

图81 盐酸伐地那非口崩片溶出度测定长期24月30 HPLC图谱  
自制品(2023120621批)-pH1.0介质-浆法-50转-片4  
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(4.6*50mm,5μm)	流速	: 1.8ml/min
柱温	: 40°C	波长	: 245nm
数据文件名	: RC\$J334 - 0-65/7-309-2 - zzp-2023120621p-cq24y-30d-rcd-pH1.0jz-jf50z-P4-2.lcd		
方法文件名	: RC\$J334 - J334-rcd-FX256.lcm		
批处理文件名	: RC\$J334 - 20251223-rcd-FX256.lcb		
样品瓶号	: 2-30	版本号	: 6.115
进样体积	: 20μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2025/12/23 19:04:28	处理者	: xiexinhui
处理时间 (V2)	: 2025/12/24 08:38:28		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C(FX256)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 245nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.350	402611	100.000	55407	2504	1.171	--
总计		402611	100.000	55407			

图82 盐酸伐地那非口崩片溶出度测定长期24月30 HPLC图谱  
自制品(2023120621批)-pH1.0介质-桨法-50转-片4  
供试品溶液-2

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(4.6*50mm,5µm)	流速	: 1.8ml/min
柱温	: 40°C	波长	: 245nm
数据文件名	: RC\$J334 - 0-65/7-310-2 - zzp-2023120621p-cq24y-30d-rcd-pH1.0jz-jf50z-P5-1.lcd		
方法文件名	: RC\$J334 - J334-rcd-FX256.lcm		
批处理文件名	: RC\$J334 - 20251223-rcd-FX256.lcb		
样品瓶号	: 2-39	版本号	: 6.115
进样体积	: 20µl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2025/12/23 19:07:52	处理者	: xiexinhui
处理时间 (V2)	: 2025/12/24 08:38:35		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C(FX256)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 245nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.351	407062	100.000	55926	2503	1.170	--
总计		407062	100.000	55926			

图83 盐酸伐地那非口崩片溶出度测定长期24月30 HPLC图谱  
自制品(2023120621批)-pH1.0介质-桨法-50转-片5  
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(4.6*50mm,5μm)	流速	: 1.8ml/min
柱温	: 40°C	波长	: 245nm
数据文件名	: RC\$J334 - 0-65/7-311-2 - zzp-2023120621p-cq24y-30d-rcd-pH1.0jz-jf50z-P5-2.lcd		
方法文件名	: RC\$J334 - J334-rcd-FX256.lcm		
批处理文件名	: RC\$J334 - 20251223-rcd-FX256.lcb		
样品瓶号	: 2-39	版本号	: 6.115
进样体积	: 20μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2025/12/23 19:11:16	处理者	: xiexinhui
处理时间 (V2)	: 2025/12/24 08:38:41		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C(FX256)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 245nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.351	407385	100.000	55942	2499	1.171	--
总计		407385	100.000	55942			

图84 盐酸伐地那非口崩片溶出度测定长期24月30 HPLC图谱  
自制品(2023120621批)-pH1.0介质-桨法-50转-片5  
供试品溶液-2




# J334

## <样品信息>

色谱柱	: XB-C18(4.6*50mm,5µm)	流速	: 1.8ml/min
柱温	: 40°C	波长	: 245nm
数据文件名	: RC\$J334 - 0-65/7-312-2 - zzp-2023120621p-cq24y-30d-rcd-pH1.0jz-jf50z-P6-1.lcd		
方法文件名	: RC\$J334 - J334-rcd-FX256.lcm		
批处理文件名	: RC\$J334 - 20251223-rcd-FX256.lcb		
样品瓶号	: 2-48	版本号	: 6.115
进样体积	: 20µl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2025/12/23 19:14:40	处理者	: xiexinhui
处理时间 (V2)	: 2025/12/24 08:38:48		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C(FX256)		

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 245nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.351	394372	100.000	54155	2503	1.170	--
总计		394372	100.000	54155			


图85 盐酸伐地那非口崩片溶出度测定长期24月30 HPLC图谱  
 自制品(2023120621批)-pH1.0介质-桨法-50转-片6  
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(4.6*50mm,5μm)	流速	: 1.8ml/min
柱温	: 40°C	波长	: 245nm
数据文件名	: RC\$J334 - 0-65/7-313-2 - zzp-2023120621p-cq24y-30d-rcd-pH1.0jz-jf50z-P6-2.lcd		
方法文件名	: RC\$J334 - J334-rcd-FX256.lcm		
批处理文件名	: RC\$J334 - 20251223-rcd-FX256.lcb		
样品瓶号	: 2-48	版本号	: 6.115
进样体积	: 20μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2025/12/23 19:18:04	处理者	: xiexinhui
处理时间 (V2)	: 2025/12/24 08:38:55		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C(FX256)		

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 245nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.351	394285	100.000	54158	2499	1.171	--
总计		394285	100.000	54158			

图86 盐酸伐地那非口崩片溶出度测定长期24月30 HPLC图谱  
自制品(2023120621批)-pH1.0介质-桨法-50转-片6  
供试品溶液-2




# J334

## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(4.6\*50mm,5μm) 流速: 1.8ml/min  
 柱温 : 40°C 波长: 245nm  
 数据文件名 : RC\$J334 - 0-65/7-314-2 - zzp-cq24y-30d-rcd-pH1.0jz-jf50z-dz2-1.lcd  
 方法文件名 : RC\$J334 - J334-rcd-FX256.lcm  
 批处理文件名: RC\$J334 - 20251223-rcd-FX256.lcb  
 样品瓶号 : 2-27  
 进样体积 : 20μl 版本号: 6.115  
 进样时间 : 2025/12/23 19:21:28 实验者: xiexinhui  
 处理时间 (V2) : 2025/12/24 08:39:03 处理者: xiexinhui  
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX256)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 245nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.351	361488	100.000	49367	2459	1.169	--
总计		361488	100.000	49367			

图87 盐酸伐地那非口崩片溶出度测定长期24月30 HPLC图谱  
 自制品-pH1.0介质-浆法-50转  
 对照品溶液-2-1




# J334

## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(4.6\*50mm,5μm) 流速: 1.8ml/min  
 柱温 : 40°C 波长: 245nm  
 数据文件名 : RC\$J334 - 0-65/7-315-2 - zzp-cq24y-30d-rcd-pH1.0jz-jf50z-dz2-2.lcd  
 方法文件名 : RC\$J334 - J334-rcd-FX256.lcm  
 批处理文件名: RC\$J334 - 20251223-rcd-FX256.lcb  
 样品瓶号 : 2-27 版本号: 6.115  
 进样体积 : 20μl 实验者: xiexinhui  
 进样时间 : 2025/12/23 19:24:53 处理者: xiexinhui  
 处理时间 (V2) : 2025/12/24 08:39:10  
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX256)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 245nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.351	361694	100.000	49347	2456	1.167	--
总计		361694	100.000	49347			

图88 盐酸伐地那非口崩片溶出度测定长期24月30 HPLC图谱  
 自制品-pH1.0介质-浆法-50转  
 对照品溶液-2-2