




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 35°C 波长: 259nm
 数据文件名:
 RC\$QTL-4125 - 0-88/24-3977-2 - zzp-2025051221p-rcqx-1-zj6y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-rj.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX273.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20251217-rc-FX273.lcb
 样品瓶号: 1-9
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/17 14:12:20 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2): 2025/12/18 08:49:08 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图1 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025051221批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转
 溶剂




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 35°C 波长: 259nm
 数据文件名:
 RC\$QTL-4125 - 0-88/24-3978-2 - zzp-2025051221p-rcqx-1-zj6y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-dz1-1.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX273.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20251217-rc-FX273.lcb
 样品瓶号: 1-18
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/17 14:15:43 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2): 2025/12/18 08:49:12 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.128	99378	100.000	15309	2523	1.157	--
总计		99378	100.000	15309			

图2 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025051221批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-浆法-50转
 对照品溶液-1-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 35°C 波长: 259nm
 数据文件名:
 RC\$QTL-4125 - 0-88/24-3979-2 - zzp-2025051221p-rcqx-1-zj6y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-dz1-2.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX273.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20251217-rc-FX273.lcb
 样品瓶号: 1-18
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/17 14:19:07 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2): 2025/12/18 08:49:17 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.127	98841	100.000	15201	2514	1.153	--
总计		98841	100.000	15201			

图3 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025051221批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-浆法-50转
 对照品溶液-1-2




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 35°C 波长: 259nm
 数据文件名:
 RC\$QTL-4125 - 0-88/24-3980-2 - zzp-2025051221p-rcqx-1-zj6y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-dz1-3.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX273.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20251217-rc-FX273.lcb
 样品瓶号: 1-18
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/17 14:22:31 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2): 2025/12/18 08:49:20 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.128	99664	100.000	15409	2548	1.160	--
总计		99664	100.000	15409			

图4 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025051221批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转
 对照品溶液-1-3




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 35°C 波长: 259nm
 数据文件名:
 RC\$QTL-4125 - 0-88/24-3981-2 - zzp-2025051221p-rcqx-1-zj6y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-dz1-4.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX273.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20251217-rc-FX273.lcb
 样品瓶号: 1-18
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/17 14:25:55 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2): 2025/12/18 08:49:23 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.128	99510	100.000	15421	2549	1.158	--
总计		99510	100.000	15421			

图5 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025051221批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-浆法-50转
 对照品溶液-1-4




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 35°C 波长: 259nm
 数据文件名:
 RC\$QTL-4125 - 0-88/24-3982-2 - zzp-2025051221p-rcqx-1-zj6y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-dz1-5.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX273.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20251217-rc-FX273.lcb
 样品瓶号: 1-18
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/17 14:29:19 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2): 2025/12/18 08:49:27 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.128	99578	100.000	15450	2567	1.161	--
总计		99578	100.000	15450			

图6 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025051221批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-浆法-50转
 对照品溶液-1-5




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 35°C 波长: 259nm
 数据文件名:
 RC\$QTL-4125 - 0-88/24-3983-2 - zzp-2025051221p-rcqx-1-zj6y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-p1-5min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX273.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20251217-rc-FX273.lcb
 样品瓶号: 1-1
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/17 14:32:42 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2): 2025/12/18 08:49:30 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.132	29104	100.000	4600	2658	1.153	--
总计		29104	100.000	4600			

图7 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025051221批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转-5min-片1
 供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 35°C 波长: 259nm
 数据文件名:
 RC\$QTL-4125 - 0-88/24-3984-2 - zzp-2025051221p-rcqx-1-zj6y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-p2-5min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX273.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20251217-rc-FX273.lcb
 样品瓶号: 1-10
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/17 14:36:04 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2): 2025/12/18 08:49:33 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.132	30570	100.000	4849	2673	1.162	--
总计		30570	100.000	4849			

图8 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025051221批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转-5min-片2
 供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 35°C 波长: 259nm
 数据文件名:
 RC\$QTL-4125 - 0-88/24-3985-2 - zzp-2025051221p-rcqx-1-zj6y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-p3-5min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX273.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20251217-rc-FX273.lcb
 样品瓶号: 1-19
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/17 14:39:27 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2): 2025/12/18 08:49:36 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.131	32533	100.000	5125	2617	1.145	--
总计		32533	100.000	5125			

图9 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025051221批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转-5min-片3
 供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 35°C 波长: 259nm
 数据文件名:
 RC\$QTL-4125 - 0-88/24-3988-2 - zzp-2025051221p-rcqx-1-zj6y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-p6-5min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX273.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20251217-rc-FX273.lcb
 样品瓶号: 1-46
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/17 14:49:36 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2): 2025/12/18 08:49:45 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.131	44411	100.000	7049	2664	1.145	--
总计		44411	100.000	7049			

图12 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025051221批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转-5min-片6
 供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 35°C 波长: 259nm
 数据文件名:
 RC\$QTL-4125 - 0-88/24-3989-2 - zzp-2025051221p-rcqx-1-zj6y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-p1-10min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX273.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20251217-rc-FX273.lcb
 样品瓶号: 1-2
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/17 14:52:59 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2): 2025/12/18 08:49:47 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.130	56720	100.000	8930	2644	1.149	--
总计		56720	100.000	8930			

图13 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025051221批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-浆法-50转-10min-片1
 供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 35°C 波长: 259nm
 数据文件名:
 RC\$QTL-4125 - 0-88/24-3990-2 - zzp-2025051221p-rcqx-1-zj6y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-p2-10min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX273.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20251217-rc-FX273.lcb
 样品瓶号: 1-11
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/17 14:56:22 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2): 2025/12/18 08:49:50 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.130	57229	100.000	9031	2642	1.149	--
总计		57229	100.000	9031			

图14 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025051221批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-浆法-50转-10min-片2
 供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 35°C 波长: 259nm
 数据文件名:
 RC\$QTL-4125 - 0-88/24-3991-2 - zzp-2025051221p-rcqx-1-zj6y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-p3-10min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX273.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20251217-rc-FX273.lcb
 样品瓶号: 1-20
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/17 14:59:48 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2): 2025/12/18 08:49:53 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.130	62514	100.000	9891	2654	1.148	--
总计		62514	100.000	9891			

图15 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025051221批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-浆法-50转-10min-片3
 供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 35°C 波长: 259nm
 数据文件名:
 RC\$QTL-4125 - 0-88/24-3992-2 - zzp-2025051221p-rcqx-1-zj6y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-p4-10min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX273.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20251217-rc-FX273.lcb
 样品瓶号: 1-29
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/17 15:03:10 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2): 2025/12/18 08:49:56 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.130	63219	100.000	9960	2645	1.146	--
总计		63219	100.000	9960			

图16 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025051221批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-浆法-50转-10min-片4
 供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 35°C 波长: 259nm
 数据文件名:
 RC\$QTL-4125 - 0-88/24-3993-2 - zzp-2025051221p-rcqx-1-zj6y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-p5-10min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX273.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20251217-rc-FX273.lcb
 样品瓶号: 1-38
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/17 15:06:33 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2): 2025/12/18 08:49:59 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.129	51278	100.000	8112	2646	1.149	--
总计		51278	100.000	8112			

图17 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025051221批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-浆法-50转-10min-片5
 供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 35°C 波长: 259nm
 数据文件名:
 RC\$QTL-4125 - 0-88/24-3994-2 - zzp-2025051221p-rcqx-1-zj6y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-p6-10min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX273.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20251217-rc-FX273.lcb
 样品瓶号: 1-47
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/17 15:09:56 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2): 2025/12/18 08:50:02 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.129	71614	100.000	11374	2678	1.147	--
总计		71614	100.000	11374			

图18 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025051221批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-浆法-50转-10min-片6
 供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 35°C 波长: 259nm
 数据文件名:
 RC\$QTL-4125 - 0-88/24-3995-2 - zzp-2025051221p-rcqx-1-zj6y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-p1-15min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX273.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20251217-rc-FX273.lcb
 样品瓶号: 1-3
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/17 15:13:19 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2): 2025/12/18 08:50:05 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.129	72242	100.000	11427	2651	1.145	--
总计		72242	100.000	11427			

图19 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025051221批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-浆法-50转-15min-片1
 供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 35°C 波长: 259nm
 数据文件名:
 RC\$QTL-4125 - 0-88/24-3998-2 - zzp-2025051221p-rcqx-1-zj6y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-p4-15min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX273.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20251217-rc-FX273.lcb
 样品瓶号: 1-30
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/17 15:23:27 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2): 2025/12/18 08:50:14 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.129	75937	100.000	12066	2676	1.149	--
总计		75937	100.000	12066			

图22 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025051221批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-浆法-50转-15min-片4
 供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 35°C 波长: 259nm
 数据文件名:
 RC\$QTL-4125 - 0-88/24-3999-2 - zzp-2025051221p-rcqx-1-zj6y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-p5-15min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX273.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20251217-rc-FX273.lcb
 样品瓶号: 1-39
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/17 15:26:50 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2): 2025/12/18 08:50:16 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.129	68935	100.000	10916	2654	1.145	--
总计		68935	100.000	10916			

图23 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025051221批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-浆法-50转-15min-片5
 供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 35°C 波长: 259nm
 数据文件名:
 RC\$QTL-4125 - 0-88/24-4000-2 - zzp-2025051221p-rcqx-1-zj6y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-p6-15min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX273.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20251217-rc-FX273.lcb
 样品瓶号: 1-48
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/17 15:30:13 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2): 2025/12/18 08:50:19 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.129	82781	100.000	13171	2682	1.148	--
总计		82781	100.000	13171			

图24 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025051221批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-浆法-50转-15min-片6
 供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 35°C 波长: 259nm
 数据文件名:
 RC\$QTL-4125 - 0-88/24-4001-2 - zzp-2025051221p-rcqx-1-zj6y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-p1-20min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX273.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20251217-rc-FX273.lcb
 样品瓶号: 1-4
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/17 15:33:36 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2): 2025/12/18 08:50:22 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.130	80603	100.000	12788	2670	1.149	--
总计		80603	100.000	12788			

图25 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025051221批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-浆法-50转-20min-片1
 供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 35°C 波长: 259nm
 数据文件名:
 RC\$QTL-4125 - 0-88/24-4002-2 - zzp-2025051221p-rcqx-1-zj6y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-p2-20min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX273.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20251217-rc-FX273.lcb
 样品瓶号: 1-13
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/17 15:36:59 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2): 2025/12/18 08:50:25 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.130	79947	100.000	12692	2675	1.147	--
总计		79947	100.000	12692			

图26 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025051221批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-浆法-50转-20min-片2
 供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 35°C 波长: 259nm
 数据文件名:
 RC\$QTL-4125 - 0-88/24-4003-2 - zzp-2025051221p-rcqx-1-zj6y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-p3-20min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX273.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20251217-rc-FX273.lcb
 样品瓶号: 1-22
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/17 15:40:22 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2): 2025/12/18 08:50:28 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.129	84282	100.000	13342	2656	1.153	--
总计		84282	100.000	13342			

图27 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025051221批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-浆法-50转-20min-片3
 供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 35°C 波长: 259nm
 数据文件名:
 RC\$QTL-4125 - 0-88/24-4004-2 - zzp-2025051221p-rcqx-1-zj6y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-p4-20min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX273.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20251217-rc-FX273.lcb
 样品瓶号: 1-31
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/17 15:43:44 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2): 2025/12/18 08:50:31 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.130	83202	100.000	13216	2683	1.152	--
总计		83202	100.000	13216			

图28 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025051221批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-浆法-50转-20min-片4
 供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 35°C 波长: 259nm
 数据文件名:
 RC\$QTL-4125 - 0-88/24-4006-2 - zzp-2025051221p-rcqx-1-zj6y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-p6-20min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX273.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20251217-rc-FX273.lcb
 样品瓶号: 1-49
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/17 15:50:30 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2): 2025/12/18 08:50:37 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.131	86837	100.000	13783	2681	1.151	--
总计		86837	100.000	13783			

图30 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025051221批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-浆法-50转-20min-片6
 供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 35°C 波长: 259nm
 数据文件名:
 RC\$QTL-4125 - 0-88/24-4007-2 - zzp-2025051221p-rcqx-1-zj6y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-p1-30min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX273.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20251217-rc-FX273.lcb
 样品瓶号: 1-5
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/17 15:53:53 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2): 2025/12/18 08:50:40 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.131	88405	100.000	14090	2702	1.151	--
总计		88405	100.000	14090			

图31 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025051221批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-浆法-50转-30min-片1
 供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 35°C 波长: 259nm
 数据文件名:
 RC\$QTL-4125 - 0-88/24-4008-2 - zzp-2025051221p-rcqx-1-zj6y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-p2-30min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX273.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20251217-rc-FX273.lcb
 样品瓶号: 1-14
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/17 15:57:15 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2): 2025/12/18 08:50:43 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.131	88566	100.000	14025	2662	1.155	--
总计		88566	100.000	14025			

图32 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025051221批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-浆法-50转-30min-片2
 供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 35°C 波长: 259nm
 数据文件名:
 RC\$QTL-4125 - 0-88/24-4009-2 - zzp-2025051221p-rcqx-1-zj6y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-p3-30min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX273.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20251217-rc-FX273.lcb
 样品瓶号: 1-23
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/17 16:00:38 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2): 2025/12/18 08:50:45 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.130	88979	100.000	14087	2660	1.148	--
总计		88979	100.000	14087			

图33 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025051221批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-浆法-50转-30min-片3
 供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 35°C 波长: 259nm
 数据文件名:
 RC\$QTL-4125 - 0-88/24-4011-2 - zzp-2025051221p-rcqx-1-zj6y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-p5-30min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX273.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20251217-rc-FX273.lcb
 样品瓶号: 1-41
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/17 16:07:24 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2): 2025/12/18 08:50:51 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.131	87523	100.000	13881	2683	1.151	--
总计		87523	100.000	13881			

图35 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025051221批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-浆法-50转-30min-片5
 供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 35°C 波长: 259nm
 数据文件名:
 RC\$QTL-4125 - 0-88/24-4012-2 - zzp-2025051221p-rcqx-1-zj6y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-p6-30min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX273.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20251217-rc-FX273.lcb
 样品瓶号: 1-50
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/17 16:10:47 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2): 2025/12/18 08:50:54 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.132	88148	100.000	14004	2691	1.150	--
总计		88148	100.000	14004			

图36 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025051221批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-浆法-50转-30min-片6
 供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 35°C 波长: 259nm
 数据文件名:
 RC\$QTL-4125 - 0-88/24-4013-2 - zzp-2025051221p-rcqx-1-zj6y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-p1-45min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX273.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20251217-rc-FX273.lcb
 样品瓶号: 1-6
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/17 16:14:10 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2): 2025/12/18 08:50:57 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.130	88773	100.000	14046	2655	1.153	--
总计		88773	100.000	14046			

图37 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025051221批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-浆法-50转-45min-片1
 供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 35°C 波长: 259nm
 数据文件名:
 RC\$QTL-4125 - 0-88/24-4014-2 - zzp-2025051221p-rcqx-1-zj6y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-p2-45min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX273.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20251217-rc-FX273.lcb
 样品瓶号: 1-15
 进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/17 16:17:33 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2): 2025/12/18 08:51:00 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.130	88934	100.000	14078	2646	1.149	--
总计		88934	100.000	14078			

图38 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025051221批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-浆法-50转-45min-片2
 供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 35°C 波长: 259nm
 数据文件名:
 RC\$QTL-4125 - 0-88/24-4015-2 - zzp-2025051221p-rcqx-1-zj6y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-p3-45min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX273.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20251217-rc-FX273.lcb
 样品瓶号: 1-24
 进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/17 16:20:56 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2): 2025/12/18 08:51:03 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.131	90337	100.000	14285	2657	1.151	--
总计		90337	100.000	14285			

图39 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025051221批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-浆法-50转-45min-片3
 供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 35°C 波长: 259nm
 数据文件名:
 RC\$QTL-4125 - 0-88/24-4017-2 - zzp-2025051221p-rcqx-1-zj6y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-p5-45min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX273.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20251217-rc-FX273.lcb
 样品瓶号: 1-42
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/17 16:27:41 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2): 2025/12/18 08:51:09 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.131	89644	100.000	14076	2623	1.147	--
总计		89644	100.000	14076			

图41 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025051221批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-浆法-50转-45min-片5
 供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 35°C 波长: 259nm
 数据文件名:
 RC\$QTL-4125 - 0-88/24-4020-2 - zzp-2025051221p-rcqx-1-zj6y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-p2-60min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX273.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20251217-rc-FX273.lcb
 样品瓶号: 1-16
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/17 16:37:49 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2): 2025/12/18 08:51:18 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.131	93129	100.000	14645	2624	1.146	--
总计		93129	100.000	14645			

图44 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025051221批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-浆法-50转-60min-片2
 供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 35°C 波长: 259nm
 数据文件名:
 RC\$QTL-4125 - 0-88/24-4021-2 - zzp-2025051221p-rcqx-1-zj6y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-p3-60min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX273.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20251217-rc-FX273.lcb
 样品瓶号: 1-25
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/17 16:41:12 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2): 2025/12/18 08:51:22 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.131	90613	100.000	14214	2618	1.149	--
总计		90613	100.000	14214			

图45 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025051221批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-浆法-50转-60min-片3
 供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 35°C 波长: 259nm
 数据文件名:
 RC\$QTL-4125 - 0-88/24-4022-2 - zzp-2025051221p-rcqx-1-zj6y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-p4-60min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX273.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20251217-rc-FX273.lcb
 样品瓶号: 1-34
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/17 16:44:35 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2): 2025/12/18 08:51:25 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.132	89287	100.000	13982	2601	1.146	--
总计		89287	100.000	13982			

图46 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025051221批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-浆法-50转-60min-片4
 供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 35°C 波长: 259nm
 数据文件名:
 RC\$QTL-4125 - 0-88/24-4024-2 - zzp-2025051221p-rcqx-1-zj6y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-p6-60min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX273.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20251217-rc-FX273.lcb
 样品瓶号: 1-52
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/17 16:51:21 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2): 2025/12/18 08:51:31 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.132	88450	100.000	13864	2613	1.145	--
总计		88450	100.000	13864			

图48 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025051221批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-浆法-50转-60min-片6
 供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 35°C 波长: 259nm
 数据文件名:
 RC\$QTL-4125 - 0-88/24-4025-2 - zzp-2025051221p-rcqx-1-zj6y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-p1-90min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX273.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20251217-rc-FX273.lcb
 样品瓶号: 1-8
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/17 16:54:45 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2): 2025/12/18 08:51:33 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.132	87613	100.000	13807	2630	1.146	--
总计		87613	100.000	13807			

图49 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025051221批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-浆法-50转-90min-片1
 供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 35°C 波长: 259nm
 数据文件名:
 RC\$QTL-4125 - 0-88/24-4026-2 - zzp-2025051221p-rcqx-1-zj6y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-p2-90min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX273.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20251217-rc-FX273.lcb
 样品瓶号: 1-17
 进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/17 16:58:09 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2): 2025/12/18 08:51:36 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.131	91272	100.000	14330	2618	1.148	--
总计		91272	100.000	14330			

图50 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025051221批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-浆法-50转-90min-片2
 供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 35°C 波长: 259nm
 数据文件名:
 RC\$QTL-4125 - 0-88/24-4027-2 - zzp-2025051221p-rcqx-1-zj6y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-p3-90min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX273.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20251217-rc-FX273.lcb
 样品瓶号: 1-26
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/17 17:01:33 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2): 2025/12/18 08:51:39 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.131	89547	100.000	14091	2625	1.143	--
总计		89547	100.000	14091			

图51 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025051221批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-浆法-50转-90min-片3
 供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 35°C 波长: 259nm
 数据文件名:
 RC\$QTL-4125 - 0-88/24-4028-2 - zzp-2025051221p-rcqx-1-zj6y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-p4-90min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX273.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20251217-rc-FX273.lcb
 样品瓶号: 1-35
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/17 17:04:57 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2): 2025/12/18 08:51:42 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.131	84405	100.000	13290	2634	1.144	--
总计		84405	100.000	13290			

图52 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025051221批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-浆法-50转-90min-片4
 供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 35°C 波长: 259nm
 数据文件名:
 RC\$QTL-4125 - 0-88/24-4029-2 - zzp-2025051221p-rcqx-1-zj6y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-p5-90min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX273.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20251217-rc-FX273.lcb
 样品瓶号: 1-44
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/17 17:08:21 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2): 2025/12/18 08:51:45 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.131	91662	100.000	14422	2641	1.146	--
总计		91662	100.000	14422			

图53 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025051221批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-浆法-50转-90min-片5
 供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 35°C 波长: 259nm
 数据文件名:
 RC\$QTL-4125 - 0-88/24-4030-2 - zzp-2025051221p-rcqx-1-zj6y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-p6-90min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX273.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20251217-rc-FX273.lcb
 样品瓶号: 1-53
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/17 17:11:45 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2): 2025/12/18 08:51:48 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.131	88002	100.000	13925	2656	1.145	--
总计		88002	100.000	13925			

图54 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025051221批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-浆法-50转-90min-片6
 供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 35°C 波长: 259nm
 数据文件名:
 RC\$QTL-4125 - 0-88/24-4031-2 - zzp-2025051221p-rcqx-1-zj6y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-p1-120min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX273.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20251217-rc-FX273.lcb
 样品瓶号: 3-1
 进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/17 17:15:08 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2): 2025/12/18 08:51:51 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.130	90085	100.000	14333	2660	1.141	--
总计		90085	100.000	14333			

图55 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025051221批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转-120min-片1
 供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 35°C 波长: 259nm
 数据文件名:
 RC\$QTL-4125 - 0-88/24-4034-2 - zzp-2025051221p-rcqx-1-zj6y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-p4-120min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX273.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20251217-rc-FX273.lcb
 样品瓶号: 3-28
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/17 17:25:17 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2): 2025/12/18 08:52:00 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.131	88396	100.000	13970	2657	1.146	--
总计		88396	100.000	13970			

图58 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025051221批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转-120min-片4
 供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 35°C 波长: 259nm
 数据文件名:
 RC\$QTL-4125 - 0-88/24-4035-2 - zzp-2025051221p-rcqx-1-zj6y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-p5-120min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX273.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20251217-rc-FX273.lcb
 样品瓶号: 3-37
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/17 17:28:40 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2): 2025/12/18 08:52:03 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.131	88976	100.000	14019	2643	1.149	--
总计		88976	100.000	14019			

图59 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025051221批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转-120min-片5
 供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 35°C 波长: 259nm
 数据文件名:
 RC\$QTL-4125 - 0-88/24-4036-2 - zzp-2025051221p-rcqx-1-zj6y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-p6-120min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX273.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20251217-rc-FX273.lcb
 样品瓶号: 3-46
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/17 17:32:02 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2): 2025/12/18 08:52:06 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.131	87691	100.000	13860	2662	1.149	--
总计		87691	100.000	13860			

图60 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025051221批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转-120min-片6
 供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 35°C 波长: 259nm
 数据文件名:
 RC\$QTL-4125 - 0-88/24-4037-2 - zzp-2025051221p-rcqx-1-zj6y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-p1-jx.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX273.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20251217-rc-FX273.lcb
 样品瓶号: 3-2
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/17 17:35:25 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2): 2025/12/18 08:52:09 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.131	94581	100.000	14914	2641	1.147	--
总计		94581	100.000	14914			

图61 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025051221批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转-极限转速-
 片1
 供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 35°C 波长: 259nm
 数据文件名:
 RC\$QTL-4125 - 0-88/24-4038-2 - zzp-2025051221p-rcqx-1-zj6y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-p2-jx.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX273.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20251217-rc-FX273.lcb
 样品瓶号: 3-11
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/17 17:38:48 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2): 2025/12/18 08:52:12 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.130	89927	100.000	14213	2648	1.145	--
总计		89927	100.000	14213			

图62 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025051221批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转-极限转速-片2
 供试品溶液-1



QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名:

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm

RC\$QTL-4125 - 0-88/24-4039-2 - zzp-2025051221p-rcqx-1-zj6y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-p3-jx.lcd

方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX273.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20251217-rc-FX273.lcb

样品瓶号: 3-20

进样体积: 20 μl

进样时间: 2025/12/17 17:42:11

处理时间 (V2): 2025/12/18 08:52:14

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.130	90379	100.000	14230	2626	1.144	--
总计		90379	100.000	14230			

图63 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
自制品-2025051221批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转-极限转速-片3
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 35°C 波长: 259nm
 数据文件名:
 RC\$QTL-4125 - 0-88/24-4040-2 - zzp-2025051221p-rcqx-1-zj6y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-p4-jx.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX273.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20251217-rc-FX273.lcb
 样品瓶号: 3-29
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/17 17:45:33 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2): 2025/12/18 08:52:17 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.131	92946	100.000	14668	2643	1.146	--
总计		92946	100.000	14668			

图64 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025051221批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转-极限转速-
 片4
 供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 35°C 波长: 259nm
 数据文件名:
 RC\$QTL-4125 - 0-88/24-4042-2 - zzp-2025051221p-rcqx-1-zj6y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-p6-jx.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX273.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20251217-rc-FX273.lcb
 样品瓶号: 3-47
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/17 17:52:18 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2): 2025/12/18 08:52:23 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.131	91178	100.000	14457	2664	1.149	--
总计		91178	100.000	14457			

图66 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025051221批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转-极限转速-
 片6
 供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 35°C 波长: 259nm
 数据文件名:
 RC\$QTL-4125 - 0-88/24-4043-2 - zzp-2025051221p-rcqx-1-zj6y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-dz2-1.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX273.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20251217-rc-FX273.lcb
 样品瓶号: 1-27
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/17 17:55:41 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2): 2025/12/18 08:52:26 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.125	99487	100.000	15294	2515	1.146	--
总计		99487	100.000	15294			

图67 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025051221批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-浆法-50转
 对照品溶液-2-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 35°C 波长: 259nm
 数据文件名:
 RC\$QTL-4125 - 0-88/24-4045-2 - zzp-2025051221p-rcqx-2-zj6y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-rj.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX273.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20251217-rc-FX273.lcb
 样品瓶号: 2-9
 进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/17 18:02:30 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2): 2025/12/18 08:52:32 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图69 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025051221批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-浆法-50转
 溶剂




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 35°C 波长: 259nm
 数据文件名:
 RC\$QTL-4125 - 0-88/24-4046-2 - zzp-2025051221p-rcqx-2-zj6y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-dz1-1.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX273.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20251217-rc-FX273.lcb
 样品瓶号: 2-18
 进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/17 18:05:56 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2): 2025/12/18 08:52:35 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.126	99250	100.000	15254	2514	1.147	--
总计		99250	100.000	15254			

图70 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025051221批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转
 对照品溶液-1-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 35°C 波长: 259nm
 数据文件名:
 RC\$QTL-4125 - 0-88/24-4047-2 - zzp-2025051221p-rcqx-2-zj6y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-dz1-2.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX273.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20251217-rc-FX273.lcb
 样品瓶号: 2-18
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/17 18:09:20 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2): 2025/12/18 08:52:37 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.127	99311	100.000	15326	2527	1.145	--
总计		99311	100.000	15326			

图71 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025051221批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转
 对照品溶液-1-2




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 35°C 波长: 259nm
 数据文件名:
 RC\$QTL-4125 - 0-88/24-4048-2 - zzp-2025051221p-rcqx-2-zj6y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-dz1-3.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX273.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20251217-rc-FX273.lcb
 样品瓶号: 2-18
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/17 18:12:45 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2): 2025/12/18 08:52:40 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.127	99515	100.000	15342	2528	1.148	--
总计		99515	100.000	15342			

图72 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025051221批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-浆法-50转
 对照品溶液-1-3




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 35°C 波长: 259nm
 数据文件名:
 RC\$QTL-4125 - 0-88/24-4049-2 - zzp-2025051221p-rcqx-2-zj6y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-dz1-4.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX273.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20251217-rc-FX273.lcb
 样品瓶号: 2-18
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/17 18:16:10 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2): 2025/12/18 08:52:43 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.127	99205	100.000	15303	2525	1.148	--
总计		99205	100.000	15303			

图73 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025051221批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转
 对照品溶液-1-4




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 35°C 波长: 259nm
 数据文件名:
 RC\$QTL-4125 - 0-88/24-4050-2 - zzp-2025051221p-rcqx-2-zj6y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-dz1-5.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX273.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20251217-rc-FX273.lcb
 样品瓶号: 2-18
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/17 18:19:36 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2): 2025/12/18 08:52:46 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.128	99226	100.000	15298	2514	1.147	--
总计		99226	100.000	15298			

图74 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025051221批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转
 对照品溶液-1-5




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 35°C 波长: 259nm
 数据文件名:
 RC\$QTL-4125 - 0-88/24-4051-2 - zzp-2025051221p-rcqx-2-zj6y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-p1-5min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX273.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20251217-rc-FX273.lcb
 样品瓶号: 2-1
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/17 18:23:00 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2): 2025/12/18 08:52:49 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.132	31540	100.000	4951	2663	1.151	--
总计		31540	100.000	4951			

图75 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025051221批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转-5min-片1
 供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 35°C 波长: 259nm
 数据文件名:
 RC\$QTL-4125 - 0-88/24-4053-2 - zzp-2025051221p-rcqx-2-zj6y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-p3-5min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX273.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20251217-rc-FX273.lcb
 样品瓶号: 2-19
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/17 18:29:49 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2): 2025/12/18 08:52:55 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.132	27813	100.000	4372	2655	1.151	--
总计		27813	100.000	4372			

图77 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025051221批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转-5min-片3
 供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 35°C 波长: 259nm
 数据文件名:
 RC\$QTL-4125 - 0-88/24-4057-2 - zzp-2025051221p-rcqx-2-zj6y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-p1-10min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX273.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20251217-rc-FX273.lcb
 样品瓶号: 2-2
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/17 18:43:25 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2): 2025/12/18 08:53:07 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.131	59339	100.000	9410	2672	1.145	--
总计		59339	100.000	9410			

图81 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025051221批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-浆法-50转-10min-片1
 供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 35°C 波长: 259nm
 数据文件名:
 RC\$QTL-4125 - 0-88/24-4058-2 - zzp-2025051221p-rcqx-2-zj6y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-p2-10min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX273.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20251217-rc-FX273.lcb
 样品瓶号: 2-11
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/17 18:46:49 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2): 2025/12/18 08:53:11 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.131	61031	100.000	9645	2660	1.145	--
总计		61031	100.000	9645			

图82 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025051221批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-浆法-50转-10min-片2
 供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 35°C 波长: 259nm
 数据文件名:
 RC\$QTL-4125 - 0-88/24-4059-2 - zzp-2025051221p-rcqx-2-zj6y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-p3-10min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX273.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20251217-rc-FX273.lcb
 样品瓶号: 2-20
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/17 18:50:13 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2): 2025/12/18 08:53:15 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.133	58463	100.000	9231	2660	1.144	--
总计		58463	100.000	9231			

图83 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025051221批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-浆法-50转-10min-片3
 供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 35°C 波长: 259nm
 数据文件名:
 RC\$QTL-4125 - 0-88/24-4060-2 - zzp-2025051221p-rcqx-2-zj6y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-p4-10min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX273.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20251217-rc-FX273.lcb
 样品瓶号: 2-29
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/17 18:53:38 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2): 2025/12/18 08:53:18 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.129	57657	100.000	9081	2628	1.142	--
总计		57657	100.000	9081			

图84 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025051221批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-浆法-50转-10min-片4
 供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 35°C 波长: 259nm
 数据文件名:
 RC\$QTL-4125 - 0-88/24-4061-2 - zzp-2025051221p-rcqx-2-zj6y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-p5-10min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX273.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20251217-rc-FX273.lcb
 样品瓶号: 2-38
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/17 18:57:02 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2): 2025/12/18 08:53:21 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.130	53599	100.000	8403	2610	1.147	--
总计		53599	100.000	8403			

图85 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025051221批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-浆法-50转-10min-片5
 供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 35°C 波长: 259nm
 数据文件名:
 RC\$QTL-4125 - 0-88/24-4062-2 - zzp-2025051221p-rcqx-2-zj6y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-p6-10min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX273.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20251217-rc-FX273.lcb
 样品瓶号: 2-47
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/17 19:00:26 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2): 2025/12/18 08:53:24 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.131	54200	100.000	8490	2609	1.151	--
总计		54200	100.000	8490			

图86 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025051221批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转-10min-片6
 供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 35°C 波长: 259nm
 数据文件名:
 RC\$QTL-4125 - 0-88/24-4064-2 - zzp-2025051221p-rcqx-2-zj6y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-p2-15min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX273.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20251217-rc-FX273.lcb
 样品瓶号: 2-12
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/17 19:07:16 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2): 2025/12/18 08:53:30 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.131	75260	100.000	11875	2641	1.144	--
总计		75260	100.000	11875			

图88 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025051221批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-浆法-50转-15min-片2
 供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 35°C 波长: 259nm
 数据文件名:
 RC\$QTL-4125 - 0-88/24-4065-2 - zzp-2025051221p-rcqx-2-zj6y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-p3-15min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX273.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20251217-rc-FX273.lcb
 样品瓶号: 2-21
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/17 19:10:40 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2): 2025/12/18 08:53:33 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.130	71510	100.000	11250	2608	1.143	--
总计		71510	100.000	11250			

图89 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025051221批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-浆法-50转-15min-片3
 供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 35°C 波长: 259nm
 数据文件名:
 RC\$QTL-4125 - 0-88/24-4066-2 - zzp-2025051221p-rcqx-2-zj6y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-p4-15min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX273.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20251217-rc-FX273.lcb
 样品瓶号: 2-30
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/17 19:14:04 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2): 2025/12/18 08:53:36 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.131	71698	100.000	11279	2626	1.143	--
总计		71698	100.000	11279			

图90 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025051221批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-浆法-50转-15min-片4
 供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 35°C 波长: 259nm
 数据文件名:
 RC\$QTL-4125 - 0-88/24-4067-2 - zzp-2025051221p-rcqx-2-zj6y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-p5-15min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX273.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20251217-rc-FX273.lcb
 样品瓶号: 2-39
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/17 19:17:28 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2): 2025/12/18 08:53:39 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.131	68349	100.000	10759	2611	1.139	--
总计		68349	100.000	10759			

图91 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025051221批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-浆法-50转-15min-片5
 供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 35°C 波长: 259nm
 数据文件名:
 RC\$QTL-4125 - 0-88/24-4068-2 - zzp-2025051221p-rcqx-2-zj6y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-p6-15min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX273.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20251217-rc-FX273.lcb
 样品瓶号: 2-48
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/17 19:20:52 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2): 2025/12/18 08:53:42 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.131	71713	100.000	11268	2634	1.144	--
总计		71713	100.000	11268			

图92 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025051221批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-浆法-50转-15min-片6
 供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 35°C 波长: 259nm
 数据文件名:
 RC\$QTL-4125 - 0-88/24-4069-2 - zzp-2025051221p-rcqx-2-zj6y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-p1-20min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX273.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20251217-rc-FX273.lcb
 样品瓶号: 2-4
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/17 19:24:16 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2): 2025/12/18 08:53:45 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.131	81737	100.000	12908	2654	1.141	--
总计		81737	100.000	12908			

图93 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025051221批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-浆法-50转-20min-片1
 供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 35°C 波长: 259nm
 数据文件名:
 RC\$QTL-4125 - 0-88/24-4070-2 - zzp-2025051221p-rcqx-2-zj6y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-p2-20min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX273.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20251217-rc-FX273.lcb
 样品瓶号: 2-13
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/17 19:27:42 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2): 2025/12/18 08:53:48 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.131	80817	100.000	12762	2655	1.143	--
总计		80817	100.000	12762			

图94 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025051221批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-浆法-50转-20min-片2
 供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 35°C 波长: 259nm
 数据文件名:
 RC\$QTL-4125 - 0-88/24-4071-2 - zzp-2025051221p-rcqx-2-zj6y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-p3-20min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX273.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20251217-rc-FX273.lcb
 样品瓶号: 2-22
 进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/17 19:31:06 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2): 2025/12/18 08:53:51 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.131	81543	100.000	12887	2657	1.148	--
总计		81543	100.000	12887			

图95 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025051221批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-浆法-50转-20min-片3
 供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 35°C 波长: 259nm
 数据文件名:
 RC\$QTL-4125 - 0-88/24-4072-2 - zzp-2025051221p-rcqx-2-zj6y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-p4-20min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX273.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20251217-rc-FX273.lcb
 样品瓶号: 2-31
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/17 19:34:30 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2): 2025/12/18 08:53:54 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.130	79535	100.000	12514	2633	1.146	--
总计		79535	100.000	12514			

图96 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025051221批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-浆法-50转-20min-片4
 供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 35°C 波长: 259nm
 数据文件名:
 RC\$QTL-4125 - 0-88/24-4073-2 - zzp-2025051221p-rcqx-2-zj6y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-p5-20min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX273.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20251217-rc-FX273.lcb
 样品瓶号: 2-40
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/17 19:37:54 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2): 2025/12/18 08:53:57 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.130	78094	100.000	12329	2654	1.143	--
总计		78094	100.000	12329			

图97 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025051221批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-浆法-50转-20min-片5
 供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 35°C 波长: 259nm
 数据文件名:
 RC\$QTL-4125 - 0-88/24-4074-2 - zzp-2025051221p-rcqx-2-zj6y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-p6-20min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX273.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20251217-rc-FX273.lcb
 样品瓶号: 2-49
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/17 19:41:18 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2): 2025/12/18 08:54:00 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.131	80155	100.000	12646	2642	1.142	--
总计		80155	100.000	12646			

图98 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025051221批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-浆法-50转-20min-片6
 供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 35°C 波长: 259nm
 数据文件名:
 RC\$QTL-4125 - 0-88/24-4075-2 - zzp-2025051221p-rcqx-2-zj6y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-p1-30min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX273.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20251217-rc-FX273.lcb
 样品瓶号: 2-5
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/17 19:44:42 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2): 2025/12/18 08:54:02 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.132	87277	100.000	13778	2653	1.139	--
总计		87277	100.000	13778			

图99 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025051221批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-浆法-50转-30min-片1
 供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 35°C 波长: 259nm
 数据文件名:
 RC\$QTL-4125 - 0-88/24-4076-2 - zzp-2025051221p-rcqx-2-zj6y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-p2-30min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX273.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20251217-rc-FX273.lcb
 样品瓶号: 2-14
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/17 19:48:07 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2): 2025/12/18 08:54:05 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.131	88064	100.000	13915	2654	1.149	--
总计		88064	100.000	13915			

图100 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025051221批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-浆法-50转-30min-片2
 供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 35°C 波长: 259nm
 数据文件名:
 RC\$QTL-4125 - 0-88/24-4077-2 - zzp-2025051221p-rcqx-2-zj6y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-p3-30min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX273.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20251217-rc-FX273.lcb
 样品瓶号: 2-23
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/17 19:51:31 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2): 2025/12/18 08:54:08 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.130	85788	100.000	13517	2642	1.142	--
总计		85788	100.000	13517			

图101 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025051221批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-浆法-50转-30min-片3
 供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 35°C 波长: 259nm
 数据文件名:
 RC\$QTL-4125 - 0-88/24-4078-2 - zzp-2025051221p-rcqx-2-zj6y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-p4-30min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX273.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20251217-rc-FX273.lcb
 样品瓶号: 2-32
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/17 19:54:55 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2): 2025/12/18 08:54:11 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.132	88209	100.000	13889	2647	1.142	--
总计		88209	100.000	13889			

图102 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025051221批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-浆法-50转-30min-片4
 供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 35°C 波长: 259nm
 数据文件名:
 RC\$QTL-4125 - 0-88/24-4079-2 - zzp-2025051221p-rcqx-2-zj6y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-p5-30min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX273.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20251217-rc-FX273.lcb
 样品瓶号: 2-41
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/17 19:58:20 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2): 2025/12/18 08:54:14 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.132	86862	100.000	13709	2648	1.142	--
总计		86862	100.000	13709			

图103 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025051221批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-浆法-50转-30min-片5
 供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 35°C 波长: 259nm
 数据文件名:
 RC\$QTL-4125 - 0-88/24-4080-2 - zzp-2025051221p-rcqx-2-zj6y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-p6-30min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX273.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20251217-rc-FX273.lcb
 样品瓶号: 2-50
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/17 20:01:44 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2): 2025/12/18 08:54:17 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.131	86276	100.000	13605	2638	1.144	--
总计		86276	100.000	13605			

图104 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025051221批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-浆法-50转-30min-片6
 供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 35°C 波长: 259nm
 数据文件名:
 RC\$QTL-4125 - 0-88/24-4081-2 - zzp-2025051221p-rcqx-2-zj6y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-p1-45min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX273.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20251217-rc-FX273.lcb
 样品瓶号: 2-6
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/17 20:05:08 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2): 2025/12/18 08:54:20 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.131	84890	100.000	13292	2606	1.138	--
总计		84890	100.000	13292			

图105 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025051221批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-浆法-50转-45min-片1
 供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 35°C 波长: 259nm
 数据文件名:
 RC\$QTL-4125 - 0-88/24-4082-2 - zzp-2025051221p-rcqx-2-zj6y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-p2-45min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX273.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20251217-rc-FX273.lcb
 样品瓶号: 2-15
 进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/17 20:08:34 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2): 2025/12/18 08:54:23 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.131	89822	100.000	14142	2628	1.141	--
总计		89822	100.000	14142			

图106 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025051221批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-浆法-50转-45min-片2
 供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 35°C 波长: 259nm
 数据文件名:
 RC\$QTL-4125 - 0-88/24-4083-2 - zzp-2025051221p-rcqx-2-zj6y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-p3-45min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX273.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20251217-rc-FX273.lcb
 样品瓶号: 2-24
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/17 20:11:58 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2): 2025/12/18 08:54:26 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.130	90523	100.000	14325	2655	1.145	--
总计		90523	100.000	14325			

图107 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025051221批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-浆法-50转-45min-片3
 供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 35°C 波长: 259nm
 数据文件名:
 RC\$QTL-4125 - 0-88/24-4084-2 - zzp-2025051221p-rcqx-2-zj6y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-p4-45min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX273.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20251217-rc-FX273.lcb
 样品瓶号: 2-33
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/17 20:15:23 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2): 2025/12/18 08:54:29 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.131	89220	100.000	14073	2646	1.145	--
总计		89220	100.000	14073			

图108 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025051221批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-浆法-50转-45min-片4
 供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 35°C 波长: 259nm
 数据文件名:
 RC\$QTL-4125 - 0-88/24-4085-2 - zzp-2025051221p-rcqx-2-zj6y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-p5-45min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX273.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20251217-rc-FX273.lcb
 样品瓶号: 2-42
 进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/17 20:18:48 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2): 2025/12/18 08:54:32 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.131	90283	100.000	14243	2645	1.142	--
总计		90283	100.000	14243			

图109 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025051221批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-浆法-50转-45min-片5
 供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 35°C 波长: 259nm
 数据文件名:
 RC\$QTL-4125 - 0-88/24-4086-2 - zzp-2025051221p-rcqx-2-zj6y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-p6-45min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX273.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20251217-rc-FX273.lcb
 样品瓶号: 2-51
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/17 20:22:13 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2): 2025/12/18 08:54:35 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.131	90746	100.000	14320	2644	1.143	--
总计		90746	100.000	14320			

图110 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025051221批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-浆法-50转-45min-片6
 供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 35°C 波长: 259nm
 数据文件名:
 RC\$QTL-4125 - 0-88/24-4087-2 - zzp-2025051221p-rcqx-2-zj6y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-p1-60min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX273.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20251217-rc-FX273.lcb
 样品瓶号: 2-7
 进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/17 20:25:38 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2): 2025/12/18 08:54:38 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.130	90149	100.000	14264	2658	1.147	--
总计		90149	100.000	14264			

图111 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025051221批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-浆法-50转-60min-片1
 供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 35°C 波长: 259nm
 数据文件名:
 RC\$QTL-4125 - 0-88/24-4089-2 - zzp-2025051221p-rcqx-2-zj6y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-p3-60min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX273.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20251217-rc-FX273.lcb
 样品瓶号: 2-25
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/17 20:32:27 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2): 2025/12/18 08:54:44 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.131	90758	100.000	14333	2646	1.139	--
总计		90758	100.000	14333			

图113 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025051221批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-浆法-50转-60min-片3
 供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 35°C 波长: 259nm
 数据文件名:
 RC\$QTL-4125 - 0-88/24-4090-2 - zzp-2025051221p-rcqx-2-zj6y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-p4-60min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX273.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20251217-rc-FX273.lcb
 样品瓶号: 2-34
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/17 20:35:52 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2): 2025/12/18 08:54:47 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.132	89576	100.000	14142	2655	1.143	--
总计		89576	100.000	14142			

图114 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025051221批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-浆法-50转-60min-片4
 供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 35°C 波长: 259nm
 数据文件名:
 RC\$QTL-4125 - 0-88/24-4091-2 - zzp-2025051221p-rcqx-2-zj6y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-p5-60min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX273.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20251217-rc-FX273.lcb
 样品瓶号: 2-43
 进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/17 20:39:17 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2): 2025/12/18 08:54:50 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.130	91432	100.000	14459	2655	1.146	--
总计		91432	100.000	14459			

图115 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025051221批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-浆法-50转-60min-片5
 供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 35°C 波长: 259nm
 数据文件名:
 RC\$QTL-4125 - 0-88/24-4092-2 - zzp-2025051221p-rcqx-2-zj6y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-p6-60min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX273.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20251217-rc-FX273.lcb
 样品瓶号: 2-52
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/17 20:42:41 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2): 2025/12/18 08:54:53 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.131	89358	100.000	14100	2661	1.145	--
总计		89358	100.000	14100			

图116 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025051221批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-浆法-50转-60min-片6
 供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 35°C 波长: 259nm
 数据文件名:
 RC\$QTL-4125 - 0-88/24-4093-2 - zzp-2025051221p-rcqx-2-zj6y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-p1-90min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX273.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20251217-rc-FX273.lcb
 样品瓶号: 2-8
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/17 20:46:06 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2): 2025/12/18 08:54:56 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.131	86435	100.000	13638	2648	1.143	--
总计		86435	100.000	13638			

图117 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025051221批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-浆法-50转-90min-片1
 供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 35°C 波长: 259nm
 数据文件名:
 RC\$QTL-4125 - 0-88/24-4094-2 - zzp-2025051221p-rcqx-2-zj6y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-p2-90min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX273.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20251217-rc-FX273.lcb
 样品瓶号: 2-17
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/17 20:49:31 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2): 2025/12/18 08:54:59 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.130	91065	100.000	14389	2643	1.138	--
总计		91065	100.000	14389			

图118 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025051221批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-浆法-50转-90min-片2
 供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 35°C 波长: 259nm
 数据文件名:
 RC\$QTL-4125 - 0-88/24-4095-2 - zzp-2025051221p-rcqx-2-zj6y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-p3-90min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX273.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20251217-rc-FX273.lcb
 样品瓶号: 2-26
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/17 20:52:56 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2): 2025/12/18 08:55:02 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.131	90181	100.000	14222	2644	1.140	--
总计		90181	100.000	14222			

图119 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025051221批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-浆法-50转-90min-片3
 供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 35°C 波长: 259nm
 数据文件名:
 RC\$QTL-4125 - 0-88/24-4096-2 - zzp-2025051221p-rcqx-2-zj6y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-p4-90min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX273.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20251217-rc-FX273.lcb
 样品瓶号: 2-35
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/17 20:56:21 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2): 2025/12/18 08:55:05 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.131	89556	100.000	14142	2654	1.145	--
总计		89556	100.000	14142			

图120 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025051221批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-浆法-50转-90min-片4
 供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 35°C 波长: 259nm
 数据文件名:
 RC\$QTL-4125 - 0-88/24-4097-2 - zzp-2025051221p-rcqx-2-zj6y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-p5-90min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX273.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20251217-rc-FX273.lcb
 样品瓶号: 2-44
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/17 20:59:45 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2): 2025/12/18 08:55:08 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.131	91830	100.000	14428	2619	1.139	--
总计		91830	100.000	14428			

图121 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025051221批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-浆法-50转-90min-片5
 供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 35°C 波长: 259nm
 数据文件名:
 RC\$QTL-4125 - 0-88/24-4098-2 - zzp-2025051221p-rcqx-2-zj6y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-p6-90min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX273.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20251217-rc-FX273.lcb
 样品瓶号: 2-53
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/17 21:03:10 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2): 2025/12/18 08:55:11 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.131	89632	100.000	14109	2639	1.140	--
总计		89632	100.000	14109			

图122 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025051221批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-浆法-50转-90min-片6
 供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 35°C 波长: 259nm
 数据文件名:
 RC\$QTL-4125 - 0-88/24-4099-2 - zzp-2025051221p-rcqx-2-zj6y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-p1-120min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX273.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20251217-rc-FX273.lcb
 样品瓶号: 3-3
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/17 21:06:32 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2): 2025/12/18 08:55:14 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.131	88367	100.000	13916	2642	1.145	--
总计		88367	100.000	13916			

图123 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025051221批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转-120min-片1
 供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 35°C 波长: 259nm
 数据文件名:
 RC\$QTL-4125 - 0-88/24-4100-2 - zzp-2025051221p-rcqx-2-zj6y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-p2-120min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX273.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20251217-rc-FX273.lcb
 样品瓶号: 3-12
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/17 21:09:55 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2): 2025/12/18 08:55:17 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.130	88780	100.000	14030	2643	1.143	--
总计		88780	100.000	14030			

图124 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025051221批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转-120min-片2
 供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 35°C 波长: 259nm
 数据文件名:
 RC\$QTL-4125 - 0-88/24-4101-2 - zzp-2025051221p-rcqx-2-zj6y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-p3-120min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX273.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20251217-rc-FX273.lcb
 样品瓶号: 3-21
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/17 21:13:18 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2): 2025/12/18 08:55:20 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.131	87917	100.000	13861	2635	1.139	--
总计		87917	100.000	13861			

图125 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025051221批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转-120min-片3
 供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 35°C 波长: 259nm
 数据文件名:
 RC\$QTL-4125 - 0-88/24-4102-2 - zzp-2025051221p-rcqx-2-zj6y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-p4-120min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX273.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20251217-rc-FX273.lcb
 样品瓶号: 3-30
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/17 21:16:41 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2): 2025/12/18 08:55:23 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.130	88079	100.000	13860	2629	1.145	--
总计		88079	100.000	13860			

图126 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025051221批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转-120min-片4
 供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 35°C 波长: 259nm
 数据文件名:
 RC\$QTL-4125 - 0-88/24-4104-2 - zzp-2025051221p-rcqx-2-zj6y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-p6-120min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX273.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20251217-rc-FX273.lcb
 样品瓶号: 3-48
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/17 21:23:27 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2): 2025/12/18 08:55:28 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.131	88027	100.000	13855	2633	1.138	--
总计		88027	100.000	13855			

图128 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025051221批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转-120min-片6
 供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 35°C 波长: 259nm
 数据文件名:
 RC\$QTL-4125 - 0-88/24-4105-2 - zzp-2025051221p-rcqx-2-zj6y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-p1-jx.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX273.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20251217-rc-FX273.lcb
 样品瓶号: 3-4
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/17 21:26:49 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2): 2025/12/18 08:55:32 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.131	90704	100.000	14225	2615	1.139	--
总计		90704	100.000	14225			

图129 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025051221批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转-极限转速-
 片1
 供试品溶液-1



QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm

数据文件名:

RC\$QTL-4125 - 0-88/24-4106-2 - zzp-2025051221p-rcqx-2-zj6y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-p2-jx.lcd

方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX273.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20251217-rc-FX273.lcb

样品瓶号: 3-13

进样体积: 20 μl

进样时间: 2025/12/17 21:30:12

处理时间 (V2): 2025/12/18 08:55:34

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.131	90035	100.000	14092	2596	1.138	--
总计		90035	100.000	14092			

图130 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
自制品-2025051221批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转-极限转速-片2
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 35°C 波长: 259nm
 数据文件名:
 RC\$QTL-4125 - 0-88/24-4107-2 - zzp-2025051221p-rcqx-2-zj6y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-p3-jx.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX273.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20251217-rc-FX273.lcb
 样品瓶号: 3-22
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/17 21:33:34 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2): 2025/12/18 08:55:37 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.131	91126	100.000	14306	2616	1.143	--
总计		91126	100.000	14306			

图131 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025051221批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转-极限转速-
 片3
 供试品溶液-1



QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名:


流速: 1.5ml/min
波长: 259nm

RC\$QTL-4125 - 0-88/24-4108-2 - zzp-2025051221p-rcqx-2-zj6y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-p4-jx.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX273.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20251217-rc-FX273.lcb
样品瓶号: 3-31
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/12/17 21:36:57
处理时间 (V2): 2025/12/18 08:55:40
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.130	90541	100.000	14215	2608	1.140	--
总计		90541	100.000	14215			

图132 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
自制品-2025051221批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转-极限转速-片4
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 35°C 波长: 259nm
 数据文件名:
 RC\$QTL-4125 - 0-88/24-4109-2 - zzp-2025051221p-rcqx-2-zj6y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-p5-jx.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX273.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20251217-rc-FX273.lcb
 样品瓶号: 3-40
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/17 21:40:20 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2): 2025/12/18 08:55:43 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.131	90319	100.000	14209	2615	1.139	--
总计		90319	100.000	14209			

图133 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025051221批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转-极限转速-
 片5
 供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 35°C 波长: 259nm
 数据文件名:
 RC\$QTL-4125 - 0-88/24-4110-2 - zzp-2025051221p-rcqx-2-zj6y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-p6-jx.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX273.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20251217-rc-FX273.lcb
 样品瓶号: 3-49
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/17 21:43:43 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2): 2025/12/18 08:55:46 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.132	90042	100.000	14124	2613	1.137	--
总计		90042	100.000	14124			

图134 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025051221批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转-极限转速-片6
 供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 35°C 波长: 259nm
 数据文件名:
 RC\$QTL-4125 - 0-88/24-4112-2 - zzp-2025051221p-rcqx-2-zj6y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-dz2-2.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX273.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20251217-rc-FX273.lcb
 样品瓶号: 2-27
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/17 21:50:34 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2): 2025/12/18 08:55:52 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.127	100077	100.000	15367	2501	1.142	--
总计		100077	100.000	15367			

图136 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025051221批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转
 对照品溶液-2-2




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 35°C 波长: 259nm
 数据文件名:
 RC\$QTL-4125 - 0-89/25-1395-2 - zzp-2025051321p-rcqx-1-zj6y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-dz1-1.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20251217-rc-FX274.lcb
 样品瓶号: 1-18
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/17 14:12:12 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2): 2025/12/18 09:00:24 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.225	98965	100.000	15725	2899	1.055	--
总计		98965	100.000	15725			

图138 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025051321批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-浆法-50转
 对照品溶液-1-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 35°C 波长: 259nm
 数据文件名:
 RC\$QTL-4125 - 0-89/25-1396-2 - zzp-2025051321p-rcqx-1-zj6y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-dz1-2.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20251217-rc-FX274.lcb
 样品瓶号: 1-18
 进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/17 14:15:36 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2): 2025/12/18 09:00:29 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.225	99053	100.000	15728	2889	1.053	--
总计		99053	100.000	15728			

图139 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025051321批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-浆法-50转
 对照品溶液-1-2




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 35°C 波长: 259nm
 数据文件名:
 RC\$QTL-4125 - 0-89/25-1397-2 - zzp-2025051321p-rcqx-1-zj6y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-dz1-3.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20251217-rc-FX274.lcb
 样品瓶号: 1-18
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/17 14:19:00 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2): 2025/12/18 09:00:33 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.224	98899	100.000	15748	2895	1.052	--
总计		98899	100.000	15748			

图140 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025051321批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-浆法-50转
 对照品溶液-1-3




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 35°C 波长: 259nm
 数据文件名:
 RC\$QTL-4125 - 0-89/25-1398-2 - zzp-2025051321p-rcqx-1-zj6y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-dz1-4.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20251217-rc-FX274.lcb
 样品瓶号: 1-18
 进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/17 14:22:24 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2): 2025/12/18 09:00:36 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.224	99160	100.000	15765	2900	1.053	--
总计		99160	100.000	15765			

图141 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025051321批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转
 对照品溶液-1-4




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 35°C 波长: 259nm
 数据文件名:
 RC\$QTL-4125 - 0-89/25-1401-2 - zzp-2025051321p-rcqx-1-zj6y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-p2-5min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20251217-rc-FX274.lcb
 样品瓶号: 1-10
 进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/17 14:32:34 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2): 2025/12/18 09:00:46 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.228	22275	100.000	3636	3039	1.058	--
总计		22275	100.000	3636			

图144 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025051321批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转-5min-片2
 供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 35°C 波长: 259nm
 数据文件名:
 RC\$QTL-4125 - 0-89/25-1402-2 - zzp-2025051321p-rcqx-1-zj6y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-p3-5min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20251217-rc-FX274.lcb
 样品瓶号: 1-19
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/17 14:35:56 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2): 2025/12/18 09:00:49 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.228	31232	100.000	5088	3042	1.052	--
总计		31232	100.000	5088			

图145 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025051321批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转-5min-片3
 供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 35°C 波长: 259nm
 数据文件名:
 RC\$QTL-4125 - 0-89/25-1403-2 - zzp-2025051321p-rcqx-1-zj6y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-p4-5min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20251217-rc-FX274.lcb
 样品瓶号: 1-28
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/17 14:39:19 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2): 2025/12/18 09:00:51 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.226	26491	100.000	4286	3014	1.058	--
总计		26491	100.000	4286			

图146 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025051321批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转-5min-片4
 供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 35°C 波长: 259nm
 数据文件名:
 RC\$QTL-4125 - 0-89/25-1405-2 - zzp-2025051321p-rcqx-1-zj6y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-p6-5min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20251217-rc-FX274.lcb
 样品瓶号: 1-46
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/17 14:46:04 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2): 2025/12/18 09:00:57 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.227	45310	100.000	7372	3041	1.051	--
总计		45310	100.000	7372			

图148 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025051321批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转-5min-片6
 供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 35°C 波长: 259nm
 数据文件名:
 RC\$QTL-4125 - 0-89/25-1406-2 - zzp-2025051321p-rcqx-1-zj6y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-p1-10min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20251217-rc-FX274.lcb
 样品瓶号: 1-2
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/17 14:49:27 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2): 2025/12/18 09:01:00 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.227	70506	100.000	11424	3028	1.050	--
总计		70506	100.000	11424			

图149 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025051321批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-浆法-50转-10min-片1
 供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 35°C 波长: 259nm
 数据文件名:
 RC\$QTL-4125 - 0-89/25-1407-2 - zzp-2025051321p-rcqx-1-zj6y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-p2-10min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20251217-rc-FX274.lcb
 样品瓶号: 1-11
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/17 14:52:50 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2): 2025/12/18 09:01:03 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.226	50307	100.000	8162	3028	1.055	--
总计		50307	100.000	8162			

图150 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025051321批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-浆法-50转-10min-片2
 供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 35°C 波长: 259nm
 数据文件名:
 RC\$QTL-4125 - 0-89/25-1408-2 - zzp-2025051321p-rcqx-1-zj6y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-p3-10min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20251217-rc-FX274.lcb
 样品瓶号: 1-20
 进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/17 14:56:14 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2): 2025/12/18 09:01:06 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.225	55673	100.000	9029	3036	1.053	--
总计		55673	100.000	9029			

图151 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025051321批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-浆法-50转-10min-片3
 供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 35°C 波长: 259nm
 数据文件名:
 RC\$QTL-4125 - 0-89/25-1409-2 - zzp-2025051321p-rcqx-1-zj6y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-p4-10min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20251217-rc-FX274.lcb
 样品瓶号: 1-29
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/17 14:59:36 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2): 2025/12/18 09:01:09 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.226	52135	100.000	8435	3027	1.048	--
总计		52135	100.000	8435			

图152 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025051321批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-浆法-50转-10min-片4
 供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 35°C 波长: 259nm
 数据文件名:
 RC\$QTL-4125 - 0-89/25-1410-2 - zzp-2025051321p-rcqx-1-zj6y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-p5-10min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20251217-rc-FX274.lcb
 样品瓶号: 1-38
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/17 15:02:59 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2): 2025/12/18 09:01:12 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.226	57377	100.000	9298	3023	1.052	--
总计		57377	100.000	9298			

图153 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025051321批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-浆法-50转-10min-片5
 供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 35°C 波长: 259nm
 数据文件名:
 RC\$QTL-4125 - 0-89/25-1411-2 - zzp-2025051321p-rcqx-1-zj6y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-p6-10min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20251217-rc-FX274.lcb
 样品瓶号: 1-47
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/17 15:06:21 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2): 2025/12/18 09:01:14 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.225	72038	100.000	11664	3024	1.054	--
总计		72038	100.000	11664			

图154 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025051321批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-浆法-50转-10min-片6
 供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 35°C 波长: 259nm
 数据文件名:
 RC\$QTL-4125 - 0-89/25-1413-2 - zzp-2025051321p-rcqx-1-zj6y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-p2-15min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20251217-rc-FX274.lcb
 样品瓶号: 1-12
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/17 15:13:07 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2): 2025/12/18 09:01:20 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.225	64205	100.000	10435	3038	1.052	--
总计		64205	100.000	10435			

图156 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025051321批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-浆法-50转-15min-片2
 供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 35°C 波长: 259nm
 数据文件名:
 RC\$QTL-4125 - 0-89/25-1414-2 - zzp-2025051321p-rcqx-1-zj6y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-p3-15min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20251217-rc-FX274.lcb
 样品瓶号: 1-21
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/17 15:16:31 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2): 2025/12/18 09:01:23 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.225	68517	100.000	11117	3030	1.052	--
总计		68517	100.000	11117			

图157 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025051321批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-浆法-50转-15min-片3
 供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 35°C 波长: 259nm
 数据文件名:
 RC\$QTL-4125 - 0-89/25-1415-2 - zzp-2025051321p-rcqx-1-zj6y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-p4-15min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20251217-rc-FX274.lcb
 样品瓶号: 1-30
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/17 15:19:53 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2): 2025/12/18 09:01:26 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.225	66059	100.000	10719	3027	1.052	--
总计		66059	100.000	10719			

图158 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025051321批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-浆法-50转-15min-片4
 供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5µm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 35°C 波长: 259nm
 数据文件名:
 RC\$QTL-4125 - 0-89/25-1416-2 - zzp-2025051321p-rcqx-1-zj6y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-p5-15min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20251217-rc-FX274.lcb
 样品瓶号: 1-39
 进样体积: 20 µl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/17 15:23:17 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2): 2025/12/18 09:01:29 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.225	75575	100.000	12268	3045	1.051	--
总计		75575	100.000	12268			

图159 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025051321批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-浆法-50转-15min-片5
 供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 35°C 波长: 259nm
 数据文件名:
 RC\$QTL-4125 - 0-89/25-1417-2 - zzp-2025051321p-rcqx-1-zj6y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-p6-15min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20251217-rc-FX274.lcb
 样品瓶号: 1-48
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/17 15:26:39 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2): 2025/12/18 09:01:32 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.225	80383	100.000	13029	3029	1.050	--
总计		80383	100.000	13029			

图160 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025051321批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-浆法-50转-15min-片6
 供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 35°C 波长: 259nm
 数据文件名:
 RC\$QTL-4125 - 0-89/25-1418-2 - zzp-2025051321p-rcqx-1-zj6y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-p1-20min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20251217-rc-FX274.lcb
 样品瓶号: 1-4
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/17 15:30:02 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2): 2025/12/18 09:01:34 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.225	84020	100.000	13637	3036	1.052	--
总计		84020	100.000	13637			

图161 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025051321批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-浆法-50转-20min-片1
 供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 35°C 波长: 259nm
 数据文件名:
 RC\$QTL-4125 - 0-89/25-1419-2 - zzp-2025051321p-rcqx-1-zj6y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-p2-20min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20251217-rc-FX274.lcb
 样品瓶号: 1-13
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/17 15:33:25 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2): 2025/12/18 09:01:37 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.226	74875	100.000	12122	3028	1.048	--
总计		74875	100.000	12122			

图162 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025051321批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-浆法-50转-20min-片2
 供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 35°C 波长: 259nm
 数据文件名:
 RC\$QTL-4125 - 0-89/25-1421-2 - zzp-2025051321p-rcqx-1-zj6y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-p4-20min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20251217-rc-FX274.lcb
 样品瓶号: 1-31
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/17 15:40:10 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2): 2025/12/18 09:01:43 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.226	75356	100.000	12206	3030	1.049	--
总计		75356	100.000	12206			

图164 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025051321批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-浆法-50转-20min-片4
 供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 35°C 波长: 259nm
 数据文件名:
 RC\$QTL-4125 - 0-89/25-1423-2 - zzp-2025051321p-rcqx-1-zj6y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-p6-20min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20251217-rc-FX274.lcb
 样品瓶号: 1-49
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/17 15:46:56 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2): 2025/12/18 09:01:48 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.225	86035	100.000	13999	3040	1.051	--
总计		86035	100.000	13999			

图166 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025051321批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-浆法-50转-20min-片6
 供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 35°C 波长: 259nm
 数据文件名:
 RC\$QTL-4125 - 0-89/25-1424-2 - zzp-2025051321p-rcqx-1-zj6y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-p1-30min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20251217-rc-FX274.lcb
 样品瓶号: 1-5
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/17 15:50:18 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2): 2025/12/18 09:01:51 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.225	89121	100.000	14466	3031	1.052	--
总计		89121	100.000	14466			

图167 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025051321批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-浆法-50转-30min-片1
 供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 35°C 波长: 259nm
 数据文件名:
 RC\$QTL-4125 - 0-89/25-1425-2 - zzp-2025051321p-rcqx-1-zj6y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-p2-30min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20251217-rc-FX274.lcb
 样品瓶号: 1-14
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/17 15:53:42 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2): 2025/12/18 09:01:54 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.225	84223	100.000	13671	3029	1.050	--
总计		84223	100.000	13671			

图168 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025051321批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-浆法-50转-30min-片2
 供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 35°C 波长: 259nm
 数据文件名:
 RC\$QTL-4125 - 0-89/25-1426-2 - zzp-2025051321p-rcqx-1-zj6y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-p3-30min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20251217-rc-FX274.lcb
 样品瓶号: 1-23
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/17 15:57:04 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2): 2025/12/18 09:01:57 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.225	86155	100.000	14007	3029	1.052	--
总计		86155	100.000	14007			

图169 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025051321批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-浆法-50转-30min-片3
 供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 35°C 波长: 259nm
 数据文件名:
 RC\$QTL-4125 - 0-89/25-1427-2 - zzp-2025051321p-rcqx-1-zj6y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-p4-30min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20251217-rc-FX274.lcb
 样品瓶号: 1-32
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/17 16:00:27 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2): 2025/12/18 09:02:00 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.225	84346	100.000	13730	3033	1.051	--
总计		84346	100.000	13730			

图170 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025051321批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-浆法-50转-30min-片4
 供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 35°C 波长: 259nm
 数据文件名:
 RC\$QTL-4125 - 0-89/25-1428-2 - zzp-2025051321p-rcqx-1-zj6y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-p5-30min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20251217-rc-FX274.lcb
 样品瓶号: 1-41
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/17 16:03:51 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2): 2025/12/18 09:02:03 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.225	89196	100.000	14470	3023	1.052	--
总计		89196	100.000	14470			

图171 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025051321批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-浆法-50转-30min-片5
 供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 35°C 波长: 259nm
 数据文件名:
 RC\$QTL-4125 - 0-89/25-1430-2 - zzp-2025051321p-rcqx-1-zj6y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-p1-45min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20251217-rc-FX274.lcb
 样品瓶号: 1-6
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/17 16:10:37 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2): 2025/12/18 09:02:09 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.225	86306	100.000	13987	3018	1.049	--
总计		86306	100.000	13987			

图173 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025051321批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-浆法-50转-45min-片1
 供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 35°C 波长: 259nm
 数据文件名:
 RC\$QTL-4125 - 0-89/25-1432-2 - zzp-2025051321p-rcqx-1-zj6y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-p3-45min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20251217-rc-FX274.lcb
 样品瓶号: 1-24
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/17 16:17:23 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2): 2025/12/18 09:02:15 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.225	90208	100.000	14676	3033	1.050	--
总计		90208	100.000	14676			

图175 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025051321批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-浆法-50转-45min-片3
 供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 35°C 波长: 259nm
 数据文件名:
 RC\$QTL-4125 - 0-89/25-1433-2 - zzp-2025051321p-rcqx-1-zj6y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-p4-45min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20251217-rc-FX274.lcb
 样品瓶号: 1-33
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/17 16:20:46 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2): 2025/12/18 09:02:18 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.225	91804	100.000	14937	3046	1.048	--
总计		91804	100.000	14937			

图176 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025051321批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-浆法-50转-45min-片4
 供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 35°C 波长: 259nm
 数据文件名:
 RC\$QTL-4125 - 0-89/25-1434-2 - zzp-2025051321p-rcqx-1-zj6y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-p5-45min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20251217-rc-FX274.lcb
 样品瓶号: 1-42
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/17 16:24:10 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2): 2025/12/18 09:02:21 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.225	91529	100.000	14875	3035	1.050	--
总计		91529	100.000	14875			

图177 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025051321批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-浆法-50转-45min-片5
 供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 35°C 波长: 259nm
 数据文件名:
 RC\$QTL-4125 - 0-89/25-1435-2 - zzp-2025051321p-rcqx-1-zj6y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-p6-45min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20251217-rc-FX274.lcb
 样品瓶号: 1-51
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/17 16:27:32 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2): 2025/12/18 09:02:24 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.225	87088	100.000	14168	3043	1.050	--
总计		87088	100.000	14168			

图178 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025051321批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-浆法-50转-45min-片6
 供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 35°C 波长: 259nm
 数据文件名:
 RC\$QTL-4125 - 0-89/25-1436-2 - zzp-2025051321p-rcqx-1-zj6y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-p1-60min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20251217-rc-FX274.lcb
 样品瓶号: 1-7
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/17 16:30:55 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2): 2025/12/18 09:02:27 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.226	89428	100.000	14492	3035	1.047	--
总计		89428	100.000	14492			

图179 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025051321批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-浆法-50转-60min-片1
 供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 35°C 波长: 259nm
 数据文件名:
 RC\$QTL-4125 - 0-89/25-1438-2 - zzp-2025051321p-rcqx-1-zj6y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-p3-60min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20251217-rc-FX274.lcb
 样品瓶号: 1-25
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/17 16:37:42 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2): 2025/12/18 09:02:33 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.225	88727	100.000	14396	3031	1.051	--
总计		88727	100.000	14396			

图181 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025051321批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-浆法-50转-60min-片3
 供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 35°C 波长: 259nm
 数据文件名:
 RC\$QTL-4125 - 0-89/25-1439-2 - zzp-2025051321p-rcqx-1-zj6y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-p4-60min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20251217-rc-FX274.lcb
 样品瓶号: 1-34
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/17 16:41:05 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2): 2025/12/18 09:02:36 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.225	89667	100.000	14559	3019	1.049	--
总计		89667	100.000	14559			

图182 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025051321批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-浆法-50转-60min-片4
 供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 35°C 波长: 259nm
 数据文件名:
 RC\$QTL-4125 - 0-89/25-1441-2 - zzp-2025051321p-rcqx-1-zj6y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-p6-60min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20251217-rc-FX274.lcb
 样品瓶号: 1-52
 进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/17 16:47:51 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2): 2025/12/18 09:02:42 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.224	85343	100.000	13873	3029	1.050	--
总计		85343	100.000	13873			

图184 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025051321批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-浆法-50转-60min-片6
 供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 35°C 波长: 259nm
 数据文件名:
 RC\$QTL-4125 - 0-89/25-1442-2 - zzp-2025051321p-rcqx-1-zj6y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-p1-90min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20251217-rc-FX274.lcb
 样品瓶号: 1-8
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/17 16:51:14 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2): 2025/12/18 09:02:45 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.224	85429	100.000	13872	3015	1.051	--
总计		85429	100.000	13872			

图185 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025051321批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-浆法-50转-90min-片1
 供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 35°C 波长: 259nm
 数据文件名:
 RC\$QTL-4125 - 0-89/25-1443-2 - zzp-2025051321p-rcqx-1-zj6y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-p2-90min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20251217-rc-FX274.lcb
 样品瓶号: 1-17
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/17 16:54:38 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2): 2025/12/18 09:02:48 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.225	90411	100.000	14695	3030	1.051	--
总计		90411	100.000	14695			

图186 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025051321批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-浆法-50转-90min-片2
 供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 35°C 波长: 259nm
 数据文件名:
 RC\$QTL-4125 - 0-89/25-1444-2 - zzp-2025051321p-rcqx-1-zj6y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-p3-90min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20251217-rc-FX274.lcb
 样品瓶号: 1-26
 进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/17 16:58:01 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2): 2025/12/18 09:02:51 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.225	89936	100.000	14605	3031	1.050	--
总计		89936	100.000	14605			

图187 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025051321批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-浆法-50转-90min-片3
 供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 35°C 波长: 259nm
 数据文件名:
 RC\$QTL-4125 - 0-89/25-1445-2 - zzp-2025051321p-rcqx-1-zj6y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-p4-90min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20251217-rc-FX274.lcb
 样品瓶号: 1-35
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/17 17:01:25 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2): 2025/12/18 09:02:53 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.225	90067	100.000	14625	3037	1.047	--
总计		90067	100.000	14625			

图188 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025051321批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-浆法-50转-90min-片4
 供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 35°C 波长: 259nm
 数据文件名:
 RC\$QTL-4125 - 0-89/25-1446-2 - zzp-2025051321p-rcqx-1-zj6y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-p5-90min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20251217-rc-FX274.lcb
 样品瓶号: 1-44
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/17 17:04:48 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2): 2025/12/18 09:02:56 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.225	92504	100.000	15013	3028	1.049	--
总计		92504	100.000	15013			

图189 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025051321批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-浆法-50转-90min-片5
 供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 35°C 波长: 259nm
 数据文件名:
 RC\$QTL-4125 - 0-89/25-1447-2 - zzp-2025051321p-rcqx-1-zj6y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-p6-90min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20251217-rc-FX274.lcb
 样品瓶号: 1-53
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/17 17:08:12 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2): 2025/12/18 09:02:59 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.225	87013	100.000	14165	3032	1.048	--
总计		87013	100.000	14165			

图190 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025051321批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-浆法-50转-90min-片6
 供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 35°C 波长: 259nm
 数据文件名:
 RC\$QTL-4125 - 0-89/25-1448-2 - zzp-2025051321p-rcqx-1-zj6y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-p1-120min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20251217-rc-FX274.lcb
 样品瓶号: 3-1
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/17 17:11:36 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2): 2025/12/18 09:03:02 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.225	86275	100.000	14008	3023	1.051	--
总计		86275	100.000	14008			

图191 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025051321批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转-120min-片1
 供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 35°C 波长: 259nm
 数据文件名:
 RC\$QTL-4125 - 0-89/25-1449-2 - zzp-2025051321p-rcqx-1-zj6y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-p2-120min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20251217-rc-FX274.lcb
 样品瓶号: 3-10
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/17 17:14:58 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2): 2025/12/18 09:03:06 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.225	89825	100.000	14567	3031	1.050	--
总计		89825	100.000	14567			

图192 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025051321批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转-120min-片2
 供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 35°C 波长: 259nm
 数据文件名:
 RC\$QTL-4125 - 0-89/25-1450-2 - zzp-2025051321p-rcqx-1-zj6y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-p3-120min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20251217-rc-FX274.lcb
 样品瓶号: 3-19
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/17 17:18:22 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2): 2025/12/18 09:03:09 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.225	86703	100.000	14047	3027	1.049	--
总计		86703	100.000	14047			

图193 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025051321批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转-120min-片3
 供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 35°C 波长: 259nm
 数据文件名:
 RC\$QTL-4125 - 0-89/25-1451-2 - zzp-2025051321p-rcqx-1-zj6y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-p4-120min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20251217-rc-FX274.lcb
 样品瓶号: 3-28
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/17 17:21:44 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2): 2025/12/18 09:03:12 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.226	89790	100.000	14533	3027	1.050	--
总计		89790	100.000	14533			

图194 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025051321批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转-120min-片4
 供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 35°C 波长: 259nm
 数据文件名:
 RC\$QTL-4125 - 0-89/25-1452-2 - zzp-2025051321p-rcqx-1-zj6y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-p5-120min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20251217-rc-FX274.lcb
 样品瓶号: 3-37
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/17 17:25:08 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2): 2025/12/18 09:03:15 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.225	91181	100.000	14802	3032	1.049	--
总计		91181	100.000	14802			

图195 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025051321批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转-120min-片5
 供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 35°C 波长: 259nm
 数据文件名:
 RC\$QTL-4125 - 0-89/25-1453-2 - zzp-2025051321p-rcqx-1-zj6y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-p6-120min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20251217-rc-FX274.lcb
 样品瓶号: 3-46
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/17 17:28:30 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2): 2025/12/18 09:03:18 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.225	85347	100.000	13847	3038	1.048	--
总计		85347	100.000	13847			

图196 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025051321批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转-120min-片6
 供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 35°C 波长: 259nm
 数据文件名:
 RC\$QTL-4125 - 0-89/25-1454-2 - zzp-2025051321p-rcqx-1-zj6y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-p1-jx.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20251217-rc-FX274.lcb
 样品瓶号: 3-2
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/17 17:31:52 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2): 2025/12/18 09:03:21 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.226	90054	100.000	14661	3044	1.052	--
总计		90054	100.000	14661			

图197 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025051321批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转-极限转速-
 片1
 供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 35°C 波长: 259nm
 数据文件名:
 RC\$QTL-4125 - 0-89/25-1455-2 - zzp-2025051321p-rcqx-1-zj6y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-p2-jx.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20251217-rc-FX274.lcb
 样品瓶号: 3-11
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/17 17:35:15 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2): 2025/12/18 09:03:24 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.225	89285	100.000	14517	3040	1.051	--
总计		89285	100.000	14517			

图198 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025051321批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转-极限转速-
 片2
 供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 35°C 波长: 259nm
 数据文件名:
 RC\$QTL-4125 - 0-89/25-1456-2 - zzp-2025051321p-rcqx-1-zj6y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-p3-jx.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20251217-rc-FX274.lcb
 样品瓶号: 3-20
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/17 17:38:37 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2): 2025/12/18 09:03:29 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.225	91689	100.000	14875	3027	1.050	--
总计		91689	100.000	14875			

图199 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025051321批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转-极限转速-
 片3
 供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 35°C 波长: 259nm
 数据文件名:
 RC\$QTL-4125 - 0-89/25-1457-2 - zzp-2025051321p-rcqx-1-zj6y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-p4-jx.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20251217-rc-FX274.lcb
 样品瓶号: 3-29
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/17 17:42:00 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2): 2025/12/18 09:03:33 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.224	90118	100.000	14686	3042	1.049	--
总计		90118	100.000	14686			




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 35°C 波长: 259nm
 数据文件名:
 RC\$QTL-4125 - 0-89/25-1459-2 - zzp-2025051321p-rcqx-1-zj6y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-p6-jx.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20251217-rc-FX274.lcb
 样品瓶号: 3-47
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/17 17:48:45 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2): 2025/12/18 09:03:39 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.225	90026	100.000	14648	3050	1.050	--
总计		90026	100.000	14648			




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 35°C 波长: 259nm
 数据文件名:
 RC\$QTL-4125 - 0-89/25-1460-2 - zzp-2025051321p-rcqx-1-zj6y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-dz2-1.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20251217-rc-FX274.lcb
 样品瓶号: 1-27
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/17 17:52:09 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2): 2025/12/18 09:03:42 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.220	98974	100.000	15753	2888	1.054	--
总计		98974	100.000	15753			

图203 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025051321批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-浆法-50转
 对照品溶液-2-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 35°C 波长: 259nm
 数据文件名:
 RC\$QTL-4125 - 0-89/25-1461-2 - zzp-2025051321p-rcqx-1-zj6y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-dz2-2.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20251217-rc-FX274.lcb
 样品瓶号: 1-27
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/17 17:55:32 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2): 2025/12/18 09:03:45 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.220	98750	100.000	15766	2893	1.053	--
总计		98750	100.000	15766			

图204 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025051321批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-浆法-50转
 对照品溶液-2-2




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 35°C 波长: 259nm
 数据文件名:
 RC\$QTL-4125 - 0-89/25-1462-2 - zzp-2025051321p-rcqx-2-zj6y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-rj.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20251217-rc-FX274.lcb
 样品瓶号: 2-9
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/17 17:58:57 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2): 2025/12/18 09:03:47 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图205 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025051321批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转
 溶剂




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 35°C 波长: 259nm
 数据文件名:
 RC\$QTL-4125 - 0-89/25-1463-2 - zzp-2025051321p-rcqx-2-zj6y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-dz1-1.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20251217-rc-FX274.lcb
 样品瓶号: 2-18
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/17 18:02:23 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2): 2025/12/18 09:03:50 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.221	98906	100.000	15783	2901	1.052	--
总计		98906	100.000	15783			

图206 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025051321批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-浆法-50转
 对照品溶液-1-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 35°C 波长: 259nm
 数据文件名:
 RC\$QTL-4125 - 0-89/25-1464-2 - zzp-2025051321p-rcqx-2-zj6y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-dz1-2.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20251217-rc-FX274.lcb
 样品瓶号: 2-18
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/17 18:05:48 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2): 2025/12/18 09:03:53 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.222	98719	100.000	15767	2900	1.054	--
总计		98719	100.000	15767			

图207 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025051321批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-浆法-50转
 对照品溶液-1-2




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 35°C 波长: 259nm
 数据文件名:
 RC\$QTL-4125 - 0-89/25-1465-2 - zzp-2025051321p-rcqx-2-zj6y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-dz1-3.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20251217-rc-FX274.lcb
 样品瓶号: 2-18
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/17 18:09:14 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2): 2025/12/18 09:03:56 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.222	98907	100.000	15780	2892	1.053	--
总计		98907	100.000	15780			

图208 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025051321批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-浆法-50转
 对照品溶液-1-3




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 35°C 波长: 259nm
 数据文件名:
 RC\$QTL-4125 - 0-89/25-1466-2 - zzp-2025051321p-rcqx-2-zj6y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-dz1-4.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20251217-rc-FX274.lcb
 样品瓶号: 2-18
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/17 18:12:39 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2): 2025/12/18 09:03:59 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.222	98740	100.000	15763	2896	1.052	--
总计		98740	100.000	15763			

图209 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025051321批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-浆法-50转
 对照品溶液-1-4




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 35°C 波长: 259nm
 数据文件名:
 RC\$QTL-4125 - 0-89/25-1467-2 - zzp-2025051321p-rcqx-2-zj6y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-dz1-5.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20251217-rc-FX274.lcb
 样品瓶号: 2-18
 进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/17 18:16:04 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2): 2025/12/18 09:04:02 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.222	98835	100.000	15765	2897	1.054	--
总计		98835	100.000	15765			

图210 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025051321批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-浆法-50转
 对照品溶液-1-5




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 35°C 波长: 259nm
 数据文件名:
 RC\$QTL-4125 - 0-89/25-1468-2 - zzp-2025051321p-rcqx-2-zj6y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-p1-5min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20251217-rc-FX274.lcb
 样品瓶号: 2-1
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/17 18:19:27 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2): 2025/12/18 09:04:04 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.227	36837	100.000	5974	3027	1.057	--
总计		36837	100.000	5974			

图211 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025051321批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转-5min-片1
 供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 35°C 波长: 259nm
 数据文件名:
 RC\$QTL-4125 - 0-89/25-1469-2 - zzp-2025051321p-rcqx-2-zj6y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-p2-5min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20251217-rc-FX274.lcb
 样品瓶号: 2-10
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/17 18:22:52 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2): 2025/12/18 09:04:07 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.227	18131	100.000	2968	3037	1.063	--
总计		18131	100.000	2968			

图212 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025051321批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转-5min-片2
 供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 35°C 波长: 259nm
 数据文件名:
 RC\$QTL-4125 - 0-89/25-1470-2 - zzp-2025051321p-rcqx-2-zj6y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-p3-5min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20251217-rc-FX274.lcb
 样品瓶号: 2-19
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/17 18:26:16 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2): 2025/12/18 09:04:10 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.226	36944	100.000	6000	3038	1.053	--
总计		36944	100.000	6000			

图213 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025051321批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转-5min-片3
 供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 35°C 波长: 259nm
 数据文件名:
 RC\$QTL-4125 - 0-89/25-1471-2 - zzp-2025051321p-rcqx-2-zj6y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-p4-5min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20251217-rc-FX274.lcb
 样品瓶号: 2-28
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/17 18:29:39 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2): 2025/12/18 09:04:13 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.226	43796	100.000	7088	3032	1.042	--
总计		43796	100.000	7088			

图214 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025051321批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转-5min-片4
 供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 35°C 波长: 259nm
 数据文件名:
 RC\$QTL-4125 - 0-89/25-1472-2 - zzp-2025051321p-rcqx-2-zj6y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-p5-5min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20251217-rc-FX274.lcb
 样品瓶号: 2-37
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/17 18:33:03 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2): 2025/12/18 09:04:16 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.226	37417	100.000	6084	3030	1.058	--
总计		37417	100.000	6084			

图215 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025051321批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转-5min-片5
 供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 35°C 波长: 259nm
 数据文件名:
 RC\$QTL-4125 - 0-89/25-1473-2 - zzp-2025051321p-rcqx-2-zj6y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-p6-5min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20251217-rc-FX274.lcb
 样品瓶号: 2-46
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/17 18:36:26 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2): 2025/12/18 09:04:18 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.225	39533	100.000	6413	3028	1.057	--
总计		39533	100.000	6413			

图216 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025051321批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转-5min-片6
 供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 35°C 波长: 259nm
 数据文件名:
 RC\$QTL-4125 - 0-89/25-1474-2 - zzp-2025051321p-rcqx-2-zj6y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-p1-10min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20251217-rc-FX274.lcb
 样品瓶号: 2-2
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/17 18:39:50 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2): 2025/12/18 09:04:21 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.225	62518	100.000	10132	3038	1.050	--
总计		62518	100.000	10132			

图217 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025051321批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-浆法-50转-10min-片1
 供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 35°C 波长: 259nm
 数据文件名:
 RC\$QTL-4125 - 0-89/25-1476-2 - zzp-2025051321p-rcqx-2-zj6y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-p3-10min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20251217-rc-FX274.lcb
 样品瓶号: 2-20
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/17 18:46:40 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2): 2025/12/18 09:04:27 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.225	63722	100.000	10370	3042	1.052	--
总计		63722	100.000	10370			

图219 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025051321批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-浆法-50转-10min-片3
 供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 35°C 波长: 259nm
 数据文件名:
 RC\$QTL-4125 - 0-89/25-1477-2 - zzp-2025051321p-rcqx-2-zj6y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-p4-10min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20251217-rc-FX274.lcb
 样品瓶号: 2-29
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/17 18:50:04 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2): 2025/12/18 09:04:30 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.225	71662	100.000	11628	3028	1.050	--
总计		71662	100.000	11628			

图220 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025051321批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-浆法-50转-10min-片4
 供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 35°C 波长: 259nm
 数据文件名:
 RC\$QTL-4125 - 0-89/25-1478-2 - zzp-2025051321p-rcqx-2-zj6y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-p5-10min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20251217-rc-FX274.lcb
 样品瓶号: 2-38
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/17 18:53:28 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2): 2025/12/18 09:04:33 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.226	62608	100.000	10156	3030	1.055	--
总计		62608	100.000	10156			

图221 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025051321批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-浆法-50转-10min-片5
 供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 35°C 波长: 259nm
 数据文件名:
 RC\$QTL-4125 - 0-89/25-1479-2 - zzp-2025051321p-rcqx-2-zj6y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-p6-10min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20251217-rc-FX274.lcb
 样品瓶号: 2-47
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/17 18:56:52 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2): 2025/12/18 09:04:36 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.225	64702	100.000	10515	3037	1.049	--
总计		64702	100.000	10515			

图222 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025051321批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-浆法-50转-10min-片6
 供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 35°C 波长: 259nm
 数据文件名:
 RC\$QTL-4125 - 0-89/25-1480-2 - zzp-2025051321p-rcqx-2-zj6y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-p1-15min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20251217-rc-FX274.lcb
 样品瓶号: 2-3
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/17 19:00:17 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2): 2025/12/18 09:04:39 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.225	73186	100.000	11915	3038	1.047	--
总计		73186	100.000	11915			

图223 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025051321批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-浆法-50转-15min-片1
 供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 35°C 波长: 259nm
 数据文件名:
 RC\$QTL-4125 - 0-89/25-1481-2 - zzp-2025051321p-rcqx-2-zj6y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-p2-15min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20251217-rc-FX274.lcb
 样品瓶号: 2-12
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/17 19:03:41 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2): 2025/12/18 09:04:41 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.225	62686	100.000	10173	3033	1.053	--
总计		62686	100.000	10173			

图224 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025051321批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-浆法-50转-15min-片2
 供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 35°C 波长: 259nm
 数据文件名:
 RC\$QTL-4125 - 0-89/25-1482-2 - zzp-2025051321p-rcqx-2-zj6y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-p3-15min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20251217-rc-FX274.lcb
 样品瓶号: 2-21
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/17 19:07:05 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2): 2025/12/18 09:04:44 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.225	78516	100.000	12762	3042	1.051	--
总计		78516	100.000	12762			

图225 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025051321批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-浆法-50转-15min-片3
 供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 35°C 波长: 259nm
 数据文件名:
 RC\$QTL-4125 - 0-89/25-1483-2 - zzp-2025051321p-rcqx-2-zj6y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-p4-15min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20251217-rc-FX274.lcb
 样品瓶号: 2-30
 进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/17 19:10:30 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2): 2025/12/18 09:04:47 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.225	84034	100.000	13672	3051	1.047	--
总计		84034	100.000	13672			

图226 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025051321批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-浆法-50转-15min-片4
 供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 35°C 波长: 259nm
 数据文件名:
 RC\$QTL-4125 - 0-89/25-1484-2 - zzp-2025051321p-rcqx-2-zj6y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-p5-15min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20251217-rc-FX274.lcb
 样品瓶号: 2-39
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/17 19:13:54 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2): 2025/12/18 09:04:50 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.225	77368	100.000	12604	3052	1.052	--
总计		77368	100.000	12604			

图227 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025051321批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-浆法-50转-15min-片5
 供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 35°C 波长: 259nm
 数据文件名:
 RC\$QTL-4125 - 0-89/25-1486-2 - zzp-2025051321p-rcqx-2-zj6y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-p1-20min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20251217-rc-FX274.lcb
 样品瓶号: 2-4
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/17 19:20:42 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2): 2025/12/18 09:04:56 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.225	79858	100.000	13023	3053	1.051	--
总计		79858	100.000	13023			

图229 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025051321批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-浆法-50转-20min-片1
 供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 35°C 波长: 259nm
 数据文件名:
 RC\$QTL-4125 - 0-89/25-1487-2 - zzp-2025051321p-rcqx-2-zj6y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-p2-20min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20251217-rc-FX274.lcb
 样品瓶号: 2-13
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/17 19:24:06 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2): 2025/12/18 09:04:59 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.225	72550	100.000	11832	3050	1.047	--
总计		72550	100.000	11832			

图230 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025051321批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-浆法-50转-20min-片2
 供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 35°C 波长: 259nm
 数据文件名:
 RC\$QTL-4125 - 0-89/25-1488-2 - zzp-2025051321p-rcqx-2-zj6y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-p3-20min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20251217-rc-FX274.lcb
 样品瓶号: 2-22
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/17 19:27:31 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2): 2025/12/18 09:05:02 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.224	83396	100.000	13605	3053	1.049	--
总计		83396	100.000	13605			

图231 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025051321批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-浆法-50转-20min-片3
 供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 35°C 波长: 259nm
 数据文件名:
 RC\$QTL-4125 - 0-89/25-1489-2 - zzp-2025051321p-rcqx-2-zj6y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-p4-20min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20251217-rc-FX274.lcb
 样品瓶号: 2-31
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/17 19:30:56 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2): 2025/12/18 09:05:05 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.224	85893	100.000	14018	3052	1.050	--
总计		85893	100.000	14018			

图232 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025051321批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-浆法-50转-20min-片4
 供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 35°C 波长: 259nm
 数据文件名:
 RC\$QTL-4125 - 0-89/25-1490-2 - zzp-2025051321p-rcqx-2-zj6y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-p5-20min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20251217-rc-FX274.lcb
 样品瓶号: 2-40
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/17 19:34:19 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2): 2025/12/18 09:05:08 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.225	80789	100.000	13148	3056	1.050	--
总计		80789	100.000	13148			

图233 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025051321批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-浆法-50转-20min-片5
 供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5µm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 35°C 波长: 259nm
 数据文件名:
 RC\$QTL-4125 - 0-89/25-1491-2 - zzp-2025051321p-rcqx-2-zj6y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-p6-20min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20251217-rc-FX274.lcb
 样品瓶号: 2-49
 进样体积: 20 µl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/17 19:37:44 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2): 2025/12/18 09:05:11 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.225	77341	100.000	12554	3036	1.050	--
总计		77341	100.000	12554			

图234 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025051321批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-浆法-50转-20min-片6
 供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 35°C 波长: 259nm
 数据文件名:
 RC\$QTL-4125 - 0-89/25-1492-2 - zzp-2025051321p-rcqx-2-zj6y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-p1-30min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20251217-rc-FX274.lcb
 样品瓶号: 2-5
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/17 19:41:08 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2): 2025/12/18 09:05:13 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.226	83522	100.000	13616	3069	1.049	--
总计		83522	100.000	13616			

图235 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025051321批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-浆法-50转-30min-片1
 供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 35°C 波长: 259nm
 数据文件名:
 RC\$QTL-4125 - 0-89/25-1493-2 - zzp-2025051321p-rcqx-2-zj6y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-p2-30min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20251217-rc-FX274.lcb
 样品瓶号: 2-14
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/17 19:44:33 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2): 2025/12/18 09:05:16 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.225	83334	100.000	13574	3053	1.050	--
总计		83334	100.000	13574			

图236 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025051321批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-浆法-50转-30min-片2
 供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 35°C 波长: 259nm
 数据文件名:
 RC\$QTL-4125 - 0-89/25-1494-2 - zzp-2025051321p-rcqx-2-zj6y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-p3-30min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20251217-rc-FX274.lcb
 样品瓶号: 2-23
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/17 19:47:57 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2): 2025/12/18 09:05:19 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.225	88821	100.000	14455	3046	1.047	--
总计		88821	100.000	14455			

图237 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025051321批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-浆法-50转-30min-片3
 供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 35°C 波长: 259nm
 数据文件名:
 RC\$QTL-4125 - 0-89/25-1495-2 - zzp-2025051321p-rcqx-2-zj6y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-p4-30min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20251217-rc-FX274.lcb
 样品瓶号: 2-32
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/17 19:51:21 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2): 2025/12/18 09:05:22 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.225	88904	100.000	14500	3053	1.047	--
总计		88904	100.000	14500			

图238 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025051321批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-浆法-50转-30min-片4
 供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 35°C 波长: 259nm
 数据文件名:
 RC\$QTL-4125 - 0-89/25-1496-2 - zzp-2025051321p-rcqx-2-zj6y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-p5-30min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20251217-rc-FX274.lcb
 样品瓶号: 2-41
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/17 19:54:47 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2): 2025/12/18 09:05:25 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.225	87678	100.000	14268	3038	1.049	--
总计		87678	100.000	14268			

图239 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025051321批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-浆法-50转-30min-片5
 供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 35°C 波长: 259nm
 数据文件名:
 RC\$QTL-4125 - 0-89/25-1497-2 - zzp-2025051321p-rcqx-2-zj6y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-p6-30min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20251217-rc-FX274.lcb
 样品瓶号: 2-50
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/17 19:58:10 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2): 2025/12/18 09:05:28 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.225	87546	100.000	14262	3050	1.051	--
总计		87546	100.000	14262			

图240 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025051321批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-浆法-50转-30min-片6
 供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 35°C 波长: 259nm
 数据文件名:
 RC\$QTL-4125 - 0-89/25-1498-2 - zzp-2025051321p-rcqx-2-zj6y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-p1-45min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20251217-rc-FX274.lcb
 样品瓶号: 2-6
 进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/17 20:01:35 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2): 2025/12/18 09:05:31 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.225	85298	100.000	13901	3053	1.050	--
总计		85298	100.000	13901			

图241 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025051321批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-浆法-50转-45min-片1
 供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 35°C 波长: 259nm
 数据文件名:
 RC\$QTL-4125 - 0-89/25-1499-2 - zzp-2025051321p-rcqx-2-zj6y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-p2-45min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20251217-rc-FX274.lcb
 样品瓶号: 2-15
 进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/17 20:05:00 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2): 2025/12/18 09:05:34 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.225	87783	100.000	14291	3044	1.051	--
总计		87783	100.000	14291			

图242 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025051321批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-浆法-50转-45min-片2
 供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 35°C 波长: 259nm
 数据文件名:
 RC\$QTL-4125 - 0-89/25-1500-2 - zzp-2025051321p-rcqx-2-zj6y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-p3-45min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20251217-rc-FX274.lcb
 样品瓶号: 2-24
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/17 20:08:24 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2): 2025/12/18 09:05:36 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.225	87388	100.000	14242	3050	1.052	--
总计		87388	100.000	14242			

图243 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025051321批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-浆法-50转-45min-片3
 供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 35°C 波长: 259nm
 数据文件名:
 RC\$QTL-4125 - 0-89/25-1502-2 - zzp-2025051321p-rcqx-2-zj6y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-p5-45min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20251217-rc-FX274.lcb
 样品瓶号: 2-42
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/17 20:15:13 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2): 2025/12/18 09:05:42 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.225	90698	100.000	14765	3047	1.050	--
总计		90698	100.000	14765			

图245 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025051321批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-浆法-50转-45min-片5
 供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 35°C 波长: 259nm
 数据文件名:
 RC\$QTL-4125 - 0-89/25-1504-2 - zzp-2025051321p-rcqx-2-zj6y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-p1-60min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20251217-rc-FX274.lcb
 样品瓶号: 2-7
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/17 20:22:02 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2): 2025/12/18 09:05:48 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.225	88437	100.000	14388	3054	1.050	--
总计		88437	100.000	14388			

图247 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025051321批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-浆法-50转-60min-片1
 供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 35°C 波长: 259nm
 数据文件名:
 RC\$QTL-4125 - 0-89/25-1505-2 - zzp-2025051321p-rcqx-2-zj6y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-p2-60min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20251217-rc-FX274.lcb
 样品瓶号: 2-16
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/17 20:25:27 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2): 2025/12/18 09:05:50 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.225	89362	100.000	14560	3054	1.048	--
总计		89362	100.000	14560			

图248 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025051321批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-浆法-50转-60min-片2
 供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 35°C 波长: 259nm
 数据文件名:
 RC\$QTL-4125 - 0-89/25-1507-2 - zzp-2025051321p-rcqx-2-zj6y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-p4-60min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20251217-rc-FX274.lcb
 样品瓶号: 2-34
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/17 20:32:16 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2): 2025/12/18 09:05:56 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.225	89461	100.000	14564	3056	1.047	--
总计		89461	100.000	14564			

图250 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025051321批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-浆法-50转-60min-片4
 供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 35°C 波长: 259nm
 数据文件名:
 RC\$QTL-4125 - 0-89/25-1508-2 - zzp-2025051321p-rcqx-2-zj6y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-p5-60min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20251217-rc-FX274.lcb
 样品瓶号: 2-43
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/17 20:35:41 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2): 2025/12/18 09:05:58 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.225	88963	100.000	14475	3036	1.049	--
总计		88963	100.000	14475			

图251 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025051321批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-浆法-50转-60min-片5
 供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 35°C 波长: 259nm
 数据文件名:
 RC\$QTL-4125 - 0-89/25-1509-2 - zzp-2025051321p-rcqx-2-zj6y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-p6-60min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20251217-rc-FX274.lcb
 样品瓶号: 2-52
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/17 20:39:07 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2): 2025/12/18 09:06:01 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.225	87742	100.000	14311	3056	1.049	--
总计		87742	100.000	14311			

图252 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025051321批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-浆法-50转-60min-片6
 供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 35°C 波长: 259nm
 数据文件名:
 RC\$QTL-4125 - 0-89/25-1512-2 - zzp-2025051321p-rcqx-2-zj6y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-p3-90min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20251217-rc-FX274.lcb
 样品瓶号: 2-26
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/17 20:49:22 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2): 2025/12/18 09:06:09 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.226	87474	100.000	14256	3060	1.050	--
总计		87474	100.000	14256			

图255 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025051321批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-浆法-50转-90min-片3
 供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 35°C 波长: 259nm
 数据文件名:
 RC\$QTL-4125 - 0-89/25-1513-2 - zzp-2025051321p-rcqx-2-zj6y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-p4-90min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20251217-rc-FX274.lcb
 样品瓶号: 2-35
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/17 20:52:46 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2): 2025/12/18 09:06:12 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.225	89574	100.000	14601	3051	1.049	--
总计		89574	100.000	14601			

图256 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025051321批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-浆法-50转-90min-片4
 供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 35°C 波长: 259nm
 数据文件名:
 RC\$QTL-4125 - 0-89/25-1515-2 - zzp-2025051321p-rcqx-2-zj6y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-p6-90min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20251217-rc-FX274.lcb
 样品瓶号: 2-53
 进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/17 20:59:37 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2): 2025/12/18 09:06:18 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.225	89231	100.000	14565	3059	1.050	--
总计		89231	100.000	14565			

图258 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025051321批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-浆法-50转-90min-片6
 供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 35°C 波长: 259nm
 数据文件名:
 RC\$QTL-4125 - 0-89/25-1516-2 - zzp-2025051321p-rcqx-2-zj6y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-p1-120min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20251217-rc-FX274.lcb
 样品瓶号: 3-3
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/17 21:03:00 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2): 2025/12/18 09:06:21 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.226	87324	100.000	14234	3067	1.050	--
总计		87324	100.000	14234			

图259 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025051321批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转-120min-片1
 供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 35°C 波长: 259nm
 数据文件名:
 RC\$QTL-4125 - 0-89/25-1517-2 - zzp-2025051321p-rcqx-2-zj6y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-p2-120min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20251217-rc-FX274.lcb
 样品瓶号: 3-12
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/17 21:06:22 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2): 2025/12/18 09:06:23 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.225	88608	100.000	14437	3060	1.051	--
总计		88608	100.000	14437			

图260 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025051321批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转-120min-片2
 供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 35°C 波长: 259nm
 数据文件名:
 RC\$QTL-4125 - 0-89/25-1518-2 - zzp-2025051321p-rcqx-2-zj6y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-p3-120min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20251217-rc-FX274.lcb
 样品瓶号: 3-21
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/17 21:09:44 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2): 2025/12/18 09:06:26 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.225	86538	100.000	14084	3048	1.048	--
总计		86538	100.000	14084			

图261 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025051321批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转-120min-片3
 供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 35°C 波长: 259nm
 数据文件名:
 RC\$QTL-4125 - 0-89/25-1519-2 - zzp-2025051321p-rcqx-2-zj6y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-p4-120min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20251217-rc-FX274.lcb
 样品瓶号: 3-30
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/17 21:13:07 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2): 2025/12/18 09:06:29 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.225	88585	100.000	14388	3048	1.048	--
总计		88585	100.000	14388			

图262 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025051321批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转-120min-片4
 供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 35°C 波长: 259nm
 数据文件名:
 RC\$QTL-4125 - 0-89/25-1520-2 - zzp-2025051321p-rcqx-2-zj6y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-p5-120min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20251217-rc-FX274.lcb
 样品瓶号: 3-39
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/17 21:16:31 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2): 2025/12/18 09:06:32 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.225	90787	100.000	14795	3058	1.052	--
总计		90787	100.000	14795			

图263 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025051321批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转-120min-片5
 供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 35°C 波长: 259nm
 数据文件名:
 RC\$QTL-4125 - 0-89/25-1521-2 - zzp-2025051321p-rcqx-2-zj6y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-p6-120min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20251217-rc-FX274.lcb
 样品瓶号: 3-48
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/17 21:19:53 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2): 2025/12/18 09:06:35 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.225	87443	100.000	14210	3045	1.051	--
总计		87443	100.000	14210			

图264 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025051321批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转-120min-片6
 供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 35°C 波长: 259nm
 数据文件名:
 RC\$QTL-4125 - 0-89/25-1522-2 - zzp-2025051321p-rcqx-2-zj6y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-p1-jx.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20251217-rc-FX274.lcb
 样品瓶号: 3-4
 进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/17 21:23:16 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2): 2025/12/18 09:06:38 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.225	89417	100.000	14593	3064	1.047	--
总计		89417	100.000	14593			




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 35°C 波长: 259nm
 数据文件名:
 RC\$QTL-4125 - 0-89/25-1523-2 - zzp-2025051321p-rcqx-2-zj6y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-p2-jx.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20251217-rc-FX274.lcb
 样品瓶号: 3-13
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/17 21:26:38 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2): 2025/12/18 09:06:41 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.225	90484	100.000	14768	3064	1.049	--
总计		90484	100.000	14768			

图266 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025051321批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转-极限转速-片2
 供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 35°C 波长: 259nm
 数据文件名:
 RC\$QTL-4125 - 0-89/25-1524-2 - zzp-2025051321p-rcqx-2-zj6y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-p3-jx.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20251217-rc-FX274.lcb
 样品瓶号: 3-22
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/17 21:30:01 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2): 2025/12/18 09:06:44 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.225	89535	100.000	14607	3069	1.047	--
总计		89535	100.000	14607			

图267 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025051321批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转-极限转速-片3
 供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 35°C 波长: 259nm
 数据文件名:
 RC\$QTL-4125 - 0-89/25-1525-2 - zzp-2025051321p-rcqx-2-zj6y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-p4-jx.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20251217-rc-FX274.lcb
 样品瓶号: 3-31
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/17 21:33:24 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2): 2025/12/18 09:06:47 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.225	89561	100.000	14565	3059	1.053	--
总计		89561	100.000	14565			




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 35°C 波长: 259nm
 数据文件名:
 RC\$QTL-4125 - 0-89/25-1526-2 - zzp-2025051321p-rcqx-2-zj6y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-p5-jx.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20251217-rc-FX274.lcb
 样品瓶号: 3-40
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/17 21:36:47 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2): 2025/12/18 09:06:50 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.225	89849	100.000	14628	3053	1.051	--
总计		89849	100.000	14628			

图269 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025051321批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转-极限转速-
 片5
 供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 35°C 波长: 259nm
 数据文件名:
 RC\$QTL-4125 - 0-89/25-1527-2 - zzp-2025051321p-rcqx-2-zj6y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-p6-jx.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20251217-rc-FX274.lcb
 样品瓶号: 3-49
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/17 21:40:09 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2): 2025/12/18 09:06:52 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.225	90992	100.000	14855	3067	1.048	--
总计		90992	100.000	14855			

图270 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025051321批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转-极限转速-
 片6
 供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 35°C 波长: 259nm
 数据文件名:
 RC\$QTL-4125 - 0-89/25-1528-2 - zzp-2025051321p-rcqx-2-zj6y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-dz2-1.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20251217-rc-FX274.lcb
 样品瓶号: 2-27
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/17 21:43:35 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2): 2025/12/18 09:06:55 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.221	98888	100.000	15821	2911	1.052	--
总计		98888	100.000	15821			

图271 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025051321批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-浆法-50转
 对照品溶液-2-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 35°C 波长: 259nm
 数据文件名:
 RC\$QTL-4125 - 0-89/25-1529-2 - zzp-2025051321p-rcqx-2-zj6y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-dz2-2.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20251217-rc-FX274.lcb
 样品瓶号: 2-27
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/17 21:46:59 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2): 2025/12/18 09:06:58 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.221	99041	100.000	15857	2919	1.051	--
总计		99041	100.000	15857			

图272 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025051321批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转
 对照品溶液-2-2