


<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm*4.6mm,5µm) 流速:1.8ml/min
 柱温 : 40°C 波长:250nm
 数据文件名: RC\$SMF-4099 - 0-81/26-2332-2 - zzp-js3y-red-rj.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4099 - SMF-4099-RCQX-FX275.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4099 - 20251224-rc-FX275.lcb
 样品瓶号: 1-9
 进样体积: 10 µl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/24 11:03:36 实验者: wangdan
 处理时间 (V2) : 2025/12/25 10:00:33 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 250nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图1 非奈利酮片溶出度测定加速3月HPLC图谱
 自制品--含0.1%吐温20的醋酸-醋酸盐溶液 (pH4.5) 介质介质
 溶剂

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.8ml/min
 柱温 : 40 $^{\circ}$ C 波长:250nm
 数据文件名: RC\$SMF-4099 - 0-81/26-2333-2 - zzp-js3y-red-dz1-1.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4099 - SMF-4099-RCQX-FX275.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4099 - 20251224-rc-FX275.lcb
 样品瓶号: 1-18
 进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/24 11:06:59 实验者: wangdan
 处理时间 (V2) : 2025/12/25 10:00:38 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 250nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.280	368347	100.000	83635	6229	1.071	--
总计		368347	100.000	83635			

图2 非奈利酮片溶出度测定加速3月HPLC图谱
 自制品--含0.1%吐温20的醋酸-醋酸盐溶液 (pH4.5) 介质介质
 对照品溶液-1-1

〈样品信息〉

色谱柱 : XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.8ml/min
 柱温 : 40°C 波长:250nm
 数据文件名: RC\$SMF-4099 - 0-81/26-2334-2 - zzp-js3y-red-dz1-2.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4099 - SMF-4099-RCQX-FX275.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4099 - 20251224-rc-FX275.lcb
 样品瓶号: 1-18
 进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/24 11:10:21 实验者: wangdan
 处理时间 (V2) : 2025/12/25 10:00:41 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 250nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.280	368208	100.000	83668	6234	1.071	--
总计		368208	100.000	83668			

图3 非奈利酮片溶出度测定加速3月HPLC图谱
 自制品--含0.1%吐温20的醋酸-醋酸盐溶液 (pH4.5) 介质介质
 对照品溶液-1-2

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.8ml/min
 柱温 : 40 $^{\circ}$ C 波长:250nm
 数据文件名: RC\$SMF-4099 - 0-81/26-2335-2 - zzp-js3y-red-dz1-3.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4099 - SMF-4099-RCQX-FX275.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4099 - 20251224-rc-FX275.lcb
 样品瓶号: 1-18
 进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/24 11:13:44 实验者: wangdan
 处理时间 (V2) : 2025/12/25 10:00:45 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 250nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.280	368415	100.000	83787	6243	1.071	--
总计		368415	100.000	83787			

图4 非奈利酮片溶出度测定加速3月HPLC图谱
 自制品--含0.1%吐温20的醋酸-醋酸盐溶液 (pH4.5) 介质介质
 对照品溶液-1-3

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.8ml/min
 柱温 : 40 $^{\circ}$ C 波长:250nm
 数据文件名: RC\$SMF-4099 - 0-81/26-2336-2 - zzp-js3y-red-dz1-4.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4099 - SMF-4099-RCQX-FX275.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4099 - 20251224-rc-FX275.lcb
 样品瓶号: 1-18
 进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/24 11:17:08 实验者: wangdan
 处理时间 (V2) : 2025/12/25 10:00:48 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 250nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.280	368481	100.000	83815	6249	1.071	--
总计		368481	100.000	83815			

图5 非奈利酮片溶出度测定加速3月HPLC图谱
 自制品--含0.1%吐温20的醋酸-醋酸盐溶液 (pH4.5) 介质介质
 对照品溶液-1-4

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.8ml/min
 柱温 : 40 $^{\circ}$ C 波长:250nm
 数据文件名: RC\$SMF-4099 - 0-81/26-2337-2 - zzp-js3y-red-dz1-5.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4099 - SMF-4099-RCQX-FX275.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4099 - 20251224-rc-FX275.lcb
 样品瓶号: 1-18
 进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/24 11:20:31 实验者: wangdan
 处理时间 (V2) : 2025/12/25 10:00:51 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 250nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.280	367481	100.000	83676	6264	1.071	--
总计		367481	100.000	83676			

图6 非奈利酮片溶出度测定加速3月HPLC图谱
 自制品--含0.1%吐温20的醋酸-醋酸盐溶液 (pH4.5) 介质介质
 对照品溶液-1-5

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.8ml/min
 柱温 : 40 $^{\circ}$ C 波长:250nm
 数据文件名: RC\$SMF-4099 - 0-81/26-2338-2 - zzp-2025082921p-js3y-rcd-P1-1.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4099 - SMF-4099-RCQX-FX275.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4099 - 20251224-rc-FX275.lcb
 样品瓶号: 1-1
 进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/24 11:23:53 实验者: wangdan
 处理时间 (V2) : 2025/12/25 10:00:54 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 250nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.282	330453	100.000	75610	6342	1.070	--
总计		330453	100.000	75610			

图7 非奈利酮片溶出度测定加速3月HPLC图谱
 自制品(2025082921批)--含0.1%吐温20的醋酸-
 醋酸盐溶液 (pH4.5) 介质介质-片1
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速:1.8ml/min
 柱温 : 40°C 波长:250nm
 数据文件名: RC\$SMF-4099 - 0-81/26-2339-2 - zzp-2025082921p-js3y-rcd-P1-2.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4099 - SMF-4099-RCQX-FX275.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4099 - 20251224-rc-FX275.lcb
 样品瓶号: 1-1
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/24 11:27:14 实验者: wangdan
 处理时间 (V2) : 2025/12/25 10:00:57 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.282	330393	100.000	75598	6354	1.070	--
总计		330393	100.000	75598			

图8 非奈利酮片溶出度测定加速3月HPLC图谱
 自制品(2025082921批)--含0.1%吐温20的醋酸-
 醋酸盐溶液 (pH4.5) 介质介质-片1
 供试品溶液-2




SMF-4099

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速:1.8ml/min
 柱温 : 40°C 波长:250nm
 数据文件名: RC\$SMF-4099 - 0-81/26-2340-2 - zzp-2025082921p-js3y-rcd-P2-1.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4099 - SMF-4099-RCQX-FX275.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4099 - 20251224-rc-FX275.lcb
 样品瓶号: 1-10
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/24 11:30:36 实验者: wangdan
 处理时间 (V2) : 2025/12/25 10:01:00 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 250nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.282	337670	100.000	77288	6360	1.070	--
总计		337670	100.000	77288			

图9 非奈利酮片溶出度测定加速3月HPLC图谱
 自制品(2025082921批)--含0.1%吐温20的醋酸-
 醋酸盐溶液 (pH4.5) 介质介质-片2
 供试品溶液-1

〈样品信息〉

色谱柱 : XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.8ml/min
 柱温 : 40°C 波长:250nm
 数据文件名: RC\$SMF-4099 - 0-81/26-2341-2 - zzp-2025082921p-js3y-rcd-P2-2.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4099 - SMF-4099-RCQX-FX275.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4099 - 20251224-rc-FX275.lcb
 样品瓶号: 1-10
 进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/24 11:33:57 实验者: wangdan
 处理时间 (V2) : 2025/12/25 10:01:03 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 250nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.281	337901	100.000	77454	6358	1.069	--
总计		337901	100.000	77454			

图10 非奈利酮片溶出度测定加速3月HPLC图谱
 自制品(2025082921批)--含0.1%吐温20的醋酸-
 醋酸盐溶液 (pH4.5) 介质介质-片2
 供试品溶液-2

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速:1.8ml/min
 柱温 : 40°C 波长:250nm
 数据文件名: RC\$SMF-4099 - 0-81/26-2342-2 - zzp-2025082921p-js3y-rcd-P3-1.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4099 - SMF-4099-RCQX-FX275.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4099 - 20251224-rc-FX275.lcb
 样品瓶号: 1-19
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/24 11:37:19 实验者: wangdan
 处理时间 (V2) : 2025/12/25 10:01:07 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 250nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.281	333720	100.000	76549	6367	1.069	--
总计		333720	100.000	76549			

图11 非奈利酮片溶出度测定加速3月HPLC图谱
 自制品(2025082921批)--含0.1%吐温20的醋酸-
 醋酸盐溶液 (pH4.5) 介质介质-片3
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.8ml/min
 柱温 : 40 $^{\circ}$ C 波长:250nm
 数据文件名: RC\$SMF-4099 - 0-81/26-2343-2 - zzp-2025082921p-js3y-rcd-P3-2.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4099 - SMF-4099-RCQX-FX275.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4099 - 20251224-rc-FX275.lcb
 样品瓶号: 1-19
 进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/24 11:40:41 实验者: wangdan
 处理时间 (V2) : 2025/12/25 10:01:10 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 250nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.281	333709	100.000	76550	6365	1.069	--
总计		333709	100.000	76550			

图12 非奈利酮片溶出度测定加速3月HPLC图谱
 自制品(2025082921批)--含0.1%吐温20的醋酸-
 醋酸盐溶液 (pH4.5) 介质介质-片3
 供试品溶液-2

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.8ml/min
 柱温 : 40 $^{\circ}$ C 波长:250nm
 数据文件名: RC\$SMF-4099 - 0-81/26-2344-2 - zzp-2025082921p-js3y-rcd-P4-1.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4099 - SMF-4099-RCQX-FX275.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4099 - 20251224-rc-FX275.lcb
 样品瓶号: 1-28
 进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/24 11:44:02 实验者: wangdan
 处理时间 (V2) : 2025/12/25 10:01:12 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 250nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.281	331800	100.000	76131	6370	1.069	--
总计		331800	100.000	76131			

图13 非奈利酮片溶出度测定加速3月HPLC图谱
 自制品(2025082921批)--含0.1%吐温20的醋酸-
 醋酸盐溶液 (pH4.5) 介质介质-片4
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.8ml/min
 柱温 : 40 $^{\circ}$ C 波长:250nm
 数据文件名: RC\$SMF-4099 - 0-81/26-2345-2 - zzp-2025082921p-js3y-rcd-P4-2.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4099 - SMF-4099-RCQX-FX275.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4099 - 20251224-rc-FX275.lcb
 样品瓶号: 1-28
 进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/24 11:47:24 实验者: wangdan
 处理时间 (V2) : 2025/12/25 10:01:15 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 250nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.281	331806	100.000	76147	6370	1.069	--
总计		331806	100.000	76147			

图14 非奈利酮片溶出度测定加速3月HPLC图谱
 自制品(2025082921批)--含0.1%吐温20的醋酸-
 醋酸盐溶液 (pH4.5) 介质介质-片4
 供试品溶液-2

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.8ml/min
 柱温 : 40 $^{\circ}$ C 波长:250nm
 数据文件名: RC\$SMF-4099 - 0-81/26-2346-2 - zzp-2025082921p-js3y-rcd-P5-1.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4099 - SMF-4099-RCQX-FX275.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4099 - 20251224-rc-FX275.lcb
 样品瓶号: 1-37
 进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/24 11:50:45 实验者: wangdan
 处理时间 (V2) : 2025/12/25 10:01:19 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 250nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.281	336997	100.000	77328	6372	1.070	--
总计		336997	100.000	77328			

图15 非奈利酮片溶出度测定加速3月HPLC图谱
 自制品(2025082921批)--含0.1%吐温20的醋酸-
 醋酸盐溶液 (pH4.5) 介质-片5
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速:1.8ml/min
 柱温 : 40°C 波长:250nm
 数据文件名: RC\$SMF-4099 - 0-81/26-2347-2 - zzp-2025082921p-js3y-rcd-P5-2.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4099 - SMF-4099-RCQX-FX275.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4099 - 20251224-rc-FX275.lcb
 样品瓶号: 1-37
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/24 11:54:07 实验者: wangdan
 处理时间 (V2) : 2025/12/25 10:01:22 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 250nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.281	336854	100.000	77349	6378	1.069	--
总计		336854	100.000	77349			

图16 非奈利酮片溶出度测定加速3月HPLC图谱
 自制品(2025082921批)--含0.1%吐温20的醋酸-
 醋酸盐溶液 (pH4.5) 介质介质-片5
 供试品溶液-2

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.8ml/min
 柱温 : 40 $^{\circ}$ C 波长:250nm
 数据文件名: RC\$SMF-4099 - 0-81/26-2348-2 - zzp-2025082921p-js3y-rcd-P6-1.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4099 - SMF-4099-RCQX-FX275.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4099 - 20251224-rc-FX275.lcb
 样品瓶号: 1-46
 进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/24 11:57:28 实验者: wangdan
 处理时间 (V2) : 2025/12/25 10:01:25 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 250nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.281	342250	100.000	78604	6382	1.069	--
总计		342250	100.000	78604			

图17 非奈利酮片溶出度测定加速3月HPLC图谱
 自制品(2025082921批)--含0.1%吐温20的醋酸-
 醋酸盐溶液 (pH4.5) 介质介质-片6
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.8ml/min
 柱温 : 40 $^{\circ}$ C 波长:250nm
 数据文件名: RC\$SMF-4099 - 0-81/26-2349-2 - zzp-2025082921p-js3y-rcd-P6-2.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4099 - SMF-4099-RCQX-FX275.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4099 - 20251224-rc-FX275.lcb
 样品瓶号: 1-46
 进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/24 12:00:50 实验者: wangdan
 处理时间 (V2) : 2025/12/25 10:01:27 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 250nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.281	338868	100.000	77780	6375	1.069	--
总计		338868	100.000	77780			

图18 非奈利酮片溶出度测定加速3月HPLC图谱
 自制品(2025082921批)--含0.1%吐温20的醋酸-
 醋酸盐溶液 (pH4.5) 介质介质-片6
 供试品溶液-2

〈样品信息〉

色谱柱 : XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.8ml/min
 柱温 : 40°C 波长:250nm
 数据文件名: RC\$SMF-4099 - 0-81/26-2350-2 - zzp-2025083021p-js3y-rcd-P1-1.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4099 - SMF-4099-RCQX-FX275.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4099 - 20251224-rc-FX275.lcb
 样品瓶号: 1-2
 进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/24 12:04:11 实验者: wangdan
 处理时间 (V2) : 2025/12/25 10:01:30 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 250nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.282	347143	100.000	79478	6380	1.069	--
总计		347143	100.000	79478			

图19 非奈利酮片溶出度测定加速3月HPLC图谱
 自制品(2025083021批)--含0.1%吐温20的醋酸-
 醋酸盐溶液 (pH4.5) 介质介质-片1
 供试品溶液-1

〈样品信息〉

色谱柱 : XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.8ml/min
 柱温 : 40 $^{\circ}$ C 波长:250nm
 数据文件名: RC\$SMF-4099 - 0-81/26-2351-2 - zzp-2025083021p-js3y-rcd-P1-2.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4099 - SMF-4099-RCQX-FX275.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4099 - 20251224-rc-FX275.lcb
 样品瓶号: 1-2
 进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/24 12:07:33 实验者: wangdan
 处理时间 (V2) : 2025/12/25 10:01:33 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 250nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.281	346819	100.000	79590	6380	1.069	--
总计		346819	100.000	79590			

图20 非奈利酮片溶出度测定加速3月HPLC图谱
 自制品(2025083021批)--含0.1%吐温20的醋酸-
 醋酸盐溶液 (pH4.5) 介质-片1
 供试品溶液-2

〈样品信息〉

色谱柱 : XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.8ml/min
 柱温 : 40 $^{\circ}$ C 波长:250nm
 数据文件名: RC\$SMF-4099 - 0-81/26-2352-2 - zzp-2025083021p-js3y-rcd-P2-1.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4099 - SMF-4099-RCQX-FX275.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4099 - 20251224-rc-FX275.lcb
 样品瓶号: 1-11
 进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/24 12:10:55 实验者: wangdan
 处理时间 (V2) : 2025/12/25 10:01:37 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.282	345510	100.000	79247	6388	1.069	--
总计		345510	100.000	79247			

图21 非奈利酮片溶出度测定加速3月HPLC图谱
 自制品(2025083021批)--含0.1%吐温20的醋酸-
 醋酸盐溶液 (pH4.5) 介质-片2
 供试品溶液-1




SMF-4099

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速:1.8ml/min
 柱温 : 40°C 波长:250nm
 数据文件名: RC\$SMF-4099 - 0-81/26-2353-2 - zzp-2025083021p-js3y-rcd-P2-2.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4099 - SMF-4099-RCQX-FX275.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4099 - 20251224-rc-FX275.lcb
 样品瓶号: 1-11
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/24 12:14:17 实验者: wangdan
 处理时间 (V2) : 2025/12/25 10:01:40 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.282	345650	100.000	79252	6384	1.069	--
总计		345650	100.000	79252			

图22 非奈利酮片溶出度测定加速3月HPLC图谱
 自制品(2025083021批)--含0.1%吐温20的醋酸-
 醋酸盐溶液 (pH4.5) 介质介质-片2
 供试品溶液-2




SMF-4099

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速:1.8ml/min
 柱温 : 40°C 波长:250nm
 数据文件名: RC\$SMF-4099 - 0-81/26-2354-2 - zzp-2025083021p-js3y-rcd-P3-1.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4099 - SMF-4099-RCQX-FX275.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4099 - 20251224-rc-FX275.lcb
 样品瓶号: 1-20
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/24 12:17:39 实验者: wangdan
 处理时间 (V2) : 2025/12/25 10:01:43 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 250nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.281	345798	100.000	79454	6390	1.069	--
总计		345798	100.000	79454			

图23 非奈利酮片溶出度测定加速3月HPLC图谱
 自制品(2025083021批)--含0.1%吐温20的醋酸-
 醋酸盐溶液 (pH4.5) 介质介质-片3
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.8ml/min
 柱温 : 40 $^{\circ}$ C 波长:250nm
 数据文件名: RC\$SMF-4099 - 0-81/26-2355-2 - zzp-2025083021p-js3y-rcd-P3-2.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4099 - SMF-4099-RCQX-FX275.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4099 - 20251224-rc-FX275.lcb
 样品瓶号: 1-20
 进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/24 12:21:01 实验者: wangdan
 处理时间 (V2) : 2025/12/25 10:01:46 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.281	345772	100.000	79443	6383	1.068	--
总计		345772	100.000	79443			

图24 非奈利酮片溶出度测定加速3月HPLC图谱
 自制品(2025083021批)--含0.1%吐温20的醋酸-
 醋酸盐溶液 (pH4.5) 介质介质-片3
 供试品溶液-2




SMF-4099

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.8ml/min
 柱温 : 40 $^{\circ}$ C 波长:250nm
 数据文件名: RC\$SMF-4099 - 0-81/26-2356-2 - zzp-2025083021p-js3y-rcd-P4-1.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4099 - SMF-4099-RCQX-FX275.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4099 - 20251224-rc-FX275.lcb
 样品瓶号: 1-29
 进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/24 12:24:23 实验者: wangdan
 处理时间 (V2) : 2025/12/25 10:01:49 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 250nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.281	353516	100.000	81221	6388	1.069	--
总计		353516	100.000	81221			

图25 非奈利酮片溶出度测定加速3月HPLC图谱
 自制品(2025083021批)--含0.1%吐温20的醋酸-
 醋酸盐溶液 (pH4.5) 介质介质-片4
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速:1.8ml/min
 柱温 : 40°C 波长:250nm
 数据文件名: RC\$SMF-4099 - 0-81/26-2357-2 - zzp-2025083021p-js3y-rcd-P4-2.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4099 - SMF-4099-RCQX-FX275.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4099 - 20251224-rc-FX275.lcb
 样品瓶号: 1-29
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/24 12:27:44 实验者: wangdan
 处理时间 (V2) : 2025/12/25 10:01:52 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 250nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.281	353336	100.000	81179	6390	1.068	--
总计		353336	100.000	81179			

图26 非奈利酮片溶出度测定加速3月HPLC图谱
 自制品(2025083021批)--含0.1%吐温20的醋酸-
 醋酸盐溶液 (pH4.5) 介质介质-片4
 供试品溶液-2

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.8ml/min
 柱温 : 40 $^{\circ}$ C 波长:250nm
 数据文件名: RC\$SMF-4099 - 0-81/26-2358-2 - zzp-2025083021p-js3y-rcd-P5-1.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4099 - SMF-4099-RCQX-FX275.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4099 - 20251224-rc-FX275.lcb
 样品瓶号: 1-38
 进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/24 12:31:06 实验者: wangdan
 处理时间 (V2) : 2025/12/25 10:01:55 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.282	344932	100.000	79199	6394	1.068	--
总计		344932	100.000	79199			

图27 非奈利酮片溶出度测定加速3月HPLC图谱
 自制品(2025083021批)--含0.1%吐温20的醋酸-
 醋酸盐溶液 (pH4.5) 介质介质-片5
 供试品溶液-1




SMF-4099

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速:1.8ml/min
 柱温 : 40°C 波长:250nm
 数据文件名: RC\$SMF-4099 - 0-81/26-2359-2 - zzp-2025083021p-js3y-rcd-P5-2.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4099 - SMF-4099-RCQX-FX275.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4099 - 20251224-rc-FX275.lcb
 样品瓶号: 1-38
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/24 12:34:27 实验者: wangdan
 处理时间 (V2) : 2025/12/25 10:01:58 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.281	344748	100.000	79230	6387	1.068	--
总计		344748	100.000	79230			

图28 非奈利酮片溶出度测定加速3月HPLC图谱
 自制品(2025083021批)--含0.1%吐温20的醋酸-
 醋酸盐溶液 (pH4.5) 介质介质-片5
 供试品溶液-2




SMF-4099

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.8ml/min
 柱温 : 40 $^{\circ}$ C 波长:250nm
 数据文件名: RC\$SMF-4099 - 0-81/26-2360-2 - zzp-2025083021p-js3y-rcd-P6-1.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4099 - SMF-4099-RCQX-FX275.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4099 - 20251224-rc-FX275.lcb
 样品瓶号: 1-47
 进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/24 12:37:49 实验者: wangdan
 处理时间 (V2) : 2025/12/25 10:02:01 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 250nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.281	371073	100.000	85298	6402	1.068	--
总计		371073	100.000	85298			

图29 非奈利酮片溶出度测定加速3月HPLC图谱
 自制品(2025083021批)--含0.1%吐温20的醋酸-
 醋酸盐溶液 (pH4.5) 介质介质-片6
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.8ml/min
 柱温 : 40 $^{\circ}$ C 波长:250nm
 数据文件名: RC\$SMF-4099 - 0-81/26-2361-2 - zzp-2025083021p-js3y-rcd-P6-2.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4099 - SMF-4099-RCQX-FX275.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4099 - 20251224-rc-FX275.lcb
 样品瓶号: 1-47
 进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/24 12:41:11 实验者: wangdan
 处理时间 (V2) : 2025/12/25 10:02:04 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 250nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.281	359331	100.000	82631	6403	1.069	--
总计		359331	100.000	82631			

图30 非奈利酮片溶出度测定加速3月HPLC图谱
 自制品(2025083021批)--含0.1%吐温20的醋酸-
 醋酸盐溶液 (pH4.5) 介质介质-片6
 供试品溶液-2

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.8ml/min
 柱温 : 40 $^{\circ}$ C 波长:250nm
 数据文件名: RC\$SMF-4099 - 0-81/26-2362-2 - zzp-2025083121p-js3y-rcd-P1-1.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4099 - SMF-4099-RCQX-FX275.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4099 - 20251224-rc-FX275.lcb
 样品瓶号: 1-3
 进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/24 12:44:34 实验者: wangdan
 处理时间 (V2) : 2025/12/25 10:02:08 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 250nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.281	343226	100.000	78890	6389	1.068	--
总计		343226	100.000	78890			

图31 非奈利酮片溶出度测定加速3月HPLC图谱
 自制品(2025083121批)--含0.1%吐温20的醋酸-
 醋酸盐溶液 (pH4.5) 介质介质-片1
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速:1.8ml/min
 柱温 : 40°C 波长:250nm
 数据文件名: RC\$SMF-4099 - 0-81/26-2363-2 - zzp-2025083121p-js3y-rcd-P1-2.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4099 - SMF-4099-RCQX-FX275.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4099 - 20251224-rc-FX275.lcb
 样品瓶号: 1-3
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/24 12:47:56 实验者: wangdan
 处理时间 (V2) : 2025/12/25 10:02:11 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 250nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.280	342573	100.000	78829	6402	1.068	--
总计		342573	100.000	78829			

图32 非奈利酮片溶出度测定加速3月HPLC图谱
 自制品(2025083121批)--含0.1%吐温20的醋酸-
 醋酸盐溶液 (pH4.5) 介质介质-片1
 供试品溶液-2

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速:1.8ml/min
 柱温 : 40°C 波长:250nm
 数据文件名: RC\$SMF-4099 - 0-81/26-2364-2 - zzp-2025083121p-js3y-rcd-P2-1.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4099 - SMF-4099-RCQX-FX275.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4099 - 20251224-rc-FX275.lcb
 样品瓶号: 1-12
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/24 12:51:18 实验者: wangdan
 处理时间 (V2) : 2025/12/25 10:02:14 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 250nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.282	347113	100.000	79635	6400	1.069	--
总计		347113	100.000	79635			

图33 非奈利酮片溶出度测定加速3月HPLC图谱
 自制品(2025083121批)--含0.1%吐温20的醋酸-
 醋酸盐溶液 (pH4.5) 介质介质-片2
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.8ml/min
 柱温 : 40 $^{\circ}$ C 波长:250nm
 数据文件名: RC\$SMF-4099 - 0-81/26-2365-2 - zzp-2025083121p-js3y-rcd-P2-2.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4099 - SMF-4099-RCQX-FX275.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4099 - 20251224-rc-FX275.lcb
 样品瓶号: 1-12
 进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/24 12:54:41 实验者: wangdan
 处理时间 (V2) : 2025/12/25 10:02:17 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.281	347036	100.000	79792	6405	1.068	--
总计		347036	100.000	79792			

图34 非奈利酮片溶出度测定加速3月HPLC图谱
 自制品(2025083121批)--含0.1%吐温20的醋酸-
 醋酸盐溶液 (pH4.5) 介质介质-片2
 供试品溶液-2




SMF-4099

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速:1.8ml/min
 柱温 : 40°C 波长:250nm
 数据文件名: RC\$SMF-4099 - 0-81/26-2366-2 - zzp-2025083121p-js3y-rcd-P3-1.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4099 - SMF-4099-RCQX-FX275.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4099 - 20251224-rc-FX275.lcb
 样品瓶号: 1-21
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/24 12:58:03 实验者: wangdan
 处理时间 (V2) : 2025/12/25 10:02:21 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 250nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.281	347842	100.000	80030	6402	1.068	--
总计		347842	100.000	80030			

图35 非奈利酮片溶出度测定加速3月HPLC图谱
 自制品(2025083121批)--含0.1%吐温20的醋酸-
 醋酸盐溶液 (pH4.5) 介质-片3
 供试品溶液-1

〈样品信息〉

色谱柱 : XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.8ml/min
 柱温 : 40 $^{\circ}$ C 波长:250nm
 数据文件名: RC\$SMF-4099 - 0-81/26-2367-2 - zzp-2025083121p-js3y-rcd-P3-2.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4099 - SMF-4099-RCQX-FX275.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4099 - 20251224-rc-FX275.lcb
 样品瓶号: 1-21
 进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/24 13:01:26 实验者: wangdan
 处理时间 (V2) : 2025/12/25 10:02:23 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 250nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.281	347688	100.000	79995	6412	1.069	--
总计		347688	100.000	79995			

图36 非奈利酮片溶出度测定加速3月HPLC图谱
 自制品(2025083121批)--含0.1%吐温20的醋酸-
 醋酸盐溶液 (pH4.5) 介质介质-片3
 供试品溶液-2

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.8ml/min
 柱温 : 40 $^{\circ}$ C 波长:250nm
 数据文件名: RC\$SMF-4099 - 0-81/26-2368-2 - zzp-2025083121p-js3y-rcd-P4-1.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4099 - SMF-4099-RCQX-FX275.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4099 - 20251224-rc-FX275.lcb
 样品瓶号: 1-30
 进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/24 13:04:47 实验者: wangdan
 处理时间 (V2) : 2025/12/25 10:02:26 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.282	343211	100.000	78853	6412	1.068	--
总计		343211	100.000	78853			

图37 非奈利酮片溶出度测定加速3月HPLC图谱
 自制品(2025083121批)--含0.1%吐温20的醋酸-
 醋酸盐溶液 (pH4.5) 介质介质-片4
 供试品溶液-1




SMF-4099

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.8ml/min
 柱温 : 40 $^{\circ}$ C 波长:250nm
 数据文件名: RC\$SMF-4099 - 0-81/26-2369-2 - zzp-2025083121p-js3y-rcd-P4-2.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4099 - SMF-4099-RCQX-FX275.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4099 - 20251224-rc-FX275.lcb
 样品瓶号: 1-30
 进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/24 13:08:09 实验者: wangdan
 处理时间 (V2) : 2025/12/25 10:02:30 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 250nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.280	343355	100.000	79011	6414	1.068	--
总计		343355	100.000	79011			

图38 非奈利酮片溶出度测定加速3月HPLC图谱
 自制品(2025083121批)--含0.1%吐温20的醋酸-
 醋酸盐溶液 (pH4.5) 介质介质-片4
 供试品溶液-2

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.8ml/min
 柱温 : 40 $^{\circ}$ C 波长:250nm
 数据文件名: RC\$SMF-4099 - 0-81/26-2370-2 - zzp-2025083121p-js3y-rcd-P5-1.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4099 - SMF-4099-RCQX-FX275.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4099 - 20251224-rc-FX275.lcb
 样品瓶号: 1-39
 进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/24 13:11:31 实验者: wangdan
 处理时间 (V2) : 2025/12/25 10:02:33 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.281	347737	100.000	79955	6400	1.068	--
总计		347737	100.000	79955			

图39 非奈利酮片溶出度测定加速3月HPLC图谱
 自制品(2025083121批)--含0.1%吐温20的醋酸-
 醋酸盐溶液 (pH4.5) 介质介质-片5
 供试品溶液-1




SMF-4099

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速:1.8ml/min
 柱温 : 40°C 波长:250nm
 数据文件名: RC\$SMF-4099 - 0-81/26-2371-2 - zzp-2025083121p-js3y-rcd-P5-2.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4099 - SMF-4099-RCQX-FX275.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4099 - 20251224-rc-FX275.lcb
 样品瓶号: 1-39
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/24 13:14:53 实验者: wangdan
 处理时间 (V2) : 2025/12/25 10:02:36 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 250nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.281	347461	100.000	79963	6404	1.068	--
总计		347461	100.000	79963			

图40 非奈利酮片溶出度测定加速3月HPLC图谱
 自制品(2025083121批)--含0.1%吐温20的醋酸-
 醋酸盐溶液 (pH4.5) 介质介质-片5
 供试品溶液-2

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.8ml/min
 柱温 : 40 $^{\circ}$ C 波长:250nm
 数据文件名: RC\$SMF-4099 - 0-81/26-2372-2 - zzp-2025083121p-js3y-rcd-P6-1.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4099 - SMF-4099-RCQX-FX275.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4099 - 20251224-rc-FX275.lcb
 样品瓶号: 1-48
 进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/24 13:18:15 实验者: wangdan
 处理时间 (V2) : 2025/12/25 10:02:39 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 250nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.281	347557	100.000	79923	6398	1.069	--
总计		347557	100.000	79923			

图41 非奈利酮片溶出度测定加速3月HPLC图谱
 自制品(2025083121批)--含0.1%吐温20的醋酸-
 醋酸盐溶液 (pH4.5) 介质介质-片6
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.8ml/min
 柱温 : 40 $^{\circ}$ C 波长:250nm
 数据文件名: RC\$SMF-4099 - 0-81/26-2373-2 - zzp-2025083121p-js3y-rcd-P6-2.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4099 - SMF-4099-RCQX-FX275.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4099 - 20251224-rc-FX275.lcb
 样品瓶号: 1-48
 进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/24 13:21:37 实验者: wangdan
 处理时间 (V2) : 2025/12/25 10:02:42 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 250nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.281	347396	100.000	79937	6413	1.069	--
总计		347396	100.000	79937			

图42 非奈利酮片溶出度测定加速3月HPLC图谱
 自制品(2025083121批)--含0.1%吐温20的醋酸-
 醋酸盐溶液 (pH4.5) 介质介质-片6
 供试品溶液-2

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.8ml/min
 柱温 : 40 $^{\circ}$ C 波长:250nm
 数据文件名: RC\$SMF-4099 - 0-81/26-2374-2 - zzp-js3y-red-dz2-1.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4099 - SMF-4099-RCQX-FX275.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4099 - 20251224-rc-FX275.lcb
 样品瓶号: 1-27
 进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/24 13:25:00 实验者: wangdan
 处理时间 (V2) : 2025/12/25 10:02:45 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 250nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.279	368164	100.000	84168	6321	1.069	--
总计		368164	100.000	84168			

图43 非奈利酮片溶出度测定加速3月HPLC图谱
 自制品--含0.1%吐温20的醋酸-醋酸盐溶液 (pH4.5) 介质介质
 对照品溶液-2-1

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.8ml/min
 柱温 : 40 $^{\circ}$ C 波长:250nm
 数据文件名: RC\$SMF-4099 - 0-81/26-2375-2 - zzp-js3y-red-dz2-2.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4099 - SMF-4099-RCQX-FX275.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4099 - 20251224-rc-FX275.lcb
 样品瓶号: 1-27
 进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/24 13:28:23 实验者: wangdan
 处理时间 (V2) : 2025/12/25 10:02:48 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.279	368090	100.000	84159	6324	1.069	--
总计		368090	100.000	84159			

图44 非奈利酮片溶出度测定加速3月HPLC图谱
 自制品--含0.1%吐温20的醋酸-醋酸盐溶液 (pH4.5) 介质介质
 对照品溶液-2-2




SMF-4099

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速:1.8ml/min
 柱温 : 40°C 波长:250nm
 数据文件名: RC\$SMF-4099 - 0-81/26-2376-2 - zzp-cq3y-rcd-rj.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4099 - SMF-4099-RCQX-FX275.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4099 - 20251224-rc-FX275.lcb
 样品瓶号: 2-9
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/24 13:31:47 实验者: wangdan
 处理时间 (V2) : 2025/12/25 10:02:51 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 250nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图45 非奈利酮片溶出度测定加速3月HPLC图谱
 自制品--含0.1%吐温20的醋酸-醋酸盐溶液 (pH4.5) 介质介质
 溶剂

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.8ml/min
 柱温 : 40 $^{\circ}$ C 波长:250nm
 数据文件名: RC\$SMF-4099 - 0-81/26-2377-2 - zzp-cq3y-rcd-dz1-1.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4099 - SMF-4099-RCQX-FX275.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4099 - 20251224-rc-FX275.lcb
 样品瓶号: 2-18
 进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/24 13:35:11 实验者: wangdan
 处理时间 (V2) : 2025/12/25 10:02:54 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 250nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.279	370495	100.000	84806	6328	1.069	--
总计		370495	100.000	84806			

图46 非奈利酮片溶出度测定长期3月HPLC图谱
 自制品--含0.1%吐温20的醋酸-醋酸盐溶液 (pH4.5) 介质介质
 对照品溶液-1-1

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.8ml/min
 柱温 : 40 $^{\circ}$ C 波长:250nm
 数据文件名: RC\$SMF-4099 - 0-81/26-2378-2 - zzp-cq3y-rcd-dz1-2.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4099 - SMF-4099-RCQX-FX275.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4099 - 20251224-rc-FX275.lcb
 样品瓶号: 2-18
 进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/24 13:38:36 实验者: wangdan
 处理时间 (V2) : 2025/12/25 10:02:57 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 250nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.280	370809	100.000	84853	6327	1.069	--
总计		370809	100.000	84853			

图47 非奈利酮片溶出度测定长期3月HPLC图谱
 自制品--含0.1%吐温20的醋酸-醋酸盐溶液 (pH4.5) 介质介质
 对照品溶液-1-2

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速:1.8ml/min
 柱温 : 40°C 波长:250nm
 数据文件名: RC\$SMF-4099 - 0-81/26-2379-2 - zzp-cq3y-rcd-dz1-3.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4099 - SMF-4099-RCQX-FX275.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4099 - 20251224-rc-FX275.lcb
 样品瓶号: 2-18
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/24 13:42:00 实验者: wangdan
 处理时间 (V2) : 2025/12/25 10:03:01 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 250nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.280	370362	100.000	84807	6330	1.069	--
总计		370362	100.000	84807			

图48 非奈利酮片溶出度测定长期3月HPLC图谱
 自制品--含0.1%吐温20的醋酸-醋酸盐溶液 (pH4.5) 介质介质
 对照品溶液-1-3

〈样品信息〉

色谱柱 : XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.8ml/min
 柱温 : 40 $^{\circ}$ C 波长:250nm
 数据文件名: RC\$SMF-4099 - 0-81/26-2380-2 - zzp-cq3y-rcd-dz1-4.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4099 - SMF-4099-RCQX-FX275.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4099 - 20251224-rc-FX275.lcb
 样品瓶号: 2-18
 进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/24 13:45:24 实验者: wangdan
 处理时间 (V2) : 2025/12/25 10:03:04 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 250nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.279	369998	100.000	84673	6336	1.068	--
总计		369998	100.000	84673			

图49 非奈利酮片溶出度测定长期3月HPLC图谱
 自制品--含0.1%吐温20的醋酸-醋酸盐溶液 (pH4.5) 介质介质
 对照品溶液-1-4

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.8ml/min
 柱温 : 40 $^{\circ}$ C 波长:250nm
 数据文件名: RC\$SMF-4099 - 0-81/26-2381-2 - zzp-cq3y-rcd-dz1-5.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4099 - SMF-4099-RCQX-FX275.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4099 - 20251224-rc-FX275.lcb
 样品瓶号: 2-18
 进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/24 13:48:48 实验者: wangdan
 处理时间 (V2) : 2025/12/25 10:03:07 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 250nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.279	370277	100.000	84736	6323	1.069	--
总计		370277	100.000	84736			

图50 非奈利酮片溶出度测定长期3月HPLC图谱
 自制品--含0.1%吐温20的醋酸-醋酸盐溶液 (pH4.5) 介质介质
 对照品溶液-1-5

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.8ml/min
 柱温 : 40 $^{\circ}$ C 波长:250nm
 数据文件名: RC\$SMF-4099 - 0-81/26-2382-2 - zzp-2025082921p-cq3y-rcd-P1-1.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4099 - SMF-4099-RCQX-FX275.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4099 - 20251224-rc-FX275.lcb
 样品瓶号: 2-1
 进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/24 13:52:10 实验者: wangdan
 处理时间 (V2) : 2025/12/25 10:03:10 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 250nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.281	336839	100.000	77548	6422	1.068	--
总计		336839	100.000	77548			

图51 非奈利酮片溶出度测定长期3月HPLC图谱
 自制品(2025082921批)--含0.1%吐温20的醋酸-
 醋酸盐溶液 (pH4.5) 介质介质-片1
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.8ml/min
 柱温 : 40 $^{\circ}$ C 波长:250nm
 数据文件名: RC\$SMF-4099 - 0-81/26-2383-2 - zzp-2025082921p-cq3y-rcd-P1-2.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4099 - SMF-4099-RCQX-FX275.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4099 - 20251224-rc-FX275.lcb
 样品瓶号: 2-1
 进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/24 13:55:34 实验者: wangdan
 处理时间 (V2) : 2025/12/25 10:03:13 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 250nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.281	336523	100.000	77527	6423	1.068	--
总计		336523	100.000	77527			

图52 非奈利酮片溶出度测定长期3月HPLC图谱
 自制品(2025082921批)--含0.1%吐温20的醋酸-
 醋酸盐溶液 (pH4.5) 介质介质-片1
 供试品溶液-2

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速:1.8ml/min
 柱温 : 40°C 波长:250nm
 数据文件名: RC\$SMF-4099 - 0-81/26-2384-2 - zzp-2025082921p-cq3y-rcd-P2-1.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4099 - SMF-4099-RCQX-FX275.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4099 - 20251224-rc-FX275.lcb
 样品瓶号: 2-10
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/24 13:58:57 实验者: wangdan
 处理时间 (V2) : 2025/12/25 10:03:16 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 250nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.282	338464	100.000	77853	6423	1.068	--
总计		338464	100.000	77853			

图53 非奈利酮片溶出度测定长期3月HPLC图谱
 自制品(2025082921批)--含0.1%吐温20的醋酸-
 醋酸盐溶液 (pH4.5) 介质介质-片2
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.8ml/min
 柱温 : 40 $^{\circ}$ C 波长:250nm
 数据文件名: RC\$SMF-4099 - 0-81/26-2385-2 - zzp-2025082921p-cq3y-rcd-P2-2.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4099 - SMF-4099-RCQX-FX275.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4099 - 20251224-rc-FX275.lcb
 样品瓶号: 2-10
 进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/24 14:02:20 实验者: wangdan
 处理时间 (V2) : 2025/12/25 10:03:19 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.281	338617	100.000	78008	6425	1.068	--
总计		338617	100.000	78008			

图54 非奈利酮片溶出度测定长期3月HPLC图谱
 自制品(2025082921批)--含0.1%吐温20的醋酸-
 醋酸盐溶液 (pH4.5) 介质介质-片2
 供试品溶液-2




SMF-4099

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速:1.8ml/min
 柱温 : 40°C 波长:250nm
 数据文件名: RC\$SMF-4099 - 0-81/26-2386-2 - zzp-2025082921p-cq3y-rcd-P3-1.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4099 - SMF-4099-RCQX-FX275.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4099 - 20251224-rc-FX275.lcb
 样品瓶号: 2-19
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/24 14:05:44 实验者: wangdan
 处理时间 (V2) : 2025/12/25 10:03:22 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 250nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.281	342410	100.000	78877	6423	1.069	--
总计		342410	100.000	78877			

图55 非奈利酮片溶出度测定长期3月HPLC图谱
 自制品(2025082921批)--含0.1%吐温20的醋酸-
 醋酸盐溶液 (pH4.5) 介质介质-片3
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.8ml/min
 柱温 : 40 $^{\circ}$ C 波长:250nm
 数据文件名: RC\$SMF-4099 - 0-81/26-2387-2 - zzp-2025082921p-cq3y-rcd-P3-2.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4099 - SMF-4099-RCQX-FX275.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4099 - 20251224-rc-FX275.lcb
 样品瓶号: 2-19
 进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/24 14:09:07 实验者: wangdan
 处理时间 (V2) : 2025/12/25 10:03:25 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.281	342202	100.000	78850	6426	1.068	--
总计		342202	100.000	78850			

图56 非奈利酮片溶出度测定长期3月HPLC图谱
 自制品(2025082921批)--含0.1%吐温20的醋酸-
 醋酸盐溶液 (pH4.5) 介质介质-片3
 供试品溶液-2




SMF-4099

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速:1.8ml/min
 柱温 : 40°C 波长:250nm
 数据文件名: RC\$SMF-4099 - 0-81/26-2388-2 - zzp-2025082921p-cq3y-rcd-P4-1.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4099 - SMF-4099-RCQX-FX275.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4099 - 20251224-rc-FX275.lcb
 样品瓶号: 2-28
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/24 14:12:31 实验者: wangdan
 处理时间 (V2) : 2025/12/25 10:03:29 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.281	340654	100.000	78473	6427	1.068	--
总计		340654	100.000	78473			

图57 非奈利酮片溶出度测定长期3月HPLC图谱
 自制品(2025082921批)--含0.1%吐温20的醋酸-
 醋酸盐溶液 (pH4.5) 介质介质-片4
 供试品溶液-1




SMF-4099

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速:1.8ml/min
 柱温 : 40°C 波长:250nm
 数据文件名: RC\$SMF-4099 - 0-81/26-2389-2 - zzp-2025082921p-cq3y-rcd-P4-2.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4099 - SMF-4099-RCQX-FX275.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4099 - 20251224-rc-FX275.lcb
 样品瓶号: 2-28
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/24 14:15:54 实验者: wangdan
 处理时间 (V2) : 2025/12/25 10:03:32 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 250nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.281	340617	100.000	78476	6419	1.068	--
总计		340617	100.000	78476			

图58 非奈利酮片溶出度测定长期3月HPLC图谱
 自制品(2025082921批)--含0.1%吐温20的醋酸-
 醋酸盐溶液 (pH4.5) 介质介质-片4
 供试品溶液-2

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.8ml/min
 柱温 : 40 $^{\circ}$ C 波长:250nm
 数据文件名: RC\$SMF-4099 - 0-81/26-2390-2 - zzp-2025082921p-cq3y-rcd-P5-1.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4099 - SMF-4099-RCQX-FX275.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4099 - 20251224-rc-FX275.lcb
 样品瓶号: 2-37
 进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/24 14:19:18 实验者: wangdan
 处理时间 (V2) : 2025/12/25 10:03:35 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.282	340031	100.000	78165	6422	1.069	--
总计		340031	100.000	78165			

图59 非奈利酮片溶出度测定长期3月HPLC图谱
 自制品(2025082921批)--含0.1%吐温20的醋酸-
 醋酸盐溶液 (pH4.5) 介质介质-片5
 供试品溶液-1




SMF-4099

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速:1.8ml/min
 柱温 : 40°C 波长:250nm
 数据文件名: RC\$SMF-4099 - 0-81/26-2391-2 - zzp-2025082921p-cq3y-rcd-P5-2.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4099 - SMF-4099-RCQX-FX275.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4099 - 20251224-rc-FX275.lcb
 样品瓶号: 2-37
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/24 14:22:40 实验者: wangdan
 处理时间 (V2) : 2025/12/25 10:03:38 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 250nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.282	340202	100.000	78257	6429	1.068	--
总计		340202	100.000	78257			

图60 非奈利酮片溶出度测定长期3月HPLC图谱
 自制品(2025082921批)--含0.1%吐温20的醋酸-
 醋酸盐溶液 (pH4.5) 介质介质-片5
 供试品溶液-2

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.8ml/min
 柱温 : 40 $^{\circ}$ C 波长:250nm
 数据文件名: RC\$SMF-4099 - 0-81/26-2392-2 - zzp-2025082921p-cq3y-rcd-P6-1.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4099 - SMF-4099-RCQX-FX275.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4099 - 20251224-rc-FX275.lcb
 样品瓶号: 2-46
 进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/24 14:26:02 实验者: wangdan
 处理时间 (V2) : 2025/12/25 10:03:41 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.282	335308	100.000	77104	6429	1.069	--
总计		335308	100.000	77104			

图61 非奈利酮片溶出度测定长期3月HPLC图谱
 自制品(2025082921批)--含0.1%吐温20的醋酸-
 醋酸盐溶液 (pH4.5) 介质介质-片6
 供试品溶液-1




SMF-4099

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速:1.8ml/min
 柱温 : 40°C 波长:250nm
 数据文件名: RC\$SMF-4099 - 0-81/26-2393-2 - zzp-2025082921p-cq3y-rcd-P6-2.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4099 - SMF-4099-RCQX-FX275.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4099 - 20251224-rc-FX275.lcb
 样品瓶号: 2-46
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/24 14:29:25 实验者: wangdan
 处理时间 (V2) : 2025/12/25 10:03:44 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 250nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.281	334722	100.000	77097	6433	1.068	--
总计		334722	100.000	77097			

图62 非奈利酮片溶出度测定长期3月HPLC图谱
 自制品(2025082921批)--含0.1%吐温20的醋酸-
 醋酸盐溶液 (pH4.5) 介质介质-片6
 供试品溶液-2

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速:1.8ml/min
 柱温 : 40°C 波长:250nm
 数据文件名: RC\$SMF-4099 - 0-81/26-2394-2 - zzp-2025083021p-cq3y-rcd-P1-1.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4099 - SMF-4099-RCQX-FX275.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4099 - 20251224-rc-FX275.lcb
 样品瓶号: 2-2
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/24 14:32:49 实验者: wangdan
 处理时间 (V2) : 2025/12/25 10:03:47 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.282	346441	100.000	79723	6429	1.068	--
总计		346441	100.000	79723			

图63 非奈利酮片溶出度测定长期3月HPLC图谱
 自制品(2025083021批)--含0.1%吐温20的醋酸-
 醋酸盐溶液 (pH4.5) 介质介质-片1
 供试品溶液-1




SMF-4099

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速:1.8ml/min
 柱温 : 40°C 波长:250nm
 数据文件名: RC\$SMF-4099 - 0-81/26-2395-2 - zzp-2025083021p-cq3y-rcd-P1-2.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4099 - SMF-4099-RCQX-FX275.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4099 - 20251224-rc-FX275.lcb
 样品瓶号: 2-2
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/24 14:36:12 实验者: wangdan
 处理时间 (V2) : 2025/12/25 10:03:51 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.282	346480	100.000	79681	6429	1.069	--
总计		346480	100.000	79681			

图64 非奈利酮片溶出度测定长期3月HPLC图谱
 自制品(2025083021批)--含0.1%吐温20的醋酸-
 醋酸盐溶液 (pH4.5) 介质介质-片1
 供试品溶液-2




SMF-4099

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.8ml/min
 柱温 : 40 $^{\circ}$ C 波长:250nm
 数据文件名: RC\$SMF-4099 - 0-81/26-2396-2 - zzp-2025083021p-cq3y-rcd-P2-1.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4099 - SMF-4099-RCQX-FX275.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4099 - 20251224-rc-FX275.lcb
 样品瓶号: 2-11
 进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/24 14:39:36 实验者: wangdan
 处理时间 (V2) : 2025/12/25 10:03:54 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 250nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.282	358822	100.000	82592	6432	1.069	--
总计		358822	100.000	82592			

图65 非奈利酮片溶出度测定长期3月HPLC图谱
 自制品(2025083021批)--含0.1%吐温20的醋酸-
 醋酸盐溶液 (pH4.5) 介质介质-片2
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.8ml/min
 柱温 : 40 $^{\circ}$ C 波长:250nm
 数据文件名: RC\$SMF-4099 - 0-81/26-2397-2 - zzp-2025083021p-cq3y-rcd-P2-2.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4099 - SMF-4099-RCQX-FX275.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4099 - 20251224-rc-FX275.lcb
 样品瓶号: 2-11
 进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/24 14:42:59 实验者: wangdan
 处理时间 (V2) : 2025/12/25 10:03:57 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.282	358216	100.000	82440	6438	1.069	--
总计		358216	100.000	82440			

图66 非奈利酮片溶出度测定长期3月HPLC图谱
 自制品(2025083021批)--含0.1%吐温20的醋酸-
 醋酸盐溶液 (pH4.5) 介质介质-片2
 供试品溶液-2




SMF-4099

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.8ml/min
 柱温 : 40 $^{\circ}$ C 波长:250nm
 数据文件名: RC\$SMF-4099 - 0-81/26-2398-2 - zzp-2025083021p-cq3y-rcd-P3-1.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4099 - SMF-4099-RCQX-FX275.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4099 - 20251224-rc-FX275.lcb
 样品瓶号: 2-20
 进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/24 14:46:23 实验者: wangdan
 处理时间 (V2) : 2025/12/25 10:04:00 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 250nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.282	340462	100.000	78332	6429	1.068	--
总计		340462	100.000	78332			

图67 非奈利酮片溶出度测定长期3月HPLC图谱
 自制品(2025083021批)--含0.1%吐温20的醋酸-
 醋酸盐溶液 (pH4.5) 介质介质-片3
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.8ml/min
 柱温 : 40 $^{\circ}$ C 波长:250nm
 数据文件名: RC\$SMF-4099 - 0-81/26-2399-2 - zzp-2025083021p-cq3y-rcd-P3-2.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4099 - SMF-4099-RCQX-FX275.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4099 - 20251224-rc-FX275.lcb
 样品瓶号: 2-20
 进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/24 14:49:46 实验者: wangdan
 处理时间 (V2) : 2025/12/25 10:04:03 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 250nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.281	340421	100.000	78418	6426	1.068	--
总计		340421	100.000	78418			

图68 非奈利酮片溶出度测定长期3月HPLC图谱
 自制品(2025083021批)--含0.1%吐温20的醋酸-
 醋酸盐溶液 (pH4.5) 介质介质-片3
 供试品溶液-2

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.8ml/min
 柱温 : 40 $^{\circ}$ C 波长:250nm
 数据文件名: RC\$SMF-4099 - 0-81/26-2400-2 - zzp-2025083021p-cq3y-rcd-P4-1.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4099 - SMF-4099-RCQX-FX275.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4099 - 20251224-rc-FX275.lcb
 样品瓶号: 2-29
 进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/24 14:53:09 实验者: wangdan
 处理时间 (V2) : 2025/12/25 10:04:06 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.282	352459	100.000	81112	6432	1.069	--
总计		352459	100.000	81112			

图69 非奈利酮片溶出度测定长期3月HPLC图谱
 自制品(2025083021批)--含0.1%吐温20的醋酸-
 醋酸盐溶液 (pH4.5) 介质介质-片4
 供试品溶液-1




SMF-4099

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速:1.8ml/min
 柱温 : 40°C 波长:250nm
 数据文件名: RC\$SMF-4099 - 0-81/26-2401-2 - zzp-2025083021p-cq3y-rcd-P4-2.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4099 - SMF-4099-RCQX-FX275.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4099 - 20251224-rc-FX275.lcb
 样品瓶号: 2-29
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/24 14:56:33 实验者: wangdan
 处理时间 (V2) : 2025/12/25 10:04:09 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 250nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.282	352136	100.000	80965	6426	1.068	--
总计		352136	100.000	80965			

图70 非奈利酮片溶出度测定长期3月HPLC图谱
 自制品(2025083021批)--含0.1%吐温20的醋酸-
 醋酸盐溶液 (pH4.5) 介质介质-片4
 供试品溶液-2

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.8ml/min
 柱温 : 40 $^{\circ}$ C 波长:250nm
 数据文件名: RC\$SMF-4099 - 0-81/26-2402-2 - zzp-2025083021p-cq3y-rcd-P5-1.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4099 - SMF-4099-RCQX-FX275.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4099 - 20251224-rc-FX275.lcb
 样品瓶号: 2-38
 进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/24 14:59:56 实验者: wangdan
 处理时间 (V2) : 2025/12/25 10:04:12 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.281	355453	100.000	81960	6441	1.068	--
总计		355453	100.000	81960			

图71 非奈利酮片溶出度测定长期3月HPLC图谱
 自制品(2025083021批)--含0.1%吐温20的醋酸-
 醋酸盐溶液 (pH4.5) 介质介质-片5
 供试品溶液-1




SMF-4099

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.8ml/min
 柱温 : 40 $^{\circ}$ C 波长:250nm
 数据文件名: RC\$SMF-4099 - 0-81/26-2403-2 - zzp-2025083021p-cq3y-rcd-P5-2.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4099 - SMF-4099-RCQX-FX275.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4099 - 20251224-rc-FX275.lcb
 样品瓶号: 2-38
 进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/24 15:03:19 实验者: wangdan
 处理时间 (V2) : 2025/12/25 10:04:15 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.281	354734	100.000	81745	6425	1.068	--
总计		354734	100.000	81745			

图72 非奈利酮片溶出度测定长期3月HPLC图谱
 自制品(2025083021批)--含0.1%吐温20的醋酸-
 醋酸盐溶液 (pH4.5) 介质介质-片5
 供试品溶液-2




SMF-4099

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.8ml/min
 柱温 : 40 $^{\circ}$ C 波长:250nm
 数据文件名: RC\$SMF-4099 - 0-81/26-2404-2 - zzp-2025083021p-cq3y-rcd-P6-1.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4099 - SMF-4099-RCQX-FX275.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4099 - 20251224-rc-FX275.lcb
 样品瓶号: 2-47
 进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/24 15:06:42 实验者: wangdan
 处理时间 (V2) : 2025/12/25 10:04:19 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.282	345904	100.000	79633	6428	1.068	--
总计		345904	100.000	79633			

图73 非奈利酮片溶出度测定长期3月HPLC图谱
 自制品(2025083021批)--含0.1%吐温20的醋酸-
 醋酸盐溶液 (pH4.5) 介质介质-片6
 供试品溶液-1




SMF-4099

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.8ml/min
 柱温 : 40 $^{\circ}$ C 波长:250nm
 数据文件名: RC\$SMF-4099 - 0-81/26-2405-2 - zzp-2025083021p-cq3y-rcd-P6-2.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4099 - SMF-4099-RCQX-FX275.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4099 - 20251224-rc-FX275.lcb
 样品瓶号: 2-47
 进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/24 15:10:05 实验者: wangdan
 处理时间 (V2) : 2025/12/25 10:04:22 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.282	345874	100.000	79645	6433	1.068	--
总计		345874	100.000	79645			

图74 非奈利酮片溶出度测定长期3月HPLC图谱
 自制品(2025083021批)--含0.1%吐温20的醋酸-
 醋酸盐溶液 (pH4.5) 介质介质-片6
 供试品溶液-2




SMF-4099

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.8ml/min
 柱温 : 40 $^{\circ}$ C 波长:250nm
 数据文件名: RC\$SMF-4099 - 0-81/26-2406-2 - zzp-2025083121p-cq3y-rcd-P1-1.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4099 - SMF-4099-RCQX-FX275.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4099 - 20251224-rc-FX275.lcb
 样品瓶号: 2-3
 进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/24 15:13:29 实验者: wangdan
 处理时间 (V2) : 2025/12/25 10:04:25 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.282	348553	100.000	80243	6430	1.068	--
总计		348553	100.000	80243			

图75 非奈利酮片溶出度测定长期3月HPLC图谱
 自制品(2025083121批)--含0.1%吐温20的醋酸-
 醋酸盐溶液 (pH4.5) 介质介质-片1
 供试品溶液-1




SMF-4099

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.8ml/min
 柱温 : 40 $^{\circ}$ C 波长:250nm
 数据文件名: RC\$SMF-4099 - 0-81/26-2407-2 - zzp-2025083121p-cq3y-rcd-P1-2.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4099 - SMF-4099-RCQX-FX275.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4099 - 20251224-rc-FX275.lcb
 样品瓶号: 2-3
 进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/24 15:16:52 实验者: wangdan
 处理时间 (V2) : 2025/12/25 10:04:28 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.282	348535	100.000	80230	6430	1.069	--
总计		348535	100.000	80230			

图76 非奈利酮片溶出度测定长期3月HPLC图谱
 自制品(2025083121批)--含0.1%吐温20的醋酸-
 醋酸盐溶液 (pH4.5) 介质介质-片1
 供试品溶液-2




SMF-4099

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速:1.8ml/min
 柱温 : 40°C 波长:250nm
 数据文件名: RC\$SMF-4099 - 0-81/26-2408-2 - zzp-2025083121p-cq3y-rcd-P2-1.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4099 - SMF-4099-RCQX-FX275.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4099 - 20251224-rc-FX275.lcb
 样品瓶号: 2-12
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/24 15:20:16 实验者: wangdan
 处理时间 (V2) : 2025/12/25 10:04:32 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.281	347879	100.000	80174	6433	1.068	--
总计		347879	100.000	80174			

图77 非奈利酮片溶出度测定长期3月HPLC图谱
 自制品(2025083121批)--含0.1%吐温20的醋酸-
 醋酸盐溶液 (pH4.5) 介质介质-片2
 供试品溶液-1




SMF-4099

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.8ml/min
 柱温 : 40 $^{\circ}$ C 波长:250nm
 数据文件名: RC\$SMF-4099 - 0-81/26-2409-2 - zzp-2025083121p-cq3y-rcd-P2-2.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4099 - SMF-4099-RCQX-FX275.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4099 - 20251224-rc-FX275.lcb
 样品瓶号: 2-12
 进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/24 15:23:40 实验者: wangdan
 处理时间 (V2) : 2025/12/25 10:04:35 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.282	347716	100.000	80062	6429	1.069	--
总计		347716	100.000	80062			

图78 非奈利酮片溶出度测定长期3月HPLC图谱
 自制品(2025083121批)--含0.1%吐温20的醋酸-
 醋酸盐溶液 (pH4.5) 介质介质-片2
 供试品溶液-2




SMF-4099

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速:1.8ml/min
 柱温 : 40°C 波长:250nm
 数据文件名: RC\$SMF-4099 - 0-81/26-2410-2 - zzp-2025083121p-cq3y-rcd-P3-1.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4099 - SMF-4099-RCQX-FX275.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4099 - 20251224-rc-FX275.lcb
 样品瓶号: 2-21
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/24 15:27:02 实验者: wangdan
 处理时间 (V2) : 2025/12/25 10:04:38 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 250nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.282	353362	100.000	81302	6433	1.068	--
总计		353362	100.000	81302			

图79 非奈利酮片溶出度测定长期3月HPLC图谱
 自制品(2025083121批)--含0.1%吐温20的醋酸-
 醋酸盐溶液 (pH4.5) 介质介质-片3
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.8ml/min
 柱温 : 40 $^{\circ}$ C 波长:250nm
 数据文件名: RC\$SMF-4099 - 0-81/26-2411-2 - zzp-2025083121p-cq3y-rcd-P3-2.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4099 - SMF-4099-RCQX-FX275.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4099 - 20251224-rc-FX275.lcb
 样品瓶号: 2-21
 进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/24 15:30:25 实验者: wangdan
 处理时间 (V2) : 2025/12/25 10:04:41 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 250nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.282	353211	100.000	81302	6434	1.069	--
总计		353211	100.000	81302			

图80 非奈利酮片溶出度测定长期3月HPLC图谱
 自制品(2025083121批)--含0.1%吐温20的醋酸-
 醋酸盐溶液 (pH4.5) 介质介质-片3
 供试品溶液-2

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速:1.8ml/min
 柱温 : 40°C 波长:250nm
 数据文件名: RC\$SMF-4099 - 0-81/26-2412-2 - zzp-2025083121p-cq3y-rcd-P4-1.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4099 - SMF-4099-RCQX-FX275.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4099 - 20251224-rc-FX275.lcb
 样品瓶号: 2-30
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/24 15:33:48 实验者: wangdan
 处理时间 (V2) : 2025/12/25 10:04:45 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 250nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.281	350888	100.000	80992	6441	1.068	--
总计		350888	100.000	80992			

图81 非奈利酮片溶出度测定长期3月HPLC图谱
 自制品(2025083121批)--含0.1%吐温20的醋酸-
 醋酸盐溶液 (pH4.5) 介质介质-片4
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.8ml/min
 柱温 : 40 $^{\circ}$ C 波长:250nm
 数据文件名: RC\$SMF-4099 - 0-81/26-2413-2 - zzp-2025083121p-cq3y-rcd-P4-2.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4099 - SMF-4099-RCQX-FX275.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4099 - 20251224-rc-FX275.lcb
 样品瓶号: 2-30
 进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/24 15:37:11 实验者: wangdan
 处理时间 (V2) : 2025/12/25 10:04:48 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 250nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.281	351030	100.000	80904	6427	1.069	--
总计		351030	100.000	80904			

图82 非奈利酮片溶出度测定长期3月HPLC图谱
 自制品(2025083121批)--含0.1%吐温20的醋酸-
 醋酸盐溶液 (pH4.5) 介质介质-片4
 供试品溶液-2

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速:1.8ml/min
 柱温 : 40°C 波长:250nm
 数据文件名: RC\$SMF-4099 - 0-81/26-2414-2 - zzp-2025083121p-cq3y-rcd-P5-1.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4099 - SMF-4099-RCQX-FX275.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4099 - 20251224-rc-FX275.lcb
 样品瓶号: 2-39
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/24 15:40:35 实验者: wangdan
 处理时间 (V2) : 2025/12/25 10:04:51 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 250nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.281	344210	100.000	79332	6437	1.068	--
总计		344210	100.000	79332			

图83 非奈利酮片溶出度测定长期3月HPLC图谱
 自制品(2025083121批)--含0.1%吐温20的醋酸-
 醋酸盐溶液 (pH4.5) 介质-片5
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.8ml/min
 柱温 : 40 $^{\circ}$ C 波长:250nm
 数据文件名: RC\$SMF-4099 - 0-81/26-2415-2 - zzp-2025083121p-cq3y-rcd-P5-2.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4099 - SMF-4099-RCQX-FX275.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4099 - 20251224-rc-FX275.lcb
 样品瓶号: 2-39
 进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/24 15:43:58 实验者: wangdan
 处理时间 (V2) : 2025/12/25 10:04:54 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 250nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.282	343868	100.000	79150	6432	1.069	--
总计		343868	100.000	79150			

图84 非奈利酮片溶出度测定长期3月HPLC图谱
 自制品(2025083121批)--含0.1%吐温20的醋酸-
 醋酸盐溶液 (pH4.5) 介质介质-片5
 供试品溶液-2

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速:1.8ml/min
 柱温 : 40°C 波长:250nm
 数据文件名: RC\$SMF-4099 - 0-81/26-2416-2 - zzp-2025083121p-cq3y-rcd-P6-1.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4099 - SMF-4099-RCQX-FX275.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4099 - 20251224-rc-FX275.lcb
 样品瓶号: 2-48
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/24 15:47:21 实验者: wangdan
 处理时间 (V2) : 2025/12/25 10:04:57 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.281	346092	100.000	79835	6447	1.068	--
总计		346092	100.000	79835			

图85 非奈利酮片溶出度测定长期3月HPLC图谱
 自制品(2025083121批)--含0.1%吐温20的醋酸-
 醋酸盐溶液 (pH4.5) 介质介质-片6
 供试品溶液-1




SMF-4099

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速:1.8ml/min
 柱温 : 40°C 波长:250nm
 数据文件名: RC\$SMF-4099 - 0-81/26-2417-2 - zzp-2025083121p-cq3y-rcd-P6-2.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4099 - SMF-4099-RCQX-FX275.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4099 - 20251224-rc-FX275.lcb
 样品瓶号: 2-48
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/24 15:50:44 实验者: wangdan
 处理时间 (V2) : 2025/12/25 10:05:00 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 250nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.281	346187	100.000	79830	6437	1.069	--
总计		346187	100.000	79830			

图86 非奈利酮片溶出度测定长期3月HPLC图谱
 自制品(2025083121批)--含0.1%吐温20的醋酸-
 醋酸盐溶液 (pH4.5) 介质介质-片6
 供试品溶液-2

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.8ml/min
 柱温 : 40 $^{\circ}$ C 波长:250nm
 数据文件名: RC\$SMF-4099 - 0-81/26-2418-2 - zzp-cq3y-rcd-dz2-1.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4099 - SMF-4099-RCQX-FX275.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4099 - 20251224-rc-FX275.lcb
 样品瓶号: 2-27
 进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/24 15:54:09 实验者: wangdan
 处理时间 (V2) : 2025/12/25 10:05:03 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 250nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.280	368542	100.000	84484	6348	1.069	--
总计		368542	100.000	84484			

图87 非奈利酮片溶出度测定长期3月HPLC图谱
 自制品--含0.1%吐温20的醋酸-醋酸盐溶液 (pH4.5) 介质介质
 对照品溶液-2-1

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.8ml/min
 柱温 : 40 $^{\circ}$ C 波长:250nm
 数据文件名: RC\$SMF-4099 - 0-81/26-2419-2 - zzp-cq3y-rcd-dz2-2.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4099 - SMF-4099-RCQX-FX275.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4099 - 20251224-rc-FX275.lcb
 样品瓶号: 2-27
 进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/24 15:57:32 实验者: wangdan
 处理时间 (V2) : 2025/12/25 10:05:06 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.280	368249	100.000	84388	6339	1.069	--
总计		368249	100.000	84388			

图88 非奈利酮片溶出度测定长期3月HPLC图谱
 自制品--含0.1%吐温20的醋酸-醋酸盐溶液 (pH4.5) 介质介质
 对照品溶液-2-2




SMF-4099

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.8ml/min
 柱温 : 40 $^{\circ}$ C 波长:250nm
 数据文件名: RC\$SMF-4099 - 0-81/26-2420-2 - zzp-zjtj3y-rcd-rj.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4099 - SMF-4099-RCQX-FX275.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4099 - 20251224-rc-FX275.lcb
 样品瓶号: 3-9
 进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/24 16:00:55 实验者: wangdan
 处理时间 (V2) : 2025/12/25 10:05:09 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 250nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图89 非奈利酮片溶出度测定长期3月HPLC图谱
 自制品--含0.1%吐温20的醋酸-醋酸盐溶液 (pH4.5) 介质介质
 溶剂

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.8ml/min
 柱温 : 40 $^{\circ}$ C 波长:250nm
 数据文件名: RC\$SMF-4099 - 0-81/26-2421-2 - zzp-zjtj3y-rcd-dz1-1.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4099 - SMF-4099-RCQX-FX275.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4099 - 20251224-rc-FX275.lcb
 样品瓶号: 3-18
 进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/24 16:04:17 实验者: wangdan
 处理时间 (V2) : 2025/12/25 10:05:12 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 250nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.280	366047	100.000	83991	6354	1.069	--
总计		366047	100.000	83991			

图90 非奈利酮片溶出度测定中间条件3月HPLC图谱
 自制品--含0.1%吐温20的醋酸-醋酸盐溶液 (pH4.5) 介质介质
 对照品溶液-1-1

〈样品信息〉

色谱柱 : XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.8ml/min
 柱温 : 40°C 波长:250nm
 数据文件名: RC\$SMF-4099 - 0-81/26-2422-2 - zzp-zjtj3y-rcd-dz1-2.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4099 - SMF-4099-RCQX-FX275.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4099 - 20251224-rc-FX275.lcb
 样品瓶号: 3-18
 进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/24 16:07:40 实验者: wangdan
 处理时间 (V2) : 2025/12/25 10:05:15 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 250nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.280	366266	100.000	83989	6355	1.069	--
总计		366266	100.000	83989			

图91 非奈利酮片溶出度测定中间条件3月HPLC图谱
 自制品--含0.1%吐温20的醋酸-醋酸盐溶液 (pH4.5) 介质介质
 对照品溶液-1-2

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.8ml/min
 柱温 : 40 $^{\circ}$ C 波长:250nm
 数据文件名: RC\$SMF-4099 - 0-81/26-2423-2 - zzp-zjtj3y-rcd-dz1-3.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4099 - SMF-4099-RCQX-FX275.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4099 - 20251224-rc-FX275.lcb
 样品瓶号: 3-18
 进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/24 16:11:02 实验者: wangdan
 处理时间 (V2) : 2025/12/25 10:05:18 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 250nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.280	366370	100.000	84031	6354	1.069	--
总计		366370	100.000	84031			

图92 非奈利酮片溶出度测定中间条件3月HPLC图谱
 自制品--含0.1%吐温20的醋酸-醋酸盐溶液 (pH4.5) 介质介质
 对照品溶液-1-3

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.8ml/min
 柱温 : 40 $^{\circ}$ C 波长:250nm
 数据文件名: RC\$SMF-4099 - 0-81/26-2424-2 - zzp-zjtj3y-rcd-dz1-4.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4099 - SMF-4099-RCQX-FX275.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4099 - 20251224-rc-FX275.lcb
 样品瓶号: 3-18
 进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/24 16:14:24 实验者: wangdan
 处理时间 (V2) : 2025/12/25 10:05:21 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 250nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.279	366471	100.000	83993	6343	1.068	--
总计		366471	100.000	83993			

图93 非奈利酮片溶出度测定中间条件3月HPLC图谱
 自制品--含0.1%吐温20的醋酸-醋酸盐溶液 (pH4.5) 介质介质
 对照品溶液-1-4

〈样品信息〉

色谱柱 : XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.8ml/min
 柱温 : 40 $^{\circ}$ C 波长:250nm
 数据文件名: RC\$SMF-4099 - 0-81/26-2425-2 - zzp-zjtj3y-rcd-dz1-5.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4099 - SMF-4099-RCQX-FX275.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4099 - 20251224-rc-FX275.lcb
 样品瓶号: 3-18
 进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/24 16:17:48 实验者: wangdan
 处理时间 (V2) : 2025/12/25 10:05:24 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 250nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.280	366353	100.000	83999	6351	1.069	--
总计		366353	100.000	83999			

图94 非奈利酮片溶出度测定中间条件3月HPLC图谱
 自制品--含0.1%吐温20的醋酸-醋酸盐溶液 (pH4.5) 介质介质
 对照品溶液-1-5

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.8ml/min
 柱温 : 40 $^{\circ}$ C 波长:250nm
 数据文件名: RC\$SMF-4099 - 0-81/26-2426-2 - zzp-2025082921p-zjtj3y-rcd-P1-1.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4099 - SMF-4099-RCQX-FX275.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4099 - 20251224-rc-FX275.lcb
 样品瓶号: 3-1
 进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/24 16:21:10 实验者: wangdan
 处理时间 (V2) : 2025/12/25 10:05:28 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.281	346500	100.000	80001	6451	1.068	--
总计		346500	100.000	80001			

图95 非奈利酮片溶出度测定中间条件3月HPLC图谱
 自制品(2025082921批)--含0.1%吐温20的醋酸-
 醋酸盐溶液 (pH4.5) 介质介质-片1
 供试品溶液-1




SMF-4099

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速:1.8ml/min
 柱温 : 40°C 波长:250nm
 数据文件名: RC\$SMF-4099 - 0-81/26-2427-2 - zzp-2025082921p-zjtj3y-rcd-P1-2.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4099 - SMF-4099-RCQX-FX275.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4099 - 20251224-rc-FX275.lcb
 样品瓶号: 3-1
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/24 16:24:32 实验者: wangdan
 处理时间 (V2) : 2025/12/25 10:05:31 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.281	336898	100.000	77797	6453	1.068	--
总计		336898	100.000	77797			

图96 非奈利酮片溶出度测定中间条件3月HPLC图谱
 自制品(2025082921批)--含0.1%吐温20的醋酸-
 醋酸盐溶液 (pH4.5) 介质介质-片1
 供试品溶液-2




SMF-4099

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.8ml/min
 柱温 : 40 $^{\circ}$ C 波长:250nm
 数据文件名: RC\$SMF-4099 - 0-81/26-2428-2 - zzp-2025082921p-zjtj3y-rcd-P2-1.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4099 - SMF-4099-RCQX-FX275.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4099 - 20251224-rc-FX275.lcb
 样品瓶号: 3-10
 进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/24 16:27:52 实验者: wangdan
 处理时间 (V2) : 2025/12/25 10:05:34 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 250nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.281	338445	100.000	78127	6452	1.069	--
总计		338445	100.000	78127			

图97 非奈利酮片溶出度测定中间条件3月HPLC图谱
 自制品(2025082921批)--含0.1%吐温20的醋酸-
 醋酸盐溶液 (pH4.5) 介质介质-片2
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.8ml/min
 柱温 : 40 $^{\circ}$ C 波长:250nm
 数据文件名: RC\$SMF-4099 - 0-81/26-2429-2 - zzp-2025082921p-zjtj3y-rcd-P2-2.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4099 - SMF-4099-RCQX-FX275.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4099 - 20251224-rc-FX275.lcb
 样品瓶号: 3-10
 进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/24 16:31:14 实验者: wangdan
 处理时间 (V2) : 2025/12/25 10:05:37 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 250nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.280	337178	100.000	77814	6435	1.068	--
总计		337178	100.000	77814			

图98 非奈利酮片溶出度测定中间条件3月HPLC图谱
 自制品(2025082921批)--含0.1%吐温20的醋酸-
 醋酸盐溶液 (pH4.5) 介质介质-片2
 供试品溶液-2

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速:1.8ml/min
 柱温 : 40°C 波长:250nm
 数据文件名: RC\$SMF-4099 - 0-81/26-2430-2 - zzp-2025082921p-zjtj3y-rcd-P3-1.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4099 - SMF-4099-RCQX-FX275.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4099 - 20251224-rc-FX275.lcb
 样品瓶号: 3-19
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/24 16:34:36 实验者: wangdan
 处理时间 (V2) : 2025/12/25 10:05:40 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 250nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.280	336510	100.000	77714	6440	1.068	--
总计		336510	100.000	77714			

图99 非奈利酮片溶出度测定中间条件3月HPLC图谱
 自制品(2025082921批)--含0.1%吐温20的醋酸-
 醋酸盐溶液 (pH4.5) 介质介质-片3
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.8ml/min
 柱温 : 40 $^{\circ}$ C 波长:250nm
 数据文件名: RC\$SMF-4099 - 0-81/26-2431-2 - zzp-2025082921p-zjtj3y-rcd-P3-2.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4099 - SMF-4099-RCQX-FX275.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4099 - 20251224-rc-FX275.lcb
 样品瓶号: 3-19
 进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/24 16:37:58 实验者: wangdan
 处理时间 (V2) : 2025/12/25 10:05:43 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 250nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.282	336397	100.000	77571	6446	1.069	--
总计		336397	100.000	77571			

图100 非奈利酮片溶出度测定中间条件3月HPLC图谱
 自制品(2025082921批)--含0.1%吐温20的醋酸-
 醋酸盐溶液 (pH4.5) 介质介质-片3
 供试品溶液-2

〈样品信息〉

色谱柱 : XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.8ml/min
 柱温 : 40 $^{\circ}$ C 波长:250nm
 数据文件名: RC\$SMF-4099 - 0-81/26-2432-2 - zzp-2025082921p-zjtj3y-rcd-P4-1.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4099 - SMF-4099-RCQX-FX275.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4099 - 20251224-rc-FX275.lcb
 样品瓶号: 3-28
 进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/24 16:41:20 实验者: wangdan
 处理时间 (V2) : 2025/12/25 10:05:45 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.281	335531	100.000	77427	6448	1.069	--
总计		335531	100.000	77427			

图101 非奈利酮片溶出度测定中间条件3月HPLC图谱
 自制品(2025082921批)--含0.1%吐温20的醋酸-
 醋酸盐溶液 (pH4.5) 介质介质-片4
 供试品溶液-1




SMF-4099

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.8ml/min
 柱温 : 40 $^{\circ}$ C 波长:250nm
 数据文件名: RC\$SMF-4099 - 0-81/26-2433-2 - zzp-2025082921p-zjtj3y-rcd-P4-2.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4099 - SMF-4099-RCQX-FX275.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4099 - 20251224-rc-FX275.lcb
 样品瓶号: 3-28
 进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/24 16:44:42 实验者: wangdan
 处理时间 (V2) : 2025/12/25 10:05:48 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 250nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.281	335889	100.000	77425	6443	1.069	--
总计		335889	100.000	77425			

图102 非奈利酮片溶出度测定中间条件3月HPLC图谱
 自制品(2025082921批)--含0.1%吐温20的醋酸-
 醋酸盐溶液 (pH4.5) 介质介质-片4
 供试品溶液-2

〈样品信息〉

色谱柱 : XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.8ml/min
 柱温 : 40°C 波长:250nm
 数据文件名: RC\$SMF-4099 - 0-81/26-2434-2 - zzp-2025082921p-zjtj3y-rcd-P5-1.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4099 - SMF-4099-RCQX-FX275.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4099 - 20251224-rc-FX275.lcb
 样品瓶号: 3-37
 进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/24 16:48:04 实验者: wangdan
 处理时间 (V2) : 2025/12/25 10:05:51 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 250nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.280	343893	100.000	79408	6441	1.069	--
总计		343893	100.000	79408			

图103 非奈利酮片溶出度测定中间条件3月HPLC图谱
 自制品(2025082921批)--含0.1%吐温20的醋酸-
 醋酸盐溶液 (pH4.5) 介质-片5
 供试品溶液-1

〈样品信息〉

色谱柱 : XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.8ml/min
 柱温 : 40 $^{\circ}$ C 波长:250nm
 数据文件名: RC\$SMF-4099 - 0-81/26-2435-2 - zzp-2025082921p-zjtj3y-rcd-P5-2.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4099 - SMF-4099-RCQX-FX275.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4099 - 20251224-rc-FX275.lcb
 样品瓶号: 3-37
 进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/24 16:51:27 实验者: wangdan
 处理时间 (V2) : 2025/12/25 10:05:54 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.280	343721	100.000	79353	6440	1.068	--
总计		343721	100.000	79353			

图104 非奈利酮片溶出度测定中间条件3月HPLC图谱
 自制品(2025082921批)--含0.1%吐温20的醋酸-
 醋酸盐溶液 (pH4.5) 介质介质-片5
 供试品溶液-2




SMF-4099

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.8ml/min
 柱温 : 40 $^{\circ}$ C 波长:250nm
 数据文件名: RC\$SMF-4099 - 0-81/26-2436-2 - zzp-2025082921p-zjtj3y-rcd-P6-1.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4099 - SMF-4099-RCQX-FX275.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4099 - 20251224-rc-FX275.lcb
 样品瓶号: 3-46
 进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/24 16:54:49 实验者: wangdan
 处理时间 (V2) : 2025/12/25 10:05:57 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 250nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.281	335201	100.000	77373	6446	1.068	--
总计		335201	100.000	77373			

图105 非奈利酮片溶出度测定中间条件3月HPLC图谱
 自制品(2025082921批)--含0.1%吐温20的醋酸-
 醋酸盐溶液 (pH4.5) 介质介质-片6
 供试品溶液-1

〈样品信息〉

色谱柱 : XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.8ml/min
 柱温 : 40 $^{\circ}$ C 波长:250nm
 数据文件名: RC\$SMF-4099 - 0-81/26-2437-2 - zzp-2025082921p-zjtj3y-rcd-P6-2.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4099 - SMF-4099-RCQX-FX275.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4099 - 20251224-rc-FX275.lcb
 样品瓶号: 3-46
 进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/24 16:58:11 实验者: wangdan
 处理时间 (V2) : 2025/12/25 10:06:00 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 250nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.281	335227	100.000	77339	6452	1.069	--
总计		335227	100.000	77339			

图106 非奈利酮片溶出度测定中间条件3月HPLC图谱
 自制品(2025082921批)--含0.1%吐温20的醋酸-
 醋酸盐溶液 (pH4.5) 介质介质-片6
 供试品溶液-2

〈样品信息〉

色谱柱 : XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.8ml/min
 柱温 : 40 $^{\circ}$ C 波长:250nm
 数据文件名: RC\$SMF-4099 - 0-81/26-2438-2 - zzp-2025083021p-zjtj3y-rcd-P1-1.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4099 - SMF-4099-RCQX-FX275.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4099 - 20251224-rc-FX275.lcb
 样品瓶号: 3-2
 进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/24 17:01:31 实验者: wangdan
 处理时间 (V2) : 2025/12/25 10:06:03 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 250nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.280	339983	100.000	78539	6444	1.068	--
总计		339983	100.000	78539			

图107 非奈利酮片溶出度测定中间条件3月HPLC图谱
 自制品(2025083021批)--含0.1%吐温20的醋酸-
 醋酸盐溶液 (pH4.5) 介质介质-片1
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.8ml/min
 柱温 : 40 $^{\circ}$ C 波长:250nm
 数据文件名: RC\$SMF-4099 - 0-81/26-2439-2 - zzp-2025083021p-zjtj3y-rcd-P1-2.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4099 - SMF-4099-RCQX-FX275.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4099 - 20251224-rc-FX275.lcb
 样品瓶号: 3-2
 进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/24 17:04:53 实验者: wangdan
 处理时间 (V2) : 2025/12/25 10:06:06 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 250nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.281	339784	100.000	78494	6456	1.069	--
总计		339784	100.000	78494			

图108 非奈利酮片溶出度测定中间条件3月HPLC图谱
 自制品(2025083021批)--含0.1%吐温20的醋酸-
 醋酸盐溶液 (pH4.5) 介质介质-片1
 供试品溶液-2

〈样品信息〉

色谱柱 : XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.8ml/min
 柱温 : 40°C 波长:250nm
 数据文件名: RC\$SMF-4099 - 0-81/26-2440-2 - zzp-2025083021p-zjtj3y-rcd-P2-1.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4099 - SMF-4099-RCQX-FX275.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4099 - 20251224-rc-FX275.lcb
 样品瓶号: 3-11
 进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/24 17:08:15 实验者: wangdan
 处理时间 (V2) : 2025/12/25 10:06:08 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 250nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.280	342488	100.000	79061	6435	1.068	--
总计		342488	100.000	79061			

图109 非奈利酮片溶出度测定中间条件3月HPLC图谱
 自制品(2025083021批)--含0.1%吐温20的醋酸-
 醋酸盐溶液 (pH4.5) 介质介质-片2
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.8ml/min
 柱温 : 40 $^{\circ}$ C 波长:250nm
 数据文件名: RC\$SMF-4099 - 0-81/26-2441-2 - zzp-2025083021p-zjtj3y-rcd-P2-2.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4099 - SMF-4099-RCQX-FX275.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4099 - 20251224-rc-FX275.lcb
 样品瓶号: 3-11
 进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/24 17:11:36 实验者: wangdan
 处理时间 (V2) : 2025/12/25 10:06:11 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 250nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.281	342400	100.000	79061	6456	1.069	--
总计		342400	100.000	79061			

图110 非奈利酮片溶出度测定中间条件3月HPLC图谱
 自制品(2025083021批)--含0.1%吐温20的醋酸-
 醋酸盐溶液 (pH4.5) 介质介质-片2
 供试品溶液-2

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速:1.8ml/min
 柱温 : 40°C 波长:250nm
 数据文件名: RC\$SMF-4099 - 0-81/26-2442-2 - zzp-2025083021p-zjtj3y-rcd-P3-1.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4099 - SMF-4099-RCQX-FX275.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4099 - 20251224-rc-FX275.lcb
 样品瓶号: 3-20
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/24 17:14:58 实验者: wangdan
 处理时间 (V2) : 2025/12/25 10:06:14 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 250nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.280	344498	100.000	79551	6449	1.068	--
总计		344498	100.000	79551			

图111 非奈利酮片溶出度测定中间条件3月HPLC图谱
 自制品(2025083021批)--含0.1%吐温20的醋酸-
 醋酸盐溶液 (pH4.5) 介质介质-片3
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.8ml/min
 柱温 : 40 $^{\circ}$ C 波长:250nm
 数据文件名: RC\$SMF-4099 - 0-81/26-2443-2 - zzp-2025083021p-zjtj3y-rcd-P3-2.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4099 - SMF-4099-RCQX-FX275.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4099 - 20251224-rc-FX275.lcb
 样品瓶号: 3-20
 进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/24 17:18:21 实验者: wangdan
 处理时间 (V2) : 2025/12/25 10:06:17 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 250nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.281	343093	100.000	79270	6458	1.068	--
总计		343093	100.000	79270			

图112 非奈利酮片溶出度测定中间条件3月HPLC图谱
 自制品(2025083021批)--含0.1%吐温20的醋酸-
 醋酸盐溶液 (pH4.5) 介质介质-片3
 供试品溶液-2

〈样品信息〉

色谱柱 : XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.8ml/min
 柱温 : 40 $^{\circ}$ C 波长:250nm
 数据文件名: RC\$SMF-4099 - 0-81/26-2444-2 - zzp-2025083021p-zjtj3y-rcd-P4-1.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4099 - SMF-4099-RCQX-FX275.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4099 - 20251224-rc-FX275.lcb
 样品瓶号: 3-29
 进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/24 17:21:42 实验者: wangdan
 处理时间 (V2) : 2025/12/25 10:06:20 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 250nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.281	338506	100.000	78217	6460	1.069	--
总计		338506	100.000	78217			

图113 非奈利酮片溶出度测定中间条件3月HPLC图谱
 自制品(2025083021批)--含0.1%吐温20的醋酸-
 醋酸盐溶液 (pH4.5) 介质介质-片4
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.8ml/min
 柱温 : 40 $^{\circ}$ C 波长:250nm
 数据文件名: RC\$SMF-4099 - 0-81/26-2445-2 - zzp-2025083021p-zjtj3y-rcd-P4-2.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4099 - SMF-4099-RCQX-FX275.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4099 - 20251224-rc-FX275.lcb
 样品瓶号: 3-29
 进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/24 17:25:03 实验者: wangdan
 处理时间 (V2) : 2025/12/25 10:06:24 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 250nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.280	338119	100.000	78096	6443	1.069	--
总计		338119	100.000	78096			

图114 非奈利酮片溶出度测定中间条件3月HPLC图谱
 自制品(2025083021批)--含0.1%吐温20的醋酸-
 醋酸盐溶液 (pH4.5) 介质介质-片4
 供试品溶液-2

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速:1.8ml/min
 柱温 : 40°C 波长:250nm
 数据文件名: RC\$SMF-4099 - 0-81/26-2446-2 - zzp-2025083021p-zjtj3y-rcd-P5-1.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4099 - SMF-4099-RCQX-FX275.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4099 - 20251224-rc-FX275.lcb
 样品瓶号: 3-38
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/24 17:28:25 实验者: wangdan
 处理时间 (V2) : 2025/12/25 10:06:26 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 250nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.281	344076	100.000	79447	6452	1.069	--
总计		344076	100.000	79447			

图115 非奈利酮片溶出度测定中间条件3月HPLC图谱
 自制品(2025083021批)--含0.1%吐温20的醋酸-
 醋酸盐溶液 (pH4.5) 介质介质-片5
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速:1.8ml/min
 柱温 : 40°C 波长:250nm
 数据文件名: RC\$SMF-4099 - 0-81/26-2447-2 - zzp-2025083021p-zjtj3y-rcd-P5-2.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4099 - SMF-4099-RCQX-FX275.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4099 - 20251224-rc-FX275.lcb
 样品瓶号: 3-38
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/24 17:31:47 实验者: wangdan
 处理时间 (V2) : 2025/12/25 10:06:30 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 250nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.281	343864	100.000	79464	6463	1.069	--
总计		343864	100.000	79464			

图116 非奈利酮片溶出度测定中间条件3月HPLC图谱
 自制品(2025083021批)--含0.1%吐温20的醋酸-
 醋酸盐溶液 (pH4.5) 介质介质-片5
 供试品溶液-2

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.8ml/min
 柱温 : 40 $^{\circ}$ C 波长:250nm
 数据文件名: RC\$SMF-4099 - 0-81/26-2448-2 - zzp-2025083021p-zjtj3y-rcd-P6-1.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4099 - SMF-4099-RCQX-FX275.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4099 - 20251224-rc-FX275.lcb
 样品瓶号: 3-47
 进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/24 17:35:07 实验者: wangdan
 处理时间 (V2) : 2025/12/25 10:06:33 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 250nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.280	344349	100.000	79539	6445	1.069	--
总计		344349	100.000	79539			

图117 非奈利酮片溶出度测定中间条件3月HPLC图谱
 自制品(2025083021批)--含0.1%吐温20的醋酸-
 醋酸盐溶液 (pH4.5) 介质介质-片6
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速:1.8ml/min
 柱温 : 40°C 波长:250nm
 数据文件名: RC\$SMF-4099 - 0-81/26-2449-2 - zzp-2025083021p-zjtj3y-rcd-P6-2.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4099 - SMF-4099-RCQX-FX275.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4099 - 20251224-rc-FX275.lcb
 样品瓶号: 3-47
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/24 17:38:30 实验者: wangdan
 处理时间 (V2) : 2025/12/25 10:06:36 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 250nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.280	344339	100.000	79547	6447	1.068	--
总计		344339	100.000	79547			

图118 非奈利酮片溶出度测定中间条件3月HPLC图谱
 自制品(2025083021批)--含0.1%吐温20的醋酸-
 醋酸盐溶液 (pH4.5) 介质介质-片6
 供试品溶液-2

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.8ml/min
 柱温 : 40 $^{\circ}$ C 波长:250nm
 数据文件名: RC\$SMF-4099 - 0-81/26-2450-2 - zzp-2025083121p-zjtj3y-rcd-P1-1.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4099 - SMF-4099-RCQX-FX275.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4099 - 20251224-rc-FX275.lcb
 样品瓶号: 3-3
 进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/24 17:41:51 实验者: wangdan
 处理时间 (V2) : 2025/12/25 10:06:38 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 250nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.280	352647	100.000	81483	6453	1.068	--
总计		352647	100.000	81483			

图119 非奈利酮片溶出度测定中间条件3月HPLC图谱
 自制品(2025083121批)--含0.1%吐温20的醋酸-
 醋酸盐溶液 (pH4.5) 介质介质-片1
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.8ml/min
 柱温 : 40 $^{\circ}$ C 波长:250nm
 数据文件名: RC\$SMF-4099 - 0-81/26-2451-2 - zzp-2025083121p-zjtj3y-rcd-P1-2.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4099 - SMF-4099-RCQX-FX275.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4099 - 20251224-rc-FX275.lcb
 样品瓶号: 3-3
 进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/24 17:45:11 实验者: wangdan
 处理时间 (V2) : 2025/12/25 10:06:41 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.280	352790	100.000	81486	6443	1.069	--
总计		352790	100.000	81486			

图120 非奈利酮片溶出度测定中间条件3月HPLC图谱
 自制品(2025083121批)--含0.1%吐温20的醋酸-
 醋酸盐溶液 (pH4.5) 介质介质-片1
 供试品溶液-2




SMF-4099

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速:1.8ml/min
 柱温 : 40°C 波长:250nm
 数据文件名: RC\$SMF-4099 - 0-81/26-2452-2 - zzp-2025083121p-zjtj3y-rcd-P2-1.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4099 - SMF-4099-RCQX-FX275.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4099 - 20251224-rc-FX275.lcb
 样品瓶号: 3-12
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/24 17:48:32 实验者: wangdan
 处理时间 (V2) : 2025/12/25 10:06:44 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 250nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.281	347882	100.000	80302	6459	1.069	--
总计		347882	100.000	80302			

图121 非奈利酮片溶出度测定中间条件3月HPLC图谱
 自制品(2025083121批)--含0.1%吐温20的醋酸-
 醋酸盐溶液 (pH4.5) 介质介质-片2
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.8ml/min
 柱温 : 40 $^{\circ}$ C 波长:250nm
 数据文件名: RC\$SMF-4099 - 0-81/26-2453-2 - zzp-2025083121p-zjtj3y-rcd-P2-2.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4099 - SMF-4099-RCQX-FX275.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4099 - 20251224-rc-FX275.lcb
 样品瓶号: 3-12
 进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/24 17:51:55 实验者: wangdan
 处理时间 (V2) : 2025/12/25 10:06:47 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 250nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.281	347781	100.000	80286	6452	1.068	--
总计		347781	100.000	80286			

图122 非奈利酮片溶出度测定中间条件3月HPLC图谱
 自制品(2025083121批)--含0.1%吐温20的醋酸-
 醋酸盐溶液 (pH4.5) 介质介质-片2
 供试品溶液-2

〈样品信息〉

色谱柱 : XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.8ml/min
 柱温 : 40 $^{\circ}$ C 波长:250nm
 数据文件名: RC\$SMF-4099 - 0-81/26-2454-2 - zzp-2025083121p-zjtj3y-rcd-P3-1.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4099 - SMF-4099-RCQX-FX275.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4099 - 20251224-rc-FX275.lcb
 样品瓶号: 3-21
 进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/24 17:55:17 实验者: wangdan
 处理时间 (V2) : 2025/12/25 10:06:50 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 250nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.281	347356	100.000	80191	6458	1.068	--
总计		347356	100.000	80191			

图123 非奈利酮片溶出度测定中间条件3月HPLC图谱
 自制品(2025083121批)--含0.1%吐温20的醋酸-
 醋酸盐溶液 (pH4.5) 介质介质-片3
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.8ml/min
 柱温 : 40 $^{\circ}$ C 波长:250nm
 数据文件名: RC\$SMF-4099 - 0-81/26-2455-2 - zzp-2025083121p-zjtj3y-rcd-P3-2.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4099 - SMF-4099-RCQX-FX275.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4099 - 20251224-rc-FX275.lcb
 样品瓶号: 3-21
 进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/24 17:58:38 实验者: wangdan
 处理时间 (V2) : 2025/12/25 10:06:53 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.281	347256	100.000	80203	6455	1.068	--
总计		347256	100.000	80203			

图124 非奈利酮片溶出度测定中间条件3月HPLC图谱
 自制品(2025083121批)--含0.1%吐温20的醋酸-
 醋酸盐溶液 (pH4.5) 介质介质-片3
 供试品溶液-2




SMF-4099

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速:1.8ml/min
 柱温 : 40°C 波长:250nm
 数据文件名: RC\$SMF-4099 - 0-81/26-2456-2 - zzp-2025083121p-zjtj3y-rcd-P4-1.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4099 - SMF-4099-RCQX-FX275.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4099 - 20251224-rc-FX275.lcb
 样品瓶号: 3-30
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/24 18:02:00 实验者: wangdan
 处理时间 (V2) : 2025/12/25 10:06:56 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 250nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.281	342750	100.000	79156	6460	1.068	--
总计		342750	100.000	79156			

图125 非奈利酮片溶出度测定中间条件3月HPLC图谱
 自制品(2025083121批)--含0.1%吐温20的醋酸-
 醋酸盐溶液 (pH4.5) 介质介质-片4
 供试品溶液-1

〈样品信息〉

色谱柱 : XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.8ml/min
 柱温 : 40 $^{\circ}$ C 波长:250nm
 数据文件名: RC\$SMF-4099 - 0-81/26-2457-2 - zzp-2025083121p-zjtj3y-rcd-P4-2.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4099 - SMF-4099-RCQX-FX275.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4099 - 20251224-rc-FX275.lcb
 样品瓶号: 3-30
 进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/24 18:05:22 实验者: wangdan
 处理时间 (V2) : 2025/12/25 10:06:59 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 250nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.281	342950	100.000	79115	6442	1.068	--
总计		342950	100.000	79115			

图126 非奈利酮片溶出度测定中间条件3月HPLC图谱
 自制品(2025083121批)--含0.1%吐温20的醋酸-
 醋酸盐溶液 (pH4.5) 介质介质-片4
 供试品溶液-2

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.8ml/min
 柱温 : 40 $^{\circ}$ C 波长:250nm
 数据文件名: RC\$SMF-4099 - 0-81/26-2458-2 - zzp-2025083121p-zjtj3y-rcd-P5-1.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4099 - SMF-4099-RCQX-FX275.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4099 - 20251224-rc-FX275.lcb
 样品瓶号: 3-39
 进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/24 18:08:43 实验者: wangdan
 处理时间 (V2) : 2025/12/25 10:07:02 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.281	348104	100.000	80406	6463	1.069	--
总计		348104	100.000	80406			

图127 非奈利酮片溶出度测定中间条件3月HPLC图谱
 自制品(2025083121批)--含0.1%吐温20的醋酸-
 醋酸盐溶液 (pH4.5) 介质介质-片5
 供试品溶液-1




SMF-4099

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.8ml/min
 柱温 : 40 $^{\circ}$ C 波长:250nm
 数据文件名: RC\$SMF-4099 - 0-81/26-2459-2 - zzp-2025083121p-zjtj3y-rcd-P5-2.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4099 - SMF-4099-RCQX-FX275.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4099 - 20251224-rc-FX275.lcb
 样品瓶号: 3-39
 进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/24 18:12:05 实验者: wangdan
 处理时间 (V2) : 2025/12/25 10:07:04 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 250nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.281	348230	100.000	80405	6453	1.069	--
总计		348230	100.000	80405			

图128 非奈利酮片溶出度测定中间条件3月HPLC图谱
 自制品(2025083121批)--含0.1%吐温20的醋酸-
 醋酸盐溶液 (pH4.5) 介质介质-片5
 供试品溶液-2

〈样品信息〉

色谱柱 : XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.8ml/min
 柱温 : 40°C 波长:250nm
 数据文件名: RC\$SMF-4099 - 0-81/26-2460-2 - zzp-2025083121p-zjtj3y-rcd-P6-1.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4099 - SMF-4099-RCQX-FX275.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4099 - 20251224-rc-FX275.lcb
 样品瓶号: 3-48
 进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/24 18:15:27 实验者: wangdan
 处理时间 (V2) : 2025/12/25 10:07:07 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 250nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.281	343229	100.000	79259	6455	1.068	--
总计		343229	100.000	79259			

图129 非奈利酮片溶出度测定中间条件3月HPLC图谱
 自制品(2025083121批)--含0.1%吐温20的醋酸-
 醋酸盐溶液 (pH4.5) 介质-片6
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.8ml/min
 柱温 : 40 $^{\circ}$ C 波长:250nm
 数据文件名: RC\$SMF-4099 - 0-81/26-2461-2 - zzp-2025083121p-zjtj3y-rcd-P6-2.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4099 - SMF-4099-RCQX-FX275.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4099 - 20251224-rc-FX275.lcb
 样品瓶号: 3-48
 进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/24 18:18:48 实验者: wangdan
 处理时间 (V2) : 2025/12/25 10:07:10 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 250nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.281	343393	100.000	79284	6461	1.068	--
总计		343393	100.000	79284			

图130 非奈利酮片溶出度测定中间条件3月HPLC图谱
 自制品(2025083121批)--含0.1%吐温20的醋酸-
 醋酸盐溶液 (pH4.5) 介质介质-片6
 供试品溶液-2

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速:1.8ml/min
 柱温 : 40°C 波长:250nm
 数据文件名: RC\$SMF-4099 - 0-81/26-2462-2 - zzp-zjtj3y-rcd-dz2-1.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4099 - SMF-4099-RCQX-FX275.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4099 - 20251224-rc-FX275.lcb
 样品瓶号: 3-27
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/24 18:22:11 实验者: wangdan
 处理时间 (V2) : 2025/12/25 10:07:13 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 250nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.279	368402	100.000	84470	6361	1.069	--
总计		368402	100.000	84470			

图131 非奈利酮片溶出度测定中间条件3月HPLC图谱
 自制品--含0.1%吐温20的醋酸-醋酸盐溶液 (pH4.5) 介质介质
 对照品溶液-2-1

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.8ml/min
 柱温 : 40 $^{\circ}$ C 波长:250nm
 数据文件名: RC\$SMF-4099 - 0-81/26-2463-2 - zzp-zjtj3y-rcd-dz2-2.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4099 - SMF-4099-RCQX-FX275.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4099 - 20251224-rc-FX275.lcb
 样品瓶号: 3-27
 进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/24 18:25:33 实验者: wangdan
 处理时间 (V2) : 2025/12/25 10:07:16 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.279	368658	100.000	84563	6352	1.068	--
总计		368658	100.000	84563			

图132 非奈利酮片溶出度测定中间条件3月HPLC图谱
 自制品--含0.1%吐温20的醋酸-醋酸盐溶液 (pH4.5) 介质介质
 对照品溶液-2-2