



SMF-227

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$SMF-227 - 0-26/18-1039-2 - zzp-25120901p-pH1.2jz-150mg10mg-rcqx-lf100z-rj.lcd

方法文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-RC-FX267.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-20251216-FX267.lcb

样品瓶号 : 1-9

进样体积 : 10μl

进样时间 : 2025/12/16 12:02:47

处理时间 (V2) : 2025/12/17 09:58:23

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 1.0ml/min



波长:237nm/250nm

版本号:6.115

实验者:wangdan

处理者:wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

检测器A Ch2 250nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							



SMF-227

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$SMF-227 - 0-26/18-1040-2 - zzp-25120901p-pH1.2jz-150mg10mg-rcqx-lf100z-dz1-1.lcd

方法文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-RC-FX267.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-20251216-FX267.lcb

样品瓶号 : 1-18

进样体积 : 10μl

进样时间 : 2025/12/16 12:06:10

处理时间 (V2) : 2025/12/17 09:58:28

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 1.0ml/min


波长:237nm/250nm

版本号:6.115

实验者:wangdan

处理者:wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.856	857231	100.000	149956	2472	1.132	--
总计		857231	100.000	149956			

检测器A Ch2 250nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.177	63011	100.000	12773	1340	1.254	--
总计		63011	100.000	12773			



SMF-227

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$SMF-227 - 0-26/18-1041-2 - zzp-25120901p-pH1.2jz-150mg10mg-rcqx-lf100z-dz1-2.lcd

方法文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-RC-FX267.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-20251216-FX267.lcb

样品瓶号 : 1-18

进样体积 : 10μl

进样时间 : 2025/12/16 12:09:34

处理时间 (V2) : 2025/12/17 09:58:31

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 1.0ml/min

波长:237nm/250nm


版本号:6.115

实验者:wangdan


处理者:wangdan

<色谱图>

mV



mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.856	856187	100.000	149895	2474	1.132	--
总计		856187	100.000	149895			

检测器A Ch2 250nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.177	62937	100.000	12782	1347	1.256	--
总计		62937	100.000	12782			



SMF-227

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$SMF-227 - 0-26/18-1042-2 - zzp-25120901p-pH1.2jz-150mg10mg-rcqx-lf100z-dz1-3.lcd

方法文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-RC-FX267.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-20251216-FX267.lcb

样品瓶号 : 1-18

进样体积 : 10μl

进样时间 : 2025/12/16 12:12:57

处理时间 (V2) : 2025/12/17 09:58:35

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 1.0ml/min



波长:237nm/250nm

版本号:6.115

实验者:wangdan

处理者:wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.859	856868	100.000	148474	2462	1.136	--
总计		856868	100.000	148474			

检测器A Ch2 250nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.178	63032	100.000	12777	1335	1.257	--
总计		63032	100.000	12777			



SMF-227

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$SMF-227 - 0-26/18-1043-2 - zzp-25120901p-pH1.2jz-150mg10mg-rcqx-lf100z-dz1-4.lcd

方法文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-RC-FX267.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-20251216-FX267.lcb

样品瓶号 : 1-18

进样体积 : 10μl

进样时间 : 2025/12/16 12:16:20

处理时间 (V2) : 2025/12/17 09:58:38

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 1.0ml/min



波长:237nm/250nm

版本号:6.115

实验者:wangdan

处理者:wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.858	855546	100.000	149340	2478	1.132	--
总计		855546	100.000	149340			

检测器A Ch2 250nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.178	62905	100.000	12806	1346	1.254	--
总计		62905	100.000	12806			



SMF-227

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$SMF-227 - 0-26/18-1044-2 - zzp-25120901p-pH1.2jz-150mg10mg-rcqx-lf100z-dz1-5.lcd

方法文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-RC-FX267.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-20251216-FX267.lcb

样品瓶号 : 1-18

进样体积 : 10μl

进样时间 : 2025/12/16 12:19:44

处理时间 (V2) : 2025/12/17 09:58:41

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 1.0ml/min



波长:237nm/250nm

版本号:6.115

实验者:wangdan

处理者:wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.855	855522	100.000	149782	2470	1.133	--
总计		855522	100.000	149782			

检测器A Ch2 250nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.176	62913	100.000	12735	1344	1.259	--
总计		62913	100.000	12735			



SMF-227

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$SMF-227 - 0-26/18-1045-2 - zzp-25120901p-pH1.2jz-150mg10mg-rcqx-lf100z-p1-5min.lcd

方法文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-RC-FX267.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-20251216-FX267.lcb

样品瓶号 : 1-1

进样体积 : 10μl

进样时间 : 2025/12/16 12:23:06

处理时间 (V2) : 2025/12/17 09:58:44

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 1.0ml/min



波长:237nm/250nm

版本号:6.115

实验者:wangdan

处理者:wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.855	94234	100.000	16517	2469	1.132	--
总计		94234	100.000	16517			

检测器A Ch2 250nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							



SMF-227

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$SMF-227 - 0-26/18-1046-2 - zzp-25120901p-pH1.2jz-150mg10mg-rcqx-lf100z-p2-5min.lcd

方法文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-RC-FX267.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-20251216-FX267.lcb

样品瓶号 : 1-10

进样体积 : 10μl

进样时间 : 2025/12/16 12:26:28

处理时间 (V2) : 2025/12/17 09:58:47

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 1.0ml/min



波长:237nm/250nm

版本号:6.115

实验者:wangdan

处理者:wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.856	275556	100.000	48174	2460	1.132	--
总计		275556	100.000	48174			

检测器A Ch2 250nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							



SMF-227

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$SMF-227 - 0-26/18-1047-2 - zzp-25120901p-pH1.2jz-150mg10mg-rcqx-lf100z-p3-5min.lcd

方法文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-RC-FX267.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-20251216-FX267.lcb

样品瓶号 : 1-19

进样体积 : 10μl

进样时间 : 2025/12/16 12:29:50

处理时间 (V2) : 2025/12/17 09:58:50

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 1.0ml/min

波长:237nm/250nm


版本号:6.115

实验者:wangdan


处理者:wangdan

<色谱图>

mV



mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.856	91455	100.000	16088	2490	1.129	--
总计		91455	100.000	16088			

检测器A Ch2 250nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							



SMF-227

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$SMF-227 - 0-26/18-1048-2 - zzp-25120901p-pH1.2jz-150mg10mg-rcqx-lf100z-p4-5min.lcd

方法文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-RC-FX267.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-20251216-FX267.lcb

样品瓶号 : 1-28

进样体积 : 10μl

进样时间 : 2025/12/16 12:33:12

处理时间 (V2) : 2025/12/17 09:58:53

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 1.0ml/min

波长:237nm/250nm


版本号:6.115

实验者:wangdan


处理者:wangdan

<色谱图>

mV



mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.856	117927	100.000	20625	2464	1.134	--
总计		117927	100.000	20625			

检测器A Ch2 250nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							



SMF-227

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$SMF-227 - 0-26/18-1049-2 - zzp-25120901p-pH1.2jz-150mg10mg-rcqx-lf100z-p5-5min.lcd

方法文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-RC-FX267.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-20251216-FX267.lcb

样品瓶号 : 1-37

进样体积 : 10μl

进样时间 : 2025/12/16 12:36:34

处理时间 (V2) : 2025/12/17 09:58:56

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 1.0ml/min



波长:237nm/250nm

版本号:6.115

实验者:wangdan

处理者:wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.858	157860	100.000	27470	2460	1.133	--
总计		157860	100.000	27470			

检测器A Ch2 250nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							



SMF-227

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$SMF-227 - 0-26/18-1050-2 - zzp-25120901p-pH1.2jz-150mg10mg-rcqx-lf100z-p6-5min.lcd

方法文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-RC-FX267.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-20251216-FX267.lcb

样品瓶号 : 1-46

进样体积 : 10μl

进样时间 : 2025/12/16 12:39:56

处理时间 (V2) : 2025/12/17 09:58:59

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 1.0ml/min



波长:237nm/250nm

版本号:6.115

实验者:wangdan

处理者:wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.859	93163	100.000	16149	2460	1.132	--
总计		93163	100.000	16149			

检测器A Ch2 250nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							



SMF-227

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$SMF-227 - 0-26/18-1051-2 - zzp-25120901p-pH1.2jz-150mg10mg-rcqx-lf100z-p1-10min.lcd

方法文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-RC-FX267.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-20251216-FX267.lcb

样品瓶号 : 1-2

进样体积 : 10μl

进样时间 : 2025/12/16 12:43:19

处理时间 (V2) : 2025/12/17 09:59:02

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 1.0ml/min



波长:237nm/250nm

版本号:6.115

实验者:wangdan

处理者:wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.856	601288	100.000	105205	2466	1.132	--
总计		601288	100.000	105205			

检测器A Ch2 250nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.176	43371	100.000	8750	1324	1.255	--
总计		43371	100.000	8750			



SMF-227

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$SMF-227 - 0-26/18-1052-2 - zzp-25120901p-pH1.2jz-150mg10mg-rcqx-lf100z-p2-10min.lcd

方法文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-RC-FX267.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-20251216-FX267.lcb

样品瓶号 : 1-11

进样体积 : 10μl

进样时间 : 2025/12/16 12:46:41

处理时间 (V2) : 2025/12/17 09:59:06

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 1.0ml/min



波长:237nm/250nm

版本号:6.115

实验者:wangdan

处理者:wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.855	690635	100.000	120520	2456	1.132	--
总计		690635	100.000	120520			

检测器A Ch2 250nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.176	29870	100.000	5987	1314	1.265	--
总计		29870	100.000	5987			



SMF-227

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$SMF-227 - 0-26/18-1053-2 - zzp-25120901p-pH1.2jz-150mg10mg-rcqx-lf100z-p3-10min.lcd

方法文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-RC-FX267.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-20251216-FX267.lcb

样品瓶号 : 1-20

进样体积 : 10μl

进样时间 : 2025/12/16 12:50:03

处理时间 (V2) : 2025/12/17 09:59:08

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 1.0ml/min



波长:237nm/250nm

版本号:6.115

实验者:wangdan

处理者:wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.856	512897	100.000	89585	2464	1.132	--
总计		512897	100.000	89585			

检测器A Ch2 250nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.176	30007	100.000	6045	1324	1.259	--
总计		30007	100.000	6045			



SMF-227

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$SMF-227 - 0-26/18-1054-2 - zzp-25120901p-pH1.2jz-150mg10mg-rcqx-lf100z-p4-10min.lcd

方法文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-RC-FX267.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-20251216-FX267.lcb

样品瓶号 : 1-29

进样体积 : 10μl

进样时间 : 2025/12/16 12:53:26

处理时间 (V2) : 2025/12/17 09:59:11

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 1.0ml/min



波长:237nm/250nm

版本号:6.115

实验者:wangdan

处理者:wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.857	591617	100.000	103300	2466	1.133	--
总计		591617	100.000	103300			

检测器A Ch2 250nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.176	31006	100.000	6236	1321	1.251	--
总计		31006	100.000	6236			



SMF-227

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$SMF-227 - 0-26/18-1055-2 - zzp-25120901p-pH1.2jz-150mg10mg-rcqx-lf100z-p5-10min.lcd

方法文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-RC-FX267.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-20251216-FX267.lcb

样品瓶号 : 1-38

进样体积 : 10μl

进样时间 : 2025/12/16 12:56:50

处理时间 (V2) : 2025/12/17 09:59:15

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 1.0ml/min



波长:237nm/250nm

版本号:6.115

实验者:wangdan

处理者:wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.857	569778	100.000	99285	2457	1.133	--
总计		569778	100.000	99285			

检测器A Ch2 250nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.177	19227	100.000	3871	1320	1.256	--
总计		19227	100.000	3871			



SMF-227

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$SMF-227 - 0-26/18-1056-2 - zzp-25120901p-pH1.2jz-150mg10mg-rcqx-lf100z-p6-10min.lcd

方法文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-RC-FX267.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-20251216-FX267.lcb

样品瓶号 : 1-47

进样体积 : 10μl

进样时间 : 2025/12/16 13:00:12

处理时间 (V2) : 2025/12/17 09:59:18

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 1.0ml/min

波长:237nm/250nm


版本号:6.115

实验者:wangdan


处理者:wangdan

<色谱图>

mV



mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.859	545671	100.000	94437	2451	1.135	--
总计		545671	100.000	94437			

检测器A Ch2 250nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.177	34663	100.000	6942	1306	1.261	--
总计		34663	100.000	6942			



SMF-227

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$SMF-227 - 0-26/18-1057-2 - zzp-25120901p-pH1.2jz-150mg10mg-rcqx-lf100z-p1-15min.lcd

方法文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-RC-FX267.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-20251216-FX267.lcb

样品瓶号 : 1-3

进样体积 : 10μl

进样时间 : 2025/12/16 13:03:35

处理时间 (V2) : 2025/12/17 09:59:21

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 1.0ml/min



波长:237nm/250nm

版本号:6.115

实验者:wangdan

处理者:wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.859	773844	100.000	135173	2489	1.127	--
总计		773844	100.000	135173			

检测器A Ch2 250nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.178	53044	100.000	10822	1347	1.244	--
总计		53044	100.000	10822			





SMF-227

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温 : 40℃
数据文件名: RC\$SMF-227 - 0-26/18-1058-2 - zzp-25120901p-pH1.2jz-150mg10mg-rcqx-lf100z-p2-15min.lcd
方法文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-RC-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-20251216-FX267.lcb
样品瓶号 : 1-12
进样体积 : 10μl
进样时间 : 2025/12/16 13:06:57
处理时间 (V2) : 2025/12/17 09:59:24
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 1.0ml/min
波长:237nm/250nm
版本号:6.115
实验者:wangdan
处理者:wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.855	845638	100.000	147515	2453	1.134	--
总计		845638	100.000	147515			

检测器A Ch2 250nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.176	47287	100.000	9459	1312	1.260	--
总计		47287	100.000	9459			



SMF-227

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$SMF-227 - 0-26/18-1059-2 - zzp-25120901p-pH1.2jz-150mg10mg-rcqx-lf100z-p3-15min.lcd

方法文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-RC-FX267.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-20251216-FX267.lcb

样品瓶号 : 1-21

进样体积 : 10μl

进样时间 : 2025/12/16 13:10:21

处理时间 (V2) : 2025/12/17 09:59:27

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 1.0ml/min



波长:237nm/250nm

版本号:6.115

实验者:wangdan

处理者:wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.856	818402	100.000	143063	2464	1.131	--
总计		818402	100.000	143063			

检测器A Ch2 250nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.176	50065	100.000	10078	1321	1.247	--
总计		50065	100.000	10078			



SMF-227

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$SMF-227 - 0-26/18-1060-2 - zzp-25120901p-pH1.2jz-150mg10mg-rcqx-lf100z-p4-15min.lcd

方法文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-RC-FX267.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-20251216-FX267.lcb

样品瓶号 : 1-30

进样体积 : 10μl

进样时间 : 2025/12/16 13:13:43

处理时间 (V2) : 2025/12/17 09:59:30

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 1.0ml/min



波长:237nm/250nm

版本号:6.115

实验者:wangdan

处理者:wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.857	842595	100.000	146377	2448	1.135	--
总计		842595	100.000	146377			

检测器A Ch2 250nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.177	49907	100.000	10012	1312	1.262	--
总计		49907	100.000	10012			



SMF-227

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$SMF-227 - 0-26/18-1061-2 - zzp-25120901p-pH1.2jz-150mg10mg-rcqx-lf100z-p5-15min.lcd

方法文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-RC-FX267.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-20251216-FX267.lcb

样品瓶号 : 1-39

进样体积 : 10μl

进样时间 : 2025/12/16 13:17:05

处理时间 (V2) : 2025/12/17 09:59:33

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 1.0ml/min



波长:237nm/250nm

版本号:6.115

实验者:wangdan

处理者:wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.856	855819	100.000	149091	2452	1.134	--
总计		855819	100.000	149091			

检测器A Ch2 250nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.176	34768	100.000	6955	1310	1.260	--
总计		34768	100.000	6955			



SMF-227

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$SMF-227 - 0-26/18-1062-2 - zzp-25120901p-pH1.2jz-150mg10mg-rcqx-lf100z-p6-15min.lcd

方法文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-RC-FX267.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-20251216-FX267.lcb

样品瓶号 : 1-48

进样体积 : 10μl

进样时间 : 2025/12/16 13:20:28

处理时间 (V2) : 2025/12/17 09:59:36

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 1.0ml/min

波长:237nm/250nm


版本号:6.115

实验者:wangdan


处理者:wangdan

<色谱图>

mV



mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.857	837167	100.000	145804	2454	1.133	--
总计		837167	100.000	145804			

检测器A Ch2 250nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.176	52924	100.000	10629	1313	1.254	--
总计		52924	100.000	10629			



SMF-227

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$SMF-227 - 0-26/18-1063-2 - zzp-25120901p-pH1.2jz-150mg10mg-rcqx-lf100z-p1-20min.lcd

方法文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-RC-FX267.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-20251216-FX267.lcb

样品瓶号 : 1-4

进样体积 : 10μl

进样时间 : 2025/12/16 13:23:51

处理时间 (V2) : 2025/12/17 09:59:39

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 1.0ml/min



波长:237nm/250nm

版本号:6.115

实验者:wangdan

处理者:wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.858	837629	100.000	145883	2468	1.132	--
总计		837629	100.000	145883			

检测器A Ch2 250nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.177	60786	100.000	12305	1329	1.251	--
总计		60786	100.000	12305			



SMF-227

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$SMF-227 - 0-26/18-1064-2 - zzp-25120901p-pH1.2jz-150mg10mg-rcqx-lf100z-p2-20min.lcd

方法文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-RC-FX267.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-20251216-FX267.lcb

样品瓶号 : 1-13

进样体积 : 10μl

进样时间 : 2025/12/16 13:27:13

处理时间 (V2) : 2025/12/17 09:59:43

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 1.0ml/min

波长:237nm/250nm


版本号:6.115

实验者:wangdan


处理者:wangdan

<色谱图>

mV



mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.860	864689	100.000	149851	2458	1.135	--
总计		864689	100.000	149851			

检测器A Ch2 250nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.178	54903	100.000	11062	1316	1.259	--
总计		54903	100.000	11062			



SMF-227

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$SMF-227 - 0-26/18-1065-2 - zzp-25120901p-pH1.2jz-150mg10mg-rcqx-lf100z-p3-20min.lcd

方法文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-RC-FX267.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-20251216-FX267.lcb

样品瓶号 : 1-22

进样体积 : 10μl

进样时间 : 2025/12/16 13:30:36

处理时间 (V2) : 2025/12/17 09:59:46

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 1.0ml/min



波长:237nm/250nm

版本号:6.115

实验者:wangdan

处理者:wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.856	843289	100.000	147652	2471	1.131	--
总计		843289	100.000	147652			

检测器A Ch2 250nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.176	55870	100.000	11286	1330	1.256	--
总计		55870	100.000	11286			



SMF-227

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$SMF-227 - 0-26/18-1066-2 - zzp-25120901p-pH1.2jz-150mg10mg-rcqx-lf100z-p4-20min.lcd

方法文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-RC-FX267.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-20251216-FX267.lcb

样品瓶号 : 1-31

进样体积 : 10μl

进样时间 : 2025/12/16 13:33:58

处理时间 (V2) : 2025/12/17 09:59:49

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 1.0ml/min



波长:237nm/250nm

版本号:6.115

实验者:wangdan

处理者:wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.856	865937	100.000	151503	2468	1.131	--
总计		865937	100.000	151503			

检测器A Ch2 250nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.176	55265	100.000	11109	1324	1.257	--
总计		55265	100.000	11109			



SMF-227

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$SMF-227 - 0-26/18-1067-2 - zzp-25120901p-pH1.2jz-150mg10mg-rcqx-lf100z-p5-20min.lcd

方法文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-RC-FX267.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-20251216-FX267.lcb

样品瓶号 : 1-40

进样体积 : 10μl

进样时间 : 2025/12/16 13:37:21

处理时间 (V2) : 2025/12/17 09:59:52

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 1.0ml/min



波长:237nm/250nm

版本号:6.115

实验者:wangdan

处理者:wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.856	872978	100.000	153139	2478	1.128	--
总计		872978	100.000	153139			

检测器A Ch2 250nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.176	40791	100.000	8249	1330	1.247	--
总计		40791	100.000	8249			



SMF-227

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$SMF-227 - 0-26/18-1068-2 - zzp-25120901p-pH1.2jz-150mg10mg-rcqx-lf100z-p6-20min.lcd

方法文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-RC-FX267.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-20251216-FX267.lcb

样品瓶号 : 1-49

进样体积 : 10μl

进样时间 : 2025/12/16 13:40:43

处理时间 (V2) : 2025/12/17 09:59:55

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 1.0ml/min



波长:237nm/250nm

版本号:6.115

实验者:wangdan

处理者:wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.856	873553	100.000	152809	2468	1.130	--
总计		873553	100.000	152809			

检测器A Ch2 250nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.176	59268	100.000	11937	1320	1.252	--
总计		59268	100.000	11937			



SMF-227

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$SMF-227 - 0-26/18-1069-2 - zzp-25120901p-pH1.2jz-150mg10mg-rcqx-lf100z-p1-30min.lcd

方法文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-RC-FX267.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-20251216-FX267.lcb

样品瓶号 : 1-5

进样体积 : 10μl

进样时间 : 2025/12/16 13:44:06

处理时间 (V2) : 2025/12/17 09:59:58

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 1.0ml/min


波长:237nm/250nm

版本号:6.115

实验者:wangdan

处理者:wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.857	832453	100.000	144787	2452	1.135	--
总计		832453	100.000	144787			

检测器A Ch2 250nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.177	65989	100.000	13266	1316	1.255	--
总计		65989	100.000	13266			



SMF-227

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$SMF-227 - 0-26/18-1070-2 - zzp-25120901p-pH1.2jz-150mg10mg-rcqx-lf100z-p2-30min.lcd

方法文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-RC-FX267.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-20251216-FX267.lcb

样品瓶号 : 1-14

进样体积 : 10μl

进样时间 : 2025/12/16 13:47:28

处理时间 (V2) : 2025/12/17 10:00:01

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 1.0ml/min

波长:237nm/250nm


版本号:6.115

实验者:wangdan


处理者:wangdan

<色谱图>

mV



mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.858	848635	100.000	147420	2459	1.134	--
总计		848635	100.000	147420			

检测器A Ch2 250nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.177	60999	100.000	12280	1317	1.255	--
总计		60999	100.000	12280			



SMF-227

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$SMF-227 - 0-26/18-1071-2 - zzp-25120901p-pH1.2jz-150mg10mg-rcqx-lf100z-p3-30min.lcd

方法文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-RC-FX267.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-20251216-FX267.lcb

样品瓶号 : 1-23

进样体积 : 10μl

进样时间 : 2025/12/16 13:50:50

处理时间 (V2) : 2025/12/17 10:00:04

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 1.0ml/min



波长:237nm/250nm

版本号:6.115

实验者:wangdan

处理者:wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.861	861081	100.000	149162	2450	1.136	--
总计		861081	100.000	149162			

检测器A Ch2 250nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.178	63030	100.000	12710	1316	1.257	--
总计		63030	100.000	12710			



SMF-227

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$SMF-227 - 0-26/18-1072-2 - zzp-25120901p-pH1.2jz-150mg10mg-rcqx-lf100z-p4-30min.lcd

方法文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-RC-FX267.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-20251216-FX267.lcb

样品瓶号 : 1-32

进样体积 : 10μl

进样时间 : 2025/12/16 13:54:12

处理时间 (V2) : 2025/12/17 10:00:07

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 1.0ml/min



波长:237nm/250nm

版本号:6.115

实验者:wangdan

处理者:wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.860	871766	100.000	151867	2478	1.132	--
总计		871766	100.000	151867			

检测器A Ch2 250nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.179	62237	100.000	12598	1328	1.251	--
总计		62237	100.000	12598			



SMF-227

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$SMF-227 - 0-26/18-1073-2 - zzp-25120901p-pH1.2jz-150mg10mg-rcqx-lf100z-p5-30min.lcd

方法文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-RC-FX267.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-20251216-FX267.lcb

样品瓶号 : 1-41

进样体积 : 10μl

进样时间 : 2025/12/16 13:57:35

处理时间 (V2) : 2025/12/17 10:00:10

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 1.0ml/min



波长:237nm/250nm

版本号:6.115

实验者:wangdan

处理者:wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.855	878021	100.000	153595	2463	1.131	--
总计		878021	100.000	153595			

检测器A Ch2 250nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.176	51042	100.000	10268	1317	1.252	--
总计		51042	100.000	10268			



SMF-227

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$SMF-227 - 0-26/18-1074-2 - zzp-25120901p-pH1.2jz-150mg10mg-rcqx-lf100z-p6-30min.lcd

方法文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-RC-FX267.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-20251216-FX267.lcb

样品瓶号 : 1-50

进样体积 : 10μl

进样时间 : 2025/12/16 14:00:56

处理时间 (V2) : 2025/12/17 10:00:13

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 1.0ml/min



波长:237nm/250nm

版本号:6.115

实验者:wangdan

处理者:wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.856	864525	100.000	151036	2463	1.133	--
总计		864525	100.000	151036			

检测器A Ch2 250nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.176	64197	100.000	12929	1324	1.256	--
总计		64197	100.000	12929			



SMF-227

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$SMF-227 - 0-26/18-1075-2 - zzp-25120901p-pH1.2jz-150mg10mg-rcqx-lf100z-p1-45min.lcd

方法文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-RC-FX267.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-20251216-FX267.lcb

样品瓶号 : 1-6

进样体积 : 10μl

进样时间 : 2025/12/16 14:04:19

处理时间 (V2) : 2025/12/17 10:00:16

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 1.0ml/min



波长:237nm/250nm

版本号:6.115

实验者:wangdan

处理者:wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.857	838780	100.000	146374	2463	1.132	--
总计		838780	100.000	146374			

检测器A Ch2 250nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.177	68110	100.000	13736	1318	1.250	--
总计		68110	100.000	13736			



SMF-227

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$SMF-227 - 0-26/18-1076-2 - zzp-25120901p-pH1.2jz-150mg10mg-rcqx-lf100z-p2-45min.lcd

方法文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-RC-FX267.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-20251216-FX267.lcb

样品瓶号 : 1-15

进样体积 : 10μl

进样时间 : 2025/12/16 14:07:41

处理时间 (V2) : 2025/12/17 10:00:19

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 1.0ml/min

波长:237nm/250nm


版本号:6.115

实验者:wangdan


处理者:wangdan

<色谱图>

mV



mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.857	852627	100.000	148173	2447	1.137	--
总计		852627	100.000	148173			

检测器A Ch2 250nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.176	65462	100.000	13116	1311	1.260	--
总计		65462	100.000	13116			



SMF-227

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$SMF-227 - 0-26/18-1077-2 - zzp-25120901p-pH1.2jz-150mg10mg-rcqx-lf100z-p3-45min.lcd

方法文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-RC-FX267.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-20251216-FX267.lcb

样品瓶号 : 1-24

进样体积 : 10μl

进样时间 : 2025/12/16 14:11:04

处理时间 (V2) : 2025/12/17 10:00:22

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 1.0ml/min

波长:237nm/250nm


版本号:6.115

实验者:wangdan


处理者:wangdan

<色谱图>

mV



mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.858	859036	100.000	149424	2463	1.134	--
总计		859036	100.000	149424			

检测器A Ch2 250nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.178	65981	100.000	13317	1320	1.253	--
总计		65981	100.000	13317			



SMF-227

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$SMF-227 - 0-26/18-1078-2 - zzp-25120901p-pH1.2jz-150mg10mg-rcqx-lf100z-p4-45min.lcd

方法文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-RC-FX267.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-20251216-FX267.lcb

样品瓶号 : 1-33

进样体积 : 10μl

进样时间 : 2025/12/16 14:14:26

处理时间 (V2) : 2025/12/17 10:00:25

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 1.0ml/min



波长:237nm/250nm

版本号:6.115

实验者:wangdan

处理者:wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.857	864555	100.000	150502	2456	1.134	--
总计		864555	100.000	150502			

检测器A Ch2 250nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.177	67249	100.000	13504	1312	1.254	--
总计		67249	100.000	13504			



SMF-227

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$SMF-227 - 0-26/18-1079-2 - zzp-25120901p-pH1.2jz-150mg10mg-rcqx-lf100z-p5-45min.lcd

方法文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-RC-FX267.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-20251216-FX267.lcb

样品瓶号 : 1-42

进样体积 : 10μl

进样时间 : 2025/12/16 14:17:48

处理时间 (V2) : 2025/12/17 10:00:28

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 1.0ml/min



波长:237nm/250nm

版本号:6.115

实验者:wangdan

处理者:wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.859	875996	100.000	152029	2460	1.133	--
总计		875996	100.000	152029			

检测器A Ch2 250nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.178	60558	100.000	12207	1318	1.256	--
总计		60558	100.000	12207			



SMF-227

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$SMF-227 - 0-26/18-1080-2 - zzp-25120901p-pH1.2jz-150mg10mg-rcqx-lf100z-p6-45min.lcd

方法文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-RC-FX267.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-20251216-FX267.lcb

样品瓶号 : 1-51

进样体积 : 10μl

进样时间 : 2025/12/16 14:21:10

处理时间 (V2) : 2025/12/17 10:00:31

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 1.0ml/min



波长:237nm/250nm

版本号:6.115

实验者:wangdan

处理者:wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.859	865559	100.000	150242	2468	1.132	--
总计		865559	100.000	150242			

检测器A Ch2 250nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.178	66525	100.000	13438	1321	1.250	--
总计		66525	100.000	13438			



SMF-227

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$SMF-227 - 0-26/18-1081-2 - zzp-25120901p-pH1.2jz-150mg10mg-rcqx-lf100z-p1-60min.lcd

方法文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-RC-FX267.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-20251216-FX267.lcb

样品瓶号 : 1-7

进样体积 : 10μl

进样时间 : 2025/12/16 14:24:32

处理时间 (V2) : 2025/12/17 10:00:34

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 1.0ml/min



波长:237nm/250nm

版本号:6.115

实验者:wangdan

处理者:wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.861	833650	100.000	145027	2466	1.134	--
总计		833650	100.000	145027			

检测器A Ch2 250nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.179	67786	100.000	13702	1321	1.254	--
总计		67786	100.000	13702			



SMF-227

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$SMF-227 - 0-26/18-1082-2 - zzp-25120901p-pH1.2jz-150mg10mg-rcqx-lf100z-p2-60min.lcd

方法文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-RC-FX267.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-20251216-FX267.lcb

样品瓶号 : 1-16

进样体积 : 10μl

进样时间 : 2025/12/16 14:27:54

处理时间 (V2) : 2025/12/17 10:00:37

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 1.0ml/min



波长:237nm/250nm

版本号:6.115

实验者:wangdan

处理者:wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.856	843637	100.000	147544	2469	1.132	--
总计		843637	100.000	147544			

检测器A Ch2 250nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.176	65987	100.000	13300	1322	1.256	--
总计		65987	100.000	13300			



SMF-227

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$SMF-227 - 0-26/18-1083-2 - zzp-25120901p-pH1.2jz-150mg10mg-rcqx-lf100z-p3-60min.lcd

方法文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-RC-FX267.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-20251216-FX267.lcb

样品瓶号 : 1-25

进样体积 : 10μl

进样时间 : 2025/12/16 14:31:17

处理时间 (V2) : 2025/12/17 10:00:40

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 1.0ml/min

波长:237nm/250nm


版本号:6.115

实验者:wangdan


处理者:wangdan

<色谱图>

mV



mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.855	859451	100.000	149791	2449	1.135	--
总计		859451	100.000	149791			

检测器A Ch2 250nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.175	66528	100.000	13319	1305	1.260	--
总计		66528	100.000	13319			



SMF-227

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$SMF-227 - 0-26/18-1084-2 - zzp-25120901p-pH1.2jz-150mg10mg-rcqx-lf100z-p4-60min.lcd

方法文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-RC-FX267.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-20251216-FX267.lcb

样品瓶号 : 1-34

进样体积 : 10μl

进样时间 : 2025/12/16 14:34:39

处理时间 (V2) : 2025/12/17 10:00:44

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 1.0ml/min



波长:237nm/250nm

版本号:6.115

实验者:wangdan

处理者:wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.858	863204	100.000	150477	2474	1.137	--
总计		863204	100.000	150477			

检测器A Ch2 250nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.177	68781	100.000	13857	1322	1.258	--
总计		68781	100.000	13857			



SMF-227

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$SMF-227 - 0-26/18-1085-2 - zzp-25120901p-pH1.2jz-150mg10mg-rcqx-lf100z-p5-60min.lcd

方法文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-RC-FX267.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-20251216-FX267.lcb

样品瓶号 : 1-43

进样体积 : 10μl

进样时间 : 2025/12/16 14:38:00

处理时间 (V2) : 2025/12/17 10:00:47

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 1.0ml/min



波长:237nm/250nm

版本号:6.115

实验者:wangdan

处理者:wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.856	864186	100.000	151229	2471	1.132	--
总计		864186	100.000	151229			

检测器A Ch2 250nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.176	64600	100.000	13019	1325	1.255	--
总计		64600	100.000	13019			



SMF-227

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$SMF-227 - 0-26/18-1086-2 - zzp-25120901p-pH1.2jz-150mg10mg-rcqx-lf100z-p6-60min.lcd

方法文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-RC-FX267.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-20251216-FX267.lcb

样品瓶号 : 1-52

进样体积 : 10μl

进样时间 : 2025/12/16 14:41:22

处理时间 (V2) : 2025/12/17 10:00:50

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 1.0ml/min



波长:237nm/250nm

版本号:6.115

实验者:wangdan

处理者:wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.856	857814	100.000	149542	2458	1.135	--
总计		857814	100.000	149542			

检测器A Ch2 250nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.176	66028	100.000	13262	1316	1.259	--
总计		66028	100.000	13262			



SMF-227

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$SMF-227 - 0-26/18-1087-2 - zzp-25120901p-pH1.2jz-150mg10mg-rcqx-lf100z-p1-90min.lcd

方法文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-RC-FX267.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-20251216-FX267.lcb

样品瓶号 : 1-8

进样体积 : 10μl

进样时间 : 2025/12/16 14:44:45

处理时间 (V2) : 2025/12/17 10:00:53

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 1.0ml/min



波长:237nm/250nm

版本号:6.115

实验者:wangdan

处理者:wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.857	829273	100.000	144742	2462	1.134	--
总计		829273	100.000	144742			

检测器A Ch2 250nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.176	66642	100.000	13435	1323	1.254	--
总计		66642	100.000	13435			



SMF-227

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$SMF-227 - 0-26/18-1088-2 - zzp-25120901p-pH1.2jz-150mg10mg-rcqx-lf100z-p2-90min.lcd

方法文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-RC-FX267.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-20251216-FX267.lcb

样品瓶号 : 1-17

进样体积 : 10μl

进样时间 : 2025/12/16 14:48:09

处理时间 (V2) : 2025/12/17 10:00:56

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 1.0ml/min


波长:237nm/250nm

版本号:6.115

实验者:wangdan

处理者:wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.857	848002	100.000	147471	2449	1.136	--
总计		848002	100.000	147471			

检测器A Ch2 250nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.176	66357	100.000	13284	1309	1.257	--
总计		66357	100.000	13284			



SMF-227

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$SMF-227 - 0-26/18-1089-2 - zzp-25120901p-pH1.2jz-150mg10mg-rcqx-lf100z-p3-90min.lcd

方法文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-RC-FX267.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-20251216-FX267.lcb

样品瓶号 : 1-26

进样体积 : 10μl

进样时间 : 2025/12/16 14:51:33

处理时间 (V2) : 2025/12/17 10:00:59

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 1.0ml/min



波长:237nm/250nm

版本号:6.115

实验者:wangdan

处理者:wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.857	850286	100.000	148366	2470	1.133	--
总计		850286	100.000	148366			

检测器A Ch2 250nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.177	65417	100.000	13156	1319	1.259	--
总计		65417	100.000	13156			



SMF-227

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$SMF-227 - 0-26/18-1090-2 - zzp-25120901p-pH1.2jz-150mg10mg-rcqx-lf100z-p4-90min.lcd

方法文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-RC-FX267.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-20251216-FX267.lcb

样品瓶号 : 1-35

进样体积 : 10μl

进样时间 : 2025/12/16 14:54:55

处理时间 (V2) : 2025/12/17 10:01:02

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 1.0ml/min



波长:237nm/250nm

版本号:6.115

实验者:wangdan

处理者:wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.859	858932	100.000	149252	2465	1.133	--
总计		858932	100.000	149252			

检测器A Ch2 250nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.178	68962	100.000	13911	1319	1.250	--
总计		68962	100.000	13911			



SMF-227

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$SMF-227 - 0-26/18-1091-2 - zzp-25120901p-pH1.2jz-150mg10mg-rcqx-lf100z-p5-90min.lcd

方法文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-RC-FX267.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-20251216-FX267.lcb

样品瓶号 : 1-44

进样体积 : 10μl

进样时间 : 2025/12/16 14:58:19

处理时间 (V2) : 2025/12/17 10:01:05

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 1.0ml/min

波长:237nm/250nm


版本号:6.115

实验者:wangdan


处理者:wangdan

<色谱图>

mV



mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.862	860446	100.000	149628	2460	1.134	--
总计		860446	100.000	149628			

检测器A Ch2 250nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.179	68362	100.000	13774	1313	1.248	--
总计		68362	100.000	13774			



SMF-227

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$SMF-227 - 0-26/18-1092-2 - zzp-25120901p-pH1.2jz-150mg10mg-rcqx-lf100z-p6-90min.lcd

方法文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-RC-FX267.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-20251216-FX267.lcb

样品瓶号 : 1-53

进样体积 : 10μl

进样时间 : 2025/12/16 15:01:41

处理时间 (V2) : 2025/12/17 10:01:08

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 1.0ml/min



波长:237nm/250nm

版本号:6.115

实验者:wangdan

处理者:wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.859	857066	100.000	148654	2463	1.134	--
总计		857066	100.000	148654			

检测器A Ch2 250nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.178	65603	100.000	13229	1317	1.256	--
总计		65603	100.000	13229			



SMF-227

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$SMF-227 - 0-26/18-1093-2 - zzp-25120901p-pH1.2jz-150mg10mg-rcqx-lf100z-p1-120min.lcd

方法文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-RC-FX267.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-20251216-FX267.lcb

样品瓶号 : 4-1

进样体积 : 10μl

进样时间 : 2025/12/16 15:05:05

处理时间 (V2) : 2025/12/17 10:01:11

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 1.0ml/min



波长:237nm/250nm

版本号:6.115

实验者:wangdan

处理者:wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.856	818028	100.000	142918	2466	1.133	--
总计		818028	100.000	142918			

检测器A Ch2 250nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.177	65506	100.000	13196	1318	1.252	--
总计		65506	100.000	13196			



SMF-227

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$SMF-227 - 0-26/18-1094-2 - zzp-25120901p-pH1.2jz-150mg10mg-rcqx-lf100z-p2-120min.lcd

方法文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-RC-FX267.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-20251216-FX267.lcb

样品瓶号 : 4-10

进样体积 : 10μl

进样时间 : 2025/12/16 15:08:27

处理时间 (V2) : 2025/12/17 10:01:14

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 1.0ml/min



波长:237nm/250nm

版本号:6.115

实验者:wangdan

处理者:wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.856	825078	100.000	144327	2470	1.133	--
总计		825078	100.000	144327			

检测器A Ch2 250nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.176	64235	100.000	12922	1324	1.255	--
总计		64235	100.000	12922			





SMF-227

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温 : 40℃
数据文件名: RC\$SMF-227 - 0-26/18-1095-2 - zzp-25120901p-pH1.2jz-150mg10mg-rcqx-lf100z-p3-120min.lcd
方法文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-RC-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-20251216-FX267.lcb
样品瓶号 : 4-19
进样体积 : 10μl
进样时间 : 2025/12/16 15:11:49
处理时间 (V2) : 2025/12/17 10:01:17
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 1.0ml/min
波长:237nm/250nm
版本号:6.115
实验者:wangdan
处理者:wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.857	833423	100.000	145056	2459	1.129	--
总计		833423	100.000	145056			

检测器A Ch2 250nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.177	63244	100.000	12753	1320	1.256	--
总计		63244	100.000	12753			



SMF-227

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$SMF-227 - 0-26/18-1096-2 - zzp-25120901p-pH1.2jz-150mg10mg-rcqx-lf100z-p4-120min.lcd

方法文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-RC-FX267.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-20251216-FX267.lcb

样品瓶号 : 4-28

进样体积 : 10μl

进样时间 : 2025/12/16 15:15:11

处理时间 (V2) : 2025/12/17 10:01:20

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 1.0ml/min



波长:237nm/250nm

版本号:6.115

实验者:wangdan

处理者:wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.856	863714	100.000	150878	2464	1.133	--
总计		863714	100.000	150878			

检测器A Ch2 250nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.176	68431	100.000	13785	1317	1.253	--
总计		68431	100.000	13785			



SMF-227

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$SMF-227 - 0-26/18-1097-2 - zzp-25120901p-pH1.2jz-150mg10mg-rcqx-lf100z-p5-120min.lcd

方法文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-RC-FX267.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-20251216-FX267.lcb

样品瓶号 : 4-37

进样体积 : 10μl

进样时间 : 2025/12/16 15:18:33

处理时间 (V2) : 2025/12/17 10:01:24

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 1.0ml/min



波长:237nm/250nm

版本号:6.115

实验者:wangdan

处理者:wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.858	860711	100.000	150039	2466	1.134	--
总计		860711	100.000	150039			

检测器A Ch2 250nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.177	68493	100.000	13810	1321	1.253	--
总计		68493	100.000	13810			



SMF-227

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$SMF-227 - 0-26/18-1098-2 - zzp-25120901p-pH1.2jz-150mg10mg-rcqx-lf100z-p6-120min.lcd

方法文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-RC-FX267.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-20251216-FX267.lcb

样品瓶号 : 4-46

进样体积 : 10μl

进样时间 : 2025/12/16 15:21:57

处理时间 (V2) : 2025/12/17 10:01:27

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 1.0ml/min



波长:237nm/250nm

版本号:6.115

实验者:wangdan

处理者:wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.858	837686	100.000	145927	2469	1.132	--
总计		837686	100.000	145927			

检测器A Ch2 250nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.177	63546	100.000	12832	1324	1.255	--
总计		63546	100.000	12832			



SMF-227

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$SMF-227 - 0-26/18-1099-2 - zzp-25120901p-pH1.2jz-150mg10mg-rcqx-lf100z-p1-jx.lcd

方法文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-RC-FX267.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-20251216-FX267.lcb

样品瓶号 : 4-2

进样体积 : 10μl

进样时间 : 2025/12/16 15:25:19

处理时间 (V2) : 2025/12/17 10:01:30

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 1.0ml/min



波长:237nm/250nm

版本号:6.115

实验者:wangdan

处理者:wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.859	837360	100.000	145517	2467	1.135	--
总计		837360	100.000	145517			

检测器A Ch2 250nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.177	64793	100.000	13092	1323	1.257	--
总计		64793	100.000	13092			



SMF-227

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$SMF-227 - 0-26/18-1100-2 - zzp-25120901p-pH1.2jz-150mg10mg-rcqx-lf100z-p2-jx.lcd

方法文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-RC-FX267.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-20251216-FX267.lcb

样品瓶号 : 4-11

进样体积 : 10μl

进样时间 : 2025/12/16 15:28:43

处理时间 (V2) : 2025/12/17 10:01:33

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 1.0ml/min



波长:237nm/250nm

版本号:6.115

实验者:wangdan

处理者:wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.856	842633	100.000	147551	2472	1.134	--
总计		842633	100.000	147551			

检测器A Ch2 250nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.176	64359	100.000	12975	1327	1.257	--
总计		64359	100.000	12975			



SMF-227

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$SMF-227 - 0-26/18-1101-2 - zzp-25120901p-pH1.2jz-150mg10mg-rcqx-lf100z-p3-jx.lcd

方法文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-RC-FX267.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-20251216-FX267.lcb

样品瓶号 : 4-20

进样体积 : 10μl

进样时间 : 2025/12/16 15:32:04

处理时间 (V2) : 2025/12/17 10:01:37

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 1.0ml/min



波长:237nm/250nm

版本号:6.115

实验者:wangdan

处理者:wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.856	863412	100.000	150983	2465	1.134	--
总计		863412	100.000	150983			

检测器A Ch2 250nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.176	63621	100.000	12785	1320	1.258	--
总计		63621	100.000	12785			



SMF-227

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$SMF-227 - 0-26/18-1102-2 - zzp-25120901p-pH1.2jz-150mg10mg-rcqx-lf100z-p4-jx.lcd

方法文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-RC-FX267.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-20251216-FX267.lcb

样品瓶号 : 4-29

进样体积 : 10μl

进样时间 : 2025/12/16 15:35:27

处理时间 (V2) : 2025/12/17 10:01:39

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 1.0ml/min



波长:237nm/250nm

版本号:6.115

实验者:wangdan

处理者:wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.857	859745	100.000	150410	2478	1.132	--
总计		859745	100.000	150410			

检测器A Ch2 250nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.177	67205	100.000	13595	1326	1.251	--
总计		67205	100.000	13595			



SMF-227

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$SMF-227 - 0-26/18-1103-2 - zzp-25120901p-pH1.2jz-150mg10mg-rcqx-lf100z-p5-jx.lcd

方法文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-RC-FX267.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-20251216-FX267.lcb

样品瓶号 : 4-38

进样体积 : 10μl

进样时间 : 2025/12/16 15:38:49

处理时间 (V2) : 2025/12/17 10:01:42

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 1.0ml/min



波长:237nm/250nm

版本号:6.115

实验者:wangdan

处理者:wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.857	869450	100.000	151262	2453	1.135	--
总计		869450	100.000	151262			

检测器A Ch2 250nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.177	68473	100.000	13764	1312	1.256	--
总计		68473	100.000	13764			



SMF-227

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$SMF-227 - 0-26/18-1104-2 - zzp-25120901p-pH1.2jz-150mg10mg-rcqx-lf100z-p6-jx.lcd

方法文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-RC-FX267.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-20251216-FX267.lcb

样品瓶号 : 4-47

进样体积 : 10μl

进样时间 : 2025/12/16 15:42:12

处理时间 (V2) : 2025/12/17 10:01:45

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 1.0ml/min



波长:237nm/250nm

版本号:6.115

实验者:wangdan

处理者:wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.858	865668	100.000	150838	2473	1.133	--
总计		865668	100.000	150838			

检测器A Ch2 250nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.177	64052	100.000	12931	1324	1.254	--
总计		64052	100.000	12931			





SMF-227

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温 : 40℃
数据文件名: RC\$SMF-227 - 0-26/18-1105-2 - zzp-25120901p-pH1.2jz-150mg10mg-rcqx-lf100z-dz2-1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-RC-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-20251216-FX267.lcb
样品瓶号 : 1-27
进样体积 : 10μl
进样时间 : 2025/12/16 15:45:35
处理时间 (V2) : 2025/12/17 10:01:48
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 1.0ml/min
波长:237nm/250nm
版本号:6.115
实验者:wangdan
处理者:wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.859	858754	100.000	150014	2491	1.134	--
总计		858754	100.000	150014			

检测器A Ch2 250nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.178	62858	100.000	12865	1356	1.254	--
总计		62858	100.000	12865			



SMF-227

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$SMF-227 - 0-26/18-1106-2 - zzp-25120901p-pH1.2jz-150mg10mg-rcqx-lf100z-dz2-2.lcd

方法文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-RC-FX267.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-20251216-FX267.lcb

样品瓶号 : 1-27

进样体积 : 10μl

进样时间 : 2025/12/16 15:48:57

处理时间 (V2) : 2025/12/17 10:01:51

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 1.0ml/min



波长:237nm/250nm

版本号:6.115

实验者:wangdan

处理者:wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.858	859119	100.000	150624	2498	1.129	--
总计		859119	100.000	150624			

检测器A Ch2 250nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.178	62939	100.000	12888	1359	1.244	--
总计		62939	100.000	12888			



SMF-227

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$SMF-227 - 0-26/18-1107-2 - zzp-25120901p-pH4.5jz-150mg10mg-rcqx-lf100z-rj.lcd

方法文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-RC-FX267.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-20251216-FX267.lcb

样品瓶号 : 2-9

进样体积 : 10μl

进样时间 : 2025/12/16 15:52:21

处理时间 (V2) : 2025/12/17 10:01:54

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 1.0ml/min



波长:237nm/250nm

版本号:6.115

实验者:wangdan

处理者:wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

检测器A Ch2 250nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							



SMF-227

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$SMF-227 - 0-26/18-1108-2 - zzp-25120901p-pH4.5jz-150mg10mg-rcqx-lf100z-dz1-1.lcd

方法文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-RC-FX267.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-20251216-FX267.lcb

样品瓶号 : 2-18

进样体积 : 10μl

进样时间 : 2025/12/16 15:55:45

处理时间 (V2) : 2025/12/17 10:01:57

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 1.0ml/min



波长:237nm/250nm

版本号:6.115

实验者:wangdan

处理者:wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.865	860970	100.000	157748	2746	1.127	--
总计		860970	100.000	157748			

检测器A Ch2 250nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.186	63392	100.000	14086	1643	1.256	--
总计		63392	100.000	14086			



SMF-227

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$SMF-227 - 0-26/18-1109-2 - zzp-25120901p-pH4.5jz-150mg10mg-rcqx-lf100z-dz1-2.lcd

方法文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-RC-FX267.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-20251216-FX267.lcb

样品瓶号 : 2-18

进样体积 : 10μl

进样时间 : 2025/12/16 15:59:10

处理时间 (V2) : 2025/12/17 10:02:00

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 1.0ml/min



波长:237nm/250nm

版本号:6.115

实验者:wangdan

处理者:wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.863	861466	100.000	157557	2731	1.128	--
总计		861466	100.000	157557			

检测器A Ch2 250nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.185	63228	100.000	14000	1637	1.254	--
总计		63228	100.000	14000			



SMF-227

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$SMF-227 - 0-26/18-1110-2 - zzp-25120901p-pH4.5jz-150mg10mg-rcqx-lf100z-dz1-3.lcd

方法文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-RC-FX267.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-20251216-FX267.lcb

样品瓶号 : 2-18

进样体积 : 10μl

进样时间 : 2025/12/16 16:02:35

处理时间 (V2) : 2025/12/17 10:02:03

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 1.0ml/min



波长:237nm/250nm

版本号:6.115

实验者:wangdan

处理者:wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.864	861750	100.000	157465	2729	1.130	--
总计		861750	100.000	157465			

检测器A Ch2 250nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.186	63293	100.000	14023	1638	1.254	--
总计		63293	100.000	14023			



SMF-227

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$SMF-227 - 0-26/18-1111-2 - zzp-25120901p-pH4.5jz-150mg10mg-rcqx-lf100z-dz1-4.lcd

方法文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-RC-FX267.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-20251216-FX267.lcb

样品瓶号 : 2-18

进样体积 : 10μl

进样时间 : 2025/12/16 16:05:59

处理时间 (V2) : 2025/12/17 10:02:06

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 1.0ml/min



波长:237nm/250nm

版本号:6.115

实验者:wangdan

处理者:wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.864	860957	100.000	157654	2738	1.128	--
总计		860957	100.000	157654			

检测器A Ch2 250nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.186	63269	100.000	14027	1634	1.256	--
总计		63269	100.000	14027			



SMF-227

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$SMF-227 - 0-26/18-1112-2 - zzp-25120901p-pH4.5jz-150mg10mg-rcqx-lf100z-dz1-5.lcd

方法文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-RC-FX267.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-20251216-FX267.lcb

样品瓶号 : 2-18

进样体积 : 10μl

进样时间 : 2025/12/16 16:09:22

处理时间 (V2) : 2025/12/17 10:02:09

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 1.0ml/min



波长:237nm/250nm

版本号:6.115

实验者:wangdan

处理者:wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.864	861372	100.000	157333	2725	1.129	--
总计		861372	100.000	157333			

检测器A Ch2 250nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.185	63123	100.000	13984	1631	1.255	--
总计		63123	100.000	13984			



SMF-227

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$SMF-227 - 0-26/18-1113-2 - zzp-25120901p-pH4.5jz-150mg10mg-rcqx-lf100z-p1-5min.lcd

方法文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-RC-FX267.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-20251216-FX267.lcb

样品瓶号 : 2-1

进样体积 : 10μl

进样时间 : 2025/12/16 16:12:46

处理时间 (V2) : 2025/12/17 10:02:12

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 1.0ml/min



波长:237nm/250nm

版本号:6.115

实验者:wangdan

处理者:wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.868	10039	100.000	1841	2772	1.117	--
总计		10039	100.000	1841			

检测器A Ch2 250nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.188	6065	100.000	1327	1621	1.312	--
总计		6065	100.000	1327			



SMF-227

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$SMF-227 - 0-26/18-1114-2 - zzp-25120901p-pH4.5jz-150mg10mg-rcqx-lf100z-p2-5min.lcd

方法文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-RC-FX267.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-20251216-FX267.lcb

样品瓶号 : 2-10

进样体积 : 10μl

进样时间 : 2025/12/16 16:16:10

处理时间 (V2) : 2025/12/17 10:02:15

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 1.0ml/min



波长:237nm/250nm

版本号:6.115

实验者:wangdan

处理者:wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.864	7582	100.000	1406	2776	1.158	--
总计		7582	100.000	1406			

检测器A Ch2 250nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.186	7413	100.000	1647	1668	1.283	--
总计		7413	100.000	1647			



SMF-227

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$SMF-227 - 0-26/18-1115-2 - zzp-25120901p-pH4.5jz-150mg10mg-rcqx-lf100z-p3-5min.lcd

方法文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-RC-FX267.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-20251216-FX267.lcb

样品瓶号 : 2-19

进样体积 : 10μl

进样时间 : 2025/12/16 16:19:34

处理时间 (V2) : 2025/12/17 10:02:18

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 1.0ml/min



波长:237nm/250nm

版本号:6.115

实验者:wangdan

处理者:wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.862	7163	100.000	1308	2736	1.128	--
总计		7163	100.000	1308			

检测器A Ch2 250nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							



SMF-227

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$SMF-227 - 0-26/18-1116-2 - zzp-25120901p-pH4.5jz-150mg10mg-rcqx-lf100z-p4-5min.lcd

方法文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-RC-FX267.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-20251216-FX267.lcb

样品瓶号 : 2-28

进样体积 : 10μl

进样时间 : 2025/12/16 16:22:57

处理时间 (V2) : 2025/12/17 10:02:21

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 1.0ml/min



波长:237nm/250nm

版本号:6.115

实验者:wangdan

处理者:wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.864	14229	100.000	2638	2760	1.123	--
总计		14229	100.000	2638			

检测器A Ch2 250nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.186	5584	100.000	1243	1650	1.277	--
总计		5584	100.000	1243			



SMF-227

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$SMF-227 - 0-26/18-1117-2 - zzp-25120901p-pH4.5jz-150mg10mg-rcqx-lf100z-p5-5min.lcd

方法文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-RC-FX267.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-20251216-FX267.lcb

样品瓶号 : 2-37

进样体积 : 10μl

进样时间 : 2025/12/16 16:26:20

处理时间 (V2) : 2025/12/17 10:02:24

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 1.0ml/min

波长:237nm/250nm


版本号:6.115

实验者:wangdan


处理者:wangdan

<色谱图>

mV



mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.865	9040	100.000	1665	2736	1.158	--
总计		9040	100.000	1665			

检测器A Ch2 250nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.186	5049	100.000	1079	1579	1.375	--
总计		5049	100.000	1079			



SMF-227

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$SMF-227 - 0-26/18-1118-2 - zzp-25120901p-pH4.5jz-150mg10mg-rcqx-lf100z-p6-5min.lcd

方法文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-RC-FX267.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-20251216-FX267.lcb

样品瓶号 : 2-46

进样体积 : 10μl

进样时间 : 2025/12/16 16:29:44

处理时间 (V2) : 2025/12/17 10:02:27

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 1.0ml/min



波长:237nm/250nm

版本号:6.115

实验者:wangdan

处理者:wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.866	7855	100.000	1436	2748	1.116	--
总计		7855	100.000	1436			

检测器A Ch2 250nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.186	6541	100.000	1448	1631	1.300	--
总计		6541	100.000	1448			



SMF-227

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$SMF-227 - 0-26/18-1119-2 - zzp-25120901p-pH4.5jz-150mg10mg-rcqx-lf100z-p1-10min.lcd

方法文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-RC-FX267.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-20251216-FX267.lcb

样品瓶号 : 2-2

进样体积 : 10μl

进样时间 : 2025/12/16 16:33:07

处理时间 (V2) : 2025/12/17 10:02:30

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 1.0ml/min


波长:237nm/250nm

版本号:6.115

实验者:wangdan

处理者:wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.866	25935	100.000	4758	2741	1.127	--
总计		25935	100.000	4758			

检测器A Ch2 250nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.186	39116	100.000	8715	1646	1.257	--
总计		39116	100.000	8715			



SMF-227

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$SMF-227 - 0-26/18-1120-2 - zzp-25120901p-pH4.5jz-150mg10mg-rcqx-lf100z-p2-10min.lcd

方法文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-RC-FX267.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-20251216-FX267.lcb

样品瓶号 : 2-11

进样体积 : 10μl

进样时间 : 2025/12/16 16:36:31

处理时间 (V2) : 2025/12/17 10:02:33

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 1.0ml/min

波长:237nm/250nm


版本号:6.115

实验者:wangdan


处理者:wangdan

<色谱图>

mV



mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.865	23047	100.000	4250	2765	1.133	--
总计		23047	100.000	4250			

检测器A Ch2 250nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.187	37311	100.000	8332	1650	1.254	--
总计		37311	100.000	8332			



SMF-227

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$SMF-227 - 0-26/18-1121-2 - zzp-25120901p-pH4.5jz-150mg10mg-rcqx-lf100z-p3-10min.lcd

方法文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-RC-FX267.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-20251216-FX267.lcb

样品瓶号 : 2-20

进样体积 : 10μl

进样时间 : 2025/12/16 16:39:53

处理时间 (V2) : 2025/12/17 10:02:36

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 1.0ml/min



波长:237nm/250nm

版本号:6.115

实验者:wangdan

处理者:wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.863	25754	100.000	4727	2751	1.112	--
总计		25754	100.000	4727			

检测器A Ch2 250nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.185	30354	100.000	6756	1655	1.261	--
总计		30354	100.000	6756			



SMF-227

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$SMF-227 - 0-26/18-1122-2 - zzp-25120901p-pH4.5jz-150mg10mg-rcqx-lf100z-p4-10min.lcd

方法文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-RC-FX267.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-20251216-FX267.lcb

样品瓶号 : 2-29

进样体积 : 10μl

进样时间 : 2025/12/16 16:43:17

处理时间 (V2) : 2025/12/17 10:02:39

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 1.0ml/min



波长:237nm/250nm

版本号:6.115

实验者:wangdan

处理者:wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.864	30645	100.000	5627	2740	1.128	--
总计		30645	100.000	5627			

检测器A Ch2 250nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.186	36632	100.000	8125	1649	1.266	--
总计		36632	100.000	8125			



SMF-227

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$SMF-227 - 0-26/18-1123-2 - zzp-25120901p-pH4.5jz-150mg10mg-rcqx-lf100z-p5-10min.lcd

方法文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-RC-FX267.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-20251216-FX267.lcb

样品瓶号 : 2-38

进样体积 : 10μl

进样时间 : 2025/12/16 16:46:40

处理时间 (V2) : 2025/12/17 10:02:42

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 1.0ml/min


波长:237nm/250nm

版本号:6.115

实验者:wangdan

处理者:wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.865	27327	100.000	5021	2752	1.123	--
总计		27327	100.000	5021			

检测器A Ch2 250nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.187	37924	100.000	8464	1652	1.251	--
总计		37924	100.000	8464			



SMF-227

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$SMF-227 - 0-26/18-1124-2 - zzp-25120901p-pH4.5jz-150mg10mg-rcqx-lf100z-p6-10min.lcd

方法文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-RC-FX267.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-20251216-FX267.lcb

样品瓶号 : 2-47

进样体积 : 10μl

进样时间 : 2025/12/16 16:50:03

处理时间 (V2) : 2025/12/17 10:02:45

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 1.0ml/min



波长:237nm/250nm

版本号:6.115

实验者:wangdan

处理者:wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.862	23760	100.000	4382	2761	1.122	--
总计		23760	100.000	4382			

检测器A Ch2 250nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.184	36537	100.000	8135	1655	1.256	--
总计		36537	100.000	8135			



SMF-227

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$SMF-227 - 0-26/18-1125-2 - zzp-25120901p-pH4.5jz-150mg10mg-rcqx-lf100z-p1-15min.lcd

方法文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-RC-FX267.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-20251216-FX267.lcb

样品瓶号 : 2-3

进样体积 : 10μl

进样时间 : 2025/12/16 16:53:26

处理时间 (V2) : 2025/12/17 10:02:48

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 1.0ml/min


波长:237nm/250nm

版本号:6.115

实验者:wangdan

处理者:wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.864	36237	100.000	6655	2763	1.130	--
总计		36237	100.000	6655			

检测器A Ch2 250nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.185	50327	100.000	11246	1662	1.251	--
总计		50327	100.000	11246			



SMF-227

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$SMF-227 - 0-26/18-1126-2 - zzp-25120901p-pH4.5jz-150mg10mg-rcqx-lf100z-p2-15min.lcd

方法文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-RC-FX267.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-20251216-FX267.lcb

样品瓶号 : 2-12

进样体积 : 10μl

进样时间 : 2025/12/16 16:56:50

处理时间 (V2) : 2025/12/17 10:02:51

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 1.0ml/min



波长:237nm/250nm

版本号:6.115

实验者:wangdan

处理者:wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.866	35656	100.000	6535	2755	1.132	--
总计		35656	100.000	6535			

检测器A Ch2 250nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.187	52113	100.000	11639	1656	1.253	--
总计		52113	100.000	11639			



SMF-227

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$SMF-227 - 0-26/18-1127-2 - zzp-25120901p-pH4.5jz-150mg10mg-rcqx-lf100z-p3-15min.lcd

方法文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-RC-FX267.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-20251216-FX267.lcb

样品瓶号 : 2-21

进样体积 : 10μl

进样时间 : 2025/12/16 17:00:14

处理时间 (V2) : 2025/12/17 10:02:54

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 1.0ml/min



波长:237nm/250nm

版本号:6.115

实验者:wangdan

处理者:wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.863	36757	100.000	6753	2755	1.127	--
总计		36757	100.000	6753			

检测器A Ch2 250nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.185	48741	100.000	10861	1652	1.252	--
总计		48741	100.000	10861			



SMF-227

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$SMF-227 - 0-26/18-1128-2 - zzp-25120901p-pH4.5jz-150mg10mg-rcqx-lf100z-p4-15min.lcd

方法文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-RC-FX267.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-20251216-FX267.lcb

样品瓶号 : 2-30

进样体积 : 10μl

进样时间 : 2025/12/16 17:03:37

处理时间 (V2) : 2025/12/17 10:02:57

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 1.0ml/min



波长:237nm/250nm

版本号:6.115

实验者:wangdan

处理者:wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.862	38109	100.000	7023	2752	1.130	--
总计		38109	100.000	7023			

检测器A Ch2 250nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.184	49288	100.000	10943	1653	1.254	--
总计		49288	100.000	10943			



SMF-227

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$SMF-227 - 0-26/18-1129-2 - zzp-25120901p-pH4.5jz-150mg10mg-rcqx-lf100z-p5-15min.lcd

方法文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-RC-FX267.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-20251216-FX267.lcb

样品瓶号 : 2-39

进样体积 : 10μl

进样时间 : 2025/12/16 17:07:02

处理时间 (V2) : 2025/12/17 10:03:00

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 1.0ml/min

波长:237nm/250nm


版本号:6.115

实验者:wangdan


处理者:wangdan

<色谱图>

mV



mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.863	36368	100.000	6719	2762	1.130	--
总计		36368	100.000	6719			

检测器A Ch2 250nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.185	49528	100.000	10984	1644	1.255	--
总计		49528	100.000	10984			



SMF-227

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$SMF-227 - 0-26/18-1130-2 - zzp-25120901p-pH4.5jz-150mg10mg-rcqx-lf100z-p6-15min.lcd

方法文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-RC-FX267.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-20251216-FX267.lcb

样品瓶号 : 2-48

进样体积 : 10μl

进样时间 : 2025/12/16 17:10:26

处理时间 (V2) : 2025/12/17 10:03:03

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 1.0ml/min



波长:237nm/250nm

版本号:6.115

实验者:wangdan

处理者:wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.864	35446	100.000	6509	2766	1.134	--
总计		35446	100.000	6509			

检测器A Ch2 250nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.186	50615	100.000	11265	1645	1.255	--
总计		50615	100.000	11265			



SMF-227

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$SMF-227 - 0-26/18-1131-2 - zzp-25120901p-pH4.5jz-150mg10mg-rcqx-lf100z-p1-20min.lcd

方法文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-RC-FX267.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-20251216-FX267.lcb

样品瓶号 : 2-4

进样体积 : 10μl

进样时间 : 2025/12/16 17:13:50

处理时间 (V2) : 2025/12/17 10:03:06

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 1.0ml/min



波长:237nm/250nm

版本号:6.115

实验者:wangdan

处理者:wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.864	40819	100.000	7492	2766	1.132	--
总计		40819	100.000	7492			

检测器A Ch2 250nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.186	54234	100.000	12130	1657	1.251	--
总计		54234	100.000	12130			



SMF-227

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$SMF-227 - 0-26/18-1132-2 - zzp-25120901p-pH4.5jz-150mg10mg-rcqx-lf100z-p2-20min.lcd

方法文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-RC-FX267.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-20251216-FX267.lcb

样品瓶号 : 2-13

进样体积 : 10μl

进样时间 : 2025/12/16 17:17:14

处理时间 (V2) : 2025/12/17 10:03:09

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 1.0ml/min

波长:237nm/250nm


版本号:6.115

实验者:wangdan


处理者:wangdan

<色谱图>

mV



mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.867	40163	100.000	7316	2747	1.136	--
总计		40163	100.000	7316			

检测器A Ch2 250nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.187	55648	100.000	12371	1642	1.256	--
总计		55648	100.000	12371			



SMF-227

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$SMF-227 - 0-26/18-1133-2 - zzp-25120901p-pH4.5jz-150mg10mg-rcqx-lf100z-p3-20min.lcd

方法文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-RC-FX267.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-20251216-FX267.lcb

样品瓶号 : 2-22

进样体积 : 10μl

进样时间 : 2025/12/16 17:20:38

处理时间 (V2) : 2025/12/17 10:03:12

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 1.0ml/min



波长:237nm/250nm

版本号:6.115

实验者:wangdan

处理者:wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.866	42144	100.000	7773	2784	1.131	--
总计		42144	100.000	7773			

检测器A Ch2 250nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.187	55486	100.000	12441	1665	1.251	--
总计		55486	100.000	12441			



SMF-227

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$SMF-227 - 0-26/18-1134-2 - zzp-25120901p-pH4.5jz-150mg10mg-rcqx-lf100z-p4-20min.lcd

方法文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-RC-FX267.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-20251216-FX267.lcb

样品瓶号 : 2-31

进样体积 : 10μl

进样时间 : 2025/12/16 17:24:02

处理时间 (V2) : 2025/12/17 10:03:15

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 1.0ml/min



波长:237nm/250nm

版本号:6.115

实验者:wangdan

处理者:wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.861	41671	100.000	7692	2760	1.126	--
总计		41671	100.000	7692			

检测器A Ch2 250nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.184	53225	100.000	11812	1648	1.257	--
总计		53225	100.000	11812			



SMF-227

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$SMF-227 - 0-26/18-1135-2 - zzp-25120901p-pH4.5jz-150mg10mg-rcqx-lf100z-p5-20min.lcd

方法文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-RC-FX267.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-20251216-FX267.lcb

样品瓶号 : 2-40

进样体积 : 10μl

进样时间 : 2025/12/16 17:27:25

处理时间 (V2) : 2025/12/17 10:03:17

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 1.0ml/min



波长:237nm/250nm

版本号:6.115

实验者:wangdan

处理者:wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.863	41495	100.000	7650	2760	1.128	--
总计		41495	100.000	7650			

检测器A Ch2 250nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.185	53702	100.000	11967	1655	1.254	--
总计		53702	100.000	11967			



SMF-227

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$SMF-227 - 0-26/18-1136-2 - zzp-25120901p-pH4.5jz-150mg10mg-rcqx-lf100z-p6-20min.lcd

方法文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-RC-FX267.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-20251216-FX267.lcb

样品瓶号 : 2-49

进样体积 : 10μl

进样时间 : 2025/12/16 17:30:48

处理时间 (V2) : 2025/12/17 10:03:20

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 1.0ml/min



波长:237nm/250nm

版本号:6.115

实验者:wangdan

处理者:wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.864	41000	100.000	7542	2766	1.127	--
总计		41000	100.000	7542			

检测器A Ch2 250nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.186	55154	100.000	12296	1658	1.257	--
总计		55154	100.000	12296			



SMF-227

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$SMF-227 - 0-26/18-1137-2 - zzp-25120901p-pH4.5jz-150mg10mg-rcqx-lf100z-p1-30min.lcd

方法文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-RC-FX267.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-20251216-FX267.lcb

样品瓶号 : 2-5

进样体积 : 10μl

进样时间 : 2025/12/16 17:34:13

处理时间 (V2) : 2025/12/17 10:03:23

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 1.0ml/min



波长:237nm/250nm

版本号:6.115

实验者:wangdan

处理者:wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.865	45872	100.000	8420	2757	1.125	--
总计		45872	100.000	8420			

检测器A Ch2 250nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.186	57946	100.000	12930	1654	1.254	--
总计		57946	100.000	12930			



SMF-227

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$SMF-227 - 0-26/18-1138-2 - zzp-25120901p-pH4.5jz-150mg10mg-rcqx-lf100z-p2-30min.lcd

方法文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-RC-FX267.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-20251216-FX267.lcb

样品瓶号 : 2-14

进样体积 : 10μl

进样时间 : 2025/12/16 17:37:37

处理时间 (V2) : 2025/12/17 10:03:27

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 1.0ml/min



波长:237nm/250nm

版本号:6.115

实验者:wangdan

处理者:wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.863	45996	100.000	8479	2766	1.124	--
总计		45996	100.000	8479			

检测器A Ch2 250nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.185	59519	100.000	13301	1663	1.251	--
总计		59519	100.000	13301			



SMF-227

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$SMF-227 - 0-26/18-1139-2 - zzp-25120901p-pH4.5jz-150mg10mg-rcqx-lf100z-p3-30min.lcd

方法文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-RC-FX267.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-20251216-FX267.lcb

样品瓶号 : 2-23

进样体积 : 10μl

进样时间 : 2025/12/16 17:41:00

处理时间 (V2) : 2025/12/17 10:03:29

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 1.0ml/min



波长:237nm/250nm

版本号:6.115

实验者:wangdan

处理者:wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.863	44803	100.000	8227	2745	1.128	--
总计		44803	100.000	8227			

检测器A Ch2 250nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.185	56580	100.000	12539	1645	1.258	--
总计		56580	100.000	12539			



SMF-227

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$SMF-227 - 0-26/18-1140-2 - zzp-25120901p-pH4.5jz-150mg10mg-rcqx-lf100z-p4-30min.lcd

方法文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-RC-FX267.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-20251216-FX267.lcb

样品瓶号 : 2-32

进样体积 : 10μl

进样时间 : 2025/12/16 17:44:25

处理时间 (V2) : 2025/12/17 10:03:32

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 1.0ml/min

波长:237nm/250nm


版本号:6.115

实验者:wangdan


处理者:wangdan

<色谱图>

mV



mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.866	46397	100.000	8515	2756	1.130	--
总计		46397	100.000	8515			

检测器A Ch2 250nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.186	57055	100.000	12718	1650	1.254	--
总计		57055	100.000	12718			



SMF-227

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$SMF-227 - 0-26/18-1141-2 - zzp-25120901p-pH4.5jz-150mg10mg-rcqx-lf100z-p5-30min.lcd

方法文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-RC-FX267.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-20251216-FX267.lcb

样品瓶号 : 2-41

进样体积 : 10μl

进样时间 : 2025/12/16 17:47:49

处理时间 (V2) : 2025/12/17 10:03:35

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 1.0ml/min



波长:237nm/250nm

版本号:6.115

实验者:wangdan

处理者:wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.865	46095	100.000	8453	2748	1.133	--
总计		46095	100.000	8453			

检测器A Ch2 250nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.186	57328	100.000	12782	1650	1.255	--
总计		57328	100.000	12782			



SMF-227

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$SMF-227 - 0-26/18-1142-2 - zzp-25120901p-pH4.5jz-150mg10mg-rcqx-lf100z-p6-30min.lcd

方法文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-RC-FX267.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-20251216-FX267.lcb

样品瓶号 : 2-50

进样体积 : 10μl

进样时间 : 2025/12/16 17:51:12

处理时间 (V2) : 2025/12/17 10:03:39

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 1.0ml/min



波长:237nm/250nm

版本号:6.115

实验者:wangdan

处理者:wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.862	45754	100.000	8419	2761	1.127	--
总计		45754	100.000	8419			

检测器A Ch2 250nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.185	57769	100.000	12862	1651	1.252	--
总计		57769	100.000	12862			



SMF-227

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$SMF-227 - 0-26/18-1143-2 - zzp-25120901p-pH4.5jz-150mg10mg-rcqx-lf100z-p1-45min.lcd

方法文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-RC-FX267.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-20251216-FX267.lcb

样品瓶号 : 2-6

进样体积 : 10μl

进样时间 : 2025/12/16 17:54:37

处理时间 (V2) : 2025/12/17 10:03:42

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 1.0ml/min



波长:237nm/250nm

版本号:6.115

实验者:wangdan

处理者:wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.863	49694	100.000	9137	2749	1.130	--
总计		49694	100.000	9137			

检测器A Ch2 250nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.185	59403	100.000	13204	1650	1.253	--
总计		59403	100.000	13204			



SMF-227

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$SMF-227 - 0-26/18-1144-2 - zzp-25120901p-pH4.5jz-150mg10mg-rcqx-lf100z-p2-45min.lcd

方法文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-RC-FX267.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-20251216-FX267.lcb

样品瓶号 : 2-15

进样体积 : 10μl

进样时间 : 2025/12/16 17:58:01

处理时间 (V2) : 2025/12/17 10:03:45

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 1.0ml/min



波长:237nm/250nm

版本号:6.115

实验者:wangdan

处理者:wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.866	50394	100.000	9226	2760	1.126	--
总计		50394	100.000	9226			

检测器A Ch2 250nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.187	61256	100.000	13677	1651	1.256	--
总计		61256	100.000	13677			



SMF-227

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$SMF-227 - 0-26/18-1145-2 - zzp-25120901p-pH4.5jz-150mg10mg-rcqx-lf100z-p3-45min.lcd

方法文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-RC-FX267.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-20251216-FX267.lcb

样品瓶号 : 2-24

进样体积 : 10μl

进样时间 : 2025/12/16 18:01:24

处理时间 (V2) : 2025/12/17 10:03:48

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 1.0ml/min



波长:237nm/250nm

版本号:6.115

实验者:wangdan

处理者:wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.863	50355	100.000	9235	2747	1.131	--
总计		50355	100.000	9235			

检测器A Ch2 250nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.186	59912	100.000	13353	1651	1.253	--
总计		59912	100.000	13353			



SMF-227

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$SMF-227 - 0-26/18-1146-2 - zzp-25120901p-pH4.5jz-150mg10mg-rcqx-lf100z-p4-45min.lcd

方法文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-RC-FX267.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-20251216-FX267.lcb

样品瓶号 : 2-33

进样体积 : 10μl

进样时间 : 2025/12/16 18:04:47

处理时间 (V2) : 2025/12/17 10:03:51

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 1.0ml/min



波长:237nm/250nm

版本号:6.115

实验者:wangdan

处理者:wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.862	49486	100.000	9071	2746	1.129	--
总计		49486	100.000	9071			

检测器A Ch2 250nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.185	57872	100.000	12825	1646	1.259	--
总计		57872	100.000	12825			



SMF-227

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$SMF-227 - 0-26/18-1147-2 - zzp-25120901p-pH4.5jz-150mg10mg-rcqx-lf100z-p5-45min.lcd

方法文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-RC-FX267.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-20251216-FX267.lcb

样品瓶号 : 2-42

进样体积 : 10μl

进样时间 : 2025/12/16 18:08:12

处理时间 (V2) : 2025/12/17 10:03:54

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 1.0ml/min



波长:237nm/250nm

版本号:6.115

实验者:wangdan

处理者:wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.864	50512	100.000	9268	2745	1.131	--
总计		50512	100.000	9268			

检测器A Ch2 250nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.186	59817	100.000	13304	1645	1.254	--
总计		59817	100.000	13304			



SMF-227

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$SMF-227 - 0-26/18-1148-2 - zzp-25120901p-pH4.5jz-150mg10mg-rcqx-lf100z-p6-45min.lcd

方法文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-RC-FX267.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-20251216-FX267.lcb

样品瓶号 : 2-51

进样体积 : 10μl

进样时间 : 2025/12/16 18:11:35

处理时间 (V2) : 2025/12/17 10:03:57

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 1.0ml/min



波长:237nm/250nm

版本号:6.115

实验者:wangdan

处理者:wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.866	51084	100.000	9358	2754	1.130	--
总计		51084	100.000	9358			

检测器A Ch2 250nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.187	60962	100.000	13590	1647	1.252	--
总计		60962	100.000	13590			



SMF-227

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$SMF-227 - 0-26/18-1149-2 - zzp-25120901p-pH4.5jz-150mg10mg-rcqx-lf100z-p1-60min.lcd

方法文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-RC-FX267.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-20251216-FX267.lcb

样品瓶号 : 2-7

进样体积 : 10μl

进样时间 : 2025/12/16 18:14:59

处理时间 (V2) : 2025/12/17 10:04:01

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 1.0ml/min



波长:237nm/250nm

版本号:6.115

实验者:wangdan

处理者:wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.863	52127	100.000	9603	2753	1.132	--
总计		52127	100.000	9603			

检测器A Ch2 250nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.185	59931	100.000	13348	1652	1.256	--
总计		59931	100.000	13348			



SMF-227

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$SMF-227 - 0-26/18-1150-2 - zzp-25120901p-pH4.5jz-150mg10mg-rcqx-lf100z-p2-60min.lcd

方法文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-RC-FX267.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-20251216-FX267.lcb

样品瓶号 : 2-16

进样体积 : 10μl

进样时间 : 2025/12/16 18:18:22

处理时间 (V2) : 2025/12/17 10:04:04

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 1.0ml/min



波长:237nm/250nm

版本号:6.115

实验者:wangdan

处理者:wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.862	52840	100.000	9720	2756	1.131	--
总计		52840	100.000	9720			

检测器A Ch2 250nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.185	61985	100.000	13773	1655	1.257	--
总计		61985	100.000	13773			



SMF-227

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$SMF-227 - 0-26/18-1151-2 - zzp-25120901p-pH4.5jz-150mg10mg-rcqx-lf100z-p3-60min.lcd

方法文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-RC-FX267.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-20251216-FX267.lcb

样品瓶号 : 2-25

进样体积 : 10μl

进样时间 : 2025/12/16 18:21:46

处理时间 (V2) : 2025/12/17 10:04:07

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 1.0ml/min



波长:237nm/250nm

版本号:6.115

实验者:wangdan

处理者:wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.865	53403	100.000	9774	2739	1.132	--
总计		53403	100.000	9774			

检测器A Ch2 250nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.186	61351	100.000	13623	1639	1.261	--
总计		61351	100.000	13623			



SMF-227

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$SMF-227 - 0-26/18-1152-2 - zzp-25120901p-pH4.5jz-150mg10mg-rcqx-lf100z-p4-60min.lcd

方法文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-RC-FX267.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-20251216-FX267.lcb

样品瓶号 : 2-34

进样体积 : 10μl

进样时间 : 2025/12/16 18:25:11

处理时间 (V2) : 2025/12/17 10:04:10

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 1.0ml/min



波长:237nm/250nm

版本号:6.115

实验者:wangdan

处理者:wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.863	53492	100.000	9833	2754	1.134	--
总计		53492	100.000	9833			

检测器A Ch2 250nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.185	60372	100.000	13394	1647	1.260	--
总计		60372	100.000	13394			



SMF-227

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$SMF-227 - 0-26/18-1153-2 - zzp-25120901p-pH4.5jz-150mg10mg-rcqx-lf100z-p5-60min.lcd

方法文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-RC-FX267.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-20251216-FX267.lcb

样品瓶号 : 2-43

进样体积 : 10μl

进样时间 : 2025/12/16 18:28:34

处理时间 (V2) : 2025/12/17 10:04:13

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 1.0ml/min



波长:237nm/250nm

版本号:6.115

实验者:wangdan

处理者:wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.862	52351	100.000	9645	2758	1.128	--
总计		52351	100.000	9645			

检测器A Ch2 250nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.185	59952	100.000	13343	1652	1.257	--
总计		59952	100.000	13343			



SMF-227

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$SMF-227 - 0-26/18-1154-2 - zzp-25120901p-pH4.5jz-150mg10mg-rcqx-lf100z-p6-60min.lcd

方法文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-RC-FX267.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-20251216-FX267.lcb

样品瓶号 : 2-52

进样体积 : 10μl

进样时间 : 2025/12/16 18:31:57

处理时间 (V2) : 2025/12/17 10:04:16

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 1.0ml/min


波长:237nm/250nm

版本号:6.115

实验者:wangdan

处理者:wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.864	53694	100.000	9882	2762	1.131	--
总计		53694	100.000	9882			

检测器A Ch2 250nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.186	61496	100.000	13695	1649	1.259	--
总计		61496	100.000	13695			



SMF-227

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$SMF-227 - 0-26/18-1155-2 - zzp-25120901p-pH4.5jz-150mg10mg-rcqx-lf100z-p1-90min.lcd

方法文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-RC-FX267.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-20251216-FX267.lcb

样品瓶号 : 2-8

进样体积 : 10μl

进样时间 : 2025/12/16 18:35:22

处理时间 (V2) : 2025/12/17 10:04:19

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 1.0ml/min



波长:237nm/250nm

版本号:6.115

实验者:wangdan

处理者:wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.864	55493	100.000	10195	2750	1.131	--
总计		55493	100.000	10195			

检测器A Ch2 250nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.186	60488	100.000	13465	1645	1.256	--
总计		60488	100.000	13465			



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-227

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$SMF-227 - 0-26/18-1156-2 - zzp-25120901p-pH4.5jz-150mg10mg-rcqx-lf100z-p2-90min.lcd

方法文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-RC-FX267.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-20251216-FX267.lcb

样品瓶号 : 2-17

进样体积 : 10μl

进样时间 : 2025/12/16 18:38:46

处理时间 (V2) : 2025/12/17 10:04:22

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 1.0ml/min

波长:237nm/250nm


版本号:6.115

实验者:wangdan


处理者:wangdan

<色谱图>

mV



mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.862	55853	100.000	10296	2757	1.127	--
总计		55853	100.000	10296			

检测器A Ch2 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.185	62291	100.000	13841	1654	1.255	--
总计		62291	100.000	13841			



SMF-227

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$SMF-227 - 0-26/18-1157-2 - zzp-25120901p-pH4.5jz-150mg10mg-rcqx-lf100z-p3-90min.lcd

方法文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-RC-FX267.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-20251216-FX267.lcb

样品瓶号 : 2-26

进样体积 : 10μl

进样时间 : 2025/12/16 18:42:10

处理时间 (V2) : 2025/12/17 10:04:25

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 1.0ml/min



波长:237nm/250nm

版本号:6.115

实验者:wangdan

处理者:wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.862	56025	100.000	10290	2741	1.126	--
总计		56025	100.000	10290			

检测器A Ch2 250nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.184	61667	100.000	13622	1637	1.256	--
总计		61667	100.000	13622			



SMF-227

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$SMF-227 - 0-26/18-1158-2 - zzp-25120901p-pH4.5jz-150mg10mg-rcqx-lf100z-p4-90min.lcd

方法文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-RC-FX267.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-20251216-FX267.lcb

样品瓶号 : 2-35

进样体积 : 10μl

进样时间 : 2025/12/16 18:45:34

处理时间 (V2) : 2025/12/17 10:04:28

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 1.0ml/min



波长:237nm/250nm

版本号:6.115

实验者:wangdan

处理者:wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.865	56824	100.000	10431	2750	1.131	--
总计		56824	100.000	10431			

检测器A Ch2 250nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.186	60850	100.000	13553	1652	1.256	--
总计		60850	100.000	13553			



SMF-227

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$SMF-227 - 0-26/18-1159-2 - zzp-25120901p-pH4.5jz-150mg10mg-rcqx-lf100z-p5-90min.lcd

方法文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-RC-FX267.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-20251216-FX267.lcb

样品瓶号 : 2-44

进样体积 : 10μl

进样时间 : 2025/12/16 18:48:57

处理时间 (V2) : 2025/12/17 10:04:31

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 1.0ml/min


波长:237nm/250nm

版本号:6.115

实验者:wangdan

处理者:wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.862	55656	100.000	10295	2774	1.127	--
总计		55656	100.000	10295			

检测器A Ch2 250nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.185	60780	100.000	13594	1665	1.249	--
总计		60780	100.000	13594			



SMF-227

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$SMF-227 - 0-26/18-1160-2 - zzp-25120901p-pH4.5jz-150mg10mg-rcqx-lf100z-p6-90min.lcd

方法文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-RC-FX267.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-20251216-FX267.lcb

样品瓶号 : 2-53

进样体积 : 10μl

进样时间 : 2025/12/16 18:52:22

处理时间 (V2) : 2025/12/17 10:04:34

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 1.0ml/min


波长:237nm/250nm

版本号:6.115

实验者:wangdan

处理者:wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.863	56131	100.000	10285	2745	1.128	--
总计		56131	100.000	10285			

检测器A Ch2 250nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.185	60556	100.000	13452	1648	1.255	--
总计		60556	100.000	13452			



SMF-227

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$SMF-227 - 0-26/18-1161-2 - zzp-25120901p-pH4.5jz-150mg10mg-rcqx-lf100z-p1-120min.lcd

方法文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-RC-FX267.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-20251216-FX267.lcb

样品瓶号 : 4-3

进样体积 : 10μl

进样时间 : 2025/12/16 18:55:44

处理时间 (V2) : 2025/12/17 10:04:37

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 1.0ml/min



波长:237nm/250nm

版本号:6.115

实验者:wangdan

处理者:wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.865	57041	100.000	10486	2754	1.128	--
总计		57041	100.000	10486			

检测器A Ch2 250nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.187	60410	100.000	13448	1649	1.255	--
总计		60410	100.000	13448			



SMF-227

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$SMF-227 - 0-26/18-1162-2 - zzp-25120901p-pH4.5jz-150mg10mg-rcqx-lf100z-p2-120min.lcd

方法文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-RC-FX267.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-20251216-FX267.lcb

样品瓶号 : 4-12

进样体积 : 10μl

进样时间 : 2025/12/16 18:59:08

处理时间 (V2) : 2025/12/17 10:04:40

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 1.0ml/min


波长:237nm/250nm

版本号:6.115

实验者:wangdan

处理者:wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.862	57903	100.000	10685	2767	1.118	--
总计		57903	100.000	10685			

检测器A Ch2 250nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.185	62226	100.000	13910	1669	1.248	--
总计		62226	100.000	13910			



SMF-227

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$SMF-227 - 0-26/18-1163-2 - zzp-25120901p-pH4.5jz-150mg10mg-rcqx-lf100z-p3-120min.lcd

方法文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-RC-FX267.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-20251216-FX267.lcb

样品瓶号 : 4-21

进样体积 : 10μl

进样时间 : 2025/12/16 19:02:31

处理时间 (V2) : 2025/12/17 10:04:43

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 1.0ml/min

波长:237nm/250nm


版本号:6.115

实验者:wangdan


处理者:wangdan

<色谱图>

mV



mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.863	58075	100.000	10694	2755	1.132	--
总计		58075	100.000	10694			

检测器A Ch2 250nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.185	62068	100.000	13845	1657	1.250	--
总计		62068	100.000	13845			



SMF-227

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$SMF-227 - 0-26/18-1164-2 - zzp-25120901p-pH4.5jz-150mg10mg-rcqx-lf100z-p4-120min.lcd

方法文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-RC-FX267.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-20251216-FX267.lcb

样品瓶号 : 4-30

进样体积 : 10μl

进样时间 : 2025/12/16 19:05:54

处理时间 (V2) : 2025/12/17 10:04:46

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 1.0ml/min



波长:237nm/250nm

版本号:6.115

实验者:wangdan

处理者:wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.865	58107	100.000	10689	2760	1.124	--
总计		58107	100.000	10689			

检测器A Ch2 250nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.186	60251	100.000	13450	1655	1.255	--
总计		60251	100.000	13450			



SMF-227

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$SMF-227 - 0-26/18-1165-2 - zzp-25120901p-pH4.5jz-150mg10mg-rcqx-lf100z-p5-120min.lcd

方法文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-RC-FX267.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-20251216-FX267.lcb

样品瓶号 : 4-39

进样体积 : 10μl

进样时间 : 2025/12/16 19:09:17

处理时间 (V2) : 2025/12/17 10:04:49

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 1.0ml/min

波长:237nm/250nm


版本号:6.115

实验者:wangdan


处理者:wangdan

<色谱图>

mV



mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.861	56804	100.000	10488	2764	1.127	--
总计		56804	100.000	10488			

检测器A Ch2 250nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.185	60271	100.000	13413	1660	1.257	--
总计		60271	100.000	13413			



SMF-227

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$SMF-227 - 0-26/18-1166-2 - zzp-25120901p-pH4.5jz-150mg10mg-rcqx-lf100z-p6-120min.lcd

方法文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-RC-FX267.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-20251216-FX267.lcb

样品瓶号 : 4-48

进样体积 : 10μl

进样时间 : 2025/12/16 19:12:40

处理时间 (V2) : 2025/12/17 10:04:52

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 1.0ml/min


波长:237nm/250nm

版本号:6.115

实验者:wangdan

处理者:wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.862	58563	100.000	10774	2757	1.129	--
总计		58563	100.000	10774			

检测器A Ch2 250nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.185	61176	100.000	13626	1658	1.256	--
总计		61176	100.000	13626			



SMF-227

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$SMF-227 - 0-26/18-1167-2 - zzp-25120901p-pH4.5jz-150mg10mg-rcqx-lf100z-p1-jx.lcd

方法文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-RC-FX267.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-20251216-FX267.lcb

样品瓶号 : 4-4

进样体积 : 10μl

进样时间 : 2025/12/16 19:16:03

处理时间 (V2) : 2025/12/17 10:04:55

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 1.0ml/min

波长:237nm/250nm


版本号:6.115

实验者:wangdan


处理者:wangdan

<色谱图>

mV



mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.865	58377	100.000	10719	2759	1.128	--
总计		58377	100.000	10719			

检测器A Ch2 250nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.186	61392	100.000	13744	1658	1.256	--
总计		61392	100.000	13744			



SMF-227

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$SMF-227 - 0-26/18-1168-2 - zzp-25120901p-pH4.5jz-150mg10mg-rcqx-lf100z-p2-jx.lcd

方法文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-RC-FX267.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-20251216-FX267.lcb

样品瓶号 : 4-13

进样体积 : 10μl

进样时间 : 2025/12/16 19:19:26

处理时间 (V2) : 2025/12/17 10:04:58

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 1.0ml/min



波长:237nm/250nm

版本号:6.115

实验者:wangdan

处理者:wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.861	57791	100.000	10640	2768	1.132	--
总计		57791	100.000	10640			

检测器A Ch2 250nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.184	62408	100.000	13864	1657	1.257	--
总计		62408	100.000	13864			



SMF-227

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$SMF-227 - 0-26/18-1169-2 - zzp-25120901p-pH4.5jz-150mg10mg-rcqx-lf100z-p3-jx.lcd

方法文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-RC-FX267.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-20251216-FX267.lcb

样品瓶号 : 4-22

进样体积 : 10μl

进样时间 : 2025/12/16 19:22:50

处理时间 (V2) : 2025/12/17 10:05:01

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 1.0ml/min



波长:237nm/250nm

版本号:6.115

实验者:wangdan

处理者:wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.862	57623	100.000	10604	2755	1.134	--
总计		57623	100.000	10604			

检测器A Ch2 250nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.185	61814	100.000	13733	1657	1.254	--
总计		61814	100.000	13733			



SMF-227

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$SMF-227 - 0-26/18-1170-2 - zzp-25120901p-pH4.5jz-150mg10mg-rcqx-lf100z-p4-jx.lcd

方法文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-RC-FX267.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-20251216-FX267.lcb

样品瓶号 : 4-31

进样体积 : 10μl

进样时间 : 2025/12/16 19:26:14

处理时间 (V2) : 2025/12/17 10:05:04

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 1.0ml/min



波长:237nm/250nm

版本号:6.115

实验者:wangdan

处理者:wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.864	58190	100.000	10657	2747	1.136	--
总计		58190	100.000	10657			

检测器A Ch2 250nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.186	60966	100.000	13560	1644	1.258	--
总计		60966	100.000	13560			



SMF-227

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$SMF-227 - 0-26/18-1171-2 - zzp-25120901p-pH4.5jz-150mg10mg-rcqx-lf100z-p5-jx.lcd

方法文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-RC-FX267.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-20251216-FX267.lcb

样品瓶号 : 4-40

进样体积 : 10μl

进样时间 : 2025/12/16 19:29:37

处理时间 (V2) : 2025/12/17 10:05:07

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 1.0ml/min



波长:237nm/250nm

版本号:6.115

实验者:wangdan

处理者:wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.861	57908	100.000	10660	2764	1.130	--
总计		57908	100.000	10660			

检测器A Ch2 250nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.184	60919	100.000	13584	1661	1.254	--
总计		60919	100.000	13584			



SMF-227

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$SMF-227 - 0-26/18-1172-2 - zzp-25120901p-pH4.5jz-150mg10mg-rcqx-lf100z-p6-jx.lcd

方法文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-RC-FX267.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-20251216-FX267.lcb

样品瓶号 : 4-49

进样体积 : 10μl

进样时间 : 2025/12/16 19:33:00

处理时间 (V2) : 2025/12/17 10:05:10

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 1.0ml/min



波长:237nm/250nm

版本号:6.115

实验者:wangdan

处理者:wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.861	59389	100.000	10907	2754	1.127	--
总计		59389	100.000	10907			

检测器A Ch2 250nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.183	62449	100.000	13922	1652	1.258	--
总计		62449	100.000	13922			



SMF-227

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$SMF-227 - 0-26/18-1173-2 - zzp-25120901p-pH4.5jz-150mg10mg-rcqx-lf100z-dz2-1.lcd

方法文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-RC-FX267.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-20251216-FX267.lcb

样品瓶号 : 2-27

进样体积 : 10μl

进样时间 : 2025/12/16 19:36:23

处理时间 (V2) : 2025/12/17 10:05:13

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 1.0ml/min



波长:237nm/250nm

版本号:6.115

实验者:wangdan

处理者:wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.864	863928	100.000	157955	2730	1.129	--
总计		863928	100.000	157955			

检测器A Ch2 250nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.185	63459	100.000	14024	1635	1.258	--
总计		63459	100.000	14024			



SMF-227

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$SMF-227 - 0-26/18-1174-2 - zzp-25120901p-pH4.5jz-150mg10mg-rcqx-lf100z-dz2-2.lcd

方法文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-RC-FX267.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-20251216-FX267.lcb

样品瓶号 : 2-27

进样体积 : 10μl

进样时间 : 2025/12/16 19:39:48

处理时间 (V2) : 2025/12/17 10:05:16

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 1.0ml/min



波长:237nm/250nm

版本号:6.115

实验者:wangdan

处理者:wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.860	864220	100.000	157705	2730	1.129	--
总计		864220	100.000	157705			

检测器A Ch2 250nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.183	63537	100.000	14068	1634	1.256	--
总计		63537	100.000	14068			



SMF-227

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$SMF-227 - 0-26/18-1175-2 - zzp-25120901p-pH6.8jz-150mg10mg-rcqx-lf100z-rj.lcd

方法文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-RC-FX267.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-20251216-FX267.lcb

样品瓶号 : 3-9

进样体积 : 10μl

进样时间 : 2025/12/16 19:43:11

处理时间 (V2) : 2025/12/17 10:05:19

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 1.0ml/min


波长:237nm/250nm

版本号:6.115

实验者:wangdan

处理者:wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

检测器A Ch2 250nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							



SMF-227

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$SMF-227 - 0-26/18-1176-2 - zzp-25120901p-pH6.8jz-150mg10mg-rcqx-lf100z-dz1-1.lcd

方法文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-RC-FX267.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-20251216-FX267.lcb

样品瓶号 : 3-18

进样体积 : 10μl

进样时间 : 2025/12/16 19:46:34

处理时间 (V2) : 2025/12/17 10:05:23

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 1.0ml/min


波长:237nm/250nm

版本号:6.115

实验者:wangdan

处理者:wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.864	853014	100.000	156994	2764	1.122	--
总计		853014	100.000	156994			

检测器A Ch2 250nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.185	62836	100.000	14015	1658	1.248	--
总计		62836	100.000	14015			



SMF-227

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$SMF-227 - 0-26/18-1177-2 - zzp-25120901p-pH6.8jz-150mg10mg-rcqx-lf100z-dz1-2.lcd

方法文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-RC-FX267.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-20251216-FX267.lcb

样品瓶号 : 3-18

进样体积 : 10μl

进样时间 : 2025/12/16 19:49:56

处理时间 (V2) : 2025/12/17 10:05:26

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 1.0ml/min



波长:237nm/250nm

版本号:6.115

实验者:wangdan

处理者:wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.861	852911	100.000	155991	2734	1.129	--
总计		852911	100.000	155991			

检测器A Ch2 250nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.184	62606	100.000	13854	1636	1.259	--
总计		62606	100.000	13854			



SMF-227

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$SMF-227 - 0-26/18-1178-2 - zzp-25120901p-pH6.8jz-150mg10mg-rcqx-lf100z-dz1-3.lcd

方法文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-RC-FX267.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-20251216-FX267.lcb

样品瓶号 : 3-18

进样体积 : 10μl

进样时间 : 2025/12/16 19:53:18

处理时间 (V2) : 2025/12/17 10:05:29

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 1.0ml/min



波长:237nm/250nm

版本号:6.115

实验者:wangdan

处理者:wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.861	853488	100.000	155962	2733	1.127	--
总计		853488	100.000	155962			

检测器A Ch2 250nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.184	62884	100.000	13900	1638	1.256	--
总计		62884	100.000	13900			



SMF-227

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$SMF-227 - 0-26/18-1179-2 - zzp-25120901p-pH6.8jz-150mg10mg-rcqx-lf100z-dz1-4.lcd

方法文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-RC-FX267.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-20251216-FX267.lcb

样品瓶号 : 3-18

进样体积 : 10μl

进样时间 : 2025/12/16 19:56:42

处理时间 (V2) : 2025/12/17 10:05:32

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 1.0ml/min



波长:237nm/250nm

版本号:6.115

实验者:wangdan

处理者:wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.864	853397	100.000	156063	2736	1.128	--
总计		853397	100.000	156063			

检测器A Ch2 250nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.185	62874	100.000	13922	1637	1.255	--
总计		62874	100.000	13922			



SMF-227

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$SMF-227 - 0-26/18-1180-2 - zzp-25120901p-pH6.8jz-150mg10mg-rcqx-lf100z-dz1-5.lcd

方法文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-RC-FX267.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-20251216-FX267.lcb

样品瓶号 : 3-18

进样体积 : 10μl

进样时间 : 2025/12/16 20:00:04

处理时间 (V2) : 2025/12/17 10:05:35

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 1.0ml/min


波长:237nm/250nm

版本号:6.115

实验者:wangdan

处理者:wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.861	851301	100.000	156316	2755	1.123	--
总计		851301	100.000	156316			

检测器A Ch2 250nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.184	62668	100.000	13927	1649	1.252	--
总计		62668	100.000	13927			



SMF-227

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$SMF-227 - 0-26/18-1181-2 - zzp-25120901p-pH6.8jz-150mg10mg-rcqx-lf100z-p1-5min.lcd

方法文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-RC-FX267.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-20251216-FX267.lcb

样品瓶号 : 3-1

进样体积 : 10μl

进样时间 : 2025/12/16 20:03:26

处理时间 (V2) : 2025/12/17 10:05:38

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 1.0ml/min



波长:237nm/250nm

版本号:6.115

实验者:wangdan

处理者:wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.861	97484	100.000	17967	2777	1.127	--
总计		97484	100.000	17967			

检测器A Ch2 250nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.184	6815	100.000	1493	1653	1.285	--
总计		6815	100.000	1493			



SMF-227

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$SMF-227 - 0-26/18-1182-2 - zzp-25120901p-pH6.8jz-150mg10mg-rcqx-lf100z-p2-5min.lcd

方法文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-RC-FX267.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-20251216-FX267.lcb

样品瓶号 : 3-10

进样体积 : 10μl

进样时间 : 2025/12/16 20:06:47

处理时间 (V2) : 2025/12/17 10:05:41

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 1.0ml/min



波长:237nm/250nm

版本号:6.115

实验者:wangdan

处理者:wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.865	104160	100.000	19222	2785	1.125	--
总计		104160	100.000	19222			

检测器A Ch2 250nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.186	7239	100.000	1606	1638	1.278	--
总计		7239	100.000	1606			



SMF-227

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$SMF-227 - 0-26/18-1183-2 - zzp-25120901p-pH6.8jz-150mg10mg-rcqx-lf100z-p3-5min.lcd

方法文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-RC-FX267.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-20251216-FX267.lcb

样品瓶号 : 3-19

进样体积 : 10μl

进样时间 : 2025/12/16 20:10:10

处理时间 (V2) : 2025/12/17 10:05:44

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 1.0ml/min



波长:237nm/250nm

版本号:6.115

实验者:wangdan

处理者:wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.863	146892	100.000	27042	2767	1.127	--
总计		146892	100.000	27042			

检测器A Ch2 250nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							



SMF-227

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$SMF-227 - 0-26/18-1184-2 - zzp-25120901p-pH6.8jz-150mg10mg-rcqx-lf100z-p4-5min.lcd

方法文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-RC-FX267.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-20251216-FX267.lcb

样品瓶号 : 3-28

进样体积 : 10μl

进样时间 : 2025/12/16 20:13:32

处理时间 (V2) : 2025/12/17 10:05:47

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 1.0ml/min



波长:237nm/250nm

版本号:6.115

实验者:wangdan

处理者:wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.861	92042	100.000	17028	2787	1.121	--
总计		92042	100.000	17028			

检测器A Ch2 250nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							



SMF-227

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$SMF-227 - 0-26/18-1185-2 - zzp-25120901p-pH6.8jz-150mg10mg-rcqx-lf100z-p5-5min.lcd

方法文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-RC-FX267.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-20251216-FX267.lcb

样品瓶号 : 3-37

进样体积 : 10μl

进样时间 : 2025/12/16 20:16:54

处理时间 (V2) : 2025/12/17 10:05:50

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 1.0ml/min



波长:237nm/250nm

版本号:6.115

实验者:wangdan

处理者:wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.862	46336	100.000	8578	2786	1.123	--
总计		46336	100.000	8578			

检测器A Ch2 250nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							



SMF-227

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$SMF-227 - 0-26/18-1186-2 - zzp-25120901p-pH6.8jz-150mg10mg-rcqx-lf100z-p6-5min.lcd

方法文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-RC-FX267.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-20251216-FX267.lcb

样品瓶号 : 3-46

进样体积 : 10μl

进样时间 : 2025/12/16 20:20:16

处理时间 (V2) : 2025/12/17 10:05:54

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 1.0ml/min



波长:237nm/250nm

版本号:6.115

实验者:wangdan

处理者:wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.865	102147	100.000	18889	2797	1.124	--
总计		102147	100.000	18889			

检测器A Ch2 250nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.186	5891	100.000	1302	1658	1.302	--
总计		5891	100.000	1302			



SMF-227

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$SMF-227 - 0-26/18-1187-2 - zzp-25120901p-pH6.8jz-150mg10mg-rcqx-lf100z-p1-10min.lcd

方法文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-RC-FX267.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-20251216-FX267.lcb

样品瓶号 : 3-2

进样体积 : 10μl

进样时间 : 2025/12/16 20:23:37

处理时间 (V2) : 2025/12/17 10:05:57

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 1.0ml/min



波长:237nm/250nm

版本号:6.115

实验者:wangdan

处理者:wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.863	353196	100.000	65161	2779	1.126	--
总计		353196	100.000	65161			

检测器A Ch2 250nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.185	32450	100.000	7282	1673	1.255	--
总计		32450	100.000	7282			



SMF-227

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$SMF-227 - 0-26/18-1188-2 - zzp-25120901p-pH6.8jz-150mg10mg-rcqx-lf100z-p2-10min.lcd

方法文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-RC-FX267.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-20251216-FX267.lcb

样品瓶号 : 3-11

进样体积 : 10μl

进样时间 : 2025/12/16 20:26:58

处理时间 (V2) : 2025/12/17 10:06:00

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 1.0ml/min



波长:237nm/250nm

版本号:6.115

实验者:wangdan

处理者:wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.862	341317	100.000	62948	2775	1.127	--
总计		341317	100.000	62948			

检测器A Ch2 250nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.185	32692	100.000	7302	1676	1.265	--
总计		32692	100.000	7302			



SMF-227

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$SMF-227 - 0-26/18-1189-2 - zzp-25120901p-pH6.8jz-150mg10mg-rcqx-lf100z-p3-10min.lcd

方法文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-RC-FX267.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-20251216-FX267.lcb

样品瓶号 : 3-20

进样体积 : 10μl

进样时间 : 2025/12/16 20:30:19

处理时间 (V2) : 2025/12/17 10:06:03

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 1.0ml/min



波长:237nm/250nm

版本号:6.115

实验者:wangdan

处理者:wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.863	387241	100.000	71744	2795	1.122	--
总计		387241	100.000	71744			

检测器A Ch2 250nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.186	30375	100.000	6817	1679	1.250	--
总计		30375	100.000	6817			



SMF-227

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$SMF-227 - 0-26/18-1190-2 - zzp-25120901p-pH6.8jz-150mg10mg-rcqx-lf100z-p4-10min.lcd

方法文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-RC-FX267.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-20251216-FX267.lcb

样品瓶号 : 3-29

进样体积 : 10μl

进样时间 : 2025/12/16 20:33:42

处理时间 (V2) : 2025/12/17 10:06:06

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 1.0ml/min

波长:237nm/250nm


版本号:6.115

实验者:wangdan


处理者:wangdan

<色谱图>

mV



mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.866	332191	100.000	60954	2776	1.128	--
总计		332191	100.000	60954			

检测器A Ch2 250nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.187	30628	100.000	6881	1672	1.254	--
总计		30628	100.000	6881			



SMF-227

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$SMF-227 - 0-26/18-1191-2 - zzp-25120901p-pH6.8jz-150mg10mg-rcqx-lf100z-p5-10min.lcd

方法文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-RC-FX267.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-20251216-FX267.lcb

样品瓶号 : 3-38

进样体积 : 10μl

进样时间 : 2025/12/16 20:37:03

处理时间 (V2) : 2025/12/17 10:06:09

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 1.0ml/min

波长:237nm/250nm


版本号:6.115

实验者:wangdan


处理者:wangdan

<色谱图>

mV



mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.865	250066	100.000	46074	2775	1.128	--
总计		250066	100.000	46074			

检测器A Ch2 250nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.187	28799	100.000	6456	1661	1.257	--
总计		28799	100.000	6456			



SMF-227

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$SMF-227 - 0-26/18-1192-2 - zzp-25120901p-pH6.8jz-150mg10mg-rcqx-lf100z-p6-10min.lcd

方法文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-RC-FX267.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-20251216-FX267.lcb

样品瓶号 : 3-47

进样体积 : 10μl

进样时间 : 2025/12/16 20:40:25

处理时间 (V2) : 2025/12/17 10:06:12

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 1.0ml/min



波长:237nm/250nm

版本号:6.115

实验者:wangdan

处理者:wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.862	315854	100.000	58359	2786	1.126	--
总计		315854	100.000	58359			

检测器A Ch2 250nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.185	29753	100.000	6672	1681	1.259	--
总计		29753	100.000	6672			



SMF-227

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$SMF-227 - 0-26/18-1193-2 - zzp-25120901p-pH6.8jz-150mg10mg-rcqx-lf100z-p1-15min.lcd

方法文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-RC-FX267.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-20251216-FX267.lcb

样品瓶号 : 3-3

进样体积 : 10μl

进样时间 : 2025/12/16 20:43:46

处理时间 (V2) : 2025/12/17 10:06:15

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 1.0ml/min

波长:237nm/250nm


版本号:6.115

实验者:wangdan


处理者:wangdan

<色谱图>

mV



mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.862	508657	100.000	93750	2771	1.125	--
总计		508657	100.000	93750			

检测器A Ch2 250nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.185	41694	100.000	9314	1670	1.253	--
总计		41694	100.000	9314			



SMF-227

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$SMF-227 - 0-26/18-1194-2 - zzp-25120901p-pH6.8jz-150mg10mg-rcqx-lf100z-p2-15min.lcd

方法文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-RC-FX267.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-20251216-FX267.lcb

样品瓶号 : 3-12

进样体积 : 10μl

进样时间 : 2025/12/16 20:47:08

处理时间 (V2) : 2025/12/17 10:06:18

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 1.0ml/min



波长:237nm/250nm

版本号:6.115

实验者:wangdan

处理者:wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.864	518365	100.000	95653	2783	1.127	--
总计		518365	100.000	95653			

检测器A Ch2 250nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.186	42539	100.000	9529	1674	1.256	--
总计		42539	100.000	9529			



SMF-227

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$SMF-227 - 0-26/18-1195-2 - zzp-25120901p-pH6.8jz-150mg10mg-rcqx-lf100z-p3-15min.lcd

方法文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-RC-FX267.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-20251216-FX267.lcb

样品瓶号 : 3-21

进样体积 : 10μl

进样时间 : 2025/12/16 20:50:29

处理时间 (V2) : 2025/12/17 10:06:21

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 1.0ml/min



波长:237nm/250nm

版本号:6.115

实验者:wangdan

处理者:wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.866	551485	100.000	101296	2783	1.128	--
总计		551485	100.000	101296			

检测器A Ch2 250nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.187	42368	100.000	9497	1670	1.257	--
总计		42368	100.000	9497			



SMF-227

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$SMF-227 - 0-26/18-1196-2 - zzp-25120901p-pH6.8jz-150mg10mg-rcqx-lf100z-p4-15min.lcd

方法文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-RC-FX267.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-20251216-FX267.lcb

样品瓶号 : 3-30

进样体积 : 10μl

进样时间 : 2025/12/16 20:53:50

处理时间 (V2) : 2025/12/17 10:06:24

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 1.0ml/min



波长:237nm/250nm

版本号:6.115

实验者:wangdan

处理者:wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.864	501304	100.000	92478	2781	1.127	--
总计		501304	100.000	92478			

检测器A Ch2 250nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.186	41764	100.000	9367	1674	1.257	--
总计		41764	100.000	9367			





SMF-227

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温 : 40℃
数据文件名: RC\$SMF-227 - 0-26/18-1197-2 - zzp-25120901p-pH6.8jz-150mg10mg-rcqx-lf100z-p5-15min.lcd
方法文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-RC-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-20251216-FX267.lcb
样品瓶号 : 3-39
进样体积 : 10μl
进样时间 : 2025/12/16 20:57:12
处理时间 (V2) : 2025/12/17 10:06:27
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 1.0ml/min
波长:237nm/250nm
版本号:6.115
实验者:wangdan
处理者:wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.862	479711	100.000	88455	2776	1.128	--
总计		479711	100.000	88455			

检测器A Ch2 250nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.185	41121	100.000	9207	1679	1.255	--
总计		41121	100.000	9207			



SMF-227

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$SMF-227 - 0-26/18-1198-2 - zzp-25120901p-pH6.8jz-150mg10mg-rcqx-lf100z-p6-15min.lcd

方法文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-RC-FX267.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-20251216-FX267.lcb

样品瓶号 : 3-48

进样体积 : 10μl

进样时间 : 2025/12/16 21:00:33

处理时间 (V2) : 2025/12/17 10:06:31

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 1.0ml/min



波长:237nm/250nm

版本号:6.115

实验者:wangdan

处理者:wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.863	505806	100.000	93603	2794	1.126	--
总计		505806	100.000	93603			

检测器A Ch2 250nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.185	41852	100.000	9375	1682	1.253	--
总计		41852	100.000	9375			



SMF-227

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$SMF-227 - 0-26/18-1199-2 - zzp-25120901p-pH6.8jz-150mg10mg-rcqx-lf100z-p1-20min.lcd

方法文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-RC-FX267.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-20251216-FX267.lcb

样品瓶号 : 3-4

进样体积 : 10μl

进样时间 : 2025/12/16 21:03:54

处理时间 (V2) : 2025/12/17 10:06:34

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 1.0ml/min



波长:237nm/250nm

版本号:6.115

实验者:wangdan

处理者:wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.867	596201	100.000	109125	2778	1.129	--
总计		596201	100.000	109125			

检测器A Ch2 250nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.188	46742	100.000	10514	1671	1.254	--
总计		46742	100.000	10514			



SMF-227

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$SMF-227 - 0-26/18-1200-2 - zzp-25120901p-pH6.8jz-150mg10mg-rcqx-lf100z-p2-20min.lcd

方法文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-RC-FX267.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-20251216-FX267.lcb

样品瓶号 : 3-13

进样体积 : 10μl

进样时间 : 2025/12/16 21:07:15

处理时间 (V2) : 2025/12/17 10:06:37

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 1.0ml/min



波长:237nm/250nm

版本号:6.115

实验者:wangdan

处理者:wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.863	600975	100.000	111033	2785	1.126	--
总计		600975	100.000	111033			

检测器A Ch2 250nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.185	46677	100.000	10489	1679	1.251	--
总计		46677	100.000	10489			



SMF-227

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$SMF-227 - 0-26/18-1201-2 - zzp-25120901p-pH6.8jz-150mg10mg-rcqx-lf100z-p3-20min.lcd

方法文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-RC-FX267.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-20251216-FX267.lcb

样品瓶号 : 3-22

进样体积 : 10μl

进样时间 : 2025/12/16 21:10:37

处理时间 (V2) : 2025/12/17 10:06:40

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 1.0ml/min



波长:237nm/250nm

版本号:6.115

实验者:wangdan

处理者:wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.862	614016	100.000	113008	2764	1.128	--
总计		614016	100.000	113008			

检测器A Ch2 250nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.184	46346	100.000	10300	1664	1.258	--
总计		46346	100.000	10300			



SMF-227

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$SMF-227 - 0-26/18-1202-2 - zzp-25120901p-pH6.8jz-150mg10mg-rcqx-lf100z-p4-20min.lcd

方法文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-RC-FX267.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-20251216-FX267.lcb

样品瓶号 : 3-31

进样体积 : 10μl

进样时间 : 2025/12/16 21:13:59

处理时间 (V2) : 2025/12/17 10:06:43

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 1.0ml/min



波长:237nm/250nm

版本号:6.115

实验者:wangdan

处理者:wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.863	580801	100.000	107071	2775	1.127	--
总计		580801	100.000	107071			

检测器A Ch2 250nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.185	46488	100.000	10394	1671	1.253	--
总计		46488	100.000	10394			



SMF-227

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$SMF-227 - 0-26/18-1203-2 - zzp-25120901p-pH6.8jz-150mg10mg-rcqx-lf100z-p5-20min.lcd

方法文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-RC-FX267.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-20251216-FX267.lcb

样品瓶号 : 3-40

进样体积 : 10μl

进样时间 : 2025/12/16 21:17:21

处理时间 (V2) : 2025/12/17 10:06:46

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 1.0ml/min



波长:237nm/250nm

版本号:6.115

实验者:wangdan

处理者:wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.866	572844	100.000	105173	2777	1.128	--
总计		572844	100.000	105173			

检测器A Ch2 250nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.187	46260	100.000	10361	1667	1.255	--
总计		46260	100.000	10361			



SMF-227

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$SMF-227 - 0-26/18-1204-2 - zzp-25120901p-pH6.8jz-150mg10mg-rcqx-lf100z-p6-20min.lcd

方法文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-RC-FX267.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-20251216-FX267.lcb

样品瓶号 : 3-49

进样体积 : 10μl

进样时间 : 2025/12/16 21:20:42

处理时间 (V2) : 2025/12/17 10:06:49

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 1.0ml/min

波长:237nm/250nm


版本号:6.115

实验者:wangdan


处理者:wangdan

<色谱图>

mV



mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.862	583207	100.000	107872	2792	1.126	--
总计		583207	100.000	107872			

检测器A Ch2 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.185	46022	100.000	10329	1681	1.255	--
总计		46022	100.000	10329			



SMF-227

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$SMF-227 - 0-26/18-1205-2 - zzp-25120901p-pH6.8jz-150mg10mg-rcqx-lf100z-p1-30min.lcd

方法文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-RC-FX267.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-20251216-FX267.lcb

样品瓶号 : 3-5

进样体积 : 10μl

进样时间 : 2025/12/16 21:24:04

处理时间 (V2) : 2025/12/17 10:06:53

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 1.0ml/min



波长:237nm/250nm

版本号:6.115

实验者:wangdan

处理者:wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.863	693021	100.000	127584	2771	1.128	--
总计		693021	100.000	127584			

检测器A Ch2 250nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.185	52587	100.000	11746	1666	1.255	--
总计		52587	100.000	11746			



SMF-227

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$SMF-227 - 0-26/18-1206-2 - zzp-25120901p-pH6.8jz-150mg10mg-rcqx-lf100z-p2-30min.lcd

方法文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-RC-FX267.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-20251216-FX267.lcb

样品瓶号 : 3-14

进样体积 : 10μl

进样时间 : 2025/12/16 21:27:25

处理时间 (V2) : 2025/12/17 10:06:56

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 1.0ml/min



波长:237nm/250nm

版本号:6.115

实验者:wangdan

处理者:wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.864	697807	100.000	128724	2782	1.127	--
总计		697807	100.000	128724			

检测器A Ch2 250nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.186	52133	100.000	11700	1670	1.256	--
总计		52133	100.000	11700			



SMF-227

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$SMF-227 - 0-26/18-1207-2 - zzp-25120901p-pH6.8jz-150mg10mg-rcqx-lf100z-p3-30min.lcd

方法文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-RC-FX267.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-20251216-FX267.lcb

样品瓶号 : 3-23

进样体积 : 10μl

进样时间 : 2025/12/16 21:30:46

处理时间 (V2) : 2025/12/17 10:06:59

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 1.0ml/min

波长:237nm/250nm


版本号:6.115

实验者:wangdan


处理者:wangdan

<色谱图>

mV



mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.866	712034	100.000	130797	2774	1.127	--
总计		712034	100.000	130797			

检测器A Ch2 250nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.187	52546	100.000	11780	1668	1.255	--
总计		52546	100.000	11780			



SMF-227

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$SMF-227 - 0-26/18-1208-2 - zzp-25120901p-pH6.8jz-150mg10mg-rcqx-lf100z-p4-30min.lcd

方法文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-RC-FX267.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-20251216-FX267.lcb

样品瓶号 : 3-32

进样体积 : 10μl

进样时间 : 2025/12/16 21:34:07

处理时间 (V2) : 2025/12/17 10:07:02

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 1.0ml/min



波长:237nm/250nm

版本号:6.115

实验者:wangdan

处理者:wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.866	681110	100.000	125252	2787	1.128	--
总计		681110	100.000	125252			

检测器A Ch2 250nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.187	52824	100.000	11871	1675	1.255	--
总计		52824	100.000	11871			





SMF-227

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温 : 40℃
数据文件名: RC\$SMF-227 - 0-26/18-1209-2 - zzp-25120901p-pH6.8jz-150mg10mg-rcqx-lf100z-p5-30min.lcd
方法文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-RC-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-20251216-FX267.lcb
样品瓶号 : 3-41
进样体积 : 10μl
进样时间 : 2025/12/16 21:37:27
处理时间 (V2) : 2025/12/17 10:07:04
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 1.0ml/min
波长:237nm/250nm
版本号:6.115
实验者:wangdan
处理者:wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.862	687300	100.000	126641	2774	1.128	--
总计		687300	100.000	126641			

检测器A Ch2 250nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.185	52630	100.000	11776	1673	1.259	--
总计		52630	100.000	11776			



SMF-227

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$SMF-227 - 0-26/18-1210-2 - zzp-25120901p-pH6.8jz-150mg10mg-rcqx-lf100z-p6-30min.lcd

方法文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-RC-FX267.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-20251216-FX267.lcb

样品瓶号 : 3-50

进样体积 : 10μl

进样时间 : 2025/12/16 21:40:48

处理时间 (V2) : 2025/12/17 10:07:07

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 1.0ml/min



波长:237nm/250nm

版本号:6.115

实验者:wangdan

处理者:wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.863	687808	100.000	126821	2774	1.128	--
总计		687808	100.000	126821			

检测器A Ch2 250nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.186	52383	100.000	11706	1668	1.259	--
总计		52383	100.000	11706			



SMF-227

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$SMF-227 - 0-26/18-1211-2 - zzp-25120901p-pH6.8jz-150mg10mg-rcqx-lf100z-p1-45min.lcd

方法文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-RC-FX267.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-20251216-FX267.lcb

样品瓶号 : 3-6

进样体积 : 10μl

进样时间 : 2025/12/16 21:44:10

处理时间 (V2) : 2025/12/17 10:07:10

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 1.0ml/min



波长:237nm/250nm

版本号:6.115

实验者:wangdan

处理者:wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.866	740926	100.000	136385	2788	1.124	--
总计		740926	100.000	136385			

检测器A Ch2 250nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.187	54712	100.000	12374	1685	1.252	--
总计		54712	100.000	12374			



SMF-227

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$SMF-227 - 0-26/18-1212-2 - zzp-25120901p-pH6.8jz-150mg10mg-rcqx-lf100z-p2-45min.lcd

方法文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-RC-FX267.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-20251216-FX267.lcb

样品瓶号 : 3-15

进样体积 : 10μl

进样时间 : 2025/12/16 21:47:32

处理时间 (V2) : 2025/12/17 10:07:13

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 1.0ml/min



波长:237nm/250nm

版本号:6.115

实验者:wangdan

处理者:wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.865	759563	100.000	140250	2796	1.123	--
总计		759563	100.000	140250			

检测器A Ch2 250nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.187	55691	100.000	12571	1685	1.245	--
总计		55691	100.000	12571			



SMF-227

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$SMF-227 - 0-26/18-1213-2 - zzp-25120901p-pH6.8jz-150mg10mg-rcqx-lf100z-p3-45min.lcd

方法文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-RC-FX267.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-20251216-FX267.lcb

样品瓶号 : 3-24

进样体积 : 10μl

进样时间 : 2025/12/16 21:50:53

处理时间 (V2) : 2025/12/17 10:07:17

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 1.0ml/min



波长:237nm/250nm

版本号:6.115

实验者:wangdan

处理者:wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.862	769664	100.000	141941	2775	1.126	--
总计		769664	100.000	141941			

检测器A Ch2 250nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.185	56138	100.000	12566	1670	1.254	--
总计		56138	100.000	12566			



SMF-227

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$SMF-227 - 0-26/18-1214-2 - zzp-25120901p-pH6.8jz-150mg10mg-rcqx-lf100z-p4-45min.lcd

方法文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-RC-FX267.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-20251216-FX267.lcb

样品瓶号 : 3-33

进样体积 : 10μl

进样时间 : 2025/12/16 21:54:14

处理时间 (V2) : 2025/12/17 10:07:20

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 1.0ml/min



波长:237nm/250nm

版本号:6.115

实验者:wangdan

处理者:wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.863	747219	100.000	137704	2773	1.127	--
总计		747219	100.000	137704			

检测器A Ch2 250nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.186	56535	100.000	12710	1674	1.258	--
总计		56535	100.000	12710			



SMF-227

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$SMF-227 - 0-26/18-1215-2 - zzp-25120901p-pH6.8jz-150mg10mg-rcqx-lf100z-p5-45min.lcd

方法文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-RC-FX267.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-20251216-FX267.lcb

样品瓶号 : 3-42

进样体积 : 10μl

进样时间 : 2025/12/16 21:57:35

处理时间 (V2) : 2025/12/17 10:07:22

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 1.0ml/min

波长:237nm/250nm


版本号:6.115

实验者:wangdan


处理者:wangdan

<色谱图>

mV



mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.864	745837	100.000	137378	2776	1.128	--
总计		745837	100.000	137378			

检测器A Ch2 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.186	55611	100.000	12484	1677	1.255	--
总计		55611	100.000	12484			



SMF-227

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$SMF-227 - 0-26/18-1216-2 - zzp-25120901p-pH6.8jz-150mg10mg-rcqx-lf100z-p6-45min.lcd

方法文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-RC-FX267.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-20251216-FX267.lcb

样品瓶号 : 3-51

进样体积 : 10μl

进样时间 : 2025/12/16 22:00:56

处理时间 (V2) : 2025/12/17 10:07:26

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 1.0ml/min



波长:237nm/250nm

版本号:6.115

实验者:wangdan

处理者:wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.866	752945	100.000	138173	2772	1.129	--
总计		752945	100.000	138173			

检测器A Ch2 250nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.187	55694	100.000	12553	1674	1.255	--
总计		55694	100.000	12553			



SMF-227

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$SMF-227 - 0-26/18-1217-2 - zzp-25120901p-pH6.8jz-150mg10mg-rcqx-lf100z-p1-60min.lcd

方法文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-RC-FX267.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-20251216-FX267.lcb

样品瓶号 : 3-7

进样体积 : 10μl

进样时间 : 2025/12/16 22:04:18

处理时间 (V2) : 2025/12/17 10:07:29

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 1.0ml/min



波长:237nm/250nm

版本号:6.115

实验者:wangdan

处理者:wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.862	784596	100.000	144397	2766	1.128	--
总计		784596	100.000	144397			

检测器A Ch2 250nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.185	57961	100.000	12932	1667	1.259	--
总计		57961	100.000	12932			



SMF-227

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$SMF-227 - 0-26/18-1218-2 - zzp-25120901p-pH6.8jz-150mg10mg-rcqx-lf100z-p2-60min.lcd

方法文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-RC-FX267.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-20251216-FX267.lcb

样品瓶号 : 3-16

进样体积 : 10μl

进样时间 : 2025/12/16 22:07:39

处理时间 (V2) : 2025/12/17 10:07:32

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 1.0ml/min



波长:237nm/250nm

版本号:6.115

实验者:wangdan

处理者:wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.862	787571	100.000	145123	2771	1.126	--
总计		787571	100.000	145123			

检测器A Ch2 250nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.185	57463	100.000	12848	1669	1.253	--
总计		57463	100.000	12848			



SMF-227

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$SMF-227 - 0-26/18-1219-2 - zzp-25120901p-pH6.8jz-150mg10mg-rcqx-lf100z-p3-60min.lcd

方法文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-RC-FX267.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-20251216-FX267.lcb

样品瓶号 : 3-25

进样体积 : 10μl

进样时间 : 2025/12/16 22:11:00

处理时间 (V2) : 2025/12/17 10:07:35

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 1.0ml/min



波长:237nm/250nm

版本号:6.115

实验者:wangdan

处理者:wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.863	793139	100.000	146589	2787	1.124	--
总计		793139	100.000	146589			

检测器A Ch2 250nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.185	57959	100.000	13008	1680	1.249	--
总计		57959	100.000	13008			



SMF-227

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$SMF-227 - 0-26/18-1220-2 - zzp-25120901p-pH6.8jz-150mg10mg-rcqx-lf100z-p4-60min.lcd

方法文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-RC-FX267.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-20251216-FX267.lcb

样品瓶号 : 3-34

进样体积 : 10μl

进样时间 : 2025/12/16 22:14:22

处理时间 (V2) : 2025/12/17 10:07:38

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 1.0ml/min

波长:237nm/250nm


版本号:6.115

实验者:wangdan


处理者:wangdan

<色谱图>

mV



mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.865	768527	100.000	141259	2775	1.126	--
总计		768527	100.000	141259			

检测器A Ch2 250nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.186	58321	100.000	13091	1670	1.250	--
总计		58321	100.000	13091			



SMF-227

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 40°C

数据文件名: RC\$SMF-227 - 0-26/18-1221-2 - zzp-25120901p-pH6.8jz-150mg10mg-rcqx-lf100z-p5-60min.lcd

方法文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-RC-FX267.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-20251216-FX267.lcb

样品瓶号 : 3-43

进样体积 : 10μl

进样时间 : 2025/12/16 22:17:44

处理时间 (V2) : 2025/12/17 10:07:41

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 1.0ml/min


波长:237nm/250nm

版本号:6.115

实验者:wangdan

处理者:wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.865	769894	100.000	141919	2784	1.128	--
总计		769894	100.000	141919			

检测器A Ch2 250nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.187	57175	100.000	12870	1680	1.253	--
总计		57175	100.000	12870			



SMF-227

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$SMF-227 - 0-26/18-1222-2 - zzp-25120901p-pH6.8jz-150mg10mg-rcqx-lf100z-p6-60min.lcd

方法文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-RC-FX267.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-20251216-FX267.lcb

样品瓶号 : 3-52

进样体积 : 10μl

进样时间 : 2025/12/16 22:21:04

处理时间 (V2) : 2025/12/17 10:07:44

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 1.0ml/min



波长:237nm/250nm

版本号:6.115

实验者:wangdan

处理者:wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.861	791919	100.000	146064	2783	1.124	--
总计		791919	100.000	146064			

检测器A Ch2 250nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.184	58756	100.000	13170	1675	1.252	--
总计		58756	100.000	13170			



SMF-227

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$SMF-227 - 0-26/18-1223-2 - zzp-25120901p-pH6.8jz-150mg10mg-rcqx-lf100z-p1-90min.lcd

方法文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-RC-FX267.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-20251216-FX267.lcb

样品瓶号 : 3-8

进样体积 : 10μl

进样时间 : 2025/12/16 22:24:27

处理时间 (V2) : 2025/12/17 10:07:47

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 1.0ml/min



波长:237nm/250nm

版本号:6.115

实验者:wangdan

处理者:wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.864	817854	100.000	151028	2788	1.128	--
总计		817854	100.000	151028			

检测器A Ch2 250nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.186	60982	100.000	13705	1681	1.256	--
总计		60982	100.000	13705			



SMF-227

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$SMF-227 - 0-26/18-1224-2 - zzp-25120901p-pH6.8jz-150mg10mg-rcqx-lf100z-p2-90min.lcd

方法文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-RC-FX267.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-20251216-FX267.lcb

样品瓶号 : 3-17

进样体积 : 10μl

进样时间 : 2025/12/16 22:27:50

处理时间 (V2) : 2025/12/17 10:07:50

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 1.0ml/min



波长:237nm/250nm

版本号:6.115

实验者:wangdan

处理者:wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.865	821682	100.000	151327	2777	1.127	--
总计		821682	100.000	151327			

检测器A Ch2 250nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.187	60178	100.000	13528	1672	1.251	--
总计		60178	100.000	13528			



SMF-227

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$SMF-227 - 0-26/18-1225-2 - zzp-25120901p-pH6.8jz-150mg10mg-rcqx-lf100z-p3-90min.lcd

方法文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-RC-FX267.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-20251216-FX267.lcb

样品瓶号 : 3-26

进样体积 : 10μl

进样时间 : 2025/12/16 22:31:12

处理时间 (V2) : 2025/12/17 10:07:53

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 1.0ml/min

波长:237nm/250nm


版本号:6.115

实验者:wangdan


处理者:wangdan

<色谱图>

mV



mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.866	825009	100.000	151634	2780	1.127	--
总计		825009	100.000	151634			

检测器A Ch2 250nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.186	60577	100.000	13613	1671	1.249	--
总计		60577	100.000	13613			



SMF-227

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$SMF-227 - 0-26/18-1226-2 - zzp-25120901p-pH6.8jz-150mg10mg-rcqx-lf100z-p4-90min.lcd

方法文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-RC-FX267.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-20251216-FX267.lcb

样品瓶号 : 3-35

进样体积 : 10μl

进样时间 : 2025/12/16 22:34:33

处理时间 (V2) : 2025/12/17 10:07:56

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 1.0ml/min



波长:237nm/250nm

版本号:6.115

实验者:wangdan

处理者:wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.865	789736	100.000	145113	2769	1.127	--
总计		789736	100.000	145113			

检测器A Ch2 250nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.186	60505	100.000	13547	1663	1.255	--
总计		60505	100.000	13547			



SMF-227

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$SMF-227 - 0-26/18-1227-2 - zzp-25120901p-pH6.8jz-150mg10mg-rcqx-lf100z-p5-90min.lcd

方法文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-RC-FX267.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-20251216-FX267.lcb

样品瓶号 : 3-44

进样体积 : 10μl

进样时间 : 2025/12/16 22:37:56

处理时间 (V2) : 2025/12/17 10:07:59

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 1.0ml/min


波长:237nm/250nm

版本号:6.115

实验者:wangdan

处理者:wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.862	821528	100.000	151856	2786	1.121	--
总计		821528	100.000	151856			

检测器A Ch2 250nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.184	61404	100.000	13743	1679	1.251	--
总计		61404	100.000	13743			



SMF-227

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$SMF-227 - 0-26/18-1228-2 - zzp-25120901p-pH6.8jz-150mg10mg-rcqx-lf100z-p6-90min.lcd

方法文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-RC-FX267.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-20251216-FX267.lcb

样品瓶号 : 3-53

进样体积 : 10μl

进样时间 : 2025/12/16 22:41:18

处理时间 (V2) : 2025/12/17 10:08:03

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 1.0ml/min


波长:237nm/250nm

版本号:6.115

实验者:wangdan

处理者:wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.863	810011	100.000	149417	2777	1.126	--
总计		810011	100.000	149417			

检测器A Ch2 250nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.185	60293	100.000	13523	1676	1.255	--
总计		60293	100.000	13523			



SMF-227

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$SMF-227 - 0-26/18-1229-2 - zzp-25120901p-pH6.8jz-150mg10mg-rcqx-lf100z-p1-120min.lcd

方法文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-RC-FX267.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-20251216-FX267.lcb

样品瓶号 : 4-5

进样体积 : 10μl

进样时间 : 2025/12/16 22:44:41

处理时间 (V2) : 2025/12/17 10:08:06

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 1.0ml/min



波长:237nm/250nm

版本号:6.115

实验者:wangdan

处理者:wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.864	823155	100.000	151265	2762	1.129	--
总计		823155	100.000	151265			

检测器A Ch2 250nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.186	61699	100.000	13785	1661	1.255	--
总计		61699	100.000	13785			



SMF-227

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$SMF-227 - 0-26/18-1230-2 - zzp-25120901p-pH6.8jz-150mg10mg-rcqx-lf100z-p2-120min.lcd

方法文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-RC-FX267.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-20251216-FX267.lcb

样品瓶号 : 4-14

进样体积 : 10μl

进样时间 : 2025/12/16 22:48:04

处理时间 (V2) : 2025/12/17 10:08:09

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 1.0ml/min



波长:237nm/250nm

版本号:6.115

实验者:wangdan

处理者:wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.864	820563	100.000	150694	2756	1.129	--
总计		820563	100.000	150694			

检测器A Ch2 250nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.185	60670	100.000	13530	1654	1.259	--
总计		60670	100.000	13530			



SMF-227

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$SMF-227 - 0-26/18-1231-2 - zzp-25120901p-pH6.8jz-150mg10mg-rcqx-lf100z-p3-120min.lcd

方法文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-RC-FX267.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-20251216-FX267.lcb

样品瓶号 : 4-23

进样体积 : 10μl

进样时间 : 2025/12/16 22:51:27

处理时间 (V2) : 2025/12/17 10:08:12

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 1.0ml/min



波长:237nm/250nm

版本号:6.115

实验者:wangdan

处理者:wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.866	836781	100.000	153599	2779	1.129	--
总计		836781	100.000	153599			

检测器A Ch2 250nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.187	61840	100.000	13915	1675	1.258	--
总计		61840	100.000	13915			



SMF-227

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$SMF-227 - 0-26/18-1232-2 - zzp-25120901p-pH6.8jz-150mg10mg-rcqx-lf100z-p4-120min.lcd

方法文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-RC-FX267.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-20251216-FX267.lcb

样品瓶号 : 4-32

进样体积 : 10μl

进样时间 : 2025/12/16 22:54:50

处理时间 (V2) : 2025/12/17 10:08:15

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 1.0ml/min



波长:237nm/250nm

版本号:6.115

实验者:wangdan

处理者:wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.862	799088	100.000	147183	2769	1.126	--
总计		799088	100.000	147183			

检测器A Ch2 250nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.185	61728	100.000	13785	1665	1.257	--
总计		61728	100.000	13785			



SMF-227

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$SMF-227 - 0-26/18-1233-2 - zzp-25120901p-pH6.8jz-150mg10mg-rcqx-lf100z-p5-120min.lcd

方法文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-RC-FX267.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-20251216-FX267.lcb

样品瓶号 : 4-41

进样体积 : 10μl

进样时间 : 2025/12/16 22:58:13

处理时间 (V2) : 2025/12/17 10:08:19

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 1.0ml/min



波长:237nm/250nm

版本号:6.115

实验者:wangdan

处理者:wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.863	819989	100.000	150996	2767	1.127	--
总计		819989	100.000	150996			

检测器A Ch2 250nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.185	61860	100.000	13796	1660	1.255	--
总计		61860	100.000	13796			



SMF-227

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$SMF-227 - 0-26/18-1234-2 - zzp-25120901p-pH6.8jz-150mg10mg-rcqx-lf100z-p6-120min.lcd

方法文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-RC-FX267.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-20251216-FX267.lcb

样品瓶号 : 4-50

进样体积 : 10μl

进样时间 : 2025/12/16 23:01:36

处理时间 (V2) : 2025/12/17 10:08:21

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 1.0ml/min



波长:237nm/250nm

版本号:6.115

实验者:wangdan

处理者:wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.863	824608	100.000	151807	2767	1.127	--
总计		824608	100.000	151807			

检测器A Ch2 250nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.185	62198	100.000	13872	1664	1.258	--
总计		62198	100.000	13872			



SMF-227

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$SMF-227 - 0-26/18-1235-2 - zzp-25120901p-pH6.8jz-150mg10mg-rcqx-lf100z-p1-jx.lcd

方法文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-RC-FX267.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-20251216-FX267.lcb

样品瓶号 : 4-6

进样体积 : 10μl

进样时间 : 2025/12/16 23:04:59

处理时间 (V2) : 2025/12/17 10:08:24

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 1.0ml/min

波长:237nm/250nm


版本号:6.115

实验者:wangdan


处理者:wangdan

<色谱图>

mV



mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.866	813921	100.000	148956	2762	1.130	--
总计		813921	100.000	148956			

检测器A Ch2 250nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.186	61329	100.000	13688	1654	1.257	--
总计		61329	100.000	13688			



SMF-227

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$SMF-227 - 0-26/18-1236-2 - zzp-25120901p-pH6.8jz-150mg10mg-rcqx-lf100z-p2-jx.lcd

方法文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-RC-FX267.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-20251216-FX267.lcb

样品瓶号 : 4-15

进样体积 : 10μl

进样时间 : 2025/12/16 23:08:22

处理时间 (V2) : 2025/12/17 10:08:27

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 1.0ml/min



波长:237nm/250nm

版本号:6.115

实验者:wangdan

处理者:wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.864	824662	100.000	152189	2780	1.127	--
总计		824662	100.000	152189			

检测器A Ch2 250nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.186	61069	100.000	13721	1675	1.255	--
总计		61069	100.000	13721			



SMF-227

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$SMF-227 - 0-26/18-1237-2 - zzp-25120901p-pH6.8jz-150mg10mg-rcqx-lf100z-p3-jx.lcd

方法文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-RC-FX267.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-20251216-FX267.lcb

样品瓶号 : 4-24

进样体积 : 10μl

进样时间 : 2025/12/16 23:11:45

处理时间 (V2) : 2025/12/17 10:08:31

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 1.0ml/min



波长:237nm/250nm

版本号:6.115

实验者:wangdan

处理者:wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.862	814906	100.000	149749	2758	1.129	--
总计		814906	100.000	149749			

检测器A Ch2 250nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.185	60700	100.000	13503	1658	1.262	--
总计		60700	100.000	13503			



SMF-227

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$SMF-227 - 0-26/18-1238-2 - zzp-25120901p-pH6.8jz-150mg10mg-rcqx-lf100z-p4-jx.lcd

方法文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-RC-FX267.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-20251216-FX267.lcb

样品瓶号 : 4-33

进样体积 : 10μl

进样时间 : 2025/12/16 23:15:09

处理时间 (V2) : 2025/12/17 10:08:33

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 1.0ml/min



波长:237nm/250nm

版本号:6.115

实验者:wangdan

处理者:wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.864	801249	100.000	147497	2770	1.127	--
总计		801249	100.000	147497			

检测器A Ch2 250nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.186	61938	100.000	13884	1669	1.257	--
总计		61938	100.000	13884			



SMF-227

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$SMF-227 - 0-26/18-1239-2 - zzp-25120901p-pH6.8jz-150mg10mg-rcqx-lf100z-p5-jx.lcd

方法文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-RC-FX267.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-20251216-FX267.lcb

样品瓶号 : 4-42

进样体积 : 10μl

进样时间 : 2025/12/16 23:18:33

处理时间 (V2) : 2025/12/17 10:08:36

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 1.0ml/min



波长:237nm/250nm

版本号:6.115

实验者:wangdan

处理者:wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.863	811543	100.000	149476	2767	1.127	--
总计		811543	100.000	149476			

检测器A Ch2 250nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.185	61256	100.000	13684	1663	1.254	--
总计		61256	100.000	13684			



SMF-227

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$SMF-227 - 0-26/18-1240-2 - zzp-25120901p-pH6.8jz-150mg10mg-rcqx-lf100z-p6-jx.lcd

方法文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-RC-FX267.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-20251216-FX267.lcb

样品瓶号 : 4-51

进样体积 : 10μl

进样时间 : 2025/12/16 23:21:55

处理时间 (V2) : 2025/12/17 10:08:39

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 1.0ml/min

波长:237nm/250nm


版本号:6.115

实验者:wangdan


处理者:wangdan

<色谱图>

mV



mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.865	822822	100.000	151503	2774	1.128	--
总计		822822	100.000	151503			

检测器A Ch2 250nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.186	62081	100.000	13943	1673	1.252	--
总计		62081	100.000	13943			



SMF-227

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$SMF-227 - 0-26/18-1241-2 - zzp-25120901p-pH6.8jz-150mg10mg-rcqx-lf100z-dz2-1.lcd

方法文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-RC-FX267.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-20251216-FX267.lcb

样品瓶号 : 3-27

进样体积 : 10μl

进样时间 : 2025/12/16 23:25:18

处理时间 (V2) : 2025/12/17 10:08:42

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 1.0ml/min



波长:237nm/250nm

版本号:6.115

实验者:wangdan

处理者:wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.867	854897	100.000	156079	2750	1.128	--
总计		854897	100.000	156079			

检测器A Ch2 250nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.187	62868	100.000	14042	1652	1.248	--
总计		62868	100.000	14042			



SMF-227

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$SMF-227 - 0-26/18-1242-2 - zzp-25120901p-pH6.8jz-150mg10mg-rcqx-lf100z-dz2-2.lcd

方法文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-RC-FX267.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-20251216-FX267.lcb

样品瓶号 : 3-27

进样体积 : 10μl

进样时间 : 2025/12/16 23:28:40

处理时间 (V2) : 2025/12/17 10:08:45

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 1.0ml/min



波长:237nm/250nm

版本号:6.115

实验者:wangdan

处理者:wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.863	854147	100.000	157094	2760	1.125	--
总计		854147	100.000	157094			

检测器A Ch2 250nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.185	62835	100.000	14015	1658	1.249	--
总计		62835	100.000	14015			