




QTL-486

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 195nm
数据文件名	: RC\$QTL-486 - 7-72/7-2924-2 - zzp-cq12y-120mg-rcd-jx-pH6.0+3sdsjz-rj.lcd		
方法文件名	: RC\$QTL-486 - QTL-486-FX256.lcm		
批处理文件名	: RC\$QTL-486 - 20260106-rc-FX256.lcb		
样品瓶号	: 2-9	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2026/01/06 23:22:45	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2026/01/07 11:14:21		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX256)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 195nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图1 奥利司他胶囊溶出度测定长期12月HPLC图谱
自制品(120mg规格)-pH6.0(内含3%SDS)介质-极限转速
溶剂




QTL-486

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 195nm
数据文件名	: RC\$QTL-486 - 7-72/7-2925-2 - zzp-cq12y-120mg-rcd-jx-pH6.0+3sdsjz-dz1-1.lcd		
方法文件名	: RC\$QTL-486 - QTL-486-FX256.lcm		
批处理文件名	: RC\$QTL-486 - 20260106-rc-FX256.lcb		
样品瓶号	: 2-18	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2026/01/06 23:26:11	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2026/01/07 11:14:30		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX256)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 195nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.133	446044	100.000	67216	2594	1.303	--
总计		446044	100.000	67216			

图2 奥利司他胶囊溶出度测定长期12月HPLC图谱
自制品(120mg规格)-pH6.0(内含3%SDS)介质-极限转速
对照品溶液-1-1




QTL-486

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 195nm
数据文件名	: RC\$QTL-486 - 7-72/7-2926-2 - zzp-cq12y-120mg-rcd-jx-pH6.0+3sdsjz-dz1-2.lcd		
方法文件名	: RC\$QTL-486 - QTL-486-FX256.lcm		
批处理文件名	: RC\$QTL-486 - 20260106-rc-FX256.lcb		
样品瓶号	: 2-18	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2026/01/06 23:29:36	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2026/01/07 11:14:37		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX256)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 195nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.132	445700	100.000	67288	2600	1.303	--
总计		445700	100.000	67288			

图3 奥利司他胶囊溶出度测定长期12月HPLC图谱
自制品(120mg规格)-pH6.0(内含3%SDS)介质-极限转速
对照品溶液-1-2




QTL-486

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 195nm
数据文件名	: RC\$QTL-486 - 7-72/7-2927-2 - zzp-cq12y-120mg-rcd-jx-pH6.0+3sdsjz-dz1-3.lcd		
方法文件名	: RC\$QTL-486 - QTL-486-FX256.lcm		
批处理文件名	: RC\$QTL-486 - 20260106-rc-FX256.lcb		
样品瓶号	: 2-18	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2026/01/06 23:33:01	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2026/01/07 11:14:45		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX256)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 195nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.133	446075	100.000	67370	2602	1.304	--
总计		446075	100.000	67370			

图4 奥利司他胶囊溶出度测定长期12月HPLC图谱
自制品(120mg规格)-pH6.0(内含3%SDS)介质-极限转速
对照品溶液-1-3




QTL-486

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 195nm
数据文件名	: RC\$QTL-486 - 7-72/7-2928-2 - zzp-cq12y-120mg-rcd-jx-pH6.0+3sdsjz-dz1-4.lcd		
方法文件名	: RC\$QTL-486 - QTL-486-FX256.lcm		
批处理文件名	: RC\$QTL-486 - 20260106-rc-FX256.lcb		
样品瓶号	: 2-18	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2026/01/06 23:36:26	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2026/01/07 11:14:53		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX256)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 195nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.133	446513	100.000	67320	2600	1.303	--
总计		446513	100.000	67320			

图5 奥利司他胶囊溶出度测定长期12月HPLC图谱
自制品(120mg规格)-pH6.0(内含3%SDS)介质-极限转速
对照品溶液-1-4




QTL-486

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 195nm
数据文件名	: RC\$QTL-486 - 7-72/7-2929-2 - zzp-cq12y-120mg-rcd-jx-pH6.0+3sdsjz-dz1-5.lcd		
方法文件名	: RC\$QTL-486 - QTL-486-FX256.lcm		
批处理文件名	: RC\$QTL-486 - 20260106-rc-FX256.lcb		
样品瓶号	: 2-18	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2026/01/06 23:39:51	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2026/01/07 11:15:00		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX256)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 195nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.133	446490	100.000	67302	2602	1.304	--
总计		446490	100.000	67302			

图6 奥利司他胶囊溶出度测定长期12月HPLC图谱
自制品(120mg规格)-pH6.0(内含3%SDS)介质-极限转速
对照品溶液-1-5




QTL-486

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 195nm
数据文件名	: RC\$QTL-486 - 7-72/7-2930-2 - zzp-2024102421p-cq12y-120mg-rcd-jx-pH6.0+3sdsjz-P1-1.lcd		
方法文件名	: RC\$QTL-486 - QTL-486-FX256.lcm		
批处理文件名	: RC\$QTL-486 - 20260106-rc-FX256.lcb		
样品瓶号	: 2-4	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2026/01/06 23:43:15	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2026/01/07 11:15:08		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX256)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 195nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.162	436481	100.000	67894	2895	1.327	--
总计		436481	100.000	67894			

图7 奥利司他胶囊溶出度测定长期12月HPLC图谱
 自制品(2024102421批)(120mg规格)-pH6.0(内含3%SDS)介质-极限转速-片1
 供试品溶液-1




QTL-486

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 195nm
数据文件名	: RC\$QTL-486 - 7-72/7-2931-2 - zzp-2024102421p-cq12y-120mg-rcd-jx-pH6.0+3sdsjz-P2-1.lcd		
方法文件名	: RC\$QTL-486 - QTL-486-FX256.lcm		
批处理文件名	: RC\$QTL-486 - 20260106-rc-FX256.lcb		
样品瓶号	: 2-13	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2026/01/06 23:46:39	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2026/01/07 11:15:15		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX256)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 195nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.163	433195	100.000	66893	2861	1.338	--
总计		433195	100.000	66893			

图8 奥利司他胶囊溶出度测定长期12月HPLC图谱
 自制品(2024102421批)(120mg规格)-pH6.0(内含3%SDS)介质-极限转速-片2
 供试品溶液-1




QTL-486

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 195nm
数据文件名	: RC\$QTL-486 - 7-72/7-2933-2 - zzp-2024102421p-cq12y-120mg-rcd-jx-pH6.0+3sdsjz-P4-1.lcd		
方法文件名	: RC\$QTL-486 - QTL-486-FX256.lcm		
批处理文件名	: RC\$QTL-486 - 20260106-rc-FX256.lcb		
样品瓶号	: 2-31	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2026/01/06 23:53:27	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2026/01/07 11:15:30		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX256)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 195nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.161	439991	100.000	67455	2842	1.359	--
总计		439991	100.000	67455			

图10 奥利司他胶囊溶出度测定长期12月HPLC图谱
自制品(2024102421批)(120mg规格)-pH6.0(内含3%SDS)介质-极限转速-片4
供试品溶液-1




QTL-486

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 195nm
数据文件名	: RC\$QTL-486 - 7-72/7-2934-2 - zzp-2024102421p-cq12y-120mg-rcd-jx-pH6.0+3sdsjz-P5-1.lcd		
方法文件名	: RC\$QTL-486 - QTL-486-FX256.lcm		
批处理文件名	: RC\$QTL-486 - 20260106-rc-FX256.lcb		
样品瓶号	: 2-40	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2026/01/06 23:56:51	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2026/01/07 11:15:38		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX256)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 195nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.160	437776	100.000	66820	2820	1.355	--
总计		437776	100.000	66820			

图11 奥利司他胶囊溶出度测定长期12月HPLC图谱
自制品(2024102421批)(120mg规格)-pH6.0(内含3%SDS)介质-极限转速-片5
供试品溶液-1




QTL-486

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 195nm
数据文件名	: RC\$QTL-486 - 7-72/7-2935-2 - zzp-2024102421p-cq12y-120mg-rcd-jx-pH6.0+3sdsjz-P6-1.lcd		
方法文件名	: RC\$QTL-486 - QTL-486-FX256.lcm		
批处理文件名	: RC\$QTL-486 - 20260106-rc-FX256.lcb		
样品瓶号	: 2-49	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2026/01/07 00:00:15	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2026/01/07 11:15:45		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX256)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 195nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.159	440067	100.000	67321	2823	1.350	--
总计		440067	100.000	67321			

图12 奥利司他胶囊溶出度测定长期12月HPLC图谱
 自制品(2024102421批)(120mg规格)-pH6.0(内含3%SDS)介质-极限转速-片6
 供试品溶液-1




QTL-486

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 195nm
数据文件名	: RC\$QTL-486 - 7-72/7-2936-2 - zzp-2024102521p-cq12y-120mg-rcd-jx-pH6.0+3sdsjz-P1-1.lcd		
方法文件名	: RC\$QTL-486 - QTL-486-FX256.lcm		
批处理文件名	: RC\$QTL-486 - 20260106-rc-FX256.lcb		
样品瓶号	: 2-5	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2026/01/07 00:03:40	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2026/01/07 11:15:52		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX256)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 195nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.159	431338	100.000	66083	2826	1.346	--
总计		431338	100.000	66083			

图13 奥利司他胶囊溶出度测定长期12月HPLC图谱
 自制品(2024102521批)(120mg规格)-pH6.0(内含3%SDS)介质-极限转速-片1
 供试品溶液-1




QTL-486

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 195nm
数据文件名	: RC\$QTL-486 - 7-72/7-2938-2 - zzp-2024102521p-cq12y-120mg-rcd-jx-pH6.0+3sdsjz-P3-1.lcd		
方法文件名	: RC\$QTL-486 - QTL-486-FX256.lcm		
批处理文件名	: RC\$QTL-486 - 20260106-rc-FX256.lcb		
样品瓶号	: 2-23	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2026/01/07 00:10:29	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2026/01/07 11:16:07		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX256)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 195nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.159	433182	100.000	66230	2820	1.355	--
总计		433182	100.000	66230			

图15 奥利司他胶囊溶出度测定长期12月HPLC图谱
 自制品(2024102521批)(120mg规格)-pH6.0(内含3%SDS)介质-极限转速-片3
 供试品溶液-1




QTL-486

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 195nm
数据文件名	: RC\$QTL-486 - 7-72/7-2939-2 - zzp-2024102521p-cq12y-120mg-rcd-jx-pH6.0+3sdsjz-P4-1.lcd		
方法文件名	: RC\$QTL-486 - QTL-486-FX256.lcm		
批处理文件名	: RC\$QTL-486 - 20260106-rc-FX256.lcb		
样品瓶号	: 2-32	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2026/01/07 00:13:53	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2026/01/07 11:16:14		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX256)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 195nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.158	434491	100.000	66748	2826	1.348	--
总计		434491	100.000	66748			

图16 奥利司他胶囊溶出度测定长期12月HPLC图谱
自制品(2024102521批)(120mg规格)-pH6.0(内含3%SDS)介质-极限转速-片4
供试品溶液-1




QTL-486

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 195nm
数据文件名	: RC\$QTL-486 - 7-72/7-2942-2 - zzp-2024102621p-cq12y-120mg-rcd-jx-pH6.0+3sdsjz-P1-1.lcd		
方法文件名	: RC\$QTL-486 - QTL-486-FX256.lcm		
批处理文件名	: RC\$QTL-486 - 20260106-rc-FX256.lcb		
样品瓶号	: 2-6	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2026/01/07 00:24:06	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2026/01/07 11:16:37		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX256)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 195nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.155	414953	100.000	63657	2805	1.352	--
总计		414953	100.000	63657			

图19 奥利司他胶囊溶出度测定长期12月HPLC图谱
自制品(2024102621批)(120mg规格)-pH6.0(内含3%SDS)介质-极限转速-片1
供试品溶液-1




QTL-486

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 195nm
数据文件名	: RC\$QTL-486 - 7-72/7-2943-2 - zzp-2024102621p-cq12y-120mg-rcd-jx-pH6.0+3sdsjz-P2-1.lcd		
方法文件名	: RC\$QTL-486 - QTL-486-FX256.lcm		
批处理文件名	: RC\$QTL-486 - 20260106-rc-FX256.lcb		
样品瓶号	: 2-15	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2026/01/07 00:27:31	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2026/01/07 11:16:44		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX256)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 195nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.156	428169	100.000	65979	2823	1.347	--
总计		428169	100.000	65979			

图20 奥利司他胶囊溶出度测定长期12月HPLC图谱
 自制品(2024102621批)(120mg规格)-pH6.0(内含3%SDS)介质-极限转速-片2
 供试品溶液-1




QTL-486

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 195nm
数据文件名	: RC\$QTL-486 - 7-72/7-2944-2 - zzp-2024102621p-cq12y-120mg-rcd-jx-pH6.0+3sdsjz-P3-1.lcd		
方法文件名	: RC\$QTL-486 - QTL-486-FX256.lcm		
批处理文件名	: RC\$QTL-486 - 20260106-rc-FX256.lcb		
样品瓶号	: 2-24	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2026/01/07 00:30:55	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2026/01/07 11:16:51		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX256)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 195nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.156	433435	100.000	66691	2818	1.345	--
总计		433435	100.000	66691			

图21 奥利司他胶囊溶出度测定长期12月HPLC图谱
 自制品(2024102621批)(120mg规格)-pH6.0(内含3%SDS)介质-极限转速-片3
 供试品溶液-1




QTL-486

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 195nm
数据文件名	: RC\$QTL-486 - 7-72/7-2945-2 - zzp-2024102621p-cq12y-120mg-rcd-jx-pH6.0+3sdsjz-P4-1.lcd		
方法文件名	: RC\$QTL-486 - QTL-486-FX256.lcm		
批处理文件名	: RC\$QTL-486 - 20260106-rc-FX256.lcb		
样品瓶号	: 2-33	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2026/01/07 00:34:20	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2026/01/07 11:16:59		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX256)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 195nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.155	437837	100.000	67369	2817	1.351	--
总计		437837	100.000	67369			

图22 奥利司他胶囊溶出度测定长期12月HPLC图谱
自制品(2024102621批)(120mg规格)-pH6.0(内含3%SDS)介质-极限转速-片4
供试品溶液-1




QTL-486

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 2.0ml/min
 柱温 : 30°C 波长: 195nm
 数据文件名 : RC\$QTL-486 - 7-72/7-2946-2 - zzp-2024102621p-cq12y-120mg-rcd-jx-pH6.0+3sdsjz-P5-1.lcd
 方法文件名 : RC\$QTL-486 - QTL-486-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-486 - 20260106-rc-FX256.lcb
 样品瓶号 : 2-42
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2026/01/07 00:37:44 实验者: xiexinhui
 处理时间(V2) : 2026/01/07 11:17:06 处理者: xiexinhui
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 195nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.153	431620	100.000	66504	2823	1.351	--
总计		431620	100.000	66504			

图23 奥利司他胶囊溶出度测定长期12月HPLC图谱
 自制品(2024102621批)(120mg规格)-pH6.0(内含3%SDS)介质-极限转速-片5
 供试品溶液-1




QTL-486

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 195nm
数据文件名	: RC\$QTL-486 - 7-72/7-2947-2 - zzp-2024102621p-cq12y-120mg-rcd-jx-pH6.0+3sdsjz-P6-1.lcd		
方法文件名	: RC\$QTL-486 - QTL-486-FX256.lcm		
批处理文件名	: RC\$QTL-486 - 20260106-rc-FX256.lcb		
样品瓶号	: 2-51	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2026/01/07 00:41:08	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2026/01/07 11:17:14		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX256)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 195nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.154	426931	100.000	65768	2831	1.350	--
总计		426931	100.000	65768			

图24 奥利司他胶囊溶出度测定长期12月HPLC图谱
 自制品(2024102621批)(120mg规格)-pH6.0(内含3%SDS)介质-极限转速-片6
 供试品溶液-1




QTL-486

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 195nm
数据文件名	: RC\$QTL-486 - 7-72/7-2948-2 - zzp-cq12y-120mg-rcd-jx-pH6.0+3sdsjz-dz2-1.lcd		
方法文件名	: RC\$QTL-486 - QTL-486-FX256.lcm		
批处理文件名	: RC\$QTL-486 - 20260106-rc-FX256.lcb		
样品瓶号	: 2-27	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2026/01/07 00:44:33	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2026/01/07 11:17:21		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX256)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 195nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.125	446923	100.000	67117	2556	1.314	--
总计		446923	100.000	67117			

图25 奥利司他胶囊溶出度测定长期12月HPLC图谱
自制品(120mg规格)-pH6.0(内含3%SDS)介质-极限转速
对照品溶液-2-1




QTL-486

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 195nm
数据文件名	: RC\$QTL-486 - 7-72/7-2949-2 - zzp-cq12y-120mg-rcd-jx-pH6.0+3sdsjz-dz2-2.lcd		
方法文件名	: RC\$QTL-486 - QTL-486-FX256.lcm		
批处理文件名	: RC\$QTL-486 - 20260106-rc-FX256.lcb		
样品瓶号	: 2-27	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2026/01/07 00:47:58	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2026/01/07 11:17:28		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX256)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 195nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.123	445341	100.000	67374	2563	1.310	--
总计		445341	100.000	67374			

图26 奥利司他胶囊溶出度测定长期12月HPLC图谱
自制品(120mg规格)-pH6.0(内含3%SDS)介质-极限转速
对照品溶液-2-2




QTL-486

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 195nm
数据文件名	: RC\$QTL-486 - 7-72/7-2950-2 - cbzj-M2449M1-cq12y-120mg-rcd-jx-pH6.0+3sdsjz-rj.lcd		
方法文件名	: RC\$QTL-486 - QTL-486-FX256.lcm		
批处理文件名	: RC\$QTL-486 - 20260106-rc-FX256.lcb		
样品瓶号	: 3-9	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2026/01/07 00:51:21	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2026/01/07 11:17:35		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX256)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 195nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图27 奥利司他胶囊溶出度测定长期12月HPLC图谱
参比制剂(120mg规格)-pH6.0(内含3%SDS)介质-极限转速
溶剂




QTL-486

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 2.0ml/min
 柱温 : 30°C 波长: 195nm
 数据文件名 : RC\$QTL-486 - 7-72/7-2951-2 - cbzj-M2449M1-cq12y-120mg-rcd-jx-pH6.0+3sdsjz-dz1-1.lcd
 方法文件名 : RC\$QTL-486 - QTL-486-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-486 - 20260106-rc-FX256.lcb
 样品瓶号 : 3-18
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2026/01/07 00:54:44 实验者: xiexinhui
 处理时间(V2) : 2026/01/07 11:17:43 处理者: xiexinhui
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 195nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.127	445049	100.000	67161	2587	1.308	--
总计		445049	100.000	67161			

图28 奥利司他胶囊溶出度测定长期12月HPLC图谱
 参比制剂(120mg规格)-pH6.0(内含3%SDS)介质-极限转速
 对照品溶液-1-1




QTL-486

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 195nm
数据文件名	: RC\$QTL-486 - 7-72/7-2952-2 - cbzj-M2449M1-cq12y-120mg-rcd-jx-pH6.0+3sdsjz-dz1-2.lcd		
方法文件名	: RC\$QTL-486 - QTL-486-FX256.lcm		
批处理文件名	: RC\$QTL-486 - 20260106-rc-FX256.lcb		
样品瓶号	: 3-18	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2026/01/07 00:58:07	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2026/01/07 11:17:51		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX256)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 195nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.126	444529	100.000	67074	2592	1.311	--
总计		444529	100.000	67074			

图29 奥利司他胶囊溶出度测定长期12月HPLC图谱
参比制剂(120mg规格)-pH6.0(内含3%SDS)介质-极限转速
对照品溶液-1-2




QTL-486

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 2.0ml/min
 柱温 : 30°C 波长: 195nm
 数据文件名 : RC\$QTL-486 - 7-72/7-2953-2 - cbzj-M2449M1-cq12y-120mg-rcd-jx-pH6.0+3sdsjz-dz1-3.lcd
 方法文件名 : RC\$QTL-486 - QTL-486-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-486 - 20260106-rc-FX256.lcb
 样品瓶号 : 3-18
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2026/01/07 01:01:30 实验者: xiexinhui
 处理时间(V2) : 2026/01/07 11:17:58 处理者: xiexinhui
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 195nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.125	443759	100.000	67170	2600	1.307	--
总计		443759	100.000	67170			

图30 奥利司他胶囊溶出度测定长期12月HPLC图谱
 参比制剂(120mg规格)-pH6.0(内含3%SDS)介质-极限转速
 对照品溶液-1-3




QTL-486

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 195nm
数据文件名	: RC\$QTL-486 - 7-72/7-2955-2 - cbzj-M2449M1-cq12y-120mg-rcd-jx-pH6.0+3sdsjz-dz1-5.lcd		
方法文件名	: RC\$QTL-486 - QTL-486-FX256.lcm		
批处理文件名	: RC\$QTL-486 - 20260106-rc-FX256.lcb		
样品瓶号	: 3-18	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2026/01/07 01:08:16	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2026/01/07 11:18:13		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX256)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 195nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.125	444492	100.000	67183	2590	1.313	--
总计		444492	100.000	67183			

图32 奥利司他胶囊溶出度测定长期12月HPLC图谱
参比制剂(120mg规格)-pH6.0(内含3%SDS)介质-极限转速
对照品溶液-1-5




QTL-486

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 195nm
数据文件名	: RC\$QTL-486 - 7-72/7-2956-2 - cbzj-M2449M1-cq12y-120mg-rcd-jx-pH6.0+3sdsjz-P1-1.lcd		
方法文件名	: RC\$QTL-486 - QTL-486-FX256.lcm		
批处理文件名	: RC\$QTL-486 - 20260106-rc-FX256.lcb		
样品瓶号	: 3-2	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2026/01/07 01:11:38	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2026/01/07 11:18:20		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX256)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 195nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.155	409839	100.000	63913	2899	1.344	--
总计		409839	100.000	63913			

图33 奥利司他胶囊溶出度测定长期12月HPLC图谱
参比制剂()(120mg规格)-pH6.0(内含3%SDS)介质-极限转速-片1
供试品溶液-1




QTL-486

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 195nm
数据文件名	: RC\$QTL-486 - 7-72/7-2957-2 - cbzj-M2449M1-cq12y-120mg-rcd-jx-pH6.0+3sdsjz-P2-1.lcd		
方法文件名	: RC\$QTL-486 - QTL-486-FX256.lcm		
批处理文件名	: RC\$QTL-486 - 20260106-rc-FX256.lcb		
样品瓶号	: 3-11	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2026/01/07 01:15:01	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2026/01/07 11:18:27		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX256)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 195nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.159	411985	100.000	63483	2868	1.359	--
总计		411985	100.000	63483			

图34 奥利司他胶囊溶出度测定长期12月HPLC图谱
参比制剂()(120mg规格)-pH6.0(内含3%SDS)介质-极限转速-片2
供试品溶液-1




QTL-486

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 195nm
数据文件名	: RC\$QTL-486 - 7-72/7-2958-2 - cbzj-M2449M1-cq12y-120mg-rcd-jx-pH6.0+3sdsjz-P3-1.lcd		
方法文件名	: RC\$QTL-486 - QTL-486-FX256.lcm		
批处理文件名	: RC\$QTL-486 - 20260106-rc-FX256.lcb		
样品瓶号	: 3-20	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2026/01/07 01:18:23	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2026/01/07 11:18:35		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX256)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 195nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.158	417745	100.000	64423	2861	1.357	--
总计		417745	100.000	64423			

图35 奥利司他胶囊溶出度测定长期12月HPLC图谱
 参比制剂()(120mg规格)-pH6.0(内含3%SDS)介质-极限转速-片3
 供试品溶液-1




QTL-486

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 195nm
数据文件名	: RC\$QTL-486 - 7-72/7-2961-2 - cbzj-M2449M1-cq12y-120mg-rcd-jx-pH6.0+3sdsjz-P6-1.lcd		
方法文件名	: RC\$QTL-486 - QTL-486-FX256.lcm		
批处理文件名	: RC\$QTL-486 - 20260106-rc-FX256.lcb		
样品瓶号	: 3-47	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2026/01/07 01:28:30	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2026/01/07 11:18:57		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX256)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 195nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.158	403552	100.000	61778	2814	1.357	--
总计		403552	100.000	61778			

图38 奥利司他胶囊溶出度测定长期12月HPLC图谱
参比制剂()(120mg规格)-pH6.0(内含3%SDS)介质-极限转速-片6
供试品溶液-1




QTL-486

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 195nm
数据文件名	: RC\$QTL-486 - 7-72/7-2962-2 - cbzj-M2449M1-cq12y-120mg-rcd-jx-pH6.0+3sdsjz-dz2-1.lcd		
方法文件名	: RC\$QTL-486 - QTL-486-FX256.lcm		
批处理文件名	: RC\$QTL-486 - 20260106-rc-FX256.lcb		
样品瓶号	: 3-27	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2026/01/07 01:31:53	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2026/01/07 11:19:04		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX256)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 195nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.127	444585	100.000	66495	2543	1.318	--
总计		444585	100.000	66495			

图39 奥利司他胶囊溶出度测定长期12月HPLC图谱
参比制剂(120mg规格)-pH6.0(内含3%SDS)介质-极限转速
对照品溶液-2-1




QTL-486

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 195nm
数据文件名	: RC\$QTL-486 - 7-72/7-2963-2 - cbzj-M2449M1-cq12y-120mg-rcd-jx-pH6.0+3sdsjz-dz2-2.lcd		
方法文件名	: RC\$QTL-486 - QTL-486-FX256.lcm		
批处理文件名	: RC\$QTL-486 - 20260106-rc-FX256.lcb		
样品瓶号	: 3-27	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2026/01/07 01:35:16	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2026/01/07 11:19:12		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX256)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 195nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.125	444026	100.000	66631	2555	1.312	--
总计		444026	100.000	66631			

图40 奥利司他胶囊溶出度测定长期12月HPLC图谱
参比制剂(120mg规格)-pH6.0(内含3%SDS)介质-极限转速
对照品溶液-2-2




QTL-486

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 195nm
数据文件名	: RC\$QTL-486 - 7-73/7-2898-2 - zzp-cq12y-60mg-rcd-jx-pH6.0+3sdsjz-rj.lcd		
方法文件名	: RC\$QTL-486 - QTL-486-FX256.lcm		
批处理文件名	: RC\$QTL-486 - 20260106-rc-FX256.lcb		
样品瓶号	: 1-9	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2026/01/06 21:54:46	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2026/01/07 11:20:16		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX256)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 195nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图41 奥利司他胶囊溶出度测定长期12月HPLC图谱
自制品(60mg规格)-pH6.0(内含3%SDS)介质-极限转速
溶剂




QTL-486

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 195nm
数据文件名	: RC\$QTL-486 - 7-73/7-2899-2 - zzp-cq12y-60mg-rcd-jx-pH6.0+3sdsjz-dz1-1.lcd		
方法文件名	: RC\$QTL-486 - QTL-486-FX256.lcm		
批处理文件名	: RC\$QTL-486 - 20260106-rc-FX256.lcb		
样品瓶号	: 1-18	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2026/01/06 21:58:09	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2026/01/07 11:20:23		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX256)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 195nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.145	448827	100.000	68087	2655	1.284	--
总计		448827	100.000	68087			

图42 奥利司他胶囊溶出度测定长期12月HPLC图谱
自制品(60mg规格)-pH6.0(内含3%SDS)介质-极限转速
对照品溶液-1-1




QTL-486

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 195nm
数据文件名	: RC\$QTL-486 - 7-73/7-2900-2 - zzp-cq12y-60mg-rcd-jx-pH6.0+3sdsjz-dz1-2.lcd		
方法文件名	: RC\$QTL-486 - QTL-486-FX256.lcm		
批处理文件名	: RC\$QTL-486 - 20260106-rc-FX256.lcb		
样品瓶号	: 1-18	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2026/01/06 22:01:32	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2026/01/07 11:20:31		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX256)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 195nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.144	448849	100.000	68111	2657	1.280	--
总计		448849	100.000	68111			

图43 奥利司他胶囊溶出度测定长期12月HPLC图谱
自制品(60mg规格)-pH6.0(内含3%SDS)介质-极限转速
对照品溶液-1-2




QTL-486

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 195nm
数据文件名	: RC\$QTL-486 - 7-73/7-2901-2 - zzp-cq12y-60mg-rcd-jx-pH6.0+3sdsjz-dz1-3.lcd		
方法文件名	: RC\$QTL-486 - QTL-486-FX256.lcm		
批处理文件名	: RC\$QTL-486 - 20260106-rc-FX256.lcb		
样品瓶号	: 1-18	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2026/01/06 22:04:56	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2026/01/07 11:20:38		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX256)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 195nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.145	448896	100.000	68198	2662	1.280	--
总计		448896	100.000	68198			

图44 奥利司他胶囊溶出度测定长期12月HPLC图谱
自制品(60mg规格)-pH6.0(内含3%SDS)介质-极限转速
对照品溶液-1-3




QTL-486

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 195nm
数据文件名	: RC\$QTL-486 - 7-73/7-2902-2 - zzp-cq12y-60mg-rcd-jx-pH6.0+3sdsjz-dz1-4.lcd		
方法文件名	: RC\$QTL-486 - QTL-486-FX256.lcm		
批处理文件名	: RC\$QTL-486 - 20260106-rc-FX256.lcb		
样品瓶号	: 1-18	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2026/01/06 22:08:20	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2026/01/07 11:20:45		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX256)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 195nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.145	449505	100.000	68245	2663	1.286	--
总计		449505	100.000	68245			

图45 奥利司他胶囊溶出度测定长期12月HPLC图谱
自制品(60mg规格)-pH6.0(内含3%SDS)介质-极限转速
对照品溶液-1-4




QTL-486

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 195nm
数据文件名	: RC\$QTL-486 - 7-73/7-2904-2 - zzp-2024102121p-cq12y-60mg-rcd-jx-pH6.0+3sdsjz-P1-1.lcd		
方法文件名	: RC\$QTL-486 - QTL-486-FX256.lcm		
批处理文件名	: RC\$QTL-486 - 20260106-rc-FX256.lcb		
样品瓶号	: 1-4	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2026/01/06 22:15:07	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2026/01/07 11:21:00		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX256)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 195nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.173	422368	100.000	65627	2923	1.326	--
总计		422368	100.000	65627			

图47 奥利司他胶囊溶出度测定长期12月HPLC图谱
 自制品(2024102121批)(60mg规格)-pH6.0(内含3%SDS)介质-极限转速-片1
 供试品溶液-1




QTL-486

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 195nm
数据文件名	: RC\$QTL-486 - 7-73/7-2905-2 - zzp-2024102121p-cq12y-60mg-rcd-jx-pH6.0+3sdsjz-P2-1.lcd		
方法文件名	: RC\$QTL-486 - QTL-486-FX256.lcm		
批处理文件名	: RC\$QTL-486 - 20260106-rc-FX256.lcb		
样品瓶号	: 1-13	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2026/01/06 22:18:30	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2026/01/07 11:21:07		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX256)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 195nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.173	412600	100.000	64430	2940	1.312	--
总计		412600	100.000	64430			

图48 奥利司他胶囊溶出度测定长期12月HPLC图谱
 自制品(2024102121批)(60mg规格)-pH6.0(内含3%SDS)介质-极限转速-片2
 供试品溶液-1




QTL-486

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 195nm
数据文件名	: RC\$QTL-486 - 7-73/7-2906-2 - zzp-2024102121p-cq12y-60mg-rcd-jx-pH6.0+3sdsjz-P3-1.lcd		
方法文件名	: RC\$QTL-486 - QTL-486-FX256.lcm		
批处理文件名	: RC\$QTL-486 - 20260106-rc-FX256.lcb		
样品瓶号	: 1-22	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2026/01/06 22:21:53	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2026/01/07 11:21:14		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX256)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 195nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.174	424452	100.000	66249	2956	1.321	--
总计		424452	100.000	66249			

图49 奥利司他胶囊溶出度测定长期12月HPLC图谱
自制品(2024102121批)(60mg规格)-pH6.0(内含3%SDS)介质-极限转速-片3
供试品溶液-1




QTL-486

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 195nm
数据文件名	: RC\$QTL-486 - 7-73/7-2907-2 - zzp-2024102121p-cq12y-60mg-rcd-jx-pH6.0+3sdsjz-P4-1.lcd		
方法文件名	: RC\$QTL-486 - QTL-486-FX256.lcm		
批处理文件名	: RC\$QTL-486 - 20260106-rc-FX256.lcb		
样品瓶号	: 1-31	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2026/01/06 22:25:16	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2026/01/07 11:21:22		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX256)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 195nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.172	427412	100.000	66606	2944	1.336	--
总计		427412	100.000	66606			

图50 奥利司他胶囊溶出度测定长期12月HPLC图谱
 自制品(2024102121批)(60mg规格)-pH6.0(内含3%SDS)介质-极限转速-片4
 供试品溶液-1




QTL-486

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 195nm
数据文件名	: RC\$QTL-486 - 7-73/7-2908-2 - zzp-2024102121p-cq12y-60mg-rcd-jx-pH6.0+3sdsjz-P5-1.lcd		
方法文件名	: RC\$QTL-486 - QTL-486-FX256.lcm		
批处理文件名	: RC\$QTL-486 - 20260106-rc-FX256.lcb		
样品瓶号	: 1-40	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2026/01/06 22:28:39	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2026/01/07 11:21:29		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX256)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 195nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.172	428973	100.000	66437	2908	1.344	--
总计		428973	100.000	66437			

图51 奥利司他胶囊溶出度测定长期12月HPLC图谱
 自制品(2024102121批)(60mg规格)-pH6.0(内含3%SDS)介质-极限转速-片5
 供试品溶液-1




QTL-486

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 195nm
数据文件名	: RC\$QTL-486 - 7-73/7-2909-2 - zzp-2024102121p-cq12y-60mg-rcd-jx-pH6.0+3sdsjz-P6-1.lcd		
方法文件名	: RC\$QTL-486 - QTL-486-FX256.lcm		
批处理文件名	: RC\$QTL-486 - 20260106-rc-FX256.lcb		
样品瓶号	: 1-49	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2026/01/06 22:32:01	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2026/01/07 11:21:36		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX256)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 195nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.171	422558	100.000	65671	2920	1.333	--
总计		422558	100.000	65671			

图52 奥利司他胶囊溶出度测定长期12月HPLC图谱
 自制品(2024102121批)(60mg规格)-pH6.0(内含3%SDS)介质-极限转速-片6
 供试品溶液-1




QTL-486

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 195nm
数据文件名	: RC\$QTL-486 - 7-73/7-2910-2 - zzp-2024102221p-cq12y-60mg-rcd-jx-pH6.0+3sdsjz-P1-1.lcd		
方法文件名	: RC\$QTL-486 - QTL-486-FX256.lcm		
批处理文件名	: RC\$QTL-486 - 20260106-rc-FX256.lcb		
样品瓶号	: 1-5	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2026/01/06 22:35:24	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2026/01/07 11:21:43		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX256)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 195nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.168	420285	100.000	65046	2904	1.334	--
总计		420285	100.000	65046			

图53 奥利司他胶囊溶出度测定长期12月HPLC图谱
 自制品(2024102221批)(60mg规格)-pH6.0(内含3%SDS)介质-极限转速-片1
 供试品溶液-1




QTL-486

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 195nm
数据文件名	: RC\$QTL-486 - 7-73/7-2911-2 - zzp-2024102221p-cq12y-60mg-rcd-jx-pH6.0+3sdsjz-P2-1.lcd		
方法文件名	: RC\$QTL-486 - QTL-486-FX256.lcm		
批处理文件名	: RC\$QTL-486 - 20260106-rc-FX256.lcb		
样品瓶号	: 1-14	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2026/01/06 22:38:47	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2026/01/07 11:21:51		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX256)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 195nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.168	426638	100.000	65897	2903	1.334	--
总计		426638	100.000	65897			

图54 奥利司他胶囊溶出度测定长期12月HPLC图谱
 自制品(2024102221批)(60mg规格)-pH6.0(内含3%SDS)介质-极限转速-片2
 供试品溶液-1




QTL-486

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 195nm
数据文件名	: RC\$QTL-486 - 7-73/7-2912-2 - zzp-2024102221p-cq12y-60mg-rcd-jx-pH6.0+3sdsjz-P3-1.lcd		
方法文件名	: RC\$QTL-486 - QTL-486-FX256.lcm		
批处理文件名	: RC\$QTL-486 - 20260106-rc-FX256.lcb		
样品瓶号	: 1-23	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2026/01/06 22:42:09	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2026/01/07 11:21:58		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX256)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 195nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.166	424860	100.000	65948	2897	1.330	--
总计		424860	100.000	65948			

图55 奥利司他胶囊溶出度测定长期12月HPLC图谱
 自制品(2024102221批)(60mg规格)-pH6.0(内含3%SDS)介质-极限转速-片3
 供试品溶液-1




QTL-486

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 195nm
数据文件名	: RC\$QTL-486 - 7-73/7-2913-2 - zzp-2024102221p-cq12y-60mg-rcd-jx-pH6.0+3sdsjz-P4-1.lcd		
方法文件名	: RC\$QTL-486 - QTL-486-FX256.lcm		
批处理文件名	: RC\$QTL-486 - 20260106-rc-FX256.lcb		
样品瓶号	: 1-32	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2026/01/06 22:45:31	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2026/01/07 11:22:05		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX256)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 195nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.167	424807	100.000	65717	2893	1.329	--
总计		424807	100.000	65717			

图56 奥利司他胶囊溶出度测定长期12月HPLC图谱
 自制品(2024102221批)(60mg规格)-pH6.0(内含3%SDS)介质-极限转速-片4
 供试品溶液-1




QTL-486

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 195nm
数据文件名	: RC\$QTL-486 - 7-73/7-2914-2 - zzp-2024102221p-cq12y-60mg-rcd-jx-pH6.0+3sdsjz-P5-1.lcd		
方法文件名	: RC\$QTL-486 - QTL-486-FX256.lcm		
批处理文件名	: RC\$QTL-486 - 20260106-rc-FX256.lcb		
样品瓶号	: 1-41	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2026/01/06 22:48:54	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2026/01/07 11:22:12		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX256)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 195nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.165	425910	100.000	66183	2883	1.325	--
总计		425910	100.000	66183			

图57 奥利司他胶囊溶出度测定长期12月HPLC图谱
 自制品(2024102221批)(60mg规格)-pH6.0(内含3%SDS)介质-极限转速-片5
 供试品溶液-1




QTL-486

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 195nm
数据文件名	: RC\$QTL-486 - 7-73/7-2915-2 - zzp-2024102221p-cq12y-60mg-rcd-jx-pH6.0+3sdsjz-P6-1.lcd		
方法文件名	: RC\$QTL-486 - QTL-486-FX256.lcm		
批处理文件名	: RC\$QTL-486 - 20260106-rc-FX256.lcb		
样品瓶号	: 1-50	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2026/01/06 22:52:16	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2026/01/07 11:22:19		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX256)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 195nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.164	433328	100.000	67270	2877	1.328	--
总计		433328	100.000	67270			

图58 奥利司他胶囊溶出度测定长期12月HPLC图谱
 自制品(2024102221批)(60mg规格)-pH6.0(内含3%SDS)介质-极限转速-片6
 供试品溶液-1




QTL-486

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 195nm
数据文件名	: RC\$QTL-486 - 7-73/7-2916-2 - zzp-2024102321p-cq12y-60mg-rcd-jx-pH6.0+3sdsjz-P1-1.lcd		
方法文件名	: RC\$QTL-486 - QTL-486-FX256.lcm		
批处理文件名	: RC\$QTL-486 - 20260106-rc-FX256.lcb		
样品瓶号	: 1-6	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2026/01/06 22:55:38	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2026/01/07 11:22:27		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX256)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 195nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.162	422004	100.000	65234	2855	1.331	--
总计		422004	100.000	65234			

图59 奥利司他胶囊溶出度测定长期12月HPLC图谱
自制品(2024102321批)(60mg规格)-pH6.0(内含3%SDS)介质-极限转速-片1
供试品溶液-1




QTL-486

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 195nm
数据文件名	: RC\$QTL-486 - 7-73/7-2917-2 - zzp-2024102321p-cq12y-60mg-rcd-jx-pH6.0+3sdsjz-P2-1.lcd		
方法文件名	: RC\$QTL-486 - QTL-486-FX256.lcm		
批处理文件名	: RC\$QTL-486 - 20260106-rc-FX256.lcb		
样品瓶号	: 1-15	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2026/01/06 22:59:01	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2026/01/07 11:22:35		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX256)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 195nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.161	416810	100.000	64475	2861	1.331	--
总计		416810	100.000	64475			

图60 奥利司他胶囊溶出度测定长期12月HPLC图谱
 自制品(2024102321批)(60mg规格)-pH6.0(内含3%SDS)介质-极限转速-片2
 供试品溶液-1




QTL-486

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 195nm
数据文件名	: RC\$QTL-486 - 7-73/7-2918-2 - zzp-2024102321p-cq12y-60mg-rcd-jx-pH6.0+3sdsjz-P3-1.lcd		
方法文件名	: RC\$QTL-486 - QTL-486-FX256.lcm		
批处理文件名	: RC\$QTL-486 - 20260106-rc-FX256.lcb		
样品瓶号	: 1-24	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2026/01/06 23:02:24	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2026/01/07 11:22:42		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX256)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 195nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.161	413335	100.000	63765	2849	1.332	--
总计		413335	100.000	63765			

图61 奥利司他胶囊溶出度测定长期12月HPLC图谱
 自制品(2024102321批)(60mg规格)-pH6.0(内含3%SDS)介质-极限转速-片3
 供试品溶液-1




QTL-486

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 195nm
数据文件名	: RC\$QTL-486 - 7-73/7-2920-2 - zzp-2024102321p-cq12y-60mg-rcd-jx-pH6.0+3sdsjz-P5-1.lcd		
方法文件名	: RC\$QTL-486 - QTL-486-FX256.lcm		
批处理文件名	: RC\$QTL-486 - 20260106-rc-FX256.lcb		
样品瓶号	: 1-42	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2026/01/06 23:09:10	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2026/01/07 11:22:57		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX256)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 195nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.161	415927	100.000	64203	2853	1.329	--
总计		415927	100.000	64203			

图63 奥利司他胶囊溶出度测定长期12月HPLC图谱
 自制品(2024102321批)(60mg规格)-pH6.0(内含3%SDS)介质-极限转速-片5
 供试品溶液-1




QTL-486

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 195nm
数据文件名	: RC\$QTL-486 - 7-73/7-2921-2 - zzp-2024102321p-cq12y-60mg-rcd-jx-pH6.0+3sdsjz-P6-1.lcd		
方法文件名	: RC\$QTL-486 - QTL-486-FX256.lcm		
批处理文件名	: RC\$QTL-486 - 20260106-rc-FX256.lcb		
样品瓶号	: 1-51	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2026/01/06 23:12:33	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2026/01/07 11:23:04		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX256)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 195nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.161	422983	100.000	65473	2855	1.322	--
总计		422983	100.000	65473			

图64 奥利司他胶囊溶出度测定长期12月HPLC图谱
 自制品(2024102321批)(60mg规格)-pH6.0(内含3%SDS)介质-极限转速-片6
 供试品溶液-1




QTL-486

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 195nm
数据文件名	: RC\$QTL-486 - 7-73/7-2922-2 - zzp-cq12y-60mg-rcd-jx-pH6.0+3sdsjz-dz2-1.lcd		
方法文件名	: RC\$QTL-486 - QTL-486-FX256.lcm		
批处理文件名	: RC\$QTL-486 - 20260106-rc-FX256.lcb		
样品瓶号	: 1-27	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2026/01/06 23:15:56	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2026/01/07 11:23:12		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX256)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 195nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.133	446480	100.000	67320	2597	1.299	--
总计		446480	100.000	67320			

图65 奥利司他胶囊溶出度测定长期12月HPLC图谱
自制品(60mg规格)-pH6.0(内含3%SDS)介质-极限转速
对照品溶液-2-1




QTL-486

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 195nm
数据文件名	: RC\$QTL-486 - 7-73/7-2923-2 - zzp-cq12y-60mg-rcd-jx-pH6.0+3sdsjz-dz2-2.lcd		
方法文件名	: RC\$QTL-486 - QTL-486-FX256.lcm		
批处理文件名	: RC\$QTL-486 - 20260106-rc-FX256.lcb		
样品瓶号	: 1-27	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2026/01/06 23:19:20	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2026/01/07 11:23:19		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX256)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 195nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.131	446127	100.000	67543	2600	1.296	--
总计		446127	100.000	67543			

图66 奥利司他胶囊溶出度测定长期12月HPLC图谱
自制品(60mg规格)-pH6.0(内含3%SDS)介质-极限转速
对照品溶液-2-2




QTL-486

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 195nm
数据文件名	: RC\$QTL-486 - 7-74/10-2363-2 - zzp-zjtj12y-60mg-red-jx-pH6.0+3sdsjz-rj.lcd		
方法文件名	: RC\$QTL-486 - QTL-486-FX259.lcm		
批处理文件名	: RC\$QTL-486 - 20260106-rc-FX259.lcb		
样品瓶号	: 1-9	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2026/01/06 20:47:39	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2026/01/07 11:30:32		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX259)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 195nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图67 奥利司他胶囊溶出度测定中间条件12月HPLC图谱
自制品(60mg规格)-pH6.0(内含3%SDS)介质-极限转速
溶剂




QTL-486

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 195nm
数据文件名	: RC\$QTL-486 - 7-74/10-2364-2 - zzp-zjtj12y-60mg-red-jx-pH6.0+3sdsjz-dz1-1.lcd		
方法文件名	: RC\$QTL-486 - QTL-486-FX259.lcm		
批处理文件名	: RC\$QTL-486 - 20260106-rc-FX259.lcb		
样品瓶号	: 1-18	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2026/01/06 20:51:02	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2026/01/07 11:30:39		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX259)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 195nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.215	449618	100.000	69949	2752	1.095	--
总计		449618	100.000	69949			

图68 奥利司他胶囊溶出度测定中间条件12月HPLC图谱
自制品(60mg规格)-pH6.0(内含3%SDS)介质-极限转速
对照品溶液-1-1




QTL-486

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 195nm
数据文件名	: RC\$QTL-486 - 7-74/10-2365-2 - zzp-zjtj12y-60mg-red-jx-pH6.0+3sdsjz-dz1-2.lcd		
方法文件名	: RC\$QTL-486 - QTL-486-FX259.lcm		
批处理文件名	: RC\$QTL-486 - 20260106-rc-FX259.lcb		
样品瓶号	: 1-18	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2026/01/06 20:54:26	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2026/01/07 11:30:47		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX259)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 195nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.214	450059	100.000	69885	2736	1.095	--
总计		450059	100.000	69885			

图69 奥利司他胶囊溶出度测定中间条件12月HPLC图谱
自制品(60mg规格)-pH6.0(内含3%SDS)介质-极限转速
对照品溶液-1-2




QTL-486

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 195nm
数据文件名	: RC\$QTL-486 - 7-74/10-2366-2 - zzp-zjtj12y-60mg-red-jx-pH6.0+3sdsjz-dz1-3.lcd		
方法文件名	: RC\$QTL-486 - QTL-486-FX259.lcm		
批处理文件名	: RC\$QTL-486 - 20260106-rc-FX259.lcb		
样品瓶号	: 1-18	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2026/01/06 20:57:50	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2026/01/07 11:30:54		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX259)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 195nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.214	449825	100.000	69801	2730	1.094	--
总计		449825	100.000	69801			

图70 奥利司他胶囊溶出度测定中间条件12月HPLC图谱
自制品(60mg规格)-pH6.0(内含3%SDS)介质-极限转速
对照品溶液-1-3




QTL-486

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 195nm
数据文件名	: RC\$QTL-486 - 7-74/10-2367-2 - zzp-zjtj12y-60mg-red-jx-pH6.0+3sdsjz-dz1-4.lcd		
方法文件名	: RC\$QTL-486 - QTL-486-FX259.lcm		
批处理文件名	: RC\$QTL-486 - 20260106-rc-FX259.lcb		
样品瓶号	: 1-18	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2026/01/06 21:01:14	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2026/01/07 11:31:02		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX259)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 195nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.215	450301	100.000	69752	2730	1.096	--
总计		450301	100.000	69752			

图71 奥利司他胶囊溶出度测定中间条件12月HPLC图谱
自制品(60mg规格)-pH6.0(内含3%SDS)介质-极限转速
对照品溶液-1-4




QTL-486

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 195nm
数据文件名	: RC\$QTL-486 - 7-74/10-2370-2 - zzp-2024102121p-zjtj12y-60mg-rcd-jx-pH6.0+3sdsjz-P2-1.lcd		
方法文件名	: RC\$QTL-486 - QTL-486-FX259.lcm		
批处理文件名	: RC\$QTL-486 - 20260106-rc-FX259.lcb		
样品瓶号	: 1-13	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2026/01/06 21:11:24	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2026/01/07 11:31:24		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX259)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 195nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.242	410072	100.000	64649	2935	1.105	--
总计		410072	100.000	64649			

图74 奥利司他胶囊溶出度测定中间条件12月HPLC图谱
 自制品(2024102121批)(60mg规格)-pH6.0(内含3%SDS)介质-极限转速-片2
 供试品溶液-1




QTL-486

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 195nm
数据文件名	: RC\$QTL-486 - 7-74/10-2371-2 - zzp-2024102121p-zjtj12y-60mg-rcd-jx-pH6.0+3sdsjz-P3-1.lcd		
方法文件名	: RC\$QTL-486 - QTL-486-FX259.lcm		
批处理文件名	: RC\$QTL-486 - 20260106-rc-FX259.lcb		
样品瓶号	: 1-22	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2026/01/06 21:14:47	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2026/01/07 11:31:32		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX259)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 195nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.240	413975	100.000	65462	2920	1.107	--
总计		413975	100.000	65462			

图75 奥利司他胶囊溶出度测定中间条件12月HPLC图谱
 自制品(2024102121批)(60mg规格)-pH6.0(内含3%SDS)介质-极限转速-片3
 供试品溶液-1




QTL-486

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 195nm
数据文件名	: RC\$QTL-486 - 7-74/10-2372-2 - zzp-2024102121p-zjtj12y-60mg-rcd-jx-pH6.0+3sdsjz-P4-1.lcd		
方法文件名	: RC\$QTL-486 - QTL-486-FX259.lcm		
批处理文件名	: RC\$QTL-486 - 20260106-rc-FX259.lcb		
样品瓶号	: 1-31	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2026/01/06 21:18:10	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2026/01/07 11:31:39		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX259)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 195nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.241	405789	100.000	64264	2928	1.106	--
总计		405789	100.000	64264			

图76 奥利司他胶囊溶出度测定中间条件12月HPLC图谱
 自制品(2024102121批)(60mg规格)-pH6.0(内含3%SDS)介质-极限转速-片4
 供试品溶液-1




QTL-486

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 195nm
数据文件名	: RC\$QTL-486 - 7-74/10-2373-2 - zzp-2024102121p-zjtj12y-60mg-rcd-jx-pH6.0+3sdsjz-P5-1.lcd		
方法文件名	: RC\$QTL-486 - QTL-486-FX259.lcm		
批处理文件名	: RC\$QTL-486 - 20260106-rc-FX259.lcb		
样品瓶号	: 1-40	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2026/01/06 21:21:32	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2026/01/07 11:31:47		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX259)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 195nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.240	417482	100.000	66323	2945	1.101	--
总计		417482	100.000	66323			

图77 奥利司他胶囊溶出度测定中间条件12月HPLC图谱
 自制品(2024102121批)(60mg规格)-pH6.0(内含3%SDS)介质-极限转速-片5
 供试品溶液-1




QTL-486

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 195nm
数据文件名	: RC\$QTL-486 - 7-74/10-2374-2 - zzp-2024102121p-zjtj12y-60mg-rcd-jx-pH6.0+3sdsjz-P6-1.lcd		
方法文件名	: RC\$QTL-486 - QTL-486-FX259.lcm		
批处理文件名	: RC\$QTL-486 - 20260106-rc-FX259.lcb		
样品瓶号	: 1-49	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2026/01/06 21:24:55	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2026/01/07 11:31:55		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX259)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 195nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.240	410528	100.000	65464	2962	1.097	--
总计		410528	100.000	65464			

图78 奥利司他胶囊溶出度测定中间条件12月HPLC图谱
 自制品(2024102121批)(60mg规格)-pH6.0(内含3%SDS)介质-极限转速-片6
 供试品溶液-1




QTL-486

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 195nm
数据文件名	: RC\$QTL-486 - 7-74/10-2375-2 - zzp-2024102221p-zjtj12y-60mg-rcd-jx-pH6.0+3sdsjz-P1-1.lcd		
方法文件名	: RC\$QTL-486 - QTL-486-FX259.lcm		
批处理文件名	: RC\$QTL-486 - 20260106-rc-FX259.lcb		
样品瓶号	: 1-5	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2026/01/06 21:28:18	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2026/01/07 11:32:02		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX259)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 195nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.238	425030	100.000	67673	2943	1.100	--
总计		425030	100.000	67673			

图79 奥利司他胶囊溶出度测定中间条件12月HPLC图谱
 自制品(2024102221批)(60mg规格)-pH6.0(内含3%SDS)介质-极限转速-片1
 供试品溶液-1




QTL-486

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 195nm
数据文件名	: RC\$QTL-486 - 7-74/10-2376-2 - zzp-2024102221p-zjtj12y-60mg-rcd-jx-pH6.0+3sdsjz-P2-1.lcd		
方法文件名	: RC\$QTL-486 - QTL-486-FX259.lcm		
批处理文件名	: RC\$QTL-486 - 20260106-rc-FX259.lcb		
样品瓶号	: 1-14	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2026/01/06 21:31:41	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2026/01/07 11:32:10		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX259)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 195nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.238	415551	100.000	66350	2958	1.098	--
总计		415551	100.000	66350			

图80 奥利司他胶囊溶出度测定中间条件12月HPLC图谱
自制品(2024102221批)(60mg规格)-pH6.0(内含3%SDS)介质-极限转速-片2
供试品溶液-1




QTL-486

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 195nm
数据文件名	: RC\$QTL-486 - 7-74/10-2377-2 - zzp-2024102221p-zjtj12y-60mg-rcd-jx-pH6.0+3sdsjz-P3-1.lcd		
方法文件名	: RC\$QTL-486 - QTL-486-FX259.lcm		
批处理文件名	: RC\$QTL-486 - 20260106-rc-FX259.lcb		
样品瓶号	: 1-23	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2026/01/06 21:35:04	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2026/01/07 11:32:17		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX259)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 195nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.236	413759	100.000	65996	2961	1.098	--
总计		413759	100.000	65996			

图81 奥利司他胶囊溶出度测定中间条件12月HPLC图谱
 自制品(2024102221批)(60mg规格)-pH6.0(内含3%SDS)介质-极限转速-片3
 供试品溶液-1




QTL-486

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 195nm
数据文件名	: RC\$QTL-486 - 7-74/10-2378-2 - zzp-2024102221p-zjtj12y-60mg-rcd-jx-pH6.0+3sdsjz-P4-1.lcd		
方法文件名	: RC\$QTL-486 - QTL-486-FX259.lcm		
批处理文件名	: RC\$QTL-486 - 20260106-rc-FX259.lcb		
样品瓶号	: 1-32	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2026/01/06 21:38:28	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2026/01/07 11:32:25		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX259)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 195nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.237	412144	100.000	66078	2993	1.096	--
总计		412144	100.000	66078			

图82 奥利司他胶囊溶出度测定中间条件12月HPLC图谱
 自制品(2024102221批)(60mg规格)-pH6.0(内含3%SDS)介质-极限转速-片4
 供试品溶液-1




QTL-486

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 195nm
数据文件名	: RC\$QTL-486 - 7-74/10-2380-2 - zzp-2024102221p-zjtj12y-60mg-rcd-jx-pH6.0+3sdsjz-P6-1.lcd		
方法文件名	: RC\$QTL-486 - QTL-486-FX259.lcm		
批处理文件名	: RC\$QTL-486 - 20260106-rc-FX259.lcb		
样品瓶号	: 1-50	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2026/01/06 21:45:13	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2026/01/07 11:32:41		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX259)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 195nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.235	409456	100.000	65473	2978	1.096	--
总计		409456	100.000	65473			

图84 奥利司他胶囊溶出度测定中间条件12月HPLC图谱
 自制品(2024102221批)(60mg规格)-pH6.0(内含3%SDS)介质-极限转速-片6
 供试品溶液-1




QTL-486

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 195nm
数据文件名	: RC\$QTL-486 - 7-74/10-2381-2 - zzp-2024102321p-zjtj12y-60mg-rcd-jx-pH6.0+3sdsjz-P1-1.lcd		
方法文件名	: RC\$QTL-486 - QTL-486-FX259.lcm		
批处理文件名	: RC\$QTL-486 - 20260106-rc-FX259.lcb		
样品瓶号	: 1-6	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2026/01/06 21:48:36	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2026/01/07 11:32:49		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX259)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 195nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.234	403715	100.000	64380	2970	1.096	--
总计		403715	100.000	64380			

图85 奥利司他胶囊溶出度测定中间条件12月HPLC图谱
 自制品(2024102321批)(60mg规格)-pH6.0(内含3%SDS)介质-极限转速-片1
 供试品溶液-1




QTL-486

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 195nm
数据文件名	: RC\$QTL-486 - 7-74/10-2382-2 - zzp-2024102321p-zjtj12y-60mg-rcd-jx-pH6.0+3sdsjz-P2-1.lcd		
方法文件名	: RC\$QTL-486 - QTL-486-FX259.lcm		
批处理文件名	: RC\$QTL-486 - 20260106-rc-FX259.lcb		
样品瓶号	: 1-15	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2026/01/06 21:51:59	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2026/01/07 11:32:56		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX259)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 195nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.233	408678	100.000	65361	2968	1.096	--
总计		408678	100.000	65361			

图86 奥利司他胶囊溶出度测定中间条件12月HPLC图谱
 自制品(2024102321批)(60mg规格)-pH6.0(内含3%SDS)介质-极限转速-片2
 供试品溶液-1




QTL-486

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 195nm
数据文件名	: RC\$QTL-486 - 7-74/10-2383-2 - zzp-2024102321p-zjtj12y-60mg-rcd-jx-pH6.0+3sdsjz-P3-1.lcd		
方法文件名	: RC\$QTL-486 - QTL-486-FX259.lcm		
批处理文件名	: RC\$QTL-486 - 20260106-rc-FX259.lcb		
样品瓶号	: 1-24	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2026/01/06 21:55:22	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2026/01/07 11:33:04		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX259)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 195nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.233	412489	100.000	65695	2949	1.100	--
总计		412489	100.000	65695			

图87 奥利司他胶囊溶出度测定中间条件12月HPLC图谱
 自制品(2024102321批)(60mg规格)-pH6.0(内含3%SDS)介质-极限转速-片3
 供试品溶液-1




QTL-486

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 195nm
数据文件名	: RC\$QTL-486 - 7-74/10-2384-2 - zzp-2024102321p-zjtj12y-60mg-rcd-jx-pH6.0+3sdsjz-P4-1.lcd		
方法文件名	: RC\$QTL-486 - QTL-486-FX259.lcm		
批处理文件名	: RC\$QTL-486 - 20260106-rc-FX259.lcb		
样品瓶号	: 1-33	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2026/01/06 21:58:45	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2026/01/07 11:33:11		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX259)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 195nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.233	409328	100.000	64983	2930	1.102	--
总计		409328	100.000	64983			

图88 奥利司他胶囊溶出度测定中间条件12月HPLC图谱
 自制品(2024102321批)(60mg规格)-pH6.0(内含3%SDS)介质-极限转速-片4
 供试品溶液-1




QTL-486

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 195nm
数据文件名	: RC\$QTL-486 - 7-74/10-2385-2 - zzp-2024102321p-zjtj12y-60mg-rcd-jx-pH6.0+3sdsjz-P5-1.lcd		
方法文件名	: RC\$QTL-486 - QTL-486-FX259.lcm		
批处理文件名	: RC\$QTL-486 - 20260106-rc-FX259.lcb		
样品瓶号	: 1-42	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2026/01/06 22:02:07	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2026/01/07 11:33:19		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX259)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 195nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.231	408151	100.000	65081	2931	1.100	--
总计		408151	100.000	65081			

图89 奥利司他胶囊溶出度测定中间条件12月HPLC图谱
 自制品(2024102321批)(60mg规格)-pH6.0(内含3%SDS)介质-极限转速-片5
 供试品溶液-1




QTL-486

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 195nm
数据文件名	: RC\$QTL-486 - 7-74/10-2386-2 - zzp-2024102321p-zjtj12y-60mg-rcd-jx-pH6.0+3sdsjz-P6-1.lcd		
方法文件名	: RC\$QTL-486 - QTL-486-FX259.lcm		
批处理文件名	: RC\$QTL-486 - 20260106-rc-FX259.lcb		
样品瓶号	: 1-51	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2026/01/06 22:05:30	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2026/01/07 11:33:26		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX259)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 195nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.230	402556	100.000	63880	2911	1.103	--
总计		402556	100.000	63880			

图90 奥利司他胶囊溶出度测定中间条件12月HPLC图谱
 自制品(2024102321批)(60mg规格)-pH6.0(内含3%SDS)介质-极限转速-片6
 供试品溶液-1




QTL-486

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 195nm
数据文件名	: RC\$QTL-486 - 7-74/10-2387-2 - zzp-zjtj12y-60mg-red-jx-pH6.0+3sdsjz-dz2-1.lcd		
方法文件名	: RC\$QTL-486 - QTL-486-FX259.lcm		
批处理文件名	: RC\$QTL-486 - 20260106-rc-FX259.lcb		
样品瓶号	: 1-27	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2026/01/06 22:08:54	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2026/01/07 11:33:33		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX259)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 195nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.202	451797	100.000	68755	2623	1.115	--
总计		451797	100.000	68755			

图91 奥利司他胶囊溶出度测定中间条件12月HPLC图谱
自制品(60mg规格)-pH6.0(内含3%SDS)介质-极限转速
对照品溶液-2-1




QTL-486

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 195nm
数据文件名	: RC\$QTL-486 - 7-74/10-2388-2 - zzp-zjtj12y-60mg-red-jx-pH6.0+3sdsjz-dz2-2.lcd		
方法文件名	: RC\$QTL-486 - QTL-486-FX259.lcm		
批处理文件名	: RC\$QTL-486 - 20260106-rc-FX259.lcb		
样品瓶号	: 1-27	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2026/01/06 22:12:17	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2026/01/07 11:33:40		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX259)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 195nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.200	451996	100.000	68656	2607	1.113	--
总计		451996	100.000	68656			

图92 奥利司他胶囊溶出度测定中间条件12月HPLC图谱
自制品(60mg规格)-pH6.0(内含3%SDS)介质-极限转速
对照品溶液-2-2




QTL-486

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 195nm
数据文件名	: RC\$QTL-486 - 7-74/10-2389-2 - zzp-zjtj12y-120mg-rcd-jx-pH6.0+3sdsjz-rj.lcd		
方法文件名	: RC\$QTL-486 - QTL-486-FX259.lcm		
批处理文件名	: RC\$QTL-486 - 20260106-rc-FX259.lcb		
样品瓶号	: 2-9	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2026/01/06 22:15:42	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2026/01/07 11:33:48		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX259)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 195nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图93 奥利司他胶囊溶出度测定中间条件12月HPLC图谱
自制品(120mg规格)-pH6.0(内含3%SDS)介质-极限转速
溶剂




QTL-486

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 195nm
数据文件名	: RC\$QTL-486 - 7-74/10-2390-2 - zzp-zjtj12y-120mg-rcd-jx-pH6.0+3sdsjz-dz1-1.lcd		
方法文件名	: RC\$QTL-486 - QTL-486-FX259.lcm		
批处理文件名	: RC\$QTL-486 - 20260106-rc-FX259.lcb		
样品瓶号	: 2-18	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2026/01/06 22:19:07	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2026/01/07 11:33:55		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX259)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 195nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.203	450957	100.000	68551	2606	1.113	--
总计		450957	100.000	68551			

图94 奥利司他胶囊溶出度测定中间条件12月HPLC图谱
自制品(120mg规格)-pH6.0(内含3%SDS)介质-极限转速
对照品溶液-1-1




QTL-486

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 195nm
数据文件名	: RC\$QTL-486 - 7-74/10-2391-2 - zzp-zjtj12y-120mg-rcd-jx-pH6.0+3sdsjz-dz1-2.lcd		
方法文件名	: RC\$QTL-486 - QTL-486-FX259.lcm		
批处理文件名	: RC\$QTL-486 - 20260106-rc-FX259.lcb		
样品瓶号	: 2-18	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2026/01/06 22:22:32	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2026/01/07 11:34:03		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX259)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 195nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.202	450790	100.000	68454	2599	1.114	--
总计		450790	100.000	68454			

图95 奥利司他胶囊溶出度测定中间条件12月HPLC图谱
自制品(120mg规格)-pH6.0(内含3%SDS)介质-极限转速
对照品溶液-1-2




QTL-486

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 195nm
数据文件名	: RC\$QTL-486 - 7-74/10-2392-2 - zzp-zjtj12y-120mg-rcd-jx-pH6.0+3sdsjz-dz1-3.lcd		
方法文件名	: RC\$QTL-486 - QTL-486-FX259.lcm		
批处理文件名	: RC\$QTL-486 - 20260106-rc-FX259.lcb		
样品瓶号	: 2-18	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2026/01/06 22:25:58	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2026/01/07 11:34:10		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX259)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 195nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.202	450767	100.000	68514	2599	1.114	--
总计		450767	100.000	68514			

图96 奥利司他胶囊溶出度测定中间条件12月HPLC图谱
自制品(120mg规格)-pH6.0(内含3%SDS)介质-极限转速
对照品溶液-1-3




QTL-486

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 195nm
数据文件名	: RC\$QTL-486 - 7-74/10-2393-2 - zzp-zjtj12y-120mg-rcd-jx-pH6.0+3sdsjz-dz1-4.lcd		
方法文件名	: RC\$QTL-486 - QTL-486-FX259.lcm		
批处理文件名	: RC\$QTL-486 - 20260106-rc-FX259.lcb		
样品瓶号	: 2-18	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2026/01/06 22:29:23	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2026/01/07 11:34:18		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX259)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 195nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.203	450930	100.000	68615	2609	1.115	--
总计		450930	100.000	68615			

图97 奥利司他胶囊溶出度测定中间条件12月HPLC图谱
自制品(120mg规格)-pH6.0(内含3%SDS)介质-极限转速
对照品溶液-1-4




QTL-486

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 195nm
数据文件名	: RC\$QTL-486 - 7-74/10-2395-2 - zzp-2024102421p-zjtj12y-120mg-rcd-jx-pH6.0+3sdsjz-P1-1.lcd		
方法文件名	: RC\$QTL-486 - QTL-486-FX259.lcm		
批处理文件名	: RC\$QTL-486 - 20260106-rc-FX259.lcb		
样品瓶号	: 2-4	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2026/01/06 22:36:12	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2026/01/07 11:34:33		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX259)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 195nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.232	421752	100.000	66362	2875	1.114	--
总计		421752	100.000	66362			

图99 奥利司他胶囊溶出度测定中间条件12月HPLC图谱
 自制品(2024102421批)(120mg规格)-pH6.0(内含3%SDS)介质-极限转速-片1
 供试品溶液-1




QTL-486

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 195nm
数据文件名	: RC\$QTL-486 - 7-74/10-2397-2 - zzp-2024102421p-zjtj12y-120mg-rcd-jx-pH6.0+3sdsjz-P3-1.lcd		
方法文件名	: RC\$QTL-486 - QTL-486-FX259.lcm		
批处理文件名	: RC\$QTL-486 - 20260106-rc-FX259.lcb		
样品瓶号	: 2-22	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2026/01/06 22:43:01	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2026/01/07 11:34:48		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX259)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 195nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.231	417310	100.000	65555	2852	1.119	--
总计		417310	100.000	65555			

图101 奥利司他胶囊溶出度测定中间条件12月HPLC图谱
 自制品(2024102421批)(120mg规格)-pH6.0(内含3%SDS)介质-极限转速-片3
 供试品溶液-1




QTL-486

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 195nm
数据文件名	: RC\$QTL-486 - 7-74/10-2398-2 - zzp-2024102421p-zjtj12y-120mg-rcd-jx-pH6.0+3sdsjz-P4-1.lcd		
方法文件名	: RC\$QTL-486 - QTL-486-FX259.lcm		
批处理文件名	: RC\$QTL-486 - 20260106-rc-FX259.lcb		
样品瓶号	: 2-31	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2026/01/06 22:46:25	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2026/01/07 11:34:55		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX259)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 195nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.231	399113	100.000	62666	2856	1.119	--
总计		399113	100.000	62666			

图102 奥利司他胶囊溶出度测定中间条件12月HPLC图谱
 自制品(2024102421批)(120mg规格)-pH6.0(内含3%SDS)介质-极限转速-片4
 供试品溶液-1




QTL-486

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 195nm
数据文件名	: RC\$QTL-486 - 7-74/10-2399-2 - zzp-2024102421p-zjtj12y-120mg-rcd-jx-pH6.0+3sdsjz-P5-1.lcd		
方法文件名	: RC\$QTL-486 - QTL-486-FX259.lcm		
批处理文件名	: RC\$QTL-486 - 20260106-rc-FX259.lcb		
样品瓶号	: 2-40	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2026/01/06 22:49:49	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2026/01/07 11:35:03		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX259)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 195nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.230	417108	100.000	65604	2858	1.118	--
总计		417108	100.000	65604			

图103 奥利司他胶囊溶出度测定中间条件12月HPLC图谱
 自制品(2024102421批)(120mg规格)-pH6.0(内含3%SDS)介质-极限转速-片5
 供试品溶液-1




QTL-486

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 195nm
数据文件名	: RC\$QTL-486 - 7-74/10-2400-2 - zzp-2024102421p-zjtj12y-120mg-rcd-jx-pH6.0+3sdsjz-P6-1.lcd		
方法文件名	: RC\$QTL-486 - QTL-486-FX259.lcm		
批处理文件名	: RC\$QTL-486 - 20260106-rc-FX259.lcb		
样品瓶号	: 2-49	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2026/01/06 22:53:13	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2026/01/07 11:35:10		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX259)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 195nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.228	418362	100.000	65722	2853	1.120	--
总计		418362	100.000	65722			

图104 奥利司他胶囊溶出度测定中间条件12月HPLC图谱
 自制品(2024102421批)(120mg规格)-pH6.0(内含3%SDS)介质-极限转速-片6
 供试品溶液-1




QTL-486

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5µm)	流速	: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 195nm
数据文件名	: RC\$QTL-486 - 7-74/10-2401-2 - zzp-2024102521p-zjtj12y-120mg-rcd-jx-pH6.0+3sdsjz-P1-1.lcd		
方法文件名	: RC\$QTL-486 - QTL-486-FX259.lcm		
批处理文件名	: RC\$QTL-486 - 20260106-rc-FX259.lcb		
样品瓶号	: 2-5	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 µl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2026/01/06 22:56:38	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2026/01/07 11:35:18		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX259)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 195nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.226	424128	100.000	66369	2838	1.118	--
总计		424128	100.000	66369			

图105 奥利司他胶囊溶出度测定中间条件12月HPLC图谱
 自制品(2024102521批)(120mg规格)-pH6.0(内含3%SDS)介质-极限转速-片1
 供试品溶液-1




QTL-486

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 195nm
数据文件名	: RC\$QTL-486 - 7-74/10-2402-2 - zzp-2024102521p-zjtj12y-120mg-rcd-jx-pH6.0+3sdsjz-P2-1.lcd		
方法文件名	: RC\$QTL-486 - QTL-486-FX259.lcm		
批处理文件名	: RC\$QTL-486 - 20260106-rc-FX259.lcb		
样品瓶号	: 2-14	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2026/01/06 23:00:02	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2026/01/07 11:35:25		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX259)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 195nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.227	430975	100.000	67627	2847	1.120	--
总计		430975	100.000	67627			

图106 奥利司他胶囊溶出度测定中间条件12月HPLC图谱
 自制品(2024102521批)(120mg规格)-pH6.0(内含3%SDS)介质-极限转速-片2
 供试品溶液-1




QTL-486

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 195nm
数据文件名	: RC\$QTL-486 - 7-74/10-2403-2 - zzp-2024102521p-zjtj12y-120mg-rcd-jx-pH6.0+3sdsjz-P3-1.lcd		
方法文件名	: RC\$QTL-486 - QTL-486-FX259.lcm		
批处理文件名	: RC\$QTL-486 - 20260106-rc-FX259.lcb		
样品瓶号	: 2-23	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2026/01/06 23:03:27	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2026/01/07 11:35:33		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX259)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 195nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.227	428531	100.000	67276	2844	1.119	--
总计		428531	100.000	67276			

图107 奥利司他胶囊溶出度测定中间条件12月HPLC图谱
 自制品(2024102521批)(120mg规格)-pH6.0(内含3%SDS)介质-极限转速-片3
 供试品溶液-1




QTL-486

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 195nm
数据文件名	: RC\$QTL-486 - 7-74/10-2404-2 - zzp-2024102521p-zjtj12y-120mg-rcd-jx-pH6.0+3sdsjz-P4-1.lcd		
方法文件名	: RC\$QTL-486 - QTL-486-FX259.lcm		
批处理文件名	: RC\$QTL-486 - 20260106-rc-FX259.lcb		
样品瓶号	: 2-32	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2026/01/06 23:06:51	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2026/01/07 11:35:40		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX259)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 195nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.225	433505	100.000	67872	2829	1.119	--
总计		433505	100.000	67872			

图108 奥利司他胶囊溶出度测定中间条件12月HPLC图谱
 自制品(2024102521批)(120mg规格)-pH6.0(内含3%SDS)介质-极限转速-片4
 供试品溶液-1




QTL-486

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 195nm
数据文件名	: RC\$QTL-486 - 7-74/10-2405-2 - zzp-2024102521p-zjtj12y-120mg-rcd-jx-pH6.0+3sdsjz-P5-1.lcd		
方法文件名	: RC\$QTL-486 - QTL-486-FX259.lcm		
批处理文件名	: RC\$QTL-486 - 20260106-rc-FX259.lcb		
样品瓶号	: 2-41	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2026/01/06 23:10:15	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2026/01/07 11:35:47		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX259)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 195nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.224	436475	100.000	68488	2839	1.118	--
总计		436475	100.000	68488			

图109 奥利司他胶囊溶出度测定中间条件12月HPLC图谱
 自制品(2024102521批)(120mg规格)-pH6.0(内含3%SDS)介质-极限转速-片5
 供试品溶液-1




QTL-486

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 195nm
数据文件名	: RC\$QTL-486 - 7-74/10-2406-2 - zzp-2024102521p-zjtj12y-120mg-rcd-jx-pH6.0+3sdsjz-P6-1.lcd		
方法文件名	: RC\$QTL-486 - QTL-486-FX259.lcm		
批处理文件名	: RC\$QTL-486 - 20260106-rc-FX259.lcb		
样品瓶号	: 2-50	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2026/01/06 23:13:39	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2026/01/07 11:35:55		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX259)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 195nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.223	438198	100.000	68793	2822	1.121	--
总计		438198	100.000	68793			

图110 奥利司他胶囊溶出度测定中间条件12月HPLC图谱
 自制品(2024102521批)(120mg规格)-pH6.0(内含3%SDS)介质-极限转速-片6
 供试品溶液-1




QTL-486

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 195nm
数据文件名	: RC\$QTL-486 - 7-74/10-2407-2 - zzp-2024102621p-zjtj12y-120mg-rcd-jx-pH6.0+3sdsjz-P1-1.lcd		
方法文件名	: RC\$QTL-486 - QTL-486-FX259.lcm		
批处理文件名	: RC\$QTL-486 - 20260106-rc-FX259.lcb		
样品瓶号	: 2-6	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2026/01/06 23:17:04	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2026/01/07 11:36:02		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX259)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 195nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.223	427351	100.000	67069	2826	1.120	--
总计		427351	100.000	67069			

图111 奥利司他胶囊溶出度测定中间条件12月HPLC图谱
 自制品(2024102621批)(120mg规格)-pH6.0(内含3%SDS)介质-极限转速-片1
 供试品溶液-1




QTL-486

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 195nm
数据文件名	: RC\$QTL-486 - 7-74/10-2408-2 - zzp-2024102621p-zjtj12y-120mg-rcd-jx-pH6.0+3sdsjz-P2-1.lcd		
方法文件名	: RC\$QTL-486 - QTL-486-FX259.lcm		
批处理文件名	: RC\$QTL-486 - 20260106-rc-FX259.lcb		
样品瓶号	: 2-15	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2026/01/06 23:20:29	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2026/01/07 11:36:09		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX259)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 195nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.222	432918	100.000	68029	2829	1.122	--
总计		432918	100.000	68029			

图112 奥利司他胶囊溶出度测定中间条件12月HPLC图谱
 自制品(2024102621批)(120mg规格)-pH6.0(内含3%SDS)介质-极限转速-片2
 供试品溶液-1




QTL-486

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5µm)	流速	: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 195nm
数据文件名	: RC\$QTL-486 - 7-74/10-2409-2 - zzp-2024102621p-zjtj12y-120mg-rcd-jx-pH6.0+3sdsjz-P3-1.lcd		
方法文件名	: RC\$QTL-486 - QTL-486-FX259.lcm		
批处理文件名	: RC\$QTL-486 - 20260106-rc-FX259.lcb		
样品瓶号	: 2-24	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 µl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2026/01/06 23:23:54	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2026/01/07 11:36:17		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX259)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 195nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.221	424189	100.000	66635	2820	1.124	--
总计		424189	100.000	66635			

图113 奥利司他胶囊溶出度测定中间条件12月HPLC图谱
 自制品(2024102621批)(120mg规格)-pH6.0(内含3%SDS)介质-极限转速-片3
 供试品溶液-1




QTL-486

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 195nm
数据文件名	: RC\$QTL-486 - 7-74/10-2410-2 - zzp-2024102621p-zjtj12y-120mg-rcd-jx-pH6.0+3sdsjz-P4-1.lcd		
方法文件名	: RC\$QTL-486 - QTL-486-FX259.lcm		
批处理文件名	: RC\$QTL-486 - 20260106-rc-FX259.lcb		
样品瓶号	: 2-33	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2026/01/06 23:27:18	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2026/01/07 11:36:24		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX259)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 195nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.221	425855	100.000	66889	2826	1.124	--
总计		425855	100.000	66889			

图114 奥利司他胶囊溶出度测定中间条件12月HPLC图谱
 自制品(2024102621批)(120mg规格)-pH6.0(内含3%SDS)介质-极限转速-片4
 供试品溶液-1




QTL-486

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 195nm
数据文件名	: RC\$QTL-486 - 7-74/10-2412-2 - zzp-2024102621p-zjtj12y-120mg-rcd-jx-pH6.0+3sdsjz-P6-1.lcd		
方法文件名	: RC\$QTL-486 - QTL-486-FX259.lcm		
批处理文件名	: RC\$QTL-486 - 20260106-rc-FX259.lcb		
样品瓶号	: 2-51	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2026/01/06 23:34:07	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2026/01/07 11:36:39		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX259)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 195nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.221	412632	100.000	64789	2825	1.126	--
总计		412632	100.000	64789			

图116 奥利司他胶囊溶出度测定中间条件12月HPLC图谱
 自制品(2024102621批)(120mg规格)-pH6.0(内含3%SDS)介质-极限转速-片6
 供试品溶液-1




QTL-486

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 195nm
数据文件名	: RC\$QTL-486 - 7-74/10-2413-2 - zzp-zjtj12y-120mg-rcd-jx-pH6.0+3sdsjz-dz2-1.lcd		
方法文件名	: RC\$QTL-486 - QTL-486-FX259.lcm		
批处理文件名	: RC\$QTL-486 - 20260106-rc-FX259.lcb		
样品瓶号	: 2-27	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2026/01/06 23:37:33	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2026/01/07 11:36:47		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX259)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 195nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.192	451468	100.000	67433	2499	1.132	--
总计		451468	100.000	67433			

图117 奥利司他胶囊溶出度测定中间条件12月HPLC图谱
自制品(120mg规格)-pH6.0(内含3%SDS)介质-极限转速
对照品溶液-2-1




QTL-486

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 195nm
数据文件名	: RC\$QTL-486 - 7-74/10-2414-2 - zzp-zjtj12y-120mg-rcd-jx-pH6.0+3sdsjz-dz2-2.lcd		
方法文件名	: RC\$QTL-486 - QTL-486-FX259.lcm		
批处理文件名	: RC\$QTL-486 - 20260106-rc-FX259.lcb		
样品瓶号	: 2-27	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2026/01/06 23:40:57	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2026/01/07 11:36:54		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX259)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 195nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.190	451948	100.000	67542	2490	1.132	--
总计		451948	100.000	67542			

图118 奥利司他胶囊溶出度测定中间条件12月HPLC图谱
自制品(120mg规格)-pH6.0(内含3%SDS)介质-极限转速
对照品溶液-2-2