


〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(100*4.6mm,5 μ m) 流速:2.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:250nm
数据文件名: RCSSXT-396 - 31-29/31-1405-2 - zzp-2025020421p-rcqx-jf75z-pH6.8+0.5tw20jz-rj.lcd
方法文件名: RCSSXT-396 - SXT-396-RCQX-FX280-低温.lcm
批处理文件名: RCSSXT-396 - 20260112-FX280.lcb
样品瓶号: 1-9
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2026/01/12 12:52:01 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2026/01/13 08:12:09 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 250nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|------|----|-----|----|------------|------|----------|
| 总计 | | | | | | | |




SXT-396

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(100*4.6mm,5μm) 流速:2.5ml/min
 柱温:30°C 波长:250nm
 数据文件名: RCSSXT-396 - 31-29/31-1406-2 - zzp-2025020421p-rcqx-jf75z-pH6.8+0.5tw20jz-dz1-1.lcd
 方法文件名: RCSSXT-396 - SXT-396-RCQX-FX280-低温.lcm
 批处理文件名: RCSSXT-396 - 20260112-FX280.lcb
 样品瓶号: 1-18
 进样体积: 10μl 版本号:6.115
 进样时间: 2026/01/12 12:55:53 实验者: xiexinhui
 处理时间 (V2): 2026/01/13 08:12:13 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 250nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 3.132 | 1639858 | 100.000 | 239370 | 4878 | 1.048 | -- |
| 总计 | | 1639858 | 100.000 | 239370 | | | |




SXT-396

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(100*4.6mm,5μm) 流速:2.5ml/min
 柱温:30°C 波长:250nm
 数据文件名: RCSSXT-396 - 31-29/31-1416-2 - zzp-2025020421p-rcqx-jf75z-pH6.8+0.5tw20jz-5min-P6.lcd
 方法文件名: RCSSXT-396 - SXT-396-RCQX-FX280-低温.lcm
 批处理文件名: RCSSXT-396 - 20260112-FX280.lcb
 样品瓶号: 1-46
 进样体积: 10μl 版本号:6.115
 进样时间: 2026/01/12 13:34:36 实验者: xiexinhui
 处理时间 (V2): 2026/01/13 08:12:41 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 250nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 3.017 | 1484299 | 100.000 | 222475 | 4825 | 1.059 | -- |
| 总计 | | 1484299 | 100.000 | 222475 | | | |




SXT-396

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(100*4.6mm,5μm) 流速:2.5ml/min
 柱温:30°C 波长:250nm
 数据文件名: RCSSXT-396 - 31-29/31-1441-2 - zzp-2025020421p-rcqx-jf75z-pH6.8+0.5tw20jz-jxzs-P1.lcd
 方法文件名: RCSSXT-396 - SXT-396-RCQX-FX280-低温.lcm
 批处理文件名: RCSSXT-396 - 20260112-FX280.lcb
 样品瓶号: 1-6
 进样体积: 10μl 版本号:6.115
 进样时间: 2026/01/12 15:11:14 实验者: xiexinhui
 处理时间 (V2): 2026/01/13 08:13:47 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 250nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 3.028 | 1525479 | 100.000 | 224199 | 4631 | 1.029 | -- |
| 总计 | | 1525479 | 100.000 | 224199 | | | |




SXT-396

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(100*4.6mm,5μm) 流速:2.5ml/min
 柱温:30°C 波长:250nm
 数据文件名: RCSSXT-396 - 31-29/31-1453-2 - zzp-2025020421p-rcqx-jf75z-ajl-pH6.8+0.5tw20jz-dz1-4.lcd
 方法文件名: RCSSXT-396 - SXT-396-RCQX-FX280-低温.lcm
 批处理文件名: RCSSXT-396 - 20260112-FX280.lcb
 样品瓶号: 2-18
 进样体积: 10μl 版本号:6.115
 进样时间: 2026/01/12 16:07:01 实验者: xiexinhui
 处理时间 (V2) : 2026/01/13 08:14:18 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 250nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 3.033 | 1698563 | 100.000 | 237651 | 4204 | 1.019 | -- |
| 总计 | | 1698563 | 100.000 | 237651 | | | |




SXT-396

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(100*4.6mm,5μm) 流速:2.5ml/min
 柱温:30°C 波长:250nm
 数据文件名: RCSSXT-396 - 31-29/31-1456-2 - zzp-2025020421p-rcqx-jf75z-ajl-pH6.8+0.5tw20jz-5min-P2.lcd
 方法文件名: RCSSXT-396 - SXT-396-RCQX-FX280-低温.lcm
 批处理文件名: RCSSXT-396 - 20260112-FX280.lcb
 样品瓶号: 2-10
 进样体积: 10μl 版本号:6.115
 进样时间: 2026/01/12 16:18:43 实验者: xiexinhui
 处理时间 (V2) : 2026/01/13 08:14:26 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 250nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 3.025 | 1504543 | 100.000 | 214282 | 4363 | 1.026 | -- |
| 总计 | | 1504543 | 100.000 | 214282 | | | |




SXT-396

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(100*4.6mm,5μm) 流速:2.5ml/min
 柱温:30°C 波长:250nm
 数据文件名: RCSSXT-396 - 31-29/31-1478-2 - zzp-2025020421p-rcqx-jf75z-ajl-pH6.8+0.5tw20jz-20min-P6.lcd
 方法文件名: RCSSXT-396 - SXT-396-RCQX-FX280-低温.lcm
 批处理文件名: RCSSXT-396 - 20260112-FX280.lcb
 样品瓶号: 2-49
 进样体积: 10μl 版本号:6.115
 进样时间: 2026/01/12 17:44:09 实验者: xiexinhui
 处理时间 (V2): 2026/01/13 08:15:23 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 250nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 3.034 | 1565960 | 100.000 | 220684 | 4277 | 1.016 | -- |
| 总计 | | 1565960 | 100.000 | 220684 | | | |




SXT-396

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(100*4.6mm,5μm) 流速:2.5ml/min
 柱温:30°C 波长:250nm
 数据文件名: RCSSXT-396 - 31-29/31-1498-2 - zzp-2025020421p-rcqx-jf50z-pH6.8+0.5tw20jz-dz1-5.lcd
 方法文件名: RCSSXT-396 - SXT-396-RCQX-FX280-低温.lcm
 批处理文件名: RCSSXT-396 - 20260112-FX280.lcb
 样品瓶号: 3-18
 进样体积: 10μl 版本号:6.115
 进样时间: 2026/01/12 19:01:51 实验者: xiexinhui
 处理时间 (V2) : 2026/01/13 08:16:13 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 250nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 3.020 | 1657443 | 100.000 | 224981 | 3886 | 1.014 | -- |
| 总计 | | 1657443 | 100.000 | 224981 | | | |

