




SZJ-4055

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm, 5 μm) 流速: 1.8ml/min
 柱温: 30°C 波长: 290nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4055 - 0-39/28-1055-2 - cbzj -C090402p-rcqx-1-pH4.5jz-jf50z-rj.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4055 - SZJ-4055-rc-FX277.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4055 - 20260116-FX277.lcb
 样品瓶号: 1-9
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2026/01/16 17:48:16 实验者: wangdan
 处理时间(V2): 2026/01/19 14:08:22 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 290nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图1 枸橼酸西地那非口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-C090402批-pH4.5介质-桨法-50转
溶剂

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm, 5 μm) 流速: 1.8ml/min
 柱温: 30°C 波长: 290nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4055 - 0-39/28-1056-2 - cbzj -C090402p-rcqx-1-pH4.5jz-jf50z-dz1-1.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4055 - SZJ-4055-rc-FX277.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4055 - 20260116-FX277.lcb
 样品瓶号: 1-18
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2026/01/16 17:52:09 实验者: wangdan
 处理时间(V2): 2026/01/19 14:08:27 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 290nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.865	486368	100.000	53731	2323	1.068	--
总计		486368	100.000	53731			


图2 枸橼酸西地那非口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-C090402批-pH4.5介质-桨法-50转
对照品溶液-1-1

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm, 5 μm) 流速: 1.8ml/min
 柱温: 30°C 波长: 290nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4055 - 0-39/28-1057-2 - cbzj -C090402p-rcqx-1-pH4.5jz-jf50z-dz1-2.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4055 - SZJ-4055-rc-FX277.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4055 - 20260116-FX277.lcb
 样品瓶号: 1-18
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2026/01/16 17:56:03 实验者: wangdan
 处理时间 (V2): 2026/01/19 14:08:30 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 290nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.863	485969	100.000	53841	2330	1.068	--
总计		485969	100.000	53841			

图3 枸橼酸西地那非口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-C090402批-pH4.5介质-桨法-50转
对照品溶液-1-2

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm, 5 μm) 流速: 1.8ml/min
 柱温: 30°C 波长: 290nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4055 - 0-39/28-1058-2 - cbzj -C090402p-rcqx-1-pH4.5jz-jf50z-dz1-3.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4055 - SZJ-4055-rc-FX277.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4055 - 20260116-FX277.lcb
 样品瓶号: 1-18
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2026/01/16 17:59:57 实验者: wangdan
 处理时间(V2): 2026/01/19 14:08:33 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 290nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.862	486939	100.000	53903	2324	1.068	--
总计		486939	100.000	53903			


图4 枸橼酸西地那非口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-C090402批-pH4.5介质-桨法-50转
对照品溶液-1-3

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm, 5 μm) 流速: 1.8ml/min
 柱温: 30°C 波长: 290nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4055 - 0-39/28-1059-2 - cbzj -C090402p-rcqx-1-pH4.5jz-jf50z-dz1-4.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4055 - SZJ-4055-rc-FX277.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4055 - 20260116-FX277.lcb
 样品瓶号: 1-18
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2026/01/16 18:03:50 实验者: wangdan
 处理时间(V2): 2026/01/19 14:08:36 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 290nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.861	486377	100.000	53832	2326	1.069	--
总计		486377	100.000	53832			

图5 枸橼酸西地那非口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-C090402批-pH4.5介质-桨法-50转
对照品溶液-1-4

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm, 5 μm) 流速: 1.8ml/min
 柱温: 30°C 波长: 290nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4055 - 0-39/28-1060-2 - cbzj -C090402p-rcqx-1-pH4.5jz-jf50z-dz1-5.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4055 - SZJ-4055-rc-FX277.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4055 - 20260116-FX277.lcb
 样品瓶号: 1-18
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2026/01/16 18:11:00 实验者: wangdan
 处理时间 (V2): 2026/01/19 14:08:38 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 290nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.857	486103	100.000	53904	2324	1.069	--
总计		486103	100.000	53904			

图6 枸橼酸西地那非口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-C090402批-pH4.5介质-桨法-50转
对照品溶液-1-5

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm, 5 μm) 流速: 1.8ml/min
 柱温: 30°C 波长: 290nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4055 - 0-39/28-1061-2 - cbzj -C090402p-rcqx-1-pH4.5jz-jf50z-P1-2min.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4055 - SZJ-4055-rc-FX277.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4055 - 20260116-FX277.lcb
 样品瓶号: 1-1
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2026/01/16 18:14:52 实验者: wangdan
 处理时间(V2): 2026/01/19 14:08:41 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 290nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.877	194063	100.000	22050	2483	1.047	--
总计		194063	100.000	22050			

图7 枸橼酸西地那非口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
 参比制剂-C090402批-pH4.5介质-桨法-50转-2min-片1
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm, 5 μm) 流速: 1.8ml/min
 柱温: 30°C 波长: 290nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4055 - 0-39/28-1062-2 - cbzj -C090402p-rcqx-1-pH4.5jz-jf50z-P2-2min.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4055 - SZJ-4055-rc-FX277.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4055 - 20260116-FX277.lcb
 样品瓶号: 1-10
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2026/01/16 18:18:45 实验者: wangdan
 处理时间(V2): 2026/01/19 14:08:44 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 290nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.875	198062	100.000	22527	2491	1.051	--
总计		198062	100.000	22527			

图8 枸橼酸西地那非口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
 参比制剂-C090402批-pH4.5介质-桨法-50转-2min-片2
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm, 5 μm) 流速: 1.8ml/min
 柱温: 30°C 波长: 290nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4055 - 0-39/28-1063-2 - cbzj -C090402p-rcqx-1-pH4.5jz-jf50z-P3-2min.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4055 - SZJ-4055-rc-FX277.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4055 - 20260116-FX277.lcb
 样品瓶号: 1-19
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2026/01/16 18:22:37 实验者: wangdan
 处理时间(V2): 2026/01/19 14:08:47 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 290nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.874	214519	100.000	24488	2481	1.048	--
总计		214519	100.000	24488			

图9 枸橼酸西地那非口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
 参比制剂-C090402批-pH4.5介质-浆法-50转-2min-片3
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm, 5 μm) 流速: 1.8ml/min
 柱温: 30°C 波长: 290nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4055 - 0-39/28-1064-2 - cbzj -C090402p-rcqx-1-pH4.5jz-jf50z-P4-2min.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4055 - SZJ-4055-rc-FX277.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4055 - 20260116-FX277.lcb
 样品瓶号: 1-28
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2026/01/16 18:26:29 实验者: wangdan
 处理时间 (V2): 2026/01/19 14:08:50 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 290nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.871	373288	100.000	42529	2485	1.060	--
总计		373288	100.000	42529			

图10 枸橼酸西地那非口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
 参比制剂-C090402批-pH4.5介质-桨法-50转-2min-片4
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm, 5 μm) 流速: 1.8ml/min
 柱温: 30°C 波长: 290nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4055 - 0-39/28-1065-2 - cbzj -C090402p-rcqx-1-pH4.5jz-jf50z-P5-2min.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4055 - SZJ-4055-rc-FX277.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4055 - 20260116-FX277.lcb
 样品瓶号: 1-37
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2026/01/16 18:30:21 实验者: wangdan
 处理时间 (V2): 2026/01/19 14:08:53 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 290nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.872	198213	100.000	22581	2490	1.049	--
总计		198213	100.000	22581			


图11 枸橼酸西地那非口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
 参比制剂-C090402批-pH4.5介质-浆法-50转-2min-片5
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm, 5 μm) 流速: 1.8ml/min
 柱温: 30°C 波长: 290nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4055 - 0-39/28-1066-2 - cbzj -C090402p-rcqx-1-pH4.5jz-jf50z-P6-2min.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4055 - SZJ-4055-rc-FX277.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4055 - 20260116-FX277.lcb
 样品瓶号: 1-46
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2026/01/16 18:34:13 实验者: wangdan
 处理时间(V2): 2026/01/19 14:08:55 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 290nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.870	286296	100.000	32560	2473	1.054	--
总计		286296	100.000	32560			

图12 枸橼酸西地那非口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
 参比制剂-C090402批-pH4.5介质-桨法-50转-2min-片6
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm, 5 μm) 流速: 1.8ml/min
 柱温: 30°C 波长: 290nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4055 - 0-39/28-1067-2 - cbzj -C090402p-rcqx-1-pH4.5jz-jf50z-P1-5min.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4055 - SZJ-4055-rc-FX277.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4055 - 20260116-FX277.lcb
 样品瓶号: 1-2
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2026/01/16 18:38:06 实验者: wangdan
 处理时间(V2): 2026/01/19 14:08:58 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 290nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.865	507680	100.000	57741	2471	1.068	--
总计		507680	100.000	57741			


图13 枸橼酸西地那非口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
 参比制剂-C090402批-pH4.5介质-桨法-50转-5min-片1
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm, 5 μm) 流速: 1.8ml/min
 柱温: 30°C 波长: 290nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4055 - 0-39/28-1068-2 - cbzj -C090402p-rcqx-1-pH4.5jz-jf50z-P2-5min.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4055 - SZJ-4055-rc-FX277.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4055 - 20260116-FX277.lcb
 样品瓶号: 1-11
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2026/01/16 18:41:58 实验者: wangdan
 处理时间 (V2): 2026/01/19 14:09:01 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 290nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.863	492419	100.000	56112	2472	1.067	--
总计		492419	100.000	56112			


图14 枸橼酸西地那非口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
 参比制剂-C090402批-pH4.5介质-桨法-50转-5min-片2
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm, 5 μm) 流速: 1.8ml/min
 柱温: 30°C 波长: 290nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4055 - 0-39/28-1069-2 - cbzj -C090402p-rcqx-1-pH4.5jz-jf50z-P3-5min.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4055 - SZJ-4055-rc-FX277.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4055 - 20260116-FX277.lcb
 样品瓶号: 1-20
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2026/01/16 18:45:51 实验者: wangdan
 处理时间 (V2): 2026/01/19 14:09:04 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 290nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.862	490765	100.000	55878	2469	1.067	--
总计		490765	100.000	55878			


图15 枸橼酸西地那非口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
 参比制剂-C090402批-pH4.5介质-桨法-50转-5min-片3
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm, 5 μm) 流速: 1.8ml/min
 柱温: 30°C 波长: 290nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4055 - 0-39/28-1070-2 - cbzj -C090402p-rcqx-1-pH4.5jz-jf50z-P4-5min.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4055 - SZJ-4055-rc-FX277.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4055 - 20260116-FX277.lcb
 样品瓶号: 1-29
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2026/01/16 18:49:44 实验者: wangdan
 处理时间 (V2): 2026/01/19 14:09:06 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 290nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.861	489343	100.000	55728	2468	1.067	--
总计		489343	100.000	55728			

图16 枸橼酸西地那非口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
 参比制剂-C090402批-pH4.5介质-桨法-50转-5min-片4
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm, 5 μm) 流速: 1.8ml/min
 柱温: 30°C 波长: 290nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4055 - 0-39/28-1071-2 - cbzj -C090402p-rcqx-1-pH4.5jz-jf50z-P5-5min.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4055 - SZJ-4055-rc-FX277.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4055 - 20260116-FX277.lcb
 样品瓶号: 1-38
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2026/01/16 18:53:36 实验者: wangdan
 处理时间 (V2): 2026/01/19 14:09:09 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 290nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.860	504528	100.000	57453	2468	1.070	--
总计		504528	100.000	57453			


图17 枸橼酸西地那非口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
 参比制剂-C090402批-pH4.5介质-桨法-50转-5min-片5
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm, 5 μm) 流速: 1.8ml/min
 柱温: 30°C 波长: 290nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4055 - 0-39/28-1072-2 - cbzj -C090402p-rcqx-1-pH4.5jz-jf50z-P6-5min.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4055 - SZJ-4055-rc-FX277.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4055 - 20260116-FX277.lcb
 样品瓶号: 1-47
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2026/01/16 18:57:28 实验者: wangdan
 处理时间(V2): 2026/01/19 14:09:12 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 290nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.859	491289	100.000	55846	2470	1.068	--
总计		491289	100.000	55846			


图18 枸橼酸西地那非口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
 参比制剂-C090402批-pH4.5介质-桨法-50转-5min-片6
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm, 5 μm) 流速: 1.8ml/min
 柱温: 30°C 波长: 290nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4055 - 0-39/28-1073-2 - cbzj -C090402p-rcqx-1-pH4.5jz-jf50z-P1-10min.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4055 - SZJ-4055-rc-FX277.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4055 - 20260116-FX277.lcb
 样品瓶号: 1-3
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2026/01/16 19:01:20 实验者: wangdan
 处理时间 (V2): 2026/01/19 14:09:15 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 290nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.861	529601	100.000	60217	2462	1.070	--
总计		529601	100.000	60217			

图19 枸橼酸西地那非口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-C090402批-pH4.5介质-桨法-50转-10min-片1
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm, 5 μm) 流速: 1.8ml/min
 柱温: 30°C 波长: 290nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4055 - 0-39/28-1074-2 - cbzj -C090402p-rcqx-1-pH4.5jz-jf50z-P2-10min.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4055 - SZJ-4055-rc-FX277.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4055 - 20260116-FX277.lcb
 样品瓶号: 1-12
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2026/01/16 19:05:12 实验者: wangdan
 处理时间 (V2): 2026/01/19 14:09:17 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 290nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.860	525818	100.000	59772	2466	1.071	--
总计		525818	100.000	59772			


图20 枸橼酸西地那非口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-C090402批-pH4.5介质-桨法-50转-10min-片2
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm, 5 μm) 流速: 1.8ml/min
 柱温: 30°C 波长: 290nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4055 - 0-39/28-1075-2 - cbzj -C090402p-rcqx-1-pH4.5jz-jf50z-P3-10min.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4055 - SZJ-4055-rc-FX277.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4055 - 20260116-FX277.lcb
 样品瓶号: 1-21
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2026/01/16 19:09:04 实验者: wangdan
 处理时间 (V2): 2026/01/19 14:09:20 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 290nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.858	532815	100.000	60624	2463	1.070	--
总计		532815	100.000	60624			

图21 枸橼酸西地那非口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-C090402批-pH4.5介质-桨法-50转-10min-片3
供试品溶液-1




SZJ-4055

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm, 5 μm) 流速: 1.8ml/min
 柱温: 30°C 波长: 290nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4055 - 0-39/28-1076-2 - cbzj -C090402p-rcqx-1-pH4.5jz-jf50z-P4-10min.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4055 - SZJ-4055-rc-FX277.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4055 - 20260116-FX277.lcb
 样品瓶号: 1-30
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2026/01/16 19:12:56 实验者: wangdan
 处理时间 (V2): 2026/01/19 14:09:23 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 290nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.858	502360	100.000	57317	2468	1.069	--
总计		502360	100.000	57317			


图22 枸橼酸西地那非口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
 参比制剂-C090402批-pH4.5介质-桨法-50转-10min-片4
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm, 5 μm) 流速: 1.8ml/min
 柱温: 30°C 波长: 290nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4055 - 0-39/28-1077-2 - cbzj -C090402p-rcqx-1-pH4.5jz-jf50z-P5-10min.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4055 - SZJ-4055-rc-FX277.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4055 - 20260116-FX277.lcb
 样品瓶号: 1-39
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2026/01/16 19:16:48 实验者: wangdan
 处理时间 (V2): 2026/01/19 14:09:26 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 290nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.857	533765	100.000	60793	2467	1.071	--
总计		533765	100.000	60793			


图23 枸橼酸西地那非口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
 参比制剂-C090402批-pH4.5介质-桨法-50转-10min-片5
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm, 5 μm) 流速: 1.8ml/min
 柱温: 30°C 波长: 290nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4055 - 0-39/28-1078-2 - cbzj -C090402p-rcqx-1-pH4.5jz-jf50z-P6-10min.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4055 - SZJ-4055-rc-FX277.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4055 - 20260116-FX277.lcb
 样品瓶号: 1-48
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2026/01/16 19:20:40 实验者: wangdan
 处理时间 (V2): 2026/01/19 14:09:28 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 290nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.861	514501	100.000	58600	2471	1.070	--
总计		514501	100.000	58600			


图24 枸橼酸西地那非口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-C090402批-pH4.5介质-桨法-50转-10min-片6
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm, 5 μm) 流速: 1.8ml/min
 柱温: 30°C 波长: 290nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4055 - 0-39/28-1079-2 - cbzj -C090402p-rcqx-1-pH4.5jz-jf50z-P1-15min.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4055 - SZJ-4055-rc-FX277.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4055 - 20260116-FX277.lcb
 样品瓶号: 1-4
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2026/01/16 19:24:32 实验者: wangdan
 处理时间(V2): 2026/01/19 14:09:31 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 290nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.856	528875	100.000	60273	2466	1.071	--
总计		528875	100.000	60273			


图25 枸橼酸西地那非口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-C090402批-pH4.5介质-桨法-50转-15min-片1
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm, 5 μm) 流速: 1.8ml/min
 柱温: 30°C 波长: 290nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4055 - 0-39/28-1080-2 - cbzj -C090402p-rcqx-1-pH4.5jz-jf50z-P2-15min.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4055 - SZJ-4055-rc-FX277.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4055 - 20260116-FX277.lcb
 样品瓶号: 1-13
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2026/01/16 19:28:24 实验者: wangdan
 处理时间(V2): 2026/01/19 14:09:34 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 290nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.857	526983	100.000	60013	2462	1.071	--
总计		526983	100.000	60013			


图26 枸橼酸西地那非口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
 参比制剂-C090402批-pH4.5介质-桨法-50转-15min-片2
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm, 5 μm) 流速: 1.8ml/min
 柱温: 30°C 波长: 290nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4055 - 0-39/28-1081-2 - cbzj -C090402p-rcqx-1-pH4.5jz-jf50z-P3-15min.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4055 - SZJ-4055-rc-FX277.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4055 - 20260116-FX277.lcb
 样品瓶号: 1-22
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2026/01/16 19:32:17 实验者: wangdan
 处理时间 (V2): 2026/01/19 14:09:37 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 290nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.855	535597	100.000	61127	2464	1.071	--
总计		535597	100.000	61127			


图27 枸橼酸西地那非口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-C090402批-pH4.5介质-桨法-50转-15min-片3
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm, 5 μm) 流速: 1.8ml/min
 柱温: 30°C 波长: 290nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4055 - 0-39/28-1082-2 - cbzj -C090402p-rcqx-1-pH4.5jz-jf50z-P4-15min.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4055 - SZJ-4055-rc-FX277.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4055 - 20260116-FX277.lcb
 样品瓶号: 1-31
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2026/01/16 19:36:10 实验者: wangdan
 处理时间 (V2): 2026/01/19 14:09:40 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 290nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.856	496793	100.000	56683	2467	1.068	--
总计		496793	100.000	56683			


图28 枸橼酸西地那非口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-C090402批-pH4.5介质-桨法-50转-15min-片4
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm, 5 μm) 流速: 1.8ml/min
 柱温: 30°C 波长: 290nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4055 - 0-39/28-1083-2 - cbzj -C090402p-rcqx-1-pH4.5jz-jf50z-P5-15min.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4055 - SZJ-4055-rc-FX277.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4055 - 20260116-FX277.lcb
 样品瓶号: 1-40
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2026/01/16 19:40:02 实验者: wangdan
 处理时间 (V2): 2026/01/19 14:09:43 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 290nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.855	535348	100.000	61056	2461	1.071	--
总计		535348	100.000	61056			


图29 枸橼酸西地那非口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-C090402批-pH4.5介质-桨法-50转-15min-片5
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm, 5 μm) 流速: 1.8ml/min
 柱温: 30°C 波长: 290nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4055 - 0-39/28-1084-2 - cbzj -C090402p-rcqx-1-pH4.5jz-jf50z-P6-15min.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4055 - SZJ-4055-rc-FX277.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4055 - 20260116-FX277.lcb
 样品瓶号: 1-49
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2026/01/16 19:43:55 实验者: wangdan
 处理时间 (V2): 2026/01/19 14:09:46 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 290nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.855	509340	100.000	58093	2461	1.070	--
总计		509340	100.000	58093			


图30 枸橼酸西地那非口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
 参比制剂-C090402批-pH4.5介质-桨法-50转-15min-片6
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm, 5 μm) 流速: 1.8ml/min
 柱温: 30°C 波长: 290nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4055 - 0-39/28-1085-2 - cbzj -C090402p-rcqx-1-pH4.5jz-jf50z-P1-20min.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4055 - SZJ-4055-rc-FX277.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4055 - 20260116-FX277.lcb
 样品瓶号: 1-5
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2026/01/16 19:47:48 实验者: wangdan
 处理时间 (V2): 2026/01/19 14:09:49 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 290nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.855	529248	100.000	60322	2458	1.070	--
总计		529248	100.000	60322			


图31 枸橼酸西地那非口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
 参比制剂-C090402批-pH4.5介质-桨法-50转-20min-片1
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm, 5 μm) 流速: 1.8ml/min
 柱温: 30°C 波长: 290nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4055 - 0-39/28-1086-2 - cbzj -C090402p-rcqx-1-pH4.5jz-jf50z-P2-20min.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4055 - SZJ-4055-rc-FX277.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4055 - 20260116-FX277.lcb
 样品瓶号: 1-14
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2026/01/16 19:51:40 实验者: wangdan
 处理时间 (V2): 2026/01/19 14:09:51 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 290nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.855	525267	100.000	59924	2469	1.071	--
总计		525267	100.000	59924			


图32 枸橼酸西地那非口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-C090402批-pH4.5介质-桨法-50转-20min-片2
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm, 5 μm) 流速: 1.8ml/min
 柱温: 30°C 波长: 290nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4055 - 0-39/28-1087-2 - cbzj -C090402p-rcqx-1-pH4.5jz-jf50z-P3-20min.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4055 - SZJ-4055-rc-FX277.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4055 - 20260116-FX277.lcb
 样品瓶号: 1-23
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2026/01/16 19:55:32 实验者: wangdan
 处理时间(V2): 2026/01/19 14:09:54 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 290nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.855	535650	100.000	61093	2464	1.071	--
总计		535650	100.000	61093			

图33 枸橼酸西地那非口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
 参比制剂-C090402批-pH4.5介质-桨法-50转-20min-片3
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm, 5 μm) 流速: 1.8ml/min
 柱温: 30°C 波长: 290nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4055 - 0-39/28-1088-2 - cbzj -C090402p-rcqx-1-pH4.5jz-jf50z-P4-20min.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4055 - SZJ-4055-rc-FX277.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4055 - 20260116-FX277.lcb
 样品瓶号: 1-32
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2026/01/16 19:59:24 实验者: wangdan
 处理时间(V2): 2026/01/19 14:09:57 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 290nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.856	503549	100.000	57506	2467	1.070	--
总计		503549	100.000	57506			

图34 枸橼酸西地那非口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
 参比制剂-C090402批-pH4.5介质-桨法-50转-20min-片4
 供试品溶液-1




SZJ-4055

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm, 5 μm) 流速: 1.8ml/min
 柱温: 30°C 波长: 290nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4055 - 0-39/28-1089-2 - cbzj -C090402p-rcqx-1-pH4.5jz-jf50z-P5-20min.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4055 - SZJ-4055-rc-FX277.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4055 - 20260116-FX277.lcb
 样品瓶号: 1-41
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2026/01/16 20:03:16 实验者: wangdan
 处理时间(V2): 2026/01/19 14:10:00 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 290nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.855	534109	100.000	60971	2465	1.072	--
总计		534109	100.000	60971			


图35 枸橼酸西地那非口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
 参比制剂-C090402批-pH4.5介质-桨法-50转-20min-片5
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm, 5 μm) 流速: 1.8ml/min
 柱温: 30°C 波长: 290nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4055 - 0-39/28-1090-2 - cbzj -C090402p-rcqx-1-pH4.5jz-jf50z-P6-20min.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4055 - SZJ-4055-rc-FX277.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4055 - 20260116-FX277.lcb
 样品瓶号: 1-50
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2026/01/16 20:07:08 实验者: wangdan
 处理时间 (V2): 2026/01/19 14:10:03 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 290nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.857	512533	100.000	58356	2463	1.069	--
总计		512533	100.000	58356			


图36 枸橼酸西地那非口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
 参比制剂-C090402批-pH4.5介质-桨法-50转-20min-片6
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm, 5 μm) 流速: 1.8ml/min
 柱温: 30°C 波长: 290nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4055 - 0-39/28-1091-2 - cbzj -C090402p-rcqx-1-pH4.5jz-jf50z-P1-30min.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4055 - SZJ-4055-rc-FX277.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4055 - 20260116-FX277.lcb
 样品瓶号: 1-6
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2026/01/16 20:11:00 实验者: wangdan
 处理时间(V2): 2026/01/19 14:10:06 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 290nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.859	526372	100.000	59789	2463	1.070	--
总计		526372	100.000	59789			


图37 枸橼酸西地那非口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
 参比制剂-C090402批-pH4.5介质-桨法-50转-30min-片1
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm, 5 μm) 流速: 1.8ml/min
 柱温: 30°C 波长: 290nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4055 - 0-39/28-1092-2 - cbzj -C090402p-rcqx-1-pH4.5jz-jf50z-P2-30min.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4055 - SZJ-4055-rc-FX277.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4055 - 20260116-FX277.lcb
 样品瓶号: 1-15
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2026/01/16 20:14:53 实验者: wangdan
 处理时间 (V2): 2026/01/19 14:10:08 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 290nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.859	524350	100.000	59652	2465	1.070	--
总计		524350	100.000	59652			

图38 枸橼酸西地那非口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-C090402批-pH4.5介质-桨法-50转-30min-片2
供试品溶液-1




SZJ-4055

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm, 5 μm) 流速: 1.8ml/min
 柱温: 30°C 波长: 290nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4055 - 0-39/28-1093-2 - cbzj -C090402p-rcqx-1-pH4.5jz-jf50z-P3-30min.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4055 - SZJ-4055-rc-FX277.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4055 - 20260116-FX277.lcb
 样品瓶号: 1-24
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2026/01/16 20:18:46 实验者: wangdan
 处理时间 (V2): 2026/01/19 14:10:11 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 290nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.858	539795	100.000	61379	2463	1.071	--
总计		539795	100.000	61379			

图39 枸橼酸西地那非口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
 参比制剂-C090402批-pH4.5介质-桨法-50转-30min-片3
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm, 5 μm) 流速: 1.8ml/min
 柱温: 30°C 波长: 290nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4055 - 0-39/28-1094-2 - cbzj -C090402p-rcqx-1-pH4.5jz-jf50z-P4-30min.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4055 - SZJ-4055-rc-FX277.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4055 - 20260116-FX277.lcb
 样品瓶号: 1-33
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2026/01/16 20:22:39 实验者: wangdan
 处理时间(V2): 2026/01/19 14:10:14 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 290nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.859	504580	100.000	57375	2467	1.069	--
总计		504580	100.000	57375			


图40 枸橼酸西地那非口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-C090402批-pH4.5介质-桨法-50转-30min-片4
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm, 5 μm) 流速: 1.8ml/min
 柱温: 30°C 波长: 290nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4055 - 0-39/28-1095-2 - cbzj -C090402p-rcqx-1-pH4.5jz-jf50z-P5-30min.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4055 - SZJ-4055-rc-FX277.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4055 - 20260116-FX277.lcb
 样品瓶号: 1-42
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2026/01/16 20:26:31 实验者: wangdan
 处理时间 (V2): 2026/01/19 14:10:17 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 290nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.857	534785	100.000	60933	2467	1.072	--
总计		534785	100.000	60933			


图41 枸橼酸西地那非口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
 参比制剂-C090402批-pH4.5介质-桨法-50转-30min-片5
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm, 5 μm) 流速: 1.8ml/min
 柱温: 30°C 波长: 290nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4055 - 0-39/28-1096-2 - cbzj -C090402p-rcqx-1-pH4.5jz-jf50z-P6-30min.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4055 - SZJ-4055-rc-FX277.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4055 - 20260116-FX277.lcb
 样品瓶号: 1-51
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2026/01/16 20:30:23 实验者: wangdan
 处理时间(V2): 2026/01/19 14:10:19 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 290nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.859	516449	100.000	58769	2468	1.069	--
总计		516449	100.000	58769			


图42 枸橼酸西地那非口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
 参比制剂-C090402批-pH4.5介质-桨法-50转-30min-片6
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm, 5 μm) 流速: 1.8ml/min
 柱温: 30°C 波长: 290nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4055 - 0-39/28-1097-2 - cbzj -C090402p-rcqx-1-pH4.5jz-jf50z-P1-45min.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4055 - SZJ-4055-rc-FX277.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4055 - 20260116-FX277.lcb
 样品瓶号: 1-7
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2026/01/16 20:34:16 实验者: wangdan
 处理时间(V2): 2026/01/19 14:10:22 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 290nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.859	530426	100.000	60271	2461	1.071	--
总计		530426	100.000	60271			

图43 枸橼酸西地那非口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
 参比制剂-C090402批-pH4.5介质-桨法-50转-45min-片1
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm, 5 μm) 流速: 1.8ml/min
 柱温: 30°C 波长: 290nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4055 - 0-39/28-1098-2 - cbzj -C090402p-rcqx-1-pH4.5jz-jf50z-P2-45min.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4055 - SZJ-4055-rc-FX277.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4055 - 20260116-FX277.lcb
 样品瓶号: 1-16
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2026/01/16 20:38:08 实验者: wangdan
 处理时间 (V2): 2026/01/19 14:10:25 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 290nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.856	528100	100.000	60230	2468	1.070	--
总计		528100	100.000	60230			


图44 枸橼酸西地那非口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-C090402批-pH4.5介质-桨法-50转-45min-片2
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm, 5 μm) 流速: 1.8ml/min
 柱温: 30°C 波长: 290nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4055 - 0-39/28-1099-2 - cbzj -C090402p-rcqx-1-pH4.5jz-jf50z-P3-45min.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4055 - SZJ-4055-rc-FX277.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4055 - 20260116-FX277.lcb
 样品瓶号: 1-25
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2026/01/16 20:42:00 实验者: wangdan
 处理时间 (V2): 2026/01/19 14:10:28 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 290nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.857	537890	100.000	61317	2469	1.071	--
总计		537890	100.000	61317			


图45 枸橼酸西地那非口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-C090402批-pH4.5介质-桨法-50转-45min-片3
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm, 5 μm) 流速: 1.8ml/min
 柱温: 30°C 波长: 290nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4055 - 0-39/28-1100-2 - cbzj -C090402p-rcqx-1-pH4.5jz-jf50z-P4-45min.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4055 - SZJ-4055-rc-FX277.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4055 - 20260116-FX277.lcb
 样品瓶号: 1-34
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2026/01/16 20:45:52 实验者: wangdan
 处理时间 (V2): 2026/01/19 14:10:31 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 290nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.856	505574	100.000	57673	2470	1.069	--
总计		505574	100.000	57673			

图46 枸橼酸西地那非口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-C090402批-pH4.5介质-桨法-50转-45min-片4
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm, 5 μm) 流速: 1.8ml/min
 柱温: 30°C 波长: 290nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4055 - 0-39/28-1101-2 - cbzj -C090402p-rcqx-1-pH4.5jz-jf50z-P5-45min.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4055 - SZJ-4055-rc-FX277.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4055 - 20260116-FX277.lcb
 样品瓶号: 1-43
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2026/01/16 20:49:44 实验者: wangdan
 处理时间 (V2): 2026/01/19 14:10:34 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 290nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.855	535279	100.000	61097	2463	1.071	--
总计		535279	100.000	61097			

图47 枸橼酸西地那非口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-C090402批-pH4.5介质-桨法-50转-45min-片5
供试品溶液-1




SZJ-4055

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm, 5 μm) 流速: 1.8ml/min
 柱温: 30°C 波长: 290nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4055 - 0-39/28-1102-2 - cbzj -C090402p-rcqx-1-pH4.5jz-jf50z-P6-45min.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4055 - SZJ-4055-rc-FX277.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4055 - 20260116-FX277.lcb
 样品瓶号: 1-52
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2026/01/16 20:53:36 实验者: wangdan
 处理时间 (V2): 2026/01/19 14:10:37 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 290nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.855	515831	100.000	58742	2460	1.070	--
总计		515831	100.000	58742			

图48 枸橼酸西地那非口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
 参比制剂-C090402批-pH4.5介质-桨法-50转-45min-片6
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm, 5 μm) 流速: 1.8ml/min
 柱温: 30°C 波长: 290nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4055 - 0-39/28-1103-2 - cbzj -C090402p-rcqx-1-pH4.5jz-jf50z-P1-jx.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4055 - SZJ-4055-rc-FX277.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4055 - 20260116-FX277.lcb
 样品瓶号: 1-8
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2026/01/16 20:57:30 实验者: wangdan
 处理时间(V2): 2026/01/19 14:10:39 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 290nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.856	529676	100.000	60419	2467	1.072	--
总计		529676	100.000	60419			

图49 枸橼酸西地那非口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-C090402批-pH4.5介质-桨法-50转-极限转速-片1
供试品溶液-1




SZJ-4055

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm, 5 μm) 流速: 1.8ml/min
 柱温: 30°C 波长: 290nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4055 - 0-39/28-1104-2 - cbzj -C090402p-rcqx-1-pH4.5jz-jf50z-P2-jx.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4055 - SZJ-4055-rc-FX277.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4055 - 20260116-FX277.lcb
 样品瓶号: 1-17
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2026/01/16 21:01:24 实验者: wangdan
 处理时间 (V2): 2026/01/19 14:10:42 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 290nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.855	527968	100.000	60270	2467	1.071	--
总计		527968	100.000	60270			

图50 枸橼酸西地那非口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
 参比制剂-C090402批-pH4.5介质-浆法-50转-极限转速-片2
 供试品溶液-1




SZJ-4055

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm, 5 μm) 流速: 1.8ml/min
 柱温: 30°C 波长: 290nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4055 - 0-39/28-1105-2 - cbzj -C090402p-rcqx-1-pH4.5jz-jf50z-P3-jx.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4055 - SZJ-4055-rc-FX277.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4055 - 20260116-FX277.lcb
 样品瓶号: 1-26
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2026/01/16 21:05:16 实验者: wangdan
 处理时间 (V2): 2026/01/19 14:10:45 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 290nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.854	536230	100.000	61138	2463	1.071	--
总计		536230	100.000	61138			


图51 枸橼酸西地那非口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
 参比制剂-C090402批-pH4.5介质-桨法-50转-极限转速-片3
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm, 5 μm) 流速: 1.8ml/min
 柱温: 30°C 波长: 290nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4055 - 0-39/28-1106-2 - cbzj -C090402p-rcqx-1-pH4.5jz-jf50z-P4-jx.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4055 - SZJ-4055-rc-FX277.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4055 - 20260116-FX277.lcb
 样品瓶号: 1-35
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2026/01/16 21:09:09 实验者: wangdan
 处理时间 (V2): 2026/01/19 14:10:48 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 290nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.854	504975	100.000	57616	2464	1.068	--
总计		504975	100.000	57616			

图52 枸橼酸西地那非口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
 参比制剂-C090402批-pH4.5介质-桨法-50转-极限转速-片4
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm, 5 μm) 流速: 1.8ml/min
 柱温: 30°C 波长: 290nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4055 - 0-39/28-1107-2 - cbzj -C090402p-rcqx-1-pH4.5jz-jf50z-P5-jx.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4055 - SZJ-4055-rc-FX277.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4055 - 20260116-FX277.lcb
 样品瓶号: 1-44
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2026/01/16 21:13:02 实验者: wangdan
 处理时间 (V2): 2026/01/19 14:10:51 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 290nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.854	534348	100.000	61033	2465	1.071	--
总计		534348	100.000	61033			

图53 枸橼酸西地那非口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-C090402批-pH4.5介质-浆法-50转-极限转速-片5
供试品溶液-1




SZJ-4055

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm, 5 μm) 流速: 1.8ml/min
 柱温: 30°C 波长: 290nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4055 - 0-39/28-1108-2 - cbzj -C090402p-rcqx-1-pH4.5jz-jf50z-P6-jx.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4055 - SZJ-4055-rc-FX277.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4055 - 20260116-FX277.lcb
 样品瓶号: 1-53
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2026/01/16 21:16:55 实验者: wangdan
 处理时间 (V2): 2026/01/19 14:10:54 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 290nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.854	516007	100.000	58922	2467	1.070	--
总计		516007	100.000	58922			

图54 枸橼酸西地那非口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
 参比制剂-C090402批-pH4.5介质-桨法-50转-极限转速-片6
 供试品溶液-1




SZJ-4055

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm, 5 μm) 流速: 1.8ml/min
 柱温: 30°C 波长: 290nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4055 - 0-39/28-1109-2 - cbzj -C090402p-rcqx-1-pH4.5jz-jf50z-dz2-1.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4055 - SZJ-4055-rc-FX277.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4055 - 20260116-FX277.lcb
 样品瓶号: 1-27
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2026/01/16 21:20:48 实验者: wangdan
 处理时间(V2): 2026/01/19 14:10:57 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 290nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.840	485323	100.000	54131	2326	1.071	--
总计		485323	100.000	54131			

图55 枸橼酸西地那非口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
 参比制剂-C090402批-pH4.5介质-桨法-50转
 对照品溶液-2-1

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm, 5 μm) 流速: 1.8ml/min
 柱温: 30°C 波长: 290nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4055 - 0-39/28-1110-2 - cbzj -C090402p-rcqx-1-pH4.5jz-jf50z-dz2-2.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4055 - SZJ-4055-rc-FX277.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4055 - 20260116-FX277.lcb
 样品瓶号: 1-27
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2026/01/16 21:24:41 实验者: wangdan
 处理时间 (V2): 2026/01/19 14:11:00 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 290nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.840	485680	100.000	54179	2324	1.071	--
总计		485680	100.000	54179			

图56 枸橼酸西地那非口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-C090402批-pH4.5介质-桨法-50转
对照品溶液-2-2




SZJ-4055

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm, 5 μm) 流速: 1.8ml/min
 柱温: 30°C 波长: 290nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4055 - 0-39/28-1111-2 - cbzj -C090402p-rcqx-2-pH4.5jz-jf50z-rj.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4055 - SZJ-4055-rc-FX277.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4055 - 20260116-FX277.lcb
 样品瓶号: 2-9
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2026/01/16 21:28:34 实验者: wangdan
 处理时间 (V2): 2026/01/19 14:11:02 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 290nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图57 枸橼酸西地那非口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-C090402批-pH4.5介质-桨法-50转
溶剂

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm, 5 μm) 流速: 1.8ml/min
 柱温: 30°C 波长: 290nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4055 - 0-39/28-1112-2 - cbzj -C090402p-rcqx-2-pH4.5jz-jf50z-dz1-1.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4055 - SZJ-4055-rc-FX277.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4055 - 20260116-FX277.lcb
 样品瓶号: 2-18
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2026/01/16 21:32:28 实验者: wangdan
 处理时间 (V2): 2026/01/19 14:11:05 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 290nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.840	483767	100.000	53977	2327	1.072	--
总计		483767	100.000	53977			


图58 枸橼酸西地那非口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-C090402批-pH4.5介质-桨法-50转
对照品溶液-1-1

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm, 5 μm) 流速: 1.8ml/min
 柱温: 30°C 波长: 290nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4055 - 0-39/28-1113-2 - cbzj -C090402p-rcqx-2-pH4.5jz-jf50z-dz1-2.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4055 - SZJ-4055-rc-FX277.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4055 - 20260116-FX277.lcb
 样品瓶号: 2-18
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2026/01/16 21:36:22 实验者: wangdan
 处理时间(V2): 2026/01/19 14:11:08 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 290nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.839	482622	100.000	53878	2324	1.070	--
总计		482622	100.000	53878			

图59 枸橼酸西地那非口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-C090402批-pH4.5介质-桨法-50转
对照品溶液-1-2




SZJ-4055

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm, 5 μm) 流速: 1.8ml/min
 柱温: 30°C 波长: 290nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4055 - 0-39/28-1114-2 - cbzj -C090402p-rcqx-2-pH4.5jz-jf50z-dz1-3.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4055 - SZJ-4055-rc-FX277.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4055 - 20260116-FX277.lcb
 样品瓶号: 2-18
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2026/01/16 21:40:16 实验者: wangdan
 处理时间(V2): 2026/01/19 14:11:11 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 290nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.839	483008	100.000	53977	2327	1.071	--
总计		483008	100.000	53977			


图60 枸橼酸西地那非口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
 参比制剂-C090402批-pH4.5介质-桨法-50转
 对照品溶液-1-3

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm, 5 μm) 流速: 1.8ml/min
 柱温: 30℃ 波长: 290nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4055 - 0-39/28-1115-2 - cbzj -C090402p-rcqx-2-pH4.5jz-jf50z-dz1-4.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4055 - SZJ-4055-rc-FX277.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4055 - 20260116-FX277.lcb
 样品瓶号: 2-18
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2026/01/16 21:44:10 实验者: wangdan
 处理时间(V2): 2026/01/19 14:11:13 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 290nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.839	482609	100.000	53903	2328	1.072	--
总计		482609	100.000	53903			

图61 枸橼酸西地那非口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
 参比制剂-C090402批-pH4.5介质-桨法-50转
 对照品溶液-1-4




SZJ-4055

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm, 5 μm) 流速: 1.8ml/min
 柱温: 30°C 波长: 290nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4055 - 0-39/28-1116-2 - cbzj -C090402p-rcqx-2-pH4.5jz-jf50z-dz1-5.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4055 - SZJ-4055-rc-FX277.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4055 - 20260116-FX277.lcb
 样品瓶号: 2-18
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2026/01/16 21:48:04 实验者: wangdan
 处理时间(V2): 2026/01/19 14:11:16 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 290nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.839	483281	100.000	53997	2324	1.071	--
总计		483281	100.000	53997			


图62 枸橼酸西地那非口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
 参比制剂-C090402批-pH4.5介质-桨法-50转
 对照品溶液-1-5

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm, 5 μm) 流速: 1.8ml/min
 柱温: 30°C 波长: 290nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4055 - 0-39/28-1117-2 - cbzj -C090402p-rcqx-2-pH4.5jz-jf50z-P1-2min.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4055 - SZJ-4055-rc-FX277.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4055 - 20260116-FX277.lcb
 样品瓶号: 2-1
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2026/01/16 21:51:58 实验者: wangdan
 处理时间 (V2): 2026/01/19 14:11:19 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 290nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.855	344249	100.000	39395	2477	1.059	--
总计		344249	100.000	39395			


图63 枸橼酸西地那非口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
 参比制剂-C090402批-pH4.5介质-桨法-50转-2min-片1
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm, 5 μm) 流速: 1.8ml/min
 柱温: 30°C 波长: 290nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4055 - 0-39/28-1118-2 - cbzj -C090402p-rcqx-2-pH4.5jz-jf50z-P2-2min.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4055 - SZJ-4055-rc-FX277.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4055 - 20260116-FX277.lcb
 样品瓶号: 2-10
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2026/01/16 21:55:52 实验者: wangdan
 处理时间 (V2): 2026/01/19 14:11:22 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 290nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.855	328132	100.000	37527	2470	1.057	--
总计		328132	100.000	37527			

图64 枸橼酸西地那非口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
 参比制剂-C090402批-pH4.5介质-桨法-50转-2min-片2
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm, 5 μm) 流速: 1.8ml/min
 柱温: 30°C 波长: 290nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4055 - 0-39/28-1119-2 - cbzj -C090402p-rcqx-2-pH4.5jz-jf50z-P3-2min.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4055 - SZJ-4055-rc-FX277.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4055 - 20260116-FX277.lcb
 样品瓶号: 2-19
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2026/01/16 21:59:45 实验者: wangdan
 处理时间(V2): 2026/01/19 14:11:24 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 290nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.854	327927	100.000	37510	2472	1.058	--
总计		327927	100.000	37510			

图65 枸橼酸西地那非口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
 参比制剂-C090402批-pH4.5介质-桨法-50转-2min-片3
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm, 5 μm) 流速: 1.8ml/min
 柱温: 30°C 波长: 290nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4055 - 0-39/28-1120-2 - cbzj -C090402p-rcqx-2-pH4.5jz-jf50z-P4-2min.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4055 - SZJ-4055-rc-FX277.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4055 - 20260116-FX277.lcb
 样品瓶号: 2-28
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2026/01/16 22:03:38 实验者: wangdan
 处理时间(V2): 2026/01/19 14:11:27 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 290nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.855	374052	100.000	42793	2476	1.062	--
总计		374052	100.000	42793			


图66 枸橼酸西地那非口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
 参比制剂-C090402批-pH4.5介质-桨法-50转-2min-片4
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm, 5 μm) 流速: 1.8ml/min
 柱温: 30°C 波长: 290nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4055 - 0-39/28-1121-2 - cbzj -C090402p-rcqx-2-pH4.5jz-jf50z-P5-2min.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4055 - SZJ-4055-rc-FX277.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4055 - 20260116-FX277.lcb
 样品瓶号: 2-37
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2026/01/16 22:07:31 实验者: wangdan
 处理时间(V2): 2026/01/19 14:11:30 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 290nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.856	312495	100.000	35709	2473	1.058	--
总计		312495	100.000	35709			

图67 枸橼酸西地那非口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
 参比制剂-C090402批-pH4.5介质-桨法-50转-2min-片5
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm, 5 μm) 流速: 1.8ml/min
 柱温: 30°C 波长: 290nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4055 - 0-39/28-1122-2 - cbzj -C090402p-rcqx-2-pH4.5jz-jf50z-P6-2min.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4055 - SZJ-4055-rc-FX277.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4055 - 20260116-FX277.lcb
 样品瓶号: 2-46
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2026/01/16 22:11:25 实验者: wangdan
 处理时间(V2): 2026/01/19 14:11:32 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 290nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.855	334169	100.000	38222	2476	1.059	--
总计		334169	100.000	38222			


图68 枸橼酸西地那非口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
 参比制剂-C090402批-pH4.5介质-桨法-50转-2min-片6
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm, 5 μm) 流速: 1.8ml/min
 柱温: 30°C 波长: 290nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4055 - 0-39/28-1123-2 - cbzj -C090402p-rcqx-2-pH4.5jz-jf50z-P1-5min.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4055 - SZJ-4055-rc-FX277.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4055 - 20260116-FX277.lcb
 样品瓶号: 2-2
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2026/01/16 22:15:17 实验者: wangdan
 处理时间(V2): 2026/01/19 14:11:35 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 290nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.853	511801	100.000	58442	2467	1.070	--
总计		511801	100.000	58442			


图69 枸橼酸西地那非口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
 参比制剂-C090402批-pH4.5介质-桨法-50转-5min-片1
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm, 5 μm) 流速: 1.8ml/min
 柱温: 30°C 波长: 290nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4055 - 0-39/28-1124-2 - cbzj -C090402p-rcqx-2-pH4.5jz-jf50z-P2-5min.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4055 - SZJ-4055-rc-FX277.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4055 - 20260116-FX277.lcb
 样品瓶号: 2-11
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2026/01/16 22:19:10 实验者: wangdan
 处理时间(V2): 2026/01/19 14:11:38 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 290nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.852	502192	100.000	57379	2470	1.068	--
总计		502192	100.000	57379			

图70 枸橼酸西地那非口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
 参比制剂-C090402批-pH4.5介质-桨法-50转-5min-片2
 供试品溶液-1




SZJ-4055

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm, 5 μm) 流速: 1.8ml/min
 柱温: 30°C 波长: 290nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4055 - 0-39/28-1125-2 - cbzj -C090402p-rcqx-2-pH4.5jz-jf50z-P3-5min.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4055 - SZJ-4055-rc-FX277.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4055 - 20260116-FX277.lcb
 样品瓶号: 2-20 版本号: 6.115
 进样体积: 10 μl 实验者: wangdan
 进样时间: 2026/01/16 22:23:03 处理者: wangdan
 处理时间 (V2): 2026/01/19 14:11:41
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 290nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.852	512872	100.000	58516	2465	1.070	--
总计		512872	100.000	58516			

图71 枸橼酸西地那非口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
 参比制剂-C090402批-pH4.5介质-桨法-50转-5min-片3
 供试品溶液-1




SZJ-4055

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm, 5 μm) 流速: 1.8ml/min
 柱温: 30°C 波长: 290nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4055 - 0-39/28-1126-2 - cbzj -C090402p-rcqx-2-pH4.5jz-jf50z-P4-5min.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4055 - SZJ-4055-rc-FX277.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4055 - 20260116-FX277.lcb
 样品瓶号: 2-29 版本号: 6.115
 进样体积: 10 μl 实验者: wangdan
 进样时间: 2026/01/16 22:26:57 处理者: wangdan
 处理时间 (V2): 2026/01/19 14:11:44
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 290nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.853	507577	100.000	57906	2468	1.069	--
总计		507577	100.000	57906			

图72 枸橼酸西地那非口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
 参比制剂-C090402批-pH4.5介质-桨法-50转-5min-片4
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm, 5 μm) 流速: 1.8ml/min
 柱温: 30°C 波长: 290nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4055 - 0-39/28-1127-2 - cbzj -C090402p-rcqx-2-pH4.5jz-jf50z-P5-5min.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4055 - SZJ-4055-rc-FX277.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4055 - 20260116-FX277.lcb
 样品瓶号: 2-38
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2026/01/16 22:30:51 实验者: wangdan
 处理时间(V2): 2026/01/19 14:11:46 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 290nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.853	507977	100.000	58032	2466	1.070	--
总计		507977	100.000	58032			

图73 枸橼酸西地那非口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
 参比制剂-C090402批-pH4.5介质-桨法-50转-5min-片5
 供试品溶液-1




SZJ-4055

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm, 5 μm) 流速: 1.8ml/min
 柱温: 30°C 波长: 290nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4055 - 0-39/28-1128-2 - cbzj -C090402p-rcqx-2-pH4.5jz-jf50z-P6-5min.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4055 - SZJ-4055-rc-FX277.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4055 - 20260116-FX277.lcb
 样品瓶号: 2-47
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2026/01/16 22:34:45 实验者: wangdan
 处理时间(V2): 2026/01/19 14:11:49 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 290nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.854	497298	100.000	56804	2466	1.068	--
总计		497298	100.000	56804			

图74 枸橼酸西地那非口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
 参比制剂-C090402批-pH4.5介质-桨法-50转-5min-片6
 供试品溶液-1




SZJ-4055

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm, 5 μm) 流速: 1.8ml/min
 柱温: 30°C 波长: 290nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4055 - 0-39/28-1129-2 - cbzj -C090402p-rcqx-2-pH4.5jz-jf50z-P1-10min.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4055 - SZJ-4055-rc-FX277.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4055 - 20260116-FX277.lcb
 样品瓶号: 2-3
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2026/01/16 22:38:39 实验者: wangdan
 处理时间(V2): 2026/01/19 14:11:52 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 290nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.853	522364	100.000	59589	2465	1.070	--
总计		522364	100.000	59589			


图75 枸橼酸西地那非口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
 参比制剂-C090402批-pH4.5介质-桨法-50转-10min-片1
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm, 5 μm) 流速: 1.8ml/min
 柱温: 30°C 波长: 290nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4055 - 0-39/28-1130-2 - cbzj -C090402p-rcqx-2-pH4.5jz-jf50z-P2-10min.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4055 - SZJ-4055-rc-FX277.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4055 - 20260116-FX277.lcb
 样品瓶号: 2-12
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2026/01/16 22:42:33 实验者: wangdan
 处理时间(V2): 2026/01/19 14:11:55 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 290nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.853	520762	100.000	59406	2465	1.071	--
总计		520762	100.000	59406			


图76 枸橼酸西地那非口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-C090402批-pH4.5介质-桨法-50转-10min-片2
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm, 5 μm) 流速: 1.8ml/min
 柱温: 30°C 波长: 290nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4055 - 0-39/28-1131-2 - cbzj -C090402p-rcqx-2-pH4.5jz-jf50z-P3-10min.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4055 - SZJ-4055-rc-FX277.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4055 - 20260116-FX277.lcb
 样品瓶号: 2-21
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2026/01/16 22:46:27 实验者: wangdan
 处理时间(V2): 2026/01/19 14:11:57 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 290nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.852	526046	100.000	59980	2466	1.070	--
总计		526046	100.000	59980			

图77 枸橼酸西地那非口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-C090402批-pH4.5介质-桨法-50转-10min-片3
供试品溶液-1




SZJ-4055

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm, 5 μm) 流速: 1.8ml/min
 柱温: 30°C 波长: 290nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4055 - 0-39/28-1132-2 - cbzj -C090402p-rcqx-2-pH4.5jz-jf50z-P4-10min.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4055 - SZJ-4055-rc-FX277.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4055 - 20260116-FX277.lcb
 样品瓶号: 2-30
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2026/01/16 22:50:21 实验者: wangdan
 处理时间(V2): 2026/01/19 14:12:00 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 290nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.854	476130	100.000	54359	2468	1.069	--
总计		476130	100.000	54359			


图78 枸橼酸西地那非口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
 参比制剂-C090402批-pH4.5介质-桨法-50转-10min-片4
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm, 5 μm) 流速: 1.8ml/min
 柱温: 30°C 波长: 290nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4055 - 0-39/28-1133-2 - cbzj -C090402p-rcqx-2-pH4.5jz-jf50z-P5-10min.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4055 - SZJ-4055-rc-FX277.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4055 - 20260116-FX277.lcb
 样品瓶号: 2-39
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2026/01/16 22:54:14 实验者: wangdan
 处理时间(V2): 2026/01/19 14:12:03 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 290nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.852	525176	100.000	59861	2464	1.071	--
总计		525176	100.000	59861			

图79 枸橼酸西地那非口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
 参比制剂-C090402批-pH4.5介质-桨法-50转-10min-片5
 供试品溶液-1




SZJ-4055

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm, 5 μm) 流速: 1.8ml/min
 柱温: 30°C 波长: 290nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4055 - 0-39/28-1134-2 - cbzj -C090402p-rcqx-2-pH4.5jz-jf50z-P6-10min.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4055 - SZJ-4055-rc-FX277.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4055 - 20260116-FX277.lcb
 样品瓶号: 2-48
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2026/01/16 22:58:08 实验者: wangdan
 处理时间(V2): 2026/01/19 14:12:06 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 290nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.852	514822	100.000	58742	2463	1.070	--
总计		514822	100.000	58742			


图80 枸橼酸西地那非口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
 参比制剂-C090402批-pH4.5介质-桨法-50转-10min-片6
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm, 5 μm) 流速: 1.8ml/min
 柱温: 30°C 波长: 290nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4055 - 0-39/28-1135-2 - cbzj -C090402p-rcqx-2-pH4.5jz-jf50z-P1-15min.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4055 - SZJ-4055-rc-FX277.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4055 - 20260116-FX277.lcb
 样品瓶号: 2-4
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2026/01/16 23:02:02 实验者: wangdan
 处理时间 (V2): 2026/01/19 14:12:09 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 290nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.852	522486	100.000	59641	2467	1.072	--
总计		522486	100.000	59641			


图81 枸橼酸西地那非口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-C090402批-pH4.5介质-桨法-50转-15min-片1
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm, 5 μm) 流速: 1.8ml/min
 柱温: 30°C 波长: 290nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4055 - 0-39/28-1136-2 - cbzj -C090402p-rcqx-2-pH4.5jz-jf50z-P2-15min.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4055 - SZJ-4055-rc-FX277.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4055 - 20260116-FX277.lcb
 样品瓶号: 2-13
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2026/01/16 23:05:56 实验者: wangdan
 处理时间(V2): 2026/01/19 14:12:12 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 290nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.854	518128	100.000	59110	2468	1.070	--
总计		518128	100.000	59110			

图82 枸橼酸西地那非口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
 参比制剂-C090402批-pH4.5介质-桨法-50转-15min-片2
 供试品溶液-1




SZJ-4055

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm, 5 μm) 流速: 1.8ml/min
 柱温: 30°C 波长: 290nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4055 - 0-39/28-1137-2 - cbzj -C090402p-rcqx-2-pH4.5jz-jf50z-P3-15min.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4055 - SZJ-4055-rc-FX277.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4055 - 20260116-FX277.lcb
 样品瓶号: 2-22
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2026/01/16 23:09:49 实验者: wangdan
 处理时间(V2): 2026/01/19 14:12:14 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 290nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.852	527350	100.000	60168	2466	1.072	--
总计		527350	100.000	60168			


图83 枸橼酸西地那非口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
 参比制剂-C090402批-pH4.5介质-桨法-50转-15min-片3
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm, 5 μm) 流速: 1.8ml/min
 柱温: 30°C 波长: 290nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4055 - 0-39/28-1138-2 - cbzj -C090402p-rcqx-2-pH4.5jz-jf50z-P4-15min.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4055 - SZJ-4055-rc-FX277.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4055 - 20260116-FX277.lcb
 样品瓶号: 2-31
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2026/01/16 23:13:43 实验者: wangdan
 处理时间 (V2): 2026/01/19 14:12:17 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 290nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.852	520855	100.000	59420	2466	1.071	--
总计		520855	100.000	59420			

图84 枸橼酸西地那非口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-C090402批-pH4.5介质-桨法-50转-15min-片4
供试品溶液-1




SZJ-4055

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm, 5 μm) 流速: 1.8ml/min
 柱温: 30°C 波长: 290nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4055 - 0-39/28-1139-2 - cbzj -C090402p-rcqx-2-pH4.5jz-jf50z-P5-15min.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4055 - SZJ-4055-rc-FX277.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4055 - 20260116-FX277.lcb
 样品瓶号: 2-40
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2026/01/16 23:17:36 实验者: wangdan
 处理时间(V2): 2026/01/19 14:12:20 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 290nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.853	526144	100.000	60002	2464	1.071	--
总计		526144	100.000	60002			


图85 枸橼酸西地那非口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
 参比制剂-C090402批-pH4.5介质-桨法-50转-15min-片5
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm, 5 μm) 流速: 1.8ml/min
 柱温: 30°C 波长: 290nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4055 - 0-39/28-1140-2 - cbzj -C090402p-rcqx-2-pH4.5jz-jf50z-P6-15min.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4055 - SZJ-4055-rc-FX277.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4055 - 20260116-FX277.lcb
 样品瓶号: 2-49
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2026/01/16 23:21:29 实验者: wangdan
 处理时间(V2): 2026/01/19 14:12:23 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 290nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.852	519480	100.000	59238	2464	1.070	--
总计		519480	100.000	59238			

图86 枸橼酸西地那非口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
 参比制剂-C090402批-pH4.5介质-桨法-50转-15min-片6
 供试品溶液-1




SZJ-4055

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm, 5 μm) 流速: 1.8ml/min
 柱温: 30°C 波长: 290nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4055 - 0-39/28-1141-2 - cbzj -C090402p-rcqx-2-pH4.5jz-jf50z-P1-20min.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4055 - SZJ-4055-rc-FX277.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4055 - 20260116-FX277.lcb
 样品瓶号: 2-5
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2026/01/16 23:25:23 实验者: wangdan
 处理时间 (V2): 2026/01/19 14:12:26 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 290nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.852	522756	100.000	59667	2465	1.069	--
总计		522756	100.000	59667			

图87 枸橼酸西地那非口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
 参比制剂-C090402批-pH4.5介质-桨法-50转-20min-片1
 供试品溶液-1




SZJ-4055

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm, 5 μm) 流速: 1.8ml/min
 柱温: 30°C 波长: 290nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4055 - 0-39/28-1142-2 - cbzj -C090402p-rcqx-2-pH4.5jz-jf50z-P2-20min.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4055 - SZJ-4055-rc-FX277.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4055 - 20260116-FX277.lcb
 样品瓶号: 2-14
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2026/01/16 23:29:18 实验者: wangdan
 处理时间 (V2): 2026/01/19 14:12:28 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 290nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.852	518367	100.000	59124	2464	1.070	--
总计		518367	100.000	59124			


图88 枸橼酸西地那非口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
 参比制剂-C090402批-pH4.5介质-桨法-50转-20min-片2
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm, 5 μm) 流速: 1.8ml/min
 柱温: 30°C 波长: 290nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4055 - 0-39/28-1143-2 - cbzj -C090402p-rcqx-2-pH4.5jz-jf50z-P3-20min.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4055 - SZJ-4055-rc-FX277.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4055 - 20260116-FX277.lcb
 样品瓶号: 2-23
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2026/01/16 23:33:12 实验者: wangdan
 处理时间(V2): 2026/01/19 14:12:31 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 290nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.853	527376	100.000	60087	2461	1.071	--
总计		527376	100.000	60087			

图89 枸橼酸西地那非口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-C090402批-pH4.5介质-桨法-50转-20min-片3
供试品溶液-1




SZJ-4055

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm, 5 μm) 流速: 1.8ml/min
 柱温: 30°C 波长: 290nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4055 - 0-39/28-1144-2 - cbzj -C090402p-rcqx-2-pH4.5jz-jf50z-P4-20min.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4055 - SZJ-4055-rc-FX277.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4055 - 20260116-FX277.lcb
 样品瓶号: 2-32
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2026/01/16 23:37:06 实验者: wangdan
 处理时间 (V2): 2026/01/19 14:12:34 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 290nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.852	516596	100.000	58955	2466	1.069	--
总计		516596	100.000	58955			


图90 枸橼酸西地那非口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
 参比制剂-C090402批-pH4.5介质-桨法-50转-20min-片4
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm, 5 μm) 流速: 1.8ml/min
 柱温: 30°C 波长: 290nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4055 - 0-39/28-1145-2 - cbzj -C090402p-rcqx-2-pH4.5jz-jf50z-P5-20min.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4055 - SZJ-4055-rc-FX277.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4055 - 20260116-FX277.lcb
 样品瓶号: 2-41
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2026/01/16 23:41:00 实验者: wangdan
 处理时间(V2): 2026/01/19 14:12:37 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 290nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.852	524056	100.000	59739	2463	1.070	--
总计		524056	100.000	59739			


图91 枸橼酸西地那非口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-C090402批-pH4.5介质-桨法-50转-20min-片5
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm, 5 μm) 流速: 1.8ml/min
 柱温: 30°C 波长: 290nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4055 - 0-39/28-1146-2 - cbzj -C090402p-rcqx-2-pH4.5jz-jf50z-P6-20min.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4055 - SZJ-4055-rc-FX277.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4055 - 20260116-FX277.lcb
 样品瓶号: 2-50
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2026/01/16 23:44:53 实验者: wangdan
 处理时间 (V2): 2026/01/19 14:12:39 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 290nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.852	519208	100.000	59188	2467	1.071	--
总计		519208	100.000	59188			


图92 枸橼酸西地那非口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-C090402批-pH4.5介质-桨法-50转-20min-片6
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm, 5 μm) 流速: 1.8ml/min
 柱温: 30°C 波长: 290nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4055 - 0-39/28-1147-2 - cbzj -C090402p-rcqx-2-pH4.5jz-jf50z-P1-30min.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4055 - SZJ-4055-rc-FX277.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4055 - 20260116-FX277.lcb
 样品瓶号: 2-6
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2026/01/16 23:48:47 实验者: wangdan
 处理时间(V2): 2026/01/19 14:12:42 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 290nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.851	522692	100.000	59502	2456	1.070	--
总计		522692	100.000	59502			

图93 枸橼酸西地那非口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-C090402批-pH4.5介质-桨法-50转-30min-片1
供试品溶液-1




SZJ-4055

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm, 5 μm) 流速: 1.8ml/min
 柱温: 30°C 波长: 290nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4055 - 0-39/28-1148-2 - cbzj -C090402p-rcqx-2-pH4.5jz-jf50z-P2-30min.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4055 - SZJ-4055-rc-FX277.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4055 - 20260116-FX277.lcb
 样品瓶号: 2-15
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2026/01/16 23:52:41 实验者: wangdan
 处理时间 (V2): 2026/01/19 14:12:45 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 290nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.851	519740	100.000	59240	2461	1.069	--
总计		519740	100.000	59240			


图94 枸橼酸西地那非口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
 参比制剂-C090402批-pH4.5介质-桨法-50转-30min-片2
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm, 5 μm) 流速: 1.8ml/min
 柱温: 30°C 波长: 290nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4055 - 0-39/28-1149-2 - cbzj -C090402p-rcqx-2-pH4.5jz-jf50z-P3-30min.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4055 - SZJ-4055-rc-FX277.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4055 - 20260116-FX277.lcb
 样品瓶号: 2-24
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2026/01/16 23:56:34 实验者: wangdan
 处理时间 (V2): 2026/01/19 14:12:48 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 290nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.852	528011	100.000	60226	2466	1.071	--
总计		528011	100.000	60226			


图95 枸橼酸西地那非口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
 参比制剂-C090402批-pH4.5介质-桨法-50转-30min-片3
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm, 5 μm) 流速: 1.8ml/min
 柱温: 30°C 波长: 290nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4055 - 0-39/28-1150-2 - cbzj -C090402p-rcqx-2-pH4.5jz-jf50z-P4-30min.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4055 - SZJ-4055-rc-FX277.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4055 - 20260116-FX277.lcb
 样品瓶号: 2-33
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2026/01/17 00:00:28 实验者: wangdan
 处理时间(V2): 2026/01/19 14:12:50 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 290nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.852	520976	100.000	59421	2461	1.070	--
总计		520976	100.000	59421			

图96 枸橼酸西地那非口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
 参比制剂-C090402批-pH4.5介质-桨法-50转-30min-片4
 供试品溶液-1




SZJ-4055

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm, 5 μm) 流速: 1.8ml/min
 柱温: 30°C 波长: 290nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4055 - 0-39/28-1151-2 - cbzj -C090402p-rcqx-2-pH4.5jz-jf50z-P5-30min.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4055 - SZJ-4055-rc-FX277.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4055 - 20260116-FX277.lcb
 样品瓶号: 2-42
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2026/01/17 00:04:22 实验者: wangdan
 处理时间 (V2): 2026/01/19 14:12:53 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 290nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.852	525924	100.000	59968	2461	1.070	--
总计		525924	100.000	59968			

图97 枸橼酸西地那非口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
 参比制剂-C090402批-pH4.5介质-桨法-50转-30min-片5
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm, 5 μm) 流速: 1.8ml/min
 柱温: 30°C 波长: 290nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4055 - 0-39/28-1152-2 - cbzj -C090402p-rcqx-2-pH4.5jz-jf50z-P6-30min.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4055 - SZJ-4055-rc-FX277.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4055 - 20260116-FX277.lcb
 样品瓶号: 2-51
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2026/01/17 00:08:16 实验者: wangdan
 处理时间 (V2): 2026/01/19 14:12:56 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 290nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.852	517148	100.000	58965	2466	1.071	--
总计		517148	100.000	58965			

图98 枸橼酸西地那非口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
 参比制剂-C090402批-pH4.5介质-桨法-50转-30min-片6
 供试品溶液-1




SZJ-4055

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm, 5 μm) 流速: 1.8ml/min
 柱温: 30°C 波长: 290nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4055 - 0-39/28-1153-2 - cbzj -C090402p-rcqx-2-pH4.5jz-jf50z-P1-45min.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4055 - SZJ-4055-rc-FX277.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4055 - 20260116-FX277.lcb
 样品瓶号: 2-7
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2026/01/17 00:12:10 实验者: wangdan
 处理时间 (V2): 2026/01/19 14:13:00 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 290nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.852	510204	100.000	58207	2465	1.070	--
总计		510204	100.000	58207			


图99 枸橼酸西地那非口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
 参比制剂-C090402批-pH4.5介质-桨法-50转-45min-片1
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm, 5 μm) 流速: 1.8ml/min
 柱温: 30°C 波长: 290nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4055 - 0-39/28-1154-2 - cbzj -C090402p-rcqx-2-pH4.5jz-jf50z-P2-45min.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4055 - SZJ-4055-rc-FX277.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4055 - 20260116-FX277.lcb
 样品瓶号: 2-16
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2026/01/17 00:16:04 实验者: wangdan
 处理时间(V2): 2026/01/19 14:13:02 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 290nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.851	516863	100.000	58888	2465	1.071	--
总计		516863	100.000	58888			


图100 枸橼酸西地那非口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
 参比制剂-C090402批-pH4.5介质-桨法-50转-45min-片2
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm, 5 μm) 流速: 1.8ml/min
 柱温: 30°C 波长: 290nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4055 - 0-39/28-1155-2 - cbzj -C090402p-rcqx-2-pH4.5jz-jf50z-P3-45min.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4055 - SZJ-4055-rc-FX277.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4055 - 20260116-FX277.lcb
 样品瓶号: 2-25
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2026/01/17 00:19:58 实验者: wangdan
 处理时间 (V2): 2026/01/19 14:13:05 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 290nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.851	529545	100.000	60304	2460	1.071	--
总计		529545	100.000	60304			

图101 枸橼酸西地那非口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-C090402批-pH4.5介质-桨法-50转-45min-片3
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm, 5 μm) 流速: 1.8ml/min
 柱温: 30°C 波长: 290nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4055 - 0-39/28-1156-2 - cbzj -C090402p-rcqx-2-pH4.5jz-jf50z-P4-45min.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4055 - SZJ-4055-rc-FX277.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4055 - 20260116-FX277.lcb
 样品瓶号: 2-34
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2026/01/17 00:23:51 实验者: wangdan
 处理时间 (V2): 2026/01/19 14:13:08 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 290nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.852	521756	100.000	59495	2463	1.070	--
总计		521756	100.000	59495			


图102 枸橼酸西地那非口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-C090402批-pH4.5介质-桨法-50转-45min-片4
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm, 5 μm) 流速: 1.8ml/min
 柱温: 30℃ 波长: 290nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4055 - 0-39/28-1157-2 - cbzj -C090402p-rcqx-2-pH4.5jz-jf50z-P5-45min.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4055 - SZJ-4055-rc-FX277.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4055 - 20260116-FX277.lcb
 样品瓶号: 2-43
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2026/01/17 00:27:45 实验者: wangdan
 处理时间(V2): 2026/01/19 14:13:11 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 290nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.851	526824	100.000	59971	2459	1.070	--
总计		526824	100.000	59971			


图103 枸橼酸西地那非口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
 参比制剂-C090402批-pH4.5介质-桨法-50转-45min-片5
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm, 5 μm) 流速: 1.8ml/min
 柱温: 30°C 波长: 290nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4055 - 0-39/28-1158-2 - cbzj -C090402p-rcqx-2-pH4.5jz-jf50z-P6-45min.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4055 - SZJ-4055-rc-FX277.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4055 - 20260116-FX277.lcb
 样品瓶号: 2-52
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2026/01/17 00:31:40 实验者: wangdan
 处理时间(V2): 2026/01/19 14:13:14 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 290nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.852	518631	100.000	59216	2466	1.069	--
总计		518631	100.000	59216			

图104 枸橼酸西地那非口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-C090402批-pH4.5介质-桨法-50转-45min-片6
供试品溶液-1




SZJ-4055

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm, 5 μm) 流速: 1.8ml/min
 柱温: 30°C 波长: 290nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4055 - 0-39/28-1159-2 - cbzj -C090402p-rcqx-2-pH4.5jz-jf50z-P1-jx.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4055 - SZJ-4055-rc-FX277.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4055 - 20260116-FX277.lcb
 样品瓶号: 2-8
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2026/01/17 00:35:35 实验者: wangdan
 处理时间 (V2): 2026/01/19 14:13:17 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 290nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.851	506722	100.000	57722	2463	1.069	--
总计		506722	100.000	57722			

图105 枸橼酸西地那非口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
 参比制剂-C090402批-pH4.5介质-桨法-50转-极限转速-片1
 供试品溶液-1




SZJ-4055

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm, 5 μm) 流速: 1.8ml/min
 柱温: 30°C 波长: 290nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4055 - 0-39/28-1160-2 - cbzj -C090402p-rcqx-2-pH4.5jz-jf50z-P2-jx.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4055 - SZJ-4055-rc-FX277.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4055 - 20260116-FX277.lcb
 样品瓶号: 2-17
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2026/01/17 00:39:29 实验者: wangdan
 处理时间 (V2): 2026/01/19 14:13:19 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 290nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.852	517083	100.000	58959	2466	1.070	--
总计		517083	100.000	58959			

图106 枸橼酸西地那非口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
 参比制剂-C090402批-pH4.5介质-桨法-50转-极限转速-片2
 供试品溶液-1




SZJ-4055

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm, 5 μm) 流速: 1.8ml/min
 柱温: 30°C 波长: 290nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4055 - 0-39/28-1161-2 - cbzj -C090402p-rcqx-2-pH4.5jz-jf50z-P3-jx.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4055 - SZJ-4055-rc-FX277.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4055 - 20260116-FX277.lcb
 样品瓶号: 2-26
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2026/01/17 00:43:24 实验者: wangdan
 处理时间 (V2): 2026/01/19 14:13:22 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 290nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.851	526641	100.000	60068	2466	1.072	--
总计		526641	100.000	60068			


图107 枸橼酸西地那非口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
 参比制剂-C090402批-pH4.5介质-桨法-50转-极限转速-片3
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm, 5 μm) 流速: 1.8ml/min
 柱温: 30°C 波长: 290nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4055 - 0-39/28-1162-2 - cbzj -C090402p-rcqx-2-pH4.5jz-jf50z-P4-jx.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4055 - SZJ-4055-rc-FX277.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4055 - 20260116-FX277.lcb
 样品瓶号: 2-35
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2026/01/17 00:47:19 实验者: wangdan
 处理时间 (V2): 2026/01/19 14:13:25 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 290nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.851	524620	100.000	59794	2467	1.071	--
总计		524620	100.000	59794			

图108 枸橼酸西地那非口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-C090402批-pH4.5介质-浆法-50转-极限转速-片4
供试品溶液-1




SZJ-4055

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm, 5 μm) 流速: 1.8ml/min
 柱温: 30°C 波长: 290nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4055 - 0-39/28-1163-2 - cbzj -C090402p-rcqx-2-pH4.5jz-jf50z-P5-jx.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4055 - SZJ-4055-rc-FX277.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4055 - 20260116-FX277.lcb
 样品瓶号: 2-44
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2026/01/17 00:51:12 实验者: wangdan
 处理时间(V2): 2026/01/19 14:13:28 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 290nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.851	525020	100.000	59873	2463	1.071	--
总计		525020	100.000	59873			

图109 枸橼酸西地那非口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
 参比制剂-C090402批-pH4.5介质-桨法-50转-极限转速-片5
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm, 5 μm) 流速: 1.8ml/min
 柱温: 30°C 波长: 290nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4055 - 0-39/28-1164-2 - cbzj -C090402p-rcqx-2-pH4.5jz-jf50z-P6-jx.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4055 - SZJ-4055-rc-FX277.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4055 - 20260116-FX277.lcb
 样品瓶号: 2-53
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2026/01/17 00:55:06 实验者: wangdan
 处理时间 (V2): 2026/01/19 14:13:31 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 290nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.852	518483	100.000	59142	2465	1.070	--
总计		518483	100.000	59142			

图110 枸橼酸西地那非口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-C090402批-pH4.5介质-浆法-50转-极限转速-片6
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm, 5 μm) 流速: 1.8ml/min
 柱温: 30°C 波长: 290nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4055 - 0-39/28-1165-2 - cbzj -C090402p-rcqx-2-pH4.5jz-jf50z-dz2-1.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4055 - SZJ-4055-rc-FX277.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4055 - 20260116-FX277.lcb
 样品瓶号: 2-27
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2026/01/17 00:59:08 实验者: wangdan
 处理时间(V2): 2026/01/19 14:13:33 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 290nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.837	483542	100.000	53970	2324	1.072	--
总计		483542	100.000	53970			

图111 枸橼酸西地那非口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-C090402批-pH4.5介质-桨法-50转
对照品溶液-2-1

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm, 5 μm) 流速: 1.8ml/min
 柱温: 30℃ 波长: 290nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4055 - 0-39/28-1166-2 - cbzj -C090402p-rcqx-2-pH4.5jz-jf50z-dz2-2.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4055 - SZJ-4055-rc-FX277.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4055 - 20260116-FX277.lcb
 样品瓶号: 2-27
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2026/01/17 01:03:44 实验者: wangdan
 处理时间 (V2): 2026/01/19 14:13:36 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 290nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.837	484560	100.000	54061	2326	1.070	--
总计		484560	100.000	54061			

图112 枸橼酸西地那非口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-C090402批-pH4.5介质-桨法-50转
对照品溶液-2-2




SZJ-4055

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm, 5 μm) 流速: 1.8ml/min
 柱温: 30°C 波长: 290nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4055 - 0-39/28-1167-2 - cbzj -C090402p-rcqx-1-pH6.8jz-jf50z-rj.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4055 - SZJ-4055-rc-FX277.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4055 - 20260116-FX277.lcb
 样品瓶号: 3-9
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2026/01/17 01:07:32 实验者: wangdan
 处理时间 (V2): 2026/01/19 14:13:39 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 290nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图113 枸橼酸西地那非口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-C090402批-pH6.8介质-桨法-50转
溶剂

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm, 5 μm) 流速: 1.8ml/min
 柱温: 30°C 波长: 290nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4055 - 0-39/28-1168-2 - cbzj -C090402p-rcqx-1-pH6.8jz-jf50z-dz1-1.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4055 - SZJ-4055-rc-FX277.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4055 - 20260116-FX277.lcb
 样品瓶号: 3-18
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2026/01/17 01:11:25 实验者: wangdan
 处理时间(V2): 2026/01/19 14:13:42 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 290nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.837	482875	100.000	53873	2320	1.072	--
总计		482875	100.000	53873			

图114 枸橼酸西地那非口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-C090402批-pH6.8介质-桨法-50转
对照品溶液-1-1

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm, 5 μm) 流速: 1.8ml/min
 柱温: 30°C 波长: 290nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4055 - 0-39/28-1169-2 - cbzj -C090402p-rcqx-1-pH6.8jz-jf50z-dz1-2.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4055 - SZJ-4055-rc-FX277.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4055 - 20260116-FX277.lcb
 样品瓶号: 3-18
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2026/01/17 01:15:17 实验者: wangdan
 处理时间 (V2): 2026/01/19 14:13:45 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 290nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.837	483534	100.000	53906	2322	1.071	--
总计		483534	100.000	53906			


图115 枸橼酸西地那非口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-C090402批-pH6.8介质-桨法-50转
对照品溶液-1-2

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm, 5 μm) 流速: 1.8ml/min
 柱温: 30°C 波长: 290nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4055 - 0-39/28-1170-2 - cbzj -C090402p-rcqx-1-pH6.8jz-jf50z-dz1-3.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4055 - SZJ-4055-rc-FX277.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4055 - 20260116-FX277.lcb
 样品瓶号: 3-18
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2026/01/17 01:19:09 实验者: wangdan
 处理时间(V2): 2026/01/19 14:13:47 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 290nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.837	482913	100.000	53888	2324	1.071	--
总计		482913	100.000	53888			


图116 枸橼酸西地那非口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
 参比制剂-C090402批-pH6.8介质-桨法-50转
 对照品溶液-1-3

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm, 5 μm) 流速: 1.8ml/min
 柱温: 30°C 波长: 290nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4055 - 0-39/28-1171-2 - cbzj -C090402p-rcqx-1-pH6.8jz-jf50z-dz1-4.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4055 - SZJ-4055-rc-FX277.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4055 - 20260116-FX277.lcb
 样品瓶号: 3-18
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2026/01/17 01:23:01 实验者: wangdan
 处理时间(V2): 2026/01/19 14:13:50 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 290nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.838	482740	100.000	53936	2326	1.072	--
总计		482740	100.000	53936			

图117 枸橼酸西地那非口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
 参比制剂-C090402批-pH6.8介质-桨法-50转
 对照品溶液-1-4

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm, 5 μm) 流速: 1.8ml/min
 柱温: 30°C 波长: 290nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4055 - 0-39/28-1172-2 - cbzj -C090402p-rcqx-1-pH6.8jz-jf50z-dz1-5.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4055 - SZJ-4055-rc-FX277.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4055 - 20260116-FX277.lcb
 样品瓶号: 3-18
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2026/01/17 01:26:53 实验者: wangdan
 处理时间(V2): 2026/01/19 14:13:53 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 290nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.838	482814	100.000	53920	2328	1.072	--
总计		482814	100.000	53920			

图118 枸橼酸西地那非口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
 参比制剂-C090402批-pH6.8介质-桨法-50转
 对照品溶液-1-5




SZJ-4055

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm, 5 μm) 流速: 1.8ml/min
 柱温: 30°C 波长: 290nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4055 - 0-39/28-1173-2 - cbzj -C090402p-rcqx-1-pH6.8jz-jf50z-P1-2min.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4055 - SZJ-4055-rc-FX277.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4055 - 20260116-FX277.lcb
 样品瓶号: 3-1
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2026/01/17 01:30:45 实验者: wangdan
 处理时间 (V2): 2026/01/19 14:13:56 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 290nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.857	248600	100.000	28427	2488	1.056	--
总计		248600	100.000	28427			

图119 枸橼酸西地那非口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
 参比制剂-C090402批-pH6.8介质-桨法-50转-2min-片1
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm, 5 μm) 流速: 1.8ml/min
 柱温: 30°C 波长: 290nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4055 - 0-39/28-1174-2 - cbzj -C090402p-rcqx-1-pH6.8jz-jf50z-P2-2min.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4055 - SZJ-4055-rc-FX277.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4055 - 20260116-FX277.lcb
 样品瓶号: 3-10
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2026/01/17 01:34:37 实验者: wangdan
 处理时间 (V2): 2026/01/19 14:13:58 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 290nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.857	249015	100.000	28484	2489	1.053	--
总计		249015	100.000	28484			

图120 枸橼酸西地那非口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-C090402批-pH6.8介质-桨法-50转-2min-片2
供试品溶液-1




SZJ-4055

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm, 5 μm) 流速: 1.8ml/min
 柱温: 30°C 波长: 290nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4055 - 0-39/28-1175-2 - cbzj -C090402p-rcqx-1-pH6.8jz-jf50z-P3-2min.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4055 - SZJ-4055-rc-FX277.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4055 - 20260116-FX277.lcb
 样品瓶号: 3-19
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2026/01/17 01:38:29 实验者: wangdan
 处理时间 (V2): 2026/01/19 14:14:01 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 290nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.857	254313	100.000	29121	2490	1.054	--
总计		254313	100.000	29121			

图121 枸橼酸西地那非口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
 参比制剂-C090402批-pH6.8介质-桨法-50转-2min-片3
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm, 5 μm) 流速: 1.8ml/min
 柱温: 30°C 波长: 290nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4055 - 0-39/28-1176-2 - cbzj -C090402p-rcqx-1-pH6.8jz-jf50z-P4-2min.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4055 - SZJ-4055-rc-FX277.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4055 - 20260116-FX277.lcb
 样品瓶号: 3-28
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2026/01/17 01:42:21 实验者: wangdan
 处理时间 (V2): 2026/01/19 14:14:04 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 290nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.857	259157	100.000	29574	2483	1.054	--
总计		259157	100.000	29574			

图122 枸橼酸西地那非口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-C090402批-pH6.8介质-桨法-50转-2min-片4
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm, 5 μm) 流速: 1.8ml/min
 柱温: 30°C 波长: 290nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4055 - 0-39/28-1177-2 - cbzj -C090402p-rcqx-1-pH6.8jz-jf50z-P5-2min.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4055 - SZJ-4055-rc-FX277.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4055 - 20260116-FX277.lcb
 样品瓶号: 3-37
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2026/01/17 01:46:13 实验者: wangdan
 处理时间 (V2): 2026/01/19 14:14:07 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 290nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.857	242649	100.000	27862	2493	1.052	--
总计		242649	100.000	27862			

图123 枸橼酸西地那非口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-C090402批-pH6.8介质-桨法-50转-2min-片5
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm, 5 μm) 流速: 1.8ml/min
 柱温: 30°C 波长: 290nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4055 - 0-39/28-1178-2 - cbzj -C090402p-rcqx-1-pH6.8jz-jf50z-P6-2min.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4055 - SZJ-4055-rc-FX277.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4055 - 20260116-FX277.lcb
 样品瓶号: 3-46
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2026/01/17 01:50:05 实验者: wangdan
 处理时间(V2): 2026/01/19 14:14:10 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 290nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.858	239019	100.000	27417	2491	1.053	--
总计		239019	100.000	27417			

图124 枸橼酸西地那非口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
 参比制剂-C090402批-pH6.8介质-桨法-50转-2min-片6
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm, 5 μm) 流速: 1.8ml/min
 柱温: 30°C 波长: 290nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4055 - 0-39/28-1179-2 - cbzj -C090402p-rcqx-1-pH6.8jz-jf50z-P1-5min.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4055 - SZJ-4055-rc-FX277.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4055 - 20260116-FX277.lcb
 样品瓶号: 3-2
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2026/01/17 01:53:56 实验者: wangdan
 处理时间 (V2): 2026/01/19 14:14:13 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 290nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.857	285970	100.000	32795	2490	1.057	--
总计		285970	100.000	32795			

图125 枸橼酸西地那非口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-C090402批-pH6.8介质-桨法-50转-5min-片1
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm, 5 μm) 流速: 1.8ml/min
 柱温: 30°C 波长: 290nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4055 - 0-39/28-1180-2 - cbzj -C090402p-rcqx-1-pH6.8jz-jf50z-P2-5min.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4055 - SZJ-4055-rc-FX277.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4055 - 20260116-FX277.lcb
 样品瓶号: 3-11
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2026/01/17 01:57:48 实验者: wangdan
 处理时间(V2): 2026/01/19 14:14:15 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 290nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.857	277559	100.000	31833	2495	1.059	--
总计		277559	100.000	31833			

图126 枸橼酸西地那非口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-C090402批-pH6.8介质-桨法-50转-5min-片2
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm, 5 μm) 流速: 1.8ml/min
 柱温: 30°C 波长: 290nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4055 - 0-39/28-1181-2 - cbzj -C090402p-rcqx-1-pH6.8jz-jf50z-P3-5min.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4055 - SZJ-4055-rc-FX277.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4055 - 20260116-FX277.lcb
 样品瓶号: 3-20
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2026/01/17 02:01:40 实验者: wangdan
 处理时间 (V2): 2026/01/19 14:14:18 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 290nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.857	283448	100.000	32525	2495	1.058	--
总计		283448	100.000	32525			

图127 枸橼酸西地那非口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-C090402批-pH6.8介质-桨法-50转-5min-片3
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm, 5 μm) 流速: 1.8ml/min
 柱温: 30°C 波长: 290nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4055 - 0-39/28-1182-2 - cbzj -C090402p-rcqx-1-pH6.8jz-jf50z-P4-5min.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4055 - SZJ-4055-rc-FX277.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4055 - 20260116-FX277.lcb
 样品瓶号: 3-29
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2026/01/17 02:05:31 实验者: wangdan
 处理时间 (V2): 2026/01/19 14:14:21 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 290nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.857	281278	100.000	32210	2488	1.056	--
总计		281278	100.000	32210			

图128 枸橼酸西地那非口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
 参比制剂-C090402批-pH6.8介质-桨法-50转-5min-片4
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm, 5 μm) 流速: 1.8ml/min
 柱温: 30°C 波长: 290nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4055 - 0-39/28-1183-2 - cbzj -C090402p-rcqx-1-pH6.8jz-jf50z-P5-5min.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4055 - SZJ-4055-rc-FX277.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4055 - 20260116-FX277.lcb
 样品瓶号: 3-38
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2026/01/17 02:09:23 实验者: wangdan
 处理时间(V2): 2026/01/19 14:14:24 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 290nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.856	282568	100.000	32366	2487	1.056	--
总计		282568	100.000	32366			

图129 枸橼酸西地那非口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
 参比制剂-C090402批-pH6.8介质-桨法-50转-5min-片5
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm, 5 μm) 流速: 1.8ml/min
 柱温: 30°C 波长: 290nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4055 - 0-39/28-1184-2 - cbzj -C090402p-rcqx-1-pH6.8jz-jf50z-P6-5min.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4055 - SZJ-4055-rc-FX277.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4055 - 20260116-FX277.lcb
 样品瓶号: 3-47
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2026/01/17 02:13:14 实验者: wangdan
 处理时间 (V2): 2026/01/19 14:14:27 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 290nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.857	266407	100.000	30500	2486	1.060	--
总计		266407	100.000	30500			

图130 枸橼酸西地那非口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
 参比制剂-C090402批-pH6.8介质-桨法-50转-5min-片6
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm, 5 μm) 流速: 1.8ml/min
 柱温: 30°C 波长: 290nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4055 - 0-39/28-1185-2 - cbzj -C090402p-rcqx-1-pH6.8jz-jf50z-P1-10min.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4055 - SZJ-4055-rc-FX277.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4055 - 20260116-FX277.lcb
 样品瓶号: 3-3
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2026/01/17 02:17:06 实验者: wangdan
 处理时间(V2): 2026/01/19 14:14:29 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 290nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.856	264115	100.000	30267	2488	1.055	--
总计		264115	100.000	30267			


图131 枸橼酸西地那非口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-C090402批-pH6.8介质-桨法-50转-10min-片1
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm, 5 μm) 流速: 1.8ml/min
 柱温: 30°C 波长: 290nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4055 - 0-39/28-1186-2 - cbzj -C090402p-rcqx-1-pH6.8jz-jf50z-P2-10min.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4055 - SZJ-4055-rc-FX277.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4055 - 20260116-FX277.lcb
 样品瓶号: 3-12
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2026/01/17 02:20:58 实验者: wangdan
 处理时间(V2): 2026/01/19 14:14:32 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 290nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.856	253646	100.000	29080	2491	1.057	--
总计		253646	100.000	29080			

图132 枸橼酸西地那非口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-C090402批-pH6.8介质-桨法-50转-10min-片2
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm, 5 μm) 流速: 1.8ml/min
 柱温: 30°C 波长: 290nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4055 - 0-39/28-1187-2 - cbzj -C090402p-rcqx-1-pH6.8jz-jf50z-P3-10min.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4055 - SZJ-4055-rc-FX277.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4055 - 20260116-FX277.lcb
 样品瓶号: 3-21
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2026/01/17 02:24:49 实验者: wangdan
 处理时间 (V2): 2026/01/19 14:14:35 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 290nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.857	258429	100.000	29563	2482	1.060	--
总计		258429	100.000	29563			


图133 枸橼酸西地那非口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-C090402批-pH6.8介质-桨法-50转-10min-片3
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm, 5 μm) 流速: 1.8ml/min
 柱温: 30°C 波长: 290nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4055 - 0-39/28-1188-2 - cbzj -C090402p-rcqx-1-pH6.8jz-jf50z-P4-10min.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4055 - SZJ-4055-rc-FX277.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4055 - 20260116-FX277.lcb
 样品瓶号: 3-30
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2026/01/17 02:28:41 实验者: wangdan
 处理时间(V2): 2026/01/19 14:14:38 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 290nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.857	277829	100.000	31877	2496	1.059	--
总计		277829	100.000	31877			


图134 枸橼酸西地那非口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
 参比制剂-C090402批-pH6.8介质-桨法-50转-10min-片4
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm, 5 μm) 流速: 1.8ml/min
 柱温: 30°C 波长: 290nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4055 - 0-39/28-1189-2 - cbzj -C090402p-rcqx-1-pH6.8jz-jf50z-P5-10min.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4055 - SZJ-4055-rc-FX277.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4055 - 20260116-FX277.lcb
 样品瓶号: 3-39 版本号: 6.115
 进样体积: 10 μl 实验者: wangdan
 进样时间: 2026/01/17 02:32:32 处理者: wangdan
 处理时间 (V2): 2026/01/19 14:14:41
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 290nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.856	287501	100.000	32979	2487	1.056	--
总计		287501	100.000	32979			


图135 枸橼酸西地那非口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-C090402批-pH6.8介质-桨法-50转-10min-片5
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm, 5 μm) 流速: 1.8ml/min
 柱温: 30°C 波长: 290nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4055 - 0-39/28-1190-2 - cbzj -C090402p-rcqx-1-pH6.8jz-jf50z-P6-10min.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4055 - SZJ-4055-rc-FX277.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4055 - 20260116-FX277.lcb
 样品瓶号: 3-48
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2026/01/17 02:36:24 实验者: wangdan
 处理时间(V2): 2026/01/19 14:14:43 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 290nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.856	286904	100.000	32887	2488	1.058	--
总计		286904	100.000	32887			

图136 枸橼酸西地那非口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-C090402批-pH6.8介质-桨法-50转-10min-片6
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm, 5 μm) 流速: 1.8ml/min
 柱温: 30°C 波长: 290nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4055 - 0-39/28-1191-2 - cbzj -C090402p-rcqx-1-pH6.8jz-jf50z-P1-15min.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4055 - SZJ-4055-rc-FX277.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4055 - 20260116-FX277.lcb
 样品瓶号: 3-4
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2026/01/17 02:40:15 实验者: wangdan
 处理时间 (V2): 2026/01/19 14:14:46 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 290nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.856	266026	100.000	30411	2481	1.065	--
总计		266026	100.000	30411			


图137 枸橼酸西地那非口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-C090402批-pH6.8介质-桨法-50转-15min-片1
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm, 5 μm) 流速: 1.8ml/min
 柱温: 30°C 波长: 290nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4055 - 0-39/28-1192-2 - cbzj -C090402p-rcqx-1-pH6.8jz-jf50z-P2-15min.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4055 - SZJ-4055-rc-FX277.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4055 - 20260116-FX277.lcb
 样品瓶号: 3-13
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2026/01/17 02:44:07 实验者: wangdan
 处理时间(V2): 2026/01/19 14:14:49 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 290nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.855	270348	100.000	30930	2486	1.062	--
总计		270348	100.000	30930			

图138 枸橼酸西地那非口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-C090402批-pH6.8介质-桨法-50转-15min-片2
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm, 5 μm) 流速: 1.8ml/min
 柱温: 30°C 波长: 290nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4055 - 0-39/28-1193-2 - cbzj -C090402p-rcqx-1-pH6.8jz-jf50z-P3-15min.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4055 - SZJ-4055-rc-FX277.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4055 - 20260116-FX277.lcb
 样品瓶号: 3-22
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2026/01/17 02:47:58 实验者: wangdan
 处理时间 (V2): 2026/01/19 14:14:52 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 290nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.856	279249	100.000	32006	2487	1.057	--
总计		279249	100.000	32006			


图139 枸橼酸西地那非口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-C090402批-pH6.8介质-桨法-50转-15min-片3
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm, 5 μm) 流速: 1.8ml/min
 柱温: 30°C 波长: 290nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4055 - 0-39/28-1194-2 - cbzj -C090402p-rcqx-1-pH6.8jz-jf50z-P4-15min.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4055 - SZJ-4055-rc-FX277.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4055 - 20260116-FX277.lcb
 样品瓶号: 3-31
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2026/01/17 02:51:50 实验者: wangdan
 处理时间(V2): 2026/01/19 14:14:55 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 290nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.856	279398	100.000	31980	2485	1.061	--
总计		279398	100.000	31980			

图140 枸橼酸西地那非口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
 参比制剂-C090402批-pH6.8介质-桨法-50转-15min-片4
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm, 5 μm) 流速: 1.8ml/min
 柱温: 30℃ 波长: 290nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4055 - 0-39/28-1195-2 - cbzj -C090402p-rcqx-1-pH6.8jz-jf50z-P5-15min.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4055 - SZJ-4055-rc-FX277.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4055 - 20260116-FX277.lcb
 样品瓶号: 3-40
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2026/01/17 02:55:41 实验者: wangdan
 处理时间(V2): 2026/01/19 14:14:57 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 290nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.856	287724	100.000	32989	2488	1.059	--
总计		287724	100.000	32989			


图141 枸橼酸西地那非口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
 参比制剂-C090402批-pH6.8介质-桨法-50转-15min-片5
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm, 5 μm) 流速: 1.8ml/min
 柱温: 30°C 波长: 290nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4055 - 0-39/28-1196-2 - cbzj -C090402p-rcqx-1-pH6.8jz-jf50z-P6-15min.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4055 - SZJ-4055-rc-FX277.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4055 - 20260116-FX277.lcb
 样品瓶号: 3-49
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2026/01/17 02:59:33 实验者: wangdan
 处理时间(V2): 2026/01/19 14:15:00 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 290nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.856	286975	100.000	31313	2435	1.132	--
总计		286975	100.000	31313			


图142 枸橼酸西地那非口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
 参比制剂-C090402批-pH6.8介质-桨法-50转-15min-片6
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm, 5 μm) 流速: 1.8ml/min
 柱温: 30°C 波长: 290nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4055 - 0-39/28-1197-2 - cbzj -C090402p-rcqx-1-pH6.8jz-jf50z-P1-20min.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4055 - SZJ-4055-rc-FX277.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4055 - 20260116-FX277.lcb
 样品瓶号: 3-5
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2026/01/17 03:03:24 实验者: wangdan
 处理时间 (V2): 2026/01/19 14:15:03 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 290nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.856	257990	100.000	29580	2484	1.057	--
总计		257990	100.000	29580			

图143 枸橼酸西地那非口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-C090402批-pH6.8介质-桨法-50转-20min-片1
供试品溶液-1




SZJ-4055

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm, 5 μm) 流速: 1.8ml/min
 柱温: 30°C 波长: 290nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4055 - 0-39/28-1198-2 - cbzj -C090402p-rcqx-1-pH6.8jz-jf50z-P2-20min.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4055 - SZJ-4055-rc-FX277.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4055 - 20260116-FX277.lcb
 样品瓶号: 3-14
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2026/01/17 03:07:16 实验者: wangdan
 处理时间 (V2): 2026/01/19 14:15:06 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 290nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.855	269477	100.000	30980	2494	1.057	--
总计		269477	100.000	30980			

图144 枸橼酸西地那非口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
 参比制剂-C090402批-pH6.8介质-桨法-50转-20min-片2
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm, 5 μm) 流速: 1.8ml/min
 柱温: 30°C 波长: 290nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4055 - 0-39/28-1199-2 - cbzj -C090402p-rcqx-1-pH6.8jz-jf50z-P3-20min.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4055 - SZJ-4055-rc-FX277.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4055 - 20260116-FX277.lcb
 样品瓶号: 3-23
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2026/01/17 03:11:08 实验者: wangdan
 处理时间(V2): 2026/01/19 14:15:08 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 290nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.855	269357	100.000	30888	2487	1.055	--
总计		269357	100.000	30888			


图145 枸橼酸西地那非口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
 参比制剂-C090402批-pH6.8介质-桨法-50转-20min-片3
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm, 5 μm) 流速: 1.8ml/min
 柱温: 30°C 波长: 290nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4055 - 0-39/28-1200-2 - cbzj -C090402p-rcqx-1-pH6.8jz-jf50z-P4-20min.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4055 - SZJ-4055-rc-FX277.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4055 - 20260116-FX277.lcb
 样品瓶号: 3-32
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2026/01/17 03:15:00 实验者: wangdan
 处理时间 (V2): 2026/01/19 14:15:11 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 290nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.855	276196	100.000	31623	2485	1.059	--
总计		276196	100.000	31623			


图146 枸橼酸西地那非口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
 参比制剂-C090402批-pH6.8介质-桨法-50转-20min-片4
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm, 5 μm) 流速: 1.8ml/min
 柱温: 30°C 波长: 290nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4055 - 0-39/28-1201-2 - cbzj -C090402p-rcqx-1-pH6.8jz-jf50z-P5-20min.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4055 - SZJ-4055-rc-FX277.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4055 - 20260116-FX277.lcb
 样品瓶号: 3-41
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2026/01/17 03:18:52 实验者: wangdan
 处理时间 (V2): 2026/01/19 14:15:14 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 290nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.856	264428	100.000	30247	2487	1.059	--
总计		264428	100.000	30247			


图147 枸橼酸西地那非口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
 参比制剂-C090402批-pH6.8介质-桨法-50转-20min-片5
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm, 5 μm) 流速: 1.8ml/min
 柱温: 30°C 波长: 290nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4055 - 0-39/28-1202-2 - cbzj -C090402p-rcqx-1-pH6.8jz-jf50z-P6-20min.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4055 - SZJ-4055-rc-FX277.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4055 - 20260116-FX277.lcb
 样品瓶号: 3-50
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2026/01/17 03:22:43 实验者: wangdan
 处理时间(V2): 2026/01/19 14:15:17 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 290nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.856	266337	100.000	30584	2499	1.059	--
总计		266337	100.000	30584			


图148 枸橼酸西地那非口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
 参比制剂-C090402批-pH6.8介质-桨法-50转-20min-片6
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm, 5 μm) 流速: 1.8ml/min
 柱温: 30°C 波长: 290nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4055 - 0-39/28-1203-2 - cbzj -C090402p-rcqx-1-pH6.8jz-jf50z-P1-30min.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4055 - SZJ-4055-rc-FX277.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4055 - 20260116-FX277.lcb
 样品瓶号: 3-6
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2026/01/17 03:26:35 实验者: wangdan
 处理时间 (V2): 2026/01/19 14:15:20 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 290nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.856	254771	100.000	29194	2490	1.055	--
总计		254771	100.000	29194			


图149 枸橼酸西地那非口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
 参比制剂-C090402批-pH6.8介质-桨法-50转-30min-片1
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm, 5 μm) 流速: 1.8ml/min
 柱温: 30°C 波长: 290nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4055 - 0-39/28-1204-2 - cbzj -C090402p-rcqx-1-pH6.8jz-jf50z-P2-30min.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4055 - SZJ-4055-rc-FX277.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4055 - 20260116-FX277.lcb
 样品瓶号: 3-15
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2026/01/17 03:30:26 实验者: wangdan
 处理时间 (V2): 2026/01/19 14:15:23 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 290nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.856	267227	100.000	30500	2468	1.067	--
总计		267227	100.000	30500			

图150 枸橼酸西地那非口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
 参比制剂-C090402批-pH6.8介质-桨法-50转-30min-片2
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm, 5 μm) 流速: 1.8ml/min
 柱温: 30°C 波长: 290nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4055 - 0-39/28-1205-2 - cbzj -C090402p-rcqx-1-pH6.8jz-jf50z-P3-30min.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4055 - SZJ-4055-rc-FX277.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4055 - 20260116-FX277.lcb
 样品瓶号: 3-24
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2026/01/17 03:34:18 实验者: wangdan
 处理时间 (V2): 2026/01/19 14:15:26 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 290nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.856	257852	100.000	29549	2486	1.058	--
总计		257852	100.000	29549			


图151 枸橼酸西地那非口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-C090402批-pH6.8介质-桨法-50转-30min-片3
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm, 5 μm) 流速: 1.8ml/min
 柱温: 30°C 波长: 290nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4055 - 0-39/28-1206-2 - cbzj -C090402p-rcqx-1-pH6.8jz-jf50z-P4-30min.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4055 - SZJ-4055-rc-FX277.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4055 - 20260116-FX277.lcb
 样品瓶号: 3-33
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2026/01/17 03:38:10 实验者: wangdan
 处理时间 (V2): 2026/01/19 14:15:28 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 290nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.856	267036	100.000	30537	2489	1.057	--
总计		267036	100.000	30537			

图152 枸橼酸西地那非口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-C090402批-pH6.8介质-桨法-50转-30min-片4
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm, 5 μm) 流速: 1.8ml/min
 柱温: 30°C 波长: 290nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4055 - 0-39/28-1207-2 - cbzj -C090402p-rcqx-1-pH6.8jz-jf50z-P5-30min.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4055 - SZJ-4055-rc-FX277.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4055 - 20260116-FX277.lcb
 样品瓶号: 3-42
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2026/01/17 03:42:01 实验者: wangdan
 处理时间 (V2): 2026/01/19 14:15:31 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 290nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.856	260021	100.000	29765	2487	1.058	--
总计		260021	100.000	29765			


图153 枸橼酸西地那非口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-C090402批-pH6.8介质-桨法-50转-30min-片5
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm, 5 μm) 流速: 1.8ml/min
 柱温: 30°C 波长: 290nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4055 - 0-39/28-1208-2 - cbzj -C090402p-rcqx-1-pH6.8jz-jf50z-P6-30min.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4055 - SZJ-4055-rc-FX277.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4055 - 20260116-FX277.lcb
 样品瓶号: 3-51
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2026/01/17 03:45:52 实验者: wangdan
 处理时间 (V2): 2026/01/19 14:15:34 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 290nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.856	267280	100.000	30685	2492	1.056	--
总计		267280	100.000	30685			


图154 枸橼酸西地那非口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-C090402批-pH6.8介质-桨法-50转-30min-片6
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm, 5 μm) 流速: 1.8ml/min
 柱温: 30°C 波长: 290nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4055 - 0-39/28-1209-2 - cbzj -C090402p-rcqx-1-pH6.8jz-jf50z-P1-45min.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4055 - SZJ-4055-rc-FX277.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4055 - 20260116-FX277.lcb
 样品瓶号: 3-7
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2026/01/17 03:49:44 实验者: wangdan
 处理时间 (V2): 2026/01/19 14:15:37 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 290nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.856	253812	100.000	29091	2489	1.057	--
总计		253812	100.000	29091			

图155 枸橼酸西地那非口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
 参比制剂-C090402批-pH6.8介质-桨法-50转-45min-片1
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm, 5 μm) 流速: 1.8ml/min
 柱温: 30°C 波长: 290nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4055 - 0-39/28-1210-2 - cbzj -C090402p-rcqx-1-pH6.8jz-jf50z-P2-45min.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4055 - SZJ-4055-rc-FX277.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4055 - 20260116-FX277.lcb
 样品瓶号: 3-16
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2026/01/17 03:53:35 实验者: wangdan
 处理时间 (V2): 2026/01/19 14:15:40 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 290nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.856	253931	100.000	29185	2496	1.057	--
总计		253931	100.000	29185			

图156 枸橼酸西地那非口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-C090402批-pH6.8介质-桨法-50转-45min-片2
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm, 5 μm) 流速: 1.8ml/min
 柱温: 30°C 波长: 290nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4055 - 0-39/28-1211-2 - cbzj -C090402p-rcqx-1-pH6.8jz-jf50z-P3-45min.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4055 - SZJ-4055-rc-FX277.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4055 - 20260116-FX277.lcb
 样品瓶号: 3-25
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2026/01/17 03:57:27 实验者: wangdan
 处理时间 (V2): 2026/01/19 14:15:42 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 290nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.857	255650	100.000	29373	2499	1.057	--
总计		255650	100.000	29373			


图157 枸橼酸西地那非口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-C090402批-pH6.8介质-桨法-50转-45min-片3
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm, 5 μm) 流速: 1.8ml/min
 柱温: 30°C 波长: 290nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4055 - 0-39/28-1212-2 - cbzj -C090402p-rcqx-1-pH6.8jz-jf50z-P4-45min.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4055 - SZJ-4055-rc-FX277.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4055 - 20260116-FX277.lcb
 样品瓶号: 3-34
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2026/01/17 04:01:18 实验者: wangdan
 处理时间 (V2): 2026/01/19 14:15:45 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 290nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.856	267607	100.000	30710	2494	1.056	--
总计		267607	100.000	30710			

图158 枸橼酸西地那非口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-C090402批-pH6.8介质-桨法-50转-45min-片4
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm, 5 μm) 流速: 1.8ml/min
 柱温: 30°C 波长: 290nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4055 - 0-39/28-1213-2 - cbzj -C090402p-rcqx-1-pH6.8jz-jf50z-P5-45min.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4055 - SZJ-4055-rc-FX277.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4055 - 20260116-FX277.lcb
 样品瓶号: 3-43
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2026/01/17 04:05:09 实验者: wangdan
 处理时间 (V2): 2026/01/19 14:15:48 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 290nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.856	258149	100.000	29579	2490	1.057	--
总计		258149	100.000	29579			

图159 枸橼酸西地那非口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-C090402批-pH6.8介质-桨法-50转-45min-片5
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm, 5 μm) 流速: 1.8ml/min
 柱温: 30°C 波长: 290nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4055 - 0-39/28-1214-2 - cbzj -C090402p-rcqx-1-pH6.8jz-jf50z-P6-45min.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4055 - SZJ-4055-rc-FX277.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4055 - 20260116-FX277.lcb
 样品瓶号: 3-52
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2026/01/17 04:09:00 实验者: wangdan
 处理时间 (V2): 2026/01/19 14:15:51 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 290nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.857	248026	100.000	28420	2494	1.055	--
总计		248026	100.000	28420			

图160 枸橼酸西地那非口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-C090402批-pH6.8介质-桨法-50转-45min-片6
供试品溶液-1




SZJ-4055

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm, 5 μm) 流速: 1.8ml/min
 柱温: 30°C 波长: 290nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4055 - 0-39/28-1215-2 - cbzj -C090402p-rcqx-1-pH6.8jz-jf50z-P1-jx.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4055 - SZJ-4055-rc-FX277.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4055 - 20260116-FX277.lcb
 样品瓶号: 3-8
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2026/01/17 04:12:52 实验者: wangdan
 处理时间 (V2): 2026/01/19 14:15:54 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 290nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.856	245143	100.000	28105	2489	1.056	--
总计		245143	100.000	28105			

图161 枸橼酸西地那非口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
 参比制剂-C090402批-pH6.8介质-浆法-50转-极限转速-片1
 供试品溶液-1




SZJ-4055

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm, 5 μm) 流速: 1.8ml/min
 柱温: 30°C 波长: 290nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4055 - 0-39/28-1216-2 - cbzj -C090402p-rcqx-1-pH6.8jz-jf50z-P2-jx.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4055 - SZJ-4055-rc-FX277.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4055 - 20260116-FX277.lcb
 样品瓶号: 3-17
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2026/01/17 04:16:45 实验者: wangdan
 处理时间(V2): 2026/01/19 14:15:56 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 290nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.856	244424	100.000	28015	2491	1.055	--
总计		244424	100.000	28015			

图162 枸橼酸西地那非口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
 参比制剂-C090402批-pH6.8介质-浆法-50转-极限转速-片2
 供试品溶液-1




SZJ-4055

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm, 5 μm) 流速: 1.8ml/min
 柱温: 30°C 波长: 290nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4055 - 0-39/28-1217-2 - cbzj -C090402p-rcqx-1-pH6.8jz-jf50z-P3-jx.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4055 - SZJ-4055-rc-FX277.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4055 - 20260116-FX277.lcb
 样品瓶号: 3-26
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2026/01/17 04:20:37 实验者: wangdan
 处理时间 (V2): 2026/01/19 14:15:59 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 290nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.856	252332	100.000	28926	2488	1.058	--
总计		252332	100.000	28926			

图163 枸橼酸西地那非口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
 参比制剂-C090402批-pH6.8介质-浆法-50转-极限转速-片3
 供试品溶液-1




SZJ-4055

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm, 5 μm) 流速: 1.8ml/min
 柱温: 30°C 波长: 290nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4055 - 0-39/28-1218-2 - cbzj -C090402p-rcqx-1-pH6.8jz-jf50z-P4-jx.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4055 - SZJ-4055-rc-FX277.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4055 - 20260116-FX277.lcb
 样品瓶号: 3-35
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2026/01/17 04:24:28 实验者: wangdan
 处理时间 (V2): 2026/01/19 14:16:02 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 290nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.856	251591	100.000	28875	2491	1.055	--
总计		251591	100.000	28875			

图164 枸橼酸西地那非口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
 参比制剂-C090402批-pH6.8介质-浆法-50转-极限转速-片4
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm, 5 μm) 流速: 1.8ml/min
 柱温: 30°C 波长: 290nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4055 - 0-39/28-1219-2 - cbzj -C090402p-rcqx-1-pH6.8jz-jf50z-P5-jx.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4055 - SZJ-4055-rc-FX277.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4055 - 20260116-FX277.lcb
 样品瓶号: 3-44
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2026/01/17 04:28:20 实验者: wangdan
 处理时间(V2): 2026/01/19 14:16:05 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 290nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.857	248005	100.000	28441	2492	1.058	--
总计		248005	100.000	28441			

图165 枸橼酸西地那非口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-C090402批-pH6.8介质-浆法-50转-极限转速-片5
供试品溶液-1




SZJ-4055

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm, 5 μm) 流速: 1.8ml/min
 柱温: 30°C 波长: 290nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4055 - 0-39/28-1220-2 - cbzj -C090402p-rcqx-1-pH6.8jz-jf50z-P6-jx.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4055 - SZJ-4055-rc-FX277.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4055 - 20260116-FX277.lcb
 样品瓶号: 3-53
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2026/01/17 04:32:12 实验者: wangdan
 处理时间 (V2): 2026/01/19 14:16:08 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 290nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.857	260952	100.000	29949	2486	1.059	--
总计		260952	100.000	29949			


图166 枸橼酸西地那非口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
 参比制剂-C090402批-pH6.8介质-浆法-50转-极限转速-片6
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm, 5 μm) 流速: 1.8ml/min
 柱温: 30℃ 波长: 290nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4055 - 0-39/28-1221-2 - cbzj -C090402p-rcqx-1-pH6.8jz-jf50z-dz2-1.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4055 - SZJ-4055-rc-FX277.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4055 - 20260116-FX277.lcb
 样品瓶号: 3-27
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2026/01/17 04:36:04 实验者: wangdan
 处理时间(V2): 2026/01/19 14:16:11 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 290nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.835	484364	100.000	53936	2322	1.074	--
总计		484364	100.000	53936			

图167 枸橼酸西地那非口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-C090402批-pH6.8介质-桨法-50转
对照品溶液-2-1

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm, 5 μm) 流速: 1.8ml/min
 柱温: 30℃ 波长: 290nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4055 - 0-39/28-1222-2 - cbzj -C090402p-rcqx-1-pH6.8jz-jf50z-dz2-2.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4055 - SZJ-4055-rc-FX277.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4055 - 20260116-FX277.lcb
 样品瓶号: 3-27
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2026/01/17 04:39:56 实验者: wangdan
 处理时间(V2): 2026/01/19 14:16:14 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 290nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.836	484344	100.000	54036	2327	1.074	--
总计		484344	100.000	54036			

图168 枸橼酸西地那非口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-C090402批-pH6.8介质-桨法-50转
对照品溶液-2-2




SZJ-4055

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm, 5 μm) 流速: 1.8ml/min
 柱温: 30°C 波长: 290nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4055 - 0-39/28-1223-2 - cbzj -C090402p-rcqx-2-pH6.8jz-jf50z-rj.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4055 - SZJ-4055-rc-FX277.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4055 - 20260116-FX277.lcb
 样品瓶号: 4-9
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2026/01/17 04:43:51 实验者: wangdan
 处理时间 (V2): 2026/01/19 14:16:16 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 290nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图169 枸橼酸西地那非口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-C090402批-pH6.8介质-桨法-50转
溶剂

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm, 5 μm) 流速: 1.8ml/min
 柱温: 30°C 波长: 290nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4055 - 0-39/28-1224-2 - cbzj -C090402p-rcqx-2-pH6.8jz-j f50z-dz1-1.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4055 - SZJ-4055-rc-FX277.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4055 - 20260116-FX277.lcb
 样品瓶号: 4-18
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2026/01/17 04:47:45 实验者: wangdan
 处理时间(V2): 2026/01/19 14:16:19 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 290nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.836	482420	100.000	53849	2325	1.074	--
总计		482420	100.000	53849			


图170 枸橼酸西地那非口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-C090402批-pH6.8介质-桨法-50转
对照品溶液-1-1

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm, 5 μm) 流速: 1.8ml/min
 柱温: 30℃ 波长: 290nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4055 - 0-39/28-1225-2 - cbzj -C090402p-rcqx-2-pH6.8jz-jf50z-dz1-2.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4055 - SZJ-4055-rc-FX277.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4055 - 20260116-FX277.lcb
 样品瓶号: 4-18
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2026/01/17 04:51:40 实验者: wangdan
 处理时间(V2): 2026/01/19 14:16:22 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 290nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.836	483937	100.000	54016	2326	1.075	--
总计		483937	100.000	54016			

图171 枸橼酸西地那非口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-C090402批-pH6.8介质-桨法-50转
对照品溶液-1-2

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm, 5 μm) 流速: 1.8ml/min
 柱温: 30℃ 波长: 290nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4055 - 0-39/28-1226-2 - cbzj -C090402p-rcqx-2-pH6.8jz-jf50z-dz1-3.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4055 - SZJ-4055-rc-FX277.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4055 - 20260116-FX277.lcb
 样品瓶号: 4-18
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2026/01/17 04:55:35 实验者: wangdan
 处理时间(V2): 2026/01/19 14:16:25 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 290nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.836	484025	100.000	54015	2327	1.074	--
总计		484025	100.000	54015			


图172 枸橼酸西地那非口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-C090402批-pH6.8介质-桨法-50转
对照品溶液-1-3

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm, 5 μm) 流速: 1.8ml/min
 柱温: 30℃ 波长: 290nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4055 - 0-39/28-1227-2 - cbzj -C090402p-rcqx-2-pH6.8jz-jf50z-dz1-4.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4055 - SZJ-4055-rc-FX277.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4055 - 20260116-FX277.lcb
 样品瓶号: 4-18
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2026/01/17 04:59:29 实验者: wangdan
 处理时间(V2): 2026/01/19 14:16:28 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 290nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.836	484254	100.000	54005	2321	1.074	--
总计		484254	100.000	54005			

图173 枸橼酸西地那非口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
 参比制剂-C090402批-pH6.8介质-桨法-50转
 对照品溶液-1-4

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm, 5 μm) 流速: 1.8ml/min
 柱温: 30℃ 波长: 290nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4055 - 0-39/28-1228-2 - cbzj -C090402p-rcqx-2-pH6.8jz-jf50z-dz1-5.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4055 - SZJ-4055-rc-FX277.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4055 - 20260116-FX277.lcb
 样品瓶号: 4-18
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2026/01/17 05:03:24 实验者: wangdan
 处理时间 (V2): 2026/01/19 14:16:30 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 290nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.836	484224	100.000	54051	2325	1.073	--
总计		484224	100.000	54051			

图174 枸橼酸西地那非口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-C090402批-pH6.8介质-桨法-50转
对照品溶液-1-5




SZJ-4055

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm, 5 μm) 流速: 1.8ml/min
 柱温: 30°C 波长: 290nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4055 - 0-39/28-1229-2 - cbzj -C090402p-rcqx-2-pH6.8jz-jf50z-P1-2min.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4055 - SZJ-4055-rc-FX277.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4055 - 20260116-FX277.lcb
 样品瓶号: 4-1
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2026/01/17 05:07:17 实验者: wangdan
 处理时间 (V2): 2026/01/19 14:16:33 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 290nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.857	218586	100.000	25080	2489	1.051	--
总计		218586	100.000	25080			

图175 枸橼酸西地那非口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
 参比制剂-C090402批-pH6.8介质-桨法-50转-2min-片1
 供试品溶液-1




SZJ-4055

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm, 5 μm) 流速: 1.8ml/min
 柱温: 30°C 波长: 290nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4055 - 0-39/28-1230-2 - cbzj -C090402p-rcqx-2-pH6.8jz-jf50z-P2-2min.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4055 - SZJ-4055-rc-FX277.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4055 - 20260116-FX277.lcb
 样品瓶号: 4-10
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2026/01/17 05:11:10 实验者: wangdan
 处理时间 (V2): 2026/01/19 14:16:36 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 290nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.857	223129	100.000	25618	2494	1.053	--
总计		223129	100.000	25618			

图176 枸橼酸西地那非口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
 参比制剂-C090402批-pH6.8介质-桨法-50转-2min-片2
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm, 5 μm) 流速: 1.8ml/min
 柱温: 30°C 波长: 290nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4055 - 0-39/28-1231-2 - cbzj -C090402p-rcqx-2-pH6.8jz-jf50z-P3-2min.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4055 - SZJ-4055-rc-FX277.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4055 - 20260116-FX277.lcb
 样品瓶号: 4-19
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2026/01/17 05:15:02 实验者: wangdan
 处理时间 (V2): 2026/01/19 14:16:39 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 290nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.857	220852	100.000	25326	2494	1.051	--
总计		220852	100.000	25326			

图177 枸橼酸西地那非口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-C090402批-pH6.8介质-桨法-50转-2min-片3
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm, 5 μm) 流速: 1.8ml/min
 柱温: 30°C 波长: 290nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4055 - 0-39/28-1232-2 - cbzj -C090402p-rcqx-2-pH6.8jz-jf50z-P4-2min.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4055 - SZJ-4055-rc-FX277.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4055 - 20260116-FX277.lcb
 样品瓶号: 4-28
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2026/01/17 05:18:54 实验者: wangdan
 处理时间 (V2): 2026/01/19 14:16:42 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 290nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.857	237529	100.000	27242	2498	1.053	--
总计		237529	100.000	27242			

图178 枸橼酸西地那非口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-C090402批-pH6.8介质-桨法-50转-2min-片4
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm, 5 μm) 流速: 1.8ml/min
 柱温: 30°C 波长: 290nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4055 - 0-39/28-1233-2 - cbzj -C090402p-rcqx-2-pH6.8jz-jf50z-P5-2min.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4055 - SZJ-4055-rc-FX277.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4055 - 20260116-FX277.lcb
 样品瓶号: 4-37
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2026/01/17 05:22:47 实验者: wangdan
 处理时间(V2): 2026/01/19 14:16:44 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 290nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.856	244186	100.000	27977	2488	1.054	--
总计		244186	100.000	27977			

图179 枸橼酸西地那非口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-C090402批-pH6.8介质-桨法-50转-2min-片5
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm, 5 μm) 流速: 1.8ml/min
 柱温: 30°C 波长: 290nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4055 - 0-39/28-1234-2 - cbzj -C090402p-rcqx-2-pH6.8jz-jf50z-P6-2min.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4055 - SZJ-4055-rc-FX277.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4055 - 20260116-FX277.lcb
 样品瓶号: 4-46
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2026/01/17 05:26:38 实验者: wangdan
 处理时间 (V2): 2026/01/19 14:16:47 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 290nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.857	257451	100.000	29468	2489	1.057	--
总计		257451	100.000	29468			


图180 枸橼酸西地那非口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-C090402批-pH6.8介质-桨法-50转-2min-片6
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm, 5 μm) 流速: 1.8ml/min
 柱温: 30°C 波长: 290nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4055 - 0-39/28-1235-2 - cbzj -C090402p-rcqx-2-pH6.8jz-jf50z-P1-5min.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4055 - SZJ-4055-rc-FX277.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4055 - 20260116-FX277.lcb
 样品瓶号: 4-2
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2026/01/17 05:30:31 实验者: wangdan
 处理时间 (V2): 2026/01/19 14:16:50 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 290nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.856	297139	100.000	34087	2486	1.058	--
总计		297139	100.000	34087			


图181 枸橼酸西地那非口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-C090402批-pH6.8介质-桨法-50转-5min-片1
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm, 5 μm) 流速: 1.8ml/min
 柱温: 30°C 波长: 290nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4055 - 0-39/28-1236-2 - cbzj -C090402p-rcqx-2-pH6.8jz-jf50z-P2-5min.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4055 - SZJ-4055-rc-FX277.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4055 - 20260116-FX277.lcb
 样品瓶号: 4-11
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2026/01/17 05:34:24 实验者: wangdan
 处理时间 (V2): 2026/01/19 14:16:53 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 290nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.858	254189	100.000	29084	2497	1.055	--
总计		254189	100.000	29084			

图182 枸橼酸西地那非口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
 参比制剂-C090402批-pH6.8介质-桨法-50转-5min-片2
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm, 5 μm) 流速: 1.8ml/min
 柱温: 30°C 波长: 290nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4055 - 0-39/28-1237-2 - cbzj -C090402p-rcqx-2-pH6.8jz-jf50z-P3-5min.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4055 - SZJ-4055-rc-FX277.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4055 - 20260116-FX277.lcb
 样品瓶号: 4-20
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2026/01/17 05:38:17 实验者: wangdan
 处理时间 (V2): 2026/01/19 14:16:56 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 290nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.858	274026	100.000	31362	2491	1.056	--
总计		274026	100.000	31362			

图183 枸橼酸西地那非口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
 参比制剂-C090402批-pH6.8介质-桨法-50转-5min-片3
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm, 5 μm) 流速: 1.8ml/min
 柱温: 30℃ 波长: 290nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4055 - 0-39/28-1238-2 - cbzj -C090402p-rcqx-2-pH6.8jz-jf50z-P4-5min.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4055 - SZJ-4055-rc-FX277.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4055 - 20260116-FX277.lcb
 样品瓶号: 4-29
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2026/01/17 05:42:09 实验者: wangdan
 处理时间(V2): 2026/01/19 14:16:59 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 290nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.858	290423	100.000	33213	2490	1.058	--
总计		290423	100.000	33213			

图184 枸橼酸西地那非口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-C090402批-pH6.8介质-桨法-50转-5min-片4
供试品溶液-1




SZJ-4055

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm, 5 μm) 流速: 1.8ml/min
 柱温: 30°C 波长: 290nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4055 - 0-39/28-1239-2 - cbzj -C090402p-rcqx-2-pH6.8jz-jf50z-P5-5min.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4055 - SZJ-4055-rc-FX277.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4055 - 20260116-FX277.lcb
 样品瓶号: 4-38
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2026/01/17 05:46:01 实验者: wangdan
 处理时间(V2): 2026/01/19 14:17:01 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 290nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.858	285988	100.000	32725	2489	1.056	--
总计		285988	100.000	32725			

图185 枸橼酸西地那非口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
 参比制剂-C090402批-pH6.8介质-桨法-50转-5min-片5
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm, 5 μm) 流速: 1.8ml/min
 柱温: 30℃ 波长: 290nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4055 - 0-39/28-1240-2 - cbzj -C090402p-rcqx-2-pH6.8jz-jf50z-P6-5min.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4055 - SZJ-4055-rc-FX277.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4055 - 20260116-FX277.lcb
 样品瓶号: 4-47
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2026/01/17 05:49:53 实验者: wangdan
 处理时间 (V2): 2026/01/19 14:17:04 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 290nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.859	258789	100.000	29571	2490	1.057	--
总计		258789	100.000	29571			

图186 枸橼酸西地那非口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
 参比制剂-C090402批-pH6.8介质-桨法-50转-5min-片6
 供试品溶液-1




SZJ-4055

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm, 5 μm) 流速: 1.8ml/min
 柱温: 30°C 波长: 290nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4055 - 0-39/28-1241-2 - cbzj -C090402p-rcqx-2-pH6.8jz-jf50z-P1-10min.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4055 - SZJ-4055-rc-FX277.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4055 - 20260116-FX277.lcb
 样品瓶号: 4-3
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2026/01/17 05:53:46 实验者: wangdan
 处理时间 (V2): 2026/01/19 14:17:07 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 290nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.858	261354	100.000	29857	2488	1.056	--
总计		261354	100.000	29857			


图187 枸橼酸西地那非口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
 参比制剂-C090402批-pH6.8介质-桨法-50转-10min-片1
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm, 5 μm) 流速: 1.8ml/min
 柱温: 30°C 波长: 290nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4055 - 0-39/28-1242-2 - cbzj -C090402p-rcqx-2-pH6.8jz-jf50z-P2-10min.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4055 - SZJ-4055-rc-FX277.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4055 - 20260116-FX277.lcb
 样品瓶号: 4-12
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2026/01/17 05:57:38 实验者: wangdan
 处理时间(V2): 2026/01/19 14:17:10 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 290nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.859	275611	100.000	31506	2486	1.058	--
总计		275611	100.000	31506			

图188 枸橼酸西地那非口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
 参比制剂-C090402批-pH6.8介质-桨法-50转-10min-片2
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm, 5 μm) 流速: 1.8ml/min
 柱温: 30°C 波长: 290nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4055 - 0-39/28-1243-2 - cbzj -C090402p-rcqx-2-pH6.8jz-jf50z-P3-10min.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4055 - SZJ-4055-rc-FX277.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4055 - 20260116-FX277.lcb
 样品瓶号: 4-21
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2026/01/17 06:01:31 实验者: wangdan
 处理时间 (V2): 2026/01/19 14:17:13 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 290nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.859	285359	100.000	32598	2486	1.057	--
总计		285359	100.000	32598			


图189 枸橼酸西地那非口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
 参比制剂-C090402批-pH6.8介质-桨法-50转-10min-片3
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm, 5 μm) 流速: 1.8ml/min
 柱温: 30°C 波长: 290nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4055 - 0-39/28-1244-2 - cbzj -C090402p-rcqx-2-pH6.8jz-jf50z-P4-10min.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4055 - SZJ-4055-rc-FX277.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4055 - 20260116-FX277.lcb
 样品瓶号: 4-30
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2026/01/17 06:05:24 实验者: wangdan
 处理时间(V2): 2026/01/19 14:17:15 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 290nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.859	294192	100.000	33503	2486	1.064	--
总计		294192	100.000	33503			

图190 枸橼酸西地那非口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-C090402批-pH6.8介质-桨法-50转-10min-片4
供试品溶液-1




SZJ-4055

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm, 5 μm) 流速: 1.8ml/min
 柱温: 30°C 波长: 290nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4055 - 0-39/28-1245-2 - cbzj -C090402p-rcqx-2-pH6.8jz-jf50z-P5-10min.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4055 - SZJ-4055-rc-FX277.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4055 - 20260116-FX277.lcb
 样品瓶号: 4-39
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2026/01/17 06:09:17 实验者: wangdan
 处理时间 (V2): 2026/01/19 14:17:18 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 290nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.859	285447	100.000	32527	2483	1.058	--
总计		285447	100.000	32527			

图191 枸橼酸西地那非口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
 参比制剂-C090402批-pH6.8介质-桨法-50转-10min-片5
 供试品溶液-1




SZJ-4055

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm, 5 μm) 流速: 1.8ml/min
 柱温: 30°C 波长: 290nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4055 - 0-39/28-1246-2 - cbzj -C090402p-rcqx-2-pH6.8jz-jf50z-P6-10min.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4055 - SZJ-4055-rc-FX277.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4055 - 20260116-FX277.lcb
 样品瓶号: 4-48
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2026/01/17 06:13:09 实验者: wangdan
 处理时间 (V2): 2026/01/19 14:17:21 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 290nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.860	266674	100.000	30410	2481	1.058	--
总计		266674	100.000	30410			


图192 枸橼酸西地那非口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
 参比制剂-C090402批-pH6.8介质-桨法-50转-10min-片6
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm, 5 μm) 流速: 1.8ml/min
 柱温: 30°C 波长: 290nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4055 - 0-39/28-1247-2 - cbzj -C090402p-rcqx-2-pH6.8jz-jf50z-P1-15min.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4055 - SZJ-4055-rc-FX277.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4055 - 20260116-FX277.lcb
 样品瓶号: 4-4
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2026/01/17 06:17:02 实验者: wangdan
 处理时间 (V2): 2026/01/19 14:17:25 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 290nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.858	267606	100.000	30593	2490	1.057	--
总计		267606	100.000	30593			


图193 枸橼酸西地那非口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
 参比制剂-C090402批-pH6.8介质-桨法-50转-15min-片1
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm, 5 μm) 流速: 1.8ml/min
 柱温: 30°C 波长: 290nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4055 - 0-39/28-1248-2 - cbzj -C090402p-rcqx-2-pH6.8jz-jf50z-P2-15min.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4055 - SZJ-4055-rc-FX277.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4055 - 20260116-FX277.lcb
 样品瓶号: 4-13
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2026/01/17 06:20:55 实验者: wangdan
 处理时间(V2): 2026/01/19 14:17:28 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 290nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.860	277352	100.000	31704	2491	1.058	--
总计		277352	100.000	31704			

图194 枸橼酸西地那非口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-C090402批-pH6.8介质-桨法-50转-15min-片2
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm, 5 μm) 流速: 1.8ml/min
 柱温: 30°C 波长: 290nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4055 - 0-39/28-1249-2 - cbzj -C090402p-rcqx-2-pH6.8jz-jf50z-P3-15min.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4055 - SZJ-4055-rc-FX277.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4055 - 20260116-FX277.lcb
 样品瓶号: 4-22
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2026/01/17 06:24:48 实验者: wangdan
 处理时间(V2): 2026/01/19 14:17:31 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 290nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.860	265974	100.000	30359	2489	1.056	--
总计		265974	100.000	30359			

图195 枸橼酸西地那非口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-C090402批-pH6.8介质-桨法-50转-15min-片3
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm, 5 μm) 流速: 1.8ml/min
 柱温: 30°C 波长: 290nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4055 - 0-39/28-1250-2 - cbzj -C090402p-rcqx-2-pH6.8jz-jf50z-P4-15min.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4055 - SZJ-4055-rc-FX277.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4055 - 20260116-FX277.lcb
 样品瓶号: 4-31
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2026/01/17 06:28:41 实验者: wangdan
 处理时间 (V2): 2026/01/19 14:17:34 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 290nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.860	286198	100.000	32718	2488	1.058	--
总计		286198	100.000	32718			

图196 枸橼酸西地那非口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-C090402批-pH6.8介质-桨法-50转-15min-片4
供试品溶液-1




SZJ-4055

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm, 5 μm) 流速: 1.8ml/min
 柱温: 30°C 波长: 290nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4055 - 0-39/28-1251-2 - cbzj -C090402p-rcqx-2-pH6.8jz-jf50z-P5-15min.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4055 - SZJ-4055-rc-FX277.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4055 - 20260116-FX277.lcb
 样品瓶号: 4-40 版本号: 6.115
 进样体积: 10 μl 实验者: wangdan
 进样时间: 2026/01/17 06:32:33 处理者: wangdan
 处理时间 (V2): 2026/01/19 14:17:37
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 290nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.860	286730	100.000	32786	2492	1.057	--
总计		286730	100.000	32786			

图197 枸橼酸西地那非口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
 参比制剂-C090402批-pH6.8介质-桨法-50转-15min-片5
 供试品溶液-1




SZJ-4055

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm, 5 μm) 流速: 1.8ml/min
 柱温: 30°C 波长: 290nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4055 - 0-39/28-1252-2 - cbzj -C090402p-rcqx-2-pH6.8jz-jf50z-P6-15min.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4055 - SZJ-4055-rc-FX277.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4055 - 20260116-FX277.lcb
 样品瓶号: 4-49
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2026/01/17 06:36:26 实验者: wangdan
 处理时间 (V2): 2026/01/19 14:17:40 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 290nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.862	268793	100.000	30650	2471	1.062	--
总计		268793	100.000	30650			


图198 枸橼酸西地那非口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
 参比制剂-C090402批-pH6.8介质-桨法-50转-15min-片6
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm, 5 μm) 流速: 1.8ml/min
 柱温: 30°C 波长: 290nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4055 - 0-39/28-1253-2 - cbzj -C090402p-rcqx-2-pH6.8jz-jf50z-P1-20min.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4055 - SZJ-4055-rc-FX277.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4055 - 20260116-FX277.lcb
 样品瓶号: 4-5
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2026/01/17 06:40:20 实验者: wangdan
 处理时间 (V2): 2026/01/19 14:17:43 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 290nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.860	254024	100.000	28989	2485	1.056	--
总计		254024	100.000	28989			

图199 枸橼酸西地那非口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-C090402批-pH6.8介质-桨法-50转-20min-片1
供试品溶液-1




SZJ-4055

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm, 5 μm) 流速: 1.8ml/min
 柱温: 30°C 波长: 290nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4055 - 0-39/28-1254-2 - cbzj -C090402p-rcqx-2-pH6.8jz-jf50z-P2-20min.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4055 - SZJ-4055-rc-FX277.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4055 - 20260116-FX277.lcb
 样品瓶号: 4-14
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2026/01/17 06:44:13 实验者: wangdan
 处理时间 (V2): 2026/01/19 14:17:46 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 290nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.861	258309	100.000	29415	2475	1.062	--
总计		258309	100.000	29415			


图200 枸橼酸西地那非口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
 参比制剂-C090402批-pH6.8介质-桨法-50转-20min-片2
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm, 5 μm) 流速: 1.8ml/min
 柱温: 30°C 波长: 290nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4055 - 0-39/28-1255-2 - cbzj -C090402p-rcqx-2-pH6.8jz-jf50z-P3-20min.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4055 - SZJ-4055-rc-FX277.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4055 - 20260116-FX277.lcb
 样品瓶号: 4-23
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2026/01/17 06:48:06 实验者: wangdan
 处理时间 (V2): 2026/01/19 14:17:49 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 290nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.861	271537	100.000	31059	2491	1.056	--
总计		271537	100.000	31059			

图201 枸橼酸西地那非口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-C090402批-pH6.8介质-桨法-50转-20min-片3
供试品溶液-1




SZJ-4055

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm, 5 μm) 流速: 1.8ml/min
 柱温: 30°C 波长: 290nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4055 - 0-39/28-1256-2 - cbzj -C090402p-rcqx-2-pH6.8jz-jf50z-P4-20min.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4055 - SZJ-4055-rc-FX277.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4055 - 20260116-FX277.lcb
 样品瓶号: 4-32
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2026/01/17 06:51:59 实验者: wangdan
 处理时间(V2): 2026/01/19 14:17:51 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 290nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.862	271126	100.000	30997	2493	1.057	--
总计		271126	100.000	30997			

图202 枸橼酸西地那非口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
 参比制剂-C090402批-pH6.8介质-桨法-50转-20min-片4
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm, 5 μm) 流速: 1.8ml/min
 柱温: 30°C 波长: 290nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4055 - 0-39/28-1257-2 - cbzj -C090402p-rcqx-2-pH6.8jz-jf50z-P5-20min.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4055 - SZJ-4055-rc-FX277.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4055 - 20260116-FX277.lcb
 样品瓶号: 4-41
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2026/01/17 06:55:52 实验者: wangdan
 处理时间(V2): 2026/01/19 14:17:54 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 290nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.861	292191	100.000	33382	2486	1.058	--
总计		292191	100.000	33382			

图203 枸橼酸西地那非口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-C090402批-pH6.8介质-桨法-50转-20min-片5
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm, 5 μm) 流速: 1.8ml/min
 柱温: 30°C 波长: 290nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4055 - 0-39/28-1258-2 - cbzj -C090402p-rcqx-2-pH6.8jz-jf50z-P6-20min.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4055 - SZJ-4055-rc-FX277.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4055 - 20260116-FX277.lcb
 样品瓶号: 4-50
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2026/01/17 06:59:45 实验者: wangdan
 处理时间 (V2): 2026/01/19 14:17:57 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 290nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.861	253837	100.000	29074	2492	1.055	--
总计		253837	100.000	29074			


图204 枸橼酸西地那非口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-C090402批-pH6.8介质-桨法-50转-20min-片6
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm, 5 μm) 流速: 1.8ml/min
 柱温: 30°C 波长: 290nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4055 - 0-39/28-1259-2 - cbzj -C090402p-rcqx-2-pH6.8jz-jf50z-P1-30min.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4055 - SZJ-4055-rc-FX277.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4055 - 20260116-FX277.lcb
 样品瓶号: 4-6
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2026/01/17 07:03:38 实验者: wangdan
 处理时间(V2): 2026/01/19 14:18:00 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 290nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.862	255606	100.000	29144	2473	1.058	--
总计		255606	100.000	29144			

图205 枸橼酸西地那非口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-C090402批-pH6.8介质-桨法-50转-30min-片1
供试品溶液-1




SZJ-4055

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm, 5 μm) 流速: 1.8ml/min
 柱温: 30°C 波长: 290nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4055 - 0-39/28-1260-2 - cbzj -C090402p-rcqx-2-pH6.8jz-jf50z-P2-30min.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4055 - SZJ-4055-rc-FX277.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4055 - 20260116-FX277.lcb
 样品瓶号: 4-15
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2026/01/17 07:07:32 实验者: wangdan
 处理时间 (V2): 2026/01/19 14:18:02 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 290nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.862	258415	100.000	29605	2492	1.055	--
总计		258415	100.000	29605			

图206 枸橼酸西地那非口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
 参比制剂-C090402批-pH6.8介质-桨法-50转-30min-片2
 供试品溶液-1




SZJ-4055

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm, 5 μm) 流速: 1.8ml/min
 柱温: 30°C 波长: 290nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4055 - 0-39/28-1261-2 - cbzj -C090402p-rcqx-2-pH6.8jz-jf50z-P3-30min.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4055 - SZJ-4055-rc-FX277.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4055 - 20260116-FX277.lcb
 样品瓶号: 4-24
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2026/01/17 07:11:27 实验者: wangdan
 处理时间 (V2): 2026/01/19 14:18:05 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 290nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.862	254262	100.000	29095	2490	1.055	--
总计		254262	100.000	29095			

图207 枸橼酸西地那非口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
 参比制剂-C090402批-pH6.8介质-桨法-50转-30min-片3
 供试品溶液-1




SZJ-4055

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm, 5 μm) 流速: 1.8ml/min
 柱温: 30°C 波长: 290nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4055 - 0-39/28-1262-2 - cbzj -C090402p-rcqx-2-pH6.8jz-jf50z-P4-30min.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4055 - SZJ-4055-rc-FX277.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4055 - 20260116-FX277.lcb
 样品瓶号: 4-33
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2026/01/17 07:15:20 实验者: wangdan
 处理时间 (V2): 2026/01/19 14:18:08 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 290nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.861	297387	100.000	34047	2493	1.056	--
总计		297387	100.000	34047			

图208 枸橼酸西地那非口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
 参比制剂-C090402批-pH6.8介质-桨法-50转-30min-片4
 供试品溶液-1




SZJ-4055

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm, 5 μm) 流速: 1.8ml/min
 柱温: 30°C 波长: 290nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4055 - 0-39/28-1263-2 - cbzj -C090402p-rcqx-2-pH6.8jz-jf50z-P5-30min.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4055 - SZJ-4055-rc-FX277.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4055 - 20260116-FX277.lcb
 样品瓶号: 4-42
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2026/01/17 07:19:13 实验者: wangdan
 处理时间 (V2): 2026/01/19 14:18:11 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 290nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.862	287211	100.000	32853	2489	1.058	--
总计		287211	100.000	32853			

图209 枸橼酸西地那非口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
 参比制剂-C090402批-pH6.8介质-桨法-50转-30min-片5
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm, 5 μm) 流速: 1.8ml/min
 柱温: 30°C 波长: 290nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4055 - 0-39/28-1264-2 - cbzj -C090402p-rcqx-2-pH6.8jz-j f50z-P6-30min.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4055 - SZJ-4055-rc-FX277.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4055 - 20260116-FX277.lcb
 样品瓶号: 4-51
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2026/01/17 07:23:06 实验者: wangdan
 处理时间 (V2): 2026/01/19 14:18:14 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 290nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.863	253385	100.000	28951	2486	1.057	--
总计		253385	100.000	28951			


图210 枸橼酸西地那非口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-C090402批-pH6.8介质-桨法-50转-30min-片6
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm, 5 μm) 流速: 1.8ml/min
 柱温: 30°C 波长: 290nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4055 - 0-39/28-1265-2 - cbzj -C090402p-rcqx-2-pH6.8jz-jf50z-P1-45min.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4055 - SZJ-4055-rc-FX277.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4055 - 20260116-FX277.lcb
 样品瓶号: 4-7
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2026/01/17 07:26:59 实验者: wangdan
 处理时间(V2): 2026/01/19 14:18:16 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 290nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.863	255793	100.000	29283	2494	1.053	--
总计		255793	100.000	29283			

图211 枸橼酸西地那非口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
 参比制剂-C090402批-pH6.8介质-桨法-50转-45min-片1
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm, 5 μm) 流速: 1.8ml/min
 柱温: 30°C 波长: 290nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4055 - 0-39/28-1266-2 - cbzj -C090402p-rcqx-2-pH6.8jz-jf50z-P2-45min.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4055 - SZJ-4055-rc-FX277.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4055 - 20260116-FX277.lcb
 样品瓶号: 4-16
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2026/01/17 07:30:53 实验者: wangdan
 处理时间 (V2): 2026/01/19 14:18:19 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 290nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.863	258942	100.000	29593	2489	1.057	--
总计		258942	100.000	29593			

图212 枸橼酸西地那非口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-C090402批-pH6.8介质-桨法-50转-45min-片2
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm, 5 μm) 流速: 1.8ml/min
 柱温: 30°C 波长: 290nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4055 - 0-39/28-1267-2 - cbzj -C090402p-rcqx-2-pH6.8jz-jf50z-P3-45min.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4055 - SZJ-4055-rc-FX277.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4055 - 20260116-FX277.lcb
 样品瓶号: 4-25
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2026/01/17 07:34:46 实验者: wangdan
 处理时间 (V2): 2026/01/19 14:18:22 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 290nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.863	265501	100.000	30398	2497	1.056	--
总计		265501	100.000	30398			

图213 枸橼酸西地那非口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-C090402批-pH6.8介质-桨法-50转-45min-片3
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm, 5 μm) 流速: 1.8ml/min
 柱温: 30°C 波长: 290nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4055 - 0-39/28-1268-2 - cbzj -C090402p-rcqx-2-pH6.8jz-jf50z-P4-45min.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4055 - SZJ-4055-rc-FX277.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4055 - 20260116-FX277.lcb
 样品瓶号: 4-34
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2026/01/17 07:38:40 实验者: wangdan
 处理时间(V2): 2026/01/19 14:18:25 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 290nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.863	270905	100.000	30917	2486	1.057	--
总计		270905	100.000	30917			

图214 枸橼酸西地那非口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
 参比制剂-C090402批-pH6.8介质-桨法-50转-45min-片4
 供试品溶液-1




SZJ-4055

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm, 5 μm) 流速: 1.8ml/min
 柱温: 30°C 波长: 290nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4055 - 0-39/28-1269-2 - cbzj -C090402p-rcqx-2-pH6.8jz-jf50z-P5-45min.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4055 - SZJ-4055-rc-FX277.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4055 - 20260116-FX277.lcb
 样品瓶号: 4-43
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2026/01/17 07:42:34 实验者: wangdan
 处理时间 (V2): 2026/01/19 14:18:28 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 290nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.864	271534	100.000	31015	2482	1.056	--
总计		271534	100.000	31015			

图215 枸橼酸西地那非口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
 参比制剂-C090402批-pH6.8介质-桨法-50转-45min-片5
 供试品溶液-1




SZJ-4055

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm, 5 μm) 流速: 1.8ml/min
 柱温: 30°C 波长: 290nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4055 - 0-39/28-1270-2 - cbzj -C090402p-rcqx-2-pH6.8jz-jf50z-P6-45min.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4055 - SZJ-4055-rc-FX277.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4055 - 20260116-FX277.lcb
 样品瓶号: 4-52
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2026/01/17 07:46:28 实验者: wangdan
 处理时间 (V2): 2026/01/19 14:18:31 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 290nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.864	250046	100.000	28545	2489	1.058	--
总计		250046	100.000	28545			

图216 枸橼酸西地那非口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
 参比制剂-C090402批-pH6.8介质-桨法-50转-45min-片6
 供试品溶液-1




SZJ-4055

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm, 5 μm) 流速: 1.8ml/min
 柱温: 30°C 波长: 290nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4055 - 0-39/28-1271-2 - cbzj -C090402p-rcqx-2-pH6.8jz-jf50z-P1-jx.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4055 - SZJ-4055-rc-FX277.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4055 - 20260116-FX277.lcb
 样品瓶号: 4-8
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2026/01/17 07:50:22 实验者: wangdan
 处理时间 (V2): 2026/01/19 14:18:33 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 290nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.865	245587	100.000	28090	2493	1.056	--
总计		245587	100.000	28090			

图217 枸橼酸西地那非口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
 参比制剂-C090402批-pH6.8介质-浆法-50转-极限转速-片1
 供试品溶液-1




SZJ-4055

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm, 5 μm) 流速: 1.8ml/min
 柱温: 30°C 波长: 290nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4055 - 0-39/28-1272-2 - cbzj -C090402p-rcqx-2-pH6.8jz-jf50z-P2-jx.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4055 - SZJ-4055-rc-FX277.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4055 - 20260116-FX277.lcb
 样品瓶号: 4-17
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2026/01/17 07:54:16 实验者: wangdan
 处理时间 (V2): 2026/01/19 14:18:36 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 290nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.864	251223	100.000	28736	2494	1.058	--
总计		251223	100.000	28736			


图218 枸橼酸西地那非口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
 参比制剂-C090402批-pH6.8介质-浆法-50转-极限转速-片2
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm, 5 μm) 流速: 1.8ml/min
 柱温: 30°C 波长: 290nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4055 - 0-39/28-1273-2 - cbzj -C090402p-rcqx-2-pH6.8jz-jf50z-P3-jx.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4055 - SZJ-4055-rc-FX277.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4055 - 20260116-FX277.lcb
 样品瓶号: 4-26
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2026/01/17 07:58:10 实验者: wangdan
 处理时间(V2): 2026/01/19 14:18:39 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 290nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.864	248065	100.000	28401	2490	1.053	--
总计		248065	100.000	28401			

图219 枸橼酸西地那非口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
 参比制剂-C090402批-pH6.8介质-浆法-50转-极限转速-片3
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm, 5 μm) 流速: 1.8ml/min
 柱温: 30°C 波长: 290nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4055 - 0-39/28-1274-2 - cbzj -C090402p-rcqx-2-pH6.8jz-jf50z-P4-jx.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4055 - SZJ-4055-rc-FX277.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4055 - 20260116-FX277.lcb
 样品瓶号: 4-35
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2026/01/17 08:02:04 实验者: wangdan
 处理时间 (V2): 2026/01/19 14:18:42 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 290nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.864	257544	100.000	29489	2495	1.054	--
总计		257544	100.000	29489			


图220 枸橼酸西地那非口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-C090402批-pH6.8介质-浆法-50转-极限转速-片4
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm, 5 μm) 流速: 1.8ml/min
 柱温: 30°C 波长: 290nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4055 - 0-39/28-1275-2 - cbzj -C090402p-rcqx-2-pH6.8jz-jf50z-P5-jx.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4055 - SZJ-4055-rc-FX277.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4055 - 20260116-FX277.lcb
 样品瓶号: 4-44
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2026/01/17 08:05:58 实验者: wangdan
 处理时间 (V2): 2026/01/19 14:18:45 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 290nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.865	250777	100.000	28652	2490	1.057	--
总计		250777	100.000	28652			

图221 枸橼酸西地那非口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
 参比制剂-C090402批-pH6.8介质-浆法-50转-极限转速-片5
 供试品溶液-1




SZJ-4055

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm, 5 μm) 流速: 1.8ml/min
 柱温: 30°C 波长: 290nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4055 - 0-39/28-1276-2 - cbzj -C090402p-rcqx-2-pH6.8jz-jf50z-P6-jx.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4055 - SZJ-4055-rc-FX277.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4055 - 20260116-FX277.lcb
 样品瓶号: 4-53
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2026/01/17 08:09:52 实验者: wangdan
 处理时间 (V2): 2026/01/19 14:18:48 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 290nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.865	255526	100.000	29254	2494	1.055	--
总计		255526	100.000	29254			

图222 枸橼酸西地那非口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
 参比制剂-C090402批-pH6.8介质-浆法-50转-极限转速-片6
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm, 5 μm) 流速: 1.8ml/min
 柱温: 30℃ 波长: 290nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4055 - 0-39/28-1277-2 - cbzj -C090402p-rcqx-2-pH6.8jz-jf50z-dz2-1.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4055 - SZJ-4055-rc-FX277.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4055 - 20260116-FX277.lcb
 样品瓶号: 4-27
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2026/01/17 08:13:46 实验者: wangdan
 处理时间 (V2): 2026/01/19 14:18:51 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 290nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.845	485918	100.000	54013	2322	1.073	--
总计		485918	100.000	54013			


图223 枸橼酸西地那非口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-C090402批-pH6.8介质-桨法-50转
对照品溶液-2-1

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm, 5 μm) 流速: 1.8ml/min
 柱温: 30℃ 波长: 290nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4055 - 0-39/28-1278-2 - cbzj -C090402p-rcqx-2-pH6.8jz-jf50z-dz2-2.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4055 - SZJ-4055-rc-FX277.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4055 - 20260116-FX277.lcb
 样品瓶号: 4-27
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2026/01/17 08:17:39 实验者: wangdan
 处理时间(V2): 2026/01/19 14:18:54 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 290nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.845	484084	100.000	53890	2322	1.074	--
总计		484084	100.000	53890			

图224 枸橼酸西地那非口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-C090402批-pH6.8介质-桨法-50转
对照品溶液-2-2