



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30℃

数据文件名: RC\$QTL-392 - 10-19/31-971-3 - zzp-2025121851p-rcqx-bp-pH1.2+0.5SDSjz-jf50z-rj.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260122-FX280.lcb

样品瓶号 : 1-9

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/01/22 13:56:19

处理时间 (V3) : 2026/01/23 10:04:51

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 10-19/31-972-3 - zzp-2025121851p-rcqx-bp-pH1.2+0.5SDSjz-jf50z-dz1-1.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260122-FX280.lcb

样品瓶号 : 1-18

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/01/22 13:59:43

处理时间 (V3) : 2026/01/23 10:04:54

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.955	53065	100.000	8308	2178	1.135	--
总计		53065	100.000	8308			



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 10-19/31-973-3 - zzp-2025121851p-rcqx-bp-pH1.2+0.5SDSjz-jf50z-dz1-2.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260122-FX280.lcb

样品瓶号 : 1-18

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/01/22 14:03:07

处理时间 (V3) : 2026/01/23 10:04:57

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.0ml/min

波长:210nm


版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.952	52834	100.000	8282	2192	1.137	--
总计		52834	100.000	8282			



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 10-19/31-974-3 - zzp-2025121851p-rcqx-bp-pH1.2+0.5SDSjz-jf50z-dz1-3.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260122-FX280.lcb

样品瓶号 : 1-18

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/01/22 14:06:31

处理时间 (V3) : 2026/01/23 10:05:00

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.952	52928	100.000	8304	2186	1.125	--
总计		52928	100.000	8304			



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 10-19/31-975-3 - zzp-2025121851p-rcqx-bp-pH1.2+0.5SDSjz-jf50z-dz1-4.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260122-FX280.lcb

样品瓶号 : 1-18

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/01/22 14:09:55

处理时间 (V3) : 2026/01/23 10:05:03

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.0ml/min

波长:210nm


版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.947	52936	100.000	8342	2175	1.132	--
总计		52936	100.000	8342			



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 10-19/31-976-3 - zzp-2025121851p-rcqx-bp-pH1.2+0.5SDSjz-jf50z-dz1-5.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260122-FX280.lcb

样品瓶号 : 1-18

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/01/22 14:13:18

处理时间 (V3) : 2026/01/23 10:05:05

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.946	52683	100.000	8333	2187	1.126	--
总计		52683	100.000	8333			



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 10-19/31-977-3 - zzp-2025121851p-rcqx-bp-pH1.2+0.5SDSjz-jf50z-p1-5min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260122-FX280.lcb

样品瓶号 : 1-1

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/01/22 14:16:40

处理时间 (V3) : 2026/01/23 10:05:08

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.986	27042	100.000	4617	2662	1.135	--
总计		27042	100.000	4617			



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 10-19/31-978-3 - zzp-2025121851p-rcqx-bp-pH1.2+0.5SDSjz-jf50z-p2-5min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260122-FX280.lcb

样品瓶号 : 1-10

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/01/22 14:20:02

处理时间 (V3) : 2026/01/23 10:05:11

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.985	27382	100.000	4599	2615	1.151	--
总计		27382	100.000	4599			



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 10-19/31-979-3 - zzp-2025121851p-rcqx-bp-pH1.2+0.5SDSjz-jf50z-p3-5min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260122-FX280.lcb

样品瓶号 : 1-19

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/01/22 14:23:24

处理时间 (V3) : 2026/01/23 10:05:13

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.983	28350	100.000	4786	2631	1.148	--
总计		28350	100.000	4786			



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 10-19/31-980-3 - zzp-2025121851p-rcqx-bp-pH1.2+0.5SDSjz-jf50z-p4-5min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260122-FX280.lcb

样品瓶号 : 1-28

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/01/22 14:26:47

处理时间 (V3) : 2026/01/23 10:05:16

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.982	29401	100.000	4974	2629	1.141	--
总计		29401	100.000	4974			



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 10-19/31-981-3 - zzp-2025121851p-rcqx-bp-pH1.2+0.5SDSjz-jf50z-p5-5min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260122-FX280.lcb

样品瓶号 : 1-37

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/01/22 14:30:10

处理时间 (V3) : 2026/01/23 10:05:19

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.985	28216	100.000	4814	2655	1.145	--
总计		28216	100.000	4814			



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 10-19/31-982-3 - zzp-2025121851p-rcqx-bp-pH1.2+0.5SDSjz-jf50z-p6-5min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260122-FX280.lcb

样品瓶号 : 1-46

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/01/22 14:33:32

处理时间 (V3) : 2026/01/23 10:05:22

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.984	29223	100.000	4984	2650	1.140	--
总计		29223	100.000	4984			



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 10-19/31-983-3 - zzp-2025121851p-rcqx-bp-pH1.2+0.5SDSjz-jf50z-p1-10min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260122-FX280.lcb

样品瓶号 : 1-2

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/01/22 14:36:59

处理时间 (V3) : 2026/01/23 10:05:24

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.985	35658	100.000	6092	2650	1.135	--
总计		35658	100.000	6092			



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 10-19/31-984-3 - zzp-2025121851p-rcqx-bp-pH1.2+0.5SDSjz-jf50z-p2-10min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260122-FX280.lcb

样品瓶号 : 1-11

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/01/22 14:40:22

处理时间 (V3) : 2026/01/23 10:05:27

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.981	35229	100.000	6044	2648	1.132	--
总计		35229	100.000	6044			



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 10-19/31-985-3 - zzp-2025121851p-rcqx-bp-pH1.2+0.5SDSjz-jf50z-p3-10min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260122-FX280.lcb

样品瓶号 : 1-20

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/01/22 14:43:44

处理时间 (V3) : 2026/01/23 10:05:29

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.982	35735	100.000	6138	2659	1.137	--
总计		35735	100.000	6138			



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 10-19/31-986-3 - zzp-2025121851p-rcqx-bp-pH1.2+0.5SDSjz-jf50z-p4-10min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260122-FX280.lcb

样品瓶号 : 1-29

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/01/22 14:47:07

处理时间 (V3) : 2026/01/23 10:05:32

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.982	36651	100.000	6283	2672	1.133	--
总计		36651	100.000	6283			



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 10-19/31-987-3 - zzp-2025121851p-rcqx-bp-pH1.2+0.5SDSjz-jf50z-p5-10min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260122-FX280.lcb

样品瓶号 : 1-38

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/01/22 14:50:30

处理时间 (V3) : 2026/01/23 10:05:35

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.981	36155	100.000	6222	2647	1.132	--
总计		36155	100.000	6222			



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 10-19/31-988-3 - zzp-2025121851p-rcqx-bp-pH1.2+0.5SDSjz-jf50z-p6-10min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260122-FX280.lcb

样品瓶号 : 1-47

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/01/22 14:53:52

处理时间 (V3) : 2026/01/23 10:05:37

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.0ml/min

波长:210nm


版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.982	37906	100.000	6500	2659	1.140	--
总计		37906	100.000	6500			



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 10-19/31-989-3 - zzp-2025121851p-rcqx-bp-pH1.2+0.5SDSjz-jf50z-p1-15min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260122-FX280.lcb

样品瓶号 : 1-3

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/01/22 14:57:15

处理时间 (V3) : 2026/01/23 10:05:40

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.982	41130	100.000	7074	2671	1.132	--
总计		41130	100.000	7074			



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 10-19/31-990-3 - zzp-2025121851p-rcqx-bp-pH1.2+0.5SDSjz-jf50z-p2-15min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260122-FX280.lcb

样品瓶号 : 1-12

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/01/22 15:00:37

处理时间 (V3) : 2026/01/23 10:05:43

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.983	39664	100.000	6818	2665	1.132	--
总计		39664	100.000	6818			



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 10-19/31-991-3 - zzp-2025121851p-rcqx-bp-pH1.2+0.5SDSjz-jf50z-p3-15min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260122-FX280.lcb

样品瓶号 : 1-21

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/01/22 15:03:59

处理时间 (V3) : 2026/01/23 10:05:45

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.983	39835	100.000	6853	2673	1.127	--
总计		39835	100.000	6853			



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 10-19/31-992-3 - zzp-2025121851p-rcqx-bp-pH1.2+0.5SDSjz-jf50z-p4-15min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260122-FX280.lcb

样品瓶号 : 1-30

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/01/22 15:07:22

处理时间 (V3) : 2026/01/23 10:05:48

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.982	40760	100.000	7018	2680	1.131	--
总计		40760	100.000	7018			



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 10-19/31-993-3 - zzp-2025121851p-rcqx-bp-pH1.2+0.5SDSjz-jf50z-p5-15min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260122-FX280.lcb

样品瓶号 : 1-39

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/01/22 15:10:45

处理时间 (V3) : 2026/01/23 10:05:51

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.986	41166	100.000	7043	2673	1.132	--
总计		41166	100.000	7043			



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30℃

数据文件名: RC\$QTL-392 - 10-19/31-994-3 - zzp-2025121851p-rcqx-bp-pH1.2+0.5SDSjz-jf50z-p6-15min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260122-FX280.lcb

样品瓶号 : 1-48

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/01/22 15:14:07

处理时间 (V3) : 2026/01/23 10:05:53

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.982	42666	100.000	7313	2672	1.128	--
总计		42666	100.000	7313			



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 10-19/31-995-3 - zzp-2025121851p-rcqx-bp-pH1.2+0.5SDSjz-jf50z-p1-20min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260122-FX280.lcb

样品瓶号 : 1-4

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/01/22 15:17:29

处理时间 (V3) : 2026/01/23 10:05:56

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.981	43616	100.000	7525	2676	1.124	--
总计		43616	100.000	7525			



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 10-19/31-996-3 - zzp-2025121851p-rcqx-bp-pH1.2+0.5SDSjz-jf50z-p2-20min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260122-FX280.lcb

样品瓶号 : 1-13

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/01/22 15:20:51

处理时间 (V3) : 2026/01/23 10:05:58

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.988	42955	100.000	7376	2679	1.129	--
总计		42955	100.000	7376			



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 10-19/31-997-3 - zzp-2025121851p-rcqx-bp-pH1.2+0.5SDSjz-jf50z-p3-20min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260122-FX280.lcb

样品瓶号 : 1-22

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/01/22 15:24:13

处理时间 (V3) : 2026/01/23 10:06:03

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.982	43344	100.000	7444	2677	1.128	--
总计		43344	100.000	7444			



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 10-19/31-998-3 - zzp-2025121851p-rcqx-bp-pH1.2+0.5SDSjz-jf50z-p4-20min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260122-FX280.lcb

样品瓶号 : 1-31

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/01/22 15:27:36

处理时间 (V3) : 2026/01/23 10:06:06

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.983	43920	100.000	7519	2677	1.129	--
总计		43920	100.000	7519			



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30℃

数据文件名: RC\$QTL-392 - 10-19/31-999-3 - zzp-2025121851p-rcqx-bp-pH1.2+0.5SDSjz-jf50z-p5-20min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260122-FX280.lcb

样品瓶号 : 1-40

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/01/22 15:30:58

处理时间 (V3) : 2026/01/23 10:06:09

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.984	44098	100.000	7519	2663	1.131	--
总计		44098	100.000	7519			



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 10-19/31-1000-3 - zzp-2025121851p-rcqx-bp-pH1.2+0.5SDSjz-jf50z-p6-20min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260122-FX280.lcb

样品瓶号 : 1-49

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/01/22 15:34:19

处理时间 (V3) : 2026/01/23 10:06:12

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.983	45085	100.000	7733	2666	1.130	--
总计		45085	100.000	7733			



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 10-19/31-1001-3 - zzp-2025121851p-rcqx-bp-pH1.2+0.5SDSjz-jf50z-p1-30min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260122-FX280.lcb

样品瓶号 : 1-5

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/01/22 15:37:41

处理时间 (V3) : 2026/01/23 10:06:15

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.983	48187	100.000	8248	2658	1.122	--
总计		48187	100.000	8248			



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 10-19/31-1002-3 - zzp-2025121851p-rcqx-bp-pH1.2+0.5SDSjz-jf50z-p2-30min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260122-FX280.lcb

样品瓶号 : 1-14

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/01/22 15:41:03

处理时间 (V3) : 2026/01/23 10:06:17

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.982	45483	100.000	7799	2651	1.125	--
总计		45483	100.000	7799			



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 10-19/31-1003-3 - zzp-2025121851p-rcqx-bp-pH1.2+0.5SDSjz-jf50z-p3-30min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260122-FX280.lcb

样品瓶号 : 1-23

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/01/22 15:44:26

处理时间 (V3) : 2026/01/23 10:06:20

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.981	45694	100.000	7869	2671	1.125	--
总计		45694	100.000	7869			



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 10-19/31-1004-3 - zzp-2025121851p-rcqx-bp-pH1.2+0.5SDSjz-jf50z-p4-30min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260122-FX280.lcb

样品瓶号 : 1-32

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/01/22 15:47:49

处理时间 (V3) : 2026/01/23 10:06:23

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.983	46927	100.000	8069	2683	1.125	--
总计		46927	100.000	8069			



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 10-19/31-1005-3 - zzp-2025121851p-rcqx-bp-pH1.2+0.5SDSjz-jf50z-p5-30min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260122-FX280.lcb

样品瓶号 : 1-41

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/01/22 15:51:12

处理时间 (V3) : 2026/01/23 10:06:25

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.982	46411	100.000	7956	2660	1.125	--
总计		46411	100.000	7956			



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 10-19/31-1006-3 - zzp-2025121851p-rcqx-bp-pH1.2+0.5SDSjz-jf50z-p6-30min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260122-FX280.lcb

样品瓶号 : 1-50

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/01/22 15:54:34

处理时间 (V3) : 2026/01/23 10:06:28

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.983	48134	100.000	8257	2657	1.123	--
总计		48134	100.000	8257			



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 10-19/31-1007-3 - zzp-2025121851p-rcqx-bp-pH1.2+0.5SDSjz-jf50z-p1-45min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260122-FX280.lcb

样品瓶号 : 1-6

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/01/22 15:57:57

处理时间 (V3) : 2026/01/23 10:06:31

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.988	49932	100.000	8554	2664	1.121	--
总计		49932	100.000	8554			



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 10-19/31-1008-3 - zzp-2025121851p-rcqx-bp-pH1.2+0.5SDSjz-jf50z-p2-45min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260122-FX280.lcb

样品瓶号 : 1-15

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/01/22 16:01:20

处理时间 (V3) : 2026/01/23 10:06:33

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.989	47335	100.000	8088	2664	1.131	--
总计		47335	100.000	8088			



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 10-19/31-1009-3 - zzp-2025121851p-rcqx-bp-pH1.2+0.5SDSjz-jf50z-p3-45min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260122-FX280.lcb

样品瓶号 : 1-24

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/01/22 16:04:42

处理时间 (V3) : 2026/01/23 10:06:36

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.984	47796	100.000	8169	2664	1.119	--
总计		47796	100.000	8169			



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 10-19/31-1010-3 - zzp-2025121851p-rcqx-bp-pH1.2+0.5SDSjz-jf50z-p4-45min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260122-FX280.lcb

样品瓶号 : 1-33

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/01/22 16:08:04

处理时间 (V3) : 2026/01/23 10:06:39

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.982	47856	100.000	8220	2664	1.123	--
总计		47856	100.000	8220			



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 10-19/31-1011-3 - zzp-2025121851p-rcqx-bp-pH1.2+0.5SDSjz-jf50z-p5-45min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260122-FX280.lcb

样品瓶号 : 1-42

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/01/22 16:11:27

处理时间 (V3) : 2026/01/23 10:06:41

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.982	48256	100.000	8301	2669	1.123	--
总计		48256	100.000	8301			



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 10-19/31-1012-3 - zzp-2025121851p-rcqx-bp-pH1.2+0.5SDSjz-jf50z-p6-45min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260122-FX280.lcb

样品瓶号 : 1-51

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/01/22 16:14:49

处理时间 (V3) : 2026/01/23 10:06:44

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.985	50213	100.000	8605	2676	1.119	--
总计		50213	100.000	8605			



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 10-19/31-1013-3 - zzp-2025121851p-rcqx-bp-pH1.2+0.5SDSjz-jf50z-p1-60min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260122-FX280.lcb

样品瓶号 : 1-7

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/01/22 16:18:12

处理时间 (V3) : 2026/01/23 10:06:47

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.986	50213	100.000	8591	2665	1.124	--
总计		50213	100.000	8591			



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 10-19/31-1014-3 - zzp-2025121851p-rcqx-bp-pH1.2+0.5SDSjz-jf50z-p2-60min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260122-FX280.lcb

样品瓶号 : 1-16

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/01/22 16:21:35

处理时间 (V3) : 2026/01/23 10:06:49

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.984	47328	100.000	8089	2661	1.127	--
总计		47328	100.000	8089			



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 10-19/31-1015-3 - zzp-2025121851p-rcqx-bp-pH1.2+0.5SDSjz-jf50z-p3-60min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260122-FX280.lcb

样品瓶号 : 1-25

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/01/22 16:24:57

处理时间 (V3) : 2026/01/23 10:06:52

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.988	47659	100.000	8175	2663	1.127	--
总计		47659	100.000	8175			



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 10-19/31-1016-3 - zzp-2025121851p-rcqx-bp-pH1.2+0.5SDSjz-jf50z-p4-60min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260122-FX280.lcb

样品瓶号 : 1-34

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/01/22 16:28:20

处理时间 (V3) : 2026/01/23 10:06:54

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.989	48575	100.000	8355	2672	1.123	--
总计		48575	100.000	8355			



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 10-19/31-1017-3 - zzp-2025121851p-rcqx-bp-pH1.2+0.5SDSjz-jf50z-p5-60min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260122-FX280.lcb

样品瓶号 : 1-43

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/01/22 16:31:42

处理时间 (V3) : 2026/01/23 10:06:57

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.988	48830	100.000	8407	2684	1.122	--
总计		48830	100.000	8407			



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 10-19/31-1018-3 - zzp-2025121851p-rcqx-bp-pH1.2+0.5SDSjz-jf50z-p6-60min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260122-FX280.lcb

样品瓶号 : 1-52

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/01/22 16:35:04

处理时间 (V3) : 2026/01/23 10:07:00

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.985	50479	100.000	8608	2668	1.130	--
总计		50479	100.000	8608			



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30℃

数据文件名: RC\$QTL-392 - 10-19/31-1019-3 - zzp-2025121851p-rcqx-bp-pH1.2+0.5SDSjz-jf50z-p1-jx.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260122-FX280.lcb

样品瓶号 : 1-8

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/01/22 16:38:27

处理时间 (V3) : 2026/01/23 10:07:02

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.985	50892	100.000	8681	2656	1.123	--
总计		50892	100.000	8681			



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 10-19/31-1020-3 - zzp-2025121851p-rcqx-bp-pH1.2+0.5SDSjz-jf50z-p2-jx.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260122-FX280.lcb

样品瓶号 : 1-17

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/01/22 16:41:50

处理时间 (V3) : 2026/01/23 10:07:05

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.982	48719	100.000	8351	2654	1.129	--
总计		48719	100.000	8351			



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 10-19/31-1021-3 - zzp-2025121851p-rcqx-bp-pH1.2+0.5SDSjz-jf50z-p3-jx.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260122-FX280.lcb

样品瓶号 : 1-26

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/01/22 16:45:14

处理时间 (V3) : 2026/01/23 10:07:08

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.983	48949	100.000	8397	2663	1.120	--
总计		48949	100.000	8397			



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 10-19/31-1022-3 - zzp-2025121851p-rcqx-bp-pH1.2+0.5SDSjz-jf50z-p4-jx.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260122-FX280.lcb

样品瓶号 : 1-35

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/01/22 16:48:37

处理时间 (V3) : 2026/01/23 10:07:10

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.982	48972	100.000	8406	2664	1.126	--
总计		48972	100.000	8406			



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 10-19/31-1023-3 - zzp-2025121851p-rcqx-bp-pH1.2+0.5SDSjz-jf50z-p5-jx.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260122-FX280.lcb

样品瓶号 : 1-44

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/01/22 16:52:00

处理时间 (V3) : 2026/01/23 10:07:13

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.987	49990	100.000	8609	2687	1.122	--
总计		49990	100.000	8609			



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 10-19/31-1024-3 - zzp-2025121851p-rcqx-bp-pH1.2+0.5SDSjz-jf50z-p6-jx.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260122-FX280.lcb

样品瓶号 : 1-53

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/01/22 16:55:23

处理时间 (V3) : 2026/01/23 10:07:16

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.985	51473	100.000	8782	2660	1.122	--
总计		51473	100.000	8782			



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 10-19/31-1025-3 - zzp-2025121851p-rcqx-bp-pH1.2+0.5SDSjz-jf50z-dz2-1.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260122-FX280.lcb

样品瓶号 : 1-27

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/01/22 16:58:46

处理时间 (V3) : 2026/01/23 10:07:18

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.940	52004	100.000	8226	2182	1.135	--
总计		52004	100.000	8226			



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 10-19/31-1026-3 - zzp-2025121851p-rcqx-bp-pH1.2+0.5SDSjz-jf50z-dz2-2.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260122-FX280.lcb

样品瓶号 : 1-27

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/01/22 17:02:10

处理时间 (V3) : 2026/01/23 10:07:21

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.939	52247	100.000	8259	2169	1.134	--
总计		52247	100.000	8259			



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 10-19/31-1083-3 - zzp-2025121851p-rcqx-bp-pH4.5+0.2SDSjz-jf50z-rj.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260122-FX280.lcb

样品瓶号 : 3-9

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/01/22 20:16:04

处理时间 (V3) : 2026/01/23 10:07:24

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 10-19/31-1084-3 - zzp-2025121851p-rcqx-bp-pH4.5+0.2SDSjz-jf50z-dz1-1.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260122-FX280.lcb

样品瓶号 : 3-18

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/01/22 20:19:27

处理时间 (V3) : 2026/01/23 10:07:27

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.947	52369	100.000	8117	2110	1.140	--
总计		52369	100.000	8117			



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 10-19/31-1085-3 - zzp-2025121851p-rcqx-bp-pH4.5+0.2SDSjz-jf50z-dz1-2.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260122-FX280.lcb

样品瓶号 : 3-18

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/01/22 20:22:50

处理时间 (V3) : 2026/01/23 10:07:29

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.0ml/min

波长:210nm


版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.948	52679	100.000	8159	2109	1.134	--
总计		52679	100.000	8159			



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 10-19/31-1086-3 - zzp-2025121851p-rcqx-bp-pH4.5+0.2SDSjz-jf50z-dz1-3.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260122-FX280.lcb

样品瓶号 : 3-18

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/01/22 20:26:13

处理时间 (V3) : 2026/01/23 10:07:32

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.0ml/min

波长:210nm


版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.947	52529	100.000	8183	2113	1.128	--
总计		52529	100.000	8183			



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 10-19/31-1087-3 - zzp-2025121851p-rcqx-bp-pH4.5+0.2SDSjz-jf50z-dz1-4.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260122-FX280.lcb

样品瓶号 : 3-18

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/01/22 20:29:36

处理时间 (V3) : 2026/01/23 10:07:35

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.943	52551	100.000	8138	2105	1.132	--
总计		52551	100.000	8138			



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 10-19/31-1088-3 - zzp-2025121851p-rcqx-bp-pH4.5+0.2SDSjz-jf50z-dz1-5.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260122-FX280.lcb

样品瓶号 : 3-18

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/01/22 20:32:59

处理时间 (V3) : 2026/01/23 10:07:38

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.946	52358	100.000	8157	2119	1.129	--
总计		52358	100.000	8157			



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30℃

数据文件名: RC\$QTL-392 - 10-19/31-1089-3 - zzp-2025121851p-rcqx-bp-pH4.5+0.2SDSjz-jf50z-p1-5min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260122-FX280.lcb

样品瓶号 : 3-1

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/01/22 20:36:21

处理时间 (V3) : 2026/01/23 10:07:40

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.971	31298	100.000	5372	2580	1.053	--
总计		31298	100.000	5372			



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30℃

数据文件名: RC\$QTL-392 - 10-19/31-1090-3 - zzp-2025121851p-rcqx-bp-pH4.5+0.2SDSjz-jf50z-p2-5min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260122-FX280.lcb

样品瓶号 : 3-10

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/01/22 20:39:43

处理时间 (V3) : 2026/01/23 10:07:43

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.975	31071	100.000	5474	2657	1.180	--
总计		31071	100.000	5474			



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 10-19/31-1091-3 - zzp-2025121851p-rcqx-bp-pH4.5+0.2SDSjz-jf50z-p3-5min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260122-FX280.lcb

样品瓶号 : 3-19

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/01/22 20:43:05

处理时间 (V3) : 2026/01/23 10:07:46

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.977	33657	100.000	5812	2607	1.192	--
总计		33657	100.000	5812			



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 10-19/31-1092-3 - zzp-2025121851p-rcqx-bp-pH4.5+0.2SDSjz-jf50z-p4-5min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260122-FX280.lcb

样品瓶号 : 3-28

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/01/22 20:46:28

处理时间 (V3) : 2026/01/23 10:07:48

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.973	33724	100.000	5812	2578	1.183	--
总计		33724	100.000	5812			



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30℃

数据文件名: RC\$QTL-392 - 10-19/31-1093-3 - zzp-2025121851p-rcqx-bp-pH4.5+0.2SDSjz-jf50z-p5-5min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260122-FX280.lcb

样品瓶号 : 3-37

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/01/22 20:49:50

处理时间 (V3) : 2026/01/23 10:07:51

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.974	34244	100.000	5864	2551	1.193	--
总计		34244	100.000	5864			



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 10-19/31-1094-3 - zzp-2025121851p-rcqx-bp-pH4.5+0.2SDSjz-jf50z-p6-5min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260122-FX280.lcb

样品瓶号 : 3-46

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/01/22 20:53:13

处理时间 (V3) : 2026/01/23 10:07:54

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.980	33506	100.000	5667	2495	1.224	--
总计		33506	100.000	5667			



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 10-19/31-1095-3 - zzp-2025121851p-rcqx-bp-pH4.5+0.2SDSjz-jf50z-p1-10min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260122-FX280.lcb

样品瓶号 : 3-2

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/01/22 20:56:35

处理时间 (V3) : 2026/01/23 10:07:57

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.974	33395	100.000	5741	2555	1.195	--
总计		33395	100.000	5741			



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30℃

数据文件名: RC\$QTL-392 - 10-19/31-1096-3 - zzp-2025121851p-rcqx-bp-pH4.5+0.2SDSjz-jf50z-p2-10min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260122-FX280.lcb

样品瓶号 : 3-11

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/01/22 20:59:58

处理时间 (V3) : 2026/01/23 10:08:00

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.980	35931	100.000	6114	2542	1.184	--
总计		35931	100.000	6114			



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 10-19/31-1097-3 - zzp-2025121851p-rcqx-bp-pH4.5+0.2SDSjz-jf50z-p3-10min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260122-FX280.lcb

样品瓶号 : 3-20

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/01/22 21:03:20

处理时间 (V3) : 2026/01/23 10:08:02

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.979	37496	100.000	6342	2509	1.183	--
总计		37496	100.000	6342			



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30℃

数据文件名: RC\$QTL-392 - 10-19/31-1098-3 - zzp-2025121851p-rcqx-bp-pH4.5+0.2SDSjz-jf50z-p4-10min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260122-FX280.lcb

样品瓶号 : 3-29

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/01/22 21:06:42

处理时间 (V3) : 2026/01/23 10:08:06

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.975	36496	100.000	6201	2527	1.189	--
总计		36496	100.000	6201			



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30℃

数据文件名: RC\$QTL-392 - 10-19/31-1099-3 - zzp-2025121851p-rcqx-bp-pH4.5+0.2SDSjz-jf50z-p5-10min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260122-FX280.lcb

样品瓶号 : 3-38

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/01/22 21:10:04

处理时间 (V3) : 2026/01/23 10:08:08

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.979	37260	100.000	6320	2517	1.185	--
总计		37260	100.000	6320			



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30℃

数据文件名: RC\$QTL-392 - 10-19/31-1100-3 - zzp-2025121851p-rcqx-bp-pH4.5+0.2SDSjz-jf50z-p6-10min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260122-FX280.lcb

样品瓶号 : 3-47

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/01/22 21:13:26

处理时间 (V3) : 2026/01/23 10:08:11

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.979	38693	100.000	6466	2469	1.185	--
总计		38693	100.000	6466			



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30℃

数据文件名: RC\$QTL-392 - 10-19/31-1101-3 - zzp-2025121851p-rcqx-bp-pH4.5+0.2SDSjz-jf50z-p1-15min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260122-FX280.lcb

样品瓶号 : 3-3

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/01/22 21:16:49

处理时间 (V3) : 2026/01/23 10:08:14

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.977	35689	100.000	6031	2507	1.186	--
总计		35689	100.000	6031			



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 10-19/31-1102-3 - zzp-2025121851p-rcqx-bp-pH4.5+0.2SDSjz-jf50z-p2-15min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260122-FX280.lcb

样品瓶号 : 3-12

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/01/22 21:20:11

处理时间 (V3) : 2026/01/23 10:08:16

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.977	37237	100.000	6275	2495	1.190	--
总计		37237	100.000	6275			



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30℃

数据文件名: RC\$QTL-392 - 10-19/31-1103-3 - zzp-2025121851p-rcqx-bp-pH4.5+0.2SDSjz-jf50z-p3-15min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260122-FX280.lcb

样品瓶号 : 3-21

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/01/22 21:23:33

处理时间 (V3) : 2026/01/23 10:08:19

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.978	38307	100.000	6462	2509	1.180	--
总计		38307	100.000	6462			



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 10-19/31-1104-3 - zzp-2025121851p-rcqx-bp-pH4.5+0.2SDSjz-jf50z-p4-15min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260122-FX280.lcb

样品瓶号 : 3-30

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/01/22 21:26:56

处理时间 (V3) : 2026/01/23 10:08:22

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.980	38615	100.000	6515	2493	1.181	--
总计		38615	100.000	6515			



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30℃

数据文件名: RC\$QTL-392 - 10-19/31-1105-3 - zzp-2025121851p-rcqx-bp-pH4.5+0.2SDSjz-jf50z-p5-15min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260122-FX280.lcb

样品瓶号 : 3-39

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/01/22 21:30:17

处理时间 (V3) : 2026/01/23 10:08:24

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.976	39305	100.000	6584	2481	1.189	--
总计		39305	100.000	6584			



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 10-19/31-1106-3 - zzp-2025121851p-rcqx-bp-pH4.5+0.2SDSjz-jf50z-p6-15min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260122-FX280.lcb

样品瓶号 : 3-48

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/01/22 21:33:39

处理时间 (V3) : 2026/01/23 10:08:27

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.977	39151	100.000	6523	2457	1.193	--
总计		39151	100.000	6523			



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30℃

数据文件名: RC\$QTL-392 - 10-19/31-1107-3 - zzp-2025121851p-rcqx-bp-pH4.5+0.2SDSjz-jf50z-p1-20min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260122-FX280.lcb

样品瓶号 : 3-4

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/01/22 21:37:01

处理时间 (V3) : 2026/01/23 10:08:30

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.980	35941	100.000	6088	2501	1.197	--
总计		35941	100.000	6088			



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 10-19/31-1108-3 - zzp-2025121851p-rcqx-bp-pH4.5+0.2SDSjz-jf50z-p2-20min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260122-FX280.lcb

样品瓶号 : 3-13

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/01/22 21:40:23

处理时间 (V3) : 2026/01/23 10:08:32

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.980	38195	100.000	6409	2470	1.183	--
总计		38195	100.000	6409			



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 10-19/31-1109-3 - zzp-2025121851p-rcqx-bp-pH4.5+0.2SDSjz-jf50z-p3-20min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260122-FX280.lcb

样品瓶号 : 3-22

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/01/22 21:43:45

处理时间 (V3) : 2026/01/23 10:08:35

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.980	39109	100.000	6572	2473	1.189	--
总计		39109	100.000	6572			



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30℃

数据文件名: RC\$QTL-392 - 10-19/31-1110-3 - zzp-2025121851p-rcqx-bp-pH4.5+0.2SDSjz-jf50z-p4-20min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260122-FX280.lcb

样品瓶号 : 3-31

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/01/22 21:47:07

处理时间 (V3) : 2026/01/23 10:08:38

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.979	38999	100.000	6554	2473	1.185	--
总计		38999	100.000	6554			



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30℃

数据文件名: RC\$QTL-392 - 10-19/31-1111-3 - zzp-2025121851p-rcqx-bp-pH4.5+0.2SDSjz-jf50z-p5-20min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260122-FX280.lcb

样品瓶号 : 3-40

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/01/22 21:50:30

处理时间 (V3) : 2026/01/23 10:08:40

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.982	39757	100.000	6645	2471	1.187	--
总计		39757	100.000	6645			



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 10-19/31-1112-3 - zzp-2025121851p-rcqx-bp-pH4.5+0.2SDSjz-jf50z-p6-20min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260122-FX280.lcb

样品瓶号 : 3-49

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/01/22 21:53:52

处理时间 (V3) : 2026/01/23 10:08:43

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.982	39351	100.000	6573	2471	1.192	--
总计		39351	100.000	6573			



QTL-392

＜样品信息＞

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30℃

数据文件名: RC\$QTL-392 - 10-19/31-1113-3 - zzp-2025121851p-rcqx-bp-pH4.5+0.2SDSjz-jf50z-p1-30min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260122-FX280.lcb

样品瓶号 : 3-5

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/01/22 21:57:14

处理时间 (V3) : 2026/01/23 10:08:46

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.977	37845	100.000	6302	2450	1.201	--
总计		37845	100.000	6302			



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30℃

数据文件名: RC\$QTL-392 - 10-19/31-1114-3 - zzp-2025121851p-rcqx-bp-pH4.5+0.2SDSjz-jf50z-p2-30min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260122-FX280.lcb

样品瓶号 : 3-14

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/01/22 22:00:36

处理时间 (V3) : 2026/01/23 10:08:49

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.977	39345	100.000	6567	2454	1.188	--
总计		39345	100.000	6567			



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 10-19/31-1115-3 - zzp-2025121851p-rcqx-bp-pH4.5+0.2SDSjz-jf50z-p3-30min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260122-FX280.lcb

样品瓶号 : 3-23

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/01/22 22:03:58

处理时间 (V3) : 2026/01/23 10:08:51

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.982	40243	100.000	6732	2466	1.187	--
总计		40243	100.000	6732			



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 10-19/31-1116-3 - zzp-2025121851p-rcqx-bp-pH4.5+0.2SDSjz-jf50z-p4-30min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260122-FX280.lcb

样品瓶号 : 3-32

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/01/22 22:07:21

处理时间 (V3) : 2026/01/23 10:08:54

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.977	39391	100.000	6617	2471	1.191	--
总计		39391	100.000	6617			



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 10-19/31-1117-3 - zzp-2025121851p-rcqx-bp-pH4.5+0.2SDSjz-jf50z-p5-30min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260122-FX280.lcb

样品瓶号 : 3-41

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/01/22 22:10:41

处理时间 (V3) : 2026/01/23 10:08:57

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.981	40899	100.000	6818	2445	1.189	--
总计		40899	100.000	6818			



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 10-19/31-1118-3 - zzp-2025121851p-rcqx-bp-pH4.5+0.2SDSjz-jf50z-p6-30min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260122-FX280.lcb

样品瓶号 : 3-50

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/01/22 22:14:02

处理时间 (V3) : 2026/01/23 10:08:59

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.983	40397	100.000	6732	2453	1.192	--
总计		40397	100.000	6732			



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30℃

数据文件名: RC\$QTL-392 - 10-19/31-1119-3 - zzp-2025121851p-rcqx-bp-pH4.5+0.2SDSjz-jf50z-p1-45min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260122-FX280.lcb

样品瓶号 : 3-6

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/01/22 22:17:24

处理时间 (V3) : 2026/01/23 10:09:02

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.980	38780	100.000	6486	2443	1.188	--
总计		38780	100.000	6486			



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 10-19/31-1120-3 - zzp-2025121851p-rcqx-bp-pH4.5+0.2SDSjz-jf50z-p2-45min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260122-FX280.lcb

样品瓶号 : 3-15

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/01/22 22:20:47

处理时间 (V3) : 2026/01/23 10:09:05

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.981	41287	100.000	6871	2435	1.190	--
总计		41287	100.000	6871			



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 10-19/31-1121-3 - zzp-2025121851p-rcqx-bp-pH4.5+0.2SDSjz-jf50z-p3-45min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260122-FX280.lcb

样品瓶号 : 3-24

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/01/22 22:24:09

处理时间 (V3) : 2026/01/23 10:09:08

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.982	41015	100.000	6867	2459	1.194	--
总计		41015	100.000	6867			



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30℃

数据文件名: RC\$QTL-392 - 10-19/31-1122-3 - zzp-2025121851p-rcqx-bp-pH4.5+0.2SDSjz-jf50z-p4-45min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260122-FX280.lcb

样品瓶号 : 3-33

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/01/22 22:27:31

处理时间 (V3) : 2026/01/23 10:09:10

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.980	40512	100.000	6771	2451	1.192	--
总计		40512	100.000	6771			



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30℃

数据文件名: RC\$QTL-392 - 10-19/31-1123-3 - zzp-2025121851p-rcqx-bp-pH4.5+0.2SDSjz-jf50z-p5-45min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260122-FX280.lcb

样品瓶号 : 3-42

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/01/22 22:30:52

处理时间 (V3) : 2026/01/23 10:09:13

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.983	41506	100.000	6929	2458	1.192	--
总计		41506	100.000	6929			



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 10-19/31-1124-3 - zzp-2025121851p-rcqx-bp-pH4.5+0.2SDSjz-jf50z-p6-45min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260122-FX280.lcb

样品瓶号 : 3-51

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/01/22 22:34:13

处理时间 (V3) : 2026/01/23 10:09:16

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.981	40852	100.000	6849	2447	1.197	--
总计		40852	100.000	6849			



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 10-19/31-1125-3 - zzp-2025121851p-rcqx-bp-pH4.5+0.2SDSjz-jf50z-p1-60min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260122-FX280.lcb

样品瓶号 : 3-7

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/01/22 22:37:35

处理时间 (V3) : 2026/01/23 10:09:19

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.980	39219	100.000	6542	2435	1.186	--
总计		39219	100.000	6542			



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 10-19/31-1126-3 - zzp-2025121851p-rcqx-bp-pH4.5+0.2SDSjz-jf50z-p2-60min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260122-FX280.lcb

样品瓶号 : 3-16

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/01/22 22:40:56

处理时间 (V3) : 2026/01/23 10:09:21

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.983	40874	100.000	6799	2434	1.192	--
总计		40874	100.000	6799			



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 10-19/31-1127-3 - zzp-2025121851p-rcqx-bp-pH4.5+0.2SDSjz-jf50z-p3-60min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260122-FX280.lcb

样品瓶号 : 3-25

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/01/22 22:44:17

处理时间 (V3) : 2026/01/23 10:09:24

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.979	41924	100.000	6962	2408	1.193	--
总计		41924	100.000	6962			



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 10-19/31-1128-3 - zzp-2025121851p-rcqx-bp-pH4.5+0.2SDSjz-jf50z-p4-60min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260122-FX280.lcb

样品瓶号 : 3-34

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/01/22 22:47:39

处理时间 (V3) : 2026/01/23 10:09:27

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.978	41661	100.000	6946	2434	1.191	--
总计		41661	100.000	6946			



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 10-19/31-1129-3 - zzp-2025121851p-rcqx-bp-pH4.5+0.2SDSjz-jf50z-p5-60min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260122-FX280.lcb

样品瓶号 : 3-43

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/01/22 22:51:00

处理时间 (V3) : 2026/01/23 10:09:29

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.980	42806	100.000	7122	2418	1.187	--
总计		42806	100.000	7122			



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 10-19/31-1130-3 - zzp-2025121851p-rcqx-bp-pH4.5+0.2SDSjz-jf50z-p6-60min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260122-FX280.lcb

样品瓶号 : 3-52

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/01/22 22:54:21

处理时间 (V3) : 2026/01/23 10:09:32

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.981	42286	100.000	7011	2409	1.192	--
总计		42286	100.000	7011			



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 10-19/31-1131-3 - zzp-2025121851p-rcqx-bp-pH4.5+0.2SDSjz-jf50z-p1-jx.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260122-FX280.lcb

样品瓶号 : 3-8

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/01/22 22:57:44

处理时间 (V3) : 2026/01/23 10:09:35

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.981	40076	100.000	6636	2400	1.177	--
总计		40076	100.000	6636			



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30℃

数据文件名: RC\$QTL-392 - 10-19/31-1132-3 - zzp-2025121851p-rcqx-bp-pH4.5+0.2SDSjz-jf50z-p2-jx.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260122-FX280.lcb

样品瓶号 : 3-17

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/01/22 23:01:07

处理时间 (V3) : 2026/01/23 10:09:38

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.982	40233	100.000	6749	2452	1.194	--
总计		40233	100.000	6749			



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 10-19/31-1133-3 - zzp-2025121851p-rcqx-bp-pH4.5+0.2SDSjz-jf50z-p3-jx.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260122-FX280.lcb

样品瓶号 : 3-26

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/01/22 23:04:30

处理时间 (V3) : 2026/01/23 10:09:40

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.983	41714	100.000	6955	2444	1.196	--
总计		41714	100.000	6955			



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 10-19/31-1134-3 - zzp-2025121851p-rcqx-bp-pH4.5+0.2SDSjz-jf50z-p4-jx.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260122-FX280.lcb

样品瓶号 : 3-35

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/01/22 23:07:53

处理时间 (V3) : 2026/01/23 10:09:44

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.980	42651	100.000	7099	2429	1.188	--
总计		42651	100.000	7099			



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 10-19/31-1135-3 - zzp-2025121851p-rcqx-bp-pH4.5+0.2SDSjz-jf50z-p5-jx.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260122-FX280.lcb

样品瓶号 : 3-44

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/01/22 23:11:15

处理时间 (V3) : 2026/01/23 10:09:47

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.979	42847	100.000	7137	2417	1.187	--
总计		42847	100.000	7137			



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 10-19/31-1136-3 - zzp-2025121851p-rcqx-bp-pH4.5+0.2SDSjz-jf50z-p6-jx.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260122-FX280.lcb

样品瓶号 : 3-53

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/01/22 23:14:37

处理时间 (V3) : 2026/01/23 10:09:49

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.978	41752	100.000	6968	2434	1.198	--
总计		41752	100.000	6968			



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30℃

数据文件名: RC\$QTL-392 - 10-19/31-1137-3 - zzp-2025121851p-rcqx-bp-pH4.5+0.2SDSjz-jf50z-dz2-1.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260122-FX280.lcb

样品瓶号 : 3-27

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/01/22 23:17:59

处理时间 (V3) : 2026/01/23 10:09:52

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.0ml/min

波长:210nm


版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.946	52570	100.000	8059	2068	1.149	--
总计		52570	100.000	8059			



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 10-19/31-1138-3 - zzp-2025121851p-rcqx-bp-pH4.5+0.2SDSjz-jf50z-dz2-2.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260122-FX280.lcb

样品瓶号 : 3-27

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/01/22 23:21:22

处理时间 (V3) : 2026/01/23 10:09:55

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.944	52800	100.000	8082	2058	1.152	--
总计		52800	100.000	8082			



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30℃

数据文件名: RC\$QTL-392 - 10-19/31-1139-3 - zzp-2025121851p-rcqx-zp-pH4.5+0.2SDSjz-jf50z-rj.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260122-FX280.lcb

样品瓶号 : 4-9

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/01/22 23:24:47

处理时间 (V3) : 2026/01/23 10:09:57

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.0ml/min

波长:210nm


版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30℃

数据文件名: RC\$QTL-392 - 10-19/31-1140-3 - zzp-2025121851p-rcqx-zp-pH4.5+0.2SDSjz-jf50z-dz1-1.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260122-FX280.lcb

样品瓶号 : 4-18

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/01/22 23:28:11

处理时间 (V3) : 2026/01/23 10:10:00

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.945	52495	100.000	8048	2060	1.148	--
总计		52495	100.000	8048			



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 10-19/31-1141-3 - zzp-2025121851p-rcqx-zp-pH4.5+0.2SDSjz-jf50z-dz1-2.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260122-FX280.lcb

样品瓶号 : 4-18

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/01/22 23:31:35

处理时间 (V3) : 2026/01/23 10:10:03

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.947	52705	100.000	8098	2068	1.148	--
总计		52705	100.000	8098			



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30℃

数据文件名: RC\$QTL-392 - 10-19/31-1142-3 - zzp-2025121851p-rcqx-zp-pH4.5+0.2SDSjz-jf50z-dz1-3.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260122-FX280.lcb

样品瓶号 : 4-18

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/01/22 23:34:58

处理时间 (V3) : 2026/01/23 10:10:05

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.946	52860	100.000	8118	2056	1.139	--
总计		52860	100.000	8118			



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 10-19/31-1143-3 - zzp-2025121851p-rcqx-zp-pH4.5+0.2SDSjz-jf50z-dz1-4.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260122-FX280.lcb

样品瓶号 : 4-18

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/01/22 23:38:22

处理时间 (V3) : 2026/01/23 10:10:08

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.952	53036	100.000	8095	2053	1.142	--
总计		53036	100.000	8095			



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 10-19/31-1144-3 - zzp-2025121851p-rcqx-zp-pH4.5+0.2SDSjz-jf50z-dz1-5.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260122-FX280.lcb

样品瓶号 : 4-18

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/01/22 23:41:46

处理时间 (V3) : 2026/01/23 10:10:11

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.946	53008	100.000	8140	2050	1.142	--
总计		53008	100.000	8140			



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30℃

数据文件名: RC\$QTL-392 - 10-19/31-1145-3 - zzp-2025121851p-rcqx-zp-pH4.5+0.2SDSjz-jf50z-p1-5min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260122-FX280.lcb

样品瓶号 : 4-1

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/01/22 23:45:09

处理时间 (V3) : 2026/01/23 10:10:13

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.978	34013	100.000	5819	2516	1.158	--
总计		34013	100.000	5819			



QTL-392

＜样品信息＞

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30℃

数据文件名: RC\$QTL-392 - 10-19/31-1146-3 - zzp-2025121851p-rcqx-zp-pH4.5+0.2SDSjz-jf50z-p2-5min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260122-FX280.lcb

样品瓶号 : 4-10

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/01/22 23:48:32

处理时间 (V3) : 2026/01/23 10:10:16

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.980	37266	100.000	6227	2437	1.207	--
总计		37266	100.000	6227			



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30℃

数据文件名: RC\$QTL-392 - 10-19/31-1147-3 - zzp-2025121851p-rcqx-zp-pH4.5+0.2SDSjz-jf50z-p3-5min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260122-FX280.lcb

样品瓶号 : 4-19

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/01/22 23:51:54

处理时间 (V3) : 2026/01/23 10:10:19

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.981	39461	100.000	6455	2361	1.202	--
总计		39461	100.000	6455			



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 10-19/31-1148-3 - zzp-2025121851p-rcqx-zp-pH4.5+0.2SDSjz-jf50z-p4-5min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260122-FX280.lcb

样品瓶号 : 4-28

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/01/22 23:55:17

处理时间 (V3) : 2026/01/23 10:10:22

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.979	40226	100.000	6428	2267	1.239	--
总计		40226	100.000	6428			



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 10-19/31-1149-3 - zzp-2025121851p-rcqx-zp-pH4.5+0.2SDSjz-jf50z-p5-5min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260122-FX280.lcb

样品瓶号 : 4-37

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/01/22 23:58:40

处理时间 (V3) : 2026/01/23 10:10:24

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.980	38945	100.000	6336	2337	1.213	--
总计		38945	100.000	6336			



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 10-19/31-1150-3 - zzp-2025121851p-rcqx-zp-pH4.5+0.2SDSjz-jf50z-p6-5min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260122-FX280.lcb

样品瓶号 : 4-46

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/01/23 00:02:02

处理时间 (V3) : 2026/01/23 10:10:27

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.979	37809	100.000	6143	2325	1.230	--
总计		37809	100.000	6143			



QTL-392

＜样品信息＞

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30℃

数据文件名: RC\$QTL-392 - 10-19/31-1151-3 - zzp-2025121851p-rcqx-zp-pH4.5+0.2SDSjz-jf50z-p1-10min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260122-FX280.lcb

样品瓶号 : 4-2

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/01/23 00:05:26

处理时间 (V3) : 2026/01/23 10:10:29

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.980	42487	100.000	6941	2344	1.186	--
总计		42487	100.000	6941			



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 10-19/31-1152-3 - zzp-2025121851p-rcqx-zp-pH4.5+0.2SDSjz-jf50z-p2-10min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260122-FX280.lcb

样品瓶号 : 4-11

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/01/23 00:08:49

处理时间 (V3) : 2026/01/23 10:10:32

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.982	42379	100.000	6874	2336	1.203	--
总计		42379	100.000	6874			



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 10-19/31-1153-3 - zzp-2025121851p-rcqx-zp-pH4.5+0.2SDSjz-jf50z-p3-10min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260122-FX280.lcb

样品瓶号 : 4-20

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/01/23 00:12:12

处理时间 (V3) : 2026/01/23 10:10:35

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.984	42743	100.000	6950	2355	1.199	--
总计		42743	100.000	6950			



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 10-19/31-1154-3 - zzp-2025121851p-rcqx-zp-pH4.5+0.2SDSjz-jf50z-p4-10min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260122-FX280.lcb

样品瓶号 : 4-29

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/01/23 00:15:35

处理时间 (V3) : 2026/01/23 10:10:38

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.980	41302	100.000	6771	2346	1.205	--
总计		41302	100.000	6771			



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30℃

数据文件名: RC\$QTL-392 - 10-19/31-1155-3 - zzp-2025121851p-rcqx-zp-pH4.5+0.2SDSjz-jf50z-p5-10min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260122-FX280.lcb

样品瓶号 : 4-38

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/01/23 00:18:57

处理时间 (V3) : 2026/01/23 10:10:40

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.980	41150	100.000	6761	2372	1.201	--
总计		41150	100.000	6761			



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 10-19/31-1156-3 - zzp-2025121851p-rcqx-zp-pH4.5+0.2SDSjz-jf50z-p6-10min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260122-FX280.lcb

样品瓶号 : 4-47

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/01/23 00:22:20

处理时间 (V3) : 2026/01/23 10:10:43

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.981	40591	100.000	6645	2352	1.200	--
总计		40591	100.000	6645			



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 10-19/31-1157-3 - zzp-2025121851p-rcqx-zp-pH4.5+0.2SDSjz-jf50z-p1-15min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260122-FX280.lcb

样品瓶号 : 4-3

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/01/23 00:25:43

处理时间 (V3) : 2026/01/23 10:10:46

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.981	44127	100.000	7171	2328	1.188	--
总计		44127	100.000	7171			



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 10-19/31-1158-3 - zzp-2025121851p-rcqx-zp-pH4.5+0.2SDSjz-jf50z-p2-15min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260122-FX280.lcb

样品瓶号 : 4-12

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/01/23 00:29:05

处理时间 (V3) : 2026/01/23 10:10:48

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.980	44360	100.000	7191	2324	1.189	--
总计		44360	100.000	7191			



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 10-19/31-1159-3 - zzp-2025121851p-rcqx-zp-pH4.5+0.2SDSjz-jf50z-p3-15min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260122-FX280.lcb

样品瓶号 : 4-21

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/01/23 00:32:29

处理时间 (V3) : 2026/01/23 10:10:51

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.983	44817	100.000	7267	2340	1.192	--
总计		44817	100.000	7267			



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 10-19/31-1160-3 - zzp-2025121851p-rcqx-zp-pH4.5+0.2SDSjz-jf50z-p4-15min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260122-FX280.lcb

样品瓶号 : 4-30

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/01/23 00:35:52

处理时间 (V3) : 2026/01/23 10:10:54

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.982	43470	100.000	7067	2330	1.197	--
总计		43470	100.000	7067			



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 10-19/31-1161-3 - zzp-2025121851p-rcqx-zp-pH4.5+0.2SDSjz-jf50z-p5-15min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260122-FX280.lcb

样品瓶号 : 4-39

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/01/23 00:39:15

处理时间 (V3) : 2026/01/23 10:10:57

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.983	41535	100.000	6809	2367	1.207	--
总计		41535	100.000	6809			



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 10-19/31-1162-3 - zzp-2025121851p-rcqx-zp-pH4.5+0.2SDSjz-jf50z-p6-15min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260122-FX280.lcb

样品瓶号 : 4-48

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/01/23 00:42:38

处理时间 (V3) : 2026/01/23 10:10:59

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.982	41243	100.000	6774	2363	1.198	--
总计		41243	100.000	6774			



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30℃

数据文件名: RC\$QTL-392 - 10-19/31-1163-3 - zzp-2025121851p-rcqx-zp-pH4.5+0.2SDSjz-jf50z-p1-20min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260122-FX280.lcb

样品瓶号 : 4-4

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/01/23 00:46:02

处理时间 (V3) : 2026/01/23 10:11:02

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.980	45097	100.000	7295	2303	1.193	--
总计		45097	100.000	7295			



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 10-19/31-1164-3 - zzp-2025121851p-rcqx-zp-pH4.5+0.2SDSjz-jf50z-p2-20min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260122-FX280.lcb

样品瓶号 : 4-13

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/01/23 00:50:19

处理时间 (V3) : 2026/01/23 10:11:05

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.981	45013	100.000	7293	2313	1.206	--
总计		45013	100.000	7293			



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 10-19/31-1165-3 - zzp-2025121851p-rcqx-zp-pH4.5+0.2SDSjz-jf50z-p3-20min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260122-FX280.lcb

样品瓶号 : 4-22

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/01/23 00:53:42

处理时间 (V3) : 2026/01/23 10:11:08

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.985	45261	100.000	7324	2318	1.206	--
总计		45261	100.000	7324			



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 10-19/31-1166-3 - zzp-2025121851p-rcqx-zp-pH4.5+0.2SDSjz-jf50z-p4-20min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260122-FX280.lcb

样品瓶号 : 4-31

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/01/23 00:57:04

处理时间 (V3) : 2026/01/23 10:11:10

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.986	44890	100.000	7206	2300	1.204	--
总计		44890	100.000	7206			



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30℃

数据文件名: RC\$QTL-392 - 10-19/31-1167-3 - zzp-2025121851p-rcqx-zp-pH4.5+0.2SDSjz-jf50z-p5-20min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260122-FX280.lcb

样品瓶号 : 4-40

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/01/23 01:00:28

处理时间 (V3) : 2026/01/23 10:11:13

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.986	43647	100.000	7075	2314	1.201	--
总计		43647	100.000	7075			



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 10-19/31-1168-3 - zzp-2025121851p-rcqx-zp-pH4.5+0.2SDSjz-jf50z-p6-20min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260122-FX280.lcb

样品瓶号 : 4-49

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/01/23 01:03:51

处理时间 (V3) : 2026/01/23 10:11:16

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.984	42379	100.000	6872	2328	1.208	--
总计		42379	100.000	6872			



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 10-19/31-1169-3 - zzp-2025121851p-rcqx-zp-pH4.5+0.2SDSjz-jf50z-p1-30min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260122-FX280.lcb

样品瓶号 : 4-5

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/01/23 01:07:14

处理时间 (V3) : 2026/01/23 10:11:19

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.985	45848	100.000	7351	2296	1.202	--
总计		45848	100.000	7351			



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 10-19/31-1170-3 - zzp-2025121851p-rcqx-zp-pH4.5+0.2SDSjz-jf50z-p2-30min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260122-FX280.lcb

样品瓶号 : 4-14

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/01/23 01:10:37

处理时间 (V3) : 2026/01/23 10:11:21

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.983	47057	100.000	7531	2268	1.194	--
总计		47057	100.000	7531			



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 10-19/31-1171-3 - zzp-2025121851p-rcqx-zp-pH4.5+0.2SDSjz-jf50z-p3-30min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260122-FX280.lcb

样品瓶号 : 4-23

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/01/23 01:14:01

处理时间 (V3) : 2026/01/23 10:11:24

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.981	46424	100.000	7503	2293	1.196	--
总计		46424	100.000	7503			



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 10-19/31-1172-3 - zzp-2025121851p-rcqx-zp-pH4.5+0.2SDSjz-jf50z-p4-30min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260122-FX280.lcb

样品瓶号 : 4-32

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/01/23 01:17:24

处理时间 (V3) : 2026/01/23 10:11:27

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.980	45127	100.000	7275	2275	1.196	--
总计		45127	100.000	7275			



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 10-19/31-1173-3 - zzp-2025121851p-rcqx-zp-pH4.5+0.2SDSjz-jf50z-p5-30min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260122-FX280.lcb

样品瓶号 : 4-41

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/01/23 01:20:48

处理时间 (V3) : 2026/01/23 10:11:30

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.981	43930	100.000	7106	2288	1.191	--
总计		43930	100.000	7106			



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 10-19/31-1174-3 - zzp-2025121851p-rcqx-zp-pH4.5+0.2SDSjz-jf50z-p6-30min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260122-FX280.lcb

样品瓶号 : 4-50

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/01/23 01:24:11

处理时间 (V3) : 2026/01/23 10:11:33

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.981	41350	100.000	6755	2317	1.186	--
总计		41350	100.000	6755			



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 10-19/31-1175-3 - zzp-2025121851p-rcqx-zp-pH4.5+0.2SDSjz-jf50z-p1-45min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260122-FX280.lcb

样品瓶号 : 4-6

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/01/23 01:27:34

处理时间 (V3) : 2026/01/23 10:11:36

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.980	48328	100.000	7702	2230	1.174	--
总计		48328	100.000	7702			



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 10-19/31-1176-3 - zzp-2025121851p-rcqx-zp-pH4.5+0.2SDSjz-jf50z-p2-45min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260122-FX280.lcb

样品瓶号 : 4-15

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/01/23 01:30:57

处理时间 (V3) : 2026/01/23 10:11:38

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.984	48727	100.000	7715	2236	1.179	--
总计		48727	100.000	7715			



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 10-19/31-1177-3 - zzp-2025121851p-rcqx-zp-pH4.5+0.2SDSjz-jf50z-p3-45min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260122-FX280.lcb

样品瓶号 : 4-24

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/01/23 01:34:21

处理时间 (V3) : 2026/01/23 10:11:42

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.985	49605	100.000	7843	2233	1.188	--
总计		49605	100.000	7843			



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 10-19/31-1178-3 - zzp-2025121851p-rcqx-zp-pH4.5+0.2SDSjz-jf50z-p4-45min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260122-FX280.lcb

样品瓶号 : 4-33

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/01/23 01:37:45

处理时间 (V3) : 2026/01/23 10:11:44

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.981	47395	100.000	7578	2239	1.185	--
总计		47395	100.000	7578			



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 10-19/31-1179-3 - zzp-2025121851p-rcqx-zp-pH4.5+0.2SDSjz-jf50z-p5-45min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260122-FX280.lcb

样品瓶号 : 4-42

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/01/23 01:41:08

处理时间 (V3) : 2026/01/23 10:11:47

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.984	46904	100.000	7482	2263	1.190	--
总计		46904	100.000	7482			



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 10-19/31-1180-3 - zzp-2025121851p-rcqx-zp-pH4.5+0.2SDSjz-jf50z-p6-45min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260122-FX280.lcb

样品瓶号 : 4-51

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/01/23 01:44:32

处理时间 (V3) : 2026/01/23 10:11:50

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.984	45143	100.000	7221	2260	1.191	--
总计		45143	100.000	7221			



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30℃

数据文件名: RC\$QTL-392 - 10-19/31-1181-3 - zzp-2025121851p-rcqx-zp-pH4.5+0.2SDSjz-jf50z-p1-60min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260122-FX280.lcb

样品瓶号 : 4-7

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/01/23 01:47:55

处理时间 (V3) : 2026/01/23 10:11:53

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.984	48196	100.000	7630	2241	1.194	--
总计		48196	100.000	7630			



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 10-19/31-1182-3 - zzp-2025121851p-rcqx-zp-pH4.5+0.2SDSjz-jf50z-p2-60min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260122-FX280.lcb

样品瓶号 : 4-16

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/01/23 01:51:19

处理时间 (V3) : 2026/01/23 10:11:55

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.982	49128	100.000	7808	2222	1.180	--
总计		49128	100.000	7808			



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 10-19/31-1183-3 - zzp-2025121851p-rcqx-zp-pH4.5+0.2SDSjz-jf50z-p3-60min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260122-FX280.lcb

样品瓶号 : 4-25

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/01/23 01:54:43

处理时间 (V3) : 2026/01/23 10:11:58

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.981	49194	100.000	7813	2223	1.190	--
总计		49194	100.000	7813			



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 10-19/31-1184-3 - zzp-2025121851p-rcqx-zp-pH4.5+0.2SDSjz-jf50z-p4-60min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260122-FX280.lcb

样品瓶号 : 4-34

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/01/23 01:58:07

处理时间 (V3) : 2026/01/23 10:12:01

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.981	47412	100.000	7547	2219	1.193	--
总计		47412	100.000	7547			



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 10-19/31-1185-3 - zzp-2025121851p-rcqx-zp-pH4.5+0.2SDSjz-jf50z-p5-60min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260122-FX280.lcb

样品瓶号 : 4-43

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/01/23 02:01:31

处理时间 (V3) : 2026/01/23 10:12:03

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.985	48076	100.000	7617	2224	1.190	--
总计		48076	100.000	7617			



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 10-19/31-1186-3 - zzp-2025121851p-rcqx-zp-pH4.5+0.2SDSjz-jf50z-p6-60min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260122-FX280.lcb

样品瓶号 : 4-52

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/01/23 02:04:54

处理时间 (V3) : 2026/01/23 10:12:06

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.985	44993	100.000	7219	2258	1.193	--
总计		44993	100.000	7219			



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 10-19/31-1187-3 - zzp-2025121851p-rcqx-zp-pH4.5+0.2SDSjz-jf50z-p1-jx.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260122-FX280.lcb

样品瓶号 : 4-8

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/01/23 02:08:18

处理时间 (V3) : 2026/01/23 10:12:09

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.981	49263	100.000	7834	2221	1.185	--
总计		49263	100.000	7834			



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30℃

数据文件名: RC\$QTL-392 - 10-19/31-1188-3 - zzp-2025121851p-rcqx-zp-pH4.5+0.2SDSjz-jf50z-p2-jx.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260122-FX280.lcb

样品瓶号 : 4-17

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/01/23 02:11:42

处理时间 (V3) : 2026/01/23 10:12:12

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.981	50708	100.000	7942	2171	1.196	--
总计		50708	100.000	7942			



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30℃

数据文件名: RC\$QTL-392 - 10-19/31-1189-3 - zzp-2025121851p-rcqx-zp-pH4.5+0.2SDSjz-jf50z-p3-jx.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260122-FX280.lcb

样品瓶号 : 4-26

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/01/23 02:15:06

处理时间 (V3) : 2026/01/23 10:12:14

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.986	51379	100.000	8101	2205	1.184	--
总计		51379	100.000	8101			



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30℃

数据文件名: RC\$QTL-392 - 10-19/31-1190-3 - zzp-2025121851p-rcqx-zp-pH4.5+0.2SDSjz-jf50z-p4-jx.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260122-FX280.lcb

样品瓶号 : 4-35

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/01/23 02:18:30

处理时间 (V3) : 2026/01/23 10:12:17

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.984	48518	100.000	7640	2205	1.194	--
总计		48518	100.000	7640			



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30℃

数据文件名: RC\$QTL-392 - 10-19/31-1191-3 - zzp-2025121851p-rcqx-zp-pH4.5+0.2SDSjz-jf50z-p5-jx.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260122-FX280.lcb

样品瓶号 : 4-44

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/01/23 02:21:54

处理时间 (V3) : 2026/01/23 10:12:20

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.986	48175	100.000	7654	2228	1.183	--
总计		48175	100.000	7654			



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 10-19/31-1192-3 - zzp-2025121851p-rcqx-zp-pH4.5+0.2SDSjz-jf50z-p6-jx.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260122-FX280.lcb

样品瓶号 : 4-53

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/01/23 02:25:18

处理时间 (V3) : 2026/01/23 10:12:23

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.0ml/min

波长:210nm


版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.984	46870	100.000	7461	2232	1.183	--
总计		46870	100.000	7461			



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 10-19/31-1193-3 - zzp-2025121851p-rcqx-zp-pH4.5+0.2SDSjz-jf50z-dz2-1.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260122-FX280.lcb

样品瓶号 : 4-27

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/01/23 02:28:42

处理时间 (V3) : 2026/01/23 10:12:25

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.0ml/min

波长:210nm


版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.949	52976	100.000	7997	2016	1.156	--
总计		52976	100.000	7997			



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30℃

数据文件名: RC\$QTL-392 - 10-19/31-1194-3 - zzp-2025121851p-rcqx-zp-pH4.5+0.2SDSjz-jf50z-dz2-2.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260122-FX280.lcb

样品瓶号 : 4-27

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/01/23 02:32:05

处理时间 (V3) : 2026/01/23 10:12:28

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.949	53124	100.000	8041	2014	1.155	--
总计		53124	100.000	8041			



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30℃

数据文件名: RC\$QTL-392 - 10-20/31-1027-3 - zzp-2025121851p-rcqx-bp-pH1.2+0.5twjz-jf50z-rj.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260122-FX280.lcb

样品瓶号 : 2-9

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/01/22 17:05:35

处理时间 (V3) : 2026/01/23 10:13:57

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 10-20/31-1028-3 - zzp-2025121851p-rcqx-bp-pH1.2+0.5twjz-jf50z-dz1-1.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260122-FX280.lcb

样品瓶号 : 2-18

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/01/22 17:09:00

处理时间 (V3) : 2026/01/23 10:14:01

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.941	52214	100.000	8219	2169	1.138	--
总计		52214	100.000	8219			



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 10-20/31-1029-3 - zzp-2025121851p-rcqx-bp-pH1.2+0.5twjz-jf50z-dz1-2.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260122-FX280.lcb

样品瓶号 : 2-18

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/01/22 17:12:25

处理时间 (V3) : 2026/01/23 10:14:04

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.939	52023	100.000	8260	2184	1.132	--
总计		52023	100.000	8260			



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30℃

数据文件名: RC\$QTL-392 - 10-20/31-1030-3 - zzp-2025121851p-rcqx-bp-pH1.2+0.5twjz-jf50z-dz1-3.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260122-FX280.lcb

样品瓶号 : 2-18

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/01/22 17:15:50

处理时间 (V3) : 2026/01/23 10:14:07

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.941	52182	100.000	8282	2182	1.125	--
总计		52182	100.000	8282			



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30℃

数据文件名: RC\$QTL-392 - 10-20/31-1031-3 - zzp-2025121851p-rcqx-bp-pH1.2+0.5twjz-jf50z-dz1-4.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260122-FX280.lcb

样品瓶号 : 2-18

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/01/22 17:19:15

处理时间 (V3) : 2026/01/23 10:14:10

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.942	52769	100.000	8291	2167	1.126	--
总计		52769	100.000	8291			



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 10-20/31-1032-3 - zzp-2025121851p-rcqx-bp-pH1.2+0.5twjz-jf50z-dz1-5.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260122-FX280.lcb

样品瓶号 : 2-18

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/01/22 17:22:39

处理时间 (V3) : 2026/01/23 10:14:12

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.941	52288	100.000	8281	2178	1.130	--
总计		52288	100.000	8281			



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30℃

数据文件名: RC\$QTL-392 - 10-20/31-1033-3 - zzp-2025121851p-rcqx-bp-pH1.2+0.5twjz-jf50z-p1-5min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260122-FX280.lcb

样品瓶号 : 2-1

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/01/22 17:26:03

处理时间 (V3) : 2026/01/23 10:14:15

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.966	2476	100.000	502	3376	1.138	--
总计		2476	100.000	502			



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 10-20/31-1034-3 - zzp-2025121851p-rcqx-bp-pH1.2+0.5twjz-jf50z-p2-5min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260122-FX280.lcb

样品瓶号 : 2-10

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/01/22 17:29:26

处理时间 (V3) : 2026/01/23 10:14:18

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.967	2659	100.000	524	3176	1.115	--
总计		2659	100.000	524			



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 10-20/31-1035-3 - zzp-2025121851p-rcqx-bp-pH1.2+0.5twjz-jf50z-p3-5min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260122-FX280.lcb

样品瓶号 : 2-19

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/01/22 17:32:50

处理时间 (V3) : 2026/01/23 10:14:21

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.966	2954	100.000	573	3021	1.105	--
总计		2954	100.000	573			



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 10-20/31-1036-3 - zzp-2025121851p-rcqx-bp-pH1.2+0.5twjz-jf50z-p4-5min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260122-FX280.lcb

样品瓶号 : 2-28

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/01/22 17:36:14

处理时间 (V3) : 2026/01/23 10:14:23

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.966	2662	100.000	520	3218	1.116	--
总计		2662	100.000	520			



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 10-20/31-1037-3 - zzp-2025121851p-rcqx-bp-pH1.2+0.5twjz-jf50z-p5-5min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260122-FX280.lcb

样品瓶号 : 2-37

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/01/22 17:39:38

处理时间 (V3) : 2026/01/23 10:14:26

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.967	2477	100.000	490	3220	1.108	--
总计		2477	100.000	490			



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 10-20/31-1038-3 - zzp-2025121851p-rcqx-bp-pH1.2+0.5twjz-jf50z-p6-5min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260122-FX280.lcb

样品瓶号 : 2-46

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/01/22 17:43:01

处理时间 (V3) : 2026/01/23 10:14:29

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.969	2528	100.000	502	3226	1.101	--
总计		2528	100.000	502			



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30℃

数据文件名: RC\$QTL-392 - 10-20/31-1039-3 - zzp-2025121851p-rcqx-bp-pH1.2+0.5twjz-jf50z-p1-10min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260122-FX280.lcb

样品瓶号 : 2-2

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/01/22 17:46:24

处理时间 (V3) : 2026/01/23 10:14:31

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.968	3672	100.000	708	3164	1.108	--
总计		3672	100.000	708			



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 10-20/31-1040-3 - zzp-2025121851p-rcqx-bp-pH1.2+0.5twjz-jf50z-p2-10min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260122-FX280.lcb

样品瓶号 : 2-11

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/01/22 17:49:48

处理时间 (V3) : 2026/01/23 10:14:34

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.971	3887	100.000	762	3174	1.076	--
总计		3887	100.000	762			



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 10-20/31-1041-3 - zzp-2025121851p-rcqx-bp-pH1.2+0.5twjz-jf50z-p3-10min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260122-FX280.lcb

样品瓶号 : 2-20

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/01/22 17:53:11

处理时间 (V3) : 2026/01/23 10:14:37

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.969	4110	100.000	795	3093	1.081	--
总计		4110	100.000	795			



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30℃

数据文件名: RC\$QTL-392 - 10-20/31-1042-3 - zzp-2025121851p-rcqx-bp-pH1.2+0.5twjz-jf50z-p4-10min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260122-FX280.lcb

样品瓶号 : 2-29

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/01/22 17:56:35

处理时间 (V3) : 2026/01/23 10:14:40

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.968	3717	100.000	730	3234	1.091	--
总计		3717	100.000	730			



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 10-20/31-1043-3 - zzp-2025121851p-rcqx-bp-pH1.2+0.5twjz-jf50z-p5-10min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260122-FX280.lcb

样品瓶号 : 2-38

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/01/22 17:59:58

处理时间 (V3) : 2026/01/23 10:14:42

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.971	3698	100.000	724	3138	1.065	--
总计		3698	100.000	724			



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30℃

数据文件名: RC\$QTL-392 - 10-20/31-1044-3 - zzp-2025121851p-rcqx-bp-pH1.2+0.5twjz-jf50z-p6-10min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260122-FX280.lcb

样品瓶号 : 2-47

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/01/22 18:03:22

处理时间 (V3) : 2026/01/23 10:14:45

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.970	3578	100.000	698	3141	1.072	--
总计		3578	100.000	698			



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30℃

数据文件名: RC\$QTL-392 - 10-20/31-1045-3 - zzp-2025121851p-rcqx-bp-pH1.2+0.5twjz-jf50z-p1-15min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260122-FX280.lcb

样品瓶号 : 2-3

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/01/22 18:06:46

处理时间 (V3) : 2026/01/23 10:14:48

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.969	4592	100.000	879	3056	1.079	--
总计		4592	100.000	879			



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 10-20/31-1046-3 - zzp-2025121851p-rcqx-bp-pH1.2+0.5twjz-jf50z-p2-15min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260122-FX280.lcb

样品瓶号 : 2-12

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/01/22 18:10:10

处理时间 (V3) : 2026/01/23 10:14:51

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.968	4819	100.000	924	3114	1.080	--
总计		4819	100.000	924			



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 10-20/31-1047-3 - zzp-2025121851p-rcqx-bp-pH1.2+0.5twjz-jf50z-p3-15min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260122-FX280.lcb

样品瓶号 : 2-21

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/01/22 18:13:33

处理时间 (V3) : 2026/01/23 10:14:53

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.968	5006	100.000	967	3188	1.082	--
总计		5006	100.000	967			



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 10-20/31-1048-3 - zzp-2025121851p-rcqx-bp-pH1.2+0.5twjz-jf50z-p4-15min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260122-FX280.lcb

样品瓶号 : 2-30

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/01/22 18:16:56

处理时间 (V3) : 2026/01/23 10:14:56

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.968	4715	100.000	905	3100	1.092	--
总计		4715	100.000	905			



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 10-20/31-1049-3 - zzp-2025121851p-rcqx-bp-pH1.2+0.5twjz-jf50z-p5-15min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260122-FX280.lcb

样品瓶号 : 2-39

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/01/22 18:20:19

处理时间 (V3) : 2026/01/23 10:14:59

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.973	4631	100.000	893	3127	1.061	--
总计		4631	100.000	893			



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 10-20/31-1050-3 - zzp-2025121851p-rcqx-bp-pH1.2+0.5twjz-jf50z-p6-15min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260122-FX280.lcb

样品瓶号 : 2-48

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/01/22 18:23:42

处理时间 (V3) : 2026/01/23 10:15:02

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.967	4448	100.000	860	3152	1.090	--
总计		4448	100.000	860			



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30℃

数据文件名: RC\$QTL-392 - 10-20/31-1051-3 - zzp-2025121851p-rcqx-bp-pH1.2+0.5twjz-jf50z-p1-20min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260122-FX280.lcb

样品瓶号 : 2-4

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/01/22 18:27:06

处理时间 (V3) : 2026/01/23 10:15:04

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.969	5295	100.000	1018	3095	1.087	--
总计		5295	100.000	1018			



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 10-20/31-1052-3 - zzp-2025121851p-rcqx-bp-pH1.2+0.5twjz-jf50z-p2-20min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260122-FX280.lcb

样品瓶号 : 2-13

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/01/22 18:30:31

处理时间 (V3) : 2026/01/23 10:15:07

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.969	5561	100.000	1063	3070	1.084	--
总计		5561	100.000	1063			



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30℃

数据文件名: RC\$QTL-392 - 10-20/31-1053-3 - zzp-2025121851p-rcqx-bp-pH1.2+0.5twjz-jf50z-p3-20min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260122-FX280.lcb

样品瓶号 : 2-22

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/01/22 18:33:55

处理时间 (V3) : 2026/01/23 10:15:10

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.968	5749	100.000	1097	3058	1.067	--
总计		5749	100.000	1097			



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 10-20/31-1054-3 - zzp-2025121851p-rcqx-bp-pH1.2+0.5twjz-jf50z-p4-20min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260122-FX280.lcb

样品瓶号 : 2-31

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/01/22 18:37:19

处理时间 (V3) : 2026/01/23 10:15:12

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.972	5487	100.000	1051	3041	1.079	--
总计		5487	100.000	1051			



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 10-20/31-1055-3 - zzp-2025121851p-rcqx-bp-pH1.2+0.5twjz-jf50z-p5-20min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260122-FX280.lcb

样品瓶号 : 2-40

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/01/22 18:40:43

处理时间 (V3) : 2026/01/23 10:15:15

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.972	5404	100.000	1036	3084	1.078	--
总计		5404	100.000	1036			



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 10-20/31-1056-3 - zzp-2025121851p-rcqx-bp-pH1.2+0.5twjz-jf50z-p6-20min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260122-FX280.lcb

样品瓶号 : 2-49

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/01/22 18:44:07

处理时间 (V3) : 2026/01/23 10:15:18

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.968	5215	100.000	999	3084	1.092	--
总计		5215	100.000	999			



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30℃

数据文件名: RC\$QTL-392 - 10-20/31-1057-3 - zzp-2025121851p-rcqx-bp-pH1.2+0.5twjz-jf50z-p1-30min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260122-FX280.lcb

样品瓶号 : 2-5

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/01/22 18:47:32

处理时间 (V3) : 2026/01/23 10:15:21

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.971	6628	100.000	1266	3038	1.078	--
总计		6628	100.000	1266			



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 10-20/31-1058-3 - zzp-2025121851p-rcqx-bp-pH1.2+0.5twjz-jf50z-p2-30min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260122-FX280.lcb

样品瓶号 : 2-14

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/01/22 18:50:56

处理时间 (V3) : 2026/01/23 10:15:23

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.971	6716	100.000	1289	3087	1.082	--
总计		6716	100.000	1289			



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 10-20/31-1059-3 - zzp-2025121851p-rcqx-bp-pH1.2+0.5twjz-jf50z-p3-30min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260122-FX280.lcb

样品瓶号 : 2-23

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/01/22 18:54:20

处理时间 (V3) : 2026/01/23 10:15:26

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.973	7195	100.000	1370	3034	1.094	--
总计		7195	100.000	1370			



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 10-20/31-1060-3 - zzp-2025121851p-rcqx-bp-pH1.2+0.5twjz-jf50z-p4-30min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260122-FX280.lcb

样品瓶号 : 2-32

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/01/22 18:57:44

处理时间 (V3) : 2026/01/23 10:15:29

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.971	6719	100.000	1281	3048	1.090	--
总计		6719	100.000	1281			



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 10-20/31-1061-3 - zzp-2025121851p-rcqx-bp-pH1.2+0.5twjz-jf50z-p5-30min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260122-FX280.lcb

样品瓶号 : 2-41

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/01/22 19:01:08

处理时间 (V3) : 2026/01/23 10:15:31

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.970	6731	100.000	1279	3028	1.085	--
总计		6731	100.000	1279			



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 10-20/31-1062-3 - zzp-2025121851p-rcqx-bp-pH1.2+0.5twjz-jf50z-p6-30min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260122-FX280.lcb

样品瓶号 : 2-50

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/01/22 19:04:32

处理时间 (V3) : 2026/01/23 10:15:35

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.973	6351	100.000	1214	3067	1.092	--
总计		6351	100.000	1214			



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30℃

数据文件名: RC\$QTL-392 - 10-20/31-1063-3 - zzp-2025121851p-rcqx-bp-pH1.2+0.5twjz-jf50z-p1-45min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260122-FX280.lcb

样品瓶号 : 2-6

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/01/22 19:07:57

处理时间 (V3) : 2026/01/23 10:15:37

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.972	7891	100.000	1496	3034	1.081	--
总计		7891	100.000	1496			



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 10-20/31-1064-3 - zzp-2025121851p-rcqx-bp-pH1.2+0.5twjz-jf50z-p2-45min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260122-FX280.lcb

样品瓶号 : 2-15

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/01/22 19:11:21

处理时间 (V3) : 2026/01/23 10:15:41

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.970	8438	100.000	1589	2945	1.083	--
总计		8438	100.000	1589			



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 10-20/31-1065-3 - zzp-2025121851p-rcqx-bp-pH1.2+0.5twjz-jf50z-p3-45min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260122-FX280.lcb

样品瓶号 : 2-24

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/01/22 19:14:46

处理时间 (V3) : 2026/01/23 10:15:43

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.969	8678	100.000	1628	2955	1.086	--
总计		8678	100.000	1628			



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 10-20/31-1066-3 - zzp-2025121851p-rcqx-bp-pH1.2+0.5twjz-jf50z-p4-45min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260122-FX280.lcb

样品瓶号 : 2-33

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/01/22 19:18:10

处理时间 (V3) : 2026/01/23 10:15:46

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.971	8223	100.000	1549	2984	1.082	--
总计		8223	100.000	1549			



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 10-20/31-1067-3 - zzp-2025121851p-rcqx-bp-pH1.2+0.5twjz-jf50z-p5-45min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260122-FX280.lcb

样品瓶号 : 2-42

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/01/22 19:21:34

处理时间 (V3) : 2026/01/23 10:15:49

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.970	8032	100.000	1520	3006	1.085	--
总计		8032	100.000	1520			



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 10-20/31-1068-3 - zzp-2025121851p-rcqx-bp-pH1.2+0.5twjz-jf50z-p6-45min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260122-FX280.lcb

样品瓶号 : 2-51

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/01/22 19:24:59

处理时间 (V3) : 2026/01/23 10:15:52

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.971	7859	100.000	1481	2965	1.079	--
总计		7859	100.000	1481			



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 10-20/31-1069-3 - zzp-2025121851p-rcqx-bp-pH1.2+0.5twjz-jf50z-p1-60min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260122-FX280.lcb

样品瓶号 : 2-7

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/01/22 19:28:23

处理时间 (V3) : 2026/01/23 10:15:54

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.969	9122	100.000	1710	2953	1.091	--
总计		9122	100.000	1710			



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 10-20/31-1070-3 - zzp-2025121851p-rcqx-bp-pH1.2+0.5twjz-jf50z-p2-60min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260122-FX280.lcb

样品瓶号 : 2-16

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/01/22 19:31:48

处理时间 (V3) : 2026/01/23 10:15:57

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.974	9474	100.000	1783	2980	1.088	--
总计		9474	100.000	1783			



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 10-20/31-1071-3 - zzp-2025121851p-rcqx-bp-pH1.2+0.5twjz-jf50z-p3-60min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260122-FX280.lcb

样品瓶号 : 2-25

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/01/22 19:35:13

处理时间 (V3) : 2026/01/23 10:16:00

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.969	9756	100.000	1826	2957	1.088	--
总计		9756	100.000	1826			



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 10-20/31-1072-3 - zzp-2025121851p-rcqx-bp-pH1.2+0.5twjz-jf50z-p4-60min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260122-FX280.lcb

样品瓶号 : 2-34

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/01/22 19:38:37

处理时间 (V3) : 2026/01/23 10:16:03

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.970	9260	100.000	1744	2981	1.086	--
总计		9260	100.000	1744			



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 10-20/31-1073-3 - zzp-2025121851p-rcqx-bp-pH1.2+0.5twjz-jf50z-p5-60min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260122-FX280.lcb

样品瓶号 : 2-43

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/01/22 19:42:01

处理时间 (V3) : 2026/01/23 10:16:05

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.968	9091	100.000	1700	2963	1.099	--
总计		9091	100.000	1700			



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 10-20/31-1074-3 - zzp-2025121851p-rcqx-bp-pH1.2+0.5twjz-jf50z-p6-60min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260122-FX280.lcb

样品瓶号 : 2-52

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/01/22 19:45:25

处理时间 (V3) : 2026/01/23 10:16:08

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.968	8914	100.000	1682	3004	1.094	--
总计		8914	100.000	1682			



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 10-20/31-1075-3 - zzp-2025121851p-rcqx-bp-pH1.2+0.5twjz-jf50z-p1-jx.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260122-FX280.lcb

样品瓶号 : 2-8

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/01/22 19:48:50

处理时间 (V3) : 2026/01/23 10:16:11

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.970	10993	100.000	2059	2962	1.088	--
总计		10993	100.000	2059			



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 10-21/31-1076-4 - zzp-2025121851p-rcqx-bp-pH1.2+0.5twjz-jf50z-p2-jx.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260122-FX280.lcb

样品瓶号 : 2-17

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/01/22 19:52:14

处理时间 (V4) : 2026/01/23 10:26:06

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.974	12498	100.000	2211	2794	--	--
总计		12498	100.000	2211			



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30℃

数据文件名: RC\$QTL-392 - 10-20/31-1077-3 - zzp-2025121851p-rcqx-bp-pH1.2+0.5twjz-jf50z-p3-jx.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260122-FX280.lcb

样品瓶号 : 2-26

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/01/22 19:55:39

处理时间 (V3) : 2026/01/23 10:16:16

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.974	11562	100.000	2149	2950	1.089	--
总计		11562	100.000	2149			



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30℃

数据文件名: RC\$QTL-392 - 10-20/31-1078-3 - zzp-2025121851p-rcqx-bp-pH1.2+0.5twjz-jf50z-p4-jx.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260122-FX280.lcb

样品瓶号 : 2-35

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/01/22 19:59:03

处理时间 (V3) : 2026/01/23 10:16:19

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.971	11292	100.000	2099	2925	1.092	--
总计		11292	100.000	2099			



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30℃

数据文件名: RC\$QTL-392 - 10-20/31-1079-3 - zzp-2025121851p-rcqx-bp-pH1.2+0.5twjz-jf50z-p5-jx.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260122-FX280.lcb

样品瓶号 : 2-44

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/01/22 20:02:27

处理时间 (V3) : 2026/01/23 10:16:22

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.970	10981	100.000	2051	2952	1.093	--
总计		10981	100.000	2051			



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 10-20/31-1080-3 - zzp-2025121851p-rcqx-bp-pH1.2+0.5twjz-jf50z-p6-jx.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260122-FX280.lcb

样品瓶号 : 2-53

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/01/22 20:05:51

处理时间 (V3) : 2026/01/23 10:16:25

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.972	10847	100.000	2037	2957	1.085	--
总计		10847	100.000	2037			



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 10-20/31-1081-3 - zzp-2025121851p-rcqx-bp-pH1.2+0.5twjz-jf50z-dz2-1.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260122-FX280.lcb

样品瓶号 : 2-27

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/01/22 20:09:16

处理时间 (V3) : 2026/01/23 10:16:28

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.943	52950	100.000	8065	2102	1.181	--
总计		52950	100.000	8065			



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 10-20/31-1082-3 - zzp-2025121851p-rcqx-bp-pH1.2+0.5twjz-jf50z-dz2-2.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260122-FX280.lcb

样品瓶号 : 2-27

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/01/22 20:12:41

处理时间 (V3) : 2026/01/23 10:16:31

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.943	52595	100.000	8135	2100	1.134	--
总计		52595	100.000	8135			