




HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温 : 35°C 波长: 259nm
数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-65/25-1332-2 - zzp-z6-2025062621p-rcqx-pH6.8jz-rj.lcd
方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20260130-RC-FX274.lcb
样品瓶号: 1-9
进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
进样时间: 2026/01/30 10:34:31 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2026/01/31 09:57:59 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图1 玛巴洛沙韦混悬剂溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
自制品-2025062621批-pH6.8介质
溶剂




HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温 : 35°C 波长: 259nm
数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-65/25-1333-2 - zzp-z6-2025062621p-rcqx-pH6.8jz-dz1-1.lcd
方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20260130-RC-FX274.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2026/01/30 10:37:55 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2026/01/31 09:58:03 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.147	97353	100.000	15692	2774	1.028	--
总计		97353	100.000	15692			

图2 玛巴洛沙韦混悬剂溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
自制品-2025062621批-pH6.8介质
对照品溶液-1-1




HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温 : 35°C 波长: 259nm
数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-65/25-1334-2 - zzp-z6-2025062621p-rcqx-pH6.8jz-dz1-2.lcd
方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20260130-RC-FX274.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2026/01/30 10:41:18 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2026/01/31 09:58:07 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.148	97557	100.000	15657	2767	1.030	--
总计		97557	100.000	15657			

图3 玛巴洛沙韦混悬剂溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
自制品-2025062621批-pH6.8介质
对照品溶液-1-2




HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温 : 35°C 波长: 259nm
数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-65/25-1335-2 - zzp-z6-2025062621p-rcqx-pH6.8jz-dz1-3.lcd
方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20260130-RC-FX274.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2026/01/30 10:44:42 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2026/01/31 09:58:10 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.148	97789	100.000	15682	2765	1.027	--
总计		97789	100.000	15682			

图4 玛巴洛沙韦混悬剂溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
自制品-2025062621批-pH6.8介质
对照品溶液-1-3




HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温 : 35°C
数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-65/25-1336-2 - zzp-z6-2025062621p-rcqx-pH6.8jz-dz1-4.lcd
方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20260130-RC-FX274.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/01/30 10:48:06
处理时间 (V2) : 2026/01/31 09:58:14
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.148	97297	100.000	15655	2771	1.028	--
总计		97297	100.000	15655			

图5 玛巴洛沙韦混悬剂溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
自制品-2025062621批-pH6.8介质
对照品溶液-1-4




HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温 : 35°C 波长: 259nm
数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-65/25-1337-2 - zzp-z6-2025062621p-rcqx-pH6.8jz-dz1-5.lcd
方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20260130-RC-FX274.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2026/01/30 10:51:30 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2026/01/31 09:58:17 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.148	97278	100.000	15645	2770	1.025	--
总计		97278	100.000	15645			

图6 玛巴洛沙韦混悬剂溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
自制品-2025062621批-pH6.8介质
对照品溶液-1-5




HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温 : 35°C 波长: 259nm
数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-65/25-1338-2 - zzp-z6-2025062621p-rcqx-pH6.8jz-p1-5min.lcd
方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20260130-RC-FX274.lcb
样品瓶号: 1-1
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2026/01/30 10:54:53 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2026/01/31 09:58:20 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.153	29142	100.000	4813	2934	1.029	--
总计		29142	100.000	4813			

图7 玛巴洛沙韦混悬剂溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
自制品-2025062621批-pH6.8介质-5min-片1
供试品溶液-1




HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温 : 35°C 波长: 259nm
数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-65/25-1339-2 - zzp-z6-2025062621p-rcqx-pH6.8jz-p2-5min.lcd
方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20260130-RC-FX274.lcb
样品瓶号: 1-10
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2026/01/30 10:58:16 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2026/01/31 09:58:22 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.154	29929	100.000	4932	2943	1.022	--
总计		29929	100.000	4932			

图8 玛巴洛沙韦混悬剂溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
自制品-2025062621批-pH6.8介质-5min-片2
供试品溶液-1




HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温 : 35°C 波长: 259nm
数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-65/25-1340-2 - zzp-z6-2025062621p-rcqx-pH6.8jz-p3-5min.lcd
方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20260130-RC-FX274.lcb
样品瓶号: 1-19
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2026/01/30 11:01:38 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2026/01/31 09:58:25 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.155	31542	100.000	5200	2945	1.011	--
总计		31542	100.000	5200			

图9 玛巴洛沙韦混悬剂溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
自制品-2025062621批-pH6.8介质-5min-片3
供试品溶液-1




HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温 : 35°C 波长: 259nm
数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-65/25-1341-2 - zzp-z6-2025062621p-rcqx-pH6.8jz-p4-5min.lcd
方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20260130-RC-FX274.lcb
样品瓶号: 1-28
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2026/01/30 11:05:02 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2026/01/31 09:58:28 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.154	30316	100.000	4997	2950	1.020	--
总计		30316	100.000	4997			

图10 玛巴洛沙韦混悬剂溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
自制品-2025062621批-pH6.8介质-5min-片4
供试品溶液-1




HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温 : 35°C 波长: 259nm
数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-65/25-1342-2 - zzp-z6-2025062621p-rcqx-pH6.8jz-p5-5min.lcd
方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20260130-RC-FX274.lcb
样品瓶号: 1-37
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2026/01/30 11:08:24 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2026/01/31 09:58:31 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.155	30756	100.000	5025	2917	1.011	--
总计		30756	100.000	5025			

图11 玛巴洛沙韦混悬剂溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
自制品-2025062621批-pH6.8介质-5min-片5
供试品溶液-1



HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 35°C

数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-65/25-1343-2 - zzp-z6-2025062621p-rcqx-pH6.8jz-p6-5min.lcd

方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20260130-RC-FX274.lcb

样品瓶号: 1-46

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/01/30 11:11:46

处理时间 (V2) : 2026/01/31 09:58:34

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min


波长: 259nm

版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.154	29043	100.000	4803	2945	1.022	--
总计		29043	100.000	4803			

图12 玛巴洛沙韦混悬剂溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
自制品-2025062621批-pH6.8介质-5min-片6
供试品溶液-1




HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温 : 35°C 波长: 259nm
数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-65/25-1344-2 - zzp-z6-2025062621p-rcqx-pH6.8jz-p1-10min.lcd
方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20260130-RC-FX274.lcb
样品瓶号: 1-2
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2026/01/30 11:15:09 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2026/01/31 09:58:37 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.154	34498	100.000	5695	2955	1.018	--
总计		34498	100.000	5695			

图13 玛巴洛沙韦混悬剂溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
自制品-2025062621批-pH6.8介质-10min-片1
供试品溶液-1




HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温 : 35°C 波长: 259nm
数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-65/25-1345-2 - zzp-z6-2025062621p-rcqx-pH6.8jz-p2-10min.lcd
方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20260130-RC-FX274.lcb
样品瓶号: 1-11
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2026/01/30 11:18:33 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2026/01/31 09:58:40 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.153	34853	100.000	5755	2941	1.019	--
总计		34853	100.000	5755			

图14 玛巴洛沙韦混悬剂溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
自制品-2025062621批-pH6.8介质-10min-片2
供试品溶液-1




HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温 : 35°C 波长: 259nm
数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-65/25-1346-2 - zzp-z6-2025062621p-rcqx-pH6.8jz-p3-10min.lcd
方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20260130-RC-FX274.lcb
样品瓶号: 1-20
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2026/01/30 11:21:55 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2026/01/31 09:58:43 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.154	35480	100.000	5870	2937	1.023	--
总计		35480	100.000	5870			

图15 玛巴洛沙韦混悬剂溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
自制品-2025062621批-pH6.8介质-10min-片3
供试品溶液-1




HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温 : 35 $^{\circ}$ C 波长: 259nm
数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-65/25-1347-2 - zzp-z6-2025062621p-rcqx-pH6.8jz-p4-10min.lcd
方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20260130-RC-FX274.lcb
样品瓶号: 1-29
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2026/01/30 11:25:18 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2026/01/31 09:58:46 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.154	34920	100.000	5769	2939	1.018	--
总计		34920	100.000	5769			

图16 玛巴洛沙韦混悬剂溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
自制品-2025062621批-pH6.8介质-10min-片4
供试品溶液-1




HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温 : 35°C 波长: 259nm
数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-65/25-1348-2 - zzp-z6-2025062621p-rcqx-pH6.8jz-p5-10min.lcd
方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20260130-RC-FX274.lcb
样品瓶号: 1-38
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2026/01/30 11:28:42 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2026/01/31 09:58:49 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.154	36050	100.000	5934	2929	1.017	--
总计		36050	100.000	5934			

图17 玛巴洛沙韦混悬剂溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
自制品-2025062621批-pH6.8介质-10min-片5
供试品溶液-1




HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温 : 35°C 波长: 259nm
数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-65/25-1349-2 - zzp-z6-2025062621p-rcqx-pH6.8jz-p6-10min.lcd
方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20260130-RC-FX274.lcb
样品瓶号: 1-47
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2026/01/30 11:32:04 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2026/01/31 09:58:52 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.154	33975	100.000	5600	2940	1.020	--
总计		33975	100.000	5600			

图18 玛巴洛沙韦混悬剂溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
自制品-2025062621批-pH6.8介质-10min-片6
供试品溶液-1




HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温 : 35°C 波长: 259nm
数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-65/25-1350-2 - zzp-z6-2025062621p-rcqx-pH6.8jz-p1-15min.lcd
方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20260130-RC-FX274.lcb
样品瓶号: 1-3
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2026/01/30 11:35:28 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2026/01/31 09:58:55 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.154	37355	100.000	6159	2944	1.019	--
总计		37355	100.000	6159			

图19 玛巴洛沙韦混悬剂溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
自制品-2025062621批-pH6.8介质-15min-片1
供试品溶液-1




HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温 : 35°C 波长: 259nm
数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-65/25-1351-2 - zzp-z6-2025062621p-rcqx-pH6.8jz-p2-15min.lcd
方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20260130-RC-FX274.lcb
样品瓶号: 1-12
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2026/01/30 11:38:50 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2026/01/31 09:58:58 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.154	37588	100.000	6201	2931	1.021	--
总计		37588	100.000	6201			

图20 玛巴洛沙韦混悬剂溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
自制品-2025062621批-pH6.8介质-15min-片2
供试品溶液-1




HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温 : 35 $^{\circ}$ C 波长: 259nm
数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-65/25-1352-2 - zzp-z6-2025062621p-rcqx-pH6.8jz-p3-15min.lcd
方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20260130-RC-FX274.lcb
样品瓶号: 1-21
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2026/01/30 11:42:13 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2026/01/31 09:59:01 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.154	38005	100.000	6269	2921	1.023	--
总计		38005	100.000	6269			

图21 玛巴洛沙韦混悬剂溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
自制品-2025062621批-pH6.8介质-15min-片3
供试品溶液-1




HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温 : 35 $^{\circ}$ C 波长: 259nm
数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-65/25-1353-2 - zzp-z6-2025062621p-rcqx-pH6.8jz-p4-15min.lcd
方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20260130-RC-FX274.lcb
样品瓶号: 1-30
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2026/01/30 11:45:37 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2026/01/31 09:59:04 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.154	37849	100.000	6262	2935	1.021	--
总计		37849	100.000	6262			

图22 玛巴洛沙韦混悬剂溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
自制品-2025062621批-pH6.8介质-15min-片4
供试品溶液-1




HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温 : 35°C 波长: 259nm
数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-65/25-1354-2 - zzp-z6-2025062621p-rcqx-pH6.8jz-p5-15min.lcd
方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20260130-RC-FX274.lcb
样品瓶号: 1-39
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2026/01/30 11:48:59 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2026/01/31 09:59:07 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.153	37519	100.000	6180	2915	1.024	--
总计		37519	100.000	6180			

图23 玛巴洛沙韦混悬剂溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
自制品-2025062621批-pH6.8介质-15min-片5
供试品溶液-1




HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温 : 35 $^{\circ}$ C 波长: 259nm
数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-65/25-1355-2 - zzp-z6-2025062621p-rcqx-pH6.8jz-p6-15min.lcd
方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20260130-RC-FX274.lcb
样品瓶号: 1-48
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2026/01/30 11:52:22 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2026/01/31 09:59:10 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.152	36156	100.000	5966	2937	1.024	--
总计		36156	100.000	5966			

图24 玛巴洛沙韦混悬剂溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
自制品-2025062621批-pH6.8介质-15min-片6
供试品溶液-1




HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温 : 35°C 波长: 259nm
数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-65/25-1356-2 - zzp-z6-2025062621p-rcqx-pH6.8jz-p1-20min.lcd
方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20260130-RC-FX274.lcb
样品瓶号: 1-4
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2026/01/30 11:55:44 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2026/01/31 09:59:13 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.154	39011	100.000	6409	2924	1.011	--
总计		39011	100.000	6409			

图25 玛巴洛沙韦混悬剂溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
自制品-2025062621批-pH6.8介质-20min-片1
供试品溶液-1




HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温 : 35°C 波长: 259nm
数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-65/25-1357-2 - zzp-z6-2025062621p-rcqx-pH6.8jz-p2-20min.lcd
方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20260130-RC-FX274.lcb
样品瓶号: 1-13
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2026/01/30 11:59:08 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2026/01/31 09:59:16 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.154	38580	100.000	6415	2963	1.015	--
总计		38580	100.000	6415			

图26 玛巴洛沙韦混悬剂溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
自制品-2025062621批-pH6.8介质-20min-片2
供试品溶液-1




HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温 : 35 $^{\circ}$ C 波长: 259nm
数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-65/25-1358-2 - zzp-z6-2025062621p-rcqx-pH6.8jz-p3-20min.lcd
方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20260130-RC-FX274.lcb
样品瓶号: 1-22
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2026/01/30 12:02:30 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2026/01/31 09:59:20 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.153	39671	100.000	6524	2921	1.023	--
总计		39671	100.000	6524			

图27 玛巴洛沙韦混悬剂溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
自制品-2025062621批-pH6.8介质-20min-片3
供试品溶液-1




HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温 : 35°C 波长: 259nm
数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-65/25-1359-2 - zzp-z6-2025062621p-rcqx-pH6.8jz-p4-20min.lcd
方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20260130-RC-FX274.lcb
样品瓶号: 1-31
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2026/01/30 12:05:52 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2026/01/31 09:59:23 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.154	38616	100.000	6343	2911	1.032	--
总计		38616	100.000	6343			

图28 玛巴洛沙韦混悬剂溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
自制品-2025062621批-pH6.8介质-20min-片4
供试品溶液-1




HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温 : 35°C 波长: 259nm
数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-65/25-1360-2 - zzp-z6-2025062621p-rcqx-pH6.8jz-p5-20min.lcd
方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20260130-RC-FX274.lcb
样品瓶号: 1-40
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2026/01/30 12:09:15 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2026/01/31 09:59:26 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.153	39308	100.000	6481	2923	1.014	--
总计		39308	100.000	6481			

图29 玛巴洛沙韦混悬剂溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
自制品-2025062621批-pH6.8介质-20min-片5
供试品溶液-1




HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温 : 35°C 波长: 259nm
数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-65/25-1361-2 - zzp-z6-2025062621p-rcqx-pH6.8jz-p6-20min.lcd
方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20260130-RC-FX274.lcb
样品瓶号: 1-49
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2026/01/30 12:12:38 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2026/01/31 09:59:29 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.155	38536	100.000	6329	2912	1.023	--
总计		38536	100.000	6329			

图30 玛巴洛沙韦混悬剂溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
自制品-2025062621批-pH6.8介质-20min-片6
供试品溶液-1




HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温 : 35 $^{\circ}$ C 波长: 259nm
数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-65/25-1362-2 - zzp-z6-2025062621p-rcqx-pH6.8jz-p1-30min.lcd
方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20260130-RC-FX274.lcb
样品瓶号: 1-5
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2026/01/30 12:16:00 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2026/01/31 09:59:32 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.155	40100	100.000	6613	2930	1.018	--
总计		40100	100.000	6613			

图31 玛巴洛沙韦混悬剂溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
自制品-2025062621批-pH6.8介质-30min-片1
供试品溶液-1



HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 35°C

数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-65/25-1363-2 - zzp-z6-2025062621p-rcqx-pH6.8jz-p2-30min.lcd

方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20260130-RC-FX274.lcb

样品瓶号: 1-14

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/01/30 12:19:24

处理时间 (V2) : 2026/01/31 09:59:35

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min


波长: 259nm

版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.154	40479	100.000	6667	2930	1.015	--
总计		40479	100.000	6667			

图32 玛巴洛沙韦混悬剂溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
自制品-2025062621批-pH6.8介质-30min-片2
供试品溶液-1



HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 35°C

数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-65/25-1364-2 - zzp-z6-2025062621p-rcqx-pH6.8jz-p3-30min.lcd

方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20260130-RC-FX274.lcb

样品瓶号: 1-23

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/01/30 12:22:47

处理时间 (V2) : 2026/01/31 09:59:38

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min


波长: 259nm

版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.154	40739	100.000	6710	2927	1.020	--
总计		40739	100.000	6710			

图33 玛巴洛沙韦混悬剂溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
自制品-2025062621批-pH6.8介质-30min-片3
供试品溶液-1



HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 35°C

数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-65/25-1365-2 - zzp-z6-2025062621p-rcqx-pH6.8jz-p4-30min.lcd

方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20260130-RC-FX274.lcb

样品瓶号: 1-32

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/01/30 12:26:10

处理时间 (V2) : 2026/01/31 09:59:41

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min


波长: 259nm

版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.155	40840	100.000	6712	2909	1.021	--
总计		40840	100.000	6712			

图34 玛巴洛沙韦混悬剂溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
自制品-2025062621批-pH6.8介质-30min-片4
供试品溶液-1




HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温 : 35°C 波长: 259nm
数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-65/25-1366-2 - zzp-z6-2025062621p-rcqx-pH6.8jz-p5-30min.lcd
方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20260130-RC-FX274.lcb
样品瓶号: 1-41
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2026/01/30 12:29:34 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2026/01/31 09:59:44 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.156	40977	100.000	6715	2909	1.019	--
总计		40977	100.000	6715			

图35 玛巴洛沙韦混悬剂溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
自制品-2025062621批-pH6.8介质-30min-片5
供试品溶液-1




HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温 : 35 $^{\circ}$ C 波长: 259nm
数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-65/25-1367-2 - zzp-z6-2025062621p-rcqx-pH6.8jz-p6-30min.lcd
方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20260130-RC-FX274.lcb
样品瓶号: 1-50
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2026/01/30 12:32:56 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2026/01/31 09:59:47 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.155	40060	100.000	6590	2914	1.019	--
总计		40060	100.000	6590			

图36 玛巴洛沙韦混悬剂溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
自制品-2025062621批-pH6.8介质-30min-片6
供试品溶液-1




HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温 : 35 $^{\circ}$ C 波长: 259nm
数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-65/25-1368-2 - zzp-z6-2025062621p-rcqx-pH6.8jz-p1-45min.lcd
方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20260130-RC-FX274.lcb
样品瓶号: 1-6
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2026/01/30 12:36:18 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2026/01/31 09:59:50 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.155	41925	100.000	6891	2922	1.019	--
总计		41925	100.000	6891			

图37 玛巴洛沙韦混悬剂溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
自制品-2025062621批-pH6.8介质-45min-片1
供试品溶液-1




HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温 : 35°C 波长: 259nm
数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-65/25-1369-2 - zzp-z6-2025062621p-rcqx-pH6.8jz-p2-45min.lcd
方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20260130-RC-FX274.lcb
样品瓶号: 1-15
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2026/01/30 12:39:42 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2026/01/31 09:59:53 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.154	41770	100.000	6896	2917	1.025	--
总计		41770	100.000	6896			

图38 玛巴洛沙韦混悬剂溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
自制品-2025062621批-pH6.8介质-45min-片2
供试品溶液-1




HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温 : 35°C 波长: 259nm
数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-65/25-1370-2 - zzp-z6-2025062621p-rcqx-pH6.8jz-p3-45min.lcd
方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20260130-RC-FX274.lcb
样品瓶号: 1-24
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2026/01/30 12:43:05 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2026/01/31 09:59:56 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.154	42053	100.000	6913	2910	1.021	--
总计		42053	100.000	6913			

图39 玛巴洛沙韦混悬剂溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
自制品-2025062621批-pH6.8介质-45min-片3
供试品溶液-1




HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温 : 35°C 波长: 259nm
数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-65/25-1371-2 - zzp-z6-2025062621p-rcqx-pH6.8jz-p4-45min.lcd
方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20260130-RC-FX274.lcb
样品瓶号: 1-33
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2026/01/30 12:46:29 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2026/01/31 09:59:59 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.155	41950	100.000	6886	2917	1.016	--
总计		41950	100.000	6886			

图40 玛巴洛沙韦混悬剂溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
自制品-2025062621批-pH6.8介质-45min-片4
供试品溶液-1




HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温 : 35°C 波长: 259nm
数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-65/25-1372-2 - zzp-z6-2025062621p-rcqx-pH6.8jz-p5-45min.lcd
方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20260130-RC-FX274.lcb
样品瓶号: 1-42
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2026/01/30 12:49:51 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2026/01/31 10:00:02 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.155	41657	100.000	6837	2916	1.020	--
总计		41657	100.000	6837			

图41 玛巴洛沙韦混悬剂溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
自制品-2025062621批-pH6.8介质-45min-片5
供试品溶液-1



HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 35°C

数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-65/25-1373-2 - zzp-z6-2025062621p-rcqx-pH6.8jz-p6-45min.lcd

方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20260130-RC-FX274.lcb

样品瓶号: 1-51

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/01/30 12:53:15

处理时间 (V2) : 2026/01/31 10:00:05

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min


波长: 259nm

版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.155	40815	100.000	6722	2909	1.021	--
总计		40815	100.000	6722			

图42 玛巴洛沙韦混悬剂溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
自制品-2025062621批-pH6.8介质-45min-片6
供试品溶液-1




HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温 : 35°C 波长: 259nm
数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-65/25-1374-2 - zzp-z6-2025062621p-rcqx-pH6.8jz-p1-60min.lcd
方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20260130-RC-FX274.lcb
样品瓶号: 1-7
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2026/01/30 12:56:38 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2026/01/31 10:00:08 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.154	41980	100.000	6904	2920	1.025	--
总计		41980	100.000	6904			

图43 玛巴洛沙韦混悬剂溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
自制品-2025062621批-pH6.8介质-60min-片1
供试品溶液-1




HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温 : 35°C 波长: 259nm
数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-65/25-1375-2 - zzp-z6-2025062621p-rcqx-pH6.8jz-p2-60min.lcd
方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20260130-RC-FX274.lcb
样品瓶号: 1-16
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2026/01/30 13:00:00 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2026/01/31 10:00:11 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.156	42094	100.000	6897	2890	1.018	--
总计		42094	100.000	6897			

图44 玛巴洛沙韦混悬剂溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
自制品-2025062621批-pH6.8介质-60min-片2
供试品溶液-1



HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 35°C

数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-65/25-1376-2 - zzp-z6-2025062621p-rcqx-pH6.8jz-p3-60min.lcd

方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20260130-RC-FX274.lcb

样品瓶号: 1-25

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/01/30 13:03:24

处理时间 (V2) : 2026/01/31 10:00:14

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min


波长: 259nm

版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.154	42956	100.000	7044	2907	1.023	--
总计		42956	100.000	7044			

图45 玛巴洛沙韦混悬剂溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
自制品-2025062621批-pH6.8介质-60min-片3
供试品溶液-1




HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温 : 35°C 波长: 259nm
数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-65/25-1377-2 - zzp-z6-2025062621p-rcqx-pH6.8jz-p4-60min.lcd
方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20260130-RC-FX274.lcb
样品瓶号: 1-34
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2026/01/30 13:07:40 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2026/01/31 10:00:17 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.155	41920	100.000	6886	2900	1.016	--
总计		41920	100.000	6886			

图46 玛巴洛沙韦混悬剂溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
自制品-2025062621批-pH6.8介质-60min-片4
供试品溶液-1




HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温 : 35°C 波长: 259nm
数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-65/25-1378-2 - zzp-z6-2025062621p-rcqx-pH6.8jz-p5-60min.lcd
方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20260130-RC-FX274.lcb
样品瓶号: 1-43
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2026/01/30 13:11:03 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2026/01/31 10:00:20 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.155	42476	100.000	6996	2931	1.019	--
总计		42476	100.000	6996			

图47 玛巴洛沙韦混悬剂溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
自制品-2025062621批-pH6.8介质-60min-片5
供试品溶液-1




HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温 : 35°C 波长: 259nm
数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-65/25-1379-2 - zzp-z6-2025062621p-rcqx-pH6.8jz-p6-60min.lcd
方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20260130-RC-FX274.lcb
样品瓶号: 1-52
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2026/01/30 13:14:26 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2026/01/31 10:00:23 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.154	41744	100.000	6896	2925	1.018	--
总计		41744	100.000	6896			

图48 玛巴洛沙韦混悬剂溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
自制品-2025062621批-pH6.8介质-60min-片6
供试品溶液-1



HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 35°C

数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-65/25-1380-2 - zzp-z6-2025062621p-rcqx-pH6.8jz-p1-90min.lcd

方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20260130-RC-FX274.lcb

样品瓶号: 1-8

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/01/30 13:17:49

处理时间 (V2) : 2026/01/31 10:00:26

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min


波长: 259nm

版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.154	42439	100.000	7014	2924	1.022	--
总计		42439	100.000	7014			

图49 玛巴洛沙韦混悬剂溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
自制品-2025062621批-pH6.8介质-90min-片1
供试品溶液-1




HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温 : 35 $^{\circ}$ C 波长: 259nm
数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-65/25-1381-2 - zzp-z6-2025062621p-rcqx-pH6.8jz-p2-90min.lcd
方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20260130-RC-FX274.lcb
样品瓶号: 1-17
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2026/01/30 13:21:12 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2026/01/31 10:00:29 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.154	42553	100.000	7030	2945	1.022	--
总计		42553	100.000	7030			

图50 玛巴洛沙韦混悬剂溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
自制品-2025062621批-pH6.8介质-90min-片2
供试品溶液-1




HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温 : 35 $^{\circ}$ C 波长: 259nm
数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-65/25-1382-2 - zzp-z6-2025062621p-rcqx-pH6.8jz-p3-90min.lcd
方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20260130-RC-FX274.lcb
样品瓶号: 1-26
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2026/01/30 13:24:37 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2026/01/31 10:00:32 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.153	43307	100.000	7101	2909	1.019	--
总计		43307	100.000	7101			

图51 玛巴洛沙韦混悬剂溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
自制品-2025062621批-pH6.8介质-90min-片3
供试品溶液-1




HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温 : 35°C 波长: 259nm
数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-65/25-1383-2 - zzp-z6-2025062621p-rcqx-pH6.8jz-p4-90min.lcd
方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20260130-RC-FX274.lcb
样品瓶号: 1-35
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2026/01/30 13:27:59 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2026/01/31 10:00:35 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.154	43351	100.000	7138	2903	1.028	--
总计		43351	100.000	7138			

图52 玛巴洛沙韦混悬剂溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
自制品-2025062621批-pH6.8介质-90min-片4
供试品溶液-1




HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温 : 35°C 波长: 259nm
数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-65/25-1384-2 - zzp-z6-2025062621p-rcqx-pH6.8jz-p5-90min.lcd
方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20260130-RC-FX274.lcb
样品瓶号: 1-44
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2026/01/30 13:31:23 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2026/01/31 10:00:38 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.153	43141	100.000	7119	2930	1.018	--
总计		43141	100.000	7119			

图53 玛巴洛沙韦混悬剂溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
自制品-2025062621批-pH6.8介质-90min-片5
供试品溶液-1




HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温 : 35 $^{\circ}$ C 波长: 259nm
数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-65/25-1385-2 - zzp-z6-2025062621p-rcqx-pH6.8jz-p6-90min.lcd
方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20260130-RC-FX274.lcb
样品瓶号: 1-53
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2026/01/30 13:34:47 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2026/01/31 10:00:41 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.155	42103	100.000	6915	2911	1.022	--
总计		42103	100.000	6915			

图54 玛巴洛沙韦混悬剂溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
自制品-2025062621批-pH6.8介质-90min-片6
供试品溶液-1




HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温 : 35°C 波长: 259nm
数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-65/25-1386-2 - zzp-z6-2025062621p-rcqx-pH6.8jz-p1-120min.lcd
方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20260130-RC-FX274.lcb
样品瓶号: 4-1
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2026/01/30 13:38:11 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2026/01/31 10:00:44 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.155	42855	100.000	7054	2911	1.023	--
总计		42855	100.000	7054			

图55 玛巴洛沙韦混悬剂溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
自制品-2025062621批-pH6.8介质-120min-片1
供试品溶液-1




HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温 : 35°C 波长: 259nm
数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-65/25-1387-2 - zzp-z6-2025062621p-rcqx-pH6.8jz-p2-120min.lcd
方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20260130-RC-FX274.lcb
样品瓶号: 4-10
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2026/01/30 13:41:42 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2026/01/31 10:00:47 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.154	43029	100.000	7081	2930	1.024	--
总计		43029	100.000	7081			

图56 玛巴洛沙韦混悬剂溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
自制品-2025062621批-pH6.8介质-120min-片2
供试品溶液-1




HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温 : 35°C 波长: 259nm
数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-65/25-1388-2 - zzp-z6-2025062621p-rcqx-pH6.8jz-p3-120min.lcd
方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20260130-RC-FX274.lcb
样品瓶号: 4-19
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2026/01/30 13:45:04 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2026/01/31 10:00:50 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.155	43872	100.000	7249	2938	1.016	--
总计		43872	100.000	7249			

图57 玛巴洛沙韦混悬剂溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
自制品-2025062621批-pH6.8介质-120min-片3
供试品溶液-1




HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温 : 35°C 波长: 259nm
数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-65/25-1389-2 - zzp-z6-2025062621p-rcqx-pH6.8jz-p4-120min.lcd
方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20260130-RC-FX274.lcb
样品瓶号: 4-28
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2026/01/30 13:48:27 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2026/01/31 10:00:53 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.154	43240	100.000	7127	2917	1.019	--
总计		43240	100.000	7127			

图58 玛巴洛沙韦混悬剂溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
自制品-2025062621批-pH6.8介质-120min-片4
供试品溶液-1




HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温 : 35°C 波长: 259nm
数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-65/25-1390-2 - zzp-z6-2025062621p-rcqx-pH6.8jz-p5-120min.lcd
方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20260130-RC-FX274.lcb
样品瓶号: 4-37
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2026/01/30 13:51:51 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2026/01/31 10:00:56 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.155	43473	100.000	7126	2903	1.024	--
总计		43473	100.000	7126			

图59 玛巴洛沙韦混悬剂溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
自制品-2025062621批-pH6.8介质-120min-片5
供试品溶液-1




HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温 : 35°C 波长: 259nm
数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-65/25-1391-2 - zzp-z6-2025062621p-rcqx-pH6.8jz-p6-120min.lcd
方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20260130-RC-FX274.lcb
样品瓶号: 4-46
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2026/01/30 13:55:13 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2026/01/31 10:00:59 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.155	42650	100.000	7032	2914	1.025	--
总计		42650	100.000	7032			

图60 玛巴洛沙韦混悬剂溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
自制品-2025062621批-pH6.8介质-120min-片6
供试品溶液-1




HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温 : 35°C 波长: 259nm
数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-65/25-1392-2 - zzp-z6-2025062621p-rcqx-pH6.8jz-p1-jx.lcd
方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20260130-RC-FX274.lcb
样品瓶号: 4-2
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2026/01/30 13:58:37 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2026/01/31 10:01:02 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.155	43342	100.000	7132	2917	1.021	--
总计		43342	100.000	7132			

图61 玛巴洛沙韦混悬剂溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
自制品-2025062621批-pH6.8介质-极限转速-片1
供试品溶液-1




HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温 : 35°C 波长: 259nm
数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-65/25-1393-2 - zzp-z6-2025062621p-rcqx-pH6.8jz-p2-jx.lcd
方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20260130-RC-FX274.lcb
样品瓶号: 4-11
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2026/01/30 14:02:00 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2026/01/31 10:01:05 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.156	43346	100.000	7115	2902	1.024	--
总计		43346	100.000	7115			

图62 玛巴洛沙韦混悬剂溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
自制品-2025062621批-pH6.8介质-极限转速-片2
供试品溶液-1




HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温 : 35 $^{\circ}$ C 波长: 259nm
数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-65/25-1394-2 - zzp-z6-2025062621p-rcqx-pH6.8jz-p3-jx.lcd
方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20260130-RC-FX274.lcb
样品瓶号: 4-20
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2026/01/30 14:05:22 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2026/01/31 10:01:08 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.156	43117	100.000	7092	2917	1.021	--
总计		43117	100.000	7092			

图63 玛巴洛沙韦混悬剂溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
自制品-2025062621批-pH6.8介质-极限转速-片3
供试品溶液-1




HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温 : 35°C 波长: 259nm
数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-65/25-1395-2 - zzp-z6-2025062621p-rcqx-pH6.8jz-p4-jx.lcd
方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20260130-RC-FX274.lcb
样品瓶号: 4-29
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2026/01/30 14:08:46 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2026/01/31 10:01:11 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.155	42870	100.000	7055	2922	1.018	--
总计		42870	100.000	7055			

图64 玛巴洛沙韦混悬剂溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
自制品-2025062621批-pH6.8介质-极限转速-片4
供试品溶液-1




HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温 : 35°C 波长: 259nm
数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-65/25-1396-2 - zzp-z6-2025062621p-rcqx-pH6.8jz-p5-jx.lcd
方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20260130-RC-FX274.lcb
样品瓶号: 4-38
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2026/01/30 14:12:08 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2026/01/31 10:01:14 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.155	43057	100.000	7081	2907	1.025	--
总计		43057	100.000	7081			

图65 玛巴洛沙韦混悬剂溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
自制品-2025062621批-pH6.8介质-极限转速-片5
供试品溶液-1




HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温 : 35°C 波长: 259nm
数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-65/25-1397-2 - zzp-z6-2025062621p-rcqx-pH6.8jz-p6-jx.lcd
方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20260130-RC-FX274.lcb
样品瓶号: 4-47
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2026/01/30 14:15:30 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2026/01/31 10:01:17 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.155	41683	100.000	6849	2909	1.017	--
总计		41683	100.000	6849			

图66 玛巴洛沙韦混悬剂溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
自制品-2025062621批-pH6.8介质-极限转速-片6
供试品溶液-1




HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温 : 35 $^{\circ}$ C 波长: 259nm
数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-65/25-1398-2 - zzp-z6-2025062621p-rcqx-pH6.8jz-dz2-1.lcd
方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20260130-RC-FX274.lcb
样品瓶号: 1-27
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2026/01/30 14:18:53 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2026/01/31 10:01:20 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.149	96897	100.000	15483	2751	1.024	--
总计		96897	100.000	15483			

图67 玛巴洛沙韦混悬剂溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
自制品-2025062621批-pH6.8介质
对照品溶液-2-1




HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温 : 35°C 波长: 259nm
数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-65/25-1399-2 - zzp-z6-2025062621p-rcqx-pH6.8jz-dz2-2.lcd
方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20260130-RC-FX274.lcb
样品瓶号: 1-27
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2026/01/30 14:22:18 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2026/01/31 10:01:23 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.148	96931	100.000	15488	2739	1.023	--
总计		96931	100.000	15488			

图68 玛巴洛沙韦混悬剂溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
自制品-2025062621批-pH6.8介质
对照品溶液-2-2




HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温 : 35 $^{\circ}$ C 波长: 259nm
数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-65/25-1400-2 - zzp-z6-2025062721p-rcqx-pH6.8jz-rj.lcd
方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20260130-RC-FX274.lcb
样品瓶号: 2-9
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2026/01/30 14:25:42 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2026/01/31 10:01:26 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图69 玛巴洛沙韦混悬剂溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
自制品-2025062721批-pH6.8介质
溶剂




HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温 : 35°C 波长: 259nm
数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-65/25-1401-2 - zzp-z6-2025062721p-rcqx-pH6.8jz-dz1-1.lcd
方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20260130-RC-FX274.lcb
样品瓶号: 2-18
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2026/01/30 14:29:07 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2026/01/31 10:01:29 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.150	97880	100.000	15623	2747	1.024	--
总计		97880	100.000	15623			

图70 玛巴洛沙韦混悬剂溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
自制品-2025062721批-pH6.8介质
对照品溶液-1-1




HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温 : 35 $^{\circ}$ C 波长: 259nm
数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-65/25-1402-2 - zzp-z6-2025062721p-rcqx-pH6.8jz-dz1-2.lcd
方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20260130-RC-FX274.lcb
样品瓶号: 2-18
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2026/01/30 14:32:31 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2026/01/31 10:01:33 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.150	98216	100.000	15660	2753	1.021	--
总计		98216	100.000	15660			

图71 玛巴洛沙韦混悬剂溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
自制品-2025062721批-pH6.8介质
对照品溶液-1-2




HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温 : 35°C 波长: 259nm
数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-65/25-1403-2 - zzp-z6-2025062721p-rcqx-pH6.8jz-dz1-3.lcd
方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20260130-RC-FX274.lcb
样品瓶号: 2-18
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2026/01/30 14:35:55 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2026/01/31 10:01:35 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.149	98057	100.000	15647	2738	1.025	--
总计		98057	100.000	15647			

图72 玛巴洛沙韦混悬剂溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
自制品-2025062721批-pH6.8介质
对照品溶液-1-3




HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温 : 35°C 波长: 259nm
数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-65/25-1404-2 - zzp-z6-2025062721p-rcqx-pH6.8jz-dz1-4.lcd
方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20260130-RC-FX274.lcb
样品瓶号: 2-18
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2026/01/30 14:39:18 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2026/01/31 10:01:38 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.149	98249	100.000	15666	2736	1.022	--
总计		98249	100.000	15666			

图73 玛巴洛沙韦混悬剂溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
自制品-2025062721批-pH6.8介质
对照品溶液-1-4




HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温 : 35°C 波长: 259nm
数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-65/25-1405-2 - zzp-z6-2025062721p-rcqx-pH6.8jz-dz1-5.lcd
方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20260130-RC-FX274.lcb
样品瓶号: 2-18
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2026/01/30 14:42:42 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2026/01/31 10:01:41 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.150	97701	100.000	15553	2746	1.029	--
总计		97701	100.000	15553			

图74 玛巴洛沙韦混悬剂溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
自制品-2025062721批-pH6.8介质
对照品溶液-1-5




HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温 : 35°C 波长: 259nm
数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-65/25-1406-2 - zzp-z6-2025062721p-rcqx-pH6.8jz-p1-5min.lcd
方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20260130-RC-FX274.lcb
样品瓶号: 2-1
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2026/01/30 14:46:06 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2026/01/31 10:01:44 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.156	29942	100.000	4920	2922	1.020	--
总计		29942	100.000	4920			

图75 玛巴洛沙韦混悬剂溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
自制品-2025062721批-pH6.8介质-5min-片1
供试品溶液-1




HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温 : 35°C 波长: 259nm
数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-65/25-1407-2 - zzp-z6-2025062721p-rcqx-pH6.8jz-p2-5min.lcd
方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20260130-RC-FX274.lcb
样品瓶号: 2-10
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2026/01/30 14:49:30 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2026/01/31 10:01:47 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.155	30361	100.000	5017	2934	1.024	--
总计		30361	100.000	5017			

图76 玛巴洛沙韦混悬剂溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
自制品-2025062721批-pH6.8介质-5min-片2
供试品溶液-1




HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温 : 35°C 波长: 259nm
数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-65/25-1408-2 - zzp-z6-2025062721p-rcqx-pH6.8jz-p3-5min.lcd
方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20260130-RC-FX274.lcb
样品瓶号: 2-19
进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
进样时间: 2026/01/30 14:52:54 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2026/01/31 10:01:50 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.156	29890	100.000	4890	2909	1.018	--
总计		29890	100.000	4890			

图77 玛巴洛沙韦混悬剂溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
自制品-2025062721批-pH6.8介质-5min-片3
供试品溶液-1




HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温 : 35°C 波长: 259nm
数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-65/25-1409-2 - zzp-z6-2025062721p-rcqx-pH6.8jz-p4-5min.lcd
方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20260130-RC-FX274.lcb
样品瓶号: 2-28
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2026/01/30 14:56:19 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2026/01/31 10:01:53 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.154	31210	100.000	5138	2935	1.008	--
总计		31210	100.000	5138			

图78 玛巴洛沙韦混悬剂溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
自制品-2025062721批-pH6.8介质-5min-片4
供试品溶液-1




HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温 : 35°C 波长: 259nm
数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-65/25-1410-2 - zzp-z6-2025062721p-rcqx-pH6.8jz-p5-5min.lcd
方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20260130-RC-FX274.lcb
样品瓶号: 2-37
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2026/01/30 14:59:41 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2026/01/31 10:01:56 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.155	30307	100.000	4999	2924	1.025	--
总计		30307	100.000	4999			

图79 玛巴洛沙韦混悬剂溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
自制品-2025062721批-pH6.8介质-5min-片5
供试品溶液-1




HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温 : 35°C 波长: 259nm
数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-65/25-1411-2 - zzp-z6-2025062721p-rcqx-pH6.8jz-p6-5min.lcd
方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20260130-RC-FX274.lcb
样品瓶号: 2-46
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2026/01/30 15:03:05 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2026/01/31 10:01:59 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.154	30414	100.000	5010	2928	1.014	--
总计		30414	100.000	5010			

图80 玛巴洛沙韦混悬剂溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
自制品-2025062721批-pH6.8介质-5min-片6
供试品溶液-1




HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温 : 35 $^{\circ}$ C 波长: 259nm
数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-65/25-1412-2 - zzp-z6-2025062721p-rcqx-pH6.8jz-p1-10min.lcd
方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20260130-RC-FX274.lcb
样品瓶号: 2-2
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2026/01/30 15:06:29 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2026/01/31 10:02:02 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.156	35466	100.000	5862	2946	1.014	--
总计		35466	100.000	5862			

图81 玛巴洛沙韦混悬剂溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
自制品-2025062721批-pH6.8介质-10min-片1
供试品溶液-1




HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温 : 35°C 波长: 259nm
数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-65/25-1413-2 - zzp-z6-2025062721p-rcqx-pH6.8jz-p2-10min.lcd
方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20260130-RC-FX274.lcb
样品瓶号: 2-11
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2026/01/30 15:09:53 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2026/01/31 10:02:05 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.153	34824	100.000	5724	2922	1.022	--
总计		34824	100.000	5724			

图82 玛巴洛沙韦混悬剂溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
自制品-2025062721批-pH6.8介质-10min-片2
供试品溶液-1




HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温 : 35°C 波长: 259nm
数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-65/25-1414-2 - zzp-z6-2025062721p-rcqx-pH6.8jz-p3-10min.lcd
方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20260130-RC-FX274.lcb
样品瓶号: 2-20
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2026/01/30 15:13:17 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2026/01/31 10:02:08 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.155	34219	100.000	5658	2918	1.025	--
总计		34219	100.000	5658			

图83 玛巴洛沙韦混悬剂溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
自制品-2025062721批-pH6.8介质-10min-片3
供试品溶液-1




HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温 : 35 $^{\circ}$ C 波长: 259nm
数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-65/25-1415-2 - zzp-z6-2025062721p-rcqx-pH6.8jz-p4-10min.lcd
方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20260130-RC-FX274.lcb
样品瓶号: 2-29
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2026/01/30 15:16:41 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2026/01/31 10:02:11 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.154	35246	100.000	5820	2933	1.019	--
总计		35246	100.000	5820			

图84 玛巴洛沙韦混悬剂溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
自制品-2025062721批-pH6.8介质-10min-片4
供试品溶液-1



HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 35°C

数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-65/25-1416-2 - zzp-z6-2025062721p-rcqx-pH6.8jz-p5-10min.lcd

方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20260130-RC-FX274.lcb

样品瓶号: 2-38

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/01/30 15:20:05

处理时间 (V2) : 2026/01/31 10:02:14

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min


波长: 259nm

版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.154	34709	100.000	5714	2924	1.021	--
总计		34709	100.000	5714			

图85 玛巴洛沙韦混悬剂溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
自制品-2025062721批-pH6.8介质-10min-片5
供试品溶液-1




HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温 : 35 $^{\circ}$ C 波长: 259nm
数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-65/25-1417-2 - zzp-z6-2025062721p-rcqx-pH6.8jz-p6-10min.lcd
方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20260130-RC-FX274.lcb
样品瓶号: 2-47
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2026/01/30 15:23:29 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2026/01/31 10:02:17 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.155	34902	100.000	5749	2924	1.019	--
总计		34902	100.000	5749			

图86 玛巴洛沙韦混悬剂溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
自制品-2025062721批-pH6.8介质-10min-片6
供试品溶液-1




HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温 : 35°C 波长: 259nm
数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-65/25-1418-2 - zzp-z6-2025062721p-rcqx-pH6.8jz-p1-15min.lcd
方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20260130-RC-FX274.lcb
样品瓶号: 2-3
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2026/01/30 15:26:54 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2026/01/31 10:02:20 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.155	37438	100.000	6161	2933	1.024	--
总计		37438	100.000	6161			

图87 玛巴洛沙韦混悬剂溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
自制品-2025062721批-pH6.8介质-15min-片1
供试品溶液-1




HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温 : 35 $^{\circ}$ C 波长: 259nm
数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-65/25-1419-2 - zzp-z6-2025062721p-rcqx-pH6.8jz-p2-15min.lcd
方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20260130-RC-FX274.lcb
样品瓶号: 2-12
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2026/01/30 15:30:18 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2026/01/31 10:02:23 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.155	36417	100.000	5997	2918	1.017	--
总计		36417	100.000	5997			

图88 玛巴洛沙韦混悬剂溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
自制品-2025062721批-pH6.8介质-15min-片2
供试品溶液-1




HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温 : 35°C 波长: 259nm
数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-65/25-1420-2 - zzp-z6-2025062721p-rcqx-pH6.8jz-p3-15min.lcd
方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20260130-RC-FX274.lcb
样品瓶号: 2-21
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2026/01/30 15:33:42 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2026/01/31 10:02:26 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.155	35755	100.000	5897	2921	1.018	--
总计		35755	100.000	5897			

图89 玛巴洛沙韦混悬剂溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
自制品-2025062721批-pH6.8介质-15min-片3
供试品溶液-1




HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温 : 35 $^{\circ}$ C 波长: 259nm
数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-65/25-1421-2 - zzp-z6-2025062721p-rcqx-pH6.8jz-p4-15min.lcd
方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20260130-RC-FX274.lcb
样品瓶号: 2-30
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2026/01/30 15:37:06 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2026/01/31 10:02:29 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.155	37539	100.000	6227	2950	1.026	--
总计		37539	100.000	6227			

图90 玛巴洛沙韦混悬剂溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
自制品-2025062721批-pH6.8介质-15min-片4
供试品溶液-1




HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温 : 35 $^{\circ}$ C 波长: 259nm
数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-65/25-1422-2 - zzp-z6-2025062721p-rcqx-pH6.8jz-p5-15min.lcd
方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20260130-RC-FX274.lcb
样品瓶号: 2-39
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2026/01/30 15:40:30 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2026/01/31 10:02:32 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.155	37189	100.000	6165	2957	1.029	--
总计		37189	100.000	6165			

图91 玛巴洛沙韦混悬剂溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
自制品-2025062721批-pH6.8介质-15min-片5
供试品溶液-1




HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温 : 35°C 波长: 259nm
数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-65/25-1423-2 - zzp-z6-2025062721p-rcqx-pH6.8jz-p6-15min.lcd
方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20260130-RC-FX274.lcb
样品瓶号: 2-48
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2026/01/30 15:43:54 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2026/01/31 10:02:35 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.154	37310	100.000	6163	2932	1.024	--
总计		37310	100.000	6163			

图92 玛巴洛沙韦混悬剂溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
自制品-2025062721批-pH6.8介质-15min-片6
供试品溶液-1




HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温 : 35 $^{\circ}$ C 波长: 259nm
数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-65/25-1424-2 - zzp-z6-2025062721p-rcqx-pH6.8jz-p1-20min.lcd
方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20260130-RC-FX274.lcb
样品瓶号: 2-4
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2026/01/30 15:47:18 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2026/01/31 10:02:38 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.156	38572	100.000	6410	2967	1.027	--
总计		38572	100.000	6410			

图93 玛巴洛沙韦混悬剂溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
自制品-2025062721批-pH6.8介质-20min-片1
供试品溶液-1




HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温 : 35°C 波长: 259nm
数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-65/25-1425-2 - zzp-z6-2025062721p-rcqx-pH6.8jz-p2-20min.lcd
方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20260130-RC-FX274.lcb
样品瓶号: 2-13
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2026/01/30 15:50:42 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2026/01/31 10:02:41 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.154	37833	100.000	6235	2923	1.023	--
总计		37833	100.000	6235			

图94 玛巴洛沙韦混悬剂溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
自制品-2025062721批-pH6.8介质-20min-片2
供试品溶液-1




HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温 : 35°C 波长: 259nm
数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-65/25-1426-2 - zzp-z6-2025062721p-rcqx-pH6.8jz-p3-20min.lcd
方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20260130-RC-FX274.lcb
样品瓶号: 2-22
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2026/01/30 15:54:06 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2026/01/31 10:02:44 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.154	37324	100.000	6141	2905	1.024	--
总计		37324	100.000	6141			

图95 玛巴洛沙韦混悬剂溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
自制品-2025062721批-pH6.8介质-20min-片3
供试品溶液-1




HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温 : 35°C 波长: 259nm
数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-65/25-1427-2 - zzp-z6-2025062721p-rcqx-pH6.8jz-p4-20min.lcd
方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20260130-RC-FX274.lcb
样品瓶号: 2-31
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2026/01/30 15:57:30 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2026/01/31 10:02:47 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.154	39260	100.000	6473	2939	1.018	--
总计		39260	100.000	6473			

图96 玛巴洛沙韦混悬剂溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
自制品-2025062721批-pH6.8介质-20min-片4
供试品溶液-1




HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温 : 35 $^{\circ}$ C 波长: 259nm
数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-65/25-1428-2 - zzp-z6-2025062721p-rcqx-pH6.8jz-p5-20min.lcd
方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20260130-RC-FX274.lcb
样品瓶号: 2-40
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2026/01/30 16:00:53 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2026/01/31 10:02:50 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.153	37466	100.000	6177	2927	1.020	--
总计		37466	100.000	6177			

图97 玛巴洛沙韦混悬剂溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
自制品-2025062721批-pH6.8介质-20min-片5
供试品溶液-1




HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温 : 35 $^{\circ}$ C 波长: 259nm
数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-65/25-1429-2 - zzp-z6-2025062721p-rcqx-pH6.8jz-p6-20min.lcd
方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20260130-RC-FX274.lcb
样品瓶号: 2-49
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2026/01/30 16:04:17 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2026/01/31 10:02:52 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.154	38196	100.000	6278	2917	1.024	--
总计		38196	100.000	6278			

图98 玛巴洛沙韦混悬剂溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
自制品-2025062721批-pH6.8介质-20min-片6
供试品溶液-1




HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温 : 35 $^{\circ}$ C 波长: 259nm
数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-65/25-1430-2 - zzp-z6-2025062721p-rcqx-pH6.8jz-p1-30min.lcd
方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20260130-RC-FX274.lcb
样品瓶号: 2-5
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2026/01/30 16:07:42 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2026/01/31 10:02:55 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.155	39193	100.000	6450	2924	1.024	--
总计		39193	100.000	6450			

图99 玛巴洛沙韦混悬剂溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
自制品-2025062721批-pH6.8介质-30min-片1
供试品溶液-1



HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 35°C

数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-65/25-1431-2 - zzp-z6-2025062721p-rcqx-pH6.8jz-p2-30min.lcd

方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20260130-RC-FX274.lcb

样品瓶号: 2-14

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/01/30 16:11:07

处理时间 (V2) : 2026/01/31 10:02:58

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min


波长: 259nm

版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.154	39540	100.000	6538	2927	1.030	--
总计		39540	100.000	6538			

图100 玛巴洛沙韦混悬剂溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
自制品-2025062721批-pH6.8介质-30min-片2
供试品溶液-1



HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 35°C

数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-65/25-1432-2 - zzp-z6-2025062721p-rcqx-pH6.8jz-p3-30min.lcd

方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20260130-RC-FX274.lcb

样品瓶号: 2-23

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/01/30 16:14:32

处理时间 (V2) : 2026/01/31 10:03:01

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min


波长: 259nm

版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.153	39376	100.000	6460	2918	1.022	--
总计		39376	100.000	6460			

图101 玛巴洛沙韦混悬剂溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
自制品-2025062721批-pH6.8介质-30min-片3
供试品溶液-1




HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温 : 35°C 波长: 259nm
数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-65/25-1433-2 - zzp-z6-2025062721p-rcqx-pH6.8jz-p4-30min.lcd
方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20260130-RC-FX274.lcb
样品瓶号: 2-32
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2026/01/30 16:17:57 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2026/01/31 10:03:04 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.154	39717	100.000	6550	2929	1.019	--
总计		39717	100.000	6550			



HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 35°C

数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-65/25-1434-2 - zzp-z6-2025062721p-rcqx-pH6.8jz-p5-30min.lcd

方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20260130-RC-FX274.lcb

样品瓶号: 2-41

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/01/30 16:21:22

处理时间 (V2) : 2026/01/31 10:03:07

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min


波长: 259nm

版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.155	39945	100.000	6617	2946	1.024	--
总计		39945	100.000	6617			

图103 玛巴洛沙韦混悬剂溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
自制品-2025062721批-pH6.8介质-30min-片5
供试品溶液-1




HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温 : 35 $^{\circ}$ C 波长: 259nm
数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-65/25-1435-2 - zzp-z6-2025062721p-rcqx-pH6.8jz-p6-30min.lcd
方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20260130-RC-FX274.lcb
样品瓶号: 2-50
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2026/01/30 16:24:46 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2026/01/31 10:03:10 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.155	39944	100.000	6587	2930	1.023	--
总计		39944	100.000	6587			

图104 玛巴洛沙韦混悬剂溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
自制品-2025062721批-pH6.8介质-30min-片6
供试品溶液-1




HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温 : 35 $^{\circ}$ C 波长: 259nm
数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-65/25-1436-2 - zzp-z6-2025062721p-rcqx-pH6.8jz-p1-45min.lcd
方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20260130-RC-FX274.lcb
样品瓶号: 2-6
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2026/01/30 16:28:10 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2026/01/31 10:03:13 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.155	40213	100.000	6656	2941	1.020	--
总计		40213	100.000	6656			



HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 35°C

数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-65/25-1437-2 - zzp-z6-2025062721p-rcqx-pH6.8jz-p2-45min.lcd

方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20260130-RC-FX274.lcb

样品瓶号: 2-15

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/01/30 16:31:35

处理时间 (V2) : 2026/01/31 10:03:17

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min


波长: 259nm

版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.155	40116	100.000	6638	2938	1.023	--
总计		40116	100.000	6638			

图106 玛巴洛沙韦混悬剂溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
自制品-2025062721批-pH6.8介质-45min-片2
供试品溶液-1




HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温 : 35°C 波长: 259nm
数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-65/25-1438-2 - zzp-z6-2025062721p-rcqx-pH6.8jz-p3-45min.lcd
方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20260130-RC-FX274.lcb
样品瓶号: 2-24
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2026/01/30 16:35:00 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2026/01/31 10:03:20 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.154	40309	100.000	6640	2919	1.020	--
总计		40309	100.000	6640			

图107 玛巴洛沙韦混悬剂溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
自制品-2025062721批-pH6.8介质-45min-片3
供试品溶液-1




HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温 : 35°C 波长: 259nm
数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-65/25-1439-2 - zzp-z6-2025062721p-rcqx-pH6.8jz-p4-45min.lcd
方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20260130-RC-FX274.lcb
样品瓶号: 2-33
进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
进样时间: 2026/01/30 16:38:24 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2026/01/31 10:03:23 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.155	40599	100.000	6730	2963	1.020	--
总计		40599	100.000	6730			




HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温 : 35°C 波长: 259nm
数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-65/25-1440-2 - zzp-z6-2025062721p-rcqx-pH6.8jz-p5-45min.lcd
方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20260130-RC-FX274.lcb
样品瓶号: 2-42
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2026/01/30 16:41:47 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2026/01/31 10:03:26 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.155	40127	100.000	6600	2923	1.023	--
总计		40127	100.000	6600			

图109 玛巴洛沙韦混悬剂溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
自制品-2025062721批-pH6.8介质-45min-片5
供试品溶液-1




HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温 : 35°C 波长: 259nm
数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-65/25-1441-2 - zzp-z6-2025062721p-rcqx-pH6.8jz-p6-45min.lcd
方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20260130-RC-FX274.lcb
样品瓶号: 2-51
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2026/01/30 16:45:12 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2026/01/31 10:03:29 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.155	40706	100.000	6690	2924	1.024	--
总计		40706	100.000	6690			

图110 玛巴洛沙韦混悬剂溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
自制品-2025062721批-pH6.8介质-45min-片6
供试品溶液-1




HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温 : 35 $^{\circ}$ C 波长: 259nm
数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-65/25-1442-2 - zzp-z6-2025062721p-rcqx-pH6.8jz-p1-60min.lcd
方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20260130-RC-FX274.lcb
样品瓶号: 2-7
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2026/01/30 16:48:36 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2026/01/31 10:03:32 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.154	40738	100.000	6706	2925	1.023	--
总计		40738	100.000	6706			

图111 玛巴洛沙韦混悬剂溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
自制品-2025062721批-pH6.8介质-60min-片1
供试品溶液-1




HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温 : 35°C 波长: 259nm
数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-65/25-1443-2 - zzp-z6-2025062721p-rcqx-pH6.8jz-p2-60min.lcd
方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20260130-RC-FX274.lcb
样品瓶号: 2-16
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2026/01/30 16:52:01 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2026/01/31 10:03:35 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.154	36866	100.000	6079	2918	1.025	--
总计		36866	100.000	6079			

图112 玛巴洛沙韦混悬剂溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
自制品-2025062721批-pH6.8介质-60min-片2
供试品溶液-1




HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温 : 35°C 波长: 259nm
数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-65/25-1444-2 - zzp-z6-2025062721p-rcqx-pH6.8jz-p3-60min.lcd
方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20260130-RC-FX274.lcb
样品瓶号: 2-25
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2026/01/30 16:55:26 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2026/01/31 10:03:38 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.154	38676	100.000	6376	2940	1.025	--
总计		38676	100.000	6376			

图113 玛巴洛沙韦混悬剂溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
自制品-2025062721批-pH6.8介质-60min-片3
供试品溶液-1




HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温 : 35°C 波长: 259nm
数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-65/25-1445-2 - zzp-z6-2025062721p-rcqx-pH6.8jz-p4-60min.lcd
方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20260130-RC-FX274.lcb
样品瓶号: 2-34
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2026/01/30 16:58:51 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2026/01/31 10:03:41 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.155	41010	100.000	6752	2937	1.021	--
总计		41010	100.000	6752			

图114 玛巴洛沙韦混悬剂溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
自制品-2025062721批-pH6.8介质-60min-片4
供试品溶液-1



HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 35°C

数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-65/25-1446-2 - zzp-z6-2025062721p-rcqx-pH6.8jz-p5-60min.lcd

方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20260130-RC-FX274.lcb

样品瓶号: 2-43

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/01/30 17:02:15

处理时间 (V2) : 2026/01/31 10:03:44

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min


波长: 259nm

版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.155	40807	100.000	6754	2945	1.014	--
总计		40807	100.000	6754			

图115 玛巴洛沙韦混悬剂溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
自制品-2025062721批-pH6.8介质-60min-片5
供试品溶液-1




HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温 : 35°C 波长: 259nm
数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-65/25-1447-2 - zzp-z6-2025062721p-rcqx-pH6.8jz-p6-60min.lcd
方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20260130-RC-FX274.lcb
样品瓶号: 2-52
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2026/01/30 17:05:40 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2026/01/31 10:03:47 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.155	41261	100.000	6839	2964	1.019	--
总计		41261	100.000	6839			

图116 玛巴洛沙韦混悬剂溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
自制品-2025062721批-pH6.8介质-60min-片6
供试品溶液-1




HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温 : 35°C 波长: 259nm
数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-65/25-1448-2 - zzp-z6-2025062721p-rcqx-pH6.8jz-p1-90min.lcd
方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20260130-RC-FX274.lcb
样品瓶号: 2-8
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2026/01/30 17:09:04 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2026/01/31 10:03:50 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.155	42003	100.000	6949	2950	1.020	--
总计		42003	100.000	6949			

图117 玛巴洛沙韦混悬剂溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
自制品-2025062721批-pH6.8介质-90min-片1
供试品溶液-1




HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温 : 35°C 波长: 259nm
数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-65/25-1449-2 - zzp-z6-2025062721p-rcqx-pH6.8jz-p2-90min.lcd
方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20260130-RC-FX274.lcb
样品瓶号: 2-17
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2026/01/30 17:12:30 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2026/01/31 10:03:54 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.154	42329	100.000	6986	2938	1.021	--
总计		42329	100.000	6986			

图118 玛巴洛沙韦混悬剂溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
自制品-2025062721批-pH6.8介质-90min-片2
供试品溶液-1




HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温 : 35°C 波长: 259nm
数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-65/25-1450-2 - zzp-z6-2025062721p-rcqx-pH6.8jz-p3-90min.lcd
方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20260130-RC-FX274.lcb
样品瓶号: 2-26
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2026/01/30 17:15:53 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2026/01/31 10:03:57 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.153	40414	100.000	6679	2949	1.027	--
总计		40414	100.000	6679			

图119 玛巴洛沙韦混悬剂溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
自制品-2025062721批-pH6.8介质-90min-片3
供试品溶液-1



HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 35°C

数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-65/25-1451-2 - zzp-z6-2025062721p-rcqx-pH6.8jz-p4-90min.lcd

方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20260130-RC-FX274.lcb

样品瓶号: 2-35

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/01/30 17:19:19

处理时间 (V2) : 2026/01/31 10:04:00

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min


波长: 259nm

版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.154	41109	100.000	6794	2953	1.024	--
总计		41109	100.000	6794			

图120 玛巴洛沙韦混悬剂溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
自制品-2025062721批-pH6.8介质-90min-片4
供试品溶液-1




HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温 : 35°C 波长: 259nm
数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-65/25-1452-2 - zzp-z6-2025062721p-rcqx-pH6.8jz-p5-90min.lcd
方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20260130-RC-FX274.lcb
样品瓶号: 2-44
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2026/01/30 17:22:44 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2026/01/31 10:04:03 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.153	41561	100.000	6863	2942	1.022	--
总计		41561	100.000	6863			

图121 玛巴洛沙韦混悬剂溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
自制品-2025062721批-pH6.8介质-90min-片5
供试品溶液-1



HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 35°C

数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-65/25-1453-2 - zzp-z6-2025062721p-rcqx-pH6.8jz-p6-90min.lcd

方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20260130-RC-FX274.lcb

样品瓶号: 2-53

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/01/30 17:26:08

处理时间 (V2) : 2026/01/31 10:04:06

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min


波长: 259nm

版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.152	42369	100.000	6973	2931	1.022	--
总计		42369	100.000	6973			

图122 玛巴洛沙韦混悬剂溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
自制品-2025062721批-pH6.8介质-90min-片6
供试品溶液-1




HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温 : 35°C 波长: 259nm
数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-65/25-1454-2 - zzp-z6-2025062721p-rcqx-pH6.8jz-p1-120min.lcd
方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20260130-RC-FX274.lcb
样品瓶号: 4-3
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2026/01/30 17:29:32 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2026/01/31 10:04:09 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.154	43056	100.000	7114	2941	1.021	--
总计		43056	100.000	7114			

图123 玛巴洛沙韦混悬剂溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
自制品-2025062721批-pH6.8介质-120min-片1
供试品溶液-1




HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温 : 35°C 波长: 259nm
数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-65/25-1455-2 - zzp-z6-2025062721p-rcqx-pH6.8jz-p2-120min.lcd
方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20260130-RC-FX274.lcb
样品瓶号: 4-12
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2026/01/30 17:32:56 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2026/01/31 10:04:12 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.154	41874	100.000	6925	2939	1.019	--
总计		41874	100.000	6925			

图124 玛巴洛沙韦混悬剂溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
自制品-2025062721批-pH6.8介质-120min-片2
供试品溶液-1




HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温 : 35 $^{\circ}$ C 波长: 259nm
数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-65/25-1456-2 - zzp-z6-2025062721p-rcqx-pH6.8jz-p3-120min.lcd
方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20260130-RC-FX274.lcb
样品瓶号: 4-21
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2026/01/30 17:36:19 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2026/01/31 10:04:15 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.153	40889	100.000	6774	2948	1.020	--
总计		40889	100.000	6774			

图125 玛巴洛沙韦混悬剂溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
自制品-2025062721批-pH6.8介质-120min-片3
供试品溶液-1




HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温 : 35°C 波长: 259nm
数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-65/25-1457-2 - zzp-z6-2025062721p-rcqx-pH6.8jz-p4-120min.lcd
方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20260130-RC-FX274.lcb
样品瓶号: 4-30
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2026/01/30 17:39:42 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2026/01/31 10:04:18 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.155	42124	100.000	7056	3009	1.023	--
总计		42124	100.000	7056			

图126 玛巴洛沙韦混悬剂溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
自制品-2025062721批-pH6.8介质-120min-片4
供试品溶液-1




HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温 : 35°C 波长: 259nm
数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-65/25-1458-2 - zzp-z6-2025062721p-rcqx-pH6.8jz-p5-120min.lcd
方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20260130-RC-FX274.lcb
样品瓶号: 4-39
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2026/01/30 17:43:05 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2026/01/31 10:04:21 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.156	41291	100.000	6887	3004	1.022	--
总计		41291	100.000	6887			

图127 玛巴洛沙韦混悬剂溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
自制品-2025062721批-pH6.8介质-120min-片5
供试品溶液-1




HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温 : 35°C 波长: 259nm
数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-65/25-1459-2 - zzp-z6-2025062721p-rcqx-pH6.8jz-p6-120min.lcd
方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20260130-RC-FX274.lcb
样品瓶号: 4-48
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2026/01/30 17:46:28 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2026/01/31 10:04:24 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.156	42468	100.000	7084	2989	1.021	--
总计		42468	100.000	7084			

图128 玛巴洛沙韦混悬剂溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
自制品-2025062721批-pH6.8介质-120min-片6
供试品溶液-1




HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温 : 35°C 波长: 259nm
数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-65/25-1460-2 - zzp-z6-2025062721p-rcqx-pH6.8jz-p1-jx.lcd
方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20260130-RC-FX274.lcb
样品瓶号: 4-4
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2026/01/30 17:49:53 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2026/01/31 10:04:26 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.156	43030	100.000	7166	2985	1.022	--
总计		43030	100.000	7166			

图129 玛巴洛沙韦混悬剂溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
自制品-2025062721批-pH6.8介质-极限转速-片1
供试品溶液-1




HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温 : 35°C 波长: 259nm
数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-65/25-1461-2 - zzp-z6-2025062721p-rcqx-pH6.8jz-p2-jx.lcd
方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20260130-RC-FX274.lcb
样品瓶号: 4-13
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2026/01/30 17:53:15 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2026/01/31 10:04:29 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.157	41353	100.000	6955	3047	1.014	--
总计		41353	100.000	6955			

图130 玛巴洛沙韦混悬剂溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
自制品-2025062721批-pH6.8介质-极限转速-片2
供试品溶液-1




HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温 : 35 $^{\circ}$ C 波长: 259nm
数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-65/25-1462-2 - zzp-z6-2025062721p-rcqx-pH6.8jz-p3-jx.lcd
方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20260130-RC-FX274.lcb
样品瓶号: 4-22
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2026/01/30 17:56:39 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2026/01/31 10:04:32 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.156	40312	100.000	6783	3026	1.025	--
总计		40312	100.000	6783			

图131 玛巴洛沙韦混悬剂溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
自制品-2025062721批-pH6.8介质-极限转速-片3
供试品溶液-1




HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温 : 35°C 波长: 259nm
数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-65/25-1463-2 - zzp-z6-2025062721p-rcqx-pH6.8jz-p4-jx.lcd
方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20260130-RC-FX274.lcb
样品瓶号: 4-31
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2026/01/30 18:00:03 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2026/01/31 10:04:36 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.156	41724	100.000	6981	3017	1.027	--
总计		41724	100.000	6981			

图132 玛巴洛沙韦混悬剂溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
自制品-2025062721批-pH6.8介质-极限转速-片4
供试品溶液-1



HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 35°C

数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-65/25-1464-2 - zzp-z6-2025062721p-rcqx-pH6.8jz-p5-jx.lcd

方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20260130-RC-FX274.lcb

样品瓶号: 4-40

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/01/30 18:03:27

处理时间 (V2) : 2026/01/31 10:04:39

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min


波长: 259nm

版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.156	42109	100.000	7008	2996	1.022	--
总计		42109	100.000	7008			

图133 玛巴洛沙韦混悬剂溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
自制品-2025062721批-pH6.8介质-极限转速-片5
供试品溶液-1




HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温 : 35°C 波长: 259nm
数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-65/25-1465-2 - zzp-z6-2025062721p-rcqx-pH6.8jz-p6-jx.lcd
方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20260130-RC-FX274.lcb
样品瓶号: 4-49
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2026/01/30 18:06:50 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2026/01/31 10:04:42 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.156	42218	100.000	7026	2991	1.018	--
总计		42218	100.000	7026			

图134 玛巴洛沙韦混悬剂溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
自制品-2025062721批-pH6.8介质-极限转速-片6
供试品溶液-1




HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温 : 35°C 波长: 259nm
数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-65/25-1466-2 - zzp-z6-2025062721p-rcqx-pH6.8jz-dz2-1.lcd
方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20260130-RC-FX274.lcb
样品瓶号: 2-27
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2026/01/30 18:10:15 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2026/01/31 10:04:45 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.149	97500	100.000	15623	2769	1.028	--
总计		97500	100.000	15623			

图135 玛巴洛沙韦混悬剂溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
自制品-2025062721批-pH6.8介质
对照品溶液-2-1




HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温 : 35°C 波长: 259nm
数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-65/25-1467-2 - zzp-z6-2025062721p-rcqx-pH6.8jz-dz2-2.lcd
方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20260130-RC-FX274.lcb
样品瓶号: 2-27
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2026/01/30 18:13:41 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2026/01/31 10:04:48 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.149	97042	100.000	15584	2758	1.027	--
总计		97042	100.000	15584			

图136 玛巴洛沙韦混悬剂溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
自制品-2025062721批-pH6.8介质
对照品溶液-2-2



HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 35°C

数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-65/25-1468-2 - zzp-z6-2025062821p-rcqx-pH6.8jz-rj.lcd

方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20260130-RC-FX274.lcb

样品瓶号: 3-9

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/01/30 18:17:05

处理时间 (V2) : 2026/01/31 10:04:51

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min


波长: 259nm

版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图137 玛巴洛沙韦混悬剂溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
自制品-2025062821批-pH6.8介质
溶剂




HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温 : 35°C 波长: 259nm
数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-65/25-1469-2 - zzp-z6-2025062821p-rcqx-pH6.8jz-dz1-1.lcd
方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20260130-RC-FX274.lcb
样品瓶号: 3-18
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2026/01/30 18:20:28 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2026/01/31 10:04:54 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.149	97577	100.000	15593	2752	1.027	--
总计		97577	100.000	15593			

图138 玛巴洛沙韦混悬剂溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
自制品-2025062821批-pH6.8介质
对照品溶液-1-1




HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温 : 35 $^{\circ}$ C 波长: 259nm
数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-65/25-1470-2 - zzp-z6-2025062821p-rcqx-pH6.8jz-dz1-2.lcd
方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20260130-RC-FX274.lcb
样品瓶号: 3-18
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2026/01/30 18:23:53 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2026/01/31 10:04:57 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.149	96644	100.000	15557	2781	1.025	--
总计		96644	100.000	15557			

图139 玛巴洛沙韦混悬剂溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
自制品-2025062821批-pH6.8介质
对照品溶液-1-2




HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温 : 35 $^{\circ}$ C 波长: 259nm
数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-65/25-1471-2 - zzp-z6-2025062821p-rcqx-pH6.8jz-dz1-3.lcd
方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20260130-RC-FX274.lcb
样品瓶号: 3-18
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2026/01/30 18:27:15 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2026/01/31 10:05:00 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.148	96898	100.000	15556	2756	1.024	--
总计		96898	100.000	15556			

图140 玛巴洛沙韦混悬剂溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
自制品-2025062821批-pH6.8介质
对照品溶液-1-3




HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温 : 35 $^{\circ}$ C 波长: 259nm
数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-65/25-1472-2 - zzp-z6-2025062821p-rcqx-pH6.8jz-dz1-4.lcd
方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20260130-RC-FX274.lcb
样品瓶号: 3-18
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2026/01/30 18:30:38 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2026/01/31 10:05:03 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.150	97024	100.000	15529	2756	1.024	--
总计		97024	100.000	15529			

图141 玛巴洛沙韦混悬剂溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
自制品-2025062821批-pH6.8介质
对照品溶液-1-4




HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温 : 35°C 波长: 259nm
数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-65/25-1473-2 - zzp-z6-2025062821p-rcqx-pH6.8jz-dz1-5.lcd
方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20260130-RC-FX274.lcb
样品瓶号: 3-18
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2026/01/30 18:34:02 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2026/01/31 10:05:06 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.148	96712	100.000	15545	2764	1.024	--
总计		96712	100.000	15545			

图142 玛巴洛沙韦混悬剂溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
自制品-2025062821批-pH6.8介质
对照品溶液-1-5




HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温 : 35 $^{\circ}$ C 波长: 259nm
数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-65/25-1474-2 - zzp-z6-2025062821p-rcqx-pH6.8jz-p1-5min.lcd
方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20260130-RC-FX274.lcb
样品瓶号: 3-1
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2026/01/30 18:37:25 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2026/01/31 10:05:09 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.156	30424	100.000	5046	2955	1.017	--
总计		30424	100.000	5046			

图143 玛巴洛沙韦混悬剂溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
自制品-2025062821批-pH6.8介质-5min-片1
供试品溶液-1




HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温 : 35 $^{\circ}$ C 波长: 259nm
数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-65/25-1475-2 - zzp-z6-2025062821p-rcqx-pH6.8jz-p2-5min.lcd
方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20260130-RC-FX274.lcb
样品瓶号: 3-10
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2026/01/30 18:40:47 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2026/01/31 10:05:12 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.154	29412	100.000	4874	2948	1.023	--
总计		29412	100.000	4874			

图144 玛巴洛沙韦混悬剂溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
自制品-2025062821批-pH6.8介质-5min-片2
供试品溶液-1




HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温 : 35°C 波长: 259nm
数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-65/25-1476-2 - zzp-z6-2025062821p-rcqx-pH6.8jz-p3-5min.lcd
方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20260130-RC-FX274.lcb
样品瓶号: 3-19
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2026/01/30 18:44:09 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2026/01/31 10:05:15 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.156	29629	100.000	4913	2956	1.018	--
总计		29629	100.000	4913			

图145 玛巴洛沙韦混悬剂溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
自制品-2025062821批-pH6.8介质-5min-片3
供试品溶液-1




HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温 : 35 $^{\circ}$ C 波长: 259nm
数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-65/25-1477-2 - zzp-z6-2025062821p-rcqx-pH6.8jz-p4-5min.lcd
方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20260130-RC-FX274.lcb
样品瓶号: 3-28
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2026/01/30 18:47:33 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2026/01/31 10:05:18 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.156	29252	100.000	4828	2952	1.015	--
总计		29252	100.000	4828			

图146 玛巴洛沙韦混悬剂溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
自制品-2025062821批-pH6.8介质-5min-片4
供试品溶液-1



HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 35°C

数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-65/25-1478-2 - zzp-z6-2025062821p-rcqx-pH6.8jz-p5-5min.lcd

方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20260130-RC-FX274.lcb

样品瓶号: 3-37

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/01/30 18:50:57

处理时间 (V2) : 2026/01/31 10:05:21

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min


波长: 259nm

版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.156	28864	100.000	4794	2965	1.013	--
总计		28864	100.000	4794			

图147 玛巴洛沙韦混悬剂溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
自制品-2025062821批-pH6.8介质-5min-片5
供试品溶液-1



HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 35°C

数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-65/25-1479-2 - zzp-z6-2025062821p-rcqx-pH6.8jz-p6-5min.lcd

方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20260130-RC-FX274.lcb

样品瓶号: 3-46

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/01/30 18:54:20

处理时间 (V2) : 2026/01/31 10:05:24

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min


波长: 259nm

版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.156	28985	100.000	4826	2948	1.027	--
总计		28985	100.000	4826			

图148 玛巴洛沙韦混悬剂溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
自制品-2025062821批-pH6.8介质-5min-片6
供试品溶液-1




HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温 : 35 $^{\circ}$ C 波长: 259nm
数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-65/25-1480-2 - zzp-z6-2025062821p-rcqx-pH6.8jz-p1-10min.lcd
方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20260130-RC-FX274.lcb
样品瓶号: 3-2
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2026/01/30 18:57:41 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2026/01/31 10:05:27 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.156	35312	100.000	5862	2978	1.022	--
总计		35312	100.000	5862			

图149 玛巴洛沙韦混悬剂溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
自制品-2025062821批-pH6.8介质-10min-片1
供试品溶液-1




HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温 : 35 $^{\circ}$ C 波长: 259nm
数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-65/25-1481-2 - zzp-z6-2025062821p-rcqx-pH6.8jz-p2-10min.lcd
方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20260130-RC-FX274.lcb
样品瓶号: 3-11
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2026/01/30 19:01:04 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2026/01/31 10:05:30 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.155	34134	100.000	5638	2955	1.020	--
总计		34134	100.000	5638			

图150 玛巴洛沙韦混悬剂溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
自制品-2025062821批-pH6.8介质-10min-片2
供试品溶液-1




HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温 : 35°C 波长: 259nm
数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-65/25-1482-2 - zzp-z6-2025062821p-rcqx-pH6.8jz-p3-10min.lcd
方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20260130-RC-FX274.lcb
样品瓶号: 3-20
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2026/01/30 19:04:27 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2026/01/31 10:05:33 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.154	34324	100.000	5740	2983	1.014	--
总计		34324	100.000	5740			

图151 玛巴洛沙韦混悬剂溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
自制品-2025062821批-pH6.8介质-10min-片3
供试品溶液-1




HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温 : 35°C 波长: 259nm
数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-65/25-1483-2 - zzp-z6-2025062821p-rcqx-pH6.8jz-p4-10min.lcd
方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20260130-RC-FX274.lcb
样品瓶号: 3-29
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2026/01/30 19:07:49 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2026/01/31 10:05:36 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.154	34401	100.000	5661	2903	1.021	--
总计		34401	100.000	5661			

图152 玛巴洛沙韦混悬剂溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
自制品-2025062821批-pH6.8介质-10min-片4
供试品溶液-1




HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温 : 35°C 波长: 259nm
数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-65/25-1484-2 - zzp-z6-2025062821p-rcqx-pH6.8jz-p5-10min.lcd
方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20260130-RC-FX274.lcb
样品瓶号: 3-38
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2026/01/30 19:11:12 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2026/01/31 10:05:39 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.153	34356	100.000	5681	2941	1.022	--
总计		34356	100.000	5681			

图153 玛巴洛沙韦混悬剂溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
自制品-2025062821批-pH6.8介质-10min-片5
供试品溶液-1




HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温 : 35°C 波长: 259nm
数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-65/25-1485-2 - zzp-z6-2025062821p-rcqx-pH6.8jz-p6-10min.lcd
方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20260130-RC-FX274.lcb
样品瓶号: 3-47
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2026/01/30 19:14:35 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2026/01/31 10:05:42 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.154	34355	100.000	5672	2930	1.021	--
总计		34355	100.000	5672			

图154 玛巴洛沙韦混悬剂溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
自制品-2025062821批-pH6.8介质-10min-片6
供试品溶液-1




HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温 : 35°C 波长: 259nm
数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-65/25-1486-2 - zzp-z6-2025062821p-rcqx-pH6.8jz-p1-15min.lcd
方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20260130-RC-FX274.lcb
样品瓶号: 3-3
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2026/01/30 19:17:57 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2026/01/31 10:05:45 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.154	37180	100.000	6136	2917	1.026	--
总计		37180	100.000	6136			

图155 玛巴洛沙韦混悬剂溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
自制品-2025062821批-pH6.8介质-15min-片1
供试品溶液-1



HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 35°C

数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-65/25-1487-2 - zzp-z6-2025062821p-rcqx-pH6.8jz-p2-15min.lcd

方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20260130-RC-FX274.lcb

样品瓶号: 3-12

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/01/30 19:21:20

处理时间 (V2) : 2026/01/31 10:05:48

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min


波长: 259nm

版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.153	36217	100.000	5963	2922	1.025	--
总计		36217	100.000	5963			

图156 玛巴洛沙韦混悬剂溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
自制品-2025062821批-pH6.8介质-15min-片2
供试品溶液-1




HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温 : 35°C 波长: 259nm
数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-65/25-1488-2 - zzp-z6-2025062821p-rcqx-pH6.8jz-p3-15min.lcd
方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20260130-RC-FX274.lcb
样品瓶号: 3-21
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2026/01/30 19:24:41 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2026/01/31 10:05:51 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.153	37272	100.000	6139	2913	1.029	--
总计		37272	100.000	6139			

图157 玛巴洛沙韦混悬剂溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
自制品-2025062821批-pH6.8介质-15min-片3
供试品溶液-1




HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温 : 35°C 波长: 259nm
数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-65/25-1489-2 - zzp-z6-2025062821p-rcqx-pH6.8jz-p4-15min.lcd
方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20260130-RC-FX274.lcb
样品瓶号: 3-30
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2026/01/30 19:28:04 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2026/01/31 10:05:54 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.154	36660	100.000	6043	2936	1.025	--
总计		36660	100.000	6043			

图158 玛巴洛沙韦混悬剂溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
自制品-2025062821批-pH6.8介质-15min-片4
供试品溶液-1




HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温 : 35°C 波长: 259nm
数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-65/25-1490-2 - zzp-z6-2025062821p-rcqx-pH6.8jz-p5-15min.lcd
方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20260130-RC-FX274.lcb
样品瓶号: 3-39
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2026/01/30 19:31:25 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2026/01/31 10:05:57 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.151	36136	100.000	5948	2932	1.020	--
总计		36136	100.000	5948			

图159 玛巴洛沙韦混悬剂溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
自制品-2025062821批-pH6.8介质-15min-片5
供试品溶液-1




HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温 : 35°C 波长: 259nm
数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-65/25-1491-2 - zzp-z6-2025062821p-rcqx-pH6.8jz-p6-15min.lcd
方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20260130-RC-FX274.lcb
样品瓶号: 3-48
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2026/01/30 19:34:48 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2026/01/31 10:06:01 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.154	36073	100.000	5958	2936	1.021	--
总计		36073	100.000	5958			

图160 玛巴洛沙韦混悬剂溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
自制品-2025062821批-pH6.8介质-15min-片6
供试品溶液-1




HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温 : 35°C 波长: 259nm
数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-65/25-1492-2 - zzp-z6-2025062821p-rcqx-pH6.8jz-p1-20min.lcd
方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20260130-RC-FX274.lcb
样品瓶号: 3-4
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2026/01/30 19:38:11 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2026/01/31 10:06:04 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.154	38621	100.000	6412	2954	1.022	--
总计		38621	100.000	6412			

图161 玛巴洛沙韦混悬剂溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
自制品-2025062821批-pH6.8介质-20min-片1
供试品溶液-1




HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温 : 35°C 波长: 259nm
数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-65/25-1493-2 - zzp-z6-2025062821p-rcqx-pH6.8jz-p2-20min.lcd
方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20260130-RC-FX274.lcb
样品瓶号: 3-13
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2026/01/30 19:41:32 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2026/01/31 10:06:07 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.154	37915	100.000	6265	2941	1.022	--
总计		37915	100.000	6265			

图162 玛巴洛沙韦混悬剂溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
自制品-2025062821批-pH6.8介质-20min-片2
供试品溶液-1




HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温 : 35°C 波长: 259nm
数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-65/25-1494-2 - zzp-z6-2025062821p-rcqx-pH6.8jz-p3-20min.lcd
方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20260130-RC-FX274.lcb
样品瓶号: 3-22
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2026/01/30 19:44:56 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2026/01/31 10:06:10 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.152	37924	100.000	6277	2947	1.033	--
总计		37924	100.000	6277			

图163 玛巴洛沙韦混悬剂溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
自制品-2025062821批-pH6.8介质-20min-片3
供试品溶液-1




HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温 : 35°C 波长: 259nm
数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-65/25-1495-2 - zzp-z6-2025062821p-rcqx-pH6.8jz-p4-20min.lcd
方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20260130-RC-FX274.lcb
样品瓶号: 3-31
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2026/01/30 19:48:18 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2026/01/31 10:06:13 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.153	38831	100.000	6418	2946	1.023	--
总计		38831	100.000	6418			

图164 玛巴洛沙韦混悬剂溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
自制品-2025062821批-pH6.8介质-20min-片4
供试品溶液-1




HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温 : 35°C 波长: 259nm
数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-65/25-1496-2 - zzp-z6-2025062821p-rcqx-pH6.8jz-p5-20min.lcd
方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20260130-RC-FX274.lcb
样品瓶号: 3-40
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2026/01/30 19:51:40 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2026/01/31 10:06:16 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.154	37991	100.000	6279	2945	1.017	--
总计		37991	100.000	6279			

图165 玛巴洛沙韦混悬剂溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
自制品-2025062821批-pH6.8介质-20min-片5
供试品溶液-1




HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温 : 35°C 波长: 259nm
数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-65/25-1497-2 - zzp-z6-2025062821p-rcqx-pH6.8jz-p6-20min.lcd
方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20260130-RC-FX274.lcb
样品瓶号: 3-49
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2026/01/30 19:55:03 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2026/01/31 10:06:19 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.152	37757	100.000	6227	2941	1.027	--
总计		37757	100.000	6227			

图166 玛巴洛沙韦混悬剂溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
自制品-2025062821批-pH6.8介质-20min-片6
供试品溶液-1




HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温 : 35°C 波长: 259nm
数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-65/25-1498-2 - zzp-z6-2025062821p-rcqx-pH6.8jz-p1-30min.lcd
方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20260130-RC-FX274.lcb
样品瓶号: 3-5
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2026/01/30 19:58:25 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2026/01/31 10:06:22 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.153	39400	100.000	6505	2921	1.018	--
总计		39400	100.000	6505			

图167 玛巴洛沙韦混悬剂溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
自制品-2025062821批-pH6.8介质-30min-片1
供试品溶液-1




HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温 : 35°C 波长: 259nm
数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-65/25-1499-2 - zzp-z6-2025062821p-rcqx-pH6.8jz-p2-30min.lcd
方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20260130-RC-FX274.lcb
样品瓶号: 3-14
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2026/01/30 20:01:47 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2026/01/31 10:06:25 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.152	39040	100.000	6426	2924	1.017	--
总计		39040	100.000	6426			

图168 玛巴洛沙韦混悬剂溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
自制品-2025062821批-pH6.8介质-30min-片2
供试品溶液-1




HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温 : 35°C 波长: 259nm
数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-65/25-1500-2 - zzp-z6-2025062821p-rcqx-pH6.8jz-p3-30min.lcd
方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20260130-RC-FX274.lcb
样品瓶号: 3-23
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2026/01/30 20:05:09 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2026/01/31 10:06:29 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.153	40109	100.000	6648	2957	1.019	--
总计		40109	100.000	6648			

图169 玛巴洛沙韦混悬剂溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
自制品-2025062821批-pH6.8介质-30min-片3
供试品溶液-1



HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 35°C

数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-65/25-1501-2 - zzp-z6-2025062821p-rcqx-pH6.8jz-p4-30min.lcd

方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20260130-RC-FX274.lcb

样品瓶号: 3-32

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/01/30 20:08:31

处理时间 (V2) : 2026/01/31 10:06:32

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min


波长: 259nm

版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.153	38808	100.000	6406	2934	1.021	--
总计		38808	100.000	6406			

图170 玛巴洛沙韦混悬剂溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
自制品-2025062821批-pH6.8介质-30min-片4
供试品溶液-1




HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温 : 35°C 波长: 259nm
数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-65/25-1502-2 - zzp-z6-2025062821p-rcqx-pH6.8jz-p5-30min.lcd
方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20260130-RC-FX274.lcb
样品瓶号: 3-41
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2026/01/30 20:11:53 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2026/01/31 10:06:35 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.153	39352	100.000	6479	2923	1.015	--
总计		39352	100.000	6479			

图171 玛巴洛沙韦混悬剂溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
自制品-2025062821批-pH6.8介质-30min-片5
供试品溶液-1




HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温 : 35°C 波长: 259nm
数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-65/25-1503-2 - zzp-z6-2025062821p-rcqx-pH6.8jz-p6-30min.lcd
方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20260130-RC-FX274.lcb
样品瓶号: 3-50
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2026/01/30 20:15:15 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2026/01/31 10:06:38 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.153	38874	100.000	6389	2926	1.023	--
总计		38874	100.000	6389			

图172 玛巴洛沙韦混悬剂溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
自制品-2025062821批-pH6.8介质-30min-片6
供试品溶液-1




HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温 : 35°C 波长: 259nm
数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-65/25-1504-2 - zzp-z6-2025062821p-rcqx-pH6.8jz-p1-45min.lcd
方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20260130-RC-FX274.lcb
样品瓶号: 3-6
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2026/01/30 20:18:37 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2026/01/31 10:06:41 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.154	41607	100.000	6865	2929	1.025	--
总计		41607	100.000	6865			

图173 玛巴洛沙韦混悬剂溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
自制品-2025062821批-pH6.8介质-45min-片1
供试品溶液-1




HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温 : 35°C 波长: 259nm
数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-65/25-1505-2 - zzp-z6-2025062821p-rcqx-pH6.8jz-p2-45min.lcd
方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20260130-RC-FX274.lcb
样品瓶号: 3-15
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2026/01/30 20:21:59 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2026/01/31 10:06:44 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.153	39879	100.000	6590	2930	1.032	--
总计		39879	100.000	6590			

图174 玛巴洛沙韦混悬剂溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
自制品-2025062821批-pH6.8介质-45min-片2
供试品溶液-1




HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温 : 35°C 波长: 259nm
数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-65/25-1506-2 - zzp-z6-2025062821p-rcqx-pH6.8jz-p3-45min.lcd
方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20260130-RC-FX274.lcb
样品瓶号: 3-24
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2026/01/30 20:25:21 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2026/01/31 10:06:48 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.153	41156	100.000	6802	2938	1.024	--
总计		41156	100.000	6802			

图175 玛巴洛沙韦混悬剂溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
自制品-2025062821批-pH6.8介质-45min-片3
供试品溶液-1




HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温 : 35°C 波长: 259nm
数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-65/25-1507-2 - zzp-z6-2025062821p-rcqx-pH6.8jz-p4-45min.lcd
方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20260130-RC-FX274.lcb
样品瓶号: 3-33
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2026/01/30 20:28:43 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2026/01/31 10:06:51 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.152	40738	100.000	6721	2933	1.019	--
总计		40738	100.000	6721			

图176 玛巴洛沙韦混悬剂溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
自制品-2025062821批-pH6.8介质-45min-片4
供试品溶液-1




HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温 : 35°C 波长: 259nm
数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-65/25-1508-2 - zzp-z6-2025062821p-rcqx-pH6.8jz-p5-45min.lcd
方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20260130-RC-FX274.lcb
样品瓶号: 3-42
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2026/01/30 20:32:05 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2026/01/31 10:06:54 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.152	40780	100.000	6744	2943	1.020	--
总计		40780	100.000	6744			

图177 玛巴洛沙韦混悬剂溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
自制品-2025062821批-pH6.8介质-45min-片5
供试品溶液-1




HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温 : 35°C 波长: 259nm
数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-65/25-1509-2 - zzp-z6-2025062821p-rcqx-pH6.8jz-p6-45min.lcd
方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20260130-RC-FX274.lcb
样品瓶号: 3-51
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2026/01/30 20:35:26 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2026/01/31 10:06:57 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.153	39528	100.000	6526	2933	1.025	--
总计		39528	100.000	6526			

图178 玛巴洛沙韦混悬剂溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
自制品-2025062821批-pH6.8介质-45min-片6
供试品溶液-1




HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温 : 35°C 波长: 259nm
数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-65/25-1510-2 - zzp-z6-2025062821p-rcqx-pH6.8jz-p1-60min.lcd
方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20260130-RC-FX274.lcb
样品瓶号: 3-7
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2026/01/30 20:38:48 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2026/01/31 10:07:00 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.152	41360	100.000	6811	2923	1.021	--
总计		41360	100.000	6811			

图179 玛巴洛沙韦混悬剂溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
自制品-2025062821批-pH6.8介质-60min-片1
供试品溶液-1



HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 35°C

数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-65/25-1511-2 - zzp-z6-2025062821p-rcqx-pH6.8jz-p2-60min.lcd

方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20260130-RC-FX274.lcb

样品瓶号: 3-16

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/01/30 20:42:11

处理时间 (V2) : 2026/01/31 10:07:03

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min


波长: 259nm

版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.152	40650	100.000	6706	2944	1.023	--
总计		40650	100.000	6706			

图180 玛巴洛沙韦混悬剂溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
自制品-2025062821批-pH6.8介质-60min-片2
供试品溶液-1




HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温 : 35°C 波长: 259nm
数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-65/25-1512-2 - zzp-z6-2025062821p-rcqx-pH6.8jz-p3-60min.lcd
方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20260130-RC-FX274.lcb
样品瓶号: 3-25
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2026/01/30 20:45:33 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2026/01/31 10:07:06 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.153	41840	100.000	6903	2935	1.028	--
总计		41840	100.000	6903			

图181 玛巴洛沙韦混悬剂溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
自制品-2025062821批-pH6.8介质-60min-片3
供试品溶液-1




HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温 : 35°C 波长: 259nm
数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-65/25-1513-2 - zzp-z6-2025062821p-rcqx-pH6.8jz-p4-60min.lcd
方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20260130-RC-FX274.lcb
样品瓶号: 3-34
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2026/01/30 20:48:55 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2026/01/31 10:07:09 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.154	41950	100.000	6938	2958	1.023	--
总计		41950	100.000	6938			

图182 玛巴洛沙韦混悬剂溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
自制品-2025062821批-pH6.8介质-60min-片4
供试品溶液-1




HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温 : 35 $^{\circ}$ C 波长: 259nm
数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-65/25-1514-2 - zzp-z6-2025062821p-rcqx-pH6.8jz-p5-60min.lcd
方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20260130-RC-FX274.lcb
样品瓶号: 3-43
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2026/01/30 20:52:17 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2026/01/31 10:07:12 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.151	40744	100.000	6675	2906	1.024	--
总计		40744	100.000	6675			

图183 玛巴洛沙韦混悬剂溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
自制品-2025062821批-pH6.8介质-60min-片5
供试品溶液-1




HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温 : 35 $^{\circ}$ C 波长: 259nm
数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-65/25-1515-2 - zzp-z6-2025062821p-rcqx-pH6.8jz-p6-60min.lcd
方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20260130-RC-FX274.lcb
样品瓶号: 3-52
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2026/01/30 20:55:39 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2026/01/31 10:07:15 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.153	40722	100.000	6708	2925	1.024	--
总计		40722	100.000	6708			

图184 玛巴洛沙韦混悬剂溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
自制品-2025062821批-pH6.8介质-60min-片6
供试品溶液-1




HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温 : 35°C 波长: 259nm
数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-65/25-1516-2 - zzp-z6-2025062821p-rcqx-pH6.8jz-p1-90min.lcd
方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20260130-RC-FX274.lcb
样品瓶号: 3-8
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2026/01/30 20:59:02 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2026/01/31 10:07:18 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.153	41736	100.000	6900	2934	1.027	--
总计		41736	100.000	6900			




HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温 : 35°C 波长: 259nm
数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-65/25-1517-2 - zzp-z6-2025062821p-rcqx-pH6.8jz-p2-90min.lcd
方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20260130-RC-FX274.lcb
样品瓶号: 3-17
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2026/01/30 21:02:25 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2026/01/31 10:07:21 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.153	41318	100.000	6811	2931	1.023	--
总计		41318	100.000	6811			

图186 玛巴洛沙韦混悬剂溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
自制品-2025062821批-pH6.8介质-90min-片2
供试品溶液-1




HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温 : 35 $^{\circ}$ C 波长: 259nm
数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-65/25-1518-2 - zzp-z6-2025062821p-rcqx-pH6.8jz-p3-90min.lcd
方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20260130-RC-FX274.lcb
样品瓶号: 3-26
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2026/01/30 21:05:48 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2026/01/31 10:07:24 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.154	42545	100.000	7021	2922	1.023	--
总计		42545	100.000	7021			

图187 玛巴洛沙韦混悬剂溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
自制品-2025062821批-pH6.8介质-90min-片3
供试品溶液-1




HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温 : 35°C 波长: 259nm
数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-65/25-1519-2 - zzp-z6-2025062821p-rcqx-pH6.8jz-p4-90min.lcd
方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20260130-RC-FX274.lcb
样品瓶号: 3-35
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2026/01/30 21:09:11 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2026/01/31 10:07:27 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.153	41113	100.000	6821	2943	1.026	--
总计		41113	100.000	6821			

图188 玛巴洛沙韦混悬剂溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
自制品-2025062821批-pH6.8介质-90min-片4
供试品溶液-1




HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温 : 35°C 波长: 259nm
数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-65/25-1520-2 - zzp-z6-2025062821p-rcqx-pH6.8jz-p5-90min.lcd
方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20260130-RC-FX274.lcb
样品瓶号: 3-44
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2026/01/30 21:12:34 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2026/01/31 10:07:30 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.152	41201	100.000	6827	2956	1.027	--
总计		41201	100.000	6827			

图189 玛巴洛沙韦混悬剂溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
自制品-2025062821批-pH6.8介质-90min-片5
供试品溶液-1




HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温 : 35°C 波长: 259nm
数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-65/25-1521-2 - zzp-z6-2025062821p-rcqx-pH6.8jz-p6-90min.lcd
方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20260130-RC-FX274.lcb
样品瓶号: 3-53
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2026/01/30 21:15:57 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2026/01/31 10:07:33 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.152	40375	100.000	6651	2941	1.017	--
总计		40375	100.000	6651			

图190 玛巴洛沙韦混悬剂溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
自制品-2025062821批-pH6.8介质-90min-片6
供试品溶液-1




HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温 : 35°C 波长: 259nm
数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-65/25-1522-2 - zzp-z6-2025062821p-rcqx-pH6.8jz-p1-120min.lcd
方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20260130-RC-FX274.lcb
样品瓶号: 4-5
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2026/01/30 21:19:20 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2026/01/31 10:07:36 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.152	42243	100.000	6999	2945	1.022	--
总计		42243	100.000	6999			

图191 玛巴洛沙韦混悬剂溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
自制品-2025062821批-pH6.8介质-120min-片1
供试品溶液-1




HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温 : 35°C 波长: 259nm
数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-65/25-1523-2 - zzp-z6-2025062821p-rcqx-pH6.8jz-p2-120min.lcd
方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20260130-RC-FX274.lcb
样品瓶号: 4-14
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2026/01/30 21:22:44 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2026/01/31 10:07:39 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.154	41869	100.000	6874	2912	1.023	--
总计		41869	100.000	6874			

图192 玛巴洛沙韦混悬剂溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
自制品-2025062821批-pH6.8介质-120min-片2
供试品溶液-1




HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温 : 35 $^{\circ}$ C 波长: 259nm
数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-65/25-1524-2 - zzp-z6-2025062821p-rcqx-pH6.8jz-p3-120min.lcd
方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20260130-RC-FX274.lcb
样品瓶号: 4-23
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2026/01/30 21:26:08 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2026/01/31 10:07:42 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.154	41582	100.000	6879	2949	1.020	--
总计		41582	100.000	6879			

图193 玛巴洛沙韦混悬剂溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
自制品-2025062821批-pH6.8介质-120min-片3
供试品溶液-1




HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温 : 35 $^{\circ}$ C 波长: 259nm
数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-65/25-1525-2 - zzp-z6-2025062821p-rcqx-pH6.8jz-p4-120min.lcd
方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20260130-RC-FX274.lcb
样品瓶号: 4-32
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2026/01/30 21:29:32 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2026/01/31 10:07:45 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.152	41804	100.000	6920	2943	1.022	--
总计		41804	100.000	6920			

图194 玛巴洛沙韦混悬剂溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
自制品-2025062821批-pH6.8介质-120min-片4
供试品溶液-1




HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温 : 35°C 波长: 259nm
数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-65/25-1526-2 - zzp-z6-2025062821p-rcqx-pH6.8jz-p5-120min.lcd
方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20260130-RC-FX274.lcb
样品瓶号: 4-41
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2026/01/30 21:32:55 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2026/01/31 10:07:48 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.152	41866	100.000	6899	2940	1.022	--
总计		41866	100.000	6899			




HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温 : 35°C 波长: 259nm
数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-65/25-1527-2 - zzp-z6-2025062821p-rcqx-pH6.8jz-p6-120min.lcd
方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20260130-RC-FX274.lcb
样品瓶号: 4-50
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2026/01/30 21:36:19 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2026/01/31 10:07:51 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.153	41826	100.000	6931	2954	1.021	--
总计		41826	100.000	6931			

图196 玛巴洛沙韦混悬剂溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
自制品-2025062821批-pH6.8介质-120min-片6
供试品溶液-1




HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温 : 35°C 波长: 259nm
数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-65/25-1528-2 - zzp-z6-2025062821p-rcqx-pH6.8jz-p1-jx.lcd
方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20260130-RC-FX274.lcb
样品瓶号: 4-6
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2026/01/30 21:39:43 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2026/01/31 10:07:54 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.152	42595	100.000	7011	2923	1.020	--
总计		42595	100.000	7011			

图197 玛巴洛沙韦混悬剂溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
自制品-2025062821批-pH6.8介质-极限转速-片1
供试品溶液-1




HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温 : 35°C 波长: 259nm
数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-65/25-1529-2 - zzp-z6-2025062821p-rcqx-pH6.8jz-p2-jx.lcd
方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20260130-RC-FX274.lcb
样品瓶号: 4-15
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2026/01/30 21:43:07 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2026/01/31 10:07:57 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.153	41851	100.000	6890	2928	1.022	--
总计		41851	100.000	6890			

图198 玛巴洛沙韦混悬剂溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
自制品-2025062821批-pH6.8介质-极限转速-片2
供试品溶液-1



HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 35°C

数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-65/25-1530-2 - zzp-z6-2025062821p-rcqx-pH6.8jz-p3-jx.lcd

方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20260130-RC-FX274.lcb

样品瓶号: 4-24

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/01/30 21:46:31

处理时间 (V2) : 2026/01/31 10:08:00

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min


波长: 259nm

版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.154	42125	100.000	6970	2965	1.024	--
总计		42125	100.000	6970			

图199 玛巴洛沙韦混悬剂溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
自制品-2025062821批-pH6.8介质-极限转速-片3
供试品溶液-1




HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温 : 35°C 波长: 259nm
数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-65/25-1531-2 - zzp-z6-2025062821p-rcqx-pH6.8jz-p4-jx.lcd
方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20260130-RC-FX274.lcb
样品瓶号: 4-33
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2026/01/30 21:49:54 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2026/01/31 10:08:03 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.154	42750	100.000	7073	2940	1.022	--
总计		42750	100.000	7073			




HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温 : 35°C 波长: 259nm
数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-65/25-1532-2 - zzp-z6-2025062821p-rcqx-pH6.8jz-p5-jx.lcd
方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20260130-RC-FX274.lcb
样品瓶号: 4-42
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2026/01/30 21:53:18 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2026/01/31 10:08:06 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.154	41078	100.000	6791	2928	1.012	--
总计		41078	100.000	6791			




HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温 : 35 $^{\circ}$ C 波长: 259nm
数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-65/25-1533-2 - zzp-z6-2025062821p-rcqx-pH6.8jz-p6-jx.lcd
方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20260130-RC-FX274.lcb
样品瓶号: 4-51
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2026/01/30 21:56:42 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2026/01/31 10:08:09 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.154	41916	100.000	6965	2946	1.026	--
总计		41916	100.000	6965			




HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温 : 35 $^{\circ}$ C 波长: 259nm
数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-65/25-1534-2 - zzp-z6-2025062821p-rcqx-pH6.8jz-dz2-1.lcd
方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20260130-RC-FX274.lcb
样品瓶号: 3-27
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2026/01/30 22:00:05 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2026/01/31 10:08:12 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.146	97561	100.000	15656	2758	1.025	--
总计		97561	100.000	15656			




HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温 : 35 $^{\circ}$ C 波长: 259nm
数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-65/25-1535-2 - zzp-z6-2025062821p-rcqx-pH6.8jz-dz2-2.lcd
方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20260130-RC-FX274.lcb
样品瓶号: 3-27
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2026/01/30 22:03:28 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2026/01/31 10:08:15 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.147	96620	100.000	15563	2772	1.022	--
总计		96620	100.000	15563			