



盐酸鲁拉西酮片项目信息

介质体积(ml)	900	取样体积(ml)	1.5	补液体积(ml)	1.5
对照品批号	N877-220209	对照品来源	自制	对照品使用方法	直接使用
对照品含量(%)	99.74	对照品水分(%)	0	对照品稀释倍数	250
标示量(mg)	40	供试品稀释倍数	1	系数	1

对照品溶液

序号	称样量(mg)	A ₁	A ₂	A ₃	A ₄	A ₅	A _{平均}	RSD%
1	10.96	190435	190245	189966	189997	190202	190169	0.11
2	10.95	190059	190546				190302	0.19

单位质量响应值	RSD%	判断	
17351.19	17379.18	0.12	数据可信

供试品溶液-pH3.8

批号	样品(片)	A ₁	A ₂	A _{平均}	溶出量(%)	平均(%)	RSD%	置信区间
2025011721批	1	150297	150535	150416	77.75	77.68	1.77	76.24% ~ 79.12%
	2	150331	150626	150478	77.79			
	3	146717	147160	146938	75.96			
	4	154406	155588	154997	80.12			
	5	149433	149843	149638	77.35			
	6	149110	149207	149158	77.10			
T0704607DD批	1	178812	178024	178418	92.23	92.33	1.32	91.06% ~ 93.60%
	2	178399	178574	178486	92.26			
	3	174831	174545	174688	90.30			
	4	181906	181810	181858	94.01			
	5	178685	178241	178463	92.25			
	6	179820	179774	179797	92.94			



操作者: 谢超君

日期: 2026-02-03

复核者:

未审阅版本



盐酸鲁拉西酮片项目信息

介质体积(ml)	900	取样体积(ml)	1.5	补液体积(ml)	1.5
对照品批号	N877-220209	对照品来源	自制	对照品使用方法	直接使用
对照品含量(%)	99.74	对照品水分(%)	0	对照品稀释倍数	250
标示量(mg)	40	供试品稀释倍数	1	系数	1

对照品溶液

序号	称样量(mg)	A ₁	A ₂	A ₃	A ₄	A ₅	A _{平均}	RSD%
1	10.96	190455	190296	190321	190008	190276	190271	0.09
2	10.95	190394	190255				190324	0.06
单位质量响应值			RSD%		判断			
17360.49			17381.19		0.09		数据可信	

供试品溶液-pH3.8

批号	样品(片)	A ₁	A ₂	A _{平均}	溶出量(%)	平均(%)	RSD%	置信区间
2025011721批	1	144900	144754	144827	74.84	75.01	3.19	72.50% ~ 77.52%
	2	144409	144007	144208	74.52			
	3	138632	138176	138404	71.52			
	4	150976	150773	150874	77.97			
	5	149580	150099	149840	77.43			
	6	142520	143032	142776	73.78			
T0704607DD批	1	177589	177660	177624	91.79	93.10	0.82	92.31% ~ 93.89%
	2	179720	180212	179966	93.00			
	3	179752	179388	179570	92.80			
	4	181264	181115	181190	93.63			
	5	181712	181458	181585	93.84			
	6	181097	180979	181038	93.55			



操作者: 谢超君

日期: 2026-02-03

复核者:

未审阅版本




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
 柱温 : 30°C 波长:318nm
 数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-91/24-650-2 - rcd-pH3.8jz-jf50z-rj.lcd
 方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcd-FX273.lcm
 批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20260128-FX273.lcb
 样品瓶号: 2-9
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2026/01/29 01:02:01 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2) : 2026/01/29 10:52:25 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 318nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图1 盐酸鲁拉西酮片溶出度测定HPLC图谱
 自制品-pH3.8介质-桨法-50转加沉降篮
 溶剂

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5µm) 流速:1.5ml/min
 柱温 : 30°C 波长:318nm
 数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-91/24-651-2 - rcd-pH3.8jz-jf50z-dz1-1.lcd
 方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcd-FX273.lcm
 批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20260128-FX273.lcb
 样品瓶号: 2-18
 进样体积: 10 µl 版本号:6.115
 进样时间: 2026/01/29 01:04:56 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2) : 2026/01/29 10:52:29 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.116	190435	100.000	45454	1638	1.147	--
总计		190435	100.000	45454			


图2 盐酸鲁拉西酮片溶出度测定HPLC图谱
自制品-pH3.8介质-桨法-50转加沉降篮
对照品溶液-1-1

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
 柱温 : 30°C 波长:318nm
 数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-91/24-652-2 - rcd-pH3.8jz-jf50z-dz1-2.lcd
 方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcd-FX273.lcm
 批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20260128-FX273.lcb
 样品瓶号: 2-18
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2026/01/29 01:07:50 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2) : 2026/01/29 10:52:32 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.115	190245	100.000	45534	1639	1.148	--
总计		190245	100.000	45534			

图3 盐酸鲁拉西酮片溶出度测定HPLC图谱
自制品-pH3.8介质-桨法-50转加沉降篮
对照品溶液-1-2

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
 柱温 : 30°C 波长:318nm
 数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-91/24-653-2 - rcd-pH3.8jz-jf50z-dz1-3.lcd
 方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcd-FX273.lcm
 批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20260128-FX273.lcb
 样品瓶号: 2-18
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2026/01/29 01:10:44 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2) : 2026/01/29 10:52:37 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 318nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.116	189966	100.000	45423	1644	1.148	--
总计		189966	100.000	45423			

图4 盐酸鲁拉西酮片溶出度测定HPLC图谱
自制品-pH3.8介质-桨法-50转加沉降篮
对照品溶液-1-3

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
 柱温 : 30°C 波长:318nm
 数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-91/24-654-2 - rcd-pH3.8jz-jf50z-dz1-4.lcd
 方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcd-FX273.lcm
 批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20260128-FX273.lcb
 样品瓶号: 2-18
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2026/01/29 01:13:38 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2) : 2026/01/29 10:52:40 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 318nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.116	189997	100.000	45429	1645	1.148	--
总计		189997	100.000	45429			

图5 盐酸鲁拉西酮片溶出度测定HPLC图谱
自制品-pH3.8介质-桨法-50转加沉降篮
对照品溶液-1-4

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
 柱温 : 30°C 波长:318nm
 数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-91/24-655-2 - rcd-pH3.8jz-jf50z-dz1-5.lcd
 方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcd-FX273.lcm
 批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20260128-FX273.lcb
 样品瓶号: 2-18
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2026/01/29 01:16:32 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2) : 2026/01/29 10:52:43 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 318nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.117	190202	100.000	45224	1649	1.149	--
总计		190202	100.000	45224			

图6 盐酸鲁拉西酮片溶出度测定HPLC图谱
自制品-pH3.8介质-桨法-50转加沉降篮
对照品溶液-1-5

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
 柱温 : 30°C 波长:318nm
 数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-91/24-656-2 - zzp-2025011721p-rcd-pH3.8jz-jf50z-P1-1.lcd
 方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcd-FX273.lcm
 批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20260128-FX273.lcb
 样品瓶号: 2-1
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2026/01/29 01:19:25 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2) : 2026/01/29 10:52:46 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 318nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.107	150297	100.000	37395	1766	1.176	--
总计		150297	100.000	37395			

图7 盐酸鲁拉西酮片溶出度测定HPLC图谱
 自制品(2025011721批)-pH3.8介质-桨法-50转加沉降篮-片1
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
 柱温 : 30°C 波长:318nm
 数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-91/24-657-2 - zzp-2025011721p-rcd-pH3.8jz-jf50z-P1-2.lcd
 方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcd-FX273.lcm
 批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20260128-FX273.lcb
 样品瓶号: 2-1
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2026/01/29 01:22:19 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2) : 2026/01/29 10:52:49 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 318nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.105	150535	100.000	37475	1761	1.175	--
总计		150535	100.000	37475			

图8 盐酸鲁拉西酮片溶出度测定HPLC图谱
 自制品(2025011721批)-pH3.8介质-桨法-50转加沉降篮-片1
 供试品溶液-2

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5µm) 流速:1.5ml/min
 柱温 : 30°C 波长:318nm
 数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-91/24-658-2 - zzp-2025011721p-rcd-pH3.8jz-jf50z-P2-1.lcd
 方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcd-FX273.lcm
 批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20260128-FX273.lcb
 样品瓶号: 2-10
 进样体积: 10 µl 版本号:6.115
 进样时间: 2026/01/29 01:25:12 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2) : 2026/01/29 10:52:51 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 318nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.106	150331	100.000	37386	1761	1.176	--
总计		150331	100.000	37386			

图9 盐酸鲁拉西酮片溶出度测定HPLC图谱
 自制品(2025011721批)-pH3.8介质-桨法-50转加沉降篮-片2
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
 柱温 : 30°C 波长:318nm
 数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-91/24-659-2 - zzp-2025011721p-rcd-pH3.8jz-jf50z-P2-2.lcd
 方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcd-FX273.lcm
 批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20260128-FX273.lcb
 样品瓶号: 2-10
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2026/01/29 01:28:06 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2) : 2026/01/29 10:52:54 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 318nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.105	150626	100.000	37411	1755	1.175	--
总计		150626	100.000	37411			

图10 盐酸鲁拉西酮片溶出度测定HPLC图谱
 自制品(2025011721批)-pH3.8介质-桨法-50转加沉降篮-片2
 供试品溶液-2

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5µm) 流速:1.5ml/min
 柱温 : 30°C 波长:318nm
 数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-91/24-660-2 - zzp-2025011721p-rcd-pH3.8jz-jf50z-P3-1.lcd
 方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcd-FX273.lcm
 批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20260128-FX273.lcb
 样品瓶号: 2-19
 进样体积: 10 µl 版本号:6.115
 进样时间: 2026/01/29 01:31:00 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2) : 2026/01/29 10:52:57 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 318nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.106	146717	100.000	36474	1762	1.176	--
总计		146717	100.000	36474			

图11 盐酸鲁拉西酮片溶出度测定HPLC图谱
 自制品(2025011721批)-pH3.8介质-桨法-50转加沉降篮-片3
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
 柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
 数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-91/24-661-2 - zzp-2025011721p-rcd-pH3.8jz-jf50z-P3-2.lcd
 方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcd-FX273.lcm
 批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20260128-FX273.lcb
 样品瓶号: 2-19
 进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
 进样时间: 2026/01/29 01:33:54 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2) : 2026/01/29 10:53:00 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 318nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.107	147160	100.000	36438	1759	1.178	--
总计		147160	100.000	36438			

图12 盐酸鲁拉西酮片溶出度测定HPLC图谱
 自制品(2025011721批)-pH3.8介质-桨法-50转加沉降篮-片3
 供试品溶液-2

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5µm) 流速:1.5ml/min
 柱温 : 30°C 波长:318nm
 数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-91/24-662-2 - zzp-2025011721p-rcd-pH3.8jz-jf50z-P4-1.lcd
 方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcd-FX273.lcm
 批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20260128-FX273.lcb
 样品瓶号: 2-28
 进样体积: 10 µl 版本号:6.115
 进样时间: 2026/01/29 01:36:47 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2) : 2026/01/29 10:53:02 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.107	154406	100.000	38406	1772	1.174	--
总计		154406	100.000	38406			

图13 盐酸鲁拉西酮片溶出度测定HPLC图谱
 自制品(2025011721批)-pH3.8介质-桨法-50转加沉降篮-片4
 供试品溶液-1




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
 柱温 : 30°C 波长:318nm
 数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-91/24-663-2 - zzp-2025011721p-rcd-pH3.8jz-jf50z-P4-2.lcd
 方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcd-FX273.lcm
 批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20260128-FX273.lcb
 样品瓶号: 2-28
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2026/01/29 01:39:40 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2) : 2026/01/29 10:53:05 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 318nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.108	155588	100.000	38430	1760	1.176	--
总计		155588	100.000	38430			

图14 盐酸鲁拉西酮片溶出度测定HPLC图谱
 自制品(2025011721批)-pH3.8介质-桨法-50转加沉降篮-片4
 供试品溶液-2

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
 柱温 : 30°C 波长:318nm
 数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-91/24-664-2 - zzp-2025011721p-rcd-pH3.8jz-jf50z-P5-1.lcd
 方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcd-FX273.lcm
 批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20260128-FX273.lcb
 样品瓶号: 2-37
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2026/01/29 01:42:33 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2) : 2026/01/29 10:53:08 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 318nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.105	149433	100.000	37270	1761	1.176	--
总计		149433	100.000	37270			

图15 盐酸鲁拉西酮片溶出度测定HPLC图谱
 自制品(2025011721批)-pH3.8介质-桨法-50转加沉降篮-片5
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
 柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
 数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-91/24-665-2 - zzp-2025011721p-rcd-pH3.8jz-jf50z-P5-2.lcd
 方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcd-FX273.lcm
 批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20260128-FX273.lcb
 样品瓶号: 2-37
 进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
 进样时间: 2026/01/29 01:45:27 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2) : 2026/01/29 10:53:11 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 318nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.107	149843	100.000	37226	1766	1.176	--
总计		149843	100.000	37226			

图16 盐酸鲁拉西酮片溶出度测定HPLC图谱
 自制品(2025011721批)-pH3.8介质-桨法-50转加沉降篮-片5
 供试品溶液-2

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
 柱温 : 30°C 波长:318nm
 数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-91/24-666-2 - zzp-2025011721p-rcd-pH3.8jz-jf50z-P6-1.lcd
 方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcd-FX273.lcm
 批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20260128-FX273.lcb
 样品瓶号: 2-46
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2026/01/29 01:48:20 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2) : 2026/01/29 10:53:14 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.106	149110	100.000	37081	1760	1.176	--
总计		149110	100.000	37081			

图17 盐酸鲁拉西酮片溶出度测定HPLC图谱
 自制品(2025011721批)-pH3.8介质-桨法-50转加沉降篮-片6
 供试品溶液-1




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
 柱温 : 30°C 波长:318nm
 数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-91/24-667-2 - zzp-2025011721p-rcd-pH3.8jz-jf50z-P6-2.lcd
 方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcd-FX273.lcm
 批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20260128-FX273.lcb
 样品瓶号: 2-46
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2026/01/29 01:51:14 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2) : 2026/01/29 10:53:17 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 318nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.106	149207	100.000	37082	1764	1.179	--
总计		149207	100.000	37082			

图18 盐酸鲁拉西酮片溶出度测定HPLC图谱
 自制品(2025011721批)-pH3.8介质-桨法-50转加沉降篮-片6
 供试品溶液-2

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
 柱温 : 30°C 波长:318nm
 数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-91/24-668-2 - cbzj-T0704607DDp-rcd-pH3.8jz-jf50z-P1-1.lcd
 方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcd-FX273.lcm
 批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20260128-FX273.lcb
 样品瓶号: 2-2
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2026/01/29 01:54:08 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2) : 2026/01/29 10:53:20 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 318nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.106	178812	100.000	44431	1763	1.171	--
总计		178812	100.000	44431			

图19 盐酸鲁拉西酮片溶出度测定HPLC图谱
 自制品(T0704607DD批)-pH3.8介质-浆法-50转加沉降篮-片1
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5µm) 流速:1.5ml/min
 柱温 : 30°C 波长:318nm
 数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-91/24-669-2 - cbzj-T0704607DDp-rcd-pH3.8jz-jf50z-P1-2.lcd
 方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcd-FX273.lcm
 批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20260128-FX273.lcb
 样品瓶号: 2-2
 进样体积: 10 µl 版本号:6.115
 进样时间: 2026/01/29 01:57:02 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2) : 2026/01/29 10:53:22 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 318nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.106	178024	100.000	44349	1768	1.169	--
总计		178024	100.000	44349			

图20 盐酸鲁拉西酮片溶出度测定HPLC图谱
 自制品(T0704607DD批)-pH3.8介质-浆法-50转加沉降篮-片1
 供试品溶液-2

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
 柱温 : 30°C 波长:318nm
 数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-91/24-670-2 - cbzj-T0704607DDp-rcd-pH3.8jz-jf50z-P2-1.lcd
 方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcd-FX273.lcm
 批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20260128-FX273.lcb
 样品瓶号: 2-11
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2026/01/29 01:59:56 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2) : 2026/01/29 10:53:25 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.106	178399	100.000	44504	1765	1.169	--
总计		178399	100.000	44504			

图21 盐酸鲁拉西酮片溶出度测定HPLC图谱
 自制品(T0704607DD批)-pH3.8介质-浆法-50转加沉降篮-片2
 供试品溶液-1




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
 柱温 : 30°C 波长:318nm
 数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-91/24-671-2 - cbzj-T0704607DDp-rcd-pH3.8jz-jf50z-P2-2.lcd
 方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcd-FX273.lcm
 批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20260128-FX273.lcb
 样品瓶号: 2-11
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2026/01/29 02:02:49 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2) : 2026/01/29 10:53:28 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.106	178574	100.000	44481	1766	1.168	--
总计		178574	100.000	44481			


图22 盐酸鲁拉西酮片溶出度测定HPLC图谱
 自制品(T0704607DD批)-pH3.8介质-浆法-50转加沉降篮-片2
 供试品溶液-2

JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5µm) 流速:1.5ml/min
 柱温 : 30°C 波长:318nm
 数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-91/24-672-2 - cbzj-T0704607DDp-rcd-pH3.8jz-jf50z-P3-1.lcd
 方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcd-FX273.lcm
 批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20260128-FX273.lcb
 样品瓶号: 2-20
 进样体积: 10 µl 版本号:6.115
 进样时间: 2026/01/29 02:05:43 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2) : 2026/01/29 10:53:31 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.106	174831	100.000	43512	1765	1.170	--
总计		174831	100.000	43512			


图23 盐酸鲁拉西酮片溶出度测定HPLC图谱
 自制品(T0704607DD批)-pH3.8介质-浆法-50转加沉降篮-片3
 供试品溶液-1

JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
 柱温 : 30°C 波长:318nm
 数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-91/24-673-2 - cbzj-T0704607DDp-rcd-pH3.8jz-jf50z-P3-2.lcd
 方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcd-FX273.lcm
 批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20260128-FX273.lcb
 样品瓶号: 2-20
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2026/01/29 02:08:36 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2) : 2026/01/29 10:53:34 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 318nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.107	174545	100.000	43449	1770	1.169	--
总计		174545	100.000	43449			

图24 盐酸鲁拉西酮片溶出度测定HPLC图谱
 自制品(T0704607DD批)-pH3.8介质-浆法-50转加沉降篮-片3
 供试品溶液-2

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
 柱温 : 30°C 波长:318nm
 数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-91/24-674-2 - cbzj-T0704607DDp-rcd-pH3.8jz-jf50z-P4-1.lcd
 方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcd-FX273.lcm
 批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20260128-FX273.lcb
 样品瓶号: 2-29
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2026/01/29 02:11:29 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2) : 2026/01/29 10:53:36 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.107	181906	100.000	45214	1775	1.171	--
总计		181906	100.000	45214			


图25 盐酸鲁拉西酮片溶出度测定HPLC图谱
 自制品(T0704607DD批)-pH3.8介质-浆法-50转加沉降篮-片4
 供试品溶液-1

JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
 柱温 : 30°C 波长:318nm
 数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-91/24-675-2 - cbzj-T0704607DDp-rcd-pH3.8jz-jf50z-P4-2.lcd
 方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcd-FX273.lcm
 批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20260128-FX273.lcb
 样品瓶号: 2-29
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2026/01/29 02:14:23 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2) : 2026/01/29 10:53:39 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.106	181810	100.000	45314	1769	1.169	--
总计		181810	100.000	45314			


图26 盐酸鲁拉西酮片溶出度测定HPLC图谱
 自制品(T0704607DD批)-pH3.8介质-浆法-50转加沉降篮-片4
 供试品溶液-2

JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
 柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
 数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-91/24-676-2 - cbzj-T0704607DDp-rcd-pH3.8jz-jf50z-P5-1.lcd
 方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcd-FX273.lcm
 批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20260128-FX273.lcb
 样品瓶号: 2-38
 进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
 进样时间: 2026/01/29 02:17:16 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2) : 2026/01/29 10:53:42 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 318nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.109	178685	100.000	44107	1776	1.171	--
总计		178685	100.000	44107			

图27 盐酸鲁拉西酮片溶出度测定HPLC图谱
 自制品(T0704607DD批)-pH3.8介质-浆法-50转加沉降篮-片5
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
 柱温 : 30°C 波长:318nm
 数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-91/24-677-2 - cbzj-T0704607DDp-rcd-pH3.8jz-jf50z-P5-2.lcd
 方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcd-FX273.lcm
 批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20260128-FX273.lcb
 样品瓶号: 2-38
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2026/01/29 02:20:09 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2) : 2026/01/29 10:53:45 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 318nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.108	178241	100.000	44249	1776	1.171	--
总计		178241	100.000	44249			

图28 盐酸鲁拉西酮片溶出度测定HPLC图谱
自制品(T0704607DD批)-pH3.8介质-浆法-50转加沉降篮-片5
供试品溶液-2

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
 柱温 : 30°C 波长:318nm
 数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-91/24-678-2 - cbzj-T0704607DDp-rcd-pH3.8jz-jf50z-P6-1.lcd
 方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcd-FX273.lcm
 批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20260128-FX273.lcb
 样品瓶号: 2-47
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2026/01/29 02:23:02 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2) : 2026/01/29 10:53:48 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.106	179820	100.000	44761	1765	1.170	--
总计		179820	100.000	44761			


图29 盐酸鲁拉西酮片溶出度测定HPLC图谱
 自制品(T0704607DD批)-pH3.8介质-浆法-50转加沉降篮-片6
 供试品溶液-1

JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
 柱温 : 30°C 波长:318nm
 数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-91/24-679-2 - cbzj-T0704607DDp-rcd-pH3.8jz-jf50z-P6-2.lcd
 方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcd-FX273.lcm
 批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20260128-FX273.lcb
 样品瓶号: 2-47
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2026/01/29 02:25:55 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2) : 2026/01/29 10:53:50 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 318nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.107	179774	100.000	44675	1765	1.171	--
总计		179774	100.000	44675			

图30 盐酸鲁拉西酮片溶出度测定HPLC图谱
自制品(T0704607DD批)-pH3.8介质-浆法-50转加沉降篮-片6
供试品溶液-2

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
 柱温 : 30°C 波长:318nm
 数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-91/24-680-2 - rcd-pH3.8jz-jf50z-dz2-1.lcd
 方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcd-FX273.lcm
 批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20260128-FX273.lcb
 样品瓶号: 2-27
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2026/01/29 02:28:49 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2) : 2026/01/29 10:53:53 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 318nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.115	190059	100.000	45541	1649	1.148	--
总计		190059	100.000	45541			

图31 盐酸鲁拉西酮片溶出度测定HPLC图谱
自制品-pH3.8介质-桨法-50转加沉降篮
对照品溶液-2-1

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
 柱温 : 30°C 波长:318nm
 数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-91/24-681-2 - rcd-pH3.8jz-jf50z-dz2-2.lcd
 方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcd-FX273.lcm
 批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20260128-FX273.lcb
 样品瓶号: 2-27
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2026/01/29 02:31:43 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2) : 2026/01/29 10:53:57 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.116	190546	100.000	45385	1645	1.147	--
总计		190546	100.000	45385			

图32 盐酸鲁拉西酮片溶出度测定HPLC图谱
自制品-pH3.8介质-桨法-50转加沉降篮
对照品溶液-2-2




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
 柱温 : 30°C 波长:318nm
 数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-91/24-682-2 - rcd-pH3.8jz-lf100z-rj.lcd
 方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcd-FX273.lcm
 批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20260128-FX273.lcb
 样品瓶号: 2-36
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2026/01/29 02:34:37 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2) : 2026/01/29 10:54:00 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 318nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图33 盐酸鲁拉西酮片溶出度测定HPLC图谱
自制品-pH3.8介质-浆法-50转
溶剂

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
 柱温 : 30°C 波长:318nm
 数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-91/24-683-2 - rcd-pH3.8jz-lf100z-dz1-1.lcd
 方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcd-FX273.lcm
 批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20260128-FX273.lcb
 样品瓶号: 2-45
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2026/01/29 02:37:31 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2) : 2026/01/29 10:54:03 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 318nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.116	190455	100.000	45548	1648	1.149	--
总计		190455	100.000	45548			

图34 盐酸鲁拉西酮片溶出度测定HPLC图谱
参比制剂-pH3.8介质-篮法-100转
对照品溶液-1-1

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5µm) 流速:1.5ml/min
 柱温 : 30°C 波长:318nm
 数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-91/24-684-2 - rcd-pH3.8jz-lf100z-dz1-2.lcd
 方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcd-FX273.lcm
 批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20260128-FX273.lcb
 样品瓶号: 2-45
 进样体积: 10 µl 版本号:6.115
 进样时间: 2026/01/29 02:40:25 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2) : 2026/01/29 10:54:06 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 318nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.115	190296	100.000	45640	1644	1.147	--
总计		190296	100.000	45640			

图35 盐酸鲁拉西酮片溶出度测定HPLC图谱
参比制剂-pH3.8介质-篮法-100转
对照品溶液-1-2

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
 柱温 : 30°C 波长:318nm
 数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-91/24-685-2 - rcd-pH3.8jz-lf100z-dz1-3.lcd
 方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcd-FX273.lcm
 批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20260128-FX273.lcb
 样品瓶号: 2-45
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2026/01/29 02:43:19 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2) : 2026/01/29 10:54:09 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.115	190321	100.000	45642	1641	1.148	--
总计		190321	100.000	45642			


图36 盐酸鲁拉西酮片溶出度测定HPLC图谱
参比制剂-pH3.8介质-篮法-100转
对照品溶液-1-3

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5µm) 流速:1.5ml/min
 柱温 : 30°C 波长:318nm
 数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-91/24-686-2 - rcd-pH3.8jz-lf100z-dz1-4.lcd
 方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcd-FX273.lcm
 批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20260128-FX273.lcb
 样品瓶号: 2-45
 进样体积: 10 µl 版本号:6.115
 进样时间: 2026/01/29 02:46:13 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2) : 2026/01/29 10:54:12 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.114	190008	100.000	45587	1644	1.147	--
总计		190008	100.000	45587			


图37 盐酸鲁拉西酮片溶出度测定HPLC图谱
参比制剂-pH3.8介质-篮法-100转
对照品溶液-1-4

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
 柱温 : 30°C 波长:318nm
 数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-91/24-687-2 - rcd-pH3.8jz-lf100z-dz1-5.lcd
 方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcd-FX273.lcm
 批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20260128-FX273.lcb
 样品瓶号: 2-45
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2026/01/29 02:49:07 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2) : 2026/01/29 10:54:16 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.116	190276	100.000	45440	1647	1.149	--
总计		190276	100.000	45440			

图38 盐酸鲁拉西酮片溶出度测定HPLC图谱
参比制剂-pH3.8介质-篮法-100转
对照品溶液-1-5

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5µm) 流速:1.5ml/min
 柱温 : 30°C 波长:318nm
 数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-91/24-688-2 - zzp-2025011721p-rcd-pH3.8jz-lf100z-P1-1.lcd
 方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcd-FX273.lcm
 批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20260128-FX273.lcb
 样品瓶号: 2-3
 进样体积: 10 µl 版本号:6.115
 进样时间: 2026/01/29 02:52:01 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2) : 2026/01/29 10:54:19 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 318nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.106	144900	100.000	35928	1763	1.180	--
总计		144900	100.000	35928			

图39 盐酸鲁拉西酮片溶出度测定HPLC图谱
 参比制剂(2025011721批)-pH3.8介质-篮法-100转-片1
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5µm) 流速:1.5ml/min
 柱温 : 30°C 波长:318nm
 数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-91/24-689-2 - zzp-2025011721p-rcd-pH3.8jz-lf100z-P1-2.lcd
 方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcd-FX273.lcm
 批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20260128-FX273.lcb
 样品瓶号: 2-3
 进样体积: 10 µl 版本号:6.115
 进样时间: 2026/01/29 02:54:55 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2) : 2026/01/29 10:54:22 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 318nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.105	144754	100.000	36021	1757	1.177	--
总计		144754	100.000	36021			

图40 盐酸鲁拉西酮片溶出度测定HPLC图谱
参比制剂(2025011721批)-pH3.8介质-篮法-100转-片1
供试品溶液-2

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
 柱温 : 30°C 波长:318nm
 数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-91/24-690-2 - zzp-2025011721p-rcd-pH3.8jz-lf100z-P2-1.lcd
 方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcd-FX273.lcm
 批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20260128-FX273.lcb
 样品瓶号: 2-12
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2026/01/29 02:57:49 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2) : 2026/01/29 10:54:24 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 318nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.106	144409	100.000	35877	1757	1.178	--
总计		144409	100.000	35877			

图41 盐酸鲁拉西酮片溶出度测定HPLC图谱
 参比制剂(2025011721批)-pH3.8介质-篮法-100转-片2
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5µm) 流速:1.5ml/min
 柱温 : 30°C 波长:318nm
 数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-91/24-691-2 - zzp-2025011721p-rcd-pH3.8jz-lf100z-P2-2.lcd
 方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcd-FX273.lcm
 批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20260128-FX273.lcb
 样品瓶号: 2-12
 进样体积: 10 µl 版本号:6.115
 进样时间: 2026/01/29 03:00:43 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2) : 2026/01/29 10:54:27 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 318nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.106	144007	100.000	35867	1759	1.177	--
总计		144007	100.000	35867			

图42 盐酸鲁拉西酮片溶出度测定HPLC图谱
 参比制剂(2025011721批)-pH3.8介质-篮法-100转-片2
 供试品溶液-2

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
 柱温 : 30°C 波长:318nm
 数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-91/24-692-2 - zzp-2025011721p-rcd-pH3.8jz-lf100z-P3-1.lcd
 方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcd-FX273.lcm
 批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20260128-FX273.lcb
 样品瓶号: 2-21
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2026/01/29 03:03:36 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2) : 2026/01/29 10:54:30 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 318nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.106	138632	100.000	34477	1758	1.179	--
总计		138632	100.000	34477			

图43 盐酸鲁拉西酮片溶出度测定HPLC图谱
 参比制剂(2025011721批)-pH3.8介质-篮法-100转-片3
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5µm) 流速:1.5ml/min
 柱温 : 30°C 波长:318nm
 数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-91/24-693-2 - zzp-2025011721p-rcd-pH3.8jz-lf100z-P3-2.lcd
 方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcd-FX273.lcm
 批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20260128-FX273.lcb
 样品瓶号: 2-21
 进样体积: 10 µl 版本号:6.115
 进样时间: 2026/01/29 03:06:30 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2) : 2026/01/29 10:54:33 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 318nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.105	138176	100.000	34436	1759	1.180	--
总计		138176	100.000	34436			

图44 盐酸鲁拉西酮片溶出度测定HPLC图谱
 参比制剂(2025011721批)-pH3.8介质-篮法-100转-片3
 供试品溶液-2

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
 柱温 : 30°C 波长:318nm
 数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-91/24-694-2 - zzp-2025011721p-rcd-pH3.8jz-lf100z-P4-1.lcd
 方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcd-FX273.lcm
 批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20260128-FX273.lcb
 样品瓶号: 2-30
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2026/01/29 03:09:23 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2) : 2026/01/29 10:54:36 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 318nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.106	150976	100.000	37580	1760	1.177	--
总计		150976	100.000	37580			

图45 盐酸鲁拉西酮片溶出度测定HPLC图谱
 参比制剂(2025011721批)-pH3.8介质-篮法-100转-片4
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5µm) 流速:1.5ml/min
 柱温 : 30°C 波长:318nm
 数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-91/24-695-2 - zzp-2025011721p-rcd-pH3.8jz-lf100z-P4-2.lcd
 方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcd-FX273.lcm
 批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20260128-FX273.lcb
 样品瓶号: 2-30
 进样体积: 10 µl 版本号:6.115
 进样时间: 2026/01/29 03:12:16 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2) : 2026/01/29 10:54:39 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 318nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.106	150773	100.000	37508	1768	1.177	--
总计		150773	100.000	37508			

图46 盐酸鲁拉西酮片溶出度测定HPLC图谱
 参比制剂(2025011721批)-pH3.8介质-篮法-100转-片4
 供试品溶液-2

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5µm) 流速:1.5ml/min
 柱温 : 30°C 波长:318nm
 数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-91/24-696-2 - zzp-2025011721p-rcd-pH3.8jz-lf100z-P5-1.lcd
 方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcd-FX273.lcm
 批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20260128-FX273.lcb
 样品瓶号: 2-39
 进样体积: 10 µl 版本号:6.115
 进样时间: 2026/01/29 03:15:09 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2) : 2026/01/29 10:54:41 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 318nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.105	149580	100.000	37273	1762	1.175	--
总计		149580	100.000	37273			

图47 盐酸鲁拉西酮片溶出度测定HPLC图谱
 参比制剂(2025011721批)-pH3.8介质-篮法-100转-片5
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5µm) 流速:1.5ml/min
 柱温 : 30°C 波长:318nm
 数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-91/24-697-2 - zzp-2025011721p-rcd-pH3.8jz-lf100z-P5-2.lcd
 方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcd-FX273.lcm
 批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20260128-FX273.lcb
 样品瓶号: 2-39
 进样体积: 10 µl 版本号:6.115
 进样时间: 2026/01/29 03:18:02 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2) : 2026/01/29 10:54:44 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 318nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.106	150099	100.000	37257	1763	1.179	--
总计		150099	100.000	37257			

图48 盐酸鲁拉西酮片溶出度测定HPLC图谱
 参比制剂(2025011721批)-pH3.8介质-篮法-100转-片5
 供试品溶液-2

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5µm) 流速:1.5ml/min
 柱温 : 30°C 波长:318nm
 数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-91/24-698-2 - zzp-2025011721p-rcd-pH3.8jz-lf100z-P6-1.lcd
 方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcd-FX273.lcm
 批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20260128-FX273.lcb
 样品瓶号: 2-48
 进样体积: 10 µl 版本号:6.115
 进样时间: 2026/01/29 03:20:56 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2) : 2026/01/29 10:54:47 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.105	142520	100.000	35461	1758	1.180	--
总计		142520	100.000	35461			

图49 盐酸鲁拉西酮片溶出度测定HPLC图谱
 参比制剂(2025011721批)-pH3.8介质-篮法-100转-片6
 供试品溶液-1




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
 柱温 : 30°C 波长:318nm
 数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-91/24-699-2 - zzp-2025011721p-rcd-pH3.8jz-lf100z-P6-2.lcd
 方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcd-FX273.lcm
 批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20260128-FX273.lcb
 样品瓶号: 2-48
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2026/01/29 03:23:49 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2) : 2026/01/29 10:54:50 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 318nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.106	143032	100.000	35491	1756	1.179	--
总计		143032	100.000	35491			

图50 盐酸鲁拉西酮片溶出度测定HPLC图谱
 参比制剂(2025011721批)-pH3.8介质-篮法-100转-片6
 供试品溶液-2

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
 柱温 : 30°C 波长:318nm
 数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-91/24-700-2 - cbzj-T0704607DDp-rcd-pH3.8jz-lf100z-P1-1.lcd
 方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcd-FX273.lcm
 批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20260128-FX273.lcb
 样品瓶号: 2-4
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2026/01/29 03:26:42 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2) : 2026/01/29 10:54:52 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.105	177589	100.000	44241	1763	1.170	--
总计		177589	100.000	44241			


图51 盐酸鲁拉西酮片溶出度测定HPLC图谱
参比制剂(T0704607DD批)-pH3.8介质-篮法-100转-片1
供试品溶液-1

JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
 柱温 : 30°C 波长:318nm
 数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-91/24-701-2 - cbzj-T0704607DDp-rcd-pH3.8jz-lf100z-P1-2.lcd
 方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcd-FX273.lcm
 批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20260128-FX273.lcb
 样品瓶号: 2-4
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2026/01/29 03:29:36 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2) : 2026/01/29 10:54:55 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 318nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.105	177660	100.000	44249	1762	1.170	--
总计		177660	100.000	44249			

图52 盐酸鲁拉西酮片溶出度测定HPLC图谱
参比制剂(T0704607DD批)-pH3.8介质-篮法-100转-片1
供试品溶液-2

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
 柱温 : 30°C 波长:318nm
 数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-91/24-702-2 - cbzj-T0704607DDp-rcd-pH3.8jz-lf100z-P2-1.lcd
 方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcd-FX273.lcm
 批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20260128-FX273.lcb
 样品瓶号: 2-13
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2026/01/29 03:32:30 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2) : 2026/01/29 10:54:58 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 318nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.105	179720	100.000	44880	1766	1.169	--
总计		179720	100.000	44880			

图53 盐酸鲁拉西酮片溶出度测定HPLC图谱
 参比制剂(T0704607DD批)-pH3.8介质-篮法-100转-片2
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5µm) 流速:1.5ml/min
 柱温 : 30°C 波长:318nm
 数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-91/24-703-2 - cbzj-T0704607DDp-rcd-pH3.8jz-lf100z-P2-2.lcd
 方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcd-FX273.lcm
 批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20260128-FX273.lcb
 样品瓶号: 2-13
 进样体积: 10 µl 版本号:6.115
 进样时间: 2026/01/29 03:35:24 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2) : 2026/01/29 10:55:01 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.107	180212	100.000	44718	1769	1.171	--
总计		180212	100.000	44718			


图54 盐酸鲁拉西酮片溶出度测定HPLC图谱
参比制剂(T0704607DD批)-pH3.8介质-篮法-100转-片2
供试品溶液-2

JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
 柱温 : 30°C 波长:318nm
 数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-91/24-704-2 - cbzj-T0704607DDp-rcd-pH3.8jz-lf100z-P3-1.lcd
 方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcd-FX273.lcm
 批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20260128-FX273.lcb
 样品瓶号: 2-22
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2026/01/29 03:38:18 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2) : 2026/01/29 10:55:04 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 318nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.105	179752	100.000	44852	1767	1.168	--
总计		179752	100.000	44852			

图55 盐酸鲁拉西酮片溶出度测定HPLC图谱
 参比制剂(T0704607DD批)-pH3.8介质-篮法-100转-片3
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
 柱温 : 30°C 波长:318nm
 数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-91/24-705-2 - cbzj-T0704607DDp-rcd-pH3.8jz-lf100z-P3-2.lcd
 方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcd-FX273.lcm
 批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20260128-FX273.lcb
 样品瓶号: 2-22
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2026/01/29 03:41:12 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2) : 2026/01/29 10:55:07 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 318nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.104	179388	100.000	44815	1765	1.169	--
总计		179388	100.000	44815			

图56 盐酸鲁拉西酮片溶出度测定HPLC图谱
 参比制剂(T0704607DD批)-pH3.8介质-篮法-100转-片3
 供试品溶液-2

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
 柱温 : 30°C 波长:318nm
 数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-91/24-706-2 - cbzj-T0704607DDp-rcd-pH3.8jz-lf100z-P4-1.lcd
 方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcd-FX273.lcm
 批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20260128-FX273.lcb
 样品瓶号: 2-31
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2026/01/29 03:44:06 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2) : 2026/01/29 10:55:09 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 318nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.105	181264	100.000	45246	1771	1.170	--
总计		181264	100.000	45246			

图57 盐酸鲁拉西酮片溶出度测定HPLC图谱
 参比制剂(T0704607DD批)-pH3.8介质-篮法-100转-片4
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
 柱温 : 30°C 波长:318nm
 数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-91/24-707-2 - cbzj-T0704607DDp-rcd-pH3.8jz-lf100z-P4-2.lcd
 方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcd-FX273.lcm
 批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20260128-FX273.lcb
 样品瓶号: 2-31
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2026/01/29 03:47:00 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2) : 2026/01/29 10:55:12 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 318nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.105	181115	100.000	45183	1764	1.169	--
总计		181115	100.000	45183			

图58 盐酸鲁拉西酮片溶出度测定HPLC图谱
参比制剂(T0704607DD批)-pH3.8介质-篮法-100转-片4
供试品溶液-2

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
 柱温 : 30°C 波长:318nm
 数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-91/24-708-2 - cbzj-T0704607DDp-rcd-pH3.8jz-lf100z-P5-1.lcd
 方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcd-FX273.lcm
 批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20260128-FX273.lcb
 样品瓶号: 2-40
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2026/01/29 03:49:53 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2) : 2026/01/29 10:55:15 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 318nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.105	181712	100.000	45273	1763	1.171	--
总计		181712	100.000	45273			

图59 盐酸鲁拉西酮片溶出度测定HPLC图谱
参比制剂(T0704607DD批)-pH3.8介质-篮法-100转-片5
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
 柱温 : 30°C 波长:318nm
 数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-91/24-709-2 - cbzj-T0704607DDp-rcd-pH3.8jz-lf100z-P5-2.lcd
 方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcd-FX273.lcm
 批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20260128-FX273.lcb
 样品瓶号: 2-40
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2026/01/29 03:52:47 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2) : 2026/01/29 10:55:18 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.105	181458	100.000	45294	1764	1.169	--
总计		181458	100.000	45294			


图60 盐酸鲁拉西酮片溶出度测定HPLC图谱
参比制剂(T0704607DD批)-pH3.8介质-篮法-100转-片5
供试品溶液-2

JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
 柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
 数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-91/24-710-2 - cbzj-T0704607DDp-rcd-pH3.8jz-lf100z-P6-1.lcd
 方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcd-FX273.lcm
 批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20260128-FX273.lcb
 样品瓶号: 2-49
 进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
 进样时间: 2026/01/29 03:55:40 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2) : 2026/01/29 10:55:21 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 318nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.105	181097	100.000	45222	1768	1.169	--
总计		181097	100.000	45222			

图61 盐酸鲁拉西酮片溶出度测定HPLC图谱
 参比制剂(T0704607DD批)-pH3.8介质-篮法-100转-片6
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
 柱温 : 30°C 波长:318nm
 数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-91/24-711-2 - cbzj-T0704607DDp-rcd-pH3.8jz-lf100z-P6-2.lcd
 方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcd-FX273.lcm
 批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20260128-FX273.lcb
 样品瓶号: 2-49
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2026/01/29 03:58:33 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2) : 2026/01/29 10:55:24 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 318nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.104	180979	100.000	45172	1768	1.170	--
总计		180979	100.000	45172			

图62 盐酸鲁拉西酮片溶出度测定HPLC图谱
参比制剂(T0704607DD批)-pH3.8介质-篮法-100转-片6
供试品溶液-2

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
 柱温 : 30°C 波长:318nm
 数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-91/24-712-2 - rcd-pH3.8jz-lf100z-dz2-1.lcd
 方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcd-FX273.lcm
 批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20260128-FX273.lcb
 样品瓶号: 2-54
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2026/01/29 04:01:27 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2) : 2026/01/29 10:55:26 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.114	190394	100.000	45744	1645	1.147	--
总计		190394	100.000	45744			


图63 盐酸鲁拉西酮片溶出度测定HPLC图谱
参比制剂-pH3.8介质-篮法-100转
对照品溶液-2-1

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
 柱温 : 30°C 波长:318nm
 数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-91/24-713-2 - rcd-pH3.8jz-lf100z-dz2-2.lcd
 方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcd-FX273.lcm
 批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20260128-FX273.lcb
 样品瓶号: 2-54
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2026/01/29 04:04:21 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2) : 2026/01/29 10:55:29 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.115	190255	100.000	45697	1647	1.147	--
总计		190255	100.000	45697			

图64 盐酸鲁拉西酮片溶出度测定HPLC图谱
参比制剂-pH3.8介质-篮法-100转
对照品溶液-2-2