




WKL-378

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温 :35°C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$WKL-378 - 0-80/11-1391-3 - zzp-2025071721p-j6-rcqx-1-pH1.2jz-jf50z-rj.lcd
 方法文件名: RC\$WKL-378 - WKL-378-rcqx-fx260.lcm
 批处理文件名: RC\$WKL-378 - 20260207-rcqx-FX260.lcb
 样品瓶号 : 1-9
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2026/02/07 11:23:27 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V3) : 2026/02/09 11:33:53 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图1 辅酶Q10片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
 自制品-2025071721批-pH1.2介质-桨法-50转
 溶剂




WKL-378

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温 :35°C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$WKL-378 - 0-80/11-1392-3 - zzp-2025071721p-j6-rcqx-1-pH1.2jz-jf50z-dz1-1.lcd
 方法文件名: RC\$WKL-378 - WKL-378-rcqx-fx260.lcm
 批处理文件名: RC\$WKL-378 - 20260207-rcqx-FX260.lcb
 样品瓶号 : 1-18
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2026/02/07 11:27:50 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V3) : 2026/02/09 11:33:57 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.353	270615	40274	100.000	2908	1.116	--
总计		270615	40274	100.000			

图2 辅酶Q10片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
 自制品-2025071721批-pH1.2介质-桨法-50转
 对照品溶液-1-1




WKL-378

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温 :35°C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$WKL-378 - 0-80/11-1393-3 - zzp-2025071721p-j6-rcqx-1-pH1.2jz-jf50z-dz1-2.lcd
 方法文件名: RC\$WKL-378 - WKL-378-rcqx-fx260.lcm
 批处理文件名: RC\$WKL-378 - 20260207-rcqx-FX260.lcb
 样品瓶号 : 1-18
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2026/02/07 11:32:15 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V3) : 2026/02/09 11:34:00 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.353	271944	40308	100.000	2908	1.116	--
总计		271944	40308	100.000			

图3 辅酶Q10片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
 自制品-2025071721批-pH1.2介质-桨法-50转
 对照品溶液-1-2




WKL-378

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温 :35°C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$WKL-378 - 0-80/11-1394-3 - zzp-2025071721p-j6-rcqx-1-pH1.2jz-jf50z-dz1-3.lcd
 方法文件名: RC\$WKL-378 - WKL-378-rcqx-fx260.lcm
 批处理文件名: RC\$WKL-378 - 20260207-rcqx-FX260.lcb
 样品瓶号 : 1-18
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2026/02/07 11:36:39 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V3) : 2026/02/09 11:34:03 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.351	270458	40186	100.000	2912	1.114	--
总计		270458	40186	100.000			

图4 辅酶Q10片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
 自制品-2025071721批-pH1.2介质-桨法-50转
 对照品溶液-1-3




WKL-378

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温 :35°C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$WKL-378 - 0-80/11-1395-3 - zzp-2025071721p-j6-rcqx-1-pH1.2jz-jf50z-dz1-4.lcd
 方法文件名: RC\$WKL-378 - WKL-378-rcqx-fx260.lcm
 批处理文件名: RC\$WKL-378 - 20260207-rcqx-FX260.lcb
 样品瓶号 : 1-18
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2026/02/07 11:41:04 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V3) : 2026/02/09 11:34:07 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.351	271530	40238	100.000	2907	1.115	--
总计		271530	40238	100.000			

图5 辅酶Q10片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
 自制品-2025071721批-pH1.2介质-桨法-50转
 对照品溶液-1-4




WKL-378

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温 :35°C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$WKL-378 - 0-80/11-1396-3 - zzp-2025071721p-j6-rcqx-1-pH1.2jz-jf50z-dz1-5.lcd
 方法文件名: RC\$WKL-378 - WKL-378-rcqx-fx260.lcm
 批处理文件名: RC\$WKL-378 - 20260207-rcqx-FX260.lcb
 样品瓶号 : 1-18
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2026/02/07 11:45:27 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V3) : 2026/02/09 11:34:10 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.349	270208	40317	100.000	2911	1.114	--
总计		270208	40317	100.000			

图6 辅酶Q10片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
 自制品-2025071721批-pH1.2介质-桨法-50转
 对照品溶液-1-5




WKL-378

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温 :35°C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$WKL-378 - 0-80/11-1397-3 - zzp-2025071721p-j6-rcqx-1-pH1.2jz-jf50z-5min-P1.lcd
 方法文件名: RC\$WKL-378 - WKL-378-rcqx-fx260.lcm
 批处理文件名: RC\$WKL-378 - 20260207-rcqx-FX260.lcb
 样品瓶号 : 1-1
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2026/02/07 11:49:49 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V3) : 2026/02/09 11:34:12 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.367	181205	27704	100.000	3136	1.113	--
总计		181205	27704	100.000			

图7 辅酶Q10片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
 自制品-2025071721批-pH1.2介质-浆法-50转-5min-片1
 供试品溶液-1




WKL-378

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5µm) 流速: 1.5ml/min
 柱温 :35°C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$WKL-378 - 0-80/11-1398-3 - zzp-2025071721p-j6-rcqx-1-pH1.2jz-jf50z-5min-P2.lcd
 方法文件名: RC\$WKL-378 - WKL-378-rcqx-fx260.lcm
 批处理文件名: RC\$WKL-378 - 20260207-rcqx-FX260.lcb
 样品瓶号 : 1-10
 进样体积 : 20 µl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2026/02/07 11:54:12 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V3) : 2026/02/09 11:34:15 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.364	189665	29198	100.000	3128	1.111	--
总计		189665	29198	100.000			

图8 辅酶Q10片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
 自制品-2025071721批-pH1.2介质-浆法-50转-5min-片2
 供试品溶液-1




WKL-378

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温 :35°C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$WKL-378 - 0-80/11-1399-3 - zzp-2025071721p-j6-rcqx-1-pH1.2jz-jf50z-5min-P3.lcd
 方法文件名: RC\$WKL-378 - WKL-378-rcqx-fx260.lcm
 批处理文件名: RC\$WKL-378 - 20260207-rcqx-FX260.lcb
 样品瓶号 : 1-19
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2026/02/07 11:58:36 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V3) : 2026/02/09 11:34:18 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.367	186720	28495	100.000	3131	1.114	--
总计		186720	28495	100.000			

图9 辅酶Q10片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
 自制品-2025071721批-pH1.2介质-浆法-50转-5min-片3
 供试品溶液-1




WKL-378

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温 :35°C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$WKL-378 - 0-80/11-1400-3 - zzp-2025071721p-j6-rcqx-1-pH1.2jz-jf50z-5min-P4.lcd
 方法文件名: RC\$WKL-378 - WKL-378-rcqx-fx260.lcm
 批处理文件名: RC\$WKL-378 - 20260207-rcqx-FX260.lcb
 样品瓶号 : 1-28
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2026/02/07 12:02:58 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V3) : 2026/02/09 11:34:21 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.364	184431	28388	100.000	3135	1.113	--
总计		184431	28388	100.000			

图10 辅酶Q10片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
 自制品-2025071721批-pH1.2介质-浆法-50转-5min-片4
 供试品溶液-1




WKL-378

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温 :35°C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$WKL-378 - 0-80/11-1401-3 - zzp-2025071721p-j6-rcqx-1-pH1.2jz-jf50z-5min-P5.lcd
 方法文件名: RC\$WKL-378 - WKL-378-rcqx-fx260.lcm
 批处理文件名: RC\$WKL-378 - 20260207-rcqx-FX260.lcb
 样品瓶号 : 1-37
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2026/02/07 12:07:21 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V3) : 2026/02/09 11:34:24 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.366	186660	28628	100.000	3128	1.112	--
总计		186660	28628	100.000			

图11 辅酶Q10片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
 自制品-2025071721批-pH1.2介质-浆法-50转-5min-片5
 供试品溶液-1




WKL-378

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温 :35°C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$WKL-378 - 0-80/11-1402-3 - zzp-2025071721p-j6-rcqx-1-pH1.2jz-jf50z-5min-P6.lcd
 方法文件名: RC\$WKL-378 - WKL-378-rcqx-fx260.lcm
 批处理文件名: RC\$WKL-378 - 20260207-rcqx-FX260.lcb
 样品瓶号 : 1-46
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2026/02/07 12:11:44 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V3) : 2026/02/09 11:34:27 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.364	181844	27917	100.000	3126	1.113	--
总计		181844	27917	100.000			

图12 辅酶Q10片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
 自制品-2025071721批-pH1.2介质-浆法-50转-5min-片6
 供试品溶液-1




WKL-378

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温 :35°C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$WKL-378 - 0-80/11-1403-3 - zzp-2025071721p-j6-rcqx-1-pH1.2jz-jf50z-10min-P1.lcd
 方法文件名: RC\$WKL-378 - WKL-378-rcqx-fx260.lcm
 批处理文件名: RC\$WKL-378 - 20260207-rcqx-FX260.lcb
 样品瓶号 : 1-2
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2026/02/07 12:16:07 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V3) : 2026/02/09 11:34:30 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.366	210920	32237	100.000	3116	1.115	--
总计		210920	32237	100.000			

图13 辅酶Q10片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
 自制品-2025071721批-pH1.2介质-浆法-50转-10min-片1
 供试品溶液-1




WKL-378

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温 :35°C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$WKL-378 - 0-80/11-1404-3 - zzp-2025071721p-j6-rcqx-1-pH1.2jz-jf50z-10min-P2.lcd
 方法文件名: RC\$WKL-378 - WKL-378-rcqx-fx260.lcm
 批处理文件名: RC\$WKL-378 - 20260207-rcqx-FX260.lcb
 样品瓶号 : 1-11
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2026/02/07 12:20:31 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V3) : 2026/02/09 11:34:32 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.363	215789	33082	100.000	3122	1.111	--
总计		215789	33082	100.000			

图14 辅酶Q10片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
 自制品-2025071721批-pH1.2介质-浆法-50转-10min-片2
 供试品溶液-1




WKL-378

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温 :35°C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$WKL-378 - 0-80/11-1405-3 - zzp-2025071721p-j6-rcqx-1-pH1.2jz-jf50z-10min-P3.lcd
 方法文件名: RC\$WKL-378 - WKL-378-rcqx-fx260.lcm
 批处理文件名: RC\$WKL-378 - 20260207-rcqx-FX260.lcb
 样品瓶号 : 1-20 版本号: 6.115
 进样体积 : 20 μl 实验者: xiechaojun
 进样时间 : 2026/02/07 12:24:53 处理者: xiechaojun
 处理时间 (V3) : 2026/02/09 11:34:35
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.366	213201	32607	100.000	3119	1.116	--
总计		213201	32607	100.000			

图15 辅酶Q10片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
 自制品-2025071721批-pH1.2介质-浆法-50转-10min-片3
 供试品溶液-1




WKL-378

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温 :35°C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$WKL-378 - 0-80/11-1406-3 - zzp-2025071721p-j6-rcqx-1-pH1.2jz-jf50z-10min-P4.lcd
 方法文件名: RC\$WKL-378 - WKL-378-rcqx-fx260.lcm
 批处理文件名: RC\$WKL-378 - 20260207-rcqx-FX260.lcb
 样品瓶号 : 1-29
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2026/02/07 12:29:17 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V3) : 2026/02/09 11:34:38 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.363	213492	32709	100.000	3115	1.113	--
总计		213492	32709	100.000			

图16 辅酶Q10片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
 自制品-2025071721批-pH1.2介质-浆法-50转-10min-片4
 供试品溶液-1




WKL-378

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温 :35°C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$WKL-378 - 0-80/11-1407-3 - zzp-2025071721p-j6-rcqx-1-pH1.2jz-jf50z-10min-P5.lcd
 方法文件名: RC\$WKL-378 - WKL-378-rcqx-fx260.lcm
 批处理文件名: RC\$WKL-378 - 20260207-rcqx-FX260.lcb
 样品瓶号 : 1-38
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2026/02/07 12:33:40 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V3) : 2026/02/09 11:34:41 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.366	213205	32652	100.000	3121	1.113	--
总计		213205	32652	100.000			

图17 辅酶Q10片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
 自制品-2025071721批-pH1.2介质-浆法-50转-10min-片5
 供试品溶液-1




WKL-378

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温 :35°C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$WKL-378 - 0-80/11-1408-3 - zzp-2025071721p-j6-rcqx-1-pH1.2jz-jf50z-10min-P6.lcd
 方法文件名: RC\$WKL-378 - WKL-378-rcqx-fx260.lcm
 批处理文件名: RC\$WKL-378 - 20260207-rcqx-FX260.lcb
 样品瓶号 : 1-47
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2026/02/07 12:38:01 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V3) : 2026/02/09 11:34:43 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.363	207801	31917	100.000	3122	1.113	--
总计		207801	31917	100.000			

图18 辅酶Q10片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
 自制品-2025071721批-pH1.2介质-桨法-50转-10min-片6
 供试品溶液-1




WKL-378

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温 :35°C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$WKL-378 - 0-80/11-1409-3 - zzp-2025071721p-j6-rcqx-1-pH1.2jz-jf50z-15min-P1.lcd
 方法文件名: RC\$WKL-378 - WKL-378-rcqx-fx260.lcm
 批处理文件名: RC\$WKL-378 - 20260207-rcqx-FX260.lcb
 样品瓶号 : 1-3
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2026/02/07 12:42:24 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V3) : 2026/02/09 11:34:46 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.364	223054	34100	100.000	3118	1.115	--
总计		223054	34100	100.000			

图19 辅酶Q10片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
 自制品-2025071721批-pH1.2介质-浆法-50转-15min-片1
 供试品溶液-1




WKL-378

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5µm) 流速: 1.5ml/min
 柱温 :35°C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$WKL-378 - 0-80/11-1410-3 - zzp-2025071721p-j6-rcqx-1-pH1.2jz-jf50z-15min-P2.lcd
 方法文件名: RC\$WKL-378 - WKL-378-rcqx-fx260.lcm
 批处理文件名: RC\$WKL-378 - 20260207-rcqx-FX260.lcb
 样品瓶号 : 1-12
 进样体积 : 20 µl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2026/02/07 12:46:48 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V3) : 2026/02/09 11:34:49 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.362	225971	34646	100.000	3115	1.113	--
总计		225971	34646	100.000			

图20 辅酶Q10片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
 自制品-2025071721批-pH1.2介质-桨法-50转-15min-片2
 供试品溶液-1




WKL-378

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温 :35°C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$WKL-378 - 0-80/11-1411-3 - zzp-2025071721p-j6-rcqx-1-pH1.2jz-jf50z-15min-P3.lcd
 方法文件名: RC\$WKL-378 - WKL-378-rcqx-fx260.lcm
 批处理文件名: RC\$WKL-378 - 20260207-rcqx-FX260.lcb
 样品瓶号 : 1-21
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2026/02/07 12:51:13 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V3) : 2026/02/09 11:34:52 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.364	224183	34337	100.000	3121	1.117	--
总计		224183	34337	100.000			

图21 辅酶Q10片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
 自制品-2025071721批-pH1.2介质-浆法-50转-15min-片3
 供试品溶液-1




WKL-378

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温 :35°C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$WKL-378 - 0-80/11-1412-3 - zzp-2025071721p-j6-rcqx-1-pH1.2jz-jf50z-15min-P4.lcd
 方法文件名: RC\$WKL-378 - WKL-378-rcqx-fx260.lcm
 批处理文件名: RC\$WKL-378 - 20260207-rcqx-FX260.lcb
 样品瓶号 : 1-30
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2026/02/07 12:55:36 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V3) : 2026/02/09 11:34:55 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.363	224149	34408	100.000	3117	1.113	--
总计		224149	34408	100.000			

图22 辅酶Q10片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
 自制品-2025071721批-pH1.2介质-桨法-50转-15min-片4
 供试品溶液-1




WKL-378

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温 :35°C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$WKL-378 - 0-80/11-1413-3 - zzp-2025071721p-j6-rcqx-1-pH1.2jz-jf50z-15min-P5.lcd
 方法文件名: RC\$WKL-378 - WKL-378-rcqx-fx260.lcm
 批处理文件名: RC\$WKL-378 - 20260207-rcqx-FX260.lcb
 样品瓶号 : 1-39
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2026/02/07 12:59:59 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V3) : 2026/02/09 11:34:58 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.364	224338	34302	100.000	3117	1.116	--
总计		224338	34302	100.000			

图23 辅酶Q10片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
 自制品-2025071721批-pH1.2介质-桨法-50转-15min-片5
 供试品溶液-1




WKL-378

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温 :35°C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$WKL-378 - 0-80/11-1414-3 - zzp-2025071721p-j6-rcqx-1-pH1.2jz-jf50z-15min-P6.lcd
 方法文件名: RC\$WKL-378 - WKL-378-rcqx-fx260.lcm
 批处理文件名: RC\$WKL-378 - 20260207-rcqx-FX260.lcb
 样品瓶号 : 1-48
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2026/02/07 13:04:21 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V3) : 2026/02/09 11:35:01 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.363	219459	33647	100.000	3122	1.114	--
总计		219459	33647	100.000			

图24 辅酶Q10片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
 自制品-2025071721批-pH1.2介质-桨法-50转-15min-片6
 供试品溶液-1




WKL-378

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温 :35°C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$WKL-378 - 0-80/11-1415-3 - zzp-2025071721p-j6-rcqx-1-pH1.2jz-jf50z-20min-P1.lcd
 方法文件名: RC\$WKL-378 - WKL-378-rcqx-fx260.lcm
 批处理文件名: RC\$WKL-378 - 20260207-rcqx-FX260.lcb
 样品瓶号 : 1-4
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2026/02/07 13:08:45 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V3) : 2026/02/09 11:35:03 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.364	225910	34665	100.000	3121	1.115	--
总计		225910	34665	100.000			

图25 辅酶Q10片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
 自制品-2025071721批-pH1.2介质-浆法-50转-20min-片1
 供试品溶液-1




WKL-378

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温 :35°C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$WKL-378 - 0-80/11-1416-3 - zzp-2025071721p-j6-rcqx-1-pH1.2jz-jf50z-20min-P2.lcd
 方法文件名: RC\$WKL-378 - WKL-378-rcqx-fx260.lcm
 批处理文件名: RC\$WKL-378 - 20260207-rcqx-FX260.lcb
 样品瓶号 : 1-13
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2026/02/07 13:13:10 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V3) : 2026/02/09 11:35:06 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.363	230234	35290	100.000	3118	1.115	--
总计		230234	35290	100.000			

图26 辅酶Q10片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
 自制品-2025071721批-pH1.2介质-浆法-50转-20min-片2
 供试品溶液-1




WKL-378

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温 :35°C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$WKL-378 - 0-80/11-1417-3 - zzp-2025071721p-j6-rcqx-1-pH1.2jz-jf50z-20min-P3.lcd
 方法文件名: RC\$WKL-378 - WKL-378-rcqx-fx260.lcm
 批处理文件名: RC\$WKL-378 - 20260207-rcqx-FX260.lcb
 样品瓶号 : 1-22
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2026/02/07 13:17:34 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V3) : 2026/02/09 11:35:09 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.364	227732	34945	100.000	3127	1.114	--
总计		227732	34945	100.000			

图27 辅酶Q10片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
 自制品-2025071721批-pH1.2介质-浆法-50转-20min-片3
 供试品溶液-1




WKL-378

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温 :35°C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$WKL-378 - 0-80/11-1418-3 - zzp-2025071721p-j6-rcqx-1-pH1.2jz-jf50z-20min-P4.lcd
 方法文件名: RC\$WKL-378 - WKL-378-rcqx-fx260.lcm
 批处理文件名: RC\$WKL-378 - 20260207-rcqx-FX260.lcb
 样品瓶号 : 1-31
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2026/02/07 13:21:56 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V3) : 2026/02/09 11:35:12 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.364	228847	35059	100.000	3117	1.113	--
总计		228847	35059	100.000			

图28 辅酶Q10片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
 自制品-2025071721批-pH1.2介质-桨法-50转-20min-片4
 供试品溶液-1




WKL-378

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温 :35°C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$WKL-378 - 0-80/11-1419-3 - zzp-2025071721p-j6-rcqx-1-pH1.2jz-jf50z-20min-P5.lcd
 方法文件名: RC\$WKL-378 - WKL-378-rcqx-fx260.lcm
 批处理文件名: RC\$WKL-378 - 20260207-rcqx-FX260.lcb
 样品瓶号 : 1-40
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2026/02/07 13:26:19 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V3) : 2026/02/09 11:35:15 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.363	226815	34785	100.000	3121	1.113	--
总计		226815	34785	100.000			

图29 辅酶Q10片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
 自制品-2025071721批-pH1.2介质-浆法-50转-20min-片5
 供试品溶液-1




WKL-378

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温 :35°C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$WKL-378 - 0-80/11-1420-3 - zzp-2025071721p-j6-rcqx-1-pH1.2jz-jf50z-20min-P6.lcd
 方法文件名: RC\$WKL-378 - WKL-378-rcqx-fx260.lcm
 批处理文件名: RC\$WKL-378 - 20260207-rcqx-FX260.lcb
 样品瓶号 : 1-49
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2026/02/07 13:30:43 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V3) : 2026/02/09 11:35:18 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.364	224891	34389	100.000	3121	1.115	--
总计		224891	34389	100.000			

图30 辅酶Q10片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
 自制品-2025071721批-pH1.2介质-浆法-50转-20min-片6
 供试品溶液-1




WKL-378

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温 :35°C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$WKL-378 - 0-80/11-1421-3 - zzp-2025071721p-j6-rcqx-1-pH1.2jz-jf50z-30min-P1.lcd
 方法文件名: RC\$WKL-378 - WKL-378-rcqx-fx260.lcm
 批处理文件名: RC\$WKL-378 - 20260207-rcqx-FX260.lcb
 样品瓶号 : 1-5
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2026/02/07 13:35:06 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V3) : 2026/02/09 11:35:20 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.363	232499	35595	100.000	3112	1.110	--
总计		232499	35595	100.000			

图31 辅酶Q10片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
 自制品-2025071721批-pH1.2介质-桨法-50转-30min-片1
 供试品溶液-1




WKL-378

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温 :35°C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$WKL-378 - 0-80/11-1422-3 - zzp-2025071721p-j6-rcqx-1-pH1.2jz-jf50z-30min-P2.lcd
 方法文件名: RC\$WKL-378 - WKL-378-rcqx-fx260.lcm
 批处理文件名: RC\$WKL-378 - 20260207-rcqx-FX260.lcb
 样品瓶号 : 1-14
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2026/02/07 13:39:30 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V3) : 2026/02/09 11:35:23 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.363	233773	35644	100.000	3111	1.115	--
总计		233773	35644	100.000			

图32 辅酶Q10片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
 自制品-2025071721批-pH1.2介质-浆法-50转-30min-片2
 供试品溶液-1




WKL-378

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温 :35°C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$WKL-378 - 0-80/11-1423-3 - zzp-2025071721p-j6-rcqx-1-pH1.2jz-jf50z-30min-P3.lcd
 方法文件名: RC\$WKL-378 - WKL-378-rcqx-fx260.lcm
 批处理文件名: RC\$WKL-378 - 20260207-rcqx-FX260.lcb
 样品瓶号 : 1-23
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2026/02/07 13:43:53 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V3) : 2026/02/09 11:35:26 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.364	230140	35382	100.000	3129	1.113	--
总计		230140	35382	100.000			

图33 辅酶Q10片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
 自制品-2025071721批-pH1.2介质-桨法-50转-30min-片3
 供试品溶液-1




WKL-378

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温 :35°C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$WKL-378 - 0-80/11-1424-3 - zzp-2025071721p-j6-rcqx-1-pH1.2jz-jf50z-30min-P4.lcd
 方法文件名: RC\$WKL-378 - WKL-378-rcqx-fx260.lcm
 批处理文件名: RC\$WKL-378 - 20260207-rcqx-FX260.lcb
 样品瓶号 : 1-32
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2026/02/07 13:48:16 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V3) : 2026/02/09 11:35:29 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.365	231467	35467	100.000	3123	1.113	--
总计		231467	35467	100.000			

图34 辅酶Q10片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
 自制品-2025071721批-pH1.2介质-浆法-50转-30min-片4
 供试品溶液-1




WKL-378

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温 :35°C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$WKL-378 - 0-80/11-1425-3 - zzp-2025071721p-j6-rcqx-1-pH1.2jz-jf50z-30min-P5.lcd
 方法文件名: RC\$WKL-378 - WKL-378-rcqx-fx260.lcm
 批处理文件名: RC\$WKL-378 - 20260207-rcqx-FX260.lcb
 样品瓶号 : 1-41
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2026/02/07 13:52:38 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V3) : 2026/02/09 11:35:31 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.363	230295	35270	100.000	3120	1.114	--
总计		230295	35270	100.000			

图35 辅酶Q10片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
 自制品-2025071721批-pH1.2介质-浆法-50转-30min-片5
 供试品溶液-1




WKL-378

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温 :35°C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$WKL-378 - 0-80/11-1426-3 - zzp-2025071721p-j6-rcqx-1-pH1.2jz-jf50z-30min-P6.lcd
 方法文件名: RC\$WKL-378 - WKL-378-rcqx-fx260.lcm
 批处理文件名: RC\$WKL-378 - 20260207-rcqx-FX260.lcb
 样品瓶号 : 1-50
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2026/02/07 13:57:01 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V3) : 2026/02/09 11:35:34 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.365	228243	34989	100.000	3127	1.114	--
总计		228243	34989	100.000			

图36 辅酶Q10片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
 自制品-2025071721批-pH1.2介质-桨法-50转-30min-片6
 供试品溶液-1




WKL-378

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温 :35°C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$WKL-378 - 0-80/11-1427-3 - zzp-2025071721p-j6-rcqx-1-pH1.2jz-jf50z-45min-P1.lcd
 方法文件名: RC\$WKL-378 - WKL-378-rcqx-fx260.lcm
 批处理文件名: RC\$WKL-378 - 20260207-rcqx-FX260.lcb
 样品瓶号 : 1-6
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2026/02/07 14:01:24 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V3) : 2026/02/09 11:35:37 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.363	230701	35394	100.000	3120	1.115	--
总计		230701	35394	100.000			

图37 辅酶Q10片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
 自制品-2025071721批-pH1.2介质-桨法-50转-45min-片1
 供试品溶液-1




WKL-378

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温 :35°C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$WKL-378 - 0-80/11-1428-3 - zzp-2025071721p-j6-rcqx-1-pH1.2jz-jf50z-45min-P2.lcd
 方法文件名: RC\$WKL-378 - WKL-378-rcqx-fx260.lcm
 批处理文件名: RC\$WKL-378 - 20260207-rcqx-FX260.lcb
 样品瓶号 : 1-15
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2026/02/07 14:05:47 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V3) : 2026/02/09 11:35:40 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.365	232708	35751	100.000	3125	1.115	--
总计		232708	35751	100.000			

图38 辅酶Q10片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
 自制品-2025071721批-pH1.2介质-桨法-50转-45min-片2
 供试品溶液-1




WKL-378

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温 :35°C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$WKL-378 - 0-80/11-1429-3 - zzp-2025071721p-j6-rcqx-1-pH1.2jz-jf50z-45min-P3.lcd
 方法文件名: RC\$WKL-378 - WKL-378-rcqx-fx260.lcm
 批处理文件名: RC\$WKL-378 - 20260207-rcqx-FX260.lcb
 样品瓶号 : 1-24
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2026/02/07 14:10:10 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V3) : 2026/02/09 11:35:42 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.363	230655	35405	100.000	3125	1.113	--
总计		230655	35405	100.000			

图39 辅酶Q10片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
 自制品-2025071721批-pH1.2介质-浆法-50转-45min-片3
 供试品溶液-1




WKL-378

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温 :35°C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$WKL-378 - 0-80/11-1430-3 - zzp-2025071721p-j6-rcqx-1-pH1.2jz-jf50z-45min-P4.lcd
 方法文件名: RC\$WKL-378 - WKL-378-rcqx-fx260.lcm
 批处理文件名: RC\$WKL-378 - 20260207-rcqx-FX260.lcb
 样品瓶号 : 1-33
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2026/02/07 14:14:34 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V3) : 2026/02/09 11:35:45 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.365	232296	35616	100.000	3121	1.116	--
总计		232296	35616	100.000			

图40 辅酶Q10片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
 自制品-2025071721批-pH1.2介质-浆法-50转-45min-片4
 供试品溶液-1




WKL-378

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温 :35°C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$WKL-378 - 0-80/11-1431-3 - zzp-2025071721p-j6-rcqx-1-pH1.2jz-jf50z-45min-P5.lcd
 方法文件名: RC\$WKL-378 - WKL-378-rcqx-fx260.lcm
 批处理文件名: RC\$WKL-378 - 20260207-rcqx-FX260.lcb
 样品瓶号 : 1-42
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2026/02/07 14:18:57 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V3) : 2026/02/09 11:35:48 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.363	231089	35453	100.000	3117	1.113	--
总计		231089	35453	100.000			

图41 辅酶Q10片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
 自制品-2025071721批-pH1.2介质-桨法-50转-45min-片5
 供试品溶液-1




WKL-378

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温 :35°C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$WKL-378 - 0-80/11-1432-3 - zzp-2025071721p-j6-rcqx-1-pH1.2jz-jf50z-45min-P6.lcd
 方法文件名: RC\$WKL-378 - WKL-378-rcqx-fx260.lcm
 批处理文件名: RC\$WKL-378 - 20260207-rcqx-FX260.lcb
 样品瓶号 : 1-51
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2026/02/07 14:23:20 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V3) : 2026/02/09 11:35:51 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.365	229755	35236	100.000	3122	1.113	--
总计		229755	35236	100.000			

图42 辅酶Q10片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
 自制品-2025071721批-pH1.2介质-桨法-50转-45min-片6
 供试品溶液-1




WKL-378

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温 :35°C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$WKL-378 - 0-80/11-1433-3 - zzp-2025071721p-j6-rcqx-1-pH1.2jz-jf50z-60min-P1.lcd
 方法文件名: RC\$WKL-378 - WKL-378-rcqx-fx260.lcm
 批处理文件名: RC\$WKL-378 - 20260207-rcqx-FX260.lcb
 样品瓶号 : 1-7
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2026/02/07 14:27:42 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V3) : 2026/02/09 11:35:54 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.363	231371	35587	100.000	3124	1.113	--
总计		231371	35587	100.000			

图43 辅酶Q10片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
 自制品-2025071721批-pH1.2介质-桨法-50转-60min-片1
 供试品溶液-1




WKL-378

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温 :35°C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$WKL-378 - 0-80/11-1434-3 - zzp-2025071721p-j6-rcqx-1-pH1.2jz-jf50z-60min-P2.lcd
 方法文件名: RC\$WKL-378 - WKL-378-rcqx-fx260.lcm
 批处理文件名: RC\$WKL-378 - 20260207-rcqx-FX260.lcb
 样品瓶号 : 1-16
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2026/02/07 14:32:06 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V3) : 2026/02/09 11:35:56 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.364	234434	35918	100.000	3122	1.115	--
总计		234434	35918	100.000			

图44 辅酶Q10片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
 自制品-2025071721批-pH1.2介质-桨法-50转-60min-片2
 供试品溶液-1




WKL-378

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温 :35°C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$WKL-378 - 0-80/11-1435-3 - zzp-2025071721p-j6-rcqx-1-pH1.2jz-jf50z-60min-P3.lcd
 方法文件名: RC\$WKL-378 - WKL-378-rcqx-fx260.lcm
 批处理文件名: RC\$WKL-378 - 20260207-rcqx-FX260.lcb
 样品瓶号 : 1-25
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2026/02/07 14:36:28 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V3) : 2026/02/09 11:35:59 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.363	231742	35601	100.000	3130	1.112	--
总计		231742	35601	100.000			

图45 辅酶Q10片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
 自制品-2025071721批-pH1.2介质-浆法-50转-60min-片3
 供试品溶液-1




WKL-378

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温 :35°C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$WKL-378 - 0-80/11-1436-3 - zzp-2025071721p-j6-rcqx-1-pH1.2jz-jf50z-60min-P4.lcd
 方法文件名: RC\$WKL-378 - WKL-378-rcqx-fx260.lcm
 批处理文件名: RC\$WKL-378 - 20260207-rcqx-FX260.lcb
 样品瓶号 : 1-34
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2026/02/07 14:40:50 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V3) : 2026/02/09 11:36:02 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.364	232791	35738	100.000	3124	1.114	--
总计		232791	35738	100.000			

图46 辅酶Q10片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
 自制品-2025071721批-pH1.2介质-浆法-50转-60min-片4
 供试品溶液-1




WKL-378

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温 :35°C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$WKL-378 - 0-80/11-1437-3 - zzp-2025071721p-j6-rcqx-1-pH1.2jz-jf50z-60min-P5.lcd
 方法文件名: RC\$WKL-378 - WKL-378-rcqx-fx260.lcm
 批处理文件名: RC\$WKL-378 - 20260207-rcqx-FX260.lcb
 样品瓶号 : 1-43
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2026/02/07 14:45:13 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V3) : 2026/02/09 11:36:05 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.363	230408	35445	100.000	3126	1.111	--
总计		230408	35445	100.000			

图47 辅酶Q10片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
 自制品-2025071721批-pH1.2介质-桨法-50转-60min-片5
 供试品溶液-1




WKL-378

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温 :35°C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$WKL-378 - 0-80/11-1438-3 - zzp-2025071721p-j6-rcqx-1-pH1.2jz-jf50z-60min-P6.lcd
 方法文件名: RC\$WKL-378 - WKL-378-rcqx-fx260.lcm
 批处理文件名: RC\$WKL-378 - 20260207-rcqx-FX260.lcb
 样品瓶号 : 1-52
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2026/02/07 14:49:36 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V3) : 2026/02/09 11:36:07 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.364	231738	35452	100.000	3121	1.114	--
总计		231738	35452	100.000			

图48 辅酶Q10片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
 自制品-2025071721批-pH1.2介质-浆法-50转-60min-片6
 供试品溶液-1




WKL-378

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温 :35°C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$WKL-378 - 0-80/11-1439-3 - zzp-2025071721p-j6-rcqx-1-pH1.2jz-jf50z-jxzs-P1.lcd
 方法文件名: RC\$WKL-378 - WKL-378-rcqx-fx260.lcm
 批处理文件名: RC\$WKL-378 - 20260207-rcqx-FX260.lcb
 样品瓶号 : 1-8
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2026/02/07 14:53:59 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V3) : 2026/02/09 11:36:10 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.362	258152	39553	100.000	3117	1.115	--
总计		258152	39553	100.000			

图49 辅酶Q10片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
 自制品-2025071721批-pH1.2介质-桨法-50转-极限转速-片1
 供试品溶液-1




WKL-378

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温 :35°C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$WKL-378 - 0-80/11-1440-3 - zzp-2025071721p-j6-rcqx-1-pH1.2jz-jf50z-jxzs-P2.lcd
 方法文件名: RC\$WKL-378 - WKL-378-rcqx-fx260.lcm
 批处理文件名: RC\$WKL-378 - 20260207-rcqx-FX260.lcb
 样品瓶号 : 1-17
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2026/02/07 14:58:23 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V3) : 2026/02/09 11:36:13 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.363	261954	40091	100.000	3111	1.114	--
总计		261954	40091	100.000			

图50 辅酶Q10片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
 自制品-2025071721批-pH1.2介质-桨法-50转-极限转速-片2
 供试品溶液-1




WKL-378

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温 :35°C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$WKL-378 - 0-80/11-1441-3 - zzp-2025071721p-j6-rcqx-1-pH1.2jz-jf50z-jxzs-P3.lcd
 方法文件名: RC\$WKL-378 - WKL-378-rcqx-fx260.lcm
 批处理文件名: RC\$WKL-378 - 20260207-rcqx-FX260.lcb
 样品瓶号 : 1-26
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2026/02/07 15:02:48 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V3) : 2026/02/09 11:36:16 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.363	255748	39201	100.000	3121	1.116	--
总计		255748	39201	100.000			

图51 辅酶Q10片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
 自制品-2025071721批-pH1.2介质-桨法-50转-极限转速-片3
 供试品溶液-1




WKL-378

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温 :35°C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$WKL-378 - 0-80/11-1442-3 - zzp-2025071721p-j6-rcqx-1-pH1.2jz-jf50z-jxzs-P4.lcd
 方法文件名: RC\$WKL-378 - WKL-378-rcqx-fx260.lcm
 批处理文件名: RC\$WKL-378 - 20260207-rcqx-FX260.lcb
 样品瓶号 : 1-35
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2026/02/07 15:07:11 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V3) : 2026/02/09 11:36:19 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.364	256394	39303	100.000	3120	1.115	--
总计		256394	39303	100.000			

图52 辅酶Q10片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
 自制品-2025071721批-pH1.2介质-桨法-50转-极限转速-片4
 供试品溶液-1




WKL-378

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温 :35°C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$WKL-378 - 0-80/11-1443-3 - zzp-2025071721p-j6-rcqx-1-pH1.2jz-jf50z-jxzs-P5.lcd
 方法文件名: RC\$WKL-378 - WKL-378-rcqx-fx260.lcm
 批处理文件名: RC\$WKL-378 - 20260207-rcqx-FX260.lcb
 样品瓶号 : 1-44
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2026/02/07 15:11:37 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V3) : 2026/02/09 11:36:22 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.363	254716	39001	100.000	3119	1.115	--
总计		254716	39001	100.000			

图53 辅酶Q10片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
 自制品-2025071721批-pH1.2介质-桨法-50转-极限转速-片5
 供试品溶液-1




WKL-378

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温 :35°C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$WKL-378 - 0-80/11-1444-3 - zzp-2025071721p-j6-rcqx-1-pH1.2jz-jf50z-jxzs-P6.lcd
 方法文件名: RC\$WKL-378 - WKL-378-rcqx-fx260.lcm
 批处理文件名: RC\$WKL-378 - 20260207-rcqx-FX260.lcb
 样品瓶号 : 1-53
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2026/02/07 15:19:18 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V3) : 2026/02/09 11:36:25 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.363	263076	40364	100.000	3118	1.113	--
总计		263076	40364	100.000			

图54 辅酶Q10片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
 自制品-2025071721批-pH1.2介质-桨法-50转-极限转速-片6
 供试品溶液-1




WKL-378

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温 :35°C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$WKL-378 - 0-80/11-1445-3 - zzp-2025071721p-j6-rcqx-1-pH1.2jz-jf50z-dz2-1.lcd
 方法文件名: RC\$WKL-378 - WKL-378-rcqx-fx260.lcm
 批处理文件名: RC\$WKL-378 - 20260207-rcqx-FX260.lcb
 样品瓶号 : 1-27
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2026/02/07 15:23:42 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V3) : 2026/02/09 11:36:28 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.340	272244	40554	100.000	2894	1.120	--
总计		272244	40554	100.000			

图55 辅酶Q10片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
 自制品-2025071721批-pH1.2介质-桨法-50转
 对照品溶液-2-1




WKL-378

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温 :35°C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$WKL-378 - 0-80/11-1446-3 - zzp-2025071721p-j6-rcqx-1-pH1.2jz-jf50z-dz2-2.lcd
 方法文件名: RC\$WKL-378 - WKL-378-rcqx-fx260.lcm
 批处理文件名: RC\$WKL-378 - 20260207-rcqx-FX260.lcb
 样品瓶号 : 1-27
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2026/02/07 15:28:07 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V3) : 2026/02/09 11:36:30 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.341	272692	40576	100.000	2891	1.119	--
总计		272692	40576	100.000			

图56 辅酶Q10片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
 自制品-2025071721批-pH1.2介质-桨法-50转
 对照品溶液-2-2




WKL-378

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温 :35°C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$WKL-378 - 0-80/11-1447-3 - zzp-2025071721p-j6-rcqx-2-pH1.2jz-jf50z-rj.lcd
 方法文件名: RC\$WKL-378 - WKL-378-rcqx-fx260.lcm
 批处理文件名: RC\$WKL-378 - 20260207-rcqx-FX260.lcb
 样品瓶号 : 2-9
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2026/02/07 15:32:32 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V3) : 2026/02/09 11:36:33 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图57 辅酶Q10片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
 自制品-2025071721批-pH1.2介质-桨法-50转
 溶剂




WKL-378

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温 :35°C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$WKL-378 - 0-80/11-1448-3 - zzp-2025071721p-j6-rcqx-2-pH1.2jz-jf50z-dz1-1.lcd
 方法文件名: RC\$WKL-378 - WKL-378-rcqx-fx260.lcm
 批处理文件名: RC\$WKL-378 - 20260207-rcqx-FX260.lcb
 样品瓶号 : 2-18 版本号: 6.115
 进样体积 : 20 μl 实验者: xiechaojun
 进样时间 : 2026/02/07 15:36:57 处理者: xiechaojun
 处理时间 (V3) : 2026/02/09 11:36:36
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.341	271558	40434	100.000	2897	1.122	--
总计		271558	40434	100.000			

图58 辅酶Q10片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
 自制品-2025071721批-pH1.2介质-桨法-50转
 对照品溶液-1-1




WKL-378

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温 :35°C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$WKL-378 - 0-80/11-1449-3 - zzp-2025071721p-j6-rcqx-2-pH1.2jz-jf50z-dz1-2.lcd
 方法文件名: RC\$WKL-378 - WKL-378-rcqx-fx260.lcm
 批处理文件名: RC\$WKL-378 - 20260207-rcqx-FX260.lcb
 样品瓶号 : 2-18
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2026/02/07 15:41:22 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V3) : 2026/02/09 11:36:39 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.340	271444	40490	100.000	2896	1.119	--
总计		271444	40490	100.000			

图59 辅酶Q10片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
 自制品-2025071721批-pH1.2介质-桨法-50转
 对照品溶液-1-2




WKL-378

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温 :35°C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$WKL-378 - 0-80/11-1450-3 - zzp-2025071721p-j6-rcqx-2-pH1.2jz-jf50z-dz1-3.lcd
 方法文件名: RC\$WKL-378 - WKL-378-rcqx-fx260.lcm
 批处理文件名: RC\$WKL-378 - 20260207-rcqx-FX260.lcb
 样品瓶号 : 2-18
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2026/02/07 15:45:46 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V3) : 2026/02/09 11:36:42 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.342	272254	40405	100.000	2899	1.119	--
总计		272254	40405	100.000			

图60 辅酶Q10片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
 自制品-2025071721批-pH1.2介质-桨法-50转
 对照品溶液-1-3




WKL-378

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温 :35°C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$WKL-378 - 0-80/11-1451-3 - zzp-2025071721p-j6-rcqx-2-pH1.2jz-jf50z-dz1-4.lcd
 方法文件名: RC\$WKL-378 - WKL-378-rcqx-fx260.lcm
 批处理文件名: RC\$WKL-378 - 20260207-rcqx-FX260.lcb
 样品瓶号 : 2-18
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2026/02/07 15:50:11 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V3) : 2026/02/09 11:36:44 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.341	271299	40508	100.000	2904	1.121	--
总计		271299	40508	100.000			

图61 辅酶Q10片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
 自制品-2025071721批-pH1.2介质-桨法-50转
 对照品溶液-1-4




WKL-378

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温 :35°C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$WKL-378 - 0-80/11-1452-3 - zzp-2025071721p-j6-rcqx-2-pH1.2jz-jf50z-dz1-5.lcd
 方法文件名: RC\$WKL-378 - WKL-378-rcqx-fx260.lcm
 批处理文件名: RC\$WKL-378 - 20260207-rcqx-FX260.lcb
 样品瓶号 : 2-18
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2026/02/07 15:54:35 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V3) : 2026/02/09 11:36:47 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.343	271276	40486	100.000	2911	1.119	--
总计		271276	40486	100.000			

图62 辅酶Q10片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
 自制品-2025071721批-pH1.2介质-桨法-50转
 对照品溶液-1-5




WKL-378

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温 :35°C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$WKL-378 - 0-80/11-1453-3 - zzp-2025071721p-j6-rcqx-2-pH1.2jz-jf50z-5min-P1.lcd
 方法文件名: RC\$WKL-378 - WKL-378-rcqx-fx260.lcm
 批处理文件名: RC\$WKL-378 - 20260207-rcqx-FX260.lcb
 样品瓶号 : 2-1
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2026/02/07 15:59:01 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V3) : 2026/02/09 11:36:50 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.357	188634	28948	100.000	3125	1.114	--
总计		188634	28948	100.000			

图63 辅酶Q10片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
 自制品-2025071721批-pH1.2介质-浆法-50转-5min-片1
 供试品溶液-1




WKL-378

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温 :35°C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$WKL-378 - 0-80/11-1454-3 - zzp-2025071721p-j6-rcqx-2-pH1.2jz-jf50z-5min-P2.lcd
 方法文件名: RC\$WKL-378 - WKL-378-rcqx-fx260.lcm
 批处理文件名: RC\$WKL-378 - 20260207-rcqx-FX260.lcb
 样品瓶号 : 2-10
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2026/02/07 16:03:25 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V3) : 2026/02/09 11:36:52 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.359	188089	28806	100.000	3127	1.114	--
总计		188089	28806	100.000			

图64 辅酶Q10片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
 自制品-2025071721批-pH1.2介质-浆法-50转-5min-片2
 供试品溶液-1




WKL-378

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温 :35°C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$WKL-378 - 0-80/11-1455-3 - zzp-2025071721p-j6-rcqx-2-pH1.2jz-jf50z-5min-P3.lcd
 方法文件名: RC\$WKL-378 - WKL-378-rcqx-fx260.lcm
 批处理文件名: RC\$WKL-378 - 20260207-rcqx-FX260.lcb
 样品瓶号 : 2-19
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2026/02/07 16:07:49 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V3) : 2026/02/09 11:36:55 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.357	190386	29275	100.000	3120	1.111	--
总计		190386	29275	100.000			

图65 辅酶Q10片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
 自制品-2025071721批-pH1.2介质-浆法-50转-5min-片3
 供试品溶液-1




WKL-378

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温 :35°C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$WKL-378 - 0-80/11-1456-3 - zzp-2025071721p-j6-rcqx-2-pH1.2jz-jf50z-5min-P4.lcd
 方法文件名: RC\$WKL-378 - WKL-378-rcqx-fx260.lcm
 批处理文件名: RC\$WKL-378 - 20260207-rcqx-FX260.lcb
 样品瓶号 : 2-28
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2026/02/07 16:12:14 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V3) : 2026/02/09 11:36:58 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.358	190488	29253	100.000	3130	1.113	--
总计		190488	29253	100.000			

图66 辅酶Q10片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
 自制品-2025071721批-pH1.2介质-浆法-50转-5min-片4
 供试品溶液-1




WKL-378

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温 :35°C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$WKL-378 - 0-80/11-1457-3 - zzp-2025071721p-j6-rcqx-2-pH1.2jz-jf50z-5min-P5.lcd
 方法文件名: RC\$WKL-378 - WKL-378-rcqx-fx260.lcm
 批处理文件名: RC\$WKL-378 - 20260207-rcqx-FX260.lcb
 样品瓶号 : 2-37
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2026/02/07 16:16:39 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V3) : 2026/02/09 11:37:01 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.357	194491	29923	100.000	3123	1.112	--
总计		194491	29923	100.000			

图67 辅酶Q10片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
 自制品-2025071721批-pH1.2介质-浆法-50转-5min-片5
 供试品溶液-1




WKL-378

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温 :35°C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$WKL-378 - 0-80/11-1458-3 - zzp-2025071721p-j6-rcqx-2-pH1.2jz-jf50z-5min-P6.lcd
 方法文件名: RC\$WKL-378 - WKL-378-rcqx-fx260.lcm
 批处理文件名: RC\$WKL-378 - 20260207-rcqx-FX260.lcb
 样品瓶号 : 2-46
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2026/02/07 16:21:03 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V3) : 2026/02/09 11:37:03 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.358	185940	28586	100.000	3122	1.114	--
总计		185940	28586	100.000			

图68 辅酶Q10片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
 自制品-2025071721批-pH1.2介质-浆法-50转-5min-片6
 供试品溶液-1




WKL-378

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温 :35°C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$WKL-378 - 0-80/11-1459-3 - zzp-2025071721p-j6-rcqx-2-pH1.2jz-jf50z-10min-P1.lcd
 方法文件名: RC\$WKL-378 - WKL-378-rcqx-fx260.lcm
 批处理文件名: RC\$WKL-378 - 20260207-rcqx-FX260.lcb
 样品瓶号 : 2-2
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2026/02/07 16:25:28 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V3) : 2026/02/09 11:37:06 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.356	217071	33331	100.000	3105	1.116	--
总计		217071	33331	100.000			

图69 辅酶Q10片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
 自制品-2025071721批-pH1.2介质-浆法-50转-10min-片1
 供试品溶液-1




WKL-378

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温 :35°C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$WKL-378 - 0-80/11-1460-2 - zzp-2025071721p-j6-rcqx-2-pH1.2jz-jf50z-10min-P2.lcd
 方法文件名: RC\$WKL-378 - WKL-378-rcqx-fx260.lcm
 批处理文件名: RC\$WKL-378 - 20260207-rcqx-FX260.lcb
 样品瓶号 : 2-11
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2026/02/07 16:29:51 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2) : 2026/02/09 11:37:09 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.357	216277	33226	100.000	3116	1.115	--
总计		216277	33226	100.000			

图70 辅酶Q10片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
 自制品-2025071721批-pH1.2介质-浆法-50转-10min-片2
 供试品溶液-1




WKL-378

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温 :35°C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$WKL-378 - 0-80/11-1461-2 - zzp-2025071721p-j6-rcqx-2-pH1.2jz-jf50z-10min-P3.lcd
 方法文件名: RC\$WKL-378 - WKL-378-rcqx-fx260.lcm
 批处理文件名: RC\$WKL-378 - 20260207-rcqx-FX260.lcb
 样品瓶号 : 2-20 版本号: 6.115
 进样体积 : 20 μl 实验者: xiechaojun
 进样时间 : 2026/02/07 16:34:16 处理者: xiechaojun
 处理时间 (V2) : 2026/02/09 11:37:12
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.357	213820	32809	100.000	3112	1.117	--
总计		213820	32809	100.000			

图71 辅酶Q10片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
 自制品-2025071721批-pH1.2介质-桨法-50转-10min-片3
 供试品溶液-1




WKL-378

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温 :35°C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$WKL-378 - 0-80/11-1462-2 - zzp-2025071721p-j6-rcqx-2-pH1.2jz-jf50z-10min-P4.lcd
 方法文件名: RC\$WKL-378 - WKL-378-rcqx-fx260.lcm
 批处理文件名: RC\$WKL-378 - 20260207-rcqx-FX260.lcb
 样品瓶号 : 2-29
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2026/02/07 16:38:39 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2) : 2026/02/09 11:37:15 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.356	218252	33513	100.000	3111	1.117	--
总计		218252	33513	100.000			

图72 辅酶Q10片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
 自制品-2025071721批-pH1.2介质-浆法-50转-10min-片4
 供试品溶液-1




WKL-378

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温 :35°C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$WKL-378 - 0-80/11-1463-2 - zzp-2025071721p-j6-rcqx-2-pH1.2jz-jf50z-10min-P5.lcd
 方法文件名: RC\$WKL-378 - WKL-378-rcqx-fx260.lcm
 批处理文件名: RC\$WKL-378 - 20260207-rcqx-FX260.lcb
 样品瓶号 : 2-38
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2026/02/07 16:43:04 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2) : 2026/02/09 11:37:18 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.357	218966	33579	100.000	3109	1.117	--
总计		218966	33579	100.000			

图73 辅酶Q10片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
 自制品-2025071721批-pH1.2介质-桨法-50转-10min-片5
 供试品溶液-1




WKL-378

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温 :35°C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$WKL-378 - 0-80/11-1464-2 - zzp-2025071721p-j6-rcqx-2-pH1.2jz-jf50z-10min-P6.lcd
 方法文件名: RC\$WKL-378 - WKL-378-rcqx-fx260.lcm
 批处理文件名: RC\$WKL-378 - 20260207-rcqx-FX260.lcb
 样品瓶号 : 2-47
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2026/02/07 16:47:29 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2) : 2026/02/09 11:37:20 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.356	206078	31656	100.000	3110	1.114	--
总计		206078	31656	100.000			

图74 辅酶Q10片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
 自制品-2025071721批-pH1.2介质-桨法-50转-10min-片6
 供试品溶液-1




WKL-378

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温 :35°C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$WKL-378 - 0-80/11-1465-2 - zzp-2025071721p-j6-rcqx-2-pH1.2jz-jf50z-15min-P1.lcd
 方法文件名: RC\$WKL-378 - WKL-378-rcqx-fx260.lcm
 批处理文件名: RC\$WKL-378 - 20260207-rcqx-FX260.lcb
 样品瓶号 : 2-3
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2026/02/07 16:51:54 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2) : 2026/02/09 11:37:23 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.357	226678	34747	100.000	3111	1.114	--
总计		226678	34747	100.000			

图75 辅酶Q10片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
 自制品-2025071721批-pH1.2介质-桨法-50转-15min-片1
 供试品溶液-1




WKL-378

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温 :35°C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$WKL-378 - 0-80/11-1466-2 - zzp-2025071721p-j6-rcqx-2-pH1.2jz-jf50z-15min-P2.lcd
 方法文件名: RC\$WKL-378 - WKL-378-rcqx-fx260.lcm
 批处理文件名: RC\$WKL-378 - 20260207-rcqx-FX260.lcb
 样品瓶号 : 2-12
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2026/02/07 16:56:19 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2) : 2026/02/09 11:37:26 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.356	228023	34880	100.000	3106	1.119	--
总计		228023	34880	100.000			

图76 辅酶Q10片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
 自制品-2025071721批-pH1.2介质-浆法-50转-15min-片2
 供试品溶液-1




WKL-378

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温 :35°C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$WKL-378 - 0-80/11-1467-2 - zzp-2025071721p-j6-rcqx-2-pH1.2jz-jf50z-15min-P3.lcd
 方法文件名: RC\$WKL-378 - WKL-378-rcqx-fx260.lcm
 批处理文件名: RC\$WKL-378 - 20260207-rcqx-FX260.lcb
 样品瓶号 : 2-21
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2026/02/07 17:00:42 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2) : 2026/02/09 11:37:29 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.357	223416	34189	100.000	3108	1.117	--
总计		223416	34189	100.000			

图77 辅酶Q10片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
 自制品-2025071721批-pH1.2介质-桨法-50转-15min-片3
 供试品溶液-1




WKL-378

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温 :35°C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$WKL-378 - 0-80/11-1468-2 - zzp-2025071721p-j6-rcqx-2-pH1.2jz-jf50z-15min-P4.lcd
 方法文件名: RC\$WKL-378 - WKL-378-rcqx-fx260.lcm
 批处理文件名: RC\$WKL-378 - 20260207-rcqx-FX260.lcb
 样品瓶号 : 2-30
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2026/02/07 17:05:08 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2) : 2026/02/09 11:37:32 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.355	228527	35028	100.000	3104	1.117	--
总计		228527	35028	100.000			

图78 辅酶Q10片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
 自制品-2025071721批-pH1.2介质-桨法-50转-15min-片4
 供试品溶液-1




WKL-378

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温 :35°C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$WKL-378 - 0-80/11-1469-2 - zzp-2025071721p-j6-rcqx-2-pH1.2jz-jf50z-15min-P5.lcd
 方法文件名: RC\$WKL-378 - WKL-378-rcqx-fx260.lcm
 批处理文件名: RC\$WKL-378 - 20260207-rcqx-FX260.lcb
 样品瓶号 : 2-39
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2026/02/07 17:09:32 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2) : 2026/02/09 11:37:34 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.357	228482	35025	100.000	3105	1.115	--
总计		228482	35025	100.000			

图79 辅酶Q10片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
 自制品-2025071721批-pH1.2介质-桨法-50转-15min-片5
 供试品溶液-1




WKL-378

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5µm) 流速: 1.5ml/min
 柱温 :35°C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$WKL-378 - 0-80/11-1470-2 - zzp-2025071721p-j6-rcqx-2-pH1.2jz-jf50z-15min-P6.lcd
 方法文件名: RC\$WKL-378 - WKL-378-rcqx-fx260.lcm
 批处理文件名: RC\$WKL-378 - 20260207-rcqx-FX260.lcb
 样品瓶号 : 2-48
 进样体积 : 20 µl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2026/02/07 17:13:56 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2) : 2026/02/09 11:37:37 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.356	213411	32767	100.000	3108	1.116	--
总计		213411	32767	100.000			

图80 辅酶Q10片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
 自制品-2025071721批-pH1.2介质-桨法-50转-15min-片6
 供试品溶液-1




WKL-378

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温 :35°C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$WKL-378 - 0-80/11-1471-2 - zzp-2025071721p-j6-rcqx-2-pH1.2jz-jf50z-20min-P1.lcd
 方法文件名: RC\$WKL-378 - WKL-378-rcqx-fx260.lcm
 批处理文件名: RC\$WKL-378 - 20260207-rcqx-FX260.lcb
 样品瓶号 : 2-4
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2026/02/07 17:18:21 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2) : 2026/02/09 11:37:40 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.356	232877	35600	100.000	3103	1.119	--
总计		232877	35600	100.000			

图81 辅酶Q10片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
 自制品-2025071721批-pH1.2介质-桨法-50转-20min-片1
 供试品溶液-1




WKL-378

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温 :35°C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$WKL-378 - 0-80/11-1472-2 - zzp-2025071721p-j6-rcqx-2-pH1.2jz-jf50z-20min-P2.lcd
 方法文件名: RC\$WKL-378 - WKL-378-rcqx-fx260.lcm
 批处理文件名: RC\$WKL-378 - 20260207-rcqx-FX260.lcb
 样品瓶号 : 2-13
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2026/02/07 17:22:46 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2) : 2026/02/09 11:37:43 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.356	230961	35537	100.000	3108	1.114	--
总计		230961	35537	100.000			

图82 辅酶Q10片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
 自制品-2025071721批-pH1.2介质-桨法-50转-20min-片2
 供试品溶液-1




WKL-378

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温 :35°C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$WKL-378 - 0-80/11-1473-2 - zzp-2025071721p-j6-rcqx-2-pH1.2jz-jf50z-20min-P3.lcd
 方法文件名: RC\$WKL-378 - WKL-378-rcqx-fx260.lcm
 批处理文件名: RC\$WKL-378 - 20260207-rcqx-FX260.lcb
 样品瓶号 : 2-22
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2026/02/07 17:27:10 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2) : 2026/02/09 11:37:46 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.357	225519	34561	100.000	3118	1.117	--
总计		225519	34561	100.000			

图83 辅酶Q10片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
 自制品-2025071721批-pH1.2介质-桨法-50转-20min-片3
 供试品溶液-1




WKL-378

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温 :35°C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$WKL-378 - 0-80/11-1474-2 - zzp-2025071721p-j6-rcqx-2-pH1.2jz-jf50z-20min-P4.lcd
 方法文件名: RC\$WKL-378 - WKL-378-rcqx-fx260.lcm
 批处理文件名: RC\$WKL-378 - 20260207-rcqx-FX260.lcb
 样品瓶号 : 2-31
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2026/02/07 17:31:35 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2) : 2026/02/09 11:37:49 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.356	231992	35527	100.000	3105	1.116	--
总计		231992	35527	100.000			

图84 辅酶Q10片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
 自制品-2025071721批-pH1.2介质-浆法-50转-20min-片4
 供试品溶液-1




WKL-378

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温 :35°C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$WKL-378 - 0-80/11-1475-2 - zzp-2025071721p-j6-rcqx-2-pH1.2jz-jf50z-20min-P5.lcd
 方法文件名: RC\$WKL-378 - WKL-378-rcqx-fx260.lcm
 批处理文件名: RC\$WKL-378 - 20260207-rcqx-FX260.lcb
 样品瓶号 : 2-40
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2026/02/07 17:35:59 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2) : 2026/02/09 11:37:52 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.357	231914	35553	100.000	3111	1.118	--
总计		231914	35553	100.000			

图85 辅酶Q10片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
 自制品-2025071721批-pH1.2介质-桨法-50转-20min-片5
 供试品溶液-1




WKL-378

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温 :35°C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$WKL-378 - 0-80/11-1476-2 - zzp-2025071721p-j6-rcqx-2-pH1.2jz-jf50z-20min-P6.lcd
 方法文件名: RC\$WKL-378 - WKL-378-rcqx-fx260.lcm
 批处理文件名: RC\$WKL-378 - 20260207-rcqx-FX260.lcb
 样品瓶号 : 2-49
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2026/02/07 17:40:24 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2) : 2026/02/09 11:37:54 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.357	217487	33237	100.000	3110	1.117	--
总计		217487	33237	100.000			

图86 辅酶Q10片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
 自制品-2025071721批-pH1.2介质-浆法-50转-20min-片6
 供试品溶液-1




WKL-378

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温 :35°C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$WKL-378 - 0-80/11-1477-2 - zzp-2025071721p-j6-rcqx-2-pH1.2jz-jf50z-30min-P1.lcd
 方法文件名: RC\$WKL-378 - WKL-378-rcqx-fx260.lcm
 批处理文件名: RC\$WKL-378 - 20260207-rcqx-FX260.lcb
 样品瓶号 : 2-5
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2026/02/07 17:44:49 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2) : 2026/02/09 11:37:57 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.355	232791	35811	100.000	3114	1.115	--
总计		232791	35811	100.000			

图87 辅酶Q10片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
 自制品-2025071721批-pH1.2介质-桨法-50转-30min-片1
 供试品溶液-1




WKL-378

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温 :35°C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$WKL-378 - 0-80/11-1478-2 - zzp-2025071721p-j6-rcqx-2-pH1.2jz-jf50z-30min-P2.lcd
 方法文件名: RC\$WKL-378 - WKL-378-rcqx-fx260.lcm
 批处理文件名: RC\$WKL-378 - 20260207-rcqx-FX260.lcb
 样品瓶号 : 2-14
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2026/02/07 17:49:14 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2) : 2026/02/09 11:38:00 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.357	234443	35836	100.000	3107	1.117	--
总计		234443	35836	100.000			

图88 辅酶Q10片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
 自制品-2025071721批-pH1.2介质-浆法-50转-30min-片2
 供试品溶液-1




WKL-378

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温 :35°C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$WKL-378 - 0-80/11-1479-2 - zzp-2025071721p-j6-rcqx-2-pH1.2jz-jf50z-30min-P3.lcd
 方法文件名: RC\$WKL-378 - WKL-378-rcqx-fx260.lcm
 批处理文件名: RC\$WKL-378 - 20260207-rcqx-FX260.lcb
 样品瓶号 : 2-23
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2026/02/07 17:53:39 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2) : 2026/02/09 11:38:04 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.356	228637	35050	100.000	3116	1.115	--
总计		228637	35050	100.000			

图89 辅酶Q10片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
 自制品-2025071721批-pH1.2介质-桨法-50转-30min-片3
 供试品溶液-1




WKL-378

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温 :35 $^{\circ}$ C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$WKL-378 - 0-80/11-1480-2 - zzp-2025071721p-j6-rcqx-2-pH1.2jz-jf50z-30min-P4.lcd
 方法文件名: RC\$WKL-378 - WKL-378-rcqx-fx260.lcm
 批处理文件名: RC\$WKL-378 - 20260207-rcqx-FX260.lcb
 样品瓶号 : 2-32
 进样体积 : 20 μ l 版本号: 6.115
 进样时间 : 2026/02/07 17:58:03 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2) : 2026/02/09 11:38:07 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.357	234270	35854	100.000	3108	1.117	--
总计		234270	35854	100.000			

图90 辅酶Q10片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
 自制品-2025071721批-pH1.2介质-桨法-50转-30min-片4
 供试品溶液-1




WKL-378

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温 :35°C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$WKL-378 - 0-80/11-1481-2 - zzp-2025071721p-j6-rcqx-2-pH1.2jz-jf50z-30min-P5.lcd
 方法文件名: RC\$WKL-378 - WKL-378-rcqx-fx260.lcm
 批处理文件名: RC\$WKL-378 - 20260207-rcqx-FX260.lcb
 样品瓶号 : 2-41
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2026/02/07 18:02:28 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2) : 2026/02/09 11:38:10 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.356	234341	35988	100.000	3108	1.115	--
总计		234341	35988	100.000			

图91 辅酶Q10片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
 自制品-2025071721批-pH1.2介质-浆法-50转-30min-片5
 供试品溶液-1




WKL-378

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温 :35°C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$WKL-378 - 0-80/11-1482-2 - zzp-2025071721p-j6-rcqx-2-pH1.2jz-jf50z-30min-P6.lcd
 方法文件名: RC\$WKL-378 - WKL-378-rcqx-fx260.lcm
 批处理文件名: RC\$WKL-378 - 20260207-rcqx-FX260.lcb
 样品瓶号 : 2-50
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2026/02/07 18:06:52 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2) : 2026/02/09 11:38:13 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.359	219532	33493	100.000	3107	1.119	--
总计		219532	33493	100.000			

图92 辅酶Q10片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
 自制品-2025071721批-pH1.2介质-浆法-50转-30min-片6
 供试品溶液-1




WKL-378

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温 :35°C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$WKL-378 - 0-80/11-1483-2 - zzp-2025071721p-j6-rcqx-2-pH1.2jz-jf50z-45min-P1.lcd
 方法文件名: RC\$WKL-378 - WKL-378-rcqx-fx260.lcm
 批处理文件名: RC\$WKL-378 - 20260207-rcqx-FX260.lcb
 样品瓶号 : 2-6
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2026/02/07 18:11:17 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2) : 2026/02/09 11:38:16 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.356	234668	36004	100.000	3109	1.117	--
总计		234668	36004	100.000			

图93 辅酶Q10片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
 自制品-2025071721批-pH1.2介质-浆法-50转-45min-片1
 供试品溶液-1




WKL-378

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温 :35°C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$WKL-378 - 0-80/11-1484-2 - zzp-2025071721p-j6-rcqx-2-pH1.2jz-jf50z-45min-P2.lcd
 方法文件名: RC\$WKL-378 - WKL-378-rcqx-fx260.lcm
 批处理文件名: RC\$WKL-378 - 20260207-rcqx-FX260.lcb
 样品瓶号 : 2-15
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2026/02/07 18:15:42 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2) : 2026/02/09 11:38:19 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.358	234969	35859	100.000	3109	1.117	--
总计		234969	35859	100.000			

图94 辅酶Q10片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
 自制品-2025071721批-pH1.2介质-桨法-50转-45min-片2
 供试品溶液-1




WKL-378

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温 :35°C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$WKL-378 - 0-80/11-1485-2 - zzp-2025071721p-j6-rcqx-2-pH1.2jz-jf50z-45min-P3.lcd
 方法文件名: RC\$WKL-378 - WKL-378-rcqx-fx260.lcm
 批处理文件名: RC\$WKL-378 - 20260207-rcqx-FX260.lcb
 样品瓶号 : 2-24
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2026/02/07 18:20:07 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2) : 2026/02/09 11:38:22 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.356	228241	35054	100.000	3114	1.114	--
总计		228241	35054	100.000			

图95 辅酶Q10片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
 自制品-2025071721批-pH1.2介质-桨法-50转-45min-片3
 供试品溶液-1




WKL-378

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温 :35°C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$WKL-378 - 0-80/11-1486-2 - zzp-2025071721p-j6-rcqx-2-pH1.2jz-jf50z-45min-P4.lcd
 方法文件名: RC\$WKL-378 - WKL-378-rcqx-fx260.lcm
 批处理文件名: RC\$WKL-378 - 20260207-rcqx-FX260.lcb
 样品瓶号 : 2-33
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2026/02/07 18:24:32 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2) : 2026/02/09 11:38:25 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.358	234294	35842	100.000	3104	1.120	--
总计		234294	35842	100.000			

图96 辅酶Q10片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
 自制品-2025071721批-pH1.2介质-浆法-50转-45min-片4
 供试品溶液-1




WKL-378

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温 :35°C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$WKL-378 - 0-80/11-1487-2 - zzp-2025071721p-j6-rcqx-2-pH1.2jz-jf50z-45min-P5.lcd
 方法文件名: RC\$WKL-378 - WKL-378-rcqx-fx260.lcm
 批处理文件名: RC\$WKL-378 - 20260207-rcqx-FX260.lcb
 样品瓶号 : 2-42
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2026/02/07 18:28:57 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2) : 2026/02/09 11:38:28 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.356	234095	35920	100.000	3112	1.116	--
总计		234095	35920	100.000			

图97 辅酶Q10片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
 自制品-2025071721批-pH1.2介质-浆法-50转-45min-片5
 供试品溶液-1




WKL-378

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温 :35°C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$WKL-378 - 0-80/11-1488-2 - zzp-2025071721p-j6-rcqx-2-pH1.2jz-jf50z-45min-P6.lcd
 方法文件名: RC\$WKL-378 - WKL-378-rcqx-fx260.lcm
 批处理文件名: RC\$WKL-378 - 20260207-rcqx-FX260.lcb
 样品瓶号 : 2-51
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2026/02/07 18:33:21 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2) : 2026/02/09 11:38:31 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.358	221601	33767	100.000	3111	1.119	--
总计		221601	33767	100.000			

图98 辅酶Q10片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
 自制品-2025071721批-pH1.2介质-浆法-50转-45min-片6
 供试品溶液-1




WKL-378

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温 :35°C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$WKL-378 - 0-80/11-1489-2 - zzp-2025071721p-j6-rcqx-2-pH1.2jz-jf50z-60min-P1.lcd
 方法文件名: RC\$WKL-378 - WKL-378-rcqx-fx260.lcm
 批处理文件名: RC\$WKL-378 - 20260207-rcqx-FX260.lcb
 样品瓶号 : 2-7
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2026/02/07 18:37:46 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2) : 2026/02/09 11:38:34 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.356	236942	36326	100.000	3108	1.118	--
总计		236942	36326	100.000			

图99 辅酶Q10片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
 自制品-2025071721批-pH1.2介质-浆法-50转-60min-片1
 供试品溶液-1




WKL-378

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温 :35°C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$WKL-378 - 0-80/11-1490-2 - zzp-2025071721p-j6-rcqx-2-pH1.2jz-jf50z-60min-P2.lcd
 方法文件名: RC\$WKL-378 - WKL-378-rcqx-fx260.lcm
 批处理文件名: RC\$WKL-378 - 20260207-rcqx-FX260.lcb
 样品瓶号 : 2-16
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2026/02/07 18:42:11 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2) : 2026/02/09 11:38:37 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.357	236108	36047	100.000	3107	1.122	--
总计		236108	36047	100.000			

图100 辅酶Q10片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
 自制品-2025071721批-pH1.2介质-浆法-50转-60min-片2
 供试品溶液-1




WKL-378

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温 :35°C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$WKL-378 - 0-80/11-1491-2 - zzp-2025071721p-j6-rcqx-2-pH1.2jz-jf50z-60min-P3.lcd
 方法文件名: RC\$WKL-378 - WKL-378-rcqx-fx260.lcm
 批处理文件名: RC\$WKL-378 - 20260207-rcqx-FX260.lcb
 样品瓶号 : 2-25
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2026/02/07 18:46:35 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2) : 2026/02/09 11:38:39 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.355	230008	35328	100.000	3110	1.117	--
总计		230008	35328	100.000			

图101 辅酶Q10片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
 自制品-2025071721批-pH1.2介质-桨法-50转-60min-片3
 供试品溶液-1




WKL-378

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温 :35°C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$WKL-378 - 0-80/11-1492-2 - zzp-2025071721p-j6-rcqx-2-pH1.2jz-jf50z-60min-P4.lcd
 方法文件名: RC\$WKL-378 - WKL-378-rcqx-fx260.lcm
 批处理文件名: RC\$WKL-378 - 20260207-rcqx-FX260.lcb
 样品瓶号 : 2-34
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2026/02/07 18:50:59 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2) : 2026/02/09 11:38:42 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.356	235477	36072	100.000	3105	1.120	--
总计		235477	36072	100.000			

图102 辅酶Q10片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
 自制品-2025071721批-pH1.2介质-桨法-50转-60min-片4
 供试品溶液-1




WKL-378

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温 :35°C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$WKL-378 - 0-80/11-1493-2 - zzp-2025071721p-j6-rcqx-2-pH1.2jz-jf50z-60min-P5.lcd
 方法文件名: RC\$WKL-378 - WKL-378-rcqx-fx260.lcm
 批处理文件名: RC\$WKL-378 - 20260207-rcqx-FX260.lcb
 样品瓶号 : 2-43
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2026/02/07 18:55:23 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2) : 2026/02/09 11:38:45 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.355	235912	36177	100.000	3104	1.119	--
总计		235912	36177	100.000			

图103 辅酶Q10片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
 自制品-2025071721批-pH1.2介质-桨法-50转-60min-片5
 供试品溶液-1




WKL-378

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温 :35°C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$WKL-378 - 0-80/11-1494-2 - zzp-2025071721p-j6-rcqx-2-pH1.2jz-jf50z-60min-P6.lcd
 方法文件名: RC\$WKL-378 - WKL-378-rcqx-fx260.lcm
 批处理文件名: RC\$WKL-378 - 20260207-rcqx-FX260.lcb
 样品瓶号 : 2-52
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2026/02/07 18:59:48 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2) : 2026/02/09 11:38:48 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.355	221930	34009	100.000	3103	1.118	--
总计		221930	34009	100.000			

图104 辅酶Q10片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
 自制品-2025071721批-pH1.2介质-桨法-50转-60min-片6
 供试品溶液-1




WKL-378

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温 :35°C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$WKL-378 - 0-80/11-1495-2 - zzp-2025071721p-j6-rcqx-2-pH1.2jz-jf50z-jxzs-P1.lcd
 方法文件名: RC\$WKL-378 - WKL-378-rcqx-fx260.lcm
 批处理文件名: RC\$WKL-378 - 20260207-rcqx-FX260.lcb
 样品瓶号 : 2-8
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2026/02/07 19:04:13 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2) : 2026/02/09 11:38:50 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.354	258738	39586	100.000	3106	1.119	--
总计		258738	39586	100.000			

图105 辅酶Q10片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
 自制品-2025071721批-pH1.2介质-桨法-50转-极限转速-片1
 供试品溶液-1




WKL-378

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温 :35°C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$WKL-378 - 0-80/11-1496-2 - zzp-2025071721p-j6-rcqx-2-pH1.2jz-jf50z-jxzs-P2.lcd
 方法文件名: RC\$WKL-378 - WKL-378-rcqx-fx260.lcm
 批处理文件名: RC\$WKL-378 - 20260207-rcqx-FX260.lcb
 样品瓶号 : 2-17
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2026/02/07 19:08:38 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2) : 2026/02/09 11:38:53 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.355	259166	39744	100.000	3108	1.118	--
总计		259166	39744	100.000			

图106 辅酶Q10片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
 自制品-2025071721批-pH1.2介质-桨法-50转-极限转速-片2
 供试品溶液-1




WKL-378

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温 :35°C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$WKL-378 - 0-80/11-1497-2 - zzp-2025071721p-j6-rcqx-2-pH1.2jz-jf50z-jxzs-P3.lcd
 方法文件名: RC\$WKL-378 - WKL-378-rcqx-fx260.lcm
 批处理文件名: RC\$WKL-378 - 20260207-rcqx-FX260.lcb
 样品瓶号 : 2-26
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2026/02/07 19:13:03 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2) : 2026/02/09 11:38:56 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.355	255558	39202	100.000	3109	1.118	--
总计		255558	39202	100.000			

图107 辅酶Q10片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
 自制品-2025071721批-pH1.2介质-桨法-50转-极限转速-片3
 供试品溶液-1




WKL-378

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5µm) 流速: 1.5ml/min
 柱温 :35°C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$WKL-378 - 0-80/11-1498-2 - zzp-2025071721p-j6-rcqx-2-pH1.2jz-jf50z-jxzs-P4.lcd
 方法文件名: RC\$WKL-378 - WKL-378-rcqx-fx260.lcm
 批处理文件名: RC\$WKL-378 - 20260207-rcqx-FX260.lcb
 样品瓶号 : 2-35
 进样体积 : 20 µl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2026/02/07 19:17:28 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2) : 2026/02/09 11:38:59 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.355	256261	39253	100.000	3100	1.119	--
总计		256261	39253	100.000			

图108 辅酶Q10片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
 自制品-2025071721批-pH1.2介质-桨法-50转-极限转速-片4
 供试品溶液-1




WKL-378

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温 :35°C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$WKL-378 - 0-80/11-1499-2 - zzp-2025071721p-j6-rcqx-2-pH1.2jz-jf50z-jxzs-P5.lcd
 方法文件名: RC\$WKL-378 - WKL-378-rcqx-fx260.lcm
 批处理文件名: RC\$WKL-378 - 20260207-rcqx-FX260.lcb
 样品瓶号 : 2-44
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2026/02/07 19:21:53 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2) : 2026/02/09 11:39:01 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.355	257722	39430	100.000	3104	1.118	--
总计		257722	39430	100.000			

图109 辅酶Q10片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
 自制品-2025071721批-pH1.2介质-桨法-50转-极限转速-片5
 供试品溶液-1




WKL-378

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温 :35°C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$WKL-378 - 0-80/11-1500-2 - zzp-2025071721p-j6-rcqx-2-pH1.2jz-jf50z-jxzs-P6.lcd
 方法文件名: RC\$WKL-378 - WKL-378-rcqx-fx260.lcm
 批处理文件名: RC\$WKL-378 - 20260207-rcqx-FX260.lcb
 样品瓶号 : 2-53
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2026/02/07 19:26:17 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2) : 2026/02/09 11:39:04 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.356	252001	38706	100.000	3110	1.120	--
总计		252001	38706	100.000			

图110 辅酶Q10片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
 自制品-2025071721批-pH1.2介质-桨法-50转-极限转速-片6
 供试品溶液-1




WKL-378

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温 :35°C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$WKL-378 - 0-80/11-1501-2 - zzp-2025071721p-j6-rcqx-2-pH1.2jz-jf50z-dz2-1.lcd
 方法文件名: RC\$WKL-378 - WKL-378-rcqx-fx260.lcm
 批处理文件名: RC\$WKL-378 - 20260207-rcqx-FX260.lcb
 样品瓶号 : 2-27
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2026/02/07 19:30:41 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2) : 2026/02/09 11:39:07 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.340	272796	40629	100.000	2893	1.124	--
总计		272796	40629	100.000			

图111 辅酶Q10片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
 自制品-2025071721批-pH1.2介质-桨法-50转
 对照品溶液-2-1




WKL-378

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温 :35°C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$WKL-378 - 0-80/11-1502-2 - zzp-2025071721p-j6-rcqx-2-pH1.2jz-jf50z-dz2-2.lcd
 方法文件名: RC\$WKL-378 - WKL-378-rcqx-fx260.lcm
 批处理文件名: RC\$WKL-378 - 20260207-rcqx-FX260.lcb
 样品瓶号 : 2-27
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2026/02/07 19:35:05 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2) : 2026/02/09 11:39:10 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.340	272183	40656	100.000	2903	1.124	--
总计		272183	40656	100.000			

图112 辅酶Q10片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
 自制品-2025071721批-pH1.2介质-桨法-50转
 对照品溶液-2-2




WKL-378

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温 :35°C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$WKL-378 - 0-80/11-1503-2 - zzp-2025071721p-z6-rcqx-1-pH1.2jz-jf50z-rj.lcd
 方法文件名: RC\$WKL-378 - WKL-378-rcqx-fx260.lcm
 批处理文件名: RC\$WKL-378 - 20260207-rcqx-FX260.lcb
 样品瓶号 : 3-9
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2026/02/07 19:39:28 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2) : 2026/02/09 11:39:12 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图113 辅酶Q10片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
 自制品-2025071721批-pH1.2介质-桨法-50转
 溶剂




WKL-378

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温 :35°C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$WKL-378 - 0-80/11-1504-2 - zzp-2025071721p-z6-rcqx-1-pH1.2jz-jf50z-dz1-1.lcd
 方法文件名: RC\$WKL-378 - WKL-378-rcqx-fx260.lcm
 批处理文件名: RC\$WKL-378 - 20260207-rcqx-FX260.lcb
 样品瓶号 : 3-18
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2026/02/07 19:43:51 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2) : 2026/02/09 11:39:15 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.339	271688	40552	100.000	2898	1.123	--
总计		271688	40552	100.000			

图114 辅酶Q10片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025071721批-pH1.2介质-桨法-50转
 对照品溶液-1-1




WKL-378

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温 :35°C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$WKL-378 - 0-80/11-1505-2 - zzp-2025071721p-z6-rcqx-1-pH1.2jz-jf50z-dz1-2.lcd
 方法文件名: RC\$WKL-378 - WKL-378-rcqx-fx260.lcm
 批处理文件名: RC\$WKL-378 - 20260207-rcqx-FX260.lcb
 样品瓶号 : 3-18
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2026/02/07 19:48:13 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2) : 2026/02/09 11:39:18 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.341	271647	40496	100.000	2903	1.123	--
总计		271647	40496	100.000			

图115 辅酶Q10片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025071721批-pH1.2介质-桨法-50转
 对照品溶液-1-2




WKL-378

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温 :35°C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$WKL-378 - 0-80/11-1506-2 - zzp-2025071721p-z6-rcqx-1-pH1.2jz-jf50z-dz1-3.lcd
 方法文件名: RC\$WKL-378 - WKL-378-rcqx-fx260.lcm
 批处理文件名: RC\$WKL-378 - 20260207-rcqx-FX260.lcb
 样品瓶号 : 3-18
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2026/02/07 19:52:36 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2) : 2026/02/09 11:39:21 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.340	271097	40557	100.000	2904	1.123	--
总计		271097	40557	100.000			

图116 辅酶Q10片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025071721批-pH1.2介质-桨法-50转
 对照品溶液-1-3




WKL-378

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温 :35°C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$WKL-378 - 0-80/11-1507-2 - zzp-2025071721p-z6-rcqx-1-pH1.2jz-jf50z-dz1-4.lcd
 方法文件名: RC\$WKL-378 - WKL-378-rcqx-fx260.lcm
 批处理文件名: RC\$WKL-378 - 20260207-rcqx-FX260.lcb
 样品瓶号 : 3-18
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2026/02/07 19:57:00 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2) : 2026/02/09 11:39:24 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.341	272112	40581	100.000	2907	1.121	--
总计		272112	40581	100.000			

图117 辅酶Q10片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025071721批-pH1.2介质-浆法-50转
 对照品溶液-1-4




WKL-378

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温 :35°C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$WKL-378 - 0-80/11-1508-2 - zzp-2025071721p-z6-rcqx-1-pH1.2jz-jf50z-dz1-5.lcd
 方法文件名: RC\$WKL-378 - WKL-378-rcqx-fx260.lcm
 批处理文件名: RC\$WKL-378 - 20260207-rcqx-FX260.lcb
 样品瓶号 : 3-18
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2026/02/07 20:01:24 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2) : 2026/02/09 11:39:26 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.340	272540	40637	100.000	2906	1.124	--
总计		272540	40637	100.000			

图118 辅酶Q10片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025071721批-pH1.2介质-桨法-50转
 对照品溶液-1-5




WKL-378

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温 :35°C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$WKL-378 - 0-80/11-1509-2 - zzp-2025071721p-z6-rcqx-1-pH1.2jz-jf50z-5min-P1.lcd
 方法文件名: RC\$WKL-378 - WKL-378-rcqx-fx260.lcm
 批处理文件名: RC\$WKL-378 - 20260207-rcqx-FX260.lcb
 样品瓶号 : 3-1
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2026/02/07 20:05:47 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2) : 2026/02/09 11:39:29 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.358	182493	28015	100.000	3128	1.116	--
总计		182493	28015	100.000			

图119 辅酶Q10片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025071721批-pH1.2介质-浆法-50转-5min-片1
 供试品溶液-1




WKL-378

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温 :35°C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$WKL-378 - 0-80/11-1510-2 - zzp-2025071721p-z6-rcqx-1-pH1.2jz-jf50z-5min-P2.lcd
 方法文件名: RC\$WKL-378 - WKL-378-rcqx-fx260.lcm
 批处理文件名: RC\$WKL-378 - 20260207-rcqx-FX260.lcb
 样品瓶号 : 3-10
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2026/02/07 20:10:10 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2) : 2026/02/09 11:39:32 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.356	184686	28344	100.000	3118	1.118	--
总计		184686	28344	100.000			

图120 辅酶Q10片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025071721批-pH1.2介质-浆法-50转-5min-片2
 供试品溶液-1




WKL-378

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温 :35°C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$WKL-378 - 0-80/11-1511-2 - zzp-2025071721p-z6-rcqx-1-pH1.2jz-jf50z-5min-P3.lcd
 方法文件名: RC\$WKL-378 - WKL-378-rcqx-fx260.lcm
 批处理文件名: RC\$WKL-378 - 20260207-rcqx-FX260.lcb
 样品瓶号 : 3-19
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2026/02/07 20:14:32 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2) : 2026/02/09 11:39:35 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.357	184025	28350	100.000	3124	1.117	--
总计		184025	28350	100.000			

图121 辅酶Q10片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025071721批-pH1.2介质-浆法-50转-5min-片3
 供试品溶液-1




WKL-378

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温 :35°C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$WKL-378 - 0-80/11-1512-2 - zzp-2025071721p-z6-rcqx-1-pH1.2jz-jf50z-5min-P4.lcd
 方法文件名: RC\$WKL-378 - WKL-378-rcqx-fx260.lcm
 批处理文件名: RC\$WKL-378 - 20260207-rcqx-FX260.lcb
 样品瓶号 : 3-28
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2026/02/07 20:18:55 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2) : 2026/02/09 11:39:38 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.357	181934	27998	100.000	3126	1.114	--
总计		181934	27998	100.000			

图122 辅酶Q10片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025071721批-pH1.2介质-浆法-50转-5min-片4
 供试品溶液-1




WKL-378

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温 :35°C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$WKL-378 - 0-80/11-1513-2 - zzp-2025071721p-z6-rcqx-1-pH1.2jz-jf50z-5min-P5.lcd
 方法文件名: RC\$WKL-378 - WKL-378-rcqx-fx260.lcm
 批处理文件名: RC\$WKL-378 - 20260207-rcqx-FX260.lcb
 样品瓶号 : 3-37
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2026/02/07 20:23:17 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2) : 2026/02/09 11:39:40 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.359	189207	28926	100.000	3130	1.120	--
总计		189207	28926	100.000			

图123 辅酶Q10片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025071721批-pH1.2介质-浆法-50转-5min-片5
 供试品溶液-1




WKL-378

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温 :35°C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$WKL-378 - 0-80/11-1514-2 - zzp-2025071721p-z6-rcqx-1-pH1.2jz-jf50z-5min-P6.lcd
 方法文件名: RC\$WKL-378 - WKL-378-rcqx-fx260.lcm
 批处理文件名: RC\$WKL-378 - 20260207-rcqx-FX260.lcb
 样品瓶号 : 3-46
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2026/02/07 20:27:40 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2) : 2026/02/09 11:39:43 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.358	187531	28772	100.000	3137	1.117	--
总计		187531	28772	100.000			

图124 辅酶Q10片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025071721批-pH1.2介质-浆法-50转-5min-片6
 供试品溶液-1




WKL-378

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温 :35°C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$WKL-378 - 0-80/11-1515-2 - zzp-2025071721p-z6-rcqx-1-pH1.2jz-jf50z-10min-P1.lcd
 方法文件名: RC\$WKL-378 - WKL-378-rcqx-fx260.lcm
 批处理文件名: RC\$WKL-378 - 20260207-rcqx-FX260.lcb
 样品瓶号 : 3-2
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2026/02/07 20:32:02 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2) : 2026/02/09 11:39:46 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.357	210688	32387	100.000	3115	1.117	--
总计		210688	32387	100.000			

图125 辅酶Q10片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025071721批-pH1.2介质-浆法-50转-10min-片1
 供试品溶液-1




WKL-378

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温 :35°C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$WKL-378 - 0-80/11-1516-2 - zzp-2025071721p-z6-rcqx-1-pH1.2jz-jf50z-10min-P2.lcd
 方法文件名: RC\$WKL-378 - WKL-378-rcqx-fx260.lcm
 批处理文件名: RC\$WKL-378 - 20260207-rcqx-FX260.lcb
 样品瓶号 : 3-11
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2026/02/07 20:36:25 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2) : 2026/02/09 11:39:49 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.356	216298	33173	100.000	3111	1.118	--
总计		216298	33173	100.000			

图126 辅酶Q10片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025071721批-pH1.2介质-浆法-50转-10min-片2
 供试品溶液-1




WKL-378

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温 :35°C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$WKL-378 - 0-80/11-1517-2 - zzp-2025071721p-z6-rcqx-1-pH1.2jz-jf50z-10min-P3.lcd
 方法文件名: RC\$WKL-378 - WKL-378-rcqx-fx260.lcm
 批处理文件名: RC\$WKL-378 - 20260207-rcqx-FX260.lcb
 样品瓶号 : 3-20
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2026/02/07 20:40:47 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2) : 2026/02/09 11:39:52 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.356	214697	32916	100.000	3111	1.119	--
总计		214697	32916	100.000			

图127 辅酶Q10片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025071721批-pH1.2介质-浆法-50转-10min-片3
 供试品溶液-1




WKL-378

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温 :35°C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$WKL-378 - 0-80/11-1518-2 - zzp-2025071721p-z6-rcqx-1-pH1.2jz-jf50z-10min-P4.lcd
 方法文件名: RC\$WKL-378 - WKL-378-rcqx-fx260.lcm
 批处理文件名: RC\$WKL-378 - 20260207-rcqx-FX260.lcb
 样品瓶号 : 3-29
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2026/02/07 20:45:09 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2) : 2026/02/09 11:39:55 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.355	212079	32601	100.000	3113	1.117	--
总计		212079	32601	100.000			

图128 辅酶Q10片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025071721批-pH1.2介质-桨法-50转-10min-片4
 供试品溶液-1




WKL-378

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温 :35°C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$WKL-378 - 0-80/11-1519-2 - zzp-2025071721p-z6-rcqx-1-pH1.2jz-jf50z-10min-P5.lcd
 方法文件名: RC\$WKL-378 - WKL-378-rcqx-fx260.lcm
 批处理文件名: RC\$WKL-378 - 20260207-rcqx-FX260.lcb
 样品瓶号 : 3-38
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2026/02/07 20:49:31 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2) : 2026/02/09 11:39:57 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.356	216785	33220	100.000	3106	1.120	--
总计		216785	33220	100.000			

图129 辅酶Q10片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025071721批-pH1.2介质-浆法-50转-10min-片5
 供试品溶液-1




WKL-378

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温 :35°C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$WKL-378 - 0-80/11-1520-2 - zzp-2025071721p-z6-rcqx-1-pH1.2jz-jf50z-10min-P6.lcd
 方法文件名: RC\$WKL-378 - WKL-378-rcqx-fx260.lcm
 批处理文件名: RC\$WKL-378 - 20260207-rcqx-FX260.lcb
 样品瓶号 : 3-47
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2026/02/07 20:53:54 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2) : 2026/02/09 11:40:00 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.356	207863	31928	100.000	3111	1.117	--
总计		207863	31928	100.000			

图130 辅酶Q10片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025071721批-pH1.2介质-浆法-50转-10min-片6
 供试品溶液-1




WKL-378

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温 :35°C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$WKL-378 - 0-80/11-1521-2 - zzp-2025071721p-z6-rcqx-1-pH1.2jz-jf50z-15min-P1.lcd
 方法文件名: RC\$WKL-378 - WKL-378-rcqx-fx260.lcm
 批处理文件名: RC\$WKL-378 - 20260207-rcqx-FX260.lcb
 样品瓶号 : 3-3
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2026/02/07 20:58:16 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2) : 2026/02/09 11:40:03 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.356	222113	34029	100.000	3114	1.119	--
总计		222113	34029	100.000			

图131 辅酶Q10片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025071721批-pH1.2介质-浆法-50转-15min-片1
 供试品溶液-1




WKL-378

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温 :35°C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$WKL-378 - 0-80/11-1522-2 - zzp-2025071721p-z6-rcqx-1-pH1.2jz-jf50z-15min-P2.lcd
 方法文件名: RC\$WKL-378 - WKL-378-rcqx-fx260.lcm
 批处理文件名: RC\$WKL-378 - 20260207-rcqx-FX260.lcb
 样品瓶号 : 3-12
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2026/02/07 21:02:38 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2) : 2026/02/09 11:40:06 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.356	228432	34978	100.000	3106	1.118	--
总计		228432	34978	100.000			

图132 辅酶Q10片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025071721批-pH1.2介质-桨法-50转-15min-片2
 供试品溶液-1




WKL-378

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5µm) 流速: 1.5ml/min
 柱温 :35°C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$WKL-378 - 0-80/11-1523-2 - zzp-2025071721p-z6-rcqx-1-pH1.2jz-jf50z-15min-P3.lcd
 方法文件名: RC\$WKL-378 - WKL-378-rcqx-fx260.lcm
 批处理文件名: RC\$WKL-378 - 20260207-rcqx-FX260.lcb
 样品瓶号 : 3-21
 进样体积 : 20 µl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2026/02/07 21:07:01 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2) : 2026/02/09 11:40:09 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.356	223443	34373	100.000	3110	1.116	--
总计		223443	34373	100.000			

图133 辅酶Q10片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025071721批-pH1.2介质-桨法-50转-15min-片3
 供试品溶液-1




WKL-378

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温 :35°C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$WKL-378 - 0-80/11-1524-2 - zzp-2025071721p-z6-rcqx-1-pH1.2jz-jf50z-15min-P4.lcd
 方法文件名: RC\$WKL-378 - WKL-378-rcqx-fx260.lcm
 批处理文件名: RC\$WKL-378 - 20260207-rcqx-FX260.lcb
 样品瓶号 : 3-30
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2026/02/07 21:11:23 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2) : 2026/02/09 11:40:11 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.356	222020	34099	100.000	3115	1.116	--
总计		222020	34099	100.000			

图134 辅酶Q10片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025071721批-pH1.2介质-桨法-50转-15min-片4
 供试品溶液-1




WKL-378

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温 :35°C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$WKL-378 - 0-80/11-1525-2 - zzp-2025071721p-z6-rcqx-1-pH1.2jz-jf50z-15min-P5.lcd
 方法文件名: RC\$WKL-378 - WKL-378-rcqx-fx260.lcm
 批处理文件名: RC\$WKL-378 - 20260207-rcqx-FX260.lcb
 样品瓶号 : 3-39
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2026/02/07 21:15:45 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2) : 2026/02/09 11:40:14 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.356	226839	34881	100.000	3108	1.118	--
总计		226839	34881	100.000			

图135 辅酶Q10片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025071721批-pH1.2介质-浆法-50转-15min-片5
 供试品溶液-1




WKL-378

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温 :35°C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$WKL-378 - 0-80/11-1526-2 - zzp-2025071721p-z6-rcqx-1-pH1.2jz-jf50z-15min-P6.lcd
 方法文件名: RC\$WKL-378 - WKL-378-rcqx-fx260.lcm
 批处理文件名: RC\$WKL-378 - 20260207-rcqx-FX260.lcb
 样品瓶号 : 3-48
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2026/02/07 21:20:09 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2) : 2026/02/09 11:40:17 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.357	219267	33704	100.000	3112	1.115	--
总计		219267	33704	100.000			

图136 辅酶Q10片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025071721批-pH1.2介质-浆法-50转-15min-片6
 供试品溶液-1




WKL-378

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5µm) 流速: 1.5ml/min
 柱温 :35°C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$WKL-378 - 0-80/11-1527-2 - zzp-2025071721p-z6-rcqx-1-pH1.2jz-jf50z-20min-P1.lcd
 方法文件名: RC\$WKL-378 - WKL-378-rcqx-fx260.lcm
 批处理文件名: RC\$WKL-378 - 20260207-rcqx-FX260.lcb
 样品瓶号 : 3-4
 进样体积 : 20 µl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2026/02/07 21:24:31 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2) : 2026/02/09 11:40:20 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.355	225776	34674	100.000	3109	1.117	--
总计		225776	34674	100.000			

图137 辅酶Q10片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025071721批-pH1.2介质-浆法-50转-20min-片1
 供试品溶液-1




WKL-378

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温 :35°C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$WKL-378 - 0-80/11-1528-2 - zzp-2025071721p-z6-rcqx-1-pH1.2jz-jf50z-20min-P2.lcd
 方法文件名: RC\$WKL-378 - WKL-378-rcqx-fx260.lcm
 批处理文件名: RC\$WKL-378 - 20260207-rcqx-FX260.lcb
 样品瓶号 : 3-13
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2026/02/07 21:28:54 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2) : 2026/02/09 11:40:23 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.356	233106	35757	100.000	3111	1.118	--
总计		233106	35757	100.000			

图138 辅酶Q10片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025071721批-pH1.2介质-浆法-50转-20min-片2
 供试品溶液-1




WKL-378

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5µm) 流速: 1.5ml/min
 柱温 :35°C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$WKL-378 - 0-80/11-1529-2 - zzp-2025071721p-z6-rcqx-1-pH1.2jz-jf50z-20min-P3.lcd
 方法文件名: RC\$WKL-378 - WKL-378-rcqx-fx260.lcm
 批处理文件名: RC\$WKL-378 - 20260207-rcqx-FX260.lcb
 样品瓶号 : 3-22
 进样体积 : 20 µl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2026/02/07 21:33:16 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2) : 2026/02/09 11:40:26 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.355	230635	35443	100.000	3113	1.116	--
总计		230635	35443	100.000			

图139 辅酶Q10片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025071721批-pH1.2介质-桨法-50转-20min-片3
 供试品溶液-1




WKL-378

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温 :35°C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$WKL-378 - 0-80/11-1530-2 - zzp-2025071721p-z6-rcqx-1-pH1.2jz-jf50z-20min-P4.lcd
 方法文件名: RC\$WKL-378 - WKL-378-rcqx-fx260.lcm
 批处理文件名: RC\$WKL-378 - 20260207-rcqx-FX260.lcb
 样品瓶号 : 3-31
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2026/02/07 21:37:38 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2) : 2026/02/09 11:40:29 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.356	225118	34598	100.000	3115	1.119	--
总计		225118	34598	100.000			

图140 辅酶Q10片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025071721批-pH1.2介质-浆法-50转-20min-片4
 供试品溶液-1




WKL-378

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5µm) 流速: 1.5ml/min
 柱温 :35°C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$WKL-378 - 0-80/11-1531-2 - zzp-2025071721p-z6-rcqx-1-pH1.2jz-jf50z-20min-P5.lcd
 方法文件名: RC\$WKL-378 - WKL-378-rcqx-fx260.lcm
 批处理文件名: RC\$WKL-378 - 20260207-rcqx-FX260.lcb
 样品瓶号 : 3-40
 进样体积 : 20 µl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2026/02/07 21:42:00 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2) : 2026/02/09 11:40:32 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.356	232240	35688	100.000	3115	1.118	--
总计		232240	35688	100.000			

图141 辅酶Q10片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025071721批-pH1.2介质-桨法-50转-20min-片5
 供试品溶液-1




WKL-378

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温 :35°C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$WKL-378 - 0-80/11-1532-2 - zzp-2025071721p-z6-rcqx-1-pH1.2jz-jf50z-20min-P6.lcd
 方法文件名: RC\$WKL-378 - WKL-378-rcqx-fx260.lcm
 批处理文件名: RC\$WKL-378 - 20260207-rcqx-FX260.lcb
 样品瓶号 : 3-49
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2026/02/07 21:46:22 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2) : 2026/02/09 11:40:35 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.356	223112	34258	100.000	3117	1.118	--
总计		223112	34258	100.000			

图142 辅酶Q10片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025071721批-pH1.2介质-浆法-50转-20min-片6
 供试品溶液-1




WKL-378

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温 :35°C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$WKL-378 - 0-80/11-1533-2 - zzp-2025071721p-z6-rcqx-1-pH1.2jz-jf50z-30min-P1.lcd
 方法文件名: RC\$WKL-378 - WKL-378-rcqx-fx260.lcm
 批处理文件名: RC\$WKL-378 - 20260207-rcqx-FX260.lcb
 样品瓶号 : 3-5
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2026/02/07 21:50:44 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2) : 2026/02/09 11:40:38 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.355	225909	34816	100.000	3114	1.116	--
总计		225909	34816	100.000			

图143 辅酶Q10片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025071721批-pH1.2介质-浆法-50转-30min-片1
 供试品溶液-1




WKL-378

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5µm) 流速: 1.5ml/min
 柱温 :35°C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$WKL-378 - 0-80/11-1534-2 - zzp-2025071721p-z6-rcqx-1-pH1.2jz-jf50z-30min-P2.lcd
 方法文件名: RC\$WKL-378 - WKL-378-rcqx-fx260.lcm
 批处理文件名: RC\$WKL-378 - 20260207-rcqx-FX260.lcb
 样品瓶号 : 3-14
 进样体积 : 20 µl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2026/02/07 21:55:07 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2) : 2026/02/09 11:40:41 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.355	236224	36274	100.000	3110	1.119	--
总计		236224	36274	100.000			

图144 辅酶Q10片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025071721批-pH1.2介质-桨法-50转-30min-片2
 供试品溶液-1




WKL-378

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温 :35°C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$WKL-378 - 0-80/11-1535-2 - zzp-2025071721p-z6-rcqx-1-pH1.2jz-jf50z-30min-P3.lcd
 方法文件名: RC\$WKL-378 - WKL-378-rcqx-fx260.lcm
 批处理文件名: RC\$WKL-378 - 20260207-rcqx-FX260.lcb
 样品瓶号 : 3-23
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2026/02/07 21:59:30 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2) : 2026/02/09 11:40:44 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.357	231965	35529	100.000	3115	1.119	--
总计		231965	35529	100.000			

图145 辅酶Q10片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025071721批-pH1.2介质-浆法-50转-30min-片3
 供试品溶液-1




WKL-378

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温 :35°C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$WKL-378 - 0-80/11-1536-2 - zzp-2025071721p-z6-rcqx-1-pH1.2jz-jf50z-30min-P4.lcd
 方法文件名: RC\$WKL-378 - WKL-378-rcqx-fx260.lcm
 批处理文件名: RC\$WKL-378 - 20260207-rcqx-FX260.lcb
 样品瓶号 : 3-32
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2026/02/07 22:03:52 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2) : 2026/02/09 11:40:47 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.356	228833	35167	100.000	3111	1.118	--
总计		228833	35167	100.000			

图146 辅酶Q10片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025071721批-pH1.2介质-浆法-50转-30min-片4
 供试品溶液-1




WKL-378

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温 :35°C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$WKL-378 - 0-80/11-1537-2 - zzp-2025071721p-z6-rcqx-1-pH1.2jz-jf50z-30min-P5.lcd
 方法文件名: RC\$WKL-378 - WKL-378-rcqx-fx260.lcm
 批处理文件名: RC\$WKL-378 - 20260207-rcqx-FX260.lcb
 样品瓶号 : 3-41
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2026/02/07 22:08:13 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2) : 2026/02/09 11:40:50 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.357	233646	35912	100.000	3115	1.118	--
总计		233646	35912	100.000			

图147 辅酶Q10片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025071721批-pH1.2介质-桨法-50转-30min-片5
 供试品溶液-1




WKL-378

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温 :35°C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$WKL-378 - 0-80/11-1538-2 - zzp-2025071721p-z6-rcqx-1-pH1.2jz-jf50z-30min-P6.lcd
 方法文件名: RC\$WKL-378 - WKL-378-rcqx-fx260.lcm
 批处理文件名: RC\$WKL-378 - 20260207-rcqx-FX260.lcb
 样品瓶号 : 3-50
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2026/02/07 22:12:35 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2) : 2026/02/09 11:40:52 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.356	225836	34646	100.000	3109	1.119	--
总计		225836	34646	100.000			

图148 辅酶Q10片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025071721批-pH1.2介质-浆法-50转-30min-片6
 供试品溶液-1




WKL-378

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温 :35°C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$WKL-378 - 0-80/11-1539-2 - zzp-2025071721p-z6-rcqx-1-pH1.2jz-jf50z-45min-P1.lcd
 方法文件名: RC\$WKL-378 - WKL-378-rcqx-fx260.lcm
 批处理文件名: RC\$WKL-378 - 20260207-rcqx-FX260.lcb
 样品瓶号 : 3-6
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2026/02/07 22:16:57 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2) : 2026/02/09 11:40:55 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.357	229571	35280	100.000	3117	1.117	--
总计		229571	35280	100.000			

图149 辅酶Q10片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025071721批-pH1.2介质-桨法-50转-45min-片1
 供试品溶液-1




WKL-378

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5µm) 流速: 1.5ml/min
 柱温 :35°C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$WKL-378 - 0-80/11-1540-2 - zzp-2025071721p-z6-rcqx-1-pH1.2jz-jf50z-45min-P2.lcd
 方法文件名: RC\$WKL-378 - WKL-378-rcqx-fx260.lcm
 批处理文件名: RC\$WKL-378 - 20260207-rcqx-FX260.lcb
 样品瓶号 : 3-15
 进样体积 : 20 µl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2026/02/07 22:21:19 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2) : 2026/02/09 11:40:58 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.356	238184	36607	100.000	3117	1.117	--
总计		238184	36607	100.000			

图150 辅酶Q10片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025071721批-pH1.2介质-浆法-50转-45min-片2
 供试品溶液-1




WKL-378

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温 :35°C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$WKL-378 - 0-80/11-1541-2 - zzp-2025071721p-z6-rcqx-1-pH1.2jz-jf50z-45min-P3.lcd
 方法文件名: RC\$WKL-378 - WKL-378-rcqx-fx260.lcm
 批处理文件名: RC\$WKL-378 - 20260207-rcqx-FX260.lcb
 样品瓶号 : 3-24
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2026/02/07 22:25:40 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2) : 2026/02/09 11:41:01 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.356	233599	35822	100.000	3110	1.119	--
总计		233599	35822	100.000			

图151 辅酶Q10片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025071721批-pH1.2介质-浆法-50转-45min-片3
 供试品溶液-1




WKL-378

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温 :35°C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$WKL-378 - 0-80/11-1542-2 - zzp-2025071721p-z6-rcqx-1-pH1.2jz-jf50z-45min-P4.lcd
 方法文件名: RC\$WKL-378 - WKL-378-rcqx-fx260.lcm
 批处理文件名: RC\$WKL-378 - 20260207-rcqx-FX260.lcb
 样品瓶号 : 3-33
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2026/02/07 22:30:02 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2) : 2026/02/09 11:41:04 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.356	231840	35514	100.000	3115	1.119	--
总计		231840	35514	100.000			

图152 辅酶Q10片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025071721批-pH1.2介质-浆法-50转-45min-片4
 供试品溶液-1




WKL-378

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温 :35°C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$WKL-378 - 0-80/11-1543-2 - zzp-2025071721p-z6-rcqx-1-pH1.2jz-jf50z-45min-P5.lcd
 方法文件名: RC\$WKL-378 - WKL-378-rcqx-fx260.lcm
 批处理文件名: RC\$WKL-378 - 20260207-rcqx-FX260.lcb
 样品瓶号 : 3-42
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2026/02/07 22:34:24 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2) : 2026/02/09 11:41:06 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.356	237291	36409	100.000	3113	1.118	--
总计		237291	36409	100.000			

图153 辅酶Q10片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025071721批-pH1.2介质-浆法-50转-45min-片5
 供试品溶液-1




WKL-378

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温 :35°C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$WKL-378 - 0-80/11-1544-2 - zzp-2025071721p-z6-rcqx-1-pH1.2jz-jf50z-45min-P6.lcd
 方法文件名: RC\$WKL-378 - WKL-378-rcqx-fx260.lcm
 批处理文件名: RC\$WKL-378 - 20260207-rcqx-FX260.lcb
 样品瓶号 : 3-51
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2026/02/07 22:38:45 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2) : 2026/02/09 11:41:09 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.356	225244	34474	100.000	3115	1.118	--
总计		225244	34474	100.000			

图154 辅酶Q10片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025071721批-pH1.2介质-浆法-50转-45min-片6
 供试品溶液-1




WKL-378

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温 :35°C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$WKL-378 - 0-80/11-1545-2 - zzp-2025071721p-z6-rcqx-1-pH1.2jz-jf50z-60min-P1.lcd
 方法文件名: RC\$WKL-378 - WKL-378-rcqx-fx260.lcm
 批处理文件名: RC\$WKL-378 - 20260207-rcqx-FX260.lcb
 样品瓶号 : 3-7
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2026/02/07 22:43:07 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2) : 2026/02/09 11:41:12 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.355	227401	34931	100.000	3108	1.116	--
总计		227401	34931	100.000			

图155 辅酶Q10片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025071721批-pH1.2介质-浆法-50转-60min-片1
 供试品溶液-1




WKL-378

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温 :35°C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$WKL-378 - 0-80/11-1546-2 - zzp-2025071721p-z6-rcqx-1-pH1.2jz-jf50z-60min-P2.lcd
 方法文件名: RC\$WKL-378 - WKL-378-rcqx-fx260.lcm
 批处理文件名: RC\$WKL-378 - 20260207-rcqx-FX260.lcb
 样品瓶号 : 3-16
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2026/02/07 22:47:30 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2) : 2026/02/09 11:41:15 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.355	237205	36412	100.000	3111	1.118	--
总计		237205	36412	100.000			

图156 辅酶Q10片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025071721批-pH1.2介质-浆法-50转-60min-片2
 供试品溶液-1




WKL-378

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温 :35°C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$WKL-378 - 0-80/11-1547-2 - zzp-2025071721p-z6-rcqx-1-pH1.2jz-jf50z-60min-P3.lcd
 方法文件名: RC\$WKL-378 - WKL-378-rcqx-fx260.lcm
 批处理文件名: RC\$WKL-378 - 20260207-rcqx-FX260.lcb
 样品瓶号 : 3-25
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2026/02/07 22:51:53 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2) : 2026/02/09 11:41:18 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.356	233173	35831	100.000	3112	1.116	--
总计		233173	35831	100.000			

图157 辅酶Q10片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025071721批-pH1.2介质-浆法-50转-60min-片3
 供试品溶液-1




WKL-378

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温 :35°C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$WKL-378 - 0-80/11-1548-2 - zzp-2025071721p-z6-rcqx-1-pH1.2jz-jf50z-60min-P4.lcd
 方法文件名: RC\$WKL-378 - WKL-378-rcqx-fx260.lcm
 批处理文件名: RC\$WKL-378 - 20260207-rcqx-FX260.lcb
 样品瓶号 : 3-34
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2026/02/07 22:56:15 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2) : 2026/02/09 11:41:20 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.356	230986	35438	100.000	3105	1.119	--
总计		230986	35438	100.000			

图158 辅酶Q10片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025071721批-pH1.2介质-浆法-50转-60min-片4
 供试品溶液-1




WKL-378

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温 :35°C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$WKL-378 - 0-80/11-1549-2 - zzp-2025071721p-z6-rcqx-1-pH1.2jz-jf50z-60min-P5.lcd
 方法文件名: RC\$WKL-378 - WKL-378-rcqx-fx260.lcm
 批处理文件名: RC\$WKL-378 - 20260207-rcqx-FX260.lcb
 样品瓶号 : 3-43
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2026/02/07 23:00:37 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2) : 2026/02/09 11:41:23 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.356	235376	36138	100.000	3114	1.117	--
总计		235376	36138	100.000			

图159 辅酶Q10片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025071721批-pH1.2介质-浆法-50转-60min-片5
 供试品溶液-1




WKL-378

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温 :35°C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$WKL-378 - 0-80/11-1550-2 - zzp-2025071721p-z6-rcqx-1-pH1.2jz-jf50z-60min-P6.lcd
 方法文件名: RC\$WKL-378 - WKL-378-rcqx-fx260.lcm
 批处理文件名: RC\$WKL-378 - 20260207-rcqx-FX260.lcb
 样品瓶号 : 3-52
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2026/02/07 23:04:59 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2) : 2026/02/09 11:41:26 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.357	226136	34716	100.000	3112	1.118	--
总计		226136	34716	100.000			

图160 辅酶Q10片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025071721批-pH1.2介质-浆法-50转-60min-片6
 供试品溶液-1




WKL-378

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温 :35°C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$WKL-378 - 0-80/11-1551-2 - zzp-2025071721p-z6-rcqx-1-pH1.2jz-jf50z-jxzs-P1.lcd
 方法文件名: RC\$WKL-378 - WKL-378-rcqx-fx260.lcm
 批处理文件名: RC\$WKL-378 - 20260207-rcqx-FX260.lcb
 样品瓶号 : 3-8
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2026/02/07 23:09:22 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2) : 2026/02/09 11:41:29 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.355	256689	39403	100.000	3109	1.117	--
总计		256689	39403	100.000			

图161 辅酶Q10片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025071721批-pH1.2介质-桨法-50转-极限转速-片1
 供试品溶液-1




WKL-378

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温 :35°C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$WKL-378 - 0-80/11-1552-2 - zzp-2025071721p-z6-rcqx-1-pH1.2jz-jf50z-jxzs-P2.lcd
 方法文件名: RC\$WKL-378 - WKL-378-rcqx-fx260.lcm
 批处理文件名: RC\$WKL-378 - 20260207-rcqx-FX260.lcb
 样品瓶号 : 3-17
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2026/02/07 23:13:44 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2) : 2026/02/09 11:41:32 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.356	263704	40439	100.000	3104	1.122	--
总计		263704	40439	100.000			

图162 辅酶Q10片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025071721批-pH1.2介质-桨法-50转-极限转速-片2
 供试品溶液-1




WKL-378

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温 :35°C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$WKL-378 - 0-80/11-1553-2 - zzp-2025071721p-z6-rcqx-1-pH1.2jz-jf50z-jxzs-P3.lcd
 方法文件名: RC\$WKL-378 - WKL-378-rcqx-fx260.lcm
 批处理文件名: RC\$WKL-378 - 20260207-rcqx-FX260.lcb
 样品瓶号 : 3-26
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2026/02/07 23:18:07 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2) : 2026/02/09 11:41:35 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.355	261162	40118	100.000	3108	1.119	--
总计		261162	40118	100.000			

图163 辅酶Q10片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025071721批-pH1.2介质-桨法-50转-极限转速-片3
 供试品溶液-1




WKL-378

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温 :35°C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$WKL-378 - 0-80/11-1554-2 - zzp-2025071721p-z6-rcqx-1-pH1.2jz-jf50z-jxzs-P4.lcd
 方法文件名: RC\$WKL-378 - WKL-378-rcqx-fx260.lcm
 批处理文件名: RC\$WKL-378 - 20260207-rcqx-FX260.lcb
 样品瓶号 : 3-35
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2026/02/07 23:22:30 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2) : 2026/02/09 11:41:38 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.355	257602	39527	100.000	3109	1.118	--
总计		257602	39527	100.000			

图164 辅酶Q10片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025071721批-pH1.2介质-桨法-50转-极限转速-片4
 供试品溶液-1




WKL-378

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温 :35°C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$WKL-378 - 0-80/11-1555-2 - zzp-2025071721p-z6-rcqx-1-pH1.2jz-jf50z-jxzs-P5.lcd
 方法文件名: RC\$WKL-378 - WKL-378-rcqx-fx260.lcm
 批处理文件名: RC\$WKL-378 - 20260207-rcqx-FX260.lcb
 样品瓶号 : 3-44
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2026/02/07 23:26:53 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2) : 2026/02/09 11:41:40 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.356	263474	40251	100.000	3103	1.120	--
总计		263474	40251	100.000			

图165 辅酶Q10片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025071721批-pH1.2介质-桨法-50转-极限转速-片5
 供试品溶液-1




WKL-378

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5µm) 流速: 1.5ml/min
 柱温 :35°C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$WKL-378 - 0-80/11-1556-2 - zzp-2025071721p-z6-rcqx-1-pH1.2jz-jf50z-jxzs-P6.lcd
 方法文件名: RC\$WKL-378 - WKL-378-rcqx-fx260.lcm
 批处理文件名: RC\$WKL-378 - 20260207-rcqx-FX260.lcb
 样品瓶号 : 3-53
 进样体积 : 20 µl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2026/02/07 23:31:15 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2) : 2026/02/09 11:41:43 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.355	252561	38883	100.000	3113	1.116	--
总计		252561	38883	100.000			

图166 辅酶Q10片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025071721批-pH1.2介质-桨法-50转-极限转速-片6
 供试品溶液-1




WKL-378

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5µm) 流速: 1.5ml/min
 柱温 :35°C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$WKL-378 - 0-80/11-1557-2 - zzp-2025071721p-z6-rcqx-1-pH1.2jz-jf50z-dz2-1.lcd
 方法文件名: RC\$WKL-378 - WKL-378-rcqx-fx260.lcm
 批处理文件名: RC\$WKL-378 - 20260207-rcqx-FX260.lcb
 样品瓶号 : 3-27
 进样体积 : 20 µl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2026/02/07 23:35:39 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2) : 2026/02/09 11:41:46 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.340	271034	40427	100.000	2895	1.123	--
总计		271034	40427	100.000			

图167 辅酶Q10片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025071721批-pH1.2介质-桨法-50转
 对照品溶液-2-1




WKL-378

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温 :35°C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$WKL-378 - 0-80/11-1558-2 - zzp-2025071721p-z6-rcqx-1-pH1.2jz-jf50z-dz2-2.lcd
 方法文件名: RC\$WKL-378 - WKL-378-rcqx-fx260.lcm
 批处理文件名: RC\$WKL-378 - 20260207-rcqx-FX260.lcb
 样品瓶号 : 3-27
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2026/02/07 23:40:02 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2) : 2026/02/09 11:41:49 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.339	270231	40388	100.000	2904	1.122	--
总计		270231	40388	100.000			

图168 辅酶Q10片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025071721批-pH1.2介质-桨法-50转
 对照品溶液-2-2




WKL-378

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温 :35°C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$WKL-378 - 0-80/11-1559-2 - zzp-2025071721p-z6-rcqx-2-pH1.2jz-jf50z-rj.lcd
 方法文件名: RC\$WKL-378 - WKL-378-rcqx-fx260.lcm
 批处理文件名: RC\$WKL-378 - 20260207-rcqx-FX260.lcb
 样品瓶号 : 4-9
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2026/02/07 23:44:26 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2) : 2026/02/09 11:41:52 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图169 辅酶Q10片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025071721批-pH1.2介质-桨法-50转
 溶剂




WKL-378

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温 :35°C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$WKL-378 - 0-80/11-1560-2 - zzp-2025071721p-z6-rcqx-2-pH1.2jz-jf50z-dz1-1.lcd
 方法文件名: RC\$WKL-378 - WKL-378-rcqx-fx260.lcm
 批处理文件名: RC\$WKL-378 - 20260207-rcqx-FX260.lcb
 样品瓶号 : 4-18
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2026/02/07 23:48:50 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2) : 2026/02/09 11:41:55 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.339	272570	40691	100.000	2896	1.125	--
总计		272570	40691	100.000			

图170 辅酶Q10片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025071721批-pH1.2介质-桨法-50转
 对照品溶液-1-1




WKL-378

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温 :35°C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$WKL-378 - 0-80/11-1561-2 - zzp-2025071721p-z6-rcqx-2-pH1.2jz-jf50z-dz1-2.lcd
 方法文件名: RC\$WKL-378 - WKL-378-rcqx-fx260.lcm
 批处理文件名: RC\$WKL-378 - 20260207-rcqx-FX260.lcb
 样品瓶号 : 4-18
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2026/02/07 23:53:15 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2) : 2026/02/09 11:41:58 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.341	272105	40592	100.000	2903	1.122	--
总计		272105	40592	100.000			

图171 辅酶Q10片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025071721批-pH1.2介质-桨法-50转
 对照品溶液-1-2




WKL-378

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温 :35°C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$WKL-378 - 0-80/11-1562-2 - zzp-2025071721p-z6-rcqx-2-pH1.2jz-jf50z-dz1-3.lcd
 方法文件名: RC\$WKL-378 - WKL-378-rcqx-fx260.lcm
 批处理文件名: RC\$WKL-378 - 20260207-rcqx-FX260.lcb
 样品瓶号 : 4-18
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2026/02/07 23:57:40 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2) : 2026/02/09 11:42:00 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.340	271653	40613	100.000	2906	1.122	--
总计		271653	40613	100.000			

图172 辅酶Q10片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025071721批-pH1.2介质-桨法-50转
 对照品溶液-1-3




WKL-378

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温 :35°C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$WKL-378 - 0-80/11-1563-2 - zzp-2025071721p-z6-rcqx-2-pH1.2jz-jf50z-dz1-4.lcd
 方法文件名: RC\$WKL-378 - WKL-378-rcqx-fx260.lcm
 批处理文件名: RC\$WKL-378 - 20260207-rcqx-FX260.lcb
 样品瓶号 : 4-18
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2026/02/08 00:02:04 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2) : 2026/02/09 11:42:03 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.342	270764	40476	100.000	2915	1.123	--
总计		270764	40476	100.000			

图173 辅酶Q10片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025071721批-pH1.2介质-桨法-50转
 对照品溶液-1-4




WKL-378

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温 :35°C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$WKL-378 - 0-80/11-1564-2 - zzp-2025071721p-z6-rcqx-2-pH1.2jz-jf50z-dz1-5.lcd
 方法文件名: RC\$WKL-378 - WKL-378-rcqx-fx260.lcm
 批处理文件名: RC\$WKL-378 - 20260207-rcqx-FX260.lcb
 样品瓶号 : 4-18
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2026/02/08 00:06:28 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2) : 2026/02/09 11:42:06 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.342	271043	40380	100.000	2914	1.125	--
总计		271043	40380	100.000			

图174 辅酶Q10片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025071721批-pH1.2介质-桨法-50转
 对照品溶液-1-5




WKL-378

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温 :35°C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$WKL-378 - 0-80/11-1565-2 - zzp-2025071721p-z6-rcqx-2-pH1.2jz-jf50z-5min-P1.lcd
 方法文件名: RC\$WKL-378 - WKL-378-rcqx-fx260.lcm
 批处理文件名: RC\$WKL-378 - 20260207-rcqx-FX260.lcb
 样品瓶号 : 4-1
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2026/02/08 00:10:51 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2) : 2026/02/09 11:42:09 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.358	188124	28885	100.000	3128	1.116	--
总计		188124	28885	100.000			

图175 辅酶Q10片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025071721批-pH1.2介质-浆法-50转-5min-片1
 供试品溶液-1




WKL-378

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温 :35°C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$WKL-378 - 0-80/11-1566-2 - zzp-2025071721p-z6-rcqx-2-pH1.2jz-jf50z-5min-P2.lcd
 方法文件名: RC\$WKL-378 - WKL-378-rcqx-fx260.lcm
 批处理文件名: RC\$WKL-378 - 20260207-rcqx-FX260.lcb
 样品瓶号 : 4-10
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2026/02/08 00:15:14 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2) : 2026/02/09 11:42:12 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.358	189389	28943	100.000	3124	1.116	--
总计		189389	28943	100.000			

图176 辅酶Q10片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025071721批-pH1.2介质-浆法-50转-5min-片2
 供试品溶液-1




WKL-378

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温 :35°C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$WKL-378 - 0-80/11-1567-2 - zzp-2025071721p-z6-rcqx-2-pH1.2jz-jf50z-5min-P3.lcd
 方法文件名: RC\$WKL-378 - WKL-378-rcqx-fx260.lcm
 批处理文件名: RC\$WKL-378 - 20260207-rcqx-FX260.lcb
 样品瓶号 : 4-19
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2026/02/08 00:19:36 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2) : 2026/02/09 11:42:15 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.358	189776	29174	100.000	3131	1.118	--
总计		189776	29174	100.000			

图177 辅酶Q10片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025071721批-pH1.2介质-浆法-50转-5min-片3
 供试品溶液-1




WKL-378

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温 :35°C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$WKL-378 - 0-80/11-1568-2 - zzp-2025071721p-z6-rcqx-2-pH1.2jz-jf50z-5min-P4.lcd
 方法文件名: RC\$WKL-378 - WKL-378-rcqx-fx260.lcm
 批处理文件名: RC\$WKL-378 - 20260207-rcqx-FX260.lcb
 样品瓶号 : 4-28
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2026/02/08 00:23:59 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2) : 2026/02/09 11:42:17 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.357	188047	28805	100.000	3119	1.120	--
总计		188047	28805	100.000			

图178 辅酶Q10片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025071721批-pH1.2介质-浆法-50转-5min-片4
 供试品溶液-1




WKL-378

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温 :35°C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$WKL-378 - 0-80/11-1569-2 - zzp-2025071721p-z6-rcqx-2-pH1.2jz-jf50z-5min-P5.lcd
 方法文件名: RC\$WKL-378 - WKL-378-rcqx-fx260.lcm
 批处理文件名: RC\$WKL-378 - 20260207-rcqx-FX260.lcb
 样品瓶号 : 4-37
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2026/02/08 00:28:22 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2) : 2026/02/09 11:42:20 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.359	179099	27516	100.000	3133	1.117	--
总计		179099	27516	100.000			

图179 辅酶Q10片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025071721批-pH1.2介质-浆法-50转-5min-片5
 供试品溶液-1




WKL-378

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温 :35°C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$WKL-378 - 0-80/11-1570-2 - zzp-2025071721p-z6-rcqx-2-pH1.2jz-jf50z-5min-P6.lcd
 方法文件名: RC\$WKL-378 - WKL-378-rcqx-fx260.lcm
 批处理文件名: RC\$WKL-378 - 20260207-rcqx-FX260.lcb
 样品瓶号 : 4-46
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2026/02/08 00:32:44 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2) : 2026/02/09 11:42:23 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.358	193742	29614	100.000	3122	1.121	--
总计		193742	29614	100.000			

图180 辅酶Q10片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025071721批-pH1.2介质-浆法-50转-5min-片6
 供试品溶液-1




WKL-378

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温 :35°C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$WKL-378 - 0-80/11-1571-2 - zzp-2025071721p-z6-rcqx-2-pH1.2jz-jf50z-10min-P1.lcd
 方法文件名: RC\$WKL-378 - WKL-378-rcqx-fx260.lcm
 批处理文件名: RC\$WKL-378 - 20260207-rcqx-FX260.lcb
 样品瓶号 : 4-2
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2026/02/08 00:37:08 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2) : 2026/02/09 11:42:26 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.356	217715	33432	100.000	3106	1.118	--
总计		217715	33432	100.000			

图181 辅酶Q10片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025071721批-pH1.2介质-浆法-50转-10min-片1
 供试品溶液-1




WKL-378

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温 :35°C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$WKL-378 - 0-80/11-1572-2 - zzp-2025071721p-z6-rcqx-2-pH1.2jz-jf50z-10min-P2.lcd
 方法文件名: RC\$WKL-378 - WKL-378-rcqx-fx260.lcm
 批处理文件名: RC\$WKL-378 - 20260207-rcqx-FX260.lcb
 样品瓶号 : 4-11
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2026/02/08 00:41:31 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2) : 2026/02/09 11:42:29 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.356	212484	32553	100.000	3110	1.120	--
总计		212484	32553	100.000			

图182 辅酶Q10片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025071721批-pH1.2介质-浆法-50转-10min-片2
 供试品溶液-1




WKL-378

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温 :35°C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$WKL-378 - 0-80/11-1573-2 - zzp-2025071721p-z6-rcqx-2-pH1.2jz-jf50z-10min-P3.lcd
 方法文件名: RC\$WKL-378 - WKL-378-rcqx-fx260.lcm
 批处理文件名: RC\$WKL-378 - 20260207-rcqx-FX260.lcb
 样品瓶号 : 4-20
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2026/02/08 00:45:54 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2) : 2026/02/09 11:42:32 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.355	218175	33413	100.000	3105	1.122	--
总计		218175	33413	100.000			

图183 辅酶Q10片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025071721批-pH1.2介质-浆法-50转-10min-片3
 供试品溶液-1




WKL-378

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温 :35°C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$WKL-378 - 0-80/11-1574-2 - zzp-2025071721p-z6-rcqx-2-pH1.2jz-jf50z-10min-P4.lcd
 方法文件名: RC\$WKL-378 - WKL-378-rcqx-fx260.lcm
 批处理文件名: RC\$WKL-378 - 20260207-rcqx-FX260.lcb
 样品瓶号 : 4-29
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2026/02/08 00:50:18 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2) : 2026/02/09 11:42:35 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.355	211849	32459	100.000	3102	1.119	--
总计		211849	32459	100.000			

图184 辅酶Q10片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025071721批-pH1.2介质-浆法-50转-10min-片4
 供试品溶液-1




WKL-378

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温 :35°C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$WKL-378 - 0-80/11-1575-2 - zzp-2025071721p-z6-rcqx-2-pH1.2jz-jf50z-10min-P5.lcd
 方法文件名: RC\$WKL-378 - WKL-378-rcqx-fx260.lcm
 批处理文件名: RC\$WKL-378 - 20260207-rcqx-FX260.lcb
 样品瓶号 : 4-38
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2026/02/08 00:54:42 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2) : 2026/02/09 11:42:38 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.356	208656	32077	100.000	3111	1.118	--
总计		208656	32077	100.000			

图185 辅酶Q10片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025071721批-pH1.2介质-浆法-50转-10min-片5
 供试品溶液-1




WKL-378

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温 :35°C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$WKL-378 - 0-80/11-1576-2 - zzp-2025071721p-z6-rcqx-2-pH1.2jz-jf50z-10min-P6.lcd
 方法文件名: RC\$WKL-378 - WKL-378-rcqx-fx260.lcm
 批处理文件名: RC\$WKL-378 - 20260207-rcqx-FX260.lcb
 样品瓶号 : 4-47
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2026/02/08 00:59:04 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2) : 2026/02/09 11:42:41 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.356	217012	33287	100.000	3118	1.118	--
总计		217012	33287	100.000			

图186 辅酶Q10片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025071721批-pH1.2介质-浆法-50转-10min-片6
 供试品溶液-1




WKL-378

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温 :35°C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$WKL-378 - 0-80/11-1577-2 - zzp-2025071721p-z6-rcqx-2-pH1.2jz-jf50z-15min-P1.lcd
 方法文件名: RC\$WKL-378 - WKL-378-rcqx-fx260.lcm
 批处理文件名: RC\$WKL-378 - 20260207-rcqx-FX260.lcb
 样品瓶号 : 4-3
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2026/02/08 01:03:27 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2) : 2026/02/09 11:42:44 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.357	229254	35070	100.000	3104	1.121	--
总计		229254	35070	100.000			

图187 辅酶Q10片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025071721批-pH1.2介质-浆法-50转-15min-片1
 供试品溶液-1




WKL-378

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温 :35°C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$WKL-378 - 0-80/11-1578-2 - zzp-2025071721p-z6-rcqx-2-pH1.2jz-jf50z-15min-P2.lcd
 方法文件名: RC\$WKL-378 - WKL-378-rcqx-fx260.lcm
 批处理文件名: RC\$WKL-378 - 20260207-rcqx-FX260.lcb
 样品瓶号 : 4-12
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2026/02/08 01:07:51 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2) : 2026/02/09 11:42:47 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.356	221595	33981	100.000	3102	1.120	--
总计		221595	33981	100.000			

图188 辅酶Q10片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025071721批-pH1.2介质-桨法-50转-15min-片2
 供试品溶液-1




WKL-378

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温 :35°C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$WKL-378 - 0-80/11-1579-2 - zzp-2025071721p-z6-rcqx-2-pH1.2jz-jf50z-15min-P3.lcd
 方法文件名: RC\$WKL-378 - WKL-378-rcqx-fx260.lcm
 批处理文件名: RC\$WKL-378 - 20260207-rcqx-FX260.lcb
 样品瓶号 : 4-21
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2026/02/08 01:12:14 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2) : 2026/02/09 11:42:50 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.357	227252	34797	100.000	3105	1.122	--
总计		227252	34797	100.000			

图189 辅酶Q10片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025071721批-pH1.2介质-桨法-50转-15min-片3
 供试品溶液-1




WKL-378

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温 :35°C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$WKL-378 - 0-80/11-1580-2 - zzp-2025071721p-z6-rcqx-2-pH1.2jz-jf50z-15min-P4.lcd
 方法文件名: RC\$WKL-378 - WKL-378-rcqx-fx260.lcm
 批处理文件名: RC\$WKL-378 - 20260207-rcqx-FX260.lcb
 样品瓶号 : 4-30
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2026/02/08 01:16:37 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2) : 2026/02/09 11:42:53 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.356	220666	33778	100.000	3100	1.120	--
总计		220666	33778	100.000			

图190 辅酶Q10片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025071721批-pH1.2介质-浆法-50转-15min-片4
 供试品溶液-1




WKL-378

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温 :35°C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$WKL-378 - 0-80/11-1581-2 - zzp-2025071721p-z6-rcqx-2-pH1.2jz-jf50z-15min-P5.lcd
 方法文件名: RC\$WKL-378 - WKL-378-rcqx-fx260.lcm
 批处理文件名: RC\$WKL-378 - 20260207-rcqx-FX260.lcb
 样品瓶号 : 4-39
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2026/02/08 01:21:00 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2) : 2026/02/09 11:42:55 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.356	221279	33889	100.000	3109	1.120	--
总计		221279	33889	100.000			

图191 辅酶Q10片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025071721批-pH1.2介质-浆法-50转-15min-片5
 供试品溶液-1




WKL-378

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温 :35°C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$WKL-378 - 0-80/11-1582-2 - zzp-2025071721p-z6-rcqx-2-pH1.2jz-jf50z-15min-P6.lcd
 方法文件名: RC\$WKL-378 - WKL-378-rcqx-fx260.lcm
 批处理文件名: RC\$WKL-378 - 20260207-rcqx-FX260.lcb
 样品瓶号 : 4-48
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2026/02/08 01:25:23 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2) : 2026/02/09 11:42:58 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.356	226258	34748	100.000	3114	1.120	--
总计		226258	34748	100.000			

图192 辅酶Q10片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025071721批-pH1.2介质-桨法-50转-15min-片6
 供试品溶液-1




WKL-378

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温 :35°C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$WKL-378 - 0-80/11-1583-2 - zzp-2025071721p-z6-rcqx-2-pH1.2jz-jf50z-20min-P1.lcd
 方法文件名: RC\$WKL-378 - WKL-378-rcqx-fx260.lcm
 批处理文件名: RC\$WKL-378 - 20260207-rcqx-FX260.lcb
 样品瓶号 : 4-4
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2026/02/08 01:29:47 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2) : 2026/02/09 11:43:01 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.356	231286	35473	100.000	3105	1.122	--
总计		231286	35473	100.000			

图193 辅酶Q10片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025071721批-pH1.2介质-浆法-50转-20min-片1
 供试品溶液-1




WKL-378

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温 :35°C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$WKL-378 - 0-80/11-1584-2 - zzp-2025071721p-z6-rcqx-2-pH1.2jz-jf50z-20min-P2.lcd
 方法文件名: RC\$WKL-378 - WKL-378-rcqx-fx260.lcm
 批处理文件名: RC\$WKL-378 - 20260207-rcqx-FX260.lcb
 样品瓶号 : 4-13
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2026/02/08 01:34:10 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2) : 2026/02/09 11:43:04 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.356	229022	35160	100.000	3107	1.118	--
总计		229022	35160	100.000			

图194 辅酶Q10片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025071721批-pH1.2介质-浆法-50转-20min-片2
 供试品溶液-1




WKL-378

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温 :35°C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$WKL-378 - 0-80/11-1585-2 - zzp-2025071721p-z6-rcqx-2-pH1.2jz-jf50z-20min-P3.lcd
 方法文件名: RC\$WKL-378 - WKL-378-rcqx-fx260.lcm
 批处理文件名: RC\$WKL-378 - 20260207-rcqx-FX260.lcb
 样品瓶号 : 4-22
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2026/02/08 01:38:34 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2) : 2026/02/09 11:43:07 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.356	231905	35496	100.000	3104	1.121	--
总计		231905	35496	100.000			

图195 辅酶Q10片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025071721批-pH1.2介质-浆法-50转-20min-片3
 供试品溶液-1




WKL-378

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温 :35°C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$WKL-378 - 0-80/11-1586-2 - zzp-2025071721p-z6-rcqx-2-pH1.2jz-jf50z-20min-P4.lcd
 方法文件名: RC\$WKL-378 - WKL-378-rcqx-fx260.lcm
 批处理文件名: RC\$WKL-378 - 20260207-rcqx-FX260.lcb
 样品瓶号 : 4-31
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2026/02/08 01:42:57 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2) : 2026/02/09 11:43:10 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.356	223970	34317	100.000	3106	1.120	--
总计		223970	34317	100.000			

图196 辅酶Q10片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025071721批-pH1.2介质-桨法-50转-20min-片4
 供试品溶液-1




WKL-378

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5µm) 流速: 1.5ml/min
 柱温 :35°C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$WKL-378 - 0-80/11-1587-2 - zzp-2025071721p-z6-rcqx-2-pH1.2jz-jf50z-20min-P5.lcd
 方法文件名: RC\$WKL-378 - WKL-378-rcqx-fx260.lcm
 批处理文件名: RC\$WKL-378 - 20260207-rcqx-FX260.lcb
 样品瓶号 : 4-40
 进样体积 : 20 µl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2026/02/08 01:47:20 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2) : 2026/02/09 11:43:13 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.356	225454	34530	100.000	3107	1.119	--
总计		225454	34530	100.000			

图197 辅酶Q10片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025071721批-pH1.2介质-浆法-50转-20min-片5
 供试品溶液-1




WKL-378

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温 :35°C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$WKL-378 - 0-80/11-1588-2 - zzp-2025071721p-z6-rcqx-2-pH1.2jz-jf50z-20min-P6.lcd
 方法文件名: RC\$WKL-378 - WKL-378-rcqx-fx260.lcm
 批处理文件名: RC\$WKL-378 - 20260207-rcqx-FX260.lcb
 样品瓶号 : 4-49
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2026/02/08 01:51:43 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2) : 2026/02/09 11:43:15 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.357	231853	35600	100.000	3112	1.118	--
总计		231853	35600	100.000			

图198 辅酶Q10片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025071721批-pH1.2介质-浆法-50转-20min-片6
 供试品溶液-1




WKL-378

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温 :35°C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$WKL-378 - 0-80/11-1589-2 - zzp-2025071721p-z6-rcqx-2-pH1.2jz-jf50z-30min-P1.lcd
 方法文件名: RC\$WKL-378 - WKL-378-rcqx-fx260.lcm
 批处理文件名: RC\$WKL-378 - 20260207-rcqx-FX260.lcb
 样品瓶号 : 4-5
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2026/02/08 01:56:07 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2) : 2026/02/09 11:43:18 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.356	234858	35926	100.000	3105	1.122	--
总计		234858	35926	100.000			

图199 辅酶Q10片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025071721批-pH1.2介质-浆法-50转-30min-片1
 供试品溶液-1




WKL-378

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温 :35°C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$WKL-378 - 0-80/11-1590-2 - zzp-2025071721p-z6-rcqx-2-pH1.2jz-jf50z-30min-P2.lcd
 方法文件名: RC\$WKL-378 - WKL-378-rcqx-fx260.lcm
 批处理文件名: RC\$WKL-378 - 20260207-rcqx-FX260.lcb
 样品瓶号 : 4-14
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2026/02/08 02:00:30 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2) : 2026/02/09 11:43:21 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.356	228342	35013	100.000	3103	1.121	--
总计		228342	35013	100.000			

图200 辅酶Q10片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025071721批-pH1.2介质-浆法-50转-30min-片2
 供试品溶液-1




WKL-378

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温 :35°C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$WKL-378 - 0-80/11-1591-2 - zzp-2025071721p-z6-rcqx-2-pH1.2jz-jf50z-30min-P3.lcd
 方法文件名: RC\$WKL-378 - WKL-378-rcqx-fx260.lcm
 批处理文件名: RC\$WKL-378 - 20260207-rcqx-FX260.lcb
 样品瓶号 : 4-23
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2026/02/08 02:04:54 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2) : 2026/02/09 11:43:24 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.356	231489	35524	100.000	3104	1.118	--
总计		231489	35524	100.000			

图201 辅酶Q10片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025071721批-pH1.2介质-浆法-50转-30min-片3
 供试品溶液-1




WKL-378

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温 :35°C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$WKL-378 - 0-80/11-1592-2 - zzp-2025071721p-z6-rcqx-2-pH1.2jz-jf50z-30min-P4.lcd
 方法文件名: RC\$WKL-378 - WKL-378-rcqx-fx260.lcm
 批处理文件名: RC\$WKL-378 - 20260207-rcqx-FX260.lcb
 样品瓶号 : 4-32
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2026/02/08 02:09:18 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2) : 2026/02/09 11:43:26 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.356	224894	34489	100.000	3098	1.120	--
总计		224894	34489	100.000			

图202 辅酶Q10片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025071721批-pH1.2介质-浆法-50转-30min-片4
 供试品溶液-1




WKL-378

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温 :35°C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$WKL-378 - 0-80/11-1593-2 - zzp-2025071721p-z6-rcqx-2-pH1.2jz-jf50z-30min-P5.lcd
 方法文件名: RC\$WKL-378 - WKL-378-rcqx-fx260.lcm
 批处理文件名: RC\$WKL-378 - 20260207-rcqx-FX260.lcb
 样品瓶号 : 4-41
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2026/02/08 02:13:41 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2) : 2026/02/09 11:43:29 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.355	229522	35162	100.000	3100	1.117	--
总计		229522	35162	100.000			

图203 辅酶Q10片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025071721批-pH1.2介质-浆法-50转-30min-片5
 供试品溶液-1




WKL-378

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温 :35°C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$WKL-378 - 0-80/11-1594-2 - zzp-2025071721p-z6-rcqx-2-pH1.2jz-jf50z-30min-P6.lcd
 方法文件名: RC\$WKL-378 - WKL-378-rcqx-fx260.lcm
 批处理文件名: RC\$WKL-378 - 20260207-rcqx-FX260.lcb
 样品瓶号 : 4-50
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2026/02/08 02:18:04 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2) : 2026/02/09 11:43:32 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.357	232505	35584	100.000	3112	1.121	--
总计		232505	35584	100.000			

图204 辅酶Q10片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025071721批-pH1.2介质-浆法-50转-30min-片6
 供试品溶液-1




WKL-378

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温 :35°C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$WKL-378 - 0-80/11-1595-2 - zzp-2025071721p-z6-rcqx-2-pH1.2jz-jf50z-45min-P1.lcd
 方法文件名: RC\$WKL-378 - WKL-378-rcqx-fx260.lcm
 批处理文件名: RC\$WKL-378 - 20260207-rcqx-FX260.lcb
 样品瓶号 : 4-6
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2026/02/08 02:22:28 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2) : 2026/02/09 11:43:35 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.355	235417	36007	100.000	3101	1.120	--
总计		235417	36007	100.000			

图205 辅酶Q10片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025071721批-pH1.2介质-浆法-50转-45min-片1
 供试品溶液-1




WKL-378

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温 :35°C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$WKL-378 - 0-80/11-1596-2 - zzp-2025071721p-z6-rcqx-2-pH1.2jz-jf50z-45min-P2.lcd
 方法文件名: RC\$WKL-378 - WKL-378-rcqx-fx260.lcm
 批处理文件名: RC\$WKL-378 - 20260207-rcqx-FX260.lcb
 样品瓶号 : 4-15
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2026/02/08 02:26:53 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2) : 2026/02/09 11:43:38 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.355	228348	34983	100.000	3106	1.122	--
总计		228348	34983	100.000			

图206 辅酶Q10片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025071721批-pH1.2介质-浆法-50转-45min-片2
 供试品溶液-1




WKL-378

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温 :35°C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$WKL-378 - 0-80/11-1597-2 - zzp-2025071721p-z6-rcqx-2-pH1.2jz-jf50z-45min-P3.lcd
 方法文件名: RC\$WKL-378 - WKL-378-rcqx-fx260.lcm
 批处理文件名: RC\$WKL-378 - 20260207-rcqx-FX260.lcb
 样品瓶号 : 4-24
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2026/02/08 02:31:17 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2) : 2026/02/09 11:43:41 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.356	232900	35693	100.000	3102	1.118	--
总计		232900	35693	100.000			

图207 辅酶Q10片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025071721批-pH1.2介质-浆法-50转-45min-片3
 供试品溶液-1




WKL-378

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温 :35°C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$WKL-378 - 0-80/11-1598-2 - zzp-2025071721p-z6-rcqx-2-pH1.2jz-jf50z-45min-P4.lcd
 方法文件名: RC\$WKL-378 - WKL-378-rcqx-fx260.lcm
 批处理文件名: RC\$WKL-378 - 20260207-rcqx-FX260.lcb
 样品瓶号 : 4-33
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2026/02/08 02:35:40 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2) : 2026/02/09 11:43:44 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.355	226891	34863	100.000	3108	1.119	--
总计		226891	34863	100.000			

图208 辅酶Q10片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025071721批-pH1.2介质-浆法-50转-45min-片4
 供试品溶液-1




WKL-378

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温 :35°C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$WKL-378 - 0-80/11-1599-2 - zzp-2025071721p-z6-rcqx-2-pH1.2jz-jf50z-45min-P5.lcd
 方法文件名: RC\$WKL-378 - WKL-378-rcqx-fx260.lcm
 批处理文件名: RC\$WKL-378 - 20260207-rcqx-FX260.lcb
 样品瓶号 : 4-42
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2026/02/08 02:40:03 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2) : 2026/02/09 11:43:46 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.356	228098	35041	100.000	3108	1.121	--
总计		228098	35041	100.000			

图209 辅酶Q10片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025071721批-pH1.2介质-桨法-50转-45min-片5
 供试品溶液-1




WKL-378

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温 :35°C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$WKL-378 - 0-80/11-1600-2 - zzp-2025071721p-z6-rcqx-2-pH1.2jz-jf50z-45min-P6.lcd
 方法文件名: RC\$WKL-378 - WKL-378-rcqx-fx260.lcm
 批处理文件名: RC\$WKL-378 - 20260207-rcqx-FX260.lcb
 样品瓶号 : 4-51
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2026/02/08 02:44:27 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2) : 2026/02/09 11:43:49 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.356	234737	35962	100.000	3108	1.119	--
总计		234737	35962	100.000			

图210 辅酶Q10片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025071721批-pH1.2介质-浆法-50转-45min-片6
 供试品溶液-1




WKL-378

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温 :35°C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$WKL-378 - 0-80/11-1601-2 - zzp-2025071721p-z6-rcqx-2-pH1.2jz-jf50z-60min-P1.lcd
 方法文件名: RC\$WKL-378 - WKL-378-rcqx-fx260.lcm
 批处理文件名: RC\$WKL-378 - 20260207-rcqx-FX260.lcb
 样品瓶号 : 4-7
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2026/02/08 02:48:51 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2) : 2026/02/09 11:43:52 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.356	236325	36063	100.000	3102	1.123	--
总计		236325	36063	100.000			

图211 辅酶Q10片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025071721批-pH1.2介质-浆法-50转-60min-片1
 供试品溶液-1




WKL-378

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温 :35°C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$WKL-378 - 0-80/11-1602-2 - zzp-2025071721p-z6-rcqx-2-pH1.2jz-jf50z-60min-P2.lcd
 方法文件名: RC\$WKL-378 - WKL-378-rcqx-fx260.lcm
 批处理文件名: RC\$WKL-378 - 20260207-rcqx-FX260.lcb
 样品瓶号 : 4-16
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2026/02/08 02:53:15 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2) : 2026/02/09 11:43:55 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.355	228432	35057	100.000	3109	1.120	--
总计		228432	35057	100.000			

图212 辅酶Q10片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025071721批-pH1.2介质-浆法-50转-60min-片2
 供试品溶液-1




WKL-378

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温 :35°C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$WKL-378 - 0-80/11-1603-2 - zzp-2025071721p-z6-rcqx-2-pH1.2jz-jf50z-60min-P3.lcd
 方法文件名: RC\$WKL-378 - WKL-378-rcqx-fx260.lcm
 批处理文件名: RC\$WKL-378 - 20260207-rcqx-FX260.lcb
 样品瓶号 : 4-25
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2026/02/08 02:57:39 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2) : 2026/02/09 11:43:58 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.356	234347	35862	100.000	3108	1.122	--
总计		234347	35862	100.000			

图213 辅酶Q10片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025071721批-pH1.2介质-浆法-50转-60min-片3
 供试品溶液-1




WKL-378

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温 :35°C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$WKL-378 - 0-80/11-1604-2 - zzp-2025071721p-z6-rcqx-2-pH1.2jz-jf50z-60min-P4.lcd
 方法文件名: RC\$WKL-378 - WKL-378-rcqx-fx260.lcm
 批处理文件名: RC\$WKL-378 - 20260207-rcqx-FX260.lcb
 样品瓶号 : 4-34
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2026/02/08 03:02:03 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2) : 2026/02/09 11:44:01 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.355	227643	34781	100.000	3096	1.123	--
总计		227643	34781	100.000			

图214 辅酶Q10片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025071721批-pH1.2介质-浆法-50转-60min-片4
 供试品溶液-1




WKL-378

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温 :35°C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$WKL-378 - 0-80/11-1605-2 - zzp-2025071721p-z6-rcqx-2-pH1.2jz-jf50z-60min-P5.lcd
 方法文件名: RC\$WKL-378 - WKL-378-rcqx-fx260.lcm
 批处理文件名: RC\$WKL-378 - 20260207-rcqx-FX260.lcb
 样品瓶号 : 4-43
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2026/02/08 03:06:27 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2) : 2026/02/09 11:44:04 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.356	231235	35439	100.000	3106	1.121	--
总计		231235	35439	100.000			

图215 辅酶Q10片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025071721批-pH1.2介质-浆法-50转-60min-片5
 供试品溶液-1




WKL-378

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温 :35°C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$WKL-378 - 0-80/11-1606-2 - zzp-2025071721p-z6-rcqx-2-pH1.2jz-jf50z-60min-P6.lcd
 方法文件名: RC\$WKL-378 - WKL-378-rcqx-fx260.lcm
 批处理文件名: RC\$WKL-378 - 20260207-rcqx-FX260.lcb
 样品瓶号 : 4-52
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2026/02/08 03:10:51 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2) : 2026/02/09 11:44:07 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.356	232791	35780	100.000	3112	1.117	--
总计		232791	35780	100.000			

图216 辅酶Q10片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025071721批-pH1.2介质-浆法-50转-60min-片6
 供试品溶液-1




WKL-378

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5µm) 流速: 1.5ml/min
 柱温 :35°C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$WKL-378 - 0-80/11-1607-2 - zzp-2025071721p-z6-rcqx-2-pH1.2jz-jf50z-jxzs-P1.lcd
 方法文件名: RC\$WKL-378 - WKL-378-rcqx-fx260.lcm
 批处理文件名: RC\$WKL-378 - 20260207-rcqx-FX260.lcb
 样品瓶号 : 4-8
 进样体积 : 20 µl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2026/02/08 03:15:15 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2) : 2026/02/09 11:44:10 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.356	258237	39610	100.000	3101	1.119	--
总计		258237	39610	100.000			

图217 辅酶Q10片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025071721批-pH1.2介质-桨法-50转-极限转速-片1
 供试品溶液-1




WKL-378

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温 :35°C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$WKL-378 - 0-80/11-1608-2 - zzp-2025071721p-z6-rcqx-2-pH1.2jz-jf50z-jxzs-P2.lcd
 方法文件名: RC\$WKL-378 - WKL-378-rcqx-fx260.lcm
 批处理文件名: RC\$WKL-378 - 20260207-rcqx-FX260.lcb
 样品瓶号 : 4-17
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2026/02/08 03:19:39 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2) : 2026/02/09 11:44:12 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.356	255904	39183	100.000	3107	1.120	--
总计		255904	39183	100.000			

图218 辅酶Q10片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025071721批-pH1.2介质-桨法-50转-极限转速-片2
 供试品溶液-1




WKL-378

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温 :35°C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$WKL-378 - 0-80/11-1609-2 - zzp-2025071721p-z6-rcqx-2-pH1.2jz-jf50z-jxzs-P3.lcd
 方法文件名: RC\$WKL-378 - WKL-378-rcqx-fx260.lcm
 批处理文件名: RC\$WKL-378 - 20260207-rcqx-FX260.lcb
 样品瓶号 : 4-26
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2026/02/08 03:24:04 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2) : 2026/02/09 11:44:15 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.355	267469	41039	100.000	3105	1.121	--
总计		267469	41039	100.000			

图219 辅酶Q10片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025071721批-pH1.2介质-桨法-50转-极限转速-片3
 供试品溶液-1




WKL-378

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温 :35°C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$WKL-378 - 0-80/11-1610-2 - zzp-2025071721p-z6-rcqx-2-pH1.2jz-jf50z-jxzs-P4.lcd
 方法文件名: RC\$WKL-378 - WKL-378-rcqx-fx260.lcm
 批处理文件名: RC\$WKL-378 - 20260207-rcqx-FX260.lcb
 样品瓶号 : 4-35
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2026/02/08 03:28:28 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2) : 2026/02/09 11:44:18 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.356	260032	39752	100.000	3102	1.123	--
总计		260032	39752	100.000			

图220 辅酶Q10片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025071721批-pH1.2介质-桨法-50转-极限转速-片4
 供试品溶液-1




WKL-378

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温 :35°C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$WKL-378 - 0-80/11-1611-2 - zzp-2025071721p-z6-rcqx-2-pH1.2jz-jf50z-jxzs-P5.lcd
 方法文件名: RC\$WKL-378 - WKL-378-rcqx-fx260.lcm
 批处理文件名: RC\$WKL-378 - 20260207-rcqx-FX260.lcb
 样品瓶号 : 4-44
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2026/02/08 03:32:52 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2) : 2026/02/09 11:44:21 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.355	256934	39402	100.000	3108	1.119	--
总计		256934	39402	100.000			

图221 辅酶Q10片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025071721批-pH1.2介质-桨法-50转-极限转速-片5
 供试品溶液-1




WKL-378

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温 :35°C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$WKL-378 - 0-80/11-1612-2 - zzp-2025071721p-z6-rcqx-2-pH1.2jz-jf50z-jxzs-P6.lcd
 方法文件名: RC\$WKL-378 - WKL-378-rcqx-fx260.lcm
 批处理文件名: RC\$WKL-378 - 20260207-rcqx-FX260.lcb
 样品瓶号 : 4-53
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2026/02/08 03:37:16 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2) : 2026/02/09 11:44:24 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.356	261568	39943	100.000	3106	1.122	--
总计		261568	39943	100.000			

图222 辅酶Q10片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025071721批-pH1.2介质-桨法-50转-极限转速-片6
 供试品溶液-1




WKL-378

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温 :35°C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$WKL-378 - 0-80/11-1613-2 - zzp-2025071721p-z6-rcqx-2-pH1.2jz-jf50z-dz2-1.lcd
 方法文件名: RC\$WKL-378 - WKL-378-rcqx-fx260.lcm
 批处理文件名: RC\$WKL-378 - 20260207-rcqx-FX260.lcb
 样品瓶号 : 4-27
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2026/02/08 03:41:40 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2) : 2026/02/09 11:44:27 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.339	270534	40336	100.000	2899	1.125	--
总计		270534	40336	100.000			

图223 辅酶Q10片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025071721批-pH1.2介质-桨法-50转
 对照品溶液-2-1




WKL-378

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温 :35°C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$WKL-378 - 0-80/11-1614-2 - zzp-2025071721p-z6-rcqx-2-pH1.2jz-jf50z-dz2-2.lcd
 方法文件名: RC\$WKL-378 - WKL-378-rcqx-fx260.lcm
 批处理文件名: RC\$WKL-378 - 20260207-rcqx-FX260.lcb
 样品瓶号 : 4-27
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2026/02/08 03:46:05 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2) : 2026/02/09 11:44:30 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.341	270364	40377	100.000	2908	1.124	--
总计		270364	40377	100.000			

图224 辅酶Q10片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025071721批-pH1.2介质-浆法-50转
 对照品溶液-2-2




WKL-378

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温 :35°C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$WKL-378 - 0-80/11-1615-2 - zzp-2025071721p-c6-rcqx-1-pH1.2jz-jf50z-rj.lcd
 方法文件名: RC\$WKL-378 - WKL-378-rcqx-fx260.lcm
 批处理文件名: RC\$WKL-378 - 20260207-rcqx-FX260.lcb
 样品瓶号 : 1-9
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2026/02/08 03:50:30 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2) : 2026/02/09 11:44:33 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图225 辅酶Q10片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025071721批-pH1.2介质-桨法-50转
 溶剂




WKL-378

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温 :35°C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$WKL-378 - 0-80/11-1616-2 - zzp-2025071721p-c6-rcqx-1-pH1.2jz-jf50z-dz1-1.lcd
 方法文件名: RC\$WKL-378 - WKL-378-rcqx-fx260.lcm
 批处理文件名: RC\$WKL-378 - 20260207-rcqx-FX260.lcb
 样品瓶号 : 1-18
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2026/02/08 03:54:54 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2) : 2026/02/09 11:44:35 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.341	274219	40788	100.000	2899	1.127	--
总计		274219	40788	100.000			

图226 辅酶Q10片溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
 自制品-2025071721批-pH1.2介质-桨法-50转
 对照品溶液-1-1




WKL-378

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温 :35°C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$WKL-378 - 0-80/11-1617-2 - zzp-2025071721p-c6-rcqx-1-pH1.2jz-jf50z-dz1-2.lcd
 方法文件名: RC\$WKL-378 - WKL-378-rcqx-fx260.lcm
 批处理文件名: RC\$WKL-378 - 20260207-rcqx-FX260.lcb
 样品瓶号 : 1-18 版本号: 6.115
 进样体积 : 20 μl 实验者: xiechaojun
 进样时间 : 2026/02/08 03:59:18 处理者: xiechaojun
 处理时间 (V2) : 2026/02/09 11:44:39
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.342	273270	40713	100.000	2903	1.124	--
总计		273270	40713	100.000			

图227 辅酶Q10片溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
 自制品-2025071721批-pH1.2介质-桨法-50转
 对照品溶液-1-2




WKL-378

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温 :35°C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$WKL-378 - 0-80/11-1618-2 - zzp-2025071721p-c6-rcqx-1-pH1.2jz-jf50z-dz1-3.lcd
 方法文件名: RC\$WKL-378 - WKL-378-rcqx-fx260.lcm
 批处理文件名: RC\$WKL-378 - 20260207-rcqx-FX260.lcb
 样品瓶号 : 1-18
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2026/02/08 04:03:42 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2) : 2026/02/09 11:44:42 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.342	273185	40781	100.000	2914	1.124	--
总计		273185	40781	100.000			

图228 辅酶Q10片溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
 自制品-2025071721批-pH1.2介质-桨法-50转
 对照品溶液-1-3




WKL-378

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温 :35°C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$WKL-378 - 0-80/11-1619-2 - zzp-2025071721p-c6-rcqx-1-pH1.2jz-jf50z-dz1-4.lcd
 方法文件名: RC\$WKL-378 - WKL-378-rcqx-fx260.lcm
 批处理文件名: RC\$WKL-378 - 20260207-rcqx-FX260.lcb
 样品瓶号 : 1-18
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2026/02/08 04:08:06 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2) : 2026/02/09 11:44:45 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.343	273531	40739	100.000	2914	1.124	--
总计		273531	40739	100.000			

图229 辅酶Q10片溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
 自制品-2025071721批-pH1.2介质-桨法-50转
 对照品溶液-1-4




WKL-378

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温 :35°C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$WKL-378 - 0-80/11-1620-2 - zzp-2025071721p-c6-rcqx-1-pH1.2jz-jf50z-dz1-5.lcd
 方法文件名: RC\$WKL-378 - WKL-378-rcqx-fx260.lcm
 批处理文件名: RC\$WKL-378 - 20260207-rcqx-FX260.lcb
 样品瓶号 : 1-18
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2026/02/08 04:12:30 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2) : 2026/02/09 11:44:48 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.342	273183	40765	100.000	2920	1.121	--
总计		273183	40765	100.000			

图230 辅酶Q10片溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
 自制品-2025071721批-pH1.2介质-桨法-50转
 对照品溶液-1-5




WKL-378

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温 :35°C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$WKL-378 - 0-80/11-1621-2 - zzp-2025071721p-c6-rcqx-1-pH1.2jz-jf50z-5min-P1.lcd
 方法文件名: RC\$WKL-378 - WKL-378-rcqx-fx260.lcm
 批处理文件名: RC\$WKL-378 - 20260207-rcqx-FX260.lcb
 样品瓶号 : 1-1
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2026/02/08 04:16:53 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2) : 2026/02/09 11:44:51 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.358	184053	28161	100.000	3119	1.120	--
总计		184053	28161	100.000			

图231 辅酶Q10片溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
 自制品-2025071721批-pH1.2介质-浆法-50转-5min-片1
 供试品溶液-1




WKL-378

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温 :35°C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$WKL-378 - 0-80/11-1622-2 - zzp-2025071721p-c6-rcqx-1-pH1.2jz-jf50z-5min-P2.lcd
 方法文件名: RC\$WKL-378 - WKL-378-rcqx-fx260.lcm
 批处理文件名: RC\$WKL-378 - 20260207-rcqx-FX260.lcb
 样品瓶号 : 1-10
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2026/02/08 04:21:16 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2) : 2026/02/09 11:44:54 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.358	185261	28443	100.000	3131	1.119	--
总计		185261	28443	100.000			

图232 辅酶Q10片溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
 自制品-2025071721批-pH1.2介质-浆法-50转-5min-片2
 供试品溶液-1




WKL-378

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温 :35°C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$WKL-378 - 0-80/11-1623-2 - zzp-2025071721p-c6-rcqx-1-pH1.2jz-jf50z-5min-P3.lcd
 方法文件名: RC\$WKL-378 - WKL-378-rcqx-fx260.lcm
 批处理文件名: RC\$WKL-378 - 20260207-rcqx-FX260.lcb
 样品瓶号 : 1-19
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2026/02/08 04:25:39 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2) : 2026/02/09 11:44:57 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.359	185494	28394	100.000	3129	1.120	--
总计		185494	28394	100.000			

图233 辅酶Q10片溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
 自制品-2025071721批-pH1.2介质-浆法-50转-5min-片3
 供试品溶液-1




WKL-378

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温 :35°C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$WKL-378 - 0-80/11-1624-2 - zzp-2025071721p-c6-rcqx-1-pH1.2jz-jf50z-5min-P4.lcd
 方法文件名: RC\$WKL-378 - WKL-378-rcqx-fx260.lcm
 批处理文件名: RC\$WKL-378 - 20260207-rcqx-FX260.lcb
 样品瓶号 : 1-28
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2026/02/08 04:30:02 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2) : 2026/02/09 11:44:59 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.358	184444	28361	100.000	3127	1.115	--
总计		184444	28361	100.000			

图234 辅酶Q10片溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
 自制品-2025071721批-pH1.2介质-浆法-50转-5min-片4
 供试品溶液-1




WKL-378

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温 :35°C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$WKL-378 - 0-80/11-1625-2 - zzp-2025071721p-c6-rcqx-1-pH1.2jz-jf50z-5min-P5.lcd
 方法文件名: RC\$WKL-378 - WKL-378-rcqx-fx260.lcm
 批处理文件名: RC\$WKL-378 - 20260207-rcqx-FX260.lcb
 样品瓶号 : 1-37
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2026/02/08 04:34:25 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2) : 2026/02/09 11:45:02 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.359	181933	27854	100.000	3123	1.116	--
总计		181933	27854	100.000			

图235 辅酶Q10片溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
 自制品-2025071721批-pH1.2介质-浆法-50转-5min-片5
 供试品溶液-1




WKL-378

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温 :35°C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$WKL-378 - 0-80/11-1626-2 - zzp-2025071721p-c6-rcqx-1-pH1.2jz-jf50z-5min-P6.lcd
 方法文件名: RC\$WKL-378 - WKL-378-rcqx-fx260.lcm
 批处理文件名: RC\$WKL-378 - 20260207-rcqx-FX260.lcb
 样品瓶号 : 1-46
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2026/02/08 04:38:47 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2) : 2026/02/09 11:45:05 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.358	184119	28258	100.000	3126	1.117	--
总计		184119	28258	100.000			

图236 辅酶Q10片溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
 自制品-2025071721批-pH1.2介质-浆法-50转-5min-片6
 供试品溶液-1




WKL-378

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温 :35°C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$WKL-378 - 0-80/11-1627-2 - zzp-2025071721p-c6-rcqx-1-pH1.2jz-jf50z-10min-P1.lcd
 方法文件名: RC\$WKL-378 - WKL-378-rcqx-fx260.lcm
 批处理文件名: RC\$WKL-378 - 20260207-rcqx-FX260.lcb
 样品瓶号 : 1-2
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2026/02/08 04:43:10 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2) : 2026/02/09 11:45:08 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.357	217287	33324	100.000	3120	1.119	--
总计		217287	33324	100.000			

图237 辅酶Q10片溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
 自制品-2025071721批-pH1.2介质-桨法-50转-10min-片1
 供试品溶液-1




WKL-378

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温 :35°C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$WKL-378 - 0-80/11-1628-2 - zzp-2025071721p-c6-rcqx-1-pH1.2jz-jf50z-10min-P2.lcd
 方法文件名: RC\$WKL-378 - WKL-378-rcqx-fx260.lcm
 批处理文件名: RC\$WKL-378 - 20260207-rcqx-FX260.lcb
 样品瓶号 : 1-11
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2026/02/08 04:47:34 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2) : 2026/02/09 11:45:11 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.357	213593	32769	100.000	3116	1.120	--
总计		213593	32769	100.000			

图238 辅酶Q10片溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
 自制品-2025071721批-pH1.2介质-桨法-50转-10min-片2
 供试品溶液-1




WKL-378

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温 :35°C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$WKL-378 - 0-80/11-1629-2 - zzp-2025071721p-c6-rcqx-1-pH1.2jz-jf50z-10min-P3.lcd
 方法文件名: RC\$WKL-378 - WKL-378-rcqx-fx260.lcm
 批处理文件名: RC\$WKL-378 - 20260207-rcqx-FX260.lcb
 样品瓶号 : 1-20
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2026/02/08 04:51:57 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2) : 2026/02/09 11:45:14 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.357	219653	33680	100.000	3115	1.120	--
总计		219653	33680	100.000			

图239 辅酶Q10片溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
 自制品-2025071721批-pH1.2介质-桨法-50转-10min-片3
 供试品溶液-1




WKL-378

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温 :35°C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$WKL-378 - 0-80/11-1630-2 - zzp-2025071721p-c6-rcqx-1-pH1.2jz-jf50z-10min-P4.lcd
 方法文件名: RC\$WKL-378 - WKL-378-rcqx-fx260.lcm
 批处理文件名: RC\$WKL-378 - 20260207-rcqx-FX260.lcb
 样品瓶号 : 1-29
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2026/02/08 04:56:19 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2) : 2026/02/09 11:45:17 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.358	217615	33292	100.000	3120	1.119	--
总计		217615	33292	100.000			

图240 辅酶Q10片溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
 自制品-2025071721批-pH1.2介质-桨法-50转-10min-片4
 供试品溶液-1




WKL-378

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温 :35°C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$WKL-378 - 0-80/11-1631-2 - zzp-2025071721p-c6-rcqx-1-pH1.2jz-jf50z-10min-P5.lcd
 方法文件名: RC\$WKL-378 - WKL-378-rcqx-fx260.lcm
 批处理文件名: RC\$WKL-378 - 20260207-rcqx-FX260.lcb
 样品瓶号 : 1-38
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2026/02/08 05:00:42 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2) : 2026/02/09 11:45:20 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.357	217045	33270	100.000	3116	1.120	--
总计		217045	33270	100.000			

图241 辅酶Q10片溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
 自制品-2025071721批-pH1.2介质-桨法-50转-10min-片5
 供试品溶液-1




WKL-378

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温 :35°C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$WKL-378 - 0-80/11-1632-2 - zzp-2025071721p-c6-rcqx-1-pH1.2jz-jf50z-10min-P6.lcd
 方法文件名: RC\$WKL-378 - WKL-378-rcqx-fx260.lcm
 批处理文件名: RC\$WKL-378 - 20260207-rcqx-FX260.lcb
 样品瓶号 : 1-47
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2026/02/08 05:05:05 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2) : 2026/02/09 11:45:23 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.358	213756	32812	100.000	3116	1.118	--
总计		213756	32812	100.000			

图242 辅酶Q10片溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
 自制品-2025071721批-pH1.2介质-桨法-50转-10min-片6
 供试品溶液-1




WKL-378

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温 :35°C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$WKL-378 - 0-80/11-1633-2 - zzp-2025071721p-c6-rcqx-1-pH1.2jz-jf50z-15min-P1.lcd
 方法文件名: RC\$WKL-378 - WKL-378-rcqx-fx260.lcm
 批处理文件名: RC\$WKL-378 - 20260207-rcqx-FX260.lcb
 样品瓶号 : 1-3
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2026/02/08 05:09:28 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2) : 2026/02/09 11:45:26 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.357	227001	34867	100.000	3117	1.119	--
总计		227001	34867	100.000			

图243 辅酶Q10片溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
 自制品-2025071721批-pH1.2介质-桨法-50转-15min-片1
 供试品溶液-1




WKL-378

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温 :35°C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$WKL-378 - 0-80/11-1634-2 - zzp-2025071721p-c6-rcqx-1-pH1.2jz-jf50z-15min-P2.lcd
 方法文件名: RC\$WKL-378 - WKL-378-rcqx-fx260.lcm
 批处理文件名: RC\$WKL-378 - 20260207-rcqx-FX260.lcb
 样品瓶号 : 1-12
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2026/02/08 05:13:50 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2) : 2026/02/09 11:45:29 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.357	228582	35162	100.000	3120	1.118	--
总计		228582	35162	100.000			

图244 辅酶Q10片溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
 自制品-2025071721批-pH1.2介质-桨法-50转-15min-片2
 供试品溶液-1




WKL-378

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温 :35°C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$WKL-378 - 0-80/11-1635-2 - zzp-2025071721p-c6-rcqx-1-pH1.2jz-jf50z-15min-P3.lcd
 方法文件名: RC\$WKL-378 - WKL-378-rcqx-fx260.lcm
 批处理文件名: RC\$WKL-378 - 20260207-rcqx-FX260.lcb
 样品瓶号 : 1-21
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2026/02/08 05:18:13 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2) : 2026/02/09 11:45:32 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.356	229579	35232	100.000	3115	1.120	--
总计		229579	35232	100.000			

图245 辅酶Q10片溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
 自制品-2025071721批-pH1.2介质-桨法-50转-15min-片3
 供试品溶液-1




WKL-378

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5µm) 流速: 1.5ml/min
 柱温 :35°C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$WKL-378 - 0-80/11-1636-2 - zzp-2025071721p-c6-rcqx-1-pH1.2jz-jf50z-15min-P4.lcd
 方法文件名: RC\$WKL-378 - WKL-378-rcqx-fx260.lcm
 批处理文件名: RC\$WKL-378 - 20260207-rcqx-FX260.lcb
 样品瓶号 : 1-30
 进样体积 : 20 µl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2026/02/08 05:22:37 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2) : 2026/02/09 11:45:34 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.357	226892	34849	100.000	3115	1.118	--
总计		226892	34849	100.000			

图246 辅酶Q10片溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
 自制品-2025071721批-pH1.2介质-桨法-50转-15min-片4
 供试品溶液-1




WKL-378

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温 :35°C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$WKL-378 - 0-80/11-1637-2 - zzp-2025071721p-c6-rcqx-1-pH1.2jz-jf50z-15min-P5.lcd
 方法文件名: RC\$WKL-378 - WKL-378-rcqx-fx260.lcm
 批处理文件名: RC\$WKL-378 - 20260207-rcqx-FX260.lcb
 样品瓶号 : 1-39
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2026/02/08 05:26:59 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2) : 2026/02/09 11:45:37 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.356	228401	35120	100.000	3117	1.118	--
总计		228401	35120	100.000			

图247 辅酶Q10片溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
 自制品-2025071721批-pH1.2介质-桨法-50转-15min-片5
 供试品溶液-1




WKL-378

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温 :35°C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$WKL-378 - 0-80/11-1638-2 - zzp-2025071721p-c6-rcqx-1-pH1.2jz-jf50z-15min-P6.lcd
 方法文件名: RC\$WKL-378 - WKL-378-rcqx-fx260.lcm
 批处理文件名: RC\$WKL-378 - 20260207-rcqx-FX260.lcb
 样品瓶号 : 1-48
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2026/02/08 05:31:22 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2) : 2026/02/09 11:45:40 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.357	225093	34512	100.000	3114	1.118	--
总计		225093	34512	100.000			

图248 辅酶Q10片溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
 自制品-2025071721批-pH1.2介质-桨法-50转-15min-片6
 供试品溶液-1




WKL-378

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温 :35°C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$WKL-378 - 0-80/11-1639-2 - zzp-2025071721p-c6-rcqx-1-pH1.2jz-jf50z-20min-P1.lcd
 方法文件名: RC\$WKL-378 - WKL-378-rcqx-fx260.lcm
 批处理文件名: RC\$WKL-378 - 20260207-rcqx-FX260.lcb
 样品瓶号 : 1-4
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2026/02/08 05:35:45 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2) : 2026/02/09 11:45:43 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.357	231986	35605	100.000	3117	1.118	--
总计		231986	35605	100.000			

图249 辅酶Q10片溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
 自制品-2025071721批-pH1.2介质-桨法-50转-20min-片1
 供试品溶液-1




WKL-378

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温 :35°C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$WKL-378 - 0-80/11-1640-2 - zzp-2025071721p-c6-rcqx-1-pH1.2jz-jf50z-20min-P2.lcd
 方法文件名: RC\$WKL-378 - WKL-378-rcqx-fx260.lcm
 批处理文件名: RC\$WKL-378 - 20260207-rcqx-FX260.lcb
 样品瓶号 : 1-13
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2026/02/08 05:40:09 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2) : 2026/02/09 11:45:46 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.357	225682	34588	100.000	3110	1.118	--
总计		225682	34588	100.000			

图250 辅酶Q10片溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
 自制品-2025071721批-pH1.2介质-桨法-50转-20min-片2
 供试品溶液-1




WKL-378

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温 :35°C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$WKL-378 - 0-80/11-1641-2 - zzp-2025071721p-c6-rcqx-1-pH1.2jz-jf50z-20min-P3.lcd
 方法文件名: RC\$WKL-378 - WKL-378-rcqx-fx260.lcm
 批处理文件名: RC\$WKL-378 - 20260207-rcqx-FX260.lcb
 样品瓶号 : 1-22
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2026/02/08 05:44:32 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2) : 2026/02/09 11:45:48 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.358	232463	35639	100.000	3118	1.119	--
总计		232463	35639	100.000			

图251 辅酶Q10片溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
 自制品-2025071721批-pH1.2介质-桨法-50转-20min-片3
 供试品溶液-1




WKL-378

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温 :35°C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$WKL-378 - 0-80/11-1642-2 - zzp-2025071721p-c6-rcqx-1-pH1.2jz-jf50z-20min-P4.lcd
 方法文件名: RC\$WKL-378 - WKL-378-rcqx-fx260.lcm
 批处理文件名: RC\$WKL-378 - 20260207-rcqx-FX260.lcb
 样品瓶号 : 1-31
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2026/02/08 05:48:55 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2) : 2026/02/09 11:45:51 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.356	231179	35549	100.000	3114	1.117	--
总计		231179	35549	100.000			

图252 辅酶Q10片溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
 自制品-2025071721批-pH1.2介质-桨法-50转-20min-片4
 供试品溶液-1




WKL-378

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温 :35°C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$WKL-378 - 0-80/11-1643-2 - zzp-2025071721p-c6-rcqx-1-pH1.2jz-jf50z-20min-P5.lcd
 方法文件名: RC\$WKL-378 - WKL-378-rcqx-fx260.lcm
 批处理文件名: RC\$WKL-378 - 20260207-rcqx-FX260.lcb
 样品瓶号 : 1-40
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2026/02/08 05:53:18 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2) : 2026/02/09 11:45:54 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.357	233264	35670	100.000	3109	1.120	--
总计		233264	35670	100.000			

图253 辅酶Q10片溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
 自制品-2025071721批-pH1.2介质-浆法-50转-20min-片5
 供试品溶液-1




WKL-378

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温 :35°C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$WKL-378 - 0-80/11-1644-2 - zzp-2025071721p-c6-rcqx-1-pH1.2jz-jf50z-20min-P6.lcd
 方法文件名: RC\$WKL-378 - WKL-378-rcqx-fx260.lcm
 批处理文件名: RC\$WKL-378 - 20260207-rcqx-FX260.lcb
 样品瓶号 : 1-49
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2026/02/08 05:57:40 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2) : 2026/02/09 11:45:57 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.356	229780	35192	100.000	3110	1.120	--
总计		229780	35192	100.000			

图254 辅酶Q10片溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
 自制品-2025071721批-pH1.2介质-浆法-50转-20min-片6
 供试品溶液-1




WKL-378

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5µm) 流速: 1.5ml/min
 柱温 :35°C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$WKL-378 - 0-80/11-1645-2 - zzp-2025071721p-c6-rcqx-1-pH1.2jz-jf50z-30min-P1.lcd
 方法文件名: RC\$WKL-378 - WKL-378-rcqx-fx260.lcm
 批处理文件名: RC\$WKL-378 - 20260207-rcqx-FX260.lcb
 样品瓶号 : 1-5
 进样体积 : 20 µl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2026/02/08 06:02:04 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2) : 2026/02/09 11:46:00 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.358	233963	35845	100.000	3120	1.119	--
总计		233963	35845	100.000			

图255 辅酶Q10片溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
 自制品-2025071721批-pH1.2介质-桨法-50转-30min-片1
 供试品溶液-1




WKL-378

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温 :35°C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$WKL-378 - 0-80/11-1646-2 - zzp-2025071721p-c6-rcqx-1-pH1.2jz-jf50z-30min-P2.lcd
 方法文件名: RC\$WKL-378 - WKL-378-rcqx-fx260.lcm
 批处理文件名: RC\$WKL-378 - 20260207-rcqx-FX260.lcb
 样品瓶号 : 1-14
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2026/02/08 06:06:26 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2) : 2026/02/09 11:46:03 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.357	227614	35005	100.000	3112	1.118	--
总计		227614	35005	100.000			

图256 辅酶Q10片溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
 自制品-2025071721批-pH1.2介质-桨法-50转-30min-片2
 供试品溶液-1




WKL-378

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温 :35°C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$WKL-378 - 0-80/11-1647-2 - zzp-2025071721p-c6-rcqx-1-pH1.2jz-jf50z-30min-P3.lcd
 方法文件名: RC\$WKL-378 - WKL-378-rcqx-fx260.lcm
 批处理文件名: RC\$WKL-378 - 20260207-rcqx-FX260.lcb
 样品瓶号 : 1-23
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2026/02/08 06:10:49 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2) : 2026/02/09 11:46:06 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.357	233837	35783	100.000	3114	1.119	--
总计		233837	35783	100.000			

图257 辅酶Q10片溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
 自制品-2025071721批-pH1.2介质-桨法-50转-30min-片3
 供试品溶液-1




WKL-378

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温 :35°C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$WKL-378 - 0-80/11-1648-2 - zzp-2025071721p-c6-rcqx-1-pH1.2jz-jf50z-30min-P4.lcd
 方法文件名: RC\$WKL-378 - WKL-378-rcqx-fx260.lcm
 批处理文件名: RC\$WKL-378 - 20260207-rcqx-FX260.lcb
 样品瓶号 : 1-32
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2026/02/08 06:15:12 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2) : 2026/02/09 11:46:09 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.357	235098	36042	100.000	3113	1.119	--
总计		235098	36042	100.000			

图258 辅酶Q10片溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
 自制品-2025071721批-pH1.2介质-桨法-50转-30min-片4
 供试品溶液-1




WKL-378

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温 :35°C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$WKL-378 - 0-80/11-1649-2 - zzp-2025071721p-c6-rcqx-1-pH1.2jz-jf50z-30min-P5.lcd
 方法文件名: RC\$WKL-378 - WKL-378-rcqx-fx260.lcm
 批处理文件名: RC\$WKL-378 - 20260207-rcqx-FX260.lcb
 样品瓶号 : 1-41
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2026/02/08 06:19:34 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2) : 2026/02/09 11:46:11 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.357	234956	35982	100.000	3112	1.120	--
总计		234956	35982	100.000			

图259 辅酶Q10片溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
 自制品-2025071721批-pH1.2介质-桨法-50转-30min-片5
 供试品溶液-1




WKL-378

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温 :35°C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$WKL-378 - 0-80/11-1650-2 - zzp-2025071721p-c6-rcqx-1-pH1.2jz-jf50z-30min-P6.lcd
 方法文件名: RC\$WKL-378 - WKL-378-rcqx-fx260.lcm
 批处理文件名: RC\$WKL-378 - 20260207-rcqx-FX260.lcb
 样品瓶号 : 1-50
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2026/02/08 06:23:56 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2) : 2026/02/09 11:46:14 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.358	232898	35608	100.000	3110	1.120	--
总计		232898	35608	100.000			

图260 辅酶Q10片溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
 自制品-2025071721批-pH1.2介质-浆法-50转-30min-片6
 供试品溶液-1




WKL-378

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温 :35°C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$WKL-378 - 0-80/11-1651-2 - zzp-2025071721p-c6-rcqx-1-pH1.2jz-jf50z-45min-P1.lcd
 方法文件名: RC\$WKL-378 - WKL-378-rcqx-fx260.lcm
 批处理文件名: RC\$WKL-378 - 20260207-rcqx-FX260.lcb
 样品瓶号 : 1-6
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2026/02/08 06:28:20 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2) : 2026/02/09 11:46:17 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.356	233973	35966	100.000	3118	1.117	--
总计		233973	35966	100.000			

图261 辅酶Q10片溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
 自制品-2025071721批-pH1.2介质-浆法-50转-45min-片1
 供试品溶液-1




WKL-378

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温 :35°C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$WKL-378 - 0-80/11-1652-2 - zzp-2025071721p-c6-rcqx-1-pH1.2jz-jf50z-45min-P2.lcd
 方法文件名: RC\$WKL-378 - WKL-378-rcqx-fx260.lcm
 批处理文件名: RC\$WKL-378 - 20260207-rcqx-FX260.lcb
 样品瓶号 : 1-15
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2026/02/08 06:32:44 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2) : 2026/02/09 11:46:20 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.357	229404	35091	100.000	3108	1.118	--
总计		229404	35091	100.000			

图262 辅酶Q10片溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
 自制品-2025071721批-pH1.2介质-浆法-50转-45min-片2
 供试品溶液-1




WKL-378

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温 :35°C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$WKL-378 - 0-80/11-1653-2 - zzp-2025071721p-c6-rcqx-1-pH1.2jz-jf50z-45min-P3.lcd
 方法文件名: RC\$WKL-378 - WKL-378-rcqx-fx260.lcm
 批处理文件名: RC\$WKL-378 - 20260207-rcqx-FX260.lcb
 样品瓶号 : 1-24
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2026/02/08 06:37:07 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2) : 2026/02/09 11:46:23 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.356	235961	36252	100.000	3115	1.116	--
总计		235961	36252	100.000			

图263 辅酶Q10片溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
 自制品-2025071721批-pH1.2介质-浆法-50转-45min-片3
 供试品溶液-1




WKL-378

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温 :35°C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$WKL-378 - 0-80/11-1654-2 - zzp-2025071721p-c6-rcqx-1-pH1.2jz-jf50z-45min-P4.lcd
 方法文件名: RC\$WKL-378 - WKL-378-rcqx-fx260.lcm
 批处理文件名: RC\$WKL-378 - 20260207-rcqx-FX260.lcb
 样品瓶号 : 1-33
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2026/02/08 06:41:30 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2) : 2026/02/09 11:46:26 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.356	238096	36478	100.000	3107	1.120	--
总计		238096	36478	100.000			

图264 辅酶Q10片溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
 自制品-2025071721批-pH1.2介质-桨法-50转-45min-片4
 供试品溶液-1




WKL-378

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温 :35°C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$WKL-378 - 0-80/11-1655-2 - zzp-2025071721p-c6-rcqx-1-pH1.2jz-jf50z-45min-P5.lcd
 方法文件名: RC\$WKL-378 - WKL-378-rcqx-fx260.lcm
 批处理文件名: RC\$WKL-378 - 20260207-rcqx-FX260.lcb
 样品瓶号 : 1-42
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2026/02/08 06:45:53 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2) : 2026/02/09 11:46:29 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.355	236028	36271	100.000	3117	1.119	--
总计		236028	36271	100.000			

图265 辅酶Q10片溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
 自制品-2025071721批-pH1.2介质-桨法-50转-45min-片5
 供试品溶液-1




WKL-378

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温 :35°C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$WKL-378 - 0-80/11-1656-2 - zzp-2025071721p-c6-rcqx-1-pH1.2jz-jf50z-45min-P6.lcd
 方法文件名: RC\$WKL-378 - WKL-378-rcqx-fx260.lcm
 批处理文件名: RC\$WKL-378 - 20260207-rcqx-FX260.lcb
 样品瓶号 : 1-51
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2026/02/08 06:50:16 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2) : 2026/02/09 11:46:32 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.357	234528	35931	100.000	3109	1.119	--
总计		234528	35931	100.000			

图266 辅酶Q10片溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
 自制品-2025071721批-pH1.2介质-浆法-50转-45min-片6
 供试品溶液-1




WKL-378

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温 :35°C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$WKL-378 - 0-80/11-1657-2 - zzp-2025071721p-c6-rcqx-1-pH1.2jz-jf50z-60min-P1.lcd
 方法文件名: RC\$WKL-378 - WKL-378-rcqx-fx260.lcm
 批处理文件名: RC\$WKL-378 - 20260207-rcqx-FX260.lcb
 样品瓶号 : 1-7
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2026/02/08 06:54:40 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2) : 2026/02/09 11:46:34 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.357	234597	36022	100.000	3110	1.116	--
总计		234597	36022	100.000			

图267 辅酶Q10片溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
 自制品-2025071721批-pH1.2介质-桨法-50转-60min-片1
 供试品溶液-1




WKL-378

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温 :35°C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$WKL-378 - 0-80/11-1658-2 - zzp-2025071721p-c6-rcqx-1-pH1.2jz-jf50z-60min-P2.lcd
 方法文件名: RC\$WKL-378 - WKL-378-rcqx-fx260.lcm
 批处理文件名: RC\$WKL-378 - 20260207-rcqx-FX260.lcb
 样品瓶号 : 1-16
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2026/02/08 06:59:03 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2) : 2026/02/09 11:46:37 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.356	228555	35083	100.000	3109	1.121	--
总计		228555	35083	100.000			

图268 辅酶Q10片溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
 自制品-2025071721批-pH1.2介质-浆法-50转-60min-片2
 供试品溶液-1




WKL-378

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温 :35°C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$WKL-378 - 0-80/11-1659-2 - zzp-2025071721p-c6-rcqx-1-pH1.2jz-jf50z-60min-P3.lcd
 方法文件名: RC\$WKL-378 - WKL-378-rcqx-fx260.lcm
 批处理文件名: RC\$WKL-378 - 20260207-rcqx-FX260.lcb
 样品瓶号 : 1-25
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2026/02/08 07:03:25 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2) : 2026/02/09 11:46:40 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.356	234918	36030	100.000	3107	1.118	--
总计		234918	36030	100.000			

图269 辅酶Q10片溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
 自制品-2025071721批-pH1.2介质-浆法-50转-60min-片3
 供试品溶液-1




WKL-378

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温 :35°C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$WKL-378 - 0-80/11-1660-2 - zzp-2025071721p-c6-rcqx-1-pH1.2jz-jf50z-60min-P4.lcd
 方法文件名: RC\$WKL-378 - WKL-378-rcqx-fx260.lcm
 批处理文件名: RC\$WKL-378 - 20260207-rcqx-FX260.lcb
 样品瓶号 : 1-34
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2026/02/08 07:07:47 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2) : 2026/02/09 11:46:44 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.356	236161	36067	100.000	3104	1.120	--
总计		236161	36067	100.000			

图270 辅酶Q10片溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
 自制品-2025071721批-pH1.2介质-浆法-50转-60min-片4
 供试品溶液-1




WKL-378

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温 :35°C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$WKL-378 - 0-80/11-1661-2 - zzp-2025071721p-c6-rcqx-1-pH1.2jz-jf50z-60min-P5.lcd
 方法文件名: RC\$WKL-378 - WKL-378-rcqx-fx260.lcm
 批处理文件名: RC\$WKL-378 - 20260207-rcqx-FX260.lcb
 样品瓶号 : 1-43
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2026/02/08 07:12:10 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2) : 2026/02/09 11:46:47 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.357	235996	36219	100.000	3113	1.117	--
总计		235996	36219	100.000			

图271 辅酶Q10片溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
 自制品-2025071721批-pH1.2介质-桨法-50转-60min-片5
 供试品溶液-1




WKL-378

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温 :35°C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$WKL-378 - 0-80/11-1662-2 - zzp-2025071721p-c6-rcqx-1-pH1.2jz-jf50z-60min-P6.lcd
 方法文件名: RC\$WKL-378 - WKL-378-rcqx-fx260.lcm
 批处理文件名: RC\$WKL-378 - 20260207-rcqx-FX260.lcb
 样品瓶号 : 1-52
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2026/02/08 07:16:34 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2) : 2026/02/09 11:46:50 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.356	236650	36315	100.000	3114	1.117	--
总计		236650	36315	100.000			

图272 辅酶Q10片溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
 自制品-2025071721批-pH1.2介质-浆法-50转-60min-片6
 供试品溶液-1




WKL-378

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温 :35°C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$WKL-378 - 0-80/11-1663-2 - zzp-2025071721p-c6-rcqx-1-pH1.2jz-jf50z-jxzs-P1.lcd
 方法文件名: RC\$WKL-378 - WKL-378-rcqx-fx260.lcm
 批处理文件名: RC\$WKL-378 - 20260207-rcqx-FX260.lcb
 样品瓶号 : 1-8
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2026/02/08 07:20:57 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2) : 2026/02/09 11:46:52 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.359	257115	39365	100.000	3122	1.119	--
总计		257115	39365	100.000			

图273 辅酶Q10片溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
 自制品-2025071721批-pH1.2介质-桨法-50转-极限转速-片1
 供试品溶液-1




WKL-378

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温 :35°C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$WKL-378 - 0-80/11-1664-2 - zzp-2025071721p-c6-rcqx-1-pH1.2jz-jf50z-jxzs-P2.lcd
 方法文件名: RC\$WKL-378 - WKL-378-rcqx-fx260.lcm
 批处理文件名: RC\$WKL-378 - 20260207-rcqx-FX260.lcb
 样品瓶号 : 1-17
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2026/02/08 07:25:20 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2) : 2026/02/09 11:46:55 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.356	257078	39444	100.000	3109	1.118	--
总计		257078	39444	100.000			

图274 辅酶Q10片溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
 自制品-2025071721批-pH1.2介质-桨法-50转-极限转速-片2
 供试品溶液-1




WKL-378

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温 :35°C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$WKL-378 - 0-80/11-1665-2 - zzp-2025071721p-c6-rcqx-1-pH1.2jz-jf50z-jxzs-P3.lcd
 方法文件名: RC\$WKL-378 - WKL-378-rcqx-fx260.lcm
 批处理文件名: RC\$WKL-378 - 20260207-rcqx-FX260.lcb
 样品瓶号 : 1-26
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2026/02/08 07:29:44 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2) : 2026/02/09 11:46:58 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.357	265224	40574	100.000	3111	1.121	--
总计		265224	40574	100.000			

图275 辅酶Q10片溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
 自制品-2025071721批-pH1.2介质-桨法-50转-极限转速-片3
 供试品溶液-1




WKL-378

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温 :35°C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$WKL-378 - 0-80/11-1666-2 - zzp-2025071721p-c6-rcqx-1-pH1.2jz-jf50z-jxzs-P4.lcd
 方法文件名: RC\$WKL-378 - WKL-378-rcqx-fx260.lcm
 批处理文件名: RC\$WKL-378 - 20260207-rcqx-FX260.lcb
 样品瓶号 : 1-35
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2026/02/08 07:34:08 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2) : 2026/02/09 11:47:01 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.356	263617	40375	100.000	3106	1.119	--
总计		263617	40375	100.000			

图276 辅酶Q10片溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
 自制品-2025071721批-pH1.2介质-桨法-50转-极限转速-片4
 供试品溶液-1




WKL-378

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温 :35°C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$WKL-378 - 0-80/11-1667-2 - zzp-2025071721p-c6-rcqx-1-pH1.2jz-jf50z-jxzs-P5.lcd
 方法文件名: RC\$WKL-378 - WKL-378-rcqx-fx260.lcm
 批处理文件名: RC\$WKL-378 - 20260207-rcqx-FX260.lcb
 样品瓶号 : 1-44
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2026/02/08 07:38:31 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2) : 2026/02/09 11:47:04 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.356	267173	40747	100.000	3108	1.119	--
总计		267173	40747	100.000			

图277 辅酶Q10片溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
 自制品-2025071721批-pH1.2介质-桨法-50转-极限转速-片5
 供试品溶液-1




WKL-378

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温 :35°C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$WKL-378 - 0-80/11-1668-2 - zzp-2025071721p-c6-rcqx-1-pH1.2jz-jf50z-jxzs-P6.lcd
 方法文件名: RC\$WKL-378 - WKL-378-rcqx-fx260.lcm
 批处理文件名: RC\$WKL-378 - 20260207-rcqx-FX260.lcb
 样品瓶号 : 1-53
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2026/02/08 07:42:54 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2) : 2026/02/09 11:47:07 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.356	260362	39945	100.000	3110	1.118	--
总计		260362	39945	100.000			

图278 辅酶Q10片溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
 自制品-2025071721批-pH1.2介质-桨法-50转-极限转速-片6
 供试品溶液-1




WKL-378

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温 :35°C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$WKL-378 - 0-80/11-1669-2 - zzp-2025071721p-c6-rcqx-1-pH1.2jz-jf50z-dz2-1.lcd
 方法文件名: RC\$WKL-378 - WKL-378-rcqx-fx260.lcm
 批处理文件名: RC\$WKL-378 - 20260207-rcqx-FX260.lcb
 样品瓶号 : 1-27
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2026/02/08 07:47:17 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2) : 2026/02/09 11:47:10 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.342	271573	40480	100.000	2896	1.124	--
总计		271573	40480	100.000			

图279 辅酶Q10片溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
 自制品-2025071721批-pH1.2介质-桨法-50转
 对照品溶液-2-1




WKL-378

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温 :35°C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$WKL-378 - 0-80/11-1670-2 - zzp-2025071721p-c6-rcqx-1-pH1.2jz-jf50z-dz2-2.lcd
 方法文件名: RC\$WKL-378 - WKL-378-rcqx-fx260.lcm
 批处理文件名: RC\$WKL-378 - 20260207-rcqx-FX260.lcb
 样品瓶号 : 1-27
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2026/02/08 07:51:41 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2) : 2026/02/09 11:47:13 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.342	272330	40471	100.000	2905	1.125	--
总计		272330	40471	100.000			

图280 辅酶Q10片溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
 自制品-2025071721批-pH1.2介质-桨法-50转
 对照品溶液-2-2




WKL-378

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温 :35°C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$WKL-378 - 0-81/29-396-2 - zzp-2025071721p-c6-rcqx-2-pH1.2jz-jf50z-rj.lcd
 方法文件名: RC\$WKL-378 - WKL-378-rcqx-fx278.lcm
 批处理文件名: RC\$WKL-378 - 20260207-rcqx-FX278.lcb
 样品瓶号 : 2-9
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2026/02/07 19:18:03 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2) : 2026/02/09 11:56:13 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图281 辅酶Q10片溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
 自制品-2025071721批-pH1.2介质-桨法-50转
 溶剂




WKL-378

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温 :35°C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$WKL-378 - 0-81/29-397-2 - zzp-2025071721p-c6-rcqx-2-pH1.2jz-jf50z-dz1-1.lcd
 方法文件名: RC\$WKL-378 - WKL-378-rcqx-fx278.lcm
 批处理文件名: RC\$WKL-378 - 20260207-rcqx-FX278.lcb
 样品瓶号 : 2-18
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2026/02/07 19:22:28 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2) : 2026/02/09 11:56:16 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.302	273249	32090	100.000	1774	1.297	--
总计		273249	32090	100.000			

图282 辅酶Q10片溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
 自制品-2025071721批-pH1.2介质-桨法-50转
 对照品溶液-1-1




WKL-378

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温 :35°C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$WKL-378 - 0-81/29-398-2 - zzp-2025071721p-c6-rcqx-2-pH1.2jz-jf50z-dz1-2.lcd
 方法文件名: RC\$WKL-378 - WKL-378-rcqx-fx278.lcm
 批处理文件名: RC\$WKL-378 - 20260207-rcqx-FX278.lcb
 样品瓶号 : 2-18
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2026/02/07 19:26:53 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2) : 2026/02/09 11:56:19 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.300	274012	32055	100.000	1768	1.307	--
总计		274012	32055	100.000			

图283 辅酶Q10片溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
 自制品-2025071721批-pH1.2介质-桨法-50转
 对照品溶液-1-2




WKL-378

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温 :35°C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$WKL-378 - 0-81/29-399-2 - zzp-2025071721p-c6-rcqx-2-pH1.2jz-jf50z-dz1-3.lcd
 方法文件名: RC\$WKL-378 - WKL-378-rcqx-fx278.lcm
 批处理文件名: RC\$WKL-378 - 20260207-rcqx-FX278.lcb
 样品瓶号 : 2-18
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2026/02/07 19:31:18 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2) : 2026/02/09 11:56:22 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.302	273206	31974	100.000	1770	1.309	--
总计		273206	31974	100.000			

图284 辅酶Q10片溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
 自制品-2025071721批-pH1.2介质-桨法-50转
 对照品溶液-1-3




WKL-378

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温 :35°C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$WKL-378 - 0-81/29-400-2 - zzp-2025071721p-c6-rcqx-2-pH1.2jz-jf50z-dz1-4.lcd
 方法文件名: RC\$WKL-378 - WKL-378-rcqx-fx278.lcm
 批处理文件名: RC\$WKL-378 - 20260207-rcqx-FX278.lcb
 样品瓶号 : 2-18
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2026/02/07 19:35:43 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2) : 2026/02/09 11:56:25 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.300	273205	32072	100.000	1773	1.311	--
总计		273205	32072	100.000			

图285 辅酶Q10片溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
 自制品-2025071721批-pH1.2介质-桨法-50转
 对照品溶液-1-4




WKL-378

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温 :35°C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$WKL-378 - 0-81/29-401-2 - zzp-2025071721p-c6-rcqx-2-pH1.2jz-jf50z-dz1-5.lcd
 方法文件名: RC\$WKL-378 - WKL-378-rcqx-fx278.lcm
 批处理文件名: RC\$WKL-378 - 20260207-rcqx-FX278.lcb
 样品瓶号 : 2-18
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2026/02/07 19:40:08 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2) : 2026/02/09 11:56:28 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.302	273213	32056	100.000	1781	1.305	--
总计		273213	32056	100.000			

图286 辅酶Q10片溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
 自制品-2025071721批-pH1.2介质-桨法-50转
 对照品溶液-1-5




WKL-378

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温 :35°C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$WKL-378 - 0-81/29-402-2 - zzp-2025071721p-c6-rcqx-2-pH1.2jz-jf50z-5min-P1.lcd
 方法文件名: RC\$WKL-378 - WKL-378-rcqx-fx278.lcm
 批处理文件名: RC\$WKL-378 - 20260207-rcqx-FX278.lcb
 样品瓶号 : 2-1
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2026/02/07 19:44:32 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2) : 2026/02/09 11:56:30 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.318	188157	22539	100.000	1877	1.307	--
总计		188157	22539	100.000			

图287 辅酶Q10片溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
 自制品-2025071721批-pH1.2介质-浆法-50转-5min-片1
 供试品溶液-1




WKL-378

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温 :35°C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$WKL-378 - 0-81/29-403-2 - zzp-2025071721p-c6-rcqx-2-pH1.2jz-jf50z-5min-P2.lcd
 方法文件名: RC\$WKL-378 - WKL-378-rcqx-fx278.lcm
 批处理文件名: RC\$WKL-378 - 20260207-rcqx-FX278.lcb
 样品瓶号 : 2-10
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2026/02/07 19:48:56 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2) : 2026/02/09 11:56:33 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.318	198170	23663	100.000	1872	1.305	--
总计		198170	23663	100.000			

图288 辅酶Q10片溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
 自制品-2025071721批-pH1.2介质-浆法-50转-5min-片2
 供试品溶液-1




WKL-378

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温 :35°C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$WKL-378 - 0-81/29-404-2 - zzp-2025071721p-c6-rcqx-2-pH1.2jz-jf50z-5min-P3.lcd
 方法文件名: RC\$WKL-378 - WKL-378-rcqx-fx278.lcm
 批处理文件名: RC\$WKL-378 - 20260207-rcqx-FX278.lcb
 样品瓶号 : 2-19
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2026/02/07 19:53:20 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2) : 2026/02/09 11:56:36 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.317	193593	23097	100.000	1868	1.306	--
总计		193593	23097	100.000			

图289 辅酶Q10片溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
 自制品-2025071721批-pH1.2介质-浆法-50转-5min-片3
 供试品溶液-1




WKL-378

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温 :35°C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$WKL-378 - 0-81/29-405-2 - zzp-2025071721p-c6-rcqx-2-pH1.2jz-jf50z-5min-P4.lcd
 方法文件名: RC\$WKL-378 - WKL-378-rcqx-fx278.lcm
 批处理文件名: RC\$WKL-378 - 20260207-rcqx-FX278.lcb
 样品瓶号 : 2-28 版本号: 6.115
 进样体积 : 20 μl 实验者: xiechaojun
 进样时间 : 2026/02/07 19:57:44 处理者: xiechaojun
 处理时间 (V2) : 2026/02/09 11:56:39
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.318	183416	21903	100.000	1871	1.306	--
总计		183416	21903	100.000			

图290 辅酶Q10片溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
 自制品-2025071721批-pH1.2介质-浆法-50转-5min-片4
 供试品溶液-1




WKL-378

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温 :35°C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$WKL-378 - 0-81/29-406-2 - zzp-2025071721p-c6-rcqx-2-pH1.2jz-jf50z-5min-P5.lcd
 方法文件名: RC\$WKL-378 - WKL-378-rcqx-fx278.lcm
 批处理文件名: RC\$WKL-378 - 20260207-rcqx-FX278.lcb
 样品瓶号 : 2-37
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2026/02/07 20:02:08 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2) : 2026/02/09 11:56:41 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.317	194625	23244	100.000	1876	1.307	--
总计		194625	23244	100.000			

图291 辅酶Q10片溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
 自制品-2025071721批-pH1.2介质-浆法-50转-5min-片5
 供试品溶液-1




WKL-378

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温 :35°C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$WKL-378 - 0-81/29-407-2 - zzp-2025071721p-c6-rcqx-2-pH1.2jz-jf50z-5min-P6.lcd
 方法文件名: RC\$WKL-378 - WKL-378-rcqx-fx278.lcm
 批处理文件名: RC\$WKL-378 - 20260207-rcqx-FX278.lcb
 样品瓶号 : 2-46
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2026/02/07 20:06:31 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2) : 2026/02/09 11:56:44 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.318	191915	22915	100.000	1875	1.310	--
总计		191915	22915	100.000			

图292 辅酶Q10片溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
 自制品-2025071721批-pH1.2介质-浆法-50转-5min-片6
 供试品溶液-1




WKL-378

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温 :35°C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$WKL-378 - 0-81/29-408-2 - zzp-2025071721p-c6-rcqx-2-pH1.2jz-jf50z-10min-P1.lcd
 方法文件名: RC\$WKL-378 - WKL-378-rcqx-fx278.lcm
 批处理文件名: RC\$WKL-378 - 20260207-rcqx-FX278.lcb
 样品瓶号 : 2-2
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2026/02/07 20:10:55 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2) : 2026/02/09 11:56:47 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.318	217532	25968	100.000	1876	1.310	--
总计		217532	25968	100.000			

图293 辅酶Q10片溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
 自制品-2025071721批-pH1.2介质-浆法-50转-10min-片1
 供试品溶液-1




WKL-378

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温 :35°C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$WKL-378 - 0-81/29-409-2 - zzp-2025071721p-c6-rcqx-2-pH1.2jz-jf50z-10min-P2.lcd
 方法文件名: RC\$WKL-378 - WKL-378-rcqx-fx278.lcm
 批处理文件名: RC\$WKL-378 - 20260207-rcqx-FX278.lcb
 样品瓶号 : 2-11
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2026/02/07 20:15:19 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2) : 2026/02/09 11:56:49 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.317	223076	26644	100.000	1872	1.312	--
总计		223076	26644	100.000			

图294 辅酶Q10片溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
 自制品-2025071721批-pH1.2介质-桨法-50转-10min-片2
 供试品溶液-1




WKL-378

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5µm) 流速: 1.5ml/min
 柱温 :35°C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$WKL-378 - 0-81/29-410-2 - zzp-2025071721p-c6-rcqx-2-pH1.2jz-jf50z-10min-P3.lcd
 方法文件名: RC\$WKL-378 - WKL-378-rcqx-fx278.lcm
 批处理文件名: RC\$WKL-378 - 20260207-rcqx-FX278.lcb
 样品瓶号 : 2-20
 进样体积 : 20 µl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2026/02/07 20:19:43 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2) : 2026/02/09 11:56:52 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.316	221011	26435	100.000	1867	1.303	--
总计		221011	26435	100.000			

图295 辅酶Q10片溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
 自制品-2025071721批-pH1.2介质-桨法-50转-10min-片3
 供试品溶液-1




WKL-378

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温 :35°C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$WKL-378 - 0-81/29-411-2 - zzp-2025071721p-c6-rcqx-2-pH1.2jz-jf50z-10min-P4.lcd
 方法文件名: RC\$WKL-378 - WKL-378-rcqx-fx278.lcm
 批处理文件名: RC\$WKL-378 - 20260207-rcqx-FX278.lcb
 样品瓶号 : 2-29
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2026/02/07 20:24:07 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2) : 2026/02/09 11:56:55 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.317	216212	25793	100.000	1871	1.310	--
总计		216212	25793	100.000			

图296 辅酶Q10片溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
 自制品-2025071721批-pH1.2介质-桨法-50转-10min-片4
 供试品溶液-1




WKL-378

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温 :35°C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$WKL-378 - 0-81/29-412-2 - zzp-2025071721p-c6-rcqx-2-pH1.2jz-jf50z-10min-P5.lcd
 方法文件名: RC\$WKL-378 - WKL-378-rcqx-fx278.lcm
 批处理文件名: RC\$WKL-378 - 20260207-rcqx-FX278.lcb
 样品瓶号 : 2-38
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2026/02/07 20:28:31 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2) : 2026/02/09 11:56:58 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.316	233748	27902	100.000	1867	1.307	--
总计		233748	27902	100.000			

图297 辅酶Q10片溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
 自制品-2025071721批-pH1.2介质-桨法-50转-10min-片5
 供试品溶液-1




WKL-378

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5µm) 流速: 1.5ml/min
 柱温 :35°C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$WKL-378 - 0-81/29-413-2 - zzp-2025071721p-c6-rcqx-2-pH1.2jz-jf50z-10min-P6.lcd
 方法文件名: RC\$WKL-378 - WKL-378-rcqx-fx278.lcm
 批处理文件名: RC\$WKL-378 - 20260207-rcqx-FX278.lcb
 样品瓶号 : 2-47
 进样体积 : 20 µl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2026/02/07 20:32:55 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2) : 2026/02/09 11:57:01 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.317	222938	26665	100.000	1871	1.307	--
总计		222938	26665	100.000			

图298 辅酶Q10片溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
 自制品-2025071721批-pH1.2介质-桨法-50转-10min-片6
 供试品溶液-1




WKL-378

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温 :35°C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$WKL-378 - 0-81/29-414-2 - zzp-2025071721p-c6-rcqx-2-pH1.2jz-jf50z-15min-P1.lcd
 方法文件名: RC\$WKL-378 - WKL-378-rcqx-fx278.lcm
 批处理文件名: RC\$WKL-378 - 20260207-rcqx-FX278.lcb
 样品瓶号 : 2-3
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2026/02/07 20:37:19 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2) : 2026/02/09 11:57:03 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.317	226741	27124	100.000	1874	1.304	--
总计		226741	27124	100.000			

图299 辅酶Q10片溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
 自制品-2025071721批-pH1.2介质-桨法-50转-15min-片1
 供试品溶液-1




WKL-378

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温 :35°C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$WKL-378 - 0-81/29-415-2 - zzp-2025071721p-c6-rcqx-2-pH1.2jz-jf50z-15min-P2.lcd
 方法文件名: RC\$WKL-378 - WKL-378-rcqx-fx278.lcm
 批处理文件名: RC\$WKL-378 - 20260207-rcqx-FX278.lcb
 样品瓶号 : 2-12
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2026/02/07 20:41:43 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2) : 2026/02/09 11:57:06 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.316	230444	27563	100.000	1876	1.309	--
总计		230444	27563	100.000			

图300 辅酶Q10片溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
 自制品-2025071721批-pH1.2介质-桨法-50转-15min-片2
 供试品溶液-1




WKL-378

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温 :35°C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$WKL-378 - 0-81/29-416-2 - zzp-2025071721p-c6-rcqx-2-pH1.2jz-jf50z-15min-P3.lcd
 方法文件名: RC\$WKL-378 - WKL-378-rcqx-fx278.lcm
 批处理文件名: RC\$WKL-378 - 20260207-rcqx-FX278.lcb
 样品瓶号 : 2-21
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2026/02/07 20:46:07 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2) : 2026/02/09 11:57:09 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.316	234003	27948	100.000	1862	1.306	--
总计		234003	27948	100.000			

图301 辅酶Q10片溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
 自制品-2025071721批-pH1.2介质-桨法-50转-15min-片3
 供试品溶液-1




WKL-378

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温 :35 $^{\circ}$ C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$WKL-378 - 0-81/29-417-2 - zzp-2025071721p-c6-rcqx-2-pH1.2jz-jf50z-15min-P4.lcd
 方法文件名: RC\$WKL-378 - WKL-378-rcqx-fx278.lcm
 批处理文件名: RC\$WKL-378 - 20260207-rcqx-FX278.lcb
 样品瓶号 : 2-30
 进样体积 : 20 μ l 版本号: 6.115
 进样时间 : 2026/02/07 20:50:31 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2) : 2026/02/09 11:57:11 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.317	227418	27226	100.000	1873	1.301	--
总计		227418	27226	100.000			

图302 辅酶Q10片溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
 自制品-2025071721批-pH1.2介质-桨法-50转-15min-片4
 供试品溶液-1




WKL-378

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温 :35°C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$WKL-378 - 0-81/29-418-2 - zzp-2025071721p-c6-rcqx-2-pH1.2jz-jf50z-15min-P5.lcd
 方法文件名: RC\$WKL-378 - WKL-378-rcqx-fx278.lcm
 批处理文件名: RC\$WKL-378 - 20260207-rcqx-FX278.lcb
 样品瓶号 : 2-39
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2026/02/07 20:54:55 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2) : 2026/02/09 11:57:14 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.317	244731	29244	100.000	1869	1.310	--
总计		244731	29244	100.000			

图303 辅酶Q10片溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
 自制品-2025071721批-pH1.2介质-桨法-50转-15min-片5
 供试品溶液-1




WKL-378

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5µm) 流速: 1.5ml/min
 柱温 :35°C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$WKL-378 - 0-81/29-419-2 - zzp-2025071721p-c6-rcqx-2-pH1.2jz-jf50z-15min-P6.lcd
 方法文件名: RC\$WKL-378 - WKL-378-rcqx-fx278.lcm
 批处理文件名: RC\$WKL-378 - 20260207-rcqx-FX278.lcb
 样品瓶号 : 2-48
 进样体积 : 20 µl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2026/02/07 20:59:20 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2) : 2026/02/09 11:57:17 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.316	233531	27922	100.000	1866	1.307	--
总计		233531	27922	100.000			

图304 辅酶Q10片溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
 自制品-2025071721批-pH1.2介质-桨法-50转-15min-片6
 供试品溶液-1




WKL-378

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5µm) 流速: 1.5ml/min
 柱温 :35°C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$WKL-378 - 0-81/29-420-2 - zzp-2025071721p-c6-rcqx-2-pH1.2jz-jf50z-20min-P1.lcd
 方法文件名: RC\$WKL-378 - WKL-378-rcqx-fx278.lcm
 批处理文件名: RC\$WKL-378 - 20260207-rcqx-FX278.lcb
 样品瓶号 : 2-4
 进样体积 : 20 µl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2026/02/07 21:03:44 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2) : 2026/02/09 11:57:20 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.317	231659	27712	100.000	1868	1.303	--
总计		231659	27712	100.000			

图305 辅酶Q10片溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
 自制品-2025071721批-pH1.2介质-桨法-50转-20min-片1
 供试品溶液-1




WKL-378

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5µm) 流速: 1.5ml/min
 柱温 :35°C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$WKL-378 - 0-81/29-421-2 - zzp-2025071721p-c6-rcqx-2-pH1.2jz-jf50z-20min-P2.lcd
 方法文件名: RC\$WKL-378 - WKL-378-rcqx-fx278.lcm
 批处理文件名: RC\$WKL-378 - 20260207-rcqx-FX278.lcb
 样品瓶号 : 2-13
 进样体积 : 20 µl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2026/02/07 21:08:09 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2) : 2026/02/09 11:57:23 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.316	232352	27816	100.000	1868	1.303	--
总计		232352	27816	100.000			

图306 辅酶Q10片溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
 自制品-2025071721批-pH1.2介质-浆法-50转-20min-片2
 供试品溶液-1




WKL-378

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温 :35°C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$WKL-378 - 0-81/29-422-2 - zzp-2025071721p-c6-rcqx-2-pH1.2jz-jf50z-20min-P3.lcd
 方法文件名: RC\$WKL-378 - WKL-378-rcqx-fx278.lcm
 批处理文件名: RC\$WKL-378 - 20260207-rcqx-FX278.lcb
 样品瓶号 : 2-22
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2026/02/07 21:12:33 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2) : 2026/02/09 11:57:26 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.316	234883	28063	100.000	1865	1.304	--
总计		234883	28063	100.000			

图307 辅酶Q10片溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
 自制品-2025071721批-pH1.2介质-桨法-50转-20min-片3
 供试品溶液-1




WKL-378

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温 :35°C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$WKL-378 - 0-81/29-423-2 - zzp-2025071721p-c6-rcqx-2-pH1.2jz-jf50z-20min-P4.lcd
 方法文件名: RC\$WKL-378 - WKL-378-rcqx-fx278.lcm
 批处理文件名: RC\$WKL-378 - 20260207-rcqx-FX278.lcb
 样品瓶号 : 2-31 版本号: 6.115
 进样体积 : 20 μl 实验者: xiechaojun
 进样时间 : 2026/02/07 21:16:57 处理者: xiechaojun
 处理时间 (V2) : 2026/02/09 11:57:29
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.316	229676	27495	100.000	1868	1.305	--
总计		229676	27495	100.000			

图308 辅酶Q10片溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
 自制品-2025071721批-pH1.2介质-浆法-50转-20min-片4
 供试品溶液-1




WKL-378

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温 :35°C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$WKL-378 - 0-81/29-424-2 - zzp-2025071721p-c6-rcqx-2-pH1.2jz-jf50z-20min-P5.lcd
 方法文件名: RC\$WKL-378 - WKL-378-rcqx-fx278.lcm
 批处理文件名: RC\$WKL-378 - 20260207-rcqx-FX278.lcb
 样品瓶号 : 2-40
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2026/02/07 21:21:21 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2) : 2026/02/09 11:57:31 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.317	249871	29866	100.000	1869	1.306	--
总计		249871	29866	100.000			

图309 辅酶Q10片溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
 自制品-2025071721批-pH1.2介质-桨法-50转-20min-片5
 供试品溶液-1




WKL-378

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温 :35°C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$WKL-378 - 0-81/29-425-2 - zzp-2025071721p-c6-rcqx-2-pH1.2jz-jf50z-20min-P6.lcd
 方法文件名: RC\$WKL-378 - WKL-378-rcqx-fx278.lcm
 批处理文件名: RC\$WKL-378 - 20260207-rcqx-FX278.lcb
 样品瓶号 : 2-49
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2026/02/07 21:25:45 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2) : 2026/02/09 11:57:34 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.316	236765	28338	100.000	1869	1.305	--
总计		236765	28338	100.000			

图310 辅酶Q10片溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
 自制品-2025071721批-pH1.2介质-桨法-50转-20min-片6
 供试品溶液-1




WKL-378

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温 :35°C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$WKL-378 - 0-81/29-426-2 - zzp-2025071721p-c6-rcqx-2-pH1.2jz-jf50z-30min-P1.lcd
 方法文件名: RC\$WKL-378 - WKL-378-rcqx-fx278.lcm
 批处理文件名: RC\$WKL-378 - 20260207-rcqx-FX278.lcb
 样品瓶号 : 2-5
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2026/02/07 21:30:10 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2) : 2026/02/09 11:57:37 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.317	235315	28095	100.000	1871	1.305	--
总计		235315	28095	100.000			

图311 辅酶Q10片溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
 自制品-2025071721批-pH1.2介质-浆法-50转-30min-片1
 供试品溶液-1




WKL-378

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温 :35°C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$WKL-378 - 0-81/29-427-2 - zzp-2025071721p-c6-rcqx-2-pH1.2jz-jf50z-30min-P2.lcd
 方法文件名: RC\$WKL-378 - WKL-378-rcqx-fx278.lcm
 批处理文件名: RC\$WKL-378 - 20260207-rcqx-FX278.lcb
 样品瓶号 : 2-14
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2026/02/07 21:34:34 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2) : 2026/02/09 11:57:40 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.317	234818	28062	100.000	1871	1.305	--
总计		234818	28062	100.000			

图312 辅酶Q10片溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
 自制品-2025071721批-pH1.2介质-桨法-50转-30min-片2
 供试品溶液-1




WKL-378

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温 :35°C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$WKL-378 - 0-81/29-428-2 - zzp-2025071721p-c6-rcqx-2-pH1.2jz-jf50z-30min-P3.lcd
 方法文件名: RC\$WKL-378 - WKL-378-rcqx-fx278.lcm
 批处理文件名: RC\$WKL-378 - 20260207-rcqx-FX278.lcb
 样品瓶号 : 2-23 版本号: 6.115
 进样体积 : 20 μl 实验者: xiechaojun
 进样时间 : 2026/02/07 21:38:59 处理者: xiechaojun
 处理时间 (V2) : 2026/02/09 11:57:43
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.315	236534	28345	100.000	1871	1.303	--
总计		236534	28345	100.000			

图313 辅酶Q10片溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
 自制品-2025071721批-pH1.2介质-浆法-50转-30min-片3
 供试品溶液-1




WKL-378

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温 :35°C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$WKL-378 - 0-81/29-429-2 - zzp-2025071721p-c6-rcqx-2-pH1.2jz-jf50z-30min-P4.lcd
 方法文件名: RC\$WKL-378 - WKL-378-rcqx-fx278.lcm
 批处理文件名: RC\$WKL-378 - 20260207-rcqx-FX278.lcb
 样品瓶号 : 2-32
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2026/02/07 21:43:23 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2) : 2026/02/09 11:57:45 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.317	234413	27963	100.000	1869	1.306	--
总计		234413	27963	100.000			

图314 辅酶Q10片溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
 自制品-2025071721批-pH1.2介质-桨法-50转-30min-片4
 供试品溶液-1




WKL-378

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温 :35°C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$WKL-378 - 0-81/29-430-2 - zzp-2025071721p-c6-rcqx-2-pH1.2jz-jf50z-30min-P5.lcd
 方法文件名: RC\$WKL-378 - WKL-378-rcqx-fx278.lcm
 批处理文件名: RC\$WKL-378 - 20260207-rcqx-FX278.lcb
 样品瓶号 : 2-41
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2026/02/07 21:47:48 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2) : 2026/02/09 11:57:48 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.315	250609	29982	100.000	1868	1.305	--
总计		250609	29982	100.000			

图315 辅酶Q10片溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
 自制品-2025071721批-pH1.2介质-桨法-50转-30min-片5
 供试品溶液-1




WKL-378

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温 :35°C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$WKL-378 - 0-81/29-431-2 - zzp-2025071721p-c6-rcqx-2-pH1.2jz-jf50z-30min-P6.lcd
 方法文件名: RC\$WKL-378 - WKL-378-rcqx-fx278.lcm
 批处理文件名: RC\$WKL-378 - 20260207-rcqx-FX278.lcb
 样品瓶号 : 2-50
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2026/02/07 21:52:12 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2) : 2026/02/09 11:57:51 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.317	239071	28574	100.000	1874	1.307	--
总计		239071	28574	100.000			

图316 辅酶Q10片溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
 自制品-2025071721批-pH1.2介质-桨法-50转-30min-片6
 供试品溶液-1




WKL-378

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温 :35°C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$WKL-378 - 0-81/29-432-2 - zzp-2025071721p-c6-rcqx-2-pH1.2jz-jf50z-45min-P1.lcd
 方法文件名: RC\$WKL-378 - WKL-378-rcqx-fx278.lcm
 批处理文件名: RC\$WKL-378 - 20260207-rcqx-FX278.lcb
 样品瓶号 : 2-6
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2026/02/07 21:56:37 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2) : 2026/02/09 11:57:53 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.316	235633	28233	100.000	1874	1.303	--
总计		235633	28233	100.000			

图317 辅酶Q10片溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
 自制品-2025071721批-pH1.2介质-桨法-50转-45min-片1
 供试品溶液-1




WKL-378

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5µm) 流速: 1.5ml/min
 柱温 :35°C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$WKL-378 - 0-81/29-433-2 - zzp-2025071721p-c6-rcqx-2-pH1.2jz-jf50z-45min-P2.lcd
 方法文件名: RC\$WKL-378 - WKL-378-rcqx-fx278.lcm
 批处理文件名: RC\$WKL-378 - 20260207-rcqx-FX278.lcb
 样品瓶号 : 2-15
 进样体积 : 20 µl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2026/02/07 22:01:02 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2) : 2026/02/09 11:57:56 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.317	237240	28344	100.000	1872	1.303	--
总计		237240	28344	100.000			

图318 辅酶Q10片溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
 自制品-2025071721批-pH1.2介质-桨法-50转-45min-片2
 供试品溶液-1




WKL-378

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温 :35°C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$WKL-378 - 0-81/29-434-2 - zzp-2025071721p-c6-rcqx-2-pH1.2jz-jf50z-45min-P3.lcd
 方法文件名: RC\$WKL-378 - WKL-378-rcqx-fx278.lcm
 批处理文件名: RC\$WKL-378 - 20260207-rcqx-FX278.lcb
 样品瓶号 : 2-24
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2026/02/07 22:05:27 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2) : 2026/02/09 11:57:59 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.317	239871	28619	100.000	1866	1.302	--
总计		239871	28619	100.000			

图319 辅酶Q10片溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
 自制品-2025071721批-pH1.2介质-浆法-50转-45min-片3
 供试品溶液-1




WKL-378

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温 :35°C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$WKL-378 - 0-81/29-435-2 - zzp-2025071721p-c6-rcqx-2-pH1.2jz-jf50z-45min-P4.lcd
 方法文件名: RC\$WKL-378 - WKL-378-rcqx-fx278.lcm
 批处理文件名: RC\$WKL-378 - 20260207-rcqx-FX278.lcb
 样品瓶号 : 2-33
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2026/02/07 22:09:52 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2) : 2026/02/09 11:58:02 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.318	236208	28256	100.000	1874	1.305	--
总计		236208	28256	100.000			

图320 辅酶Q10片溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
 自制品-2025071721批-pH1.2介质-桨法-50转-45min-片4
 供试品溶液-1




WKL-378

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温 :35°C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$WKL-378 - 0-81/29-436-2 - zzp-2025071721p-c6-rcqx-2-pH1.2jz-jf50z-45min-P5.lcd
 方法文件名: RC\$WKL-378 - WKL-378-rcqx-fx278.lcm
 批处理文件名: RC\$WKL-378 - 20260207-rcqx-FX278.lcb
 样品瓶号 : 2-42
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2026/02/07 22:14:16 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2) : 2026/02/09 11:58:05 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.317	252072	30141	100.000	1872	1.306	--
总计		252072	30141	100.000			

图321 辅酶Q10片溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
 自制品-2025071721批-pH1.2介质-桨法-50转-45min-片5
 供试品溶液-1




WKL-378

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温 :35°C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$WKL-378 - 0-81/29-437-2 - zzp-2025071721p-c6-rcqx-2-pH1.2jz-jf50z-45min-P6.lcd
 方法文件名: RC\$WKL-378 - WKL-378-rcqx-fx278.lcm
 批处理文件名: RC\$WKL-378 - 20260207-rcqx-FX278.lcb
 样品瓶号 : 2-51
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2026/02/07 22:18:40 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2) : 2026/02/09 11:58:08 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.317	240652	28768	100.000	1875	1.305	--
总计		240652	28768	100.000			

图322 辅酶Q10片溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
 自制品-2025071721批-pH1.2介质-桨法-50转-45min-片6
 供试品溶液-1




WKL-378

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温 :35°C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$WKL-378 - 0-81/29-438-2 - zzp-2025071721p-c6-rcqx-2-pH1.2jz-jf50z-60min-P1.lcd
 方法文件名: RC\$WKL-378 - WKL-378-rcqx-fx278.lcm
 批处理文件名: RC\$WKL-378 - 20260207-rcqx-FX278.lcb
 样品瓶号 : 2-7
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2026/02/07 22:23:06 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2) : 2026/02/09 11:58:11 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.319	236318	28256	100.000	1876	1.303	--
总计		236318	28256	100.000			

图323 辅酶Q10片溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
 自制品-2025071721批-pH1.2介质-浆法-50转-60min-片1
 供试品溶液-1




WKL-378

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温 :35°C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$WKL-378 - 0-81/29-439-2 - zzp-2025071721p-c6-rcqx-2-pH1.2jz-jf50z-60min-P2.lcd
 方法文件名: RC\$WKL-378 - WKL-378-rcqx-fx278.lcm
 批处理文件名: RC\$WKL-378 - 20260207-rcqx-FX278.lcb
 样品瓶号 : 2-16
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2026/02/07 22:27:33 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2) : 2026/02/09 11:58:13 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.316	236687	28366	100.000	1873	1.304	--
总计		236687	28366	100.000			

图324 辅酶Q10片溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
 自制品-2025071721批-pH1.2介质-桨法-50转-60min-片2
 供试品溶液-1




WKL-378

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温 :35°C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$WKL-378 - 0-81/29-440-2 - zzp-2025071721p-c6-rcqx-2-pH1.2jz-jf50z-60min-P3.lcd
 方法文件名: RC\$WKL-378 - WKL-378-rcqx-fx278.lcm
 批处理文件名: RC\$WKL-378 - 20260207-rcqx-FX278.lcb
 样品瓶号 : 2-25
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2026/02/07 22:31:57 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2) : 2026/02/09 11:58:16 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.318	239915	28646	100.000	1871	1.306	--
总计		239915	28646	100.000			

图325 辅酶Q10片溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
 自制品-2025071721批-pH1.2介质-浆法-50转-60min-片3
 供试品溶液-1




WKL-378

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温 :35°C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$WKL-378 - 0-81/29-441-2 - zzp-2025071721p-c6-rcqx-2-pH1.2jz-jf50z-60min-P4.lcd
 方法文件名: RC\$WKL-378 - WKL-378-rcqx-fx278.lcm
 批处理文件名: RC\$WKL-378 - 20260207-rcqx-FX278.lcb
 样品瓶号 : 2-34
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2026/02/07 22:36:22 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2) : 2026/02/09 11:58:19 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.316	235506	28192	100.000	1872	1.304	--
总计		235506	28192	100.000			

图326 辅酶Q10片溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
 自制品-2025071721批-pH1.2介质-桨法-50转-60min-片4
 供试品溶液-1




WKL-378

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温 :35°C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$WKL-378 - 0-81/29-442-2 - zzp-2025071721p-c6-rcqx-2-pH1.2jz-jf50z-60min-P5.lcd
 方法文件名: RC\$WKL-378 - WKL-378-rcqx-fx278.lcm
 批处理文件名: RC\$WKL-378 - 20260207-rcqx-FX278.lcb
 样品瓶号 : 2-43
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2026/02/07 22:40:46 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2) : 2026/02/09 11:58:22 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.316	252449	30220	100.000	1872	1.306	--
总计		252449	30220	100.000			

图327 辅酶Q10片溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
 自制品-2025071721批-pH1.2介质-桨法-50转-60min-片5
 供试品溶液-1




WKL-378

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温 :35°C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$WKL-378 - 0-81/29-443-2 - zzp-2025071721p-c6-rcqx-2-pH1.2jz-jf50z-60min-P6.lcd
 方法文件名: RC\$WKL-378 - WKL-378-rcqx-fx278.lcm
 批处理文件名: RC\$WKL-378 - 20260207-rcqx-FX278.lcb
 样品瓶号 : 2-52
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2026/02/07 22:45:10 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2) : 2026/02/09 11:58:25 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.316	239843	28698	100.000	1873	1.301	--
总计		239843	28698	100.000			

图328 辅酶Q10片溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
 自制品-2025071721批-pH1.2介质-桨法-50转-60min-片6
 供试品溶液-1




WKL-378

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温 :35°C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$WKL-378 - 0-81/29-444-2 - zzp-2025071721p-c6-rcqx-2-pH1.2jz-jf50z-jxzs-P1.lcd
 方法文件名: RC\$WKL-378 - WKL-378-rcqx-fx278.lcm
 批处理文件名: RC\$WKL-378 - 20260207-rcqx-FX278.lcb
 样品瓶号 : 2-8
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2026/02/07 22:49:35 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2) : 2026/02/09 11:58:27 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.317	267849	32016	100.000	1877	1.307	--
总计		267849	32016	100.000			

图329 辅酶Q10片溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
 自制品-2025071721批-pH1.2介质-桨法-50转-极限转速-片1
 供试品溶液-1




WKL-378

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5µm) 流速: 1.5ml/min
 柱温 :35°C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$WKL-378 - 0-81/29-445-2 - zzp-2025071721p-c6-rcqx-2-pH1.2jz-jf50z-jxzs-P2.lcd
 方法文件名: RC\$WKL-378 - WKL-378-rcqx-fx278.lcm
 批处理文件名: RC\$WKL-378 - 20260207-rcqx-FX278.lcb
 样品瓶号 : 2-17
 进样体积 : 20 µl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2026/02/07 22:54:00 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2) : 2026/02/09 11:58:30 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.317	264407	31619	100.000	1873	1.304	--
总计		264407	31619	100.000			

图330 辅酶Q10片溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
 自制品-2025071721批-pH1.2介质-桨法-50转-极限转速-片2
 供试品溶液-1




WKL-378

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温 :35°C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$WKL-378 - 0-81/29-446-2 - zzp-2025071721p-c6-rcqx-2-pH1.2jz-jf50z-jxzs-P3.lcd
 方法文件名: RC\$WKL-378 - WKL-378-rcqx-fx278.lcm
 批处理文件名: RC\$WKL-378 - 20260207-rcqx-FX278.lcb
 样品瓶号 : 2-26
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2026/02/07 22:58:26 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2) : 2026/02/09 11:58:33 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.316	264185	31589	100.000	1872	1.303	--
总计		264185	31589	100.000			

图331 辅酶Q10片溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
 自制品-2025071721批-pH1.2介质-桨法-50转-极限转速-片3
 供试品溶液-1




WKL-378

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温 :35°C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$WKL-378 - 0-81/29-447-2 - zzp-2025071721p-c6-rcqx-2-pH1.2jz-jf50z-jxzs-P4.lcd
 方法文件名: RC\$WKL-378 - WKL-378-rcqx-fx278.lcm
 批处理文件名: RC\$WKL-378 - 20260207-rcqx-FX278.lcb
 样品瓶号 : 2-35
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2026/02/07 23:02:50 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2) : 2026/02/09 11:58:36 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.317	264499	31614	100.000	1872	1.304	--
总计		264499	31614	100.000			

图332 辅酶Q10片溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
 自制品-2025071721批-pH1.2介质-桨法-50转-极限转速-片4
 供试品溶液-1




WKL-378

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温 :35°C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$WKL-378 - 0-81/29-448-2 - zzp-2025071721p-c6-rcqx-2-pH1.2jz-jf50z-jxzs-P5.lcd
 方法文件名: RC\$WKL-378 - WKL-378-rcqx-fx278.lcm
 批处理文件名: RC\$WKL-378 - 20260207-rcqx-FX278.lcb
 样品瓶号 : 2-44
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2026/02/07 23:07:14 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2) : 2026/02/09 11:58:38 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.316	267466	32024	100.000	1874	1.305	--
总计		267466	32024	100.000			

图333 辅酶Q10片溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
 自制品-2025071721批-pH1.2介质-桨法-50转-极限转速-片5
 供试品溶液-1




WKL-378

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温 :35°C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$WKL-378 - 0-81/29-449-2 - zzp-2025071721p-c6-rcqx-2-pH1.2jz-jf50z-jxzs-P6.lcd
 方法文件名: RC\$WKL-378 - WKL-378-rcqx-fx278.lcm
 批处理文件名: RC\$WKL-378 - 20260207-rcqx-FX278.lcb
 样品瓶号 : 2-53
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2026/02/07 23:11:39 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2) : 2026/02/09 11:58:41 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.318	261823	31300	100.000	1877	1.302	--
总计		261823	31300	100.000			

图334 辅酶Q10片溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
 自制品-2025071721批-pH1.2介质-桨法-50转-极限转速-片6
 供试品溶液-1




WKL-378

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温 :35°C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$WKL-378 - 0-81/29-450-2 - zzp-2025071721p-c6-rcqx-2-pH1.2jz-jf50z-dz2-1.lcd
 方法文件名: RC\$WKL-378 - WKL-378-rcqx-fx278.lcm
 批处理文件名: RC\$WKL-378 - 20260207-rcqx-FX278.lcb
 样品瓶号 : 2-27
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2026/02/07 23:16:02 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2) : 2026/02/09 11:58:44 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.301	273457	32189	100.000	1790	1.292	--
总计		273457	32189	100.000			

图335 辅酶Q10片溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
 自制品-2025071721批-pH1.2介质-桨法-50转
 对照品溶液-2-1




WKL-378

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5µm) 流速: 1.5ml/min
 柱温 :35°C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$WKL-378 - 0-81/29-451-2 - zzp-2025071721p-c6-rcqx-2-pH1.2jz-jf50z-dz2-2.lcd
 方法文件名: RC\$WKL-378 - WKL-378-rcqx-fx278.lcm
 批处理文件名: RC\$WKL-378 - 20260207-rcqx-FX278.lcb
 样品瓶号 : 2-27
 进样体积 : 20 µl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2026/02/07 23:20:27 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2) : 2026/02/09 11:58:46 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.302	273143	32088	100.000	1780	1.303	--
总计		273143	32088	100.000			

图336 辅酶Q10片溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
 自制品-2025071721批-pH1.2介质-桨法-50转
 对照品溶液-2-2