




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
 柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
 数据文件名: RC\$JSS-222 - 7-4/7-341-2 - zzp-6022401-1p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-rj.lcd
 方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20260227-FX256.lcb
 样品瓶号: 1-9
 进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
 进样时间: 2026/02/27 10:29:42 实验者: xiexinhui
 处理时间 (V2) : 2026/02/28 09:52:31 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|------|----|-----|----|------------|------|----------|
| 总计 | | | | | | | |




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
 柱温 : 30°C 波长:318nm
 数据文件名: RC\$JSS-222 - 7-4/7-342-2 - zzp-6022401-1p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-dz1-1.lcd
 方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20260227-FX256.lcb
 样品瓶号: 1-18
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2026/02/27 10:32:35 实验者: xiexinhui
 处理时间 (V2) : 2026/02/28 09:52:35 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.238 | 189124 | 100.000 | 39963 | 1639 | 1.252 | -- |
| 总计 | | 189124 | 100.000 | 39963 | | | |




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
 柱温 : 30°C 波长:318nm
 数据文件名: RC\$JSS-222 - 7-4/7-343-2 - zzp-6022401-1p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-dz1-2.lcd
 方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20260227-FX256.lcb
 样品瓶号: 1-18
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2026/02/27 10:35:28 实验者: xiexinhui
 处理时间 (V2) : 2026/02/28 09:52:38 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.230 | 189269 | 100.000 | 40095 | 1629 | 1.255 | -- |
| 总计 | | 189269 | 100.000 | 40095 | | | |




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
 柱温 : 30°C 波长:318nm
 数据文件名: RC\$JSS-222 - 7-4/7-344-2 - zzp-6022401-1p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-dz1-3.lcd
 方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20260227-FX256.lcb
 样品瓶号: 1-18
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2026/02/27 10:38:21 实验者: xiexinhui
 处理时间 (V2) : 2026/02/28 09:52:41 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.223 | 188835 | 100.000 | 40110 | 1619 | 1.259 | -- |
| 总计 | | 188835 | 100.000 | 40110 | | | |




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
 柱温 : 30°C 波长:318nm
 数据文件名: RC\$JSS-222 - 7-4/7-345-2 - zzp-6022401-1p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-dz1-4.lcd
 方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20260227-FX256.lcb
 样品瓶号: 1-18
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2026/02/27 10:41:14 实验者: xiexinhui
 处理时间 (V2) : 2026/02/28 09:52:43 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 318nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.218 | 189016 | 100.000 | 39867 | 1610 | 1.260 | -- |
| 总计 | | 189016 | 100.000 | 39867 | | | |

〈样品信息〉

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 7-4/7-346-2 - zzp-6022401-1p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-dz1-5.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20260227-FX256.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2026/02/27 10:44:07 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2026/02/28 09:52:46 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉

mV



〈峰表〉

检测器A Ch1 318nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.213 | 189061 | 100.000 | 40319 | 1602 | 1.260 | -- |
| 总计 | | 189061 | 100.000 | 40319 | | | |




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
 柱温 : 30°C 波长:318nm
 数据文件名: RC\$JSS-222 - 7-4/7-347-2 - zzp-6022401-1p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-5min-P1.lcd
 方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20260227-FX256.lcb
 样品瓶号: 1-1
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2026/02/27 10:46:58 实验者: xiexinhui
 处理时间 (V2) : 2026/02/28 09:52:49 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.170 | 113677 | 100.000 | 24271 | 1509 | 1.305 | -- |
| 总计 | | 113677 | 100.000 | 24271 | | | |




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
 柱温 : 30°C 波长:318nm
 数据文件名: RC\$JSS-222 - 7-4/7-348-2 - zzp-6022401-1p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-5min-P2.lcd
 方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20260227-FX256.lcb
 样品瓶号: 1-10
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2026/02/27 10:49:51 实验者: xiexinhui
 处理时间 (V2) : 2026/02/28 09:52:51 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.167 | 113060 | 100.000 | 24055 | 1504 | 1.309 | -- |
| 总计 | | 113060 | 100.000 | 24055 | | | |




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
 柱温 : 30°C 波长:318nm
 数据文件名: RC\$JSS-222 - 7-4/7-349-2 - zzp-6022401-1p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-5min-P3.lcd
 方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20260227-FX256.lcb
 样品瓶号: 1-19
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2026/02/27 10:52:43 实验者: xiexinhui
 处理时间 (V2) : 2026/02/28 09:52:54 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.163 | 110891 | 100.000 | 23720 | 1494 | 1.307 | -- |
| 总计 | | 110891 | 100.000 | 23720 | | | |

〈样品信息〉

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 7-4/7-350-2 - zzp-6022401-1p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-5min-P4.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20260227-FX256.lcb
样品瓶号: 1-28
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2026/02/27 10:55:35 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2026/02/28 09:52:57 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉

mV



〈峰表〉

检测器A Ch1 318nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.160 | 114755 | 100.000 | 24435 | 1489 | 1.309 | -- |
| 总计 | | 114755 | 100.000 | 24435 | | | |




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
 柱温 : 30°C 波长:318nm
 数据文件名: RC\$JSS-222 - 7-4/7-351-2 - zzp-6022401-1p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-5min-P5.lcd
 方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20260227-FX256.lcb
 样品瓶号: 1-37
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2026/02/27 10:58:27 实验者: xiexinhui
 处理时间 (V2) : 2026/02/28 09:52:59 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.158 | 113715 | 100.000 | 24331 | 1490 | 1.307 | -- |
| 总计 | | 113715 | 100.000 | 24331 | | | |




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
 柱温 : 30°C 波长:318nm
 数据文件名: RC\$JSS-222 - 7-4/7-352-2 - zzp-6022401-1p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-5min-P6.lcd
 方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20260227-FX256.lcb
 样品瓶号: 1-46
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2026/02/27 11:01:19 实验者: xiexinhui
 处理时间 (V2) : 2026/02/28 09:53:02 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.157 | 114669 | 100.000 | 24637 | 1489 | 1.302 | -- |
| 总计 | | 114669 | 100.000 | 24637 | | | |




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
 柱温 : 30°C 波长:318nm
 数据文件名: RC\$JSS-222 - 7-4/7-353-2 - zzp-6022401-1p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-10min-P1.lcd
 方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20260227-FX256.lcb
 样品瓶号: 1-2
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2026/02/27 11:04:11 实验者: xiexinhui
 处理时间 (V2) : 2026/02/28 09:53:05 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.156 | 155921 | 100.000 | 33628 | 1493 | 1.293 | -- |
| 总计 | | 155921 | 100.000 | 33628 | | | |




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
 柱温 : 30°C 波长:318nm
 数据文件名: RC\$JSS-222 - 7-4/7-354-2 - zzp-6022401-1p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-10min-P2.lcd
 方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20260227-FX256.lcb
 样品瓶号: 1-11
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2026/02/27 11:07:03 实验者: xiexinhui
 处理时间 (V2) : 2026/02/28 09:53:07 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.156 | 157551 | 100.000 | 33947 | 1493 | 1.295 | -- |
| 总计 | | 157551 | 100.000 | 33947 | | | |




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
 柱温 : 30°C 波长:318nm
 数据文件名: RC\$JSS-222 - 7-4/7-355-2 - zzp-6022401-1p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-10min-P3.lcd
 方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20260227-FX256.lcb
 样品瓶号: 1-20
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2026/02/27 11:09:55 实验者: xiexinhui
 处理时间 (V2) : 2026/02/28 09:53:10 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.154 | 154911 | 100.000 | 33405 | 1492 | 1.295 | -- |
| 总计 | | 154911 | 100.000 | 33405 | | | |




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
 柱温 : 30°C 波长:318nm
 数据文件名: RC\$JSS-222 - 7-4/7-356-2 - zzp-6022401-1p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-10min-P4.lcd
 方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20260227-FX256.lcb
 样品瓶号: 1-29
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2026/02/27 11:12:48 实验者: xiexinhui
 处理时间 (V2) : 2026/02/28 09:53:13 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.153 | 155313 | 100.000 | 33430 | 1491 | 1.299 | -- |
| 总计 | | 155313 | 100.000 | 33430 | | | |




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
 柱温 : 30°C 波长:318nm
 数据文件名: RC\$JSS-222 - 7-4/7-357-2 - zzp-6022401-1p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-10min-P5.lcd
 方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20260227-FX256.lcb
 样品瓶号: 1-38
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2026/02/27 11:15:40 实验者: xiexinhui
 处理时间 (V2) : 2026/02/28 09:53:15 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.151 | 156705 | 100.000 | 33578 | 1493 | 1.301 | -- |
| 总计 | | 156705 | 100.000 | 33578 | | | |




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
 柱温 : 30°C 波长:318nm
 数据文件名: RC\$JSS-222 - 7-4/7-358-2 - zzp-6022401-1p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-10min-P6.lcd
 方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20260227-FX256.lcb
 样品瓶号: 1-47
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2026/02/27 11:18:31 实验者: xiexinhui
 处理时间 (V2) : 2026/02/28 09:53:18 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.150 | 156275 | 100.000 | 33601 | 1489 | 1.299 | -- |
| 总计 | | 156275 | 100.000 | 33601 | | | |




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
 柱温 : 30°C 波长:318nm
 数据文件名: RC\$JSS-222 - 7-4/7-359-2 - zzp-6022401-1p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-15min-P1.lcd
 方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20260227-FX256.lcb
 样品瓶号: 1-3
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2026/02/27 11:21:24 实验者: xiexinhui
 处理时间 (V2) : 2026/02/28 09:53:21 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.149 | 170065 | 100.000 | 36746 | 1495 | 1.292 | -- |
| 总计 | | 170065 | 100.000 | 36746 | | | |




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
 柱温 : 30°C 波长:318nm
 数据文件名: RC\$JSS-222 - 7-4/7-360-2 - zzp-6022401-1p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-15min-P2.lcd
 方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20260227-FX256.lcb
 样品瓶号: 1-12
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2026/02/27 11:24:16 实验者: xiexinhui
 处理时间 (V2) : 2026/02/28 09:53:24 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.148 | 172392 | 100.000 | 37367 | 1495 | 1.296 | -- |
| 总计 | | 172392 | 100.000 | 37367 | | | |




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
 柱温 : 30°C 波长:318nm
 数据文件名: RC\$JSS-222 - 7-4/7-361-2 - zzp-6022401-1p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-15min-P3.lcd
 方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20260227-FX256.lcb
 样品瓶号: 1-21
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2026/02/27 11:27:08 实验者: xiexinhui
 处理时间 (V2) : 2026/02/28 09:53:26 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.148 | 170608 | 100.000 | 36924 | 1494 | 1.296 | -- |
| 总计 | | 170608 | 100.000 | 36924 | | | |




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
 柱温 : 30°C 波长:318nm
 数据文件名: RC\$JSS-222 - 7-4/7-362-2 - zzp-6022401-1p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-15min-P4.lcd
 方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20260227-FX256.lcb
 样品瓶号: 1-30
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2026/02/27 11:29:59 实验者: xiexinhui
 处理时间 (V2) : 2026/02/28 09:53:29 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.148 | 169260 | 100.000 | 36696 | 1497 | 1.295 | -- |
| 总计 | | 169260 | 100.000 | 36696 | | | |




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
 柱温 : 30°C 波长:318nm
 数据文件名: RC\$JSS-222 - 7-4/7-363-2 - zzp-6022401-1p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-15min-P5.lcd
 方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20260227-FX256.lcb
 样品瓶号: 1-39
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2026/02/27 11:32:51 实验者: xiexinhui
 处理时间 (V2) : 2026/02/28 09:53:32 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.148 | 171471 | 100.000 | 37265 | 1494 | 1.292 | -- |
| 总计 | | 171471 | 100.000 | 37265 | | | |

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
 柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
 数据文件名: RC\$JSS-222 - 7-4/7-364-2 - zzp-6022401-1p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-15min-P6.lcd
 方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20260227-FX256.lcb
 样品瓶号: 1-48
 进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
 进样时间: 2026/02/27 11:35:43 实验者: xiexinhui
 处理时间 (V2) : 2026/02/28 09:53:34 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.147 | 171052 | 100.000 | 37181 | 1497 | 1.296 | -- |
| 总计 | | 171052 | 100.000 | 37181 | | | |




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5µm) 流速:1.5ml/min
 柱温 : 30°C 波长:318nm
 数据文件名: RC\$JSS-222 - 7-4/7-365-2 - zzp-6022401-1p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-20min-P1.lcd
 方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20260227-FX256.lcb
 样品瓶号: 1-4
 进样体积: 10 µl 版本号:6.115
 进样时间: 2026/02/27 11:38:36 实验者: xiexinhui
 处理时间 (V2) : 2026/02/28 09:53:37 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.146 | 177355 | 100.000 | 38520 | 1494 | 1.293 | -- |
| 总计 | | 177355 | 100.000 | 38520 | | | |




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
 柱温 : 30°C 波长:318nm
 数据文件名: RC\$JSS-222 - 7-4/7-366-2 - zzp-6022401-1p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-20min-P2.lcd
 方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20260227-FX256.lcb
 样品瓶号: 1-13
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2026/02/27 11:41:28 实验者: xiexinhui
 处理时间 (V2) : 2026/02/28 09:53:40 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.145 | 179509 | 100.000 | 38973 | 1495 | 1.291 | -- |
| 总计 | | 179509 | 100.000 | 38973 | | | |




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
 柱温 : 30°C 波长:318nm
 数据文件名: RC\$JSS-222 - 7-4/7-367-2 - zzp-6022401-1p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-20min-P3.lcd
 方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20260227-FX256.lcb
 样品瓶号: 1-22
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2026/02/27 11:44:20 实验者: xiexinhui
 处理时间 (V2) : 2026/02/28 09:53:43 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.145 | 177346 | 100.000 | 38544 | 1495 | 1.291 | -- |
| 总计 | | 177346 | 100.000 | 38544 | | | |




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
 柱温 : 30°C 波长:318nm
 数据文件名: RC\$JSS-222 - 7-4/7-368-2 - zzp-6022401-1p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-20min-P4.lcd
 方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20260227-FX256.lcb
 样品瓶号: 1-31
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2026/02/27 11:47:12 实验者: xiexinhui
 处理时间 (V2) : 2026/02/28 09:53:45 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.144 | 175407 | 100.000 | 38047 | 1494 | 1.295 | -- |
| 总计 | | 175407 | 100.000 | 38047 | | | |

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
 柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
 数据文件名: RC\$JSS-222 - 7-4/7-369-2 - zzp-6022401-1p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-20min-P5.lcd
 方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20260227-FX256.lcb
 样品瓶号: 1-40
 进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
 进样时间: 2026/02/27 11:50:04 实验者: xiexinhui
 处理时间 (V2) : 2026/02/28 09:53:48 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.145 | 178422 | 100.000 | 38711 | 1494 | 1.293 | -- |
| 总计 | | 178422 | 100.000 | 38711 | | | |




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
 柱温 : 30°C 波长:318nm
 数据文件名: RC\$JSS-222 - 7-4/7-370-2 - zzp-6022401-1p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-20min-P6.lcd
 方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20260227-FX256.lcb
 样品瓶号: 1-49
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2026/02/27 11:52:56 实验者: xiexinhui
 处理时间 (V2) : 2026/02/28 09:53:51 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.145 | 177303 | 100.000 | 38517 | 1496 | 1.291 | -- |
| 总计 | | 177303 | 100.000 | 38517 | | | |




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
 柱温 : 30°C 波长:318nm
 数据文件名: RC\$JSS-222 - 7-4/7-371-2 - zzp-6022401-1p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-30min-P1.lcd
 方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20260227-FX256.lcb
 样品瓶号: 1-5
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2026/02/27 11:55:47 实验者: xiexinhui
 处理时间 (V2) : 2026/02/28 09:53:54 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.144 | 182962 | 100.000 | 39561 | 1491 | 1.291 | -- |
| 总计 | | 182962 | 100.000 | 39561 | | | |




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
 柱温 : 30°C 波长:318nm
 数据文件名: RC\$JSS-222 - 7-4/7-372-2 - zzp-6022401-1p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-30min-P2.lcd
 方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20260227-FX256.lcb
 样品瓶号: 1-14
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2026/02/27 11:58:40 实验者: xiexinhui
 处理时间 (V2) : 2026/02/28 09:53:57 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 318nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.143 | 184902 | 100.000 | 39878 | 1491 | 1.294 | -- |
| 总计 | | 184902 | 100.000 | 39878 | | | |

〈样品信息〉

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
 柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
 数据文件名: RC\$JSS-222 - 7-4/7-373-2 - zzp-6022401-1p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-30min-P3.lcd
 方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20260227-FX256.lcb
 样品瓶号: 1-23
 进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
 进样时间: 2026/02/27 12:01:32 实验者: xiexinhui
 处理时间 (V2) : 2026/02/28 09:54:00 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉

mV



〈峰表〉

检测器A Ch1 318nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.142 | 183343 | 100.000 | 39567 | 1487 | 1.293 | -- |
| 总计 | | 183343 | 100.000 | 39567 | | | |




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
 柱温 : 30°C 波长:318nm
 数据文件名: RC\$JSS-222 - 7-4/7-374-2 - zzp-6022401-1p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-30min-P4.lcd
 方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20260227-FX256.lcb
 样品瓶号: 1-32
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2026/02/27 12:04:24 实验者: xiexinhui
 处理时间 (V2) : 2026/02/28 09:54:03 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.143 | 180035 | 100.000 | 38829 | 1488 | 1.292 | -- |
| 总计 | | 180035 | 100.000 | 38829 | | | |




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
 柱温 : 30°C 波长:318nm
 数据文件名: RC\$JSS-222 - 7-4/7-375-2 - zzp-6022401-1p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-30min-P5.lcd
 方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20260227-FX256.lcb
 样品瓶号: 1-41
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2026/02/27 12:07:16 实验者: xiexinhui
 处理时间 (V2) : 2026/02/28 09:54:06 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.143 | 183722 | 100.000 | 39537 | 1485 | 1.294 | -- |
| 总计 | | 183722 | 100.000 | 39537 | | | |




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
 柱温 : 30°C 波长:318nm
 数据文件名: RC\$JSS-222 - 7-4/7-376-2 - zzp-6022401-1p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-30min-P6.lcd
 方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20260227-FX256.lcb
 样品瓶号: 1-50
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2026/02/27 12:10:08 实验者: xiexinhui
 处理时间 (V2) : 2026/02/28 09:54:08 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.143 | 182537 | 100.000 | 39326 | 1489 | 1.293 | -- |
| 总计 | | 182537 | 100.000 | 39326 | | | |




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
 柱温 : 30°C 波长:318nm
 数据文件名: RC\$JSS-222 - 7-4/7-377-2 - zzp-6022401-1p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-45min-P1.lcd
 方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20260227-FX256.lcb
 样品瓶号: 1-6
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2026/02/27 12:13:00 实验者: xiexinhui
 处理时间 (V2) : 2026/02/28 09:54:11 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.142 | 185247 | 100.000 | 39854 | 1483 | 1.293 | -- |
| 总计 | | 185247 | 100.000 | 39854 | | | |




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
 柱温 : 30°C 波长:318nm
 数据文件名: RC\$JSS-222 - 7-4/7-378-2 - zzp-6022401-1p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-45min-P2.lcd
 方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20260227-FX256.lcb
 样品瓶号: 1-15
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2026/02/27 12:15:51 实验者: xiexinhui
 处理时间 (V2) : 2026/02/28 09:54:14 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.142 | 187843 | 100.000 | 40549 | 1486 | 1.293 | -- |
| 总计 | | 187843 | 100.000 | 40549 | | | |




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
 柱温 : 30°C 波长:318nm
 数据文件名: RC\$JSS-222 - 7-4/7-379-2 - zzp-6022401-1p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-45min-P3.lcd
 方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20260227-FX256.lcb
 样品瓶号: 1-24
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2026/02/27 12:18:44 实验者: xiexinhui
 处理时间 (V2) : 2026/02/28 09:54:17 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.142 | 186209 | 100.000 | 40261 | 1488 | 1.293 | -- |
| 总计 | | 186209 | 100.000 | 40261 | | | |




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
 柱温 : 30°C 波长:318nm
 数据文件名: RC\$JSS-222 - 7-4/7-380-2 - zzp-6022401-1p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-45min-P4.lcd
 方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20260227-FX256.lcb
 样品瓶号: 1-33
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2026/02/27 12:21:36 实验者: xiexinhui
 处理时间 (V2) : 2026/02/28 09:54:19 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.141 | 182620 | 100.000 | 39567 | 1488 | 1.293 | -- |
| 总计 | | 182620 | 100.000 | 39567 | | | |




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
 柱温 : 30°C 波长:318nm
 数据文件名: RC\$JSS-222 - 7-4/7-381-2 - zzp-6022401-1p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-45min-P5.lcd
 方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20260227-FX256.lcb
 样品瓶号: 1-42
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2026/02/27 12:24:28 实验者: xiexinhui
 处理时间 (V2) : 2026/02/28 09:54:22 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.141 | 186829 | 100.000 | 40461 | 1483 | 1.291 | -- |
| 总计 | | 186829 | 100.000 | 40461 | | | |

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
 柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
 数据文件名: RC\$JSS-222 - 7-4/7-382-2 - zzp-6022401-1p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-45min-P6.lcd
 方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20260227-FX256.lcb
 样品瓶号: 1-51
 进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
 进样时间: 2026/02/27 12:27:20 实验者: xiexinhui
 处理时间 (V2) : 2026/02/28 09:54:25 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.141 | 185456 | 100.000 | 40249 | 1487 | 1.290 | -- |
| 总计 | | 185456 | 100.000 | 40249 | | | |




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
 柱温 : 30°C 波长:318nm
 数据文件名: RC\$JSS-222 - 7-4/7-383-2 - zzp-6022401-1p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-60min-P1.lcd
 方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20260227-FX256.lcb
 样品瓶号: 1-7
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2026/02/27 12:30:12 实验者: xiexinhui
 处理时间 (V2) : 2026/02/28 09:54:27 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.141 | 186267 | 100.000 | 40405 | 1483 | 1.294 | -- |
| 总计 | | 186267 | 100.000 | 40405 | | | |




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
 柱温 : 30°C 波长:318nm
 数据文件名: RC\$JSS-222 - 7-4/7-384-2 - zzp-6022401-1p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-60min-P2.lcd
 方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20260227-FX256.lcb
 样品瓶号: 1-16
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2026/02/27 12:33:04 实验者: xiexinhui
 处理时间 (V2) : 2026/02/28 09:54:30 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 318nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.141 | 189176 | 100.000 | 41009 | 1483 | 1.292 | -- |
| 总计 | | 189176 | 100.000 | 41009 | | | |

〈样品信息〉

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 7-4/7-385-2 - zzp-6022401-1p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-60min-P3.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20260227-FX256.lcb
样品瓶号: 1-25
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2026/02/27 12:35:56 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2026/02/28 09:54:33 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉

mV



〈峰表〉

检测器A Ch1 318nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.140 | 187058 | 100.000 | 40652 | 1482 | 1.292 | -- |
| 总计 | | 187058 | 100.000 | 40652 | | | |




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
 柱温 : 30°C 波长:318nm
 数据文件名: RC\$JSS-222 - 7-4/7-386-2 - zzp-6022401-1p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-60min-P4.lcd
 方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20260227-FX256.lcb
 样品瓶号: 1-34
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2026/02/27 12:38:48 实验者: xiexinhui
 处理时间 (V2) : 2026/02/28 09:54:36 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.141 | 183028 | 100.000 | 39731 | 1487 | 1.294 | -- |
| 总计 | | 183028 | 100.000 | 39731 | | | |




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
 柱温 : 30°C 波长:318nm
 数据文件名: RC\$JSS-222 - 7-4/7-387-2 - zzp-6022401-1p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-60min-P5.lcd
 方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20260227-FX256.lcb
 样品瓶号: 1-43
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2026/02/27 12:41:41 实验者: xiexinhui
 处理时间 (V2) : 2026/02/28 09:54:38 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.142 | 187042 | 100.000 | 40495 | 1488 | 1.293 | -- |
| 总计 | | 187042 | 100.000 | 40495 | | | |




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
 柱温 : 30°C 波长:318nm
 数据文件名: RC\$JSS-222 - 7-4/7-388-2 - zzp-6022401-1p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-60min-P6.lcd
 方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20260227-FX256.lcb
 样品瓶号: 1-52
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2026/02/27 12:44:32 实验者: xiexinhui
 处理时间 (V2) : 2026/02/28 09:54:41 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.141 | 186149 | 100.000 | 40343 | 1483 | 1.293 | -- |
| 总计 | | 186149 | 100.000 | 40343 | | | |




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
 柱温 : 30°C 波长:318nm
 数据文件名: RC\$JSS-222 - 7-4/7-389-2 - zzp-6022401-1p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-jxzs-P1.lcd
 方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20260227-FX256.lcb
 样品瓶号: 1-8
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2026/02/27 12:47:26 实验者: xiexinhui
 处理时间 (V2) : 2026/02/28 09:54:44 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.141 | 187205 | 100.000 | 40634 | 1483 | 1.293 | -- |
| 总计 | | 187205 | 100.000 | 40634 | | | |




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
 柱温 : 30°C 波长:318nm
 数据文件名: RC\$JSS-222 - 7-4/7-390-2 - zzp-6022401-1p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-jxzs-P2.lcd
 方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20260227-FX256.lcb
 样品瓶号: 1-17
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2026/02/27 12:50:20 实验者: xiexinhui
 处理时间 (V2) : 2026/02/28 09:54:46 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.140 | 189863 | 100.000 | 41326 | 1484 | 1.290 | -- |
| 总计 | | 189863 | 100.000 | 41326 | | | |




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
 柱温 : 30°C 波长:318nm
 数据文件名: RC\$JSS-222 - 7-4/7-391-2 - zzp-6022401-1p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-jxzs-P3.lcd
 方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20260227-FX256.lcb
 样品瓶号: 1-26
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2026/02/27 12:53:12 实验者: xiexinhui
 处理时间 (V2) : 2026/02/28 09:54:49 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.140 | 187467 | 100.000 | 40801 | 1485 | 1.290 | -- |
| 总计 | | 187467 | 100.000 | 40801 | | | |




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
 柱温 : 30°C 波长:318nm
 数据文件名: RC\$JSS-222 - 7-4/7-392-2 - zzp-6022401-1p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-jxzs-P4.lcd
 方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20260227-FX256.lcb
 样品瓶号: 1-35
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2026/02/27 12:56:05 实验者: xiexinhui
 处理时间 (V2) : 2026/02/28 09:54:52 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 318nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.139 | 184333 | 100.000 | 40203 | 1481 | 1.290 | -- |
| 总计 | | 184333 | 100.000 | 40203 | | | |

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
 柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
 数据文件名: RC\$JSS-222 - 7-4/7-393-2 - zzp-6022401-1p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-jxzs-P5.lcd
 方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20260227-FX256.lcb
 样品瓶号: 1-44
 进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
 进样时间: 2026/02/27 12:58:57 实验者: xiexinhui
 处理时间 (V2) : 2026/02/28 09:54:55 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.140 | 187801 | 100.000 | 40892 | 1485 | 1.291 | -- |
| 总计 | | 187801 | 100.000 | 40892 | | | |




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
 柱温 : 30°C 波长:318nm
 数据文件名: RC\$JSS-222 - 7-4/7-394-2 - zzp-6022401-1p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-jxzs-P6.lcd
 方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20260227-FX256.lcb
 样品瓶号: 1-53
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2026/02/27 13:01:50 实验者: xiexinhui
 处理时间 (V2) : 2026/02/28 09:54:57 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.139 | 186760 | 100.000 | 40740 | 1483 | 1.289 | -- |
| 总计 | | 186760 | 100.000 | 40740 | | | |




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
 柱温 : 30°C 波长:318nm
 数据文件名: RC\$JSS-222 - 7-4/7-395-2 - zzp-6022401-1p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-dz2-1.lcd
 方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20260227-FX256.lcb
 样品瓶号: 1-27
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2026/02/27 13:04:43 实验者: xiexinhui
 处理时间 (V2) : 2026/02/28 09:55:00 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.171 | 189167 | 100.000 | 40977 | 1538 | 1.267 | -- |
| 总计 | | 189167 | 100.000 | 40977 | | | |

〈样品信息〉

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 7-4/7-396-2 - zzp-6022401-1p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-dz2-2.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20260227-FX256.lcb
样品瓶号: 1-27
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2026/02/27 13:07:36 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2026/02/28 09:55:03 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉

mV



〈峰表〉

检测器A Ch1 318nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.172 | 188994 | 100.000 | 40892 | 1537 | 1.271 | -- |
| 总计 | | 188994 | 100.000 | 40892 | | | |

〈样品信息〉

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 7-4/7-397-2 - zzp-6022401-2p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-rj.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20260227-FX256.lcb
样品瓶号: 2-9
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2026/02/27 13:10:30 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2026/02/28 09:55:05 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉

mV



〈峰表〉

检测器A Ch1 318nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|------|----|-----|----|------------|------|----------|
| 总计 | | | | | | | |




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
 柱温 : 30°C 波长:318nm
 数据文件名: RC\$JSS-222 - 7-4/7-398-2 - zzp-6022401-2p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-dz1-1.lcd
 方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20260227-FX256.lcb
 样品瓶号: 2-18
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2026/02/27 13:13:24 实验者: xiexinhui
 处理时间 (V2) : 2026/02/28 09:55:08 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.172 | 189884 | 100.000 | 41122 | 1540 | 1.270 | -- |
| 总计 | | 189884 | 100.000 | 41122 | | | |




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
 柱温 : 30°C 波长:318nm
 数据文件名: RC\$JSS-222 - 7-4/7-399-2 - zzp-6022401-2p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-dz1-2.lcd
 方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20260227-FX256.lcb
 样品瓶号: 2-18
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2026/02/27 13:16:18 实验者: xiexinhui
 处理时间 (V2) : 2026/02/28 09:55:10 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.173 | 189695 | 100.000 | 41054 | 1542 | 1.273 | -- |
| 总计 | | 189695 | 100.000 | 41054 | | | |




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
 柱温 : 30°C 波长:318nm
 数据文件名: RC\$JSS-222 - 7-4/7-400-2 - zzp-6022401-2p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-dz1-3.lcd
 方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20260227-FX256.lcb
 样品瓶号: 2-18
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2026/02/27 13:19:12 实验者: xiexinhui
 处理时间 (V2) : 2026/02/28 09:55:13 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.172 | 189749 | 100.000 | 41132 | 1540 | 1.269 | -- |
| 总计 | | 189749 | 100.000 | 41132 | | | |




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
 柱温 : 30°C 波长:318nm
 数据文件名: RC\$JSS-222 - 7-4/7-401-2 - zzp-6022401-2p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-dz1-4.lcd
 方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20260227-FX256.lcb
 样品瓶号: 2-18
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2026/02/27 13:22:06 实验者: xiexinhui
 处理时间 (V2) : 2026/02/28 09:55:16 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.172 | 189733 | 100.000 | 41120 | 1537 | 1.270 | -- |
| 总计 | | 189733 | 100.000 | 41120 | | | |




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
 柱温 : 30°C 波长:318nm
 数据文件名: RC\$JSS-222 - 7-4/7-402-2 - zzp-6022401-2p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-dz1-5.lcd
 方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20260227-FX256.lcb
 样品瓶号: 2-18
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2026/02/27 13:25:00 实验者: xiexinhui
 处理时间 (V2) : 2026/02/28 09:55:18 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.173 | 189659 | 100.000 | 41077 | 1542 | 1.270 | -- |
| 总计 | | 189659 | 100.000 | 41077 | | | |




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
 柱温 : 30°C 波长:318nm
 数据文件名: RC\$JSS-222 - 7-4/7-403-2 - zzp-6022401-2p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-5min-P1.lcd
 方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20260227-FX256.lcb
 样品瓶号: 2-1
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2026/02/27 13:27:52 实验者: xiexinhui
 处理时间 (V2) : 2026/02/28 09:55:21 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.138 | 123859 | 100.000 | 26983 | 1481 | 1.306 | -- |
| 总计 | | 123859 | 100.000 | 26983 | | | |




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
 柱温 : 30°C 波长:318nm
 数据文件名: RC\$JSS-222 - 7-4/7-404-2 - zzp-6022401-2p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-5min-P2.lcd
 方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20260227-FX256.lcb
 样品瓶号: 2-10
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2026/02/27 13:30:46 实验者: xiexinhui
 处理时间 (V2) : 2026/02/28 09:55:24 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.139 | 119617 | 100.000 | 26078 | 1481 | 1.303 | -- |
| 总计 | | 119617 | 100.000 | 26078 | | | |




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
 柱温 : 30°C 波长:318nm
 数据文件名: RC\$JSS-222 - 7-4/7-405-2 - zzp-6022401-2p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-5min-P3.lcd
 方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20260227-FX256.lcb
 样品瓶号: 2-19
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2026/02/27 13:33:39 实验者: xiexinhui
 处理时间 (V2) : 2026/02/28 09:55:26 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.138 | 119948 | 100.000 | 26130 | 1481 | 1.306 | -- |
| 总计 | | 119948 | 100.000 | 26130 | | | |




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
 柱温 : 30°C 波长:318nm
 数据文件名: RC\$JSS-222 - 7-4/7-406-2 - zzp-6022401-2p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-5min-P4.lcd
 方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20260227-FX256.lcb
 样品瓶号: 2-28
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2026/02/27 13:36:32 实验者: xiexinhui
 处理时间 (V2) : 2026/02/28 09:55:29 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.138 | 122009 | 100.000 | 26643 | 1483 | 1.303 | -- |
| 总计 | | 122009 | 100.000 | 26643 | | | |




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
 柱温 : 30°C 波长:318nm
 数据文件名: RC\$JSS-222 - 7-4/7-407-2 - zzp-6022401-2p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-5min-P5.lcd
 方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20260227-FX256.lcb
 样品瓶号: 2-37
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2026/02/27 13:39:25 实验者: xiexinhui
 处理时间 (V2) : 2026/02/28 09:55:32 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.138 | 123698 | 100.000 | 26968 | 1482 | 1.305 | -- |
| 总计 | | 123698 | 100.000 | 26968 | | | |




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
 柱温 : 30°C 波长:318nm
 数据文件名: RC\$JSS-222 - 7-4/7-408-2 - zzp-6022401-2p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-5min-P6.lcd
 方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20260227-FX256.lcb
 样品瓶号: 2-46
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2026/02/27 13:42:18 实验者: xiexinhui
 处理时间 (V2) : 2026/02/28 09:55:34 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.137 | 115889 | 100.000 | 25263 | 1482 | 1.308 | -- |
| 总计 | | 115889 | 100.000 | 25263 | | | |




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
 柱温 : 30°C 波长:318nm
 数据文件名: RC\$JSS-222 - 7-4/7-409-2 - zzp-6022401-2p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-10min-P1.lcd
 方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20260227-FX256.lcb
 样品瓶号: 2-2
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2026/02/27 13:45:11 实验者: xiexinhui
 处理时间 (V2) : 2026/02/28 09:55:37 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.138 | 163503 | 100.000 | 35735 | 1488 | 1.296 | -- |
| 总计 | | 163503 | 100.000 | 35735 | | | |




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
 柱温 : 30°C 波长:318nm
 数据文件名: RC\$JSS-222 - 7-4/7-410-2 - zzp-6022401-2p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-10min-P2.lcd
 方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20260227-FX256.lcb
 样品瓶号: 2-11
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2026/02/27 13:48:04 实验者: xiexinhui
 处理时间 (V2) : 2026/02/28 09:55:40 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.138 | 160493 | 100.000 | 35084 | 1489 | 1.298 | -- |
| 总计 | | 160493 | 100.000 | 35084 | | | |




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
 柱温 : 30°C 波长:318nm
 数据文件名: RC\$JSS-222 - 7-4/7-411-2 - zzp-6022401-2p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-10min-P3.lcd
 方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20260227-FX256.lcb
 样品瓶号: 2-20
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2026/02/27 13:50:57 实验者: xiexinhui
 处理时间 (V2) : 2026/02/28 09:55:43 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.138 | 161111 | 100.000 | 35152 | 1486 | 1.300 | -- |
| 总计 | | 161111 | 100.000 | 35152 | | | |




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
 柱温 : 30°C 波长:318nm
 数据文件名: RC\$JSS-222 - 7-4/7-412-2 - zzp-6022401-2p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-10min-P4.lcd
 方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20260227-FX256.lcb
 样品瓶号: 2-29
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2026/02/27 13:53:50 实验者: xiexinhui
 处理时间 (V2) : 2026/02/28 09:55:45 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.138 | 163396 | 100.000 | 35695 | 1485 | 1.294 | -- |
| 总计 | | 163396 | 100.000 | 35695 | | | |




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
 柱温 : 30°C 波长:318nm
 数据文件名: RC\$JSS-222 - 7-4/7-413-2 - zzp-6022401-2p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-10min-P5.lcd
 方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20260227-FX256.lcb
 样品瓶号: 2-38
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2026/02/27 13:56:43 实验者: xiexinhui
 处理时间 (V2) : 2026/02/28 09:55:48 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.138 | 164252 | 100.000 | 35888 | 1490 | 1.299 | -- |
| 总计 | | 164252 | 100.000 | 35888 | | | |

〈样品信息〉

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 7-4/7-414-2 - zzp-6022401-2p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-10min-P6.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20260227-FX256.lcb
样品瓶号: 2-47
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2026/02/27 13:59:36 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2026/02/28 09:55:51 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉

mV



〈峰表〉

检测器A Ch1 318nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.138 | 160417 | 100.000 | 35084 | 1490 | 1.296 | -- |
| 总计 | | 160417 | 100.000 | 35084 | | | |




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
 柱温 : 30°C 波长:318nm
 数据文件名: RC\$JSS-222 - 7-4/7-415-2 - zzp-6022401-2p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-15min-P1.lcd
 方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20260227-FX256.lcb
 样品瓶号: 2-3
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2026/02/27 14:02:30 实验者: xiexinhui
 处理时间 (V2) : 2026/02/28 09:55:54 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.139 | 176979 | 100.000 | 38598 | 1486 | 1.297 | -- |
| 总计 | | 176979 | 100.000 | 38598 | | | |




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
 柱温 : 30°C 波长:318nm
 数据文件名: RC\$JSS-222 - 7-4/7-416-2 - zzp-6022401-2p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-15min-P2.lcd
 方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20260227-FX256.lcb
 样品瓶号: 2-12
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2026/02/27 14:05:23 实验者: xiexinhui
 处理时间 (V2) : 2026/02/28 09:55:57 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.138 | 174175 | 100.000 | 38087 | 1492 | 1.295 | -- |
| 总计 | | 174175 | 100.000 | 38087 | | | |




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
 柱温 : 30°C 波长:318nm
 数据文件名: RC\$JSS-222 - 7-4/7-417-2 - zzp-6022401-2p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-15min-P3.lcd
 方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20260227-FX256.lcb
 样品瓶号: 2-21
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2026/02/27 14:08:17 实验者: xiexinhui
 处理时间 (V2) : 2026/02/28 09:56:00 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.139 | 175154 | 100.000 | 38311 | 1492 | 1.297 | -- |
| 总计 | | 175154 | 100.000 | 38311 | | | |




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
 柱温 : 30°C 波长:318nm
 数据文件名: RC\$JSS-222 - 7-4/7-418-2 - zzp-6022401-2p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-15min-P4.lcd
 方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20260227-FX256.lcb
 样品瓶号: 2-30
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2026/02/27 14:11:11 实验者: xiexinhui
 处理时间 (V2) : 2026/02/28 09:56:03 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.139 | 177798 | 100.000 | 38822 | 1492 | 1.298 | -- |
| 总计 | | 177798 | 100.000 | 38822 | | | |




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
 柱温 : 30°C 波长:318nm
 数据文件名: RC\$JSS-222 - 7-4/7-419-2 - zzp-6022401-2p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-15min-P5.lcd
 方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20260227-FX256.lcb
 样品瓶号: 2-39
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2026/02/27 14:14:04 实验者: xiexinhui
 处理时间 (V2) : 2026/02/28 09:56:05 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.139 | 178317 | 100.000 | 39029 | 1495 | 1.294 | -- |
| 总计 | | 178317 | 100.000 | 39029 | | | |




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
 柱温 : 30°C 波长:318nm
 数据文件名: RC\$JSS-222 - 7-4/7-420-2 - zzp-6022401-2p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-15min-P6.lcd
 方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20260227-FX256.lcb
 样品瓶号: 2-48
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2026/02/27 14:16:57 实验者: xiexinhui
 处理时间 (V2) : 2026/02/28 09:56:08 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.138 | 175274 | 100.000 | 38309 | 1491 | 1.297 | -- |
| 总计 | | 175274 | 100.000 | 38309 | | | |




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
 柱温 : 30°C 波长:318nm
 数据文件名: RC\$JSS-222 - 7-4/7-421-2 - zzp-6022401-2p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-20min-P1.lcd
 方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20260227-FX256.lcb
 样品瓶号: 2-4
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2026/02/27 14:19:50 实验者: xiexinhui
 处理时间 (V2) : 2026/02/28 09:56:11 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.140 | 184209 | 100.000 | 40251 | 1511 | 1.278 | -- |
| 总计 | | 184209 | 100.000 | 40251 | | | |




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
 柱温 : 30°C 波长:318nm
 数据文件名: RC\$JSS-222 - 7-4/7-422-2 - zzp-6022401-2p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-20min-P2.lcd
 方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20260227-FX256.lcb
 样品瓶号: 2-13
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2026/02/27 14:22:44 实验者: xiexinhui
 处理时间 (V2) : 2026/02/28 09:56:14 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.139 | 179887 | 100.000 | 39333 | 1491 | 1.297 | -- |
| 总计 | | 179887 | 100.000 | 39333 | | | |




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
 柱温 : 30°C 波长:318nm
 数据文件名: RC\$JSS-222 - 7-4/7-423-2 - zzp-6022401-2p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-20min-P3.lcd
 方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20260227-FX256.lcb
 样品瓶号: 2-22
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2026/02/27 14:25:37 实验者: xiexinhui
 处理时间 (V2) : 2026/02/28 09:56:16 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.138 | 181560 | 100.000 | 39624 | 1489 | 1.296 | -- |
| 总计 | | 181560 | 100.000 | 39624 | | | |




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
 柱温 : 30°C 波长:318nm
 数据文件名: RC\$JSS-222 - 7-4/7-424-2 - zzp-6022401-2p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-20min-P4.lcd
 方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20260227-FX256.lcb
 样品瓶号: 2-31
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2026/02/27 14:28:31 实验者: xiexinhui
 处理时间 (V2) : 2026/02/28 09:56:19 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.137 | 183873 | 100.000 | 40213 | 1489 | 1.293 | -- |
| 总计 | | 183873 | 100.000 | 40213 | | | |




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
 柱温 : 30°C 波长:318nm
 数据文件名: RC\$JSS-222 - 7-4/7-425-2 - zzp-6022401-2p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-20min-P5.lcd
 方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20260227-FX256.lcb
 样品瓶号: 2-40
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2026/02/27 14:31:24 实验者: xiexinhui
 处理时间 (V2) : 2026/02/28 09:56:22 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.137 | 184934 | 100.000 | 40448 | 1487 | 1.293 | -- |
| 总计 | | 184934 | 100.000 | 40448 | | | |




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
 柱温 : 30°C 波长:318nm
 数据文件名: RC\$JSS-222 - 7-4/7-426-2 - zzp-6022401-2p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-20min-P6.lcd
 方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20260227-FX256.lcb
 样品瓶号: 2-49
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2026/02/27 14:34:17 实验者: xiexinhui
 处理时间 (V2) : 2026/02/28 09:56:24 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.138 | 182209 | 100.000 | 39828 | 1489 | 1.292 | -- |
| 总计 | | 182209 | 100.000 | 39828 | | | |




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
 柱温 : 30°C 波长:318nm
 数据文件名: RC\$JSS-222 - 7-4/7-427-2 - zzp-6022401-2p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-30min-P1.lcd
 方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20260227-FX256.lcb
 样品瓶号: 2-5
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2026/02/27 14:37:11 实验者: xiexinhui
 处理时间 (V2) : 2026/02/28 09:56:27 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.139 | 187216 | 100.000 | 40914 | 1488 | 1.292 | -- |
| 总计 | | 187216 | 100.000 | 40914 | | | |




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
 柱温 : 30°C 波长:318nm
 数据文件名: RC\$JSS-222 - 7-4/7-428-2 - zzp-6022401-2p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-30min-P2.lcd
 方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20260227-FX256.lcb
 样品瓶号: 2-14
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2026/02/27 14:40:05 实验者: xiexinhui
 处理时间 (V2) : 2026/02/28 09:56:29 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.139 | 185122 | 100.000 | 40449 | 1493 | 1.297 | -- |
| 总计 | | 185122 | 100.000 | 40449 | | | |




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
 柱温 : 30°C 波长:318nm
 数据文件名: RC\$JSS-222 - 7-4/7-429-2 - zzp-6022401-2p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-30min-P3.lcd
 方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20260227-FX256.lcb
 样品瓶号: 2-23
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2026/02/27 14:42:59 实验者: xiexinhui
 处理时间 (V2) : 2026/02/28 09:56:32 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.139 | 186688 | 100.000 | 40840 | 1494 | 1.295 | -- |
| 总计 | | 186688 | 100.000 | 40840 | | | |

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
 柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
 数据文件名: RC\$JSS-222 - 7-4/7-430-2 - zzp-6022401-2p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-30min-P4.lcd
 方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20260227-FX256.lcb
 样品瓶号: 2-32
 进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
 进样时间: 2026/02/27 14:45:52 实验者: xiexinhui
 处理时间 (V2) : 2026/02/28 09:56:35 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.138 | 188576 | 100.000 | 41307 | 1497 | 1.291 | -- |
| 总计 | | 188576 | 100.000 | 41307 | | | |




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
 柱温 : 30°C 波长:318nm
 数据文件名: RC\$JSS-222 - 7-4/7-431-2 - zzp-6022401-2p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-30min-P5.lcd
 方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20260227-FX256.lcb
 样品瓶号: 2-41
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2026/02/27 14:48:46 实验者: xiexinhui
 处理时间 (V2) : 2026/02/28 09:56:37 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.139 | 189914 | 100.000 | 41653 | 1500 | 1.290 | -- |
| 总计 | | 189914 | 100.000 | 41653 | | | |




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
 柱温 : 30°C 波长:318nm
 数据文件名: RC\$JSS-222 - 7-4/7-432-2 - zzp-6022401-2p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-30min-P6.lcd
 方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20260227-FX256.lcb
 样品瓶号: 2-50
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2026/02/27 14:51:39 实验者: xiexinhui
 处理时间 (V2) : 2026/02/28 09:56:40 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.136 | 187779 | 100.000 | 41028 | 1493 | 1.292 | -- |
| 总计 | | 187779 | 100.000 | 41028 | | | |

〈样品信息〉

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 7-4/7-433-2 - zzp-6022401-2p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-45min-P1.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20260227-FX256.lcb
样品瓶号: 2-6
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2026/02/27 14:54:33 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2026/02/28 09:56:43 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉

mV



〈峰表〉

检测器A Ch1 318nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.138 | 189631 | 100.000 | 41508 | 1496 | 1.292 | -- |
| 总计 | | 189631 | 100.000 | 41508 | | | |




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
 柱温 : 30°C 波长:318nm
 数据文件名: RC\$JSS-222 - 7-4/7-434-2 - zzp-6022401-2p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-45min-P2.lcd
 方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20260227-FX256.lcb
 样品瓶号: 2-15
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2026/02/27 14:57:27 实验者: xiexinhui
 处理时间 (V2) : 2026/02/28 09:56:45 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.139 | 187609 | 100.000 | 41133 | 1499 | 1.291 | -- |
| 总计 | | 187609 | 100.000 | 41133 | | | |

〈样品信息〉

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 7-4/7-435-2 - zzp-6022401-2p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-45min-P3.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20260227-FX256.lcb
样品瓶号: 2-24
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2026/02/27 15:00:21 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2026/02/28 09:56:48 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉

mV



〈峰表〉

检测器A Ch1 318nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.137 | 188876 | 100.000 | 41343 | 1495 | 1.295 | -- |
| 总计 | | 188876 | 100.000 | 41343 | | | |




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
 柱温 : 30°C 波长:318nm
 数据文件名: RC\$JSS-222 - 7-4/7-436-2 - zzp-6022401-2p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-45min-P4.lcd
 方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20260227-FX256.lcb
 样品瓶号: 2-33
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2026/02/27 15:03:14 实验者: xiexinhui
 处理时间 (V2) : 2026/02/28 09:56:51 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.139 | 190357 | 100.000 | 41789 | 1500 | 1.292 | -- |
| 总计 | | 190357 | 100.000 | 41789 | | | |




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
 柱温 : 30°C 波长:318nm
 数据文件名: RC\$JSS-222 - 7-4/7-437-2 - zzp-6022401-2p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-45min-P5.lcd
 方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20260227-FX256.lcb
 样品瓶号: 2-42
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2026/02/27 15:06:08 实验者: xiexinhui
 处理时间 (V2) : 2026/02/28 09:56:53 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 318nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.139 | 192028 | 100.000 | 42122 | 1498 | 1.290 | -- |
| 总计 | | 192028 | 100.000 | 42122 | | | |

〈样品信息〉

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 7-4/7-438-2 - zzp-6022401-2p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-45min-P6.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20260227-FX256.lcb
样品瓶号: 2-51
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2026/02/27 15:09:01 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2026/02/28 09:56:56 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉

mV



〈峰表〉

检测器A Ch1 318nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.138 | 190558 | 100.000 | 41735 | 1497 | 1.292 | -- |
| 总计 | | 190558 | 100.000 | 41735 | | | |




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
 柱温 : 30°C 波长:318nm
 数据文件名: RC\$JSS-222 - 7-4/7-439-2 - zzp-6022401-2p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-60min-P1.lcd
 方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20260227-FX256.lcb
 样品瓶号: 2-7
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2026/02/27 15:11:54 实验者: xiexinhui
 处理时间 (V2) : 2026/02/28 09:56:59 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.136 | 190400 | 100.000 | 41596 | 1493 | 1.292 | -- |
| 总计 | | 190400 | 100.000 | 41596 | | | |




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
 柱温 : 30°C 波长:318nm
 数据文件名: RC\$JSS-222 - 7-4/7-440-2 - zzp-6022401-2p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-60min-P2.lcd
 方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20260227-FX256.lcb
 样品瓶号: 2-16
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2026/02/27 15:14:48 实验者: xiexinhui
 处理时间 (V2) : 2026/02/28 09:57:01 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 318nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.138 | 187951 | 100.000 | 41121 | 1492 | 1.293 | -- |
| 总计 | | 187951 | 100.000 | 41121 | | | |

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
 柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
 数据文件名: RC\$JSS-222 - 7-4/7-441-2 - zzp-6022401-2p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-60min-P3.lcd
 方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20260227-FX256.lcb
 样品瓶号: 2-25
 进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
 进样时间: 2026/02/27 15:17:42 实验者: xiexinhui
 处理时间 (V2) : 2026/02/28 09:57:04 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.138 | 189085 | 100.000 | 41398 | 1495 | 1.294 | -- |
| 总计 | | 189085 | 100.000 | 41398 | | | |




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
 柱温 : 30°C 波长:318nm
 数据文件名: RC\$JSS-222 - 7-4/7-442-2 - zzp-6022401-2p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-60min-P4.lcd
 方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20260227-FX256.lcb
 样品瓶号: 2-34
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2026/02/27 15:20:36 实验者: xiexinhui
 处理时间 (V2) : 2026/02/28 09:57:07 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.138 | 191280 | 100.000 | 41825 | 1493 | 1.292 | -- |
| 总计 | | 191280 | 100.000 | 41825 | | | |




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
 柱温 : 30°C 波长:318nm
 数据文件名: RC\$JSS-222 - 7-4/7-443-2 - zzp-6022401-2p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-60min-P5.lcd
 方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20260227-FX256.lcb
 样品瓶号: 2-43
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2026/02/27 15:23:30 实验者: xiexinhui
 处理时间 (V2) : 2026/02/28 09:57:09 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.138 | 193082 | 100.000 | 42278 | 1496 | 1.291 | -- |
| 总计 | | 193082 | 100.000 | 42278 | | | |




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
 柱温 : 30°C 波长:318nm
 数据文件名: RC\$JSS-222 - 7-4/7-444-2 - zzp-6022401-2p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-60min-P6.lcd
 方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20260227-FX256.lcb
 样品瓶号: 2-52
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2026/02/27 15:26:23 实验者: xiexinhui
 处理时间 (V2) : 2026/02/28 09:57:12 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.139 | 192296 | 100.000 | 42069 | 1494 | 1.291 | -- |
| 总计 | | 192296 | 100.000 | 42069 | | | |

〈样品信息〉

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 7-4/7-445-2 - zzp-6022401-2p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-jxzs-P1.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20260227-FX256.lcb
样品瓶号: 2-8
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2026/02/27 15:29:17 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2026/02/28 09:57:15 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉

mV



〈峰表〉

检测器A Ch1 318nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.137 | 190586 | 100.000 | 41720 | 1493 | 1.293 | -- |
| 总计 | | 190586 | 100.000 | 41720 | | | |




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
 柱温 : 30°C 波长:318nm
 数据文件名: RC\$JSS-222 - 7-4/7-446-2 - zzp-6022401-2p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-jxzs-P2.lcd
 方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20260227-FX256.lcb
 样品瓶号: 2-17
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2026/02/27 15:32:10 实验者: xiexinhui
 处理时间 (V2) : 2026/02/28 09:57:18 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.138 | 188723 | 100.000 | 41264 | 1491 | 1.292 | -- |
| 总计 | | 188723 | 100.000 | 41264 | | | |




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
 柱温 : 30°C 波长:318nm
 数据文件名: RC\$JSS-222 - 7-4/7-447-2 - zzp-6022401-2p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-jxzs-P3.lcd
 方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20260227-FX256.lcb
 样品瓶号: 2-26
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2026/02/27 15:35:04 实验者: xiexinhui
 处理时间 (V2) : 2026/02/28 09:57:20 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.138 | 188880 | 100.000 | 41363 | 1492 | 1.292 | -- |
| 总计 | | 188880 | 100.000 | 41363 | | | |




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
 柱温 : 30°C 波长:318nm
 数据文件名: RC\$JSS-222 - 7-4/7-448-2 - zzp-6022401-2p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-jxzs-P4.lcd
 方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20260227-FX256.lcb
 样品瓶号: 2-35
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2026/02/27 15:37:58 实验者: xiexinhui
 处理时间 (V2) : 2026/02/28 09:57:23 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.137 | 190798 | 100.000 | 41738 | 1487 | 1.289 | -- |
| 总计 | | 190798 | 100.000 | 41738 | | | |




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
 柱温 : 30°C 波长:318nm
 数据文件名: RC\$JSS-222 - 7-4/7-449-2 - zzp-6022401-2p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-jxzs-P5.lcd
 方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20260227-FX256.lcb
 样品瓶号: 2-44
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2026/02/27 15:40:52 实验者: xiexinhui
 处理时间 (V2) : 2026/02/28 09:57:26 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.138 | 192868 | 100.000 | 42204 | 1493 | 1.291 | -- |
| 总计 | | 192868 | 100.000 | 42204 | | | |




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
 柱温 : 30°C 波长:318nm
 数据文件名: RC\$JSS-222 - 7-4/7-450-2 - zzp-6022401-2p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-jxzs-P6.lcd
 方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20260227-FX256.lcb
 样品瓶号: 2-53
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2026/02/27 15:43:46 实验者: xiexinhui
 处理时间 (V2) : 2026/02/28 09:57:28 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.138 | 191600 | 100.000 | 41903 | 1493 | 1.291 | -- |
| 总计 | | 191600 | 100.000 | 41903 | | | |




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
 柱温 : 30°C 波长:318nm
 数据文件名: RC\$JSS-222 - 7-4/7-451-2 - zzp-6022401-2p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-dz2-1.lcd
 方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20260227-FX256.lcb
 样品瓶号: 2-27
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2026/02/27 15:46:40 实验者: xiexinhui
 处理时间 (V2) : 2026/02/28 09:57:31 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 318nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.169 | 189628 | 100.000 | 40947 | 1539 | 1.272 | -- |
| 总计 | | 189628 | 100.000 | 40947 | | | |

〈样品信息〉

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 7-4/7-452-2 - zzp-6022401-2p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-dz2-2.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20260227-FX256.lcb
样品瓶号: 2-27
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2026/02/27 15:49:34 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2026/02/28 09:57:34 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉

mV



〈峰表〉

检测器A Ch1 318nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.169 | 189820 | 100.000 | 41057 | 1539 | 1.271 | -- |
| 总计 | | 189820 | 100.000 | 41057 | | | |




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
 柱温 : 30°C 波长:318nm
 数据文件名: RC\$JSS-222 - 7-4/7-453-2 - zzp-6022402p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-rj.lcd
 方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20260227-FX256.lcb
 样品瓶号: 3-9
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2026/02/27 15:52:26 实验者: xiexinhui
 处理时间 (V2) : 2026/02/28 09:57:36 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|------|----|-----|----|------------|------|----------|
| 总计 | | | | | | | |




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
 柱温 : 30°C 波长:318nm
 数据文件名: RC\$JSS-222 - 7-4/7-454-2 - zzp-6022402p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-dz1-1.lcd
 方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20260227-FX256.lcb
 样品瓶号: 3-18
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2026/02/27 15:55:18 实验者: xiexinhui
 处理时间 (V2) : 2026/02/28 09:57:39 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.169 | 189072 | 100.000 | 40945 | 1540 | 1.271 | -- |
| 总计 | | 189072 | 100.000 | 40945 | | | |




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
 柱温 : 30°C 波长:318nm
 数据文件名: RC\$JSS-222 - 7-4/7-455-2 - zzp-6022402p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-dz1-2.lcd
 方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20260227-FX256.lcb
 样品瓶号: 3-18
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2026/02/27 15:58:11 实验者: xiexinhui
 处理时间 (V2) : 2026/02/28 09:57:41 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.170 | 188916 | 100.000 | 40942 | 1544 | 1.271 | -- |
| 总计 | | 188916 | 100.000 | 40942 | | | |




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
 柱温 : 30°C 波长:318nm
 数据文件名: RC\$JSS-222 - 7-4/7-456-2 - zzp-6022402p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-dz1-3.lcd
 方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20260227-FX256.lcb
 样品瓶号: 3-18
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2026/02/27 16:01:03 实验者: xiexinhui
 处理时间 (V2) : 2026/02/28 09:57:44 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.168 | 188887 | 100.000 | 40800 | 1538 | 1.272 | -- |
| 总计 | | 188887 | 100.000 | 40800 | | | |




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
 柱温 : 30°C 波长:318nm
 数据文件名: RC\$JSS-222 - 7-4/7-457-2 - zzp-6022402p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-dz1-4.lcd
 方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20260227-FX256.lcb
 样品瓶号: 3-18
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2026/02/27 16:03:56 实验者: xiexinhui
 处理时间 (V2) : 2026/02/28 09:57:47 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.169 | 188806 | 100.000 | 40851 | 1542 | 1.271 | -- |
| 总计 | | 188806 | 100.000 | 40851 | | | |




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
 柱温 : 30°C 波长:318nm
 数据文件名: RC\$JSS-222 - 7-4/7-458-2 - zzp-6022402p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-dz1-5.lcd
 方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20260227-FX256.lcb
 样品瓶号: 3-18
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2026/02/27 16:06:48 实验者: xiexinhui
 处理时间 (V2) : 2026/02/28 09:57:49 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.168 | 189055 | 100.000 | 40730 | 1536 | 1.275 | -- |
| 总计 | | 189055 | 100.000 | 40730 | | | |




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
 柱温 : 30°C 波长:318nm
 数据文件名: RC\$JSS-222 - 7-4/7-459-2 - zzp-6022402p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-5min-P1.lcd
 方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20260227-FX256.lcb
 样品瓶号: 3-1
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2026/02/27 16:09:40 实验者: xiexinhui
 处理时间 (V2) : 2026/02/28 09:57:52 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.135 | 112273 | 100.000 | 24414 | 1484 | 1.313 | -- |
| 总计 | | 112273 | 100.000 | 24414 | | | |




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
 柱温 : 30°C 波长:318nm
 数据文件名: RC\$JSS-222 - 7-4/7-460-2 - zzp-6022402p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-5min-P2.lcd
 方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20260227-FX256.lcb
 样品瓶号: 3-10
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2026/02/27 16:12:32 实验者: xiexinhui
 处理时间 (V2) : 2026/02/28 09:57:56 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.135 | 113112 | 100.000 | 24543 | 1484 | 1.312 | -- |
| 总计 | | 113112 | 100.000 | 24543 | | | |




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
 柱温 : 30°C 波长:318nm
 数据文件名: RC\$JSS-222 - 7-4/7-461-2 - zzp-6022402p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-5min-P3.lcd
 方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20260227-FX256.lcb
 样品瓶号: 3-19
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2026/02/27 16:15:24 实验者: xiexinhui
 处理时间 (V2) : 2026/02/28 09:57:58 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.136 | 116382 | 100.000 | 25335 | 1483 | 1.306 | -- |
| 总计 | | 116382 | 100.000 | 25335 | | | |




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
 柱温 : 30°C 波长:318nm
 数据文件名: RC\$JSS-222 - 7-4/7-462-2 - zzp-6022402p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-5min-P4.lcd
 方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20260227-FX256.lcb
 样品瓶号: 3-28
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2026/02/27 16:18:16 实验者: xiexinhui
 处理时间 (V2) : 2026/02/28 09:58:01 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.135 | 114732 | 100.000 | 24928 | 1477 | 1.308 | -- |
| 总计 | | 114732 | 100.000 | 24928 | | | |




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
 柱温 : 30°C 波长:318nm
 数据文件名: RC\$JSS-222 - 7-4/7-463-2 - zzp-6022402p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-5min-P5.lcd
 方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20260227-FX256.lcb
 样品瓶号: 3-37
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2026/02/27 16:21:08 实验者: xiexinhui
 处理时间 (V2) : 2026/02/28 09:58:04 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.135 | 108568 | 100.000 | 23616 | 1483 | 1.314 | -- |
| 总计 | | 108568 | 100.000 | 23616 | | | |




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5µm) 流速:1.5ml/min
 柱温 : 30°C 波长:318nm
 数据文件名: RC\$JSS-222 - 7-4/7-464-2 - zzp-6022402p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-5min-P6.lcd
 方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20260227-FX256.lcb
 样品瓶号: 3-46
 进样体积: 10 µl 版本号:6.115
 进样时间: 2026/02/27 16:23:59 实验者: xiexinhui
 处理时间 (V2) : 2026/02/28 09:58:07 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.135 | 111598 | 100.000 | 24284 | 1483 | 1.311 | -- |
| 总计 | | 111598 | 100.000 | 24284 | | | |




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
 柱温 : 30°C 波长:318nm
 数据文件名: RC\$JSS-222 - 7-4/7-465-2 - zzp-6022402p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-10min-P1.lcd
 方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20260227-FX256.lcb
 样品瓶号: 3-2
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2026/02/27 16:26:51 实验者: xiexinhui
 处理时间 (V2) : 2026/02/28 09:58:10 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.136 | 147819 | 100.000 | 32154 | 1482 | 1.303 | -- |
| 总计 | | 147819 | 100.000 | 32154 | | | |




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
 柱温 : 30°C 波长:318nm
 数据文件名: RC\$JSS-222 - 7-4/7-466-2 - zzp-6022402p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-10min-P2.lcd
 方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20260227-FX256.lcb
 样品瓶号: 3-11
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2026/02/27 16:29:43 实验者: xiexinhui
 处理时间 (V2) : 2026/02/28 09:58:12 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.136 | 149990 | 100.000 | 32697 | 1487 | 1.303 | -- |
| 总计 | | 149990 | 100.000 | 32697 | | | |

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 7-4/7-467-2 - zzp-6022402p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-10min-P3.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20260227-FX256.lcb
样品瓶号: 3-20
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2026/02/27 16:32:35 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2026/02/28 09:58:15 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.135 | 152316 | 100.000 | 33133 | 1482 | 1.300 | -- |
| 总计 | | 152316 | 100.000 | 33133 | | | |




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
 柱温 : 30°C 波长:318nm
 数据文件名: RC\$JSS-222 - 7-4/7-468-2 - zzp-6022402p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-10min-P4.lcd
 方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20260227-FX256.lcb
 样品瓶号: 3-29
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2026/02/27 16:35:27 实验者: xiexinhui
 处理时间 (V2) : 2026/02/28 09:58:18 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.136 | 149665 | 100.000 | 32683 | 1489 | 1.301 | -- |
| 总计 | | 149665 | 100.000 | 32683 | | | |




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
 柱温 : 30°C 波长:318nm
 数据文件名: RC\$JSS-222 - 7-4/7-469-2 - zzp-6022402p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-10min-P5.lcd
 方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20260227-FX256.lcb
 样品瓶号: 3-38
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2026/02/27 16:38:19 实验者: xiexinhui
 处理时间 (V2) : 2026/02/28 09:58:21 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.135 | 145961 | 100.000 | 31707 | 1485 | 1.305 | -- |
| 总计 | | 145961 | 100.000 | 31707 | | | |




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
 柱温 : 30°C 波长:318nm
 数据文件名: RC\$JSS-222 - 7-4/7-470-2 - zzp-6022402p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-10min-P6.lcd
 方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20260227-FX256.lcb
 样品瓶号: 3-47
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2026/02/27 16:41:12 实验者: xiexinhui
 处理时间 (V2) : 2026/02/28 09:58:23 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.135 | 147258 | 100.000 | 32029 | 1485 | 1.305 | -- |
| 总计 | | 147258 | 100.000 | 32029 | | | |




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
 柱温 : 30°C 波长:318nm
 数据文件名: RC\$JSS-222 - 7-4/7-471-2 - zzp-6022402p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-15min-P1.lcd
 方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20260227-FX256.lcb
 样品瓶号: 3-3
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2026/02/27 16:44:04 实验者: xiexinhui
 处理时间 (V2) : 2026/02/28 09:58:26 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.137 | 163273 | 100.000 | 35572 | 1483 | 1.299 | -- |
| 总计 | | 163273 | 100.000 | 35572 | | | |




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
 柱温 : 30°C 波长:318nm
 数据文件名: RC\$JSS-222 - 7-4/7-472-2 - zzp-6022402p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-15min-P2.lcd
 方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20260227-FX256.lcb
 样品瓶号: 3-12
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2026/02/27 16:46:55 实验者: xiexinhui
 处理时间 (V2) : 2026/02/28 09:58:29 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.136 | 166066 | 100.000 | 36156 | 1481 | 1.298 | -- |
| 总计 | | 166066 | 100.000 | 36156 | | | |




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
 柱温 : 30°C 波长:318nm
 数据文件名: RC\$JSS-222 - 7-4/7-473-2 - zzp-6022402p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-15min-P3.lcd
 方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20260227-FX256.lcb
 样品瓶号: 3-21
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2026/02/27 16:49:47 实验者: xiexinhui
 处理时间 (V2) : 2026/02/28 09:58:32 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.135 | 168314 | 100.000 | 36537 | 1483 | 1.298 | -- |
| 总计 | | 168314 | 100.000 | 36537 | | | |




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
 柱温 : 30°C 波长:318nm
 数据文件名: RC\$JSS-222 - 7-4/7-474-2 - zzp-6022402p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-15min-P4.lcd
 方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20260227-FX256.lcb
 样品瓶号: 3-30
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2026/02/27 16:52:38 实验者: xiexinhui
 处理时间 (V2) : 2026/02/28 09:58:34 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.136 | 165195 | 100.000 | 35939 | 1483 | 1.299 | -- |
| 总计 | | 165195 | 100.000 | 35939 | | | |




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
 柱温 : 30°C 波长:318nm
 数据文件名: RC\$JSS-222 - 7-4/7-475-2 - zzp-6022402p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-15min-P5.lcd
 方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20260227-FX256.lcb
 样品瓶号: 3-39
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2026/02/27 16:55:30 实验者: xiexinhui
 处理时间 (V2) : 2026/02/28 09:58:37 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.136 | 160880 | 100.000 | 35053 | 1484 | 1.301 | -- |
| 总计 | | 160880 | 100.000 | 35053 | | | |




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
 柱温 : 30°C 波长:318nm
 数据文件名: RC\$JSS-222 - 7-4/7-476-2 - zzp-6022402p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-15min-P6.lcd
 方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20260227-FX256.lcb
 样品瓶号: 3-48
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2026/02/27 16:58:22 实验者: xiexinhui
 处理时间 (V2) : 2026/02/28 09:58:40 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.135 | 163722 | 100.000 | 35517 | 1482 | 1.299 | -- |
| 总计 | | 163722 | 100.000 | 35517 | | | |




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
 柱温 : 30°C 波长:318nm
 数据文件名: RC\$JSS-222 - 7-4/7-477-2 - zzp-6022402p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-20min-P1.lcd
 方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20260227-FX256.lcb
 样品瓶号: 3-4
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2026/02/27 17:01:13 实验者: xiexinhui
 处理时间 (V2) : 2026/02/28 09:58:42 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.137 | 171617 | 100.000 | 37485 | 1490 | 1.297 | -- |
| 总计 | | 171617 | 100.000 | 37485 | | | |




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
 柱温 : 30°C 波长:318nm
 数据文件名: RC\$JSS-222 - 7-4/7-478-2 - zzp-6022402p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-20min-P2.lcd
 方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20260227-FX256.lcb
 样品瓶号: 3-13
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2026/02/27 17:04:04 实验者: xiexinhui
 处理时间 (V2) : 2026/02/28 09:58:45 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.136 | 174241 | 100.000 | 38046 | 1490 | 1.296 | -- |
| 总计 | | 174241 | 100.000 | 38046 | | | |




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
 柱温 : 30°C 波长:318nm
 数据文件名: RC\$JSS-222 - 7-4/7-479-2 - zzp-6022402p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-20min-P3.lcd
 方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20260227-FX256.lcb
 样品瓶号: 3-22
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2026/02/27 17:06:55 实验者: xiexinhui
 处理时间 (V2) : 2026/02/28 09:58:48 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.137 | 176542 | 100.000 | 38538 | 1491 | 1.297 | -- |
| 总计 | | 176542 | 100.000 | 38538 | | | |




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
 柱温 : 30°C 波长:318nm
 数据文件名: RC\$JSS-222 - 7-4/7-480-2 - zzp-6022402p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-20min-P4.lcd
 方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20260227-FX256.lcb
 样品瓶号: 3-31
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2026/02/27 17:09:47 实验者: xiexinhui
 处理时间 (V2) : 2026/02/28 09:58:51 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.137 | 172871 | 100.000 | 37761 | 1489 | 1.297 | -- |
| 总计 | | 172871 | 100.000 | 37761 | | | |




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
 柱温 : 30°C 波长:318nm
 数据文件名: RC\$JSS-222 - 7-4/7-481-2 - zzp-6022402p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-20min-P5.lcd
 方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20260227-FX256.lcb
 样品瓶号: 3-40
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2026/02/27 17:12:39 实验者: xiexinhui
 处理时间 (V2) : 2026/02/28 09:58:53 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.136 | 169065 | 100.000 | 36890 | 1491 | 1.297 | -- |
| 总计 | | 169065 | 100.000 | 36890 | | | |




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
 柱温 : 30°C 波长:318nm
 数据文件名: RC\$JSS-222 - 7-4/7-482-2 - zzp-6022402p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-20min-P6.lcd
 方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20260227-FX256.lcb
 样品瓶号: 3-49
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2026/02/27 17:15:30 实验者: xiexinhui
 处理时间 (V2) : 2026/02/28 09:58:56 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.137 | 171353 | 100.000 | 37416 | 1491 | 1.298 | -- |
| 总计 | | 171353 | 100.000 | 37416 | | | |




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
 柱温 : 30°C 波长:318nm
 数据文件名: RC\$JSS-222 - 7-4/7-483-2 - zzp-6022402p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-30min-P1.lcd
 方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20260227-FX256.lcb
 样品瓶号: 3-5
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2026/02/27 17:18:21 实验者: xiexinhui
 处理时间 (V2) : 2026/02/28 09:58:59 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.136 | 179426 | 100.000 | 39121 | 1488 | 1.297 | -- |
| 总计 | | 179426 | 100.000 | 39121 | | | |




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
 柱温 : 30°C 波长:318nm
 数据文件名: RC\$JSS-222 - 7-4/7-484-2 - zzp-6022402p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-30min-P2.lcd
 方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20260227-FX256.lcb
 样品瓶号: 3-14
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2026/02/27 17:21:13 实验者: xiexinhui
 处理时间 (V2) : 2026/02/28 09:59:02 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.136 | 182969 | 100.000 | 39879 | 1486 | 1.295 | -- |
| 总计 | | 182969 | 100.000 | 39879 | | | |




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
 柱温 : 30°C 波长:318nm
 数据文件名: RC\$JSS-222 - 7-4/7-485-2 - zzp-6022402p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-30min-P3.lcd
 方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20260227-FX256.lcb
 样品瓶号: 3-23
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2026/02/27 17:24:04 实验者: xiexinhui
 处理时间 (V2) : 2026/02/28 09:59:04 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.136 | 184684 | 100.000 | 40327 | 1490 | 1.291 | -- |
| 总计 | | 184684 | 100.000 | 40327 | | | |




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
 柱温 : 30°C 波长:318nm
 数据文件名: RC\$JSS-222 - 7-4/7-486-2 - zzp-6022402p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-30min-P4.lcd
 方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20260227-FX256.lcb
 样品瓶号: 3-32
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2026/02/27 17:26:54 实验者: xiexinhui
 处理时间 (V2) : 2026/02/28 09:59:07 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 318nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.136 | 181078 | 100.000 | 39549 | 1491 | 1.296 | -- |
| 总计 | | 181078 | 100.000 | 39549 | | | |

〈样品信息〉

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 7-4/7-487-2 - zzp-6022402p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-30min-P5.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20260227-FX256.lcb
样品瓶号: 3-41
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2026/02/27 17:29:46 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2026/02/28 09:59:10 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉

mV



〈峰表〉

检测器A Ch1 318nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.136 | 177312 | 100.000 | 38599 | 1486 | 1.298 | -- |
| 总计 | | 177312 | 100.000 | 38599 | | | |




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
 柱温 : 30°C 波长:318nm
 数据文件名: RC\$JSS-222 - 7-4/7-488-2 - zzp-6022402p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-30min-P6.lcd
 方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20260227-FX256.lcb
 样品瓶号: 3-50
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2026/02/27 17:32:37 实验者: xiexinhui
 处理时间 (V2) : 2026/02/28 09:59:13 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.137 | 179561 | 100.000 | 39197 | 1489 | 1.294 | -- |
| 总计 | | 179561 | 100.000 | 39197 | | | |




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
 柱温 : 30°C 波长:318nm
 数据文件名: RC\$JSS-222 - 7-4/7-489-2 - zzp-6022402p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-45min-P1.lcd
 方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20260227-FX256.lcb
 样品瓶号: 3-6
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2026/02/27 17:35:28 实验者: xiexinhui
 处理时间 (V2) : 2026/02/28 09:59:15 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.135 | 184392 | 100.000 | 40201 | 1486 | 1.292 | -- |
| 总计 | | 184392 | 100.000 | 40201 | | | |




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
 柱温 : 30°C 波长:318nm
 数据文件名: RC\$JSS-222 - 7-4/7-490-2 - zzp-6022402p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-45min-P2.lcd
 方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20260227-FX256.lcb
 样品瓶号: 3-15
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2026/02/27 17:38:20 实验者: xiexinhui
 处理时间 (V2) : 2026/02/28 09:59:18 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.136 | 188042 | 100.000 | 40966 | 1485 | 1.295 | -- |
| 总计 | | 188042 | 100.000 | 40966 | | | |




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
 柱温 : 30°C 波长:318nm
 数据文件名: RC\$JSS-222 - 7-4/7-491-2 - zzp-6022402p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-45min-P3.lcd
 方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20260227-FX256.lcb
 样品瓶号: 3-24
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2026/02/27 17:41:12 实验者: xiexinhui
 处理时间 (V2) : 2026/02/28 09:59:21 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.135 | 189661 | 100.000 | 41226 | 1488 | 1.293 | -- |
| 总计 | | 189661 | 100.000 | 41226 | | | |




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
 柱温 : 30°C 波长:318nm
 数据文件名: RC\$JSS-222 - 7-4/7-492-2 - zzp-6022402p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-45min-P4.lcd
 方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20260227-FX256.lcb
 样品瓶号: 3-33
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2026/02/27 17:44:03 实验者: xiexinhui
 处理时间 (V2) : 2026/02/28 09:59:23 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.135 | 186160 | 100.000 | 40517 | 1490 | 1.293 | -- |
| 总计 | | 186160 | 100.000 | 40517 | | | |




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
 柱温 : 30°C 波长:318nm
 数据文件名: RC\$JSS-222 - 7-4/7-493-2 - zzp-6022402p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-45min-P5.lcd
 方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20260227-FX256.lcb
 样品瓶号: 3-42
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2026/02/27 17:46:54 实验者: xiexinhui
 处理时间 (V2) : 2026/02/28 09:59:26 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.135 | 182077 | 100.000 | 39696 | 1489 | 1.291 | -- |
| 总计 | | 182077 | 100.000 | 39696 | | | |




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
 柱温 : 30°C 波长:318nm
 数据文件名: RC\$JSS-222 - 7-4/7-494-2 - zzp-6022402p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-45min-P6.lcd
 方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20260227-FX256.lcb
 样品瓶号: 3-51
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2026/02/27 17:49:45 实验者: xiexinhui
 处理时间 (V2) : 2026/02/28 09:59:29 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.136 | 184854 | 100.000 | 40352 | 1488 | 1.292 | -- |
| 总计 | | 184854 | 100.000 | 40352 | | | |




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
 柱温 : 30°C 波长:318nm
 数据文件名: RC\$JSS-222 - 7-4/7-495-2 - zzp-6022402p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-60min-P1.lcd
 方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20260227-FX256.lcb
 样品瓶号: 3-7
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2026/02/27 17:52:36 实验者: xiexinhui
 处理时间 (V2) : 2026/02/28 09:59:31 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.136 | 186564 | 100.000 | 40589 | 1487 | 1.293 | -- |
| 总计 | | 186564 | 100.000 | 40589 | | | |




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
 柱温 : 30°C 波长:318nm
 数据文件名: RC\$JSS-222 - 7-4/7-496-2 - zzp-6022402p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-60min-P2.lcd
 方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20260227-FX256.lcb
 样品瓶号: 3-16
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2026/02/27 17:55:27 实验者: xiexinhui
 处理时间 (V2) : 2026/02/28 09:59:34 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.136 | 190520 | 100.000 | 41556 | 1489 | 1.292 | -- |
| 总计 | | 190520 | 100.000 | 41556 | | | |




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
 柱温 : 30°C 波长:318nm
 数据文件名: RC\$JSS-222 - 7-4/7-497-2 - zzp-6022402p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-60min-P3.lcd
 方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20260227-FX256.lcb
 样品瓶号: 3-25
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2026/02/27 17:58:18 实验者: xiexinhui
 处理时间 (V2) : 2026/02/28 09:59:37 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.136 | 191822 | 100.000 | 41835 | 1486 | 1.291 | -- |
| 总计 | | 191822 | 100.000 | 41835 | | | |




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
 柱温 : 30°C 波长:318nm
 数据文件名: RC\$JSS-222 - 7-4/7-498-2 - zzp-6022402p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-60min-P4.lcd
 方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20260227-FX256.lcb
 样品瓶号: 3-34
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2026/02/27 18:01:10 实验者: xiexinhui
 处理时间 (V2) : 2026/02/28 09:59:40 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 318nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.135 | 188326 | 100.000 | 40949 | 1485 | 1.297 | -- |
| 总计 | | 188326 | 100.000 | 40949 | | | |

〈样品信息〉

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 7-4/7-499-2 - zzp-6022402p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-60min-P5.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20260227-FX256.lcb
样品瓶号: 3-43
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2026/02/27 18:04:01 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2026/02/28 09:59:42 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉

mV



〈峰表〉

检测器A Ch1 318nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.135 | 184051 | 100.000 | 40000 | 1485 | 1.295 | -- |
| 总计 | | 184051 | 100.000 | 40000 | | | |




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
 柱温 : 30°C 波长:318nm
 数据文件名: RC\$JSS-222 - 7-4/7-500-2 - zzp-6022402p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-60min-P6.lcd
 方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20260227-FX256.lcb
 样品瓶号: 3-52
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2026/02/27 18:06:52 实验者: xiexinhui
 处理时间 (V2) : 2026/02/28 09:59:45 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.136 | 185878 | 100.000 | 40619 | 1490 | 1.290 | -- |
| 总计 | | 185878 | 100.000 | 40619 | | | |




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
 柱温 : 30°C 波长:318nm
 数据文件名: RC\$JSS-222 - 7-4/7-501-2 - zzp-6022402p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-jxzs-P1.lcd
 方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20260227-FX256.lcb
 样品瓶号: 3-8
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2026/02/27 18:09:44 实验者: xiexinhui
 处理时间 (V2) : 2026/02/28 09:59:48 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.135 | 187644 | 100.000 | 40761 | 1486 | 1.293 | -- |
| 总计 | | 187644 | 100.000 | 40761 | | | |




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
 柱温 : 30°C 波长:318nm
 数据文件名: RC\$JSS-222 - 7-4/7-502-2 - zzp-6022402p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-jxzs-P2.lcd
 方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20260227-FX256.lcb
 样品瓶号: 3-17
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2026/02/27 18:12:36 实验者: xiexinhui
 处理时间 (V2) : 2026/02/28 09:59:50 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 318nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.135 | 191781 | 100.000 | 41740 | 1489 | 1.291 | -- |
| 总计 | | 191781 | 100.000 | 41740 | | | |

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 7-4/7-503-2 - zzp-6022402p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-jxzs-P3.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20260227-FX256.lcb
样品瓶号: 3-26
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2026/02/27 18:15:28 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2026/02/28 09:59:53 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.136 | 193151 | 100.000 | 42078 | 1485 | 1.292 | -- |
| 总计 | | 193151 | 100.000 | 42078 | | | |




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
 柱温 : 30°C 波长:318nm
 数据文件名: RC\$JSS-222 - 7-4/7-504-2 - zzp-6022402p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-jxzs-P4.lcd
 方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20260227-FX256.lcb
 样品瓶号: 3-35
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2026/02/27 18:18:20 实验者: xiexinhui
 处理时间 (V2) : 2026/02/28 09:59:56 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.136 | 189000 | 100.000 | 41195 | 1485 | 1.292 | -- |
| 总计 | | 189000 | 100.000 | 41195 | | | |




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
 柱温 : 30°C 波长:318nm
 数据文件名: RC\$JSS-222 - 7-4/7-505-2 - zzp-6022402p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-jxzs-P5.lcd
 方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20260227-FX256.lcb
 样品瓶号: 3-44
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2026/02/27 18:21:12 实验者: xiexinhui
 处理时间 (V2) : 2026/02/28 09:59:58 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.135 | 185076 | 100.000 | 40147 | 1485 | 1.297 | -- |
| 总计 | | 185076 | 100.000 | 40147 | | | |




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
 柱温 : 30°C 波长:318nm
 数据文件名: RC\$JSS-222 - 7-4/7-506-2 - zzp-6022402p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-jxzs-P6.lcd
 方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20260227-FX256.lcb
 样品瓶号: 3-53
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2026/02/27 18:24:03 实验者: xiexinhui
 处理时间 (V2) : 2026/02/28 10:00:02 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.136 | 188290 | 100.000 | 40961 | 1486 | 1.296 | -- |
| 总计 | | 188290 | 100.000 | 40961 | | | |




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
 柱温 : 30°C 波长:318nm
 数据文件名: RC\$JSS-222 - 7-4/7-507-2 - zzp-6022402p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-dz2-1.lcd
 方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20260227-FX256.lcb
 样品瓶号: 3-27
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2026/02/27 18:26:55 实验者: xiexinhui
 处理时间 (V2) : 2026/02/28 10:00:04 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.168 | 189496 | 100.000 | 40738 | 1533 | 1.274 | -- |
| 总计 | | 189496 | 100.000 | 40738 | | | |




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
 柱温 : 30°C 波长:318nm
 数据文件名: RC\$JSS-222 - 7-4/7-508-2 - zzp-6022402p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-dz2-2.lcd
 方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20260227-FX256.lcb
 样品瓶号: 3-27
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2026/02/27 18:29:47 实验者: xiexinhui
 处理时间 (V2) : 2026/02/28 10:00:07 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.168 | 189707 | 100.000 | 40844 | 1533 | 1.272 | -- |
| 总计 | | 189707 | 100.000 | 40844 | | | |




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 7-4/7-509-2 - zzp-6022401-1p-rcqx-pH3.8jz-jf50z-rj.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20260227-FX256.lcb
样品瓶号: 4-9
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2026/02/27 18:32:41 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2026/02/28 10:00:10 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|------|----|-----|----|------------|------|----------|
| 总计 | | | | | | | |




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
 柱温 : 30°C 波长:318nm
 数据文件名: RC\$JSS-222 - 7-4/7-510-2 - zzp-6022401-1p-rcqx-pH3.8jz-jf50z-dz1-1.lcd
 方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20260227-FX256.lcb
 样品瓶号: 4-18
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2026/02/27 18:35:34 实验者: xiexinhui
 处理时间 (V2) : 2026/02/28 10:00:12 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.168 | 190227 | 100.000 | 41013 | 1535 | 1.271 | -- |
| 总计 | | 190227 | 100.000 | 41013 | | | |

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 7-4/7-511-2 - zzp-6022401-1p-rcqx-pH3.8jz-jf50z-dz1-2.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20260227-FX256.lcb
样品瓶号: 4-18
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2026/02/27 18:38:28 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2026/02/28 10:00:15 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.168 | 189968 | 100.000 | 40951 | 1537 | 1.270 | -- |
| 总计 | | 189968 | 100.000 | 40951 | | | |




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
 柱温 : 30°C 波长:318nm
 数据文件名: RC\$JSS-222 - 7-4/7-512-2 - zzp-6022401-1p-rcqx-pH3.8jz-jf50z-dz1-3.lcd
 方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20260227-FX256.lcb
 样品瓶号: 4-18
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2026/02/27 18:41:21 实验者: xiexinhui
 处理时间 (V2) : 2026/02/28 10:00:18 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.168 | 190427 | 100.000 | 41013 | 1534 | 1.272 | -- |
| 总计 | | 190427 | 100.000 | 41013 | | | |

〈样品信息〉

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 7-4/7-513-2 - zzp-6022401-1p-rcqx-pH3.8jz-jf50z-dz1-4.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20260227-FX256.lcb
样品瓶号: 4-18
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2026/02/27 18:44:14 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2026/02/28 10:00:20 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉

mV



〈峰表〉

检测器A Ch1 318nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.168 | 190273 | 100.000 | 40922 | 1537 | 1.273 | -- |
| 总计 | | 190273 | 100.000 | 40922 | | | |




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
 柱温 : 30°C 波长:318nm
 数据文件名: RC\$JSS-222 - 7-4/7-514-2 - zzp-6022401-1p-rcqx-pH3.8jz-jf50z-dz1-5.lcd
 方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20260227-FX256.lcb
 样品瓶号: 4-18
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2026/02/27 18:47:08 实验者: xiexinhui
 处理时间 (V2) : 2026/02/28 10:00:23 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 318nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.167 | 190182 | 100.000 | 40907 | 1535 | 1.273 | -- |
| 总计 | | 190182 | 100.000 | 40907 | | | |

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
 柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
 数据文件名: RC\$JSS-222 - 7-4/7-515-2 - zzp-6022401-1p-rcqx-pH3.8jz-jf50z-5min-P1.lcd
 方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20260227-FX256.lcb
 样品瓶号: 4-1
 进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
 进样时间: 2026/02/27 18:50:00 实验者: xiexinhui
 处理时间 (V2) : 2026/02/28 10:00:26 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.167 | 142202 | 100.000 | 31874 | 1670 | 1.292 | -- |
| 总计 | | 142202 | 100.000 | 31874 | | | |




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
 柱温 : 30°C 波长:318nm
 数据文件名: RC\$JSS-222 - 7-4/7-516-2 - zzp-6022401-1p-rcqx-pH3.8jz-jf50z-5min-P2.lcd
 方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20260227-FX256.lcb
 样品瓶号: 4-10
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2026/02/27 18:52:52 实验者: xiexinhui
 处理时间 (V2) : 2026/02/28 10:00:29 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.166 | 138424 | 100.000 | 31071 | 1669 | 1.293 | -- |
| 总计 | | 138424 | 100.000 | 31071 | | | |




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
 柱温 : 30°C 波长:318nm
 数据文件名: RC\$JSS-222 - 7-4/7-517-2 - zzp-6022401-1p-rcqx-pH3.8jz-jf50z-5min-P3.lcd
 方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20260227-FX256.lcb
 样品瓶号: 4-19
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2026/02/27 18:55:45 实验者: xiexinhui
 处理时间 (V2) : 2026/02/28 10:00:31 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.167 | 142935 | 100.000 | 32059 | 1673 | 1.289 | -- |
| 总计 | | 142935 | 100.000 | 32059 | | | |




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
 柱温 : 30°C 波长:318nm
 数据文件名: RC\$JSS-222 - 7-4/7-518-2 - zzp-6022401-1p-rcqx-pH3.8jz-jf50z-5min-P4.lcd
 方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20260227-FX256.lcb
 样品瓶号: 4-28
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2026/02/27 18:58:37 实验者: xiexinhui
 处理时间 (V2) : 2026/02/28 10:00:34 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.167 | 139803 | 100.000 | 31292 | 1674 | 1.289 | -- |
| 总计 | | 139803 | 100.000 | 31292 | | | |




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
 柱温 : 30°C 波长:318nm
 数据文件名: RC\$JSS-222 - 7-4/7-519-2 - zzp-6022401-1p-rcqx-pH3.8jz-jf50z-5min-P5.lcd
 方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20260227-FX256.lcb
 样品瓶号: 4-37
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2026/02/27 19:01:29 实验者: xiexinhui
 处理时间 (V2) : 2026/02/28 10:00:37 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.167 | 139354 | 100.000 | 31231 | 1670 | 1.294 | -- |
| 总计 | | 139354 | 100.000 | 31231 | | | |




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
 柱温 : 30°C 波长:318nm
 数据文件名: RC\$JSS-222 - 7-4/7-520-2 - zzp-6022401-1p-rcqx-pH3.8jz-jf50z-5min-P6.lcd
 方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20260227-FX256.lcb
 样品瓶号: 4-46
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2026/02/27 19:04:22 实验者: xiexinhui
 处理时间 (V2) : 2026/02/28 10:00:40 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.167 | 137087 | 100.000 | 30748 | 1669 | 1.294 | -- |
| 总计 | | 137087 | 100.000 | 30748 | | | |




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
 柱温 : 30°C 波长:318nm
 数据文件名: RC\$JSS-222 - 7-4/7-521-2 - zzp-6022401-1p-rcqx-pH3.8jz-jf50z-10min-P1.lcd
 方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20260227-FX256.lcb
 样品瓶号: 4-2
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2026/02/27 19:07:15 实验者: xiexinhui
 处理时间 (V2) : 2026/02/28 10:00:42 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.167 | 168396 | 100.000 | 37693 | 1676 | 1.286 | -- |
| 总计 | | 168396 | 100.000 | 37693 | | | |




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
 柱温 : 30°C 波长:318nm
 数据文件名: RC\$JSS-222 - 7-4/7-522-2 - zzp-6022401-1p-rcqx-pH3.8jz-jf50z-10min-P2.lcd
 方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20260227-FX256.lcb
 样品瓶号: 4-11
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2026/02/27 19:10:07 实验者: xiexinhui
 处理时间 (V2) : 2026/02/28 10:00:45 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.168 | 165156 | 100.000 | 36915 | 1675 | 1.284 | -- |
| 总计 | | 165156 | 100.000 | 36915 | | | |




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
 柱温 : 30°C 波长:318nm
 数据文件名: RC\$JSS-222 - 7-4/7-523-2 - zzp-6022401-1p-rcqx-pH3.8jz-jf50z-10min-P3.lcd
 方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20260227-FX256.lcb
 样品瓶号: 4-20
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2026/02/27 19:13:00 实验者: xiexinhui
 处理时间 (V2) : 2026/02/28 10:00:48 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.167 | 171378 | 100.000 | 38577 | 1678 | 1.284 | -- |
| 总计 | | 171378 | 100.000 | 38577 | | | |




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
 柱温 : 30°C 波长:318nm
 数据文件名: RC\$JSS-222 - 7-4/7-524-2 - zzp-6022401-1p-rcqx-pH3.8jz-jf50z-10min-P4.lcd
 方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20260227-FX256.lcb
 样品瓶号: 4-29
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2026/02/27 19:15:53 实验者: xiexinhui
 处理时间 (V2) : 2026/02/28 10:00:51 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.166 | 168568 | 100.000 | 37912 | 1676 | 1.284 | -- |
| 总计 | | 168568 | 100.000 | 37912 | | | |




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
 柱温 : 30°C 波长:318nm
 数据文件名: RC\$JSS-222 - 7-4/7-525-2 - zzp-6022401-1p-rcqx-pH3.8jz-jf50z-10min-P5.lcd
 方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20260227-FX256.lcb
 样品瓶号: 4-38
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2026/02/27 19:18:45 实验者: xiexinhui
 处理时间 (V2) : 2026/02/28 10:00:53 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.167 | 165124 | 100.000 | 37089 | 1673 | 1.286 | -- |
| 总计 | | 165124 | 100.000 | 37089 | | | |




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
 柱温 : 30°C 波长:318nm
 数据文件名: RC\$JSS-222 - 7-4/7-526-2 - zzp-6022401-1p-rcqx-pH3.8jz-jf50z-10min-P6.lcd
 方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20260227-FX256.lcb
 样品瓶号: 4-47
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2026/02/27 19:21:37 实验者: xiexinhui
 处理时间 (V2) : 2026/02/28 10:00:56 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.166 | 164061 | 100.000 | 36957 | 1673 | 1.284 | -- |
| 总计 | | 164061 | 100.000 | 36957 | | | |




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
 柱温 : 30°C 波长:318nm
 数据文件名: RC\$JSS-222 - 7-4/7-527-2 - zzp-6022401-1p-rcqx-pH3.8jz-jf50z-15min-P1.lcd
 方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20260227-FX256.lcb
 样品瓶号: 4-3
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2026/02/27 19:24:31 实验者: xiexinhui
 处理时间 (V2) : 2026/02/28 10:00:59 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.166 | 178152 | 100.000 | 40160 | 1673 | 1.282 | -- |
| 总计 | | 178152 | 100.000 | 40160 | | | |




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
 柱温 : 30°C 波长:318nm
 数据文件名: RC\$JSS-222 - 7-4/7-528-2 - zzp-6022401-1p-rcqx-pH3.8jz-jf50z-15min-P2.lcd
 方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20260227-FX256.lcb
 样品瓶号: 4-12
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2026/02/27 19:27:23 实验者: xiexinhui
 处理时间 (V2) : 2026/02/28 10:01:02 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 318nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.167 | 174481 | 100.000 | 39236 | 1675 | 1.281 | -- |
| 总计 | | 174481 | 100.000 | 39236 | | | |

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
 柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
 数据文件名: RC\$JSS-222 - 7-4/7-529-2 - zzp-6022401-1p-rcqx-pH3.8jz-jf50z-15min-P3.lcd
 方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20260227-FX256.lcb
 样品瓶号: 4-21
 进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
 进样时间: 2026/02/27 19:30:16 实验者: xiexinhui
 处理时间 (V2) : 2026/02/28 10:01:04 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.167 | 180610 | 100.000 | 40578 | 1677 | 1.281 | -- |
| 总计 | | 180610 | 100.000 | 40578 | | | |




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
 柱温 : 30°C 波长:318nm
 数据文件名: RC\$JSS-222 - 7-4/7-530-2 - zzp-6022401-1p-rcqx-pH3.8jz-jf50z-15min-P4.lcd
 方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20260227-FX256.lcb
 样品瓶号: 4-30
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2026/02/27 19:33:08 实验者: xiexinhui
 处理时间 (V2) : 2026/02/28 10:01:07 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.166 | 177235 | 100.000 | 39900 | 1673 | 1.284 | -- |
| 总计 | | 177235 | 100.000 | 39900 | | | |




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
 柱温 : 30°C 波长:318nm
 数据文件名: RC\$JSS-222 - 7-4/7-531-2 - zzp-6022401-1p-rcqx-pH3.8jz-jf50z-15min-P5.lcd
 方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20260227-FX256.lcb
 样品瓶号: 4-39
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2026/02/27 19:36:01 实验者: xiexinhui
 处理时间 (V2) : 2026/02/28 10:01:10 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.166 | 175704 | 100.000 | 39566 | 1674 | 1.282 | -- |
| 总计 | | 175704 | 100.000 | 39566 | | | |




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
 柱温 : 30°C 波长:318nm
 数据文件名: RC\$JSS-222 - 7-4/7-532-2 - zzp-6022401-1p-rcqx-pH3.8jz-jf50z-15min-P6.lcd
 方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20260227-FX256.lcb
 样品瓶号: 4-48
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2026/02/27 19:38:53 实验者: xiexinhui
 处理时间 (V2) : 2026/02/28 10:01:13 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.166 | 174590 | 100.000 | 39316 | 1673 | 1.281 | -- |
| 总计 | | 174590 | 100.000 | 39316 | | | |




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
 柱温 : 30°C 波长:318nm
 数据文件名: RC\$JSS-222 - 7-4/7-533-2 - zzp-6022401-1p-rcqx-pH3.8jz-jf50z-20min-P1.lcd
 方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20260227-FX256.lcb
 样品瓶号: 4-4
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2026/02/27 19:41:46 实验者: xiexinhui
 处理时间 (V2) : 2026/02/28 10:01:15 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.166 | 182158 | 100.000 | 40965 | 1670 | 1.280 | -- |
| 总计 | | 182158 | 100.000 | 40965 | | | |




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
 柱温 : 30°C 波长:318nm
 数据文件名: RC\$JSS-222 - 7-4/7-534-2 - zzp-6022401-1p-rcqx-pH3.8jz-jf50z-20min-P2.lcd
 方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20260227-FX256.lcb
 样品瓶号: 4-13
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2026/02/27 19:44:39 实验者: xiexinhui
 处理时间 (V2) : 2026/02/28 10:01:18 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.166 | 178834 | 100.000 | 40265 | 1673 | 1.282 | -- |
| 总计 | | 178834 | 100.000 | 40265 | | | |




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
 柱温 : 30°C 波长:318nm
 数据文件名: RC\$JSS-222 - 7-4/7-535-2 - zzp-6022401-1p-rcqx-pH3.8jz-jf50z-20min-P3.lcd
 方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20260227-FX256.lcb
 样品瓶号: 4-22
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2026/02/27 19:47:32 实验者: xiexinhui
 处理时间 (V2) : 2026/02/28 10:01:21 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.166 | 184645 | 100.000 | 41544 | 1676 | 1.278 | -- |
| 总计 | | 184645 | 100.000 | 41544 | | | |




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
 柱温 : 30°C 波长:318nm
 数据文件名: RC\$JSS-222 - 7-4/7-536-2 - zzp-6022401-1p-rcqx-pH3.8jz-jf50z-20min-P4.lcd
 方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20260227-FX256.lcb
 样品瓶号: 4-31
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2026/02/27 19:50:24 实验者: xiexinhui
 处理时间 (V2) : 2026/02/28 10:01:23 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.166 | 181737 | 100.000 | 40963 | 1676 | 1.283 | -- |
| 总计 | | 181737 | 100.000 | 40963 | | | |




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
 柱温 : 30°C 波长:318nm
 数据文件名: RC\$JSS-222 - 7-4/7-537-2 - zzp-6022401-1p-rcqx-pH3.8jz-jf50z-20min-P5.lcd
 方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20260227-FX256.lcb
 样品瓶号: 4-40
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2026/02/27 19:53:17 实验者: xiexinhui
 处理时间 (V2) : 2026/02/28 10:01:26 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.166 | 179691 | 100.000 | 40438 | 1676 | 1.282 | -- |
| 总计 | | 179691 | 100.000 | 40438 | | | |




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
 柱温 : 30°C 波长:318nm
 数据文件名: RC\$JSS-222 - 7-4/7-538-2 - zzp-6022401-1p-rcqx-pH3.8jz-jf50z-20min-P6.lcd
 方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20260227-FX256.lcb
 样品瓶号: 4-49
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2026/02/27 19:56:10 实验者: xiexinhui
 处理时间 (V2) : 2026/02/28 10:01:30 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.166 | 178562 | 100.000 | 40179 | 1674 | 1.281 | -- |
| 总计 | | 178562 | 100.000 | 40179 | | | |




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
 柱温 : 30°C 波长:318nm
 数据文件名: RC\$JSS-222 - 7-4/7-539-2 - zzp-6022401-1p-rcqx-pH3.8jz-jf50z-30min-P1.lcd
 方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20260227-FX256.lcb
 样品瓶号: 4-5
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2026/02/27 19:59:03 实验者: xiexinhui
 处理时间 (V2) : 2026/02/28 10:01:32 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 318nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.166 | 184583 | 100.000 | 41608 | 1673 | 1.281 | -- |
| 总计 | | 184583 | 100.000 | 41608 | | | |

〈样品信息〉

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 7-4/7-540-2 - zzp-6022401-1p-rcqx-pH3.8jz-jf50z-30min-P2.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20260227-FX256.lcb
样品瓶号: 4-14
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2026/02/27 20:01:57 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2026/02/28 10:01:36 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉

mV



〈峰表〉

检测器A Ch1 318nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.166 | 182553 | 100.000 | 41149 | 1672 | 1.281 | -- |
| 总计 | | 182553 | 100.000 | 41149 | | | |




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
 柱温 : 30°C 波长:318nm
 数据文件名: RC\$JSS-222 - 7-4/7-541-2 - zzp-6022401-1p-rcqx-pH3.8jz-jf50z-30min-P3.lcd
 方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20260227-FX256.lcb
 样品瓶号: 4-23
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2026/02/27 20:04:50 实验者: xiexinhui
 处理时间 (V2) : 2026/02/28 10:01:38 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.166 | 188494 | 100.000 | 42458 | 1676 | 1.278 | -- |
| 总计 | | 188494 | 100.000 | 42458 | | | |




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
 柱温 : 30°C 波长:318nm
 数据文件名: RC\$JSS-222 - 7-4/7-542-2 - zzp-6022401-1p-rcqx-pH3.8jz-jf50z-30min-P4.lcd
 方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20260227-FX256.lcb
 样品瓶号: 4-32
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2026/02/27 20:07:44 实验者: xiexinhui
 处理时间 (V2) : 2026/02/28 10:01:41 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.167 | 185822 | 100.000 | 41651 | 1680 | 1.278 | -- |
| 总计 | | 185822 | 100.000 | 41651 | | | |




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
 柱温 : 30°C 波长:318nm
 数据文件名: RC\$JSS-222 - 7-4/7-543-2 - zzp-6022401-1p-rcqx-pH3.8jz-jf50z-30min-P5.lcd
 方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20260227-FX256.lcb
 样品瓶号: 4-41
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2026/02/27 20:10:37 实验者: xiexinhui
 处理时间 (V2) : 2026/02/28 10:01:44 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.166 | 182882 | 100.000 | 41261 | 1676 | 1.279 | -- |
| 总计 | | 182882 | 100.000 | 41261 | | | |




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
 柱温 : 30°C 波长:318nm
 数据文件名: RC\$JSS-222 - 7-4/7-544-2 - zzp-6022401-1p-rcqx-pH3.8jz-jf50z-30min-P6.lcd
 方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20260227-FX256.lcb
 样品瓶号: 4-50
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2026/02/27 20:13:30 实验者: xiexinhui
 处理时间 (V2) : 2026/02/28 10:01:47 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.166 | 181565 | 100.000 | 40982 | 1678 | 1.281 | -- |
| 总计 | | 181565 | 100.000 | 40982 | | | |




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
 柱温 : 30°C 波长:318nm
 数据文件名: RC\$JSS-222 - 7-4/7-545-2 - zzp-6022401-1p-rcqx-pH3.8jz-jf50z-45min-P1.lcd
 方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20260227-FX256.lcb
 样品瓶号: 4-6
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2026/02/27 20:16:23 实验者: xiexinhui
 处理时间 (V2) : 2026/02/28 10:01:49 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.166 | 186653 | 100.000 | 42077 | 1677 | 1.279 | -- |
| 总计 | | 186653 | 100.000 | 42077 | | | |




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
 柱温 : 30°C 波长:318nm
 数据文件名: RC\$JSS-222 - 7-4/7-546-2 - zzp-6022401-1p-rcqx-pH3.8jz-jf50z-45min-P2.lcd
 方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20260227-FX256.lcb
 样品瓶号: 4-15
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2026/02/27 20:19:16 实验者: xiexinhui
 处理时间 (V2) : 2026/02/28 10:01:52 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.167 | 184513 | 100.000 | 41492 | 1675 | 1.282 | -- |
| 总计 | | 184513 | 100.000 | 41492 | | | |




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
 柱温 : 30°C 波长:318nm
 数据文件名: RC\$JSS-222 - 7-4/7-547-2 - zzp-6022401-1p-rcqx-pH3.8jz-jf50z-45min-P3.lcd
 方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20260227-FX256.lcb
 样品瓶号: 4-24
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2026/02/27 20:22:09 实验者: xiexinhui
 处理时间 (V2) : 2026/02/28 10:01:55 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.166 | 189819 | 100.000 | 42704 | 1676 | 1.278 | -- |
| 总计 | | 189819 | 100.000 | 42704 | | | |




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
 柱温 : 30°C 波长:318nm
 数据文件名: RC\$JSS-222 - 7-4/7-548-2 - zzp-6022401-1p-rcqx-pH3.8jz-jf50z-45min-P4.lcd
 方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20260227-FX256.lcb
 样品瓶号: 4-33
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2026/02/27 20:25:02 实验者: xiexinhui
 处理时间 (V2) : 2026/02/28 10:01:58 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 318nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.166 | 186744 | 100.000 | 42099 | 1680 | 1.280 | -- |
| 总计 | | 186744 | 100.000 | 42099 | | | |

〈样品信息〉

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 7-4/7-549-2 - zzp-6022401-1p-rcqx-pH3.8jz-jf50z-45min-P5.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20260227-FX256.lcb
样品瓶号: 4-42
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2026/02/27 20:27:55 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2026/02/28 10:02:00 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉

mV



〈峰表〉

检测器A Ch1 318nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.167 | 184301 | 100.000 | 41378 | 1681 | 1.278 | -- |
| 总计 | | 184301 | 100.000 | 41378 | | | |




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
 柱温 : 30°C 波长:318nm
 数据文件名: RC\$JSS-222 - 7-4/7-550-2 - zzp-6022401-1p-rcqx-pH3.8jz-jf50z-45min-P6.lcd
 方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20260227-FX256.lcb
 样品瓶号: 4-51
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2026/02/27 20:30:48 实验者: xiexinhui
 处理时间 (V2) : 2026/02/28 10:02:03 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 318nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.166 | 183880 | 100.000 | 41421 | 1678 | 1.282 | -- |
| 总计 | | 183880 | 100.000 | 41421 | | | |

〈样品信息〉

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 7-4/7-551-2 - zzp-6022401-1p-rcqx-pH3.8jz-jf50z-60min-P1.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20260227-FX256.lcb
样品瓶号: 4-7
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2026/02/27 20:33:42 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2026/02/28 10:02:06 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉

mV



〈峰表〉

检测器A Ch1 318nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.167 | 186143 | 100.000 | 41884 | 1676 | 1.278 | -- |
| 总计 | | 186143 | 100.000 | 41884 | | | |




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
 柱温 : 30°C 波长:318nm
 数据文件名: RC\$JSS-222 - 7-4/7-552-2 - zzp-6022401-1p-rcqx-pH3.8jz-jf50z-60min-P2.lcd
 方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20260227-FX256.lcb
 样品瓶号: 4-16
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2026/02/27 20:36:35 实验者: xiexinhui
 处理时间 (V2) : 2026/02/28 10:02:08 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.166 | 184725 | 100.000 | 41614 | 1676 | 1.279 | -- |
| 总计 | | 184725 | 100.000 | 41614 | | | |




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
 柱温 : 30°C 波长:318nm
 数据文件名: RC\$JSS-222 - 7-4/7-553-2 - zzp-6022401-1p-rcqx-pH3.8jz-jf50z-60min-P3.lcd
 方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20260227-FX256.lcb
 样品瓶号: 4-25
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2026/02/27 20:39:28 实验者: xiexinhui
 处理时间 (V2) : 2026/02/28 10:02:11 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.166 | 190720 | 100.000 | 42866 | 1675 | 1.281 | -- |
| 总计 | | 190720 | 100.000 | 42866 | | | |




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
 柱温 : 30°C 波长:318nm
 数据文件名: RC\$JSS-222 - 7-4/7-554-2 - zzp-6022401-1p-rcqx-pH3.8jz-jf50z-60min-P4.lcd
 方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20260227-FX256.lcb
 样品瓶号: 4-34
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2026/02/27 20:42:22 实验者: xiexinhui
 处理时间 (V2) : 2026/02/28 10:02:14 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.166 | 188330 | 100.000 | 42084 | 1676 | 1.279 | -- |
| 总计 | | 188330 | 100.000 | 42084 | | | |




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
 柱温 : 30°C 波长:318nm
 数据文件名: RC\$JSS-222 - 7-4/7-555-2 - zzp-6022401-1p-rcqx-pH3.8jz-jf50z-60min-P5.lcd
 方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20260227-FX256.lcb
 样品瓶号: 4-43
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2026/02/27 20:45:15 实验者: xiexinhui
 处理时间 (V2) : 2026/02/28 10:02:17 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.166 | 185098 | 100.000 | 41706 | 1676 | 1.279 | -- |
| 总计 | | 185098 | 100.000 | 41706 | | | |




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
 柱温 : 30°C 波长:318nm
 数据文件名: RC\$JSS-222 - 7-4/7-556-2 - zzp-6022401-1p-rcqx-pH3.8jz-jf50z-60min-P6.lcd
 方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20260227-FX256.lcb
 样品瓶号: 4-52
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2026/02/27 20:48:08 实验者: xiexinhui
 处理时间 (V2) : 2026/02/28 10:02:19 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.166 | 184046 | 100.000 | 41470 | 1674 | 1.281 | -- |
| 总计 | | 184046 | 100.000 | 41470 | | | |

〈样品信息〉

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 7-4/7-557-2 - zzp-6022401-1p-rcqx-pH3.8jz-jf50z-jxzs-P1.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20260227-FX256.lcb
样品瓶号: 4-8
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2026/02/27 20:51:02 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2026/02/28 10:02:22 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉

mV



〈峰表〉

检测器A Ch1 318nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.166 | 186606 | 100.000 | 42113 | 1674 | 1.282 | -- |
| 总计 | | 186606 | 100.000 | 42113 | | | |




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
 柱温 : 30°C 波长:318nm
 数据文件名: RC\$JSS-222 - 7-4/7-558-2 - zzp-6022401-1p-rcqx-pH3.8jz-jf50z-jxzs-P2.lcd
 方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20260227-FX256.lcb
 样品瓶号: 4-17
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2026/02/27 20:53:55 实验者: xiexinhui
 处理时间 (V2) : 2026/02/28 10:02:25 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.166 | 184778 | 100.000 | 41695 | 1676 | 1.276 | -- |
| 总计 | | 184778 | 100.000 | 41695 | | | |




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
 柱温 : 30°C 波长:318nm
 数据文件名: RC\$JSS-222 - 7-4/7-559-2 - zzp-6022401-1p-rcqx-pH3.8jz-jf50z-jxzs-P3.lcd
 方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20260227-FX256.lcb
 样品瓶号: 4-26
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2026/02/27 20:56:49 实验者: xiexinhui
 处理时间 (V2) : 2026/02/28 10:02:28 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.166 | 190694 | 100.000 | 42947 | 1677 | 1.278 | -- |
| 总计 | | 190694 | 100.000 | 42947 | | | |




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
 柱温 : 30°C 波长:318nm
 数据文件名: RC\$JSS-222 - 7-4/7-560-2 - zzp-6022401-1p-rcqx-pH3.8jz-jf50z-jxzs-P4.lcd
 方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20260227-FX256.lcb
 样品瓶号: 4-35
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2026/02/27 20:59:42 实验者: xiexinhui
 处理时间 (V2) : 2026/02/28 10:02:30 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.167 | 186927 | 100.000 | 42001 | 1676 | 1.281 | -- |
| 总计 | | 186927 | 100.000 | 42001 | | | |




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
 柱温 : 30°C 波长:318nm
 数据文件名: RC\$JSS-222 - 7-4/7-561-2 - zzp-6022401-1p-rcqx-pH3.8jz-jf50z-jxzs-P5.lcd
 方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20260227-FX256.lcb
 样品瓶号: 4-44
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2026/02/27 21:02:36 实验者: xiexinhui
 处理时间 (V2) : 2026/02/28 10:02:33 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 318nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.167 | 186325 | 100.000 | 41883 | 1675 | 1.282 | -- |
| 总计 | | 186325 | 100.000 | 41883 | | | |

〈样品信息〉

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 7-4/7-562-2 - zzp-6022401-1p-rcqx-pH3.8jz-jf50z-jxzs-P6.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20260227-FX256.lcb
样品瓶号: 4-53
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2026/02/27 21:05:30 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2026/02/28 10:02:36 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉

mV



〈峰表〉

检测器A Ch1 318nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.165 | 185217 | 100.000 | 41860 | 1674 | 1.278 | -- |
| 总计 | | 185217 | 100.000 | 41860 | | | |




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
 柱温 : 30°C 波长:318nm
 数据文件名: RC\$JSS-222 - 7-4/7-563-2 - zzp-6022401-1p-rcqx-pH3.8jz-jf50z-dz2-1.lcd
 方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20260227-FX256.lcb
 样品瓶号: 4-27
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2026/02/27 21:08:24 实验者: xiexinhui
 处理时间 (V2) : 2026/02/28 10:02:38 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.165 | 191272 | 100.000 | 41487 | 1531 | 1.269 | -- |
| 总计 | | 191272 | 100.000 | 41487 | | | |




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
 柱温 : 30°C 波长:318nm
 数据文件名: RC\$JSS-222 - 7-4/7-564-2 - zzp-6022401-1p-rcqx-pH3.8jz-jf50z-dz2-2.lcd
 方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20260227-FX256.lcb
 样品瓶号: 4-27
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2026/02/27 21:11:18 实验者: xiexinhui
 处理时间 (V2) : 2026/02/28 10:02:41 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.165 | 191096 | 100.000 | 41539 | 1527 | 1.270 | -- |
| 总计 | | 191096 | 100.000 | 41539 | | | |




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
 柱温 : 30°C 波长:318nm
 数据文件名: RC\$JSS-222 - 7-4/7-565-2 - zzp-6022401-2p-rcqx-pH3.8jz-jf50z-rj.lcd
 方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20260227-FX256.lcb
 样品瓶号: 1-9
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2026/02/27 21:14:10 实验者: xiexinhui
 处理时间 (V2) : 2026/02/28 10:02:44 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|------|----|-----|----|------------|------|----------|
| 总计 | | | | | | | |




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
 柱温 : 30°C 波长:318nm
 数据文件名: RC\$JSS-222 - 7-4/7-566-2 - zzp-6022401-2p-rcqx-pH3.8jz-jf50z-dz1-1.lcd
 方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20260227-FX256.lcb
 样品瓶号: 1-18
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2026/02/27 21:17:04 实验者: xiexinhui
 处理时间 (V2) : 2026/02/28 10:02:47 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.163 | 189861 | 100.000 | 41253 | 1525 | 1.270 | -- |
| 总计 | | 189861 | 100.000 | 41253 | | | |




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
 柱温 : 30°C 波长:318nm
 数据文件名: RC\$JSS-222 - 7-4/7-567-2 - zzp-6022401-2p-rcqx-pH3.8jz-jf50z-dz1-2.lcd
 方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20260227-FX256.lcb
 样品瓶号: 1-18
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2026/02/27 21:19:57 实验者: xiexinhui
 处理时间 (V2) : 2026/02/28 10:02:49 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.163 | 189485 | 100.000 | 41212 | 1526 | 1.270 | -- |
| 总计 | | 189485 | 100.000 | 41212 | | | |




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
 柱温 : 30°C 波长:318nm
 数据文件名: RC\$JSS-222 - 7-4/7-568-2 - zzp-6022401-2p-rcqx-pH3.8jz-jf50z-dz1-3.lcd
 方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20260227-FX256.lcb
 样品瓶号: 1-18
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2026/02/27 21:22:51 实验者: xiexinhui
 处理时间 (V2) : 2026/02/28 10:02:52 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.163 | 189706 | 100.000 | 41205 | 1526 | 1.272 | -- |
| 总计 | | 189706 | 100.000 | 41205 | | | |




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
 柱温 : 30°C 波长:318nm
 数据文件名: RC\$JSS-222 - 7-4/7-569-2 - zzp-6022401-2p-rcqx-pH3.8jz-jf50z-dz1-4.lcd
 方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20260227-FX256.lcb
 样品瓶号: 1-18
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2026/02/27 21:25:46 实验者: xiexinhui
 处理时间 (V2) : 2026/02/28 10:02:55 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.162 | 189490 | 100.000 | 41163 | 1524 | 1.271 | -- |
| 总计 | | 189490 | 100.000 | 41163 | | | |




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
 柱温 : 30°C 波长:318nm
 数据文件名: RC\$JSS-222 - 7-4/7-570-2 - zzp-6022401-2p-rcqx-pH3.8jz-jf50z-dz1-5.lcd
 方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20260227-FX256.lcb
 样品瓶号: 1-18
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2026/02/27 21:28:39 实验者: xiexinhui
 处理时间 (V2) : 2026/02/28 10:02:58 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.162 | 189679 | 100.000 | 41176 | 1524 | 1.271 | -- |
| 总计 | | 189679 | 100.000 | 41176 | | | |




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
 柱温 : 30°C 波长:318nm
 数据文件名: RC\$JSS-222 - 7-4/7-571-2 - zzp-6022401-2p-rcqx-pH3.8jz-jf50z-5min-P1.lcd
 方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20260227-FX256.lcb
 样品瓶号: 1-1
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2026/02/27 21:31:32 实验者: xiexinhui
 处理时间 (V2) : 2026/02/28 10:03:01 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.161 | 143902 | 100.000 | 32446 | 1659 | 1.289 | -- |
| 总计 | | 143902 | 100.000 | 32446 | | | |




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
 柱温 : 30°C 波长:318nm
 数据文件名: RC\$JSS-222 - 7-4/7-572-2 - zzp-6022401-2p-rcqx-pH3.8jz-jf50z-5min-P2.lcd
 方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20260227-FX256.lcb
 样品瓶号: 1-10
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2026/02/27 21:34:24 实验者: xiexinhui
 处理时间 (V2) : 2026/02/28 10:03:03 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.156 | 137318 | 100.000 | 31102 | 1650 | 1.293 | -- |
| 总计 | | 137318 | 100.000 | 31102 | | | |




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
 柱温 : 30°C 波长:318nm
 数据文件名: RC\$JSS-222 - 7-4/7-573-2 - zzp-6022401-2p-rcqx-pH3.8jz-jf50z-5min-P3.lcd
 方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20260227-FX256.lcb
 样品瓶号: 1-19
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2026/02/27 21:37:16 实验者: xiexinhui
 处理时间 (V2) : 2026/02/28 10:03:06 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 318nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.156 | 140258 | 100.000 | 31812 | 1652 | 1.292 | -- |
| 总计 | | 140258 | 100.000 | 31812 | | | |

〈样品信息〉

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 7-4/7-574-2 - zzp-6022401-2p-rcqx-pH3.8jz-jf50z-5min-P4.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20260227-FX256.lcb
样品瓶号: 1-28
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2026/02/27 21:40:08 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2026/02/28 10:03:09 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉

mV



〈峰表〉

检测器A Ch1 318nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.158 | 148760 | 100.000 | 33521 | 1656 | 1.292 | -- |
| 总计 | | 148760 | 100.000 | 33521 | | | |




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
 柱温 : 30°C 波长:318nm
 数据文件名: RC\$JSS-222 - 7-4/7-575-2 - zzp-6022401-2p-rcqx-pH3.8jz-jf50z-5min-P5.lcd
 方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20260227-FX256.lcb
 样品瓶号: 1-37
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2026/02/27 21:43:01 实验者: xiexinhui
 处理时间 (V2) : 2026/02/28 10:03:11 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.160 | 139378 | 100.000 | 31298 | 1656 | 1.294 | -- |
| 总计 | | 139378 | 100.000 | 31298 | | | |




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
 柱温 : 30°C 波长:318nm
 数据文件名: RC\$JSS-222 - 7-4/7-576-2 - zzp-6022401-2p-rcqx-pH3.8jz-jf50z-5min-P6.lcd
 方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20260227-FX256.lcb
 样品瓶号: 1-46
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2026/02/27 21:45:53 实验者: xiexinhui
 处理时间 (V2) : 2026/02/28 10:03:15 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.161 | 141139 | 100.000 | 31819 | 1664 | 1.291 | -- |
| 总计 | | 141139 | 100.000 | 31819 | | | |




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
 柱温 : 30°C 波长:318nm
 数据文件名: RC\$JSS-222 - 7-4/7-577-2 - zzp-6022401-2p-rcqx-pH3.8jz-jf50z-10min-P1.lcd
 方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20260227-FX256.lcb
 样品瓶号: 1-2
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2026/02/27 21:48:46 实验者: xiexinhui
 处理时间 (V2) : 2026/02/28 10:03:17 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.163 | 170989 | 100.000 | 38726 | 1670 | 1.284 | -- |
| 总计 | | 170989 | 100.000 | 38726 | | | |




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
 柱温 : 30°C 波长:318nm
 数据文件名: RC\$JSS-222 - 7-4/7-578-2 - zzp-6022401-2p-rcqx-pH3.8jz-jf50z-10min-P2.lcd
 方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20260227-FX256.lcb
 样品瓶号: 1-11
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2026/02/27 21:51:39 实验者: xiexinhui
 处理时间 (V2) : 2026/02/28 10:03:20 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.162 | 166056 | 100.000 | 37615 | 1668 | 1.281 | -- |
| 总计 | | 166056 | 100.000 | 37615 | | | |




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
 柱温 : 30°C 波长:318nm
 数据文件名: RC\$JSS-222 - 7-4/7-579-2 - zzp-6022401-2p-rcqx-pH3.8jz-jf50z-10min-P3.lcd
 方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20260227-FX256.lcb
 样品瓶号: 1-20
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2026/02/27 21:54:32 实验者: xiexinhui
 处理时间 (V2) : 2026/02/28 10:03:22 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.163 | 167499 | 100.000 | 37949 | 1672 | 1.283 | -- |
| 总计 | | 167499 | 100.000 | 37949 | | | |




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
 柱温 : 30°C 波长:318nm
 数据文件名: RC\$JSS-222 - 7-4/7-580-2 - zzp-6022401-2p-rcqx-pH3.8jz-jf50z-10min-P4.lcd
 方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20260227-FX256.lcb
 样品瓶号: 1-29
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2026/02/27 21:57:24 实验者: xiexinhui
 处理时间 (V2) : 2026/02/28 10:03:25 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.165 | 175926 | 100.000 | 39768 | 1671 | 1.282 | -- |
| 总计 | | 175926 | 100.000 | 39768 | | | |

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
 柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
 数据文件名: RC\$JSS-222 - 7-4/7-581-2 - zzp-6022401-2p-rcqx-pH3.8jz-jf50z-10min-P5.lcd
 方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20260227-FX256.lcb
 样品瓶号: 1-38
 进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
 进样时间: 2026/02/27 22:00:17 实验者: xiexinhui
 处理时间 (V2) : 2026/02/28 10:03:28 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.165 | 167552 | 100.000 | 37919 | 1671 | 1.283 | -- |
| 总计 | | 167552 | 100.000 | 37919 | | | |

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
 柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
 数据文件名: RC\$JSS-222 - 7-4/7-582-2 - zzp-6022401-2p-rcqx-pH3.8jz-jf50z-10min-P6.lcd
 方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20260227-FX256.lcb
 样品瓶号: 1-47
 进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
 进样时间: 2026/02/27 22:03:09 实验者: xiexinhui
 处理时间 (V2) : 2026/02/28 10:03:31 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.166 | 167702 | 100.000 | 37786 | 1679 | 1.287 | -- |
| 总计 | | 167702 | 100.000 | 37786 | | | |




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
 柱温 : 30°C 波长:318nm
 数据文件名: RC\$JSS-222 - 7-4/7-583-2 - zzp-6022401-2p-rcqx-pH3.8jz-jf50z-15min-P1.lcd
 方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20260227-FX256.lcb
 样品瓶号: 1-3
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2026/02/27 22:06:01 实验者: xiexinhui
 处理时间 (V2) : 2026/02/28 10:03:35 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.167 | 179853 | 100.000 | 40325 | 1678 | 1.284 | -- |
| 总计 | | 179853 | 100.000 | 40325 | | | |




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
 柱温 : 30°C 波长:318nm
 数据文件名: RC\$JSS-222 - 7-4/7-584-2 - zzp-6022401-2p-rcqx-pH3.8jz-jf50z-15min-P2.lcd
 方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20260227-FX256.lcb
 样品瓶号: 1-12
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2026/02/27 22:08:54 实验者: xiexinhui
 处理时间 (V2) : 2026/02/28 10:03:38 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.166 | 175903 | 100.000 | 39554 | 1674 | 1.282 | -- |
| 总计 | | 175903 | 100.000 | 39554 | | | |




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
 柱温 : 30°C 波长:318nm
 数据文件名: RC\$JSS-222 - 7-4/7-585-2 - zzp-6022401-2p-rcqx-pH3.8jz-jf50z-15min-P3.lcd
 方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20260227-FX256.lcb
 样品瓶号: 1-21
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2026/02/27 22:11:45 实验者: xiexinhui
 处理时间 (V2) : 2026/02/28 10:03:40 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.168 | 176955 | 100.000 | 39602 | 1676 | 1.283 | -- |
| 总计 | | 176955 | 100.000 | 39602 | | | |

〈样品信息〉

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 7-4/7-586-2 - zzp-6022401-2p-rcqx-pH3.8jz-jf50z-15min-P4.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20260227-FX256.lcb
样品瓶号: 1-30
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2026/02/27 22:14:38 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2026/02/28 10:03:43 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉

mV



〈峰表〉

检测器A Ch1 318nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.169 | 184223 | 100.000 | 41410 | 1682 | 1.278 | -- |
| 总计 | | 184223 | 100.000 | 41410 | | | |




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
 柱温 : 30°C 波长:318nm
 数据文件名: RC\$JSS-222 - 7-4/7-587-2 - zzp-6022401-2p-rcqx-pH3.8jz-jf50z-15min-P5.lcd
 方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20260227-FX256.lcb
 样品瓶号: 1-39
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2026/02/27 22:17:30 实验者: xiexinhui
 处理时间 (V2) : 2026/02/28 10:03:46 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 318nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.169 | 177182 | 100.000 | 39872 | 1683 | 1.276 | -- |
| 总计 | | 177182 | 100.000 | 39872 | | | |

〈样品信息〉

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 7-4/7-588-2 - zzp-6022401-2p-rcqx-pH3.8jz-jf50z-15min-P6.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20260227-FX256.lcb
样品瓶号: 1-48
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2026/02/27 22:20:23 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2026/02/28 10:03:49 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉

mV



〈峰表〉

检测器A Ch1 318nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.170 | 176005 | 100.000 | 39642 | 1679 | 1.280 | -- |
| 总计 | | 176005 | 100.000 | 39642 | | | |




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
 柱温 : 30°C 波长:318nm
 数据文件名: RC\$JSS-222 - 7-4/7-589-2 - zzp-6022401-2p-rcqx-pH3.8jz-jf50z-20min-P1.lcd
 方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20260227-FX256.lcb
 样品瓶号: 1-4
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2026/02/27 22:23:16 实验者: xiexinhui
 处理时间 (V2) : 2026/02/28 10:03:52 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 318nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.169 | 183763 | 100.000 | 41490 | 1686 | 1.277 | -- |
| 总计 | | 183763 | 100.000 | 41490 | | | |

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
 柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
 数据文件名: RC\$JSS-222 - 7-4/7-590-2 - zzp-6022401-2p-rcqx-pH3.8jz-jf50z-20min-P2.lcd
 方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20260227-FX256.lcb
 样品瓶号: 1-13
 进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
 进样时间: 2026/02/27 22:26:07 实验者: xiexinhui
 处理时间 (V2) : 2026/02/28 10:03:54 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.169 | 180297 | 100.000 | 40546 | 1681 | 1.279 | -- |
| 总计 | | 180297 | 100.000 | 40546 | | | |




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
 柱温 : 30°C 波长:318nm
 数据文件名: RC\$JSS-222 - 7-4/7-591-2 - zzp-6022401-2p-rcqx-pH3.8jz-jf50z-20min-P3.lcd
 方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20260227-FX256.lcb
 样品瓶号: 1-22
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2026/02/27 22:28:59 实验者: xiexinhui
 处理时间 (V2) : 2026/02/28 10:03:57 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.169 | 181100 | 100.000 | 40723 | 1684 | 1.280 | -- |
| 总计 | | 181100 | 100.000 | 40723 | | | |




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
 柱温 : 30°C 波长:318nm
 数据文件名: RC\$JSS-222 - 7-4/7-592-2 - zzp-6022401-2p-rcqx-pH3.8jz-jf50z-20min-P4.lcd
 方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20260227-FX256.lcb
 样品瓶号: 1-31
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2026/02/27 22:31:52 实验者: xiexinhui
 处理时间 (V2) : 2026/02/28 10:04:00 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.169 | 188102 | 100.000 | 42320 | 1684 | 1.276 | -- |
| 总计 | | 188102 | 100.000 | 42320 | | | |




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
 柱温 : 30°C 波长:318nm
 数据文件名: RC\$JSS-222 - 7-4/7-593-2 - zzp-6022401-2p-rcqx-pH3.8jz-jf50z-20min-P5.lcd
 方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20260227-FX256.lcb
 样品瓶号: 1-40
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2026/02/27 22:34:44 实验者: xiexinhui
 处理时间 (V2) : 2026/02/28 10:04:02 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.169 | 182409 | 100.000 | 40980 | 1682 | 1.278 | -- |
| 总计 | | 182409 | 100.000 | 40980 | | | |




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
 柱温 : 30°C 波长:318nm
 数据文件名: RC\$JSS-222 - 7-4/7-594-2 - zzp-6022401-2p-rcqx-pH3.8jz-jf50z-20min-P6.lcd
 方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20260227-FX256.lcb
 样品瓶号: 1-49
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2026/02/27 22:37:36 实验者: xiexinhui
 处理时间 (V2) : 2026/02/28 10:04:05 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 318nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.169 | 181268 | 100.000 | 40819 | 1682 | 1.276 | -- |
| 总计 | | 181268 | 100.000 | 40819 | | | |

〈样品信息〉

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 7-4/7-595-2 - zzp-6022401-2p-rcqx-pH3.8jz-jf50z-30min-P1.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20260227-FX256.lcb
样品瓶号: 1-5
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2026/02/27 22:40:28 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2026/02/28 10:04:08 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉

mV



〈峰表〉

检测器A Ch1 318nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.170 | 187421 | 100.000 | 42378 | 1684 | 1.273 | -- |
| 总计 | | 187421 | 100.000 | 42378 | | | |




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
 柱温 : 30°C 波长:318nm
 数据文件名: RC\$JSS-222 - 7-4/7-596-2 - zzp-6022401-2p-rcqx-pH3.8jz-jf50z-30min-P2.lcd
 方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20260227-FX256.lcb
 样品瓶号: 1-14
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2026/02/27 22:43:21 实验者: xiexinhui
 处理时间 (V2) : 2026/02/28 10:04:11 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.171 | 185242 | 100.000 | 41891 | 1688 | 1.276 | -- |
| 总计 | | 185242 | 100.000 | 41891 | | | |




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
 柱温 : 30°C 波长:318nm
 数据文件名: RC\$JSS-222 - 7-4/7-597-2 - zzp-6022401-2p-rcqx-pH3.8jz-jf50z-30min-P3.lcd
 方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20260227-FX256.lcb
 样品瓶号: 1-23
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2026/02/27 22:46:13 实验者: xiexinhui
 处理时间 (V2) : 2026/02/28 10:04:13 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.170 | 183393 | 100.000 | 41416 | 1683 | 1.275 | -- |
| 总计 | | 183393 | 100.000 | 41416 | | | |




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
 柱温 : 30°C 波长:318nm
 数据文件名: RC\$JSS-222 - 7-4/7-598-2 - zzp-6022401-2p-rcqx-pH3.8jz-jf50z-30min-P4.lcd
 方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20260227-FX256.lcb
 样品瓶号: 1-32
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2026/02/27 22:49:05 实验者: xiexinhui
 处理时间 (V2) : 2026/02/28 10:04:16 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.171 | 190760 | 100.000 | 43144 | 1691 | 1.276 | -- |
| 总计 | | 190760 | 100.000 | 43144 | | | |




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
 柱温 : 30°C 波长:318nm
 数据文件名: RC\$JSS-222 - 7-4/7-599-2 - zzp-6022401-2p-rcqx-pH3.8jz-jf50z-30min-P5.lcd
 方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20260227-FX256.lcb
 样品瓶号: 1-41
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2026/02/27 22:51:57 实验者: xiexinhui
 处理时间 (V2) : 2026/02/28 10:04:19 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.171 | 185520 | 100.000 | 41938 | 1689 | 1.275 | -- |
| 总计 | | 185520 | 100.000 | 41938 | | | |




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
 柱温 : 30°C 波长:318nm
 数据文件名: RC\$JSS-222 - 7-4/7-600-2 - zzp-6022401-2p-rcqx-pH3.8jz-jf50z-30min-P6.lcd
 方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20260227-FX256.lcb
 样品瓶号: 1-50
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2026/02/27 22:54:49 实验者: xiexinhui
 处理时间 (V2) : 2026/02/28 10:04:21 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.171 | 183742 | 100.000 | 41593 | 1690 | 1.277 | -- |
| 总计 | | 183742 | 100.000 | 41593 | | | |




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
 柱温 : 30°C 波长:318nm
 数据文件名: RC\$JSS-222 - 7-4/7-601-2 - zzp-6022401-2p-rcqx-pH3.8jz-jf50z-45min-P1.lcd
 方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20260227-FX256.lcb
 样品瓶号: 1-6
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2026/02/27 22:57:42 实验者: xiexinhui
 处理时间 (V2) : 2026/02/28 10:04:24 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.171 | 187728 | 100.000 | 42476 | 1690 | 1.274 | -- |
| 总计 | | 187728 | 100.000 | 42476 | | | |




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
 柱温 : 30°C 波长:318nm
 数据文件名: RC\$JSS-222 - 7-4/7-602-2 - zzp-6022401-2p-rcqx-pH3.8jz-jf50z-45min-P2.lcd
 方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20260227-FX256.lcb
 样品瓶号: 1-15
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2026/02/27 23:00:34 实验者: xiexinhui
 处理时间 (V2) : 2026/02/28 10:04:27 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.171 | 186297 | 100.000 | 42164 | 1689 | 1.273 | -- |
| 总计 | | 186297 | 100.000 | 42164 | | | |




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
 柱温 : 30°C 波长:318nm
 数据文件名: RC\$JSS-222 - 7-4/7-603-2 - zzp-6022401-2p-rcqx-pH3.8jz-jf50z-45min-P3.lcd
 方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20260227-FX256.lcb
 样品瓶号: 1-24
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2026/02/27 23:03:26 实验者: xiexinhui
 处理时间 (V2) : 2026/02/28 10:04:29 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.171 | 185291 | 100.000 | 41857 | 1686 | 1.275 | -- |
| 总计 | | 185291 | 100.000 | 41857 | | | |




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
 柱温 : 30°C 波长:318nm
 数据文件名: RC\$JSS-222 - 7-4/7-604-2 - zzp-6022401-2p-rcqx-pH3.8jz-jf50z-45min-P4.lcd
 方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20260227-FX256.lcb
 样品瓶号: 1-33
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2026/02/27 23:06:18 实验者: xiexinhui
 处理时间 (V2) : 2026/02/28 10:04:32 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.172 | 191057 | 100.000 | 43201 | 1687 | 1.274 | -- |
| 总计 | | 191057 | 100.000 | 43201 | | | |




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
 柱温 : 30°C 波长:318nm
 数据文件名: RC\$JSS-222 - 7-4/7-605-2 - zzp-6022401-2p-rcqx-pH3.8jz-jf50z-45min-P5.lcd
 方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20260227-FX256.lcb
 样品瓶号: 1-42
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2026/02/27 23:09:10 实验者: xiexinhui
 处理时间 (V2) : 2026/02/28 10:04:35 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.172 | 187168 | 100.000 | 42322 | 1693 | 1.276 | -- |
| 总计 | | 187168 | 100.000 | 42322 | | | |




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
 柱温 : 30°C 波长:318nm
 数据文件名: RC\$JSS-222 - 7-4/7-606-2 - zzp-6022401-2p-rcqx-pH3.8jz-jf50z-45min-P6.lcd
 方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20260227-FX256.lcb
 样品瓶号: 1-51
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2026/02/27 23:12:02 实验者: xiexinhui
 处理时间 (V2) : 2026/02/28 10:04:38 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.171 | 185499 | 100.000 | 41993 | 1693 | 1.276 | -- |
| 总计 | | 185499 | 100.000 | 41993 | | | |




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
 柱温 : 30°C 波长:318nm
 数据文件名: RC\$JSS-222 - 7-4/7-607-2 - zzp-6022401-2p-rcqx-pH3.8jz-jf50z-60min-P1.lcd
 方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20260227-FX256.lcb
 样品瓶号: 1-7
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2026/02/27 23:14:54 实验者: xiexinhui
 处理时间 (V2) : 2026/02/28 10:04:40 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.171 | 189297 | 100.000 | 42808 | 1690 | 1.275 | -- |
| 总计 | | 189297 | 100.000 | 42808 | | | |




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
 柱温 : 30°C 波长:318nm
 数据文件名: RC\$JSS-222 - 7-4/7-608-2 - zzp-6022401-2p-rcqx-pH3.8jz-jf50z-60min-P2.lcd
 方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20260227-FX256.lcb
 样品瓶号: 1-16
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2026/02/27 23:17:48 实验者: xiexinhui
 处理时间 (V2) : 2026/02/28 10:04:43 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.171 | 187253 | 100.000 | 42303 | 1687 | 1.276 | -- |
| 总计 | | 187253 | 100.000 | 42303 | | | |




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
 柱温 : 30°C 波长:318nm
 数据文件名: RC\$JSS-222 - 7-4/7-609-2 - zzp-6022401-2p-rcqx-pH3.8jz-jf50z-60min-P3.lcd
 方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20260227-FX256.lcb
 样品瓶号: 1-25
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2026/02/27 23:20:40 实验者: xiexinhui
 处理时间 (V2) : 2026/02/28 10:04:46 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.171 | 185258 | 100.000 | 41785 | 1687 | 1.277 | -- |
| 总计 | | 185258 | 100.000 | 41785 | | | |




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
 柱温 : 30°C 波长:318nm
 数据文件名: RC\$JSS-222 - 7-4/7-610-2 - zzp-6022401-2p-rcqx-pH3.8jz-jf50z-60min-P4.lcd
 方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20260227-FX256.lcb
 样品瓶号: 1-34
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2026/02/27 23:23:31 实验者: xiexinhui
 处理时间 (V2) : 2026/02/28 10:04:48 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.171 | 192323 | 100.000 | 43518 | 1690 | 1.276 | -- |
| 总计 | | 192323 | 100.000 | 43518 | | | |




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
 柱温 : 30°C 波长:318nm
 数据文件名: RC\$JSS-222 - 7-4/7-611-2 - zzp-6022401-2p-rcqx-pH3.8jz-jf50z-60min-P5.lcd
 方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20260227-FX256.lcb
 样品瓶号: 1-43
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2026/02/27 23:26:24 实验者: xiexinhui
 处理时间 (V2) : 2026/02/28 10:04:51 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.170 | 186824 | 100.000 | 42179 | 1686 | 1.275 | -- |
| 总计 | | 186824 | 100.000 | 42179 | | | |




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
 柱温 : 30°C 波长:318nm
 数据文件名: RC\$JSS-222 - 7-4/7-612-2 - zzp-6022401-2p-rcqx-pH3.8jz-jf50z-60min-P6.lcd
 方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20260227-FX256.lcb
 样品瓶号: 1-52
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2026/02/27 23:29:15 实验者: xiexinhui
 处理时间 (V2) : 2026/02/28 10:04:54 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 318nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.170 | 185887 | 100.000 | 42001 | 1687 | 1.275 | -- |
| 总计 | | 185887 | 100.000 | 42001 | | | |

〈样品信息〉

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 7-4/7-613-2 - zzp-6022401-2p-rcqx-pH3.8jz-jf50z-jxzs-P1.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20260227-FX256.lcb
样品瓶号: 1-8
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2026/02/27 23:32:08 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2026/02/28 10:04:56 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉

mV



〈峰表〉

检测器A Ch1 318nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.171 | 189907 | 100.000 | 42956 | 1687 | 1.275 | -- |
| 总计 | | 189907 | 100.000 | 42956 | | | |




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
 柱温 : 30°C 波长:318nm
 数据文件名: RC\$JSS-222 - 7-4/7-614-2 - zzp-6022401-2p-rcqx-pH3.8jz-jf50z-jxzs-P2.lcd
 方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20260227-FX256.lcb
 样品瓶号: 1-17
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2026/02/27 23:35:01 实验者: xiexinhui
 处理时间 (V2) : 2026/02/28 10:04:59 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 318nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.171 | 187359 | 100.000 | 42377 | 1687 | 1.276 | -- |
| 总计 | | 187359 | 100.000 | 42377 | | | |

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
 柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
 数据文件名: RC\$JSS-222 - 7-4/7-615-2 - zzp-6022401-2p-rcqx-pH3.8jz-jf50z-jxzs-P3.lcd
 方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20260227-FX256.lcb
 样品瓶号: 1-26
 进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
 进样时间: 2026/02/27 23:37:54 实验者: xiexinhui
 处理时间 (V2) : 2026/02/28 10:05:02 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.171 | 185295 | 100.000 | 41885 | 1690 | 1.277 | -- |
| 总计 | | 185295 | 100.000 | 41885 | | | |




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
 柱温 : 30°C 波长:318nm
 数据文件名: RC\$JSS-222 - 7-4/7-616-2 - zzp-6022401-2p-rcqx-pH3.8jz-jf50z-jxzs-P4.lcd
 方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20260227-FX256.lcb
 样品瓶号: 1-35
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2026/02/27 23:40:48 实验者: xiexinhui
 处理时间 (V2) : 2026/02/28 10:05:04 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.171 | 191914 | 100.000 | 43387 | 1691 | 1.275 | -- |
| 总计 | | 191914 | 100.000 | 43387 | | | |




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
 柱温 : 30°C 波长:318nm
 数据文件名: RC\$JSS-222 - 7-4/7-617-2 - zzp-6022401-2p-rcqx-pH3.8jz-jf50z-jxzs-P5.lcd
 方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20260227-FX256.lcb
 样品瓶号: 1-44
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2026/02/27 23:43:40 实验者: xiexinhui
 处理时间 (V2) : 2026/02/28 10:05:07 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.171 | 186520 | 100.000 | 42208 | 1689 | 1.274 | -- |
| 总计 | | 186520 | 100.000 | 42208 | | | |




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
 柱温 : 30°C 波长:318nm
 数据文件名: RC\$JSS-222 - 7-4/7-618-2 - zzp-6022401-2p-rcqx-pH3.8jz-jf50z-jxzs-P6.lcd
 方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20260227-FX256.lcb
 样品瓶号: 1-53
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2026/02/27 23:46:33 实验者: xiexinhui
 处理时间 (V2) : 2026/02/28 10:05:10 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 318nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.171 | 186610 | 100.000 | 42160 | 1689 | 1.276 | -- |
| 总计 | | 186610 | 100.000 | 42160 | | | |

〈样品信息〉

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 7-4/7-619-2 - zzp-6022401-2p-rcqx-pH3.8jz-jf50z-dz2-1.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20260227-FX256.lcb
样品瓶号: 1-27
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2026/02/27 23:49:25 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2026/02/28 10:05:12 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉

mV



〈峰表〉

检测器A Ch1 318nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.172 | 192544 | 100.000 | 41778 | 1545 | 1.267 | -- |
| 总计 | | 192544 | 100.000 | 41778 | | | |




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
 柱温 : 30°C 波长:318nm
 数据文件名: RC\$JSS-222 - 7-4/7-620-2 - zzp-6022401-2p-rcqx-pH3.8jz-jf50z-dz2-2.lcd
 方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20260227-FX256.lcb
 样品瓶号: 1-27
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2026/02/27 23:52:16 实验者: xiexinhui
 处理时间 (V2) : 2026/02/28 10:05:15 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 318nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.171 | 192141 | 100.000 | 41754 | 1546 | 1.264 | -- |
| 总计 | | 192141 | 100.000 | 41754 | | | |

〈样品信息〉

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 7-4/7-621-2 - zzp-6022402p-rcqx-pH3.8jz-jf50z-rj.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20260227-FX256.lcb
样品瓶号: 2-9
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2026/02/27 23:55:12 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2026/02/28 10:05:18 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉

mV



〈峰表〉

检测器A Ch1 318nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|------|----|-----|----|------------|------|----------|
| 总计 | | | | | | | |




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
 柱温 : 30°C 波长:318nm
 数据文件名: RC\$JSS-222 - 7-4/7-622-2 - zzp-6022402p-rcqx-pH3.8jz-jf50z-dz1-1.lcd
 方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20260227-FX256.lcb
 样品瓶号: 2-18
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2026/02/27 23:58:05 实验者: xiexinhui
 处理时间 (V2) : 2026/02/28 10:05:21 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.171 | 191090 | 100.000 | 41523 | 1547 | 1.269 | -- |
| 总计 | | 191090 | 100.000 | 41523 | | | |




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
 柱温 : 30°C 波长:318nm
 数据文件名: RC\$JSS-222 - 7-4/7-623-2 - zzp-6022402p-rcqx-pH3.8jz-jf50z-dz1-2.lcd
 方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20260227-FX256.lcb
 样品瓶号: 2-18
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2026/02/28 00:00:59 实验者: xiexinhui
 处理时间 (V2) : 2026/02/28 10:05:23 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.171 | 190708 | 100.000 | 41465 | 1548 | 1.267 | -- |
| 总计 | | 190708 | 100.000 | 41465 | | | |




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
 柱温 : 30°C 波长:318nm
 数据文件名: RC\$JSS-222 - 7-4/7-624-2 - zzp-6022402p-rcqx-pH3.8jz-jf50z-dz1-3.lcd
 方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20260227-FX256.lcb
 样品瓶号: 2-18
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2026/02/28 00:03:53 实验者: xiexinhui
 处理时间 (V2) : 2026/02/28 10:05:26 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.171 | 191164 | 100.000 | 41530 | 1546 | 1.265 | -- |
| 总计 | | 191164 | 100.000 | 41530 | | | |




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
 柱温 : 30°C 波长:318nm
 数据文件名: RC\$JSS-222 - 7-4/7-625-2 - zzp-6022402p-rcqx-pH3.8jz-jf50z-dz1-4.lcd
 方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20260227-FX256.lcb
 样品瓶号: 2-18
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2026/02/28 00:06:47 实验者: xiexinhui
 处理时间 (V2) : 2026/02/28 10:05:29 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.171 | 191237 | 100.000 | 41540 | 1550 | 1.270 | -- |
| 总计 | | 191237 | 100.000 | 41540 | | | |




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
 柱温 : 30°C 波长:318nm
 数据文件名: RC\$JSS-222 - 7-4/7-626-2 - zzp-6022402p-rcqx-pH3.8jz-jf50z-dz1-5.lcd
 方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20260227-FX256.lcb
 样品瓶号: 2-18
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2026/02/28 00:09:42 实验者: xiexinhui
 处理时间 (V2) : 2026/02/28 10:05:32 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.171 | 191167 | 100.000 | 41516 | 1545 | 1.266 | -- |
| 总计 | | 191167 | 100.000 | 41516 | | | |




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
 柱温 : 30°C 波长:318nm
 数据文件名: RC\$JSS-222 - 7-4/7-627-2 - zzp-6022402p-rcqx-pH3.8jz-jf50z-5min-P1.lcd
 方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20260227-FX256.lcb
 样品瓶号: 2-1
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2026/02/28 00:12:35 实验者: xiexinhui
 处理时间 (V2) : 2026/02/28 10:05:34 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.169 | 138075 | 100.000 | 31088 | 1679 | 1.287 | -- |
| 总计 | | 138075 | 100.000 | 31088 | | | |




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
 柱温 : 30°C 波长:318nm
 数据文件名: RC\$JSS-222 - 7-4/7-628-2 - zzp-6022402p-rcqx-pH3.8jz-jf50z-5min-P2.lcd
 方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20260227-FX256.lcb
 样品瓶号: 2-10
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2026/02/28 00:15:28 实验者: xiexinhui
 处理时间 (V2) : 2026/02/28 10:05:37 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.170 | 132953 | 100.000 | 29894 | 1676 | 1.292 | -- |
| 总计 | | 132953 | 100.000 | 29894 | | | |




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
 柱温 : 30°C 波长:318nm
 数据文件名: RC\$JSS-222 - 7-4/7-629-2 - zzp-6022402p-rcqx-pH3.8jz-jf50z-5min-P3.lcd
 方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20260227-FX256.lcb
 样品瓶号: 2-19
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2026/02/28 00:18:20 实验者: xiexinhui
 处理时间 (V2) : 2026/02/28 10:05:41 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.170 | 137992 | 100.000 | 31089 | 1679 | 1.291 | -- |
| 总计 | | 137992 | 100.000 | 31089 | | | |




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
 柱温 : 30°C 波长:318nm
 数据文件名: RC\$JSS-222 - 7-4/7-630-2 - zzp-6022402p-rcqx-pH3.8jz-jf50z-5min-P4.lcd
 方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20260227-FX256.lcb
 样品瓶号: 2-28
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2026/02/28 00:21:14 实验者: xiexinhui
 处理时间 (V2) : 2026/02/28 10:05:44 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.170 | 142089 | 100.000 | 31966 | 1678 | 1.286 | -- |
| 总计 | | 142089 | 100.000 | 31966 | | | |




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
 柱温 : 30°C 波长:318nm
 数据文件名: RC\$JSS-222 - 7-4/7-631-2 - zzp-6022402p-rcqx-pH3.8jz-jf50z-5min-P5.lcd
 方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20260227-FX256.lcb
 样品瓶号: 2-37
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2026/02/28 00:24:06 实验者: xiexinhui
 处理时间 (V2) : 2026/02/28 10:05:47 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.171 | 139337 | 100.000 | 31411 | 1681 | 1.291 | -- |
| 总计 | | 139337 | 100.000 | 31411 | | | |




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
 柱温 : 30°C 波长:318nm
 数据文件名: RC\$JSS-222 - 7-4/7-632-2 - zzp-6022402p-rcqx-pH3.8jz-jf50z-5min-P6.lcd
 方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20260227-FX256.lcb
 样品瓶号: 2-46
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2026/02/28 00:26:59 实验者: xiexinhui
 处理时间 (V2) : 2026/02/28 10:05:50 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.170 | 133077 | 100.000 | 29990 | 1682 | 1.291 | -- |
| 总计 | | 133077 | 100.000 | 29990 | | | |




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
 柱温 : 30°C 波长:318nm
 数据文件名: RC\$JSS-222 - 7-4/7-633-2 - zzp-6022402p-rcqx-pH3.8jz-jf50z-10min-P1.lcd
 方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20260227-FX256.lcb
 样品瓶号: 2-2
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2026/02/28 00:29:53 实验者: xiexinhui
 处理时间 (V2) : 2026/02/28 10:05:52 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.171 | 165485 | 100.000 | 37422 | 1692 | 1.283 | -- |
| 总计 | | 165485 | 100.000 | 37422 | | | |

〈样品信息〉

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 7-4/7-634-2 - zzp-6022402p-rcqx-pH3.8jz-jf50z-10min-P2.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20260227-FX256.lcb
样品瓶号: 2-11
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2026/02/28 00:32:46 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2026/02/28 10:05:55 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉

mV



〈峰表〉

检测器A Ch1 318nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.170 | 157810 | 100.000 | 35742 | 1689 | 1.281 | -- |
| 总计 | | 157810 | 100.000 | 35742 | | | |




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
 柱温 : 30°C 波长:318nm
 数据文件名: RC\$JSS-222 - 7-4/7-635-2 - zzp-6022402p-rcqx-pH3.8jz-jf50z-10min-P3.lcd
 方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20260227-FX256.lcb
 样品瓶号: 2-20
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2026/02/28 00:35:39 实验者: xiexinhui
 处理时间 (V2) : 2026/02/28 10:05:58 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.170 | 166832 | 100.000 | 37717 | 1688 | 1.279 | -- |
| 总计 | | 166832 | 100.000 | 37717 | | | |




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
 柱温 : 30°C 波长:318nm
 数据文件名: RC\$JSS-222 - 7-4/7-636-2 - zzp-6022402p-rcqx-pH3.8jz-jf50z-10min-P4.lcd
 方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20260227-FX256.lcb
 样品瓶号: 2-29
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2026/02/28 00:38:32 实验者: xiexinhui
 处理时间 (V2) : 2026/02/28 10:06:00 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.170 | 169526 | 100.000 | 38259 | 1687 | 1.281 | -- |
| 总计 | | 169526 | 100.000 | 38259 | | | |




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
 柱温 : 30°C 波长:318nm
 数据文件名: RC\$JSS-222 - 7-4/7-637-2 - zzp-6022402p-rcqx-pH3.8jz-jf50z-10min-P5.lcd
 方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20260227-FX256.lcb
 样品瓶号: 2-38
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2026/02/28 00:41:25 实验者: xiexinhui
 处理时间 (V2) : 2026/02/28 10:06:03 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.172 | 166302 | 100.000 | 37713 | 1693 | 1.277 | -- |
| 总计 | | 166302 | 100.000 | 37713 | | | |




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
 柱温 : 30°C 波长:318nm
 数据文件名: RC\$JSS-222 - 7-4/7-638-2 - zzp-6022402p-rcqx-pH3.8jz-jf50z-10min-P6.lcd
 方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20260227-FX256.lcb
 样品瓶号: 2-47
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2026/02/28 00:44:17 实验者: xiexinhui
 处理时间 (V2) : 2026/02/28 10:06:06 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.172 | 161605 | 100.000 | 36544 | 1687 | 1.281 | -- |
| 总计 | | 161605 | 100.000 | 36544 | | | |




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
 柱温 : 30°C 波长:318nm
 数据文件名: RC\$JSS-222 - 7-4/7-639-2 - zzp-6022402p-rcqx-pH3.8jz-jf50z-15min-P1.lcd
 方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20260227-FX256.lcb
 样品瓶号: 2-3
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2026/02/28 00:47:10 实验者: xiexinhui
 处理时间 (V2) : 2026/02/28 10:06:08 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.170 | 175084 | 100.000 | 39639 | 1692 | 1.277 | -- |
| 总计 | | 175084 | 100.000 | 39639 | | | |




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
 柱温 : 30°C 波长:318nm
 数据文件名: RC\$JSS-222 - 7-4/7-640-2 - zzp-6022402p-rcqx-pH3.8jz-jf50z-15min-P2.lcd
 方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20260227-FX256.lcb
 样品瓶号: 2-12
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2026/02/28 00:50:04 实验者: xiexinhui
 处理时间 (V2) : 2026/02/28 10:06:11 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.170 | 167020 | 100.000 | 37807 | 1688 | 1.279 | -- |
| 总计 | | 167020 | 100.000 | 37807 | | | |




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
 柱温 : 30°C 波长:318nm
 数据文件名: RC\$JSS-222 - 7-4/7-641-2 - zzp-6022402p-rcqx-pH3.8jz-jf50z-15min-P3.lcd
 方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20260227-FX256.lcb
 样品瓶号: 2-21
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2026/02/28 00:52:57 实验者: xiexinhui
 处理时间 (V2) : 2026/02/28 10:06:14 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 318nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.169 | 176488 | 100.000 | 39873 | 1692 | 1.278 | -- |
| 总计 | | 176488 | 100.000 | 39873 | | | |

〈样品信息〉

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 7-4/7-642-2 - zzp-6022402p-rcqx-pH3.8jz-jf50z-15min-P4.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20260227-FX256.lcb
样品瓶号: 2-30
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2026/02/28 00:55:50 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2026/02/28 10:06:17 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉

mV



〈峰表〉

检测器A Ch1 318nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.169 | 180361 | 100.000 | 40656 | 1691 | 1.281 | -- |
| 总计 | | 180361 | 100.000 | 40656 | | | |




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
 柱温 : 30°C 波长:318nm
 数据文件名: RC\$JSS-222 - 7-4/7-643-2 - zzp-6022402p-rcqx-pH3.8jz-jf50z-15min-P5.lcd
 方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20260227-FX256.lcb
 样品瓶号: 2-39
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2026/02/28 00:58:44 实验者: xiexinhui
 处理时间 (V2) : 2026/02/28 10:06:19 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.170 | 176840 | 100.000 | 39995 | 1692 | 1.278 | -- |
| 总计 | | 176840 | 100.000 | 39995 | | | |




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
 柱温 : 30°C 波长:318nm
 数据文件名: RC\$JSS-222 - 7-4/7-644-2 - zzp-6022402p-rcqx-pH3.8jz-jf50z-15min-P6.lcd
 方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20260227-FX256.lcb
 样品瓶号: 2-48
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2026/02/28 01:01:36 实验者: xiexinhui
 处理时间 (V2) : 2026/02/28 10:06:22 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.169 | 170653 | 100.000 | 38465 | 1686 | 1.280 | -- |
| 总计 | | 170653 | 100.000 | 38465 | | | |




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
 柱温 : 30°C 波长:318nm
 数据文件名: RC\$JSS-222 - 7-4/7-645-2 - zzp-6022402p-rcqx-pH3.8jz-jf50z-20min-P1.lcd
 方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20260227-FX256.lcb
 样品瓶号: 2-4
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2026/02/28 01:04:30 实验者: xiexinhui
 处理时间 (V2) : 2026/02/28 10:06:25 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.169 | 179743 | 100.000 | 40576 | 1692 | 1.277 | -- |
| 总计 | | 179743 | 100.000 | 40576 | | | |




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
 柱温 : 30°C 波长:318nm
 数据文件名: RC\$JSS-222 - 7-4/7-646-2 - zzp-6022402p-rcqx-pH3.8jz-jf50z-20min-P2.lcd
 方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20260227-FX256.lcb
 样品瓶号: 2-13
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2026/02/28 01:07:23 实验者: xiexinhui
 处理时间 (V2) : 2026/02/28 10:06:28 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.170 | 172477 | 100.000 | 38960 | 1690 | 1.278 | -- |
| 总计 | | 172477 | 100.000 | 38960 | | | |




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
 柱温 : 30°C 波长:318nm
 数据文件名: RC\$JSS-222 - 7-4/7-647-2 - zzp-6022402p-rcqx-pH3.8jz-jf50z-20min-P3.lcd
 方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20260227-FX256.lcb
 样品瓶号: 2-22
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2026/02/28 01:10:18 实验者: xiexinhui
 处理时间 (V2) : 2026/02/28 10:06:30 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.171 | 182343 | 100.000 | 41274 | 1695 | 1.275 | -- |
| 总计 | | 182343 | 100.000 | 41274 | | | |




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
 柱温 : 30°C 波长:318nm
 数据文件名: RC\$JSS-222 - 7-4/7-648-2 - zzp-6022402p-rcqx-pH3.8jz-jf50z-20min-P4.lcd
 方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20260227-FX256.lcb
 样品瓶号: 2-31
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2026/02/28 01:13:10 实验者: xiexinhui
 处理时间 (V2) : 2026/02/28 10:06:33 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.171 | 184694 | 100.000 | 41741 | 1693 | 1.279 | -- |
| 总计 | | 184694 | 100.000 | 41741 | | | |




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
 柱温 : 30°C 波长:318nm
 数据文件名: RC\$JSS-222 - 7-4/7-649-2 - zzp-6022402p-rcqx-pH3.8jz-jf50z-20min-P5.lcd
 方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20260227-FX256.lcb
 样品瓶号: 2-40
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2026/02/28 01:16:03 实验者: xiexinhui
 处理时间 (V2) : 2026/02/28 10:06:36 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.171 | 181817 | 100.000 | 41199 | 1693 | 1.276 | -- |
| 总计 | | 181817 | 100.000 | 41199 | | | |




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
 柱温 : 30°C 波长:318nm
 数据文件名: RC\$JSS-222 - 7-4/7-650-2 - zzp-6022402p-rcqx-pH3.8jz-jf50z-20min-P6.lcd
 方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20260227-FX256.lcb
 样品瓶号: 2-49
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2026/02/28 01:18:57 实验者: xiexinhui
 处理时间 (V2) : 2026/02/28 10:06:38 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.171 | 178230 | 100.000 | 40307 | 1692 | 1.276 | -- |
| 总计 | | 178230 | 100.000 | 40307 | | | |




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
 柱温 : 30°C 波长:318nm
 数据文件名: RC\$JSS-222 - 7-4/7-651-2 - zzp-6022402p-rcqx-pH3.8jz-jf50z-30min-P1.lcd
 方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20260227-FX256.lcb
 样品瓶号: 2-5
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2026/02/28 01:21:50 实验者: xiexinhui
 处理时间 (V2) : 2026/02/28 10:06:41 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.170 | 183577 | 100.000 | 41541 | 1691 | 1.277 | -- |
| 总计 | | 183577 | 100.000 | 41541 | | | |




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
 柱温 : 30°C 波长:318nm
 数据文件名: RC\$JSS-222 - 7-4/7-652-2 - zzp-6022402p-rcqx-pH3.8jz-jf50z-30min-P2.lcd
 方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20260227-FX256.lcb
 样品瓶号: 2-14
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2026/02/28 01:24:44 实验者: xiexinhui
 处理时间 (V2) : 2026/02/28 10:06:44 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.170 | 176245 | 100.000 | 39835 | 1689 | 1.277 | -- |
| 总计 | | 176245 | 100.000 | 39835 | | | |




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
 柱温 : 30°C 波长:318nm
 数据文件名: RC\$JSS-222 - 7-4/7-653-2 - zzp-6022402p-rcqx-pH3.8jz-jf50z-30min-P3.lcd
 方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20260227-FX256.lcb
 样品瓶号: 2-23
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2026/02/28 01:27:38 实验者: xiexinhui
 处理时间 (V2) : 2026/02/28 10:06:47 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.171 | 187643 | 100.000 | 42464 | 1693 | 1.277 | -- |
| 总计 | | 187643 | 100.000 | 42464 | | | |

〈样品信息〉

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 7-4/7-654-2 - zzp-6022402p-rcqx-pH3.8jz-jf50z-30min-P4.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20260227-FX256.lcb
样品瓶号: 2-32
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2026/02/28 01:30:31 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2026/02/28 10:06:49 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉

mV



〈峰表〉

检测器A Ch1 318nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.172 | 189148 | 100.000 | 42827 | 1692 | 1.274 | -- |
| 总计 | | 189148 | 100.000 | 42827 | | | |




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
 柱温 : 30°C 波长:318nm
 数据文件名: RC\$JSS-222 - 7-4/7-655-2 - zzp-6022402p-rcqx-pH3.8jz-jf50z-30min-P5.lcd
 方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20260227-FX256.lcb
 样品瓶号: 2-41
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2026/02/28 01:33:25 实验者: xiexinhui
 处理时间 (V2) : 2026/02/28 10:06:52 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.172 | 187829 | 100.000 | 42566 | 1694 | 1.276 | -- |
| 总计 | | 187829 | 100.000 | 42566 | | | |




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
 柱温 : 30°C 波长:318nm
 数据文件名: RC\$JSS-222 - 7-4/7-656-2 - zzp-6022402p-rcqx-pH3.8jz-jf50z-30min-P6.lcd
 方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20260227-FX256.lcb
 样品瓶号: 2-50
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2026/02/28 01:36:19 实验者: xiexinhui
 处理时间 (V2) : 2026/02/28 10:06:55 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.171 | 183637 | 100.000 | 41538 | 1690 | 1.275 | -- |
| 总计 | | 183637 | 100.000 | 41538 | | | |




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
 柱温 : 30°C 波长:318nm
 数据文件名: RC\$JSS-222 - 7-4/7-657-2 - zzp-6022402p-rcqx-pH3.8jz-jf50z-45min-P1.lcd
 方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20260227-FX256.lcb
 样品瓶号: 2-6
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2026/02/28 01:39:13 实验者: xiexinhui
 处理时间 (V2) : 2026/02/28 10:06:57 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.170 | 186819 | 100.000 | 42132 | 1683 | 1.276 | -- |
| 总计 | | 186819 | 100.000 | 42132 | | | |




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
 柱温 : 30°C 波长:318nm
 数据文件名: RC\$JSS-222 - 7-4/7-658-2 - zzp-6022402p-rcqx-pH3.8jz-jf50z-45min-P2.lcd
 方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20260227-FX256.lcb
 样品瓶号: 2-15
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2026/02/28 01:42:07 实验者: xiexinhui
 处理时间 (V2) : 2026/02/28 10:07:00 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.169 | 177989 | 100.000 | 40153 | 1691 | 1.280 | -- |
| 总计 | | 177989 | 100.000 | 40153 | | | |




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
 柱温 : 30°C 波长:318nm
 数据文件名: RC\$JSS-222 - 7-4/7-659-2 - zzp-6022402p-rcqx-pH3.8jz-jf50z-45min-P3.lcd
 方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20260227-FX256.lcb
 样品瓶号: 2-24
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2026/02/28 01:45:02 实验者: xiexinhui
 处理时间 (V2) : 2026/02/28 10:07:03 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.170 | 190635 | 100.000 | 43090 | 1689 | 1.275 | -- |
| 总计 | | 190635 | 100.000 | 43090 | | | |




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
 柱温 : 30°C 波长:318nm
 数据文件名: RC\$JSS-222 - 7-4/7-660-2 - zzp-6022402p-rcqx-pH3.8jz-jf50z-45min-P4.lcd
 方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20260227-FX256.lcb
 样品瓶号: 2-33
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2026/02/28 01:47:54 实验者: xiexinhui
 处理时间 (V2) : 2026/02/28 10:07:06 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.170 | 191291 | 100.000 | 43239 | 1690 | 1.274 | -- |
| 总计 | | 191291 | 100.000 | 43239 | | | |




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
 柱温 : 30°C 波长:318nm
 数据文件名: RC\$JSS-222 - 7-4/7-661-2 - zzp-6022402p-rcqx-pH3.8jz-jf50z-45min-P5.lcd
 方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20260227-FX256.lcb
 样品瓶号: 2-42
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2026/02/28 01:50:49 实验者: xiexinhui
 处理时间 (V2) : 2026/02/28 10:07:08 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.170 | 190737 | 100.000 | 43066 | 1692 | 1.275 | -- |
| 总计 | | 190737 | 100.000 | 43066 | | | |




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
 柱温 : 30°C 波长:318nm
 数据文件名: RC\$JSS-222 - 7-4/7-662-2 - zzp-6022402p-rcqx-pH3.8jz-jf50z-45min-P6.lcd
 方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20260227-FX256.lcb
 样品瓶号: 2-51
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2026/02/28 01:53:42 实验者: xiexinhui
 处理时间 (V2) : 2026/02/28 10:07:11 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.170 | 185825 | 100.000 | 42022 | 1693 | 1.275 | -- |
| 总计 | | 185825 | 100.000 | 42022 | | | |




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
 柱温 : 30°C 波长:318nm
 数据文件名: RC\$JSS-222 - 7-4/7-663-2 - zzp-6022402p-rcqx-pH3.8jz-jf50z-60min-P1.lcd
 方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20260227-FX256.lcb
 样品瓶号: 2-7
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2026/02/28 01:56:35 实验者: xiexinhui
 处理时间 (V2) : 2026/02/28 10:07:14 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.170 | 187615 | 100.000 | 42442 | 1691 | 1.275 | -- |
| 总计 | | 187615 | 100.000 | 42442 | | | |




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
 柱温 : 30°C 波长:318nm
 数据文件名: RC\$JSS-222 - 7-4/7-664-2 - zzp-6022402p-rcqx-pH3.8jz-jf50z-60min-P2.lcd
 方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20260227-FX256.lcb
 样品瓶号: 2-16
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2026/02/28 01:59:29 实验者: xiexinhui
 处理时间 (V2) : 2026/02/28 10:07:16 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.170 | 180025 | 100.000 | 40626 | 1686 | 1.277 | -- |
| 总计 | | 180025 | 100.000 | 40626 | | | |




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
 柱温 : 30°C 波长:318nm
 数据文件名: RC\$JSS-222 - 7-4/7-665-2 - zzp-6022402p-rcqx-pH3.8jz-jf50z-60min-P3.lcd
 方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20260227-FX256.lcb
 样品瓶号: 2-25
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2026/02/28 02:02:22 实验者: xiexinhui
 处理时间 (V2) : 2026/02/28 10:07:19 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.170 | 191628 | 100.000 | 43315 | 1693 | 1.275 | -- |
| 总计 | | 191628 | 100.000 | 43315 | | | |




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
 柱温 : 30°C 波长:318nm
 数据文件名: RC\$JSS-222 - 7-4/7-666-2 - zzp-6022402p-rcqx-pH3.8jz-jf50z-60min-P4.lcd
 方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20260227-FX256.lcb
 样品瓶号: 2-34
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2026/02/28 02:05:15 实验者: xiexinhui
 处理时间 (V2) : 2026/02/28 10:07:22 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.170 | 191635 | 100.000 | 43319 | 1688 | 1.271 | -- |
| 总计 | | 191635 | 100.000 | 43319 | | | |




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
 柱温 : 30°C 波长:318nm
 数据文件名: RC\$JSS-222 - 7-4/7-667-2 - zzp-6022402p-rcqx-pH3.8jz-jf50z-60min-P5.lcd
 方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20260227-FX256.lcb
 样品瓶号: 2-43
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2026/02/28 02:08:09 实验者: xiexinhui
 处理时间 (V2) : 2026/02/28 10:07:24 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.170 | 191194 | 100.000 | 43214 | 1693 | 1.275 | -- |
| 总计 | | 191194 | 100.000 | 43214 | | | |




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
 柱温 : 30°C 波长:318nm
 数据文件名: RC\$JSS-222 - 7-4/7-668-2 - zzp-6022402p-rcqx-pH3.8jz-jf50z-60min-P6.lcd
 方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20260227-FX256.lcb
 样品瓶号: 2-52
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2026/02/28 02:11:03 实验者: xiexinhui
 处理时间 (V2) : 2026/02/28 10:07:27 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.170 | 187629 | 100.000 | 42421 | 1690 | 1.276 | -- |
| 总计 | | 187629 | 100.000 | 42421 | | | |




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
 柱温 : 30°C 波长:318nm
 数据文件名: RC\$JSS-222 - 7-4/7-669-2 - zzp-6022402p-rcqx-pH3.8jz-jf50z-jxzs-P1.lcd
 方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20260227-FX256.lcb
 样品瓶号: 2-8
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2026/02/28 02:13:57 实验者: xiexinhui
 处理时间 (V2) : 2026/02/28 10:07:30 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.171 | 187936 | 100.000 | 42552 | 1693 | 1.276 | -- |
| 总计 | | 187936 | 100.000 | 42552 | | | |

〈样品信息〉

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 7-4/7-670-2 - zzp-6022402p-rcqx-pH3.8jz-jf50z-jxzs-P2.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20260227-FX256.lcb
样品瓶号: 2-17
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2026/02/28 02:16:52 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2026/02/28 10:07:33 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉

mV



〈峰表〉

检测器A Ch1 318nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.169 | 180600 | 100.000 | 40695 | 1689 | 1.279 | -- |
| 总计 | | 180600 | 100.000 | 40695 | | | |




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
 柱温 : 30°C 波长:318nm
 数据文件名: RC\$JSS-222 - 7-4/7-671-2 - zzp-6022402p-rcqx-pH3.8jz-jf50z-jxzs-P3.lcd
 方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20260227-FX256.lcb
 样品瓶号: 2-26
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2026/02/28 02:19:45 实验者: xiexinhui
 处理时间 (V2) : 2026/02/28 10:07:36 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.171 | 193040 | 100.000 | 43685 | 1690 | 1.274 | -- |
| 总计 | | 193040 | 100.000 | 43685 | | | |




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
 柱温 : 30°C 波长:318nm
 数据文件名: RC\$JSS-222 - 7-4/7-672-2 - zzp-6022402p-rcqx-pH3.8jz-jf50z-jxzs-P4.lcd
 方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20260227-FX256.lcb
 样品瓶号: 2-35
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2026/02/28 02:22:39 实验者: xiexinhui
 处理时间 (V2) : 2026/02/28 10:07:38 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.171 | 192340 | 100.000 | 43504 | 1692 | 1.274 | -- |
| 总计 | | 192340 | 100.000 | 43504 | | | |




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
 柱温 : 30°C 波长:318nm
 数据文件名: RC\$JSS-222 - 7-4/7-673-2 - zzp-6022402p-rcqx-pH3.8jz-jf50z-jxzs-P5.lcd
 方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20260227-FX256.lcb
 样品瓶号: 2-44
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2026/02/28 02:25:33 实验者: xiexinhui
 处理时间 (V2) : 2026/02/28 10:07:41 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.170 | 191568 | 100.000 | 43367 | 1688 | 1.273 | -- |
| 总计 | | 191568 | 100.000 | 43367 | | | |




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
 柱温 : 30°C 波长:318nm
 数据文件名: RC\$JSS-222 - 7-4/7-674-2 - zzp-6022402p-rcqx-pH3.8jz-jf50z-jxzs-P6.lcd
 方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20260227-FX256.lcb
 样品瓶号: 2-53
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2026/02/28 02:28:27 实验者: xiexinhui
 处理时间 (V2) : 2026/02/28 10:07:44 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.169 | 188573 | 100.000 | 42562 | 1693 | 1.274 | -- |
| 总计 | | 188573 | 100.000 | 42562 | | | |




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
 柱温 : 30°C 波长:318nm
 数据文件名: RC\$JSS-222 - 7-4/7-675-2 - zzp-6022402p-rcqx-pH3.8jz-jf50z-dz2-1.lcd
 方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20260227-FX256.lcb
 样品瓶号: 2-27
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2026/02/28 02:31:20 实验者: xiexinhui
 处理时间 (V2) : 2026/02/28 10:07:48 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.170 | 193376 | 100.000 | 41901 | 1545 | 1.269 | -- |
| 总计 | | 193376 | 100.000 | 41901 | | | |




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
 柱温 : 30°C 波长:318nm
 数据文件名: RC\$JSS-222 - 7-4/7-676-2 - zzp-6022402p-rcqx-pH3.8jz-jf50z-dz2-2.lcd
 方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20260227-FX256.lcb
 样品瓶号: 2-27
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2026/02/28 02:34:13 实验者: xiexinhui
 处理时间 (V2) : 2026/02/28 10:07:50 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.170 | 193133 | 100.000 | 41949 | 1548 | 1.266 | -- |
| 总计 | | 193133 | 100.000 | 41949 | | | |