




SMF-4060

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
 柱 温 : 30°C 波 长: 305nm
 数据文件名: RC\$SMF-4060 - 0-172/26-3106-2 - 2024041721p-zzp-1-pH6.8jz-lf100z-rj.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-rcqx-FX275.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-20260224-FX275.lcb
 样品瓶号 : 1-9
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2026/02/25 10:11:22 实验者: wangdan
 处理时间(V2) : 2026/02/26 13:18:24 处理者: wangdan
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 305nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图1 氟伐他汀钠缓释片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024041721批-pH6.8介质-篮法-100转
溶剂




SMF-4060

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
 柱 温 : 30°C 波 长: 305nm
 数据文件名: RC\$SMF-4060 - 0-172/26-3107-2 - 2024041721p-zzp-1-pH6.8jz-lf100z-dz1-1.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-rcqx-FX275.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-20260224-FX275.lcb
 样品瓶号 : 1-18
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2026/02/25 10:14:46 实验者: wangdan
 处理时间(V2) : 2026/02/26 13:18:33 处理者: wangdan
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 305nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.928	1496093	100.000	215518	1898	1.281	--
总计		1496093	100.000	215518			

图2 氟伐他汀钠缓释片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2024041721批-pH6.8介质-篮法-100转
 对照品溶液-1-1




SMF-4060

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
 柱 温 : 30°C 波 长: 305nm
 数据文件名: RC\$SMF-4060 - 0-172/26-3108-2 - 2024041721p-zzp-1-pH6.8jz-lf100z-dz1-2.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-rcqx-FX275.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-20260224-FX275.lcb
 样品瓶号 : 1-18
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2026/02/25 10:18:09 实验者: wangdan
 处理时间(V2) : 2026/02/26 13:18:40 处理者: wangdan
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 305nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.927	1494736	100.000	214760	1891	1.281	--
总计		1494736	100.000	214760			

图3 氟伐他汀钠缓释片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2024041721批-pH6.8介质-篮法-100转
 对照品溶液-1-2




SMF-4060

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
 柱 温 : 30°C 波 长: 305nm
 数据文件名: RC\$SMF-4060 - 0-172/26-3109-2 - 2024041721p-zzp-1-pH6.8jz-lf100z-dz1-3.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-rcqx-FX275.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-20260224-FX275.lcb
 样品瓶号 : 1-18
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2026/02/25 10:21:33 实验者: wangdan
 处理时间(V2) : 2026/02/26 13:18:48 处理者: wangdan
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 305nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.927	1495578	100.000	214717	1891	1.283	--
总计		1495578	100.000	214717			

图4 氟伐他汀钠缓释片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2024041721批-pH6.8介质-篮法-100转
 对照品溶液-1-3




SMF-4060

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
 柱 温 : 30°C 波 长: 305nm
 数据文件名: RC\$SMF-4060 - 0-172/26-3110-2 - 2024041721p-zzp-1-pH6.8jz-lf100z-dz1-4.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-rcqx-FX275.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-20260224-FX275.lcb
 样品瓶号 : 1-18
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2026/02/25 10:24:56 实验者: wangdan
 处理时间(V2) : 2026/02/26 13:18:56 处理者: wangdan
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 305nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.927	1495190	100.000	214671	1890	1.283	--
总计		1495190	100.000	214671			

图5 氟伐他汀钠缓释片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2024041721批-pH6.8介质-篮法-100转
 对照品溶液-1-4




SMF-4060

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
 柱 温 : 30°C 波 长: 305nm
 数据文件名: RC\$SMF-4060 - 0-172/26-3111-2 - 2024041721p-zzp-1-pH6.8jz-lf100z-dz1-5.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-rcqx-FX275.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-20260224-FX275.lcb
 样品瓶号 : 1-18
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2026/02/25 10:28:21 实验者: wangdan
 处理时间(V2) : 2026/02/26 13:19:03 处理者: wangdan
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 305nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.927	1494337	100.000	214390	1886	1.284	--
总计		1494337	100.000	214390			

图6 氟伐他汀钠缓释片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2024041721批-pH6.8介质-篮法-100转
 对照品溶液-1-5




SMF-4060

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
 柱 温 : 30°C 波 长: 305nm
 数据文件名: RC\$SMF-4060 - 0-172/26-3112-2 - 2024041721p-zzp-1-pH6.8jz-lf100z-p1-1h.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-rcqx-FX275.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-20260224-FX275.lcb
 样品瓶号 : 1-1
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2026/02/25 10:31:43 实验者: wangdan
 处理时间(V2) : 2026/02/26 13:19:11 处理者: wangdan
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 305nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.923	120038	100.000	17369	1888	1.260	--
总计		120038	100.000	17369			

图7 氟伐他汀钠缓释片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2024041721批-pH6.8介质-篮法-100转-60min-片1
 供试品溶液-1




SMF-4060

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
 柱 温 : 30°C 波 长: 305nm
 数据文件名: RC\$SMF-4060 - 0-172/26-3113-2 - 2024041721p-zzp-1-pH6.8jz-lf100z-p2-1h.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-rcqx-FX275.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-20260224-FX275.lcb
 样品瓶号 : 1-10
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2026/02/25 10:35:07 实验者: wangdan
 处理时间(V2) : 2026/02/26 13:19:19 处理者: wangdan
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 305nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.923	118098	100.000	17060	1890	1.263	--
总计		118098	100.000	17060			

图8 氟伐他汀钠缓释片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2024041721批-pH6.8介质-篮法-100转-60min-片2
 供试品溶液-1




SMF-4060

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5µm) 流 速: 2.0ml/min
 柱 温 : 30°C 波 长: 305nm
 数据文件名: RC\$SMF-4060 - 0-172/26-3114-2 - 2024041721p-zzp-1-pH6.8jz-lf100z-p3-1h.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-rcqx-FX275.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-20260224-FX275.lcb
 样品瓶号 : 1-19
 进样体积 : 20 µl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2026/02/25 10:38:29 实验者: wangdan
 处理时间(V2) : 2026/02/26 13:19:27 处理者: wangdan
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 305nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.923	113664	100.000	16462	1890	1.263	--
总计		113664	100.000	16462			

图9 氟伐他汀钠缓释片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2024041721批-pH6.8介质-篮法-100转-60min-片3
 供试品溶液-1




SMF-4060

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
 柱 温 : 30°C 波 长: 305nm
 数据文件名: RC\$SMF-4060 - 0-172/26-3115-2 - 2024041721p-zzp-1-pH6.8jz-lf100z-p4-1h.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-rcqx-FX275.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-20260224-FX275.lcb
 样品瓶号 : 1-28
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2026/02/25 10:41:52 实验者: wangdan
 处理时间(V2) : 2026/02/26 13:19:34 处理者: wangdan
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 305nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.922	108253	100.000	15671	1886	1.263	--
总计		108253	100.000	15671			

图10 氟伐他汀钠缓释片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2024041721批-pH6.8介质-篮法-100转-60min-片4
 供试品溶液-1




SMF-4060

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
 柱 温 : 30°C 波 长: 305nm
 数据文件名: RC\$SMF-4060 - 0-172/26-3116-2 - 2024041721p-zzp-1-pH6.8jz-lf100z-p5-1h.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-rcqx-FX275.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-20260224-FX275.lcb
 样品瓶号 : 1-37
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2026/02/25 10:45:16 实验者: wangdan
 处理时间(V2) : 2026/02/26 13:19:42 处理者: wangdan
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 305nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.923	107706	100.000	15556	1887	1.264	--
总计		107706	100.000	15556			

图11 氟伐他汀钠缓释片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2024041721批-pH6.8介质-篮法-100转-60min-片5
 供试品溶液-1




SMF-4060

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
 柱 温 : 30°C 波 长: 305nm
 数据文件名: RC\$SMF-4060 - 0-172/26-3117-2 - 2024041721p-zzp-1-pH6.8jz-lf100z-p6-1h.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-rcqx-FX275.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-20260224-FX275.lcb
 样品瓶号 : 1-46
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2026/02/25 10:48:38 实验者: wangdan
 处理时间(V2) : 2026/02/26 13:19:50 处理者: wangdan
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 305nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.923	102277	100.000	14764	1888	1.269	--
总计		102277	100.000	14764			

图12 氟伐他汀钠缓释片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2024041721批-pH6.8介质-篮法-100转-60min-片6
 供试品溶液-1




SMF-4060

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
 柱 温 : 30°C 波 长: 305nm
 数据文件名: RC\$SMF-4060 - 0-172/26-3118-2 - 2024041721p-zzp-1-pH6.8jz-lf100z-p1-2h.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-rcqx-FX275.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-20260224-FX275.lcb
 样品瓶号 : 1-2
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2026/02/25 10:52:02 实验者: wangdan
 处理时间(V2) : 2026/02/26 13:19:57 处理者: wangdan
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 305nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.923	233328	100.000	33633	1878	1.267	--
总计		233328	100.000	33633			

图13 氟伐他汀钠缓释片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2024041721批-pH6.8介质-篮法-100转-120min-片1
 供试品溶液-1




SMF-4060

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
 柱 温 : 30°C 波 长: 305nm
 数据文件名: RC\$SMF-4060 - 0-172/26-3119-2 - 2024041721p-zzp-1-pH6.8jz-lf100z-p2-2h.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-rcqx-FX275.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-20260224-FX275.lcb
 样品瓶号 : 1-11
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2026/02/25 10:55:24 实验者: wangdan
 处理时间(V2) : 2026/02/26 13:20:05 处理者: wangdan
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 305nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.923	232346	100.000	33455	1876	1.271	--
总计		232346	100.000	33455			

图14 氟伐他汀钠缓释片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2024041721批-pH6.8介质-篮法-100转-120min-片2
 供试品溶液-1




SMF-4060

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
 柱 温 : 30°C 波 长: 305nm
 数据文件名: RC\$SMF-4060 - 0-172/26-3120-2 - 2024041721p-zzp-1-pH6.8jz-lf100z-p3-2h.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-rcqx-FX275.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-20260224-FX275.lcb
 样品瓶号 : 1-20
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2026/02/25 10:58:48 实验者: wangdan
 处理时间(V2) : 2026/02/26 13:20:13 处理者: wangdan
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 305nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.923	216011	100.000	31118	1873	1.268	--
总计		216011	100.000	31118			

图15 氟伐他汀钠缓释片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2024041721批-pH6.8介质-篮法-100转-120min-片3
 供试品溶液-1




SMF-4060

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
 柱 温 : 30°C 波 长: 305nm
 数据文件名: RC\$SMF-4060 - 0-172/26-3121-2 - 2024041721p-zzp-1-pH6.8jz-lf100z-p4-2h.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-rcqx-FX275.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-20260224-FX275.lcb
 样品瓶号 : 1-29
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2026/02/25 11:02:11 实验者: wangdan
 处理时间(V2) : 2026/02/26 13:20:20 处理者: wangdan
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 305nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.923	209754	100.000	30194	1870	1.266	--
总计		209754	100.000	30194			

图16 氟伐他汀钠缓释片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2024041721批-pH6.8介质-篮法-100转-120min-片4
 供试品溶液-1




SMF-4060

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
 柱 温 : 30°C 波 长: 305nm
 数据文件名: RC\$SMF-4060 - 0-172/26-3122-2 - 2024041721p-zzp-1-pH6.8jz-lf100z-p5-2h.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-rcqx-FX275.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-20260224-FX275.lcb
 样品瓶号 : 1-38
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2026/02/25 11:05:33 实验者: wangdan
 处理时间(V2) : 2026/02/26 13:20:28 处理者: wangdan
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 305nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.922	226236	100.000	32559	1869	1.268	--
总计		226236	100.000	32559			

图17 氟伐他汀钠缓释片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2024041721批-pH6.8介质-篮法-100转-120min-片5
 供试品溶液-1




SMF-4060

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
 柱 温 : 30°C 波 长: 305nm
 数据文件名: RC\$SMF-4060 - 0-172/26-3123-2 - 2024041721p-zzp-1-pH6.8jz-lf100z-p6-2h.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-rcqx-FX275.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-20260224-FX275.lcb
 样品瓶号 : 1-47
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2026/02/25 11:08:55 实验者: wangdan
 处理时间(V2) : 2026/02/26 13:20:36 处理者: wangdan
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 305nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.922	196799	100.000	28328	1868	1.267	--
总计		196799	100.000	28328			

图18 氟伐他汀钠缓释片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2024041721批-pH6.8介质-篮法-100转-120min-片6
 供试品溶液-1




SMF-4060

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
 柱 温 : 30°C 波 长: 305nm
 数据文件名: RC\$SMF-4060 - 0-172/26-3124-2 - 2024041721p-zzp-1-pH6.8jz-lf100z-p1-4h.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-rcqx-FX275.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-20260224-FX275.lcb
 样品瓶号 : 1-3
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2026/02/25 11:12:18 实验者: wangdan
 处理时间(V2) : 2026/02/26 13:20:44 处理者: wangdan
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 305nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.923	437538	100.000	62702	1862	1.271	--
总计		437538	100.000	62702			

图19 氟伐他汀钠缓释片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2024041721批-pH6.8介质-篮法-100转-240min-片1
 供试品溶液-1




SMF-4060

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
 柱 温 : 30°C 波 长: 305nm
 数据文件名: RC\$SMF-4060 - 0-172/26-3125-2 - 2024041721p-zzp-1-pH6.8jz-lf100z-p2-4h.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-rcqx-FX275.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-20260224-FX275.lcb
 样品瓶号 : 1-12
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2026/02/25 11:15:41 实验者: wangdan
 处理时间(V2) : 2026/02/26 13:20:51 处理者: wangdan
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 305nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.922	433353	100.000	62229	1861	1.270	--
总计		433353	100.000	62229			

图20 氟伐他汀钠缓释片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2024041721批-pH6.8介质-篮法-100转-240min-片2
 供试品溶液-1




SMF-4060

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
 柱 温 : 30°C 波 长: 305nm
 数据文件名: RC\$SMF-4060 - 0-172/26-3126-2 - 2024041721p-zzp-1-pH6.8jz-lf100z-p3-4h.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-rcqx-FX275.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-20260224-FX275.lcb
 样品瓶号 : 1-21
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2026/02/25 11:19:05 实验者: wangdan
 处理时间(V2) : 2026/02/26 13:20:59 处理者: wangdan
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 305nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.923	410612	100.000	58934	1862	1.271	--
总计		410612	100.000	58934			

图21 氟伐他汀钠缓释片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2024041721批-pH6.8介质-篮法-100转-240min-片3
 供试品溶液-1




SMF-4060

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
 柱 温 : 30°C 波 长: 305nm
 数据文件名: RC\$SMF-4060 - 0-172/26-3127-2 - 2024041721p-zzp-1-pH6.8jz-lf100z-p4-4h.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-rcqx-FX275.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-20260224-FX275.lcb
 样品瓶号 : 1-30
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2026/02/25 11:22:27 实验者: wangdan
 处理时间(V2) : 2026/02/26 13:21:06 处理者: wangdan
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 305nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.923	397069	100.000	56957	1860	1.271	--
总计		397069	100.000	56957			

图22 氟伐他汀钠缓释片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2024041721批-pH6.8介质-篮法-100转-240min-片4
 供试品溶液-1




SMF-4060

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
 柱 温 : 30°C 波 长: 305nm
 数据文件名: RC\$SMF-4060 - 0-172/26-3128-2 - 2024041721p-zzp-1-pH6.8jz-lf100z-p5-4h.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-rcqx-FX275.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-20260224-FX275.lcb
 样品瓶号 : 1-39
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2026/02/25 11:25:50 实验者: wangdan
 处理时间(V2) : 2026/02/26 13:21:14 处理者: wangdan
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 305nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.923	462655	100.000	66311	1858	1.273	--
总计		462655	100.000	66311			

图23 氟伐他汀钠缓释片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2024041721批-pH6.8介质-篮法-100转-240min-片5
 供试品溶液-1




SMF-4060

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
 柱 温 : 30°C 波 长: 305nm
 数据文件名: RC\$SMF-4060 - 0-172/26-3129-2 - 2024041721p-zzp-1-pH6.8jz-lf100z-p6-4h.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-rcqx-FX275.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-20260224-FX275.lcb
 样品瓶号 : 1-48
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2026/02/25 11:29:12 实验者: wangdan
 处理时间(V2) : 2026/02/26 13:21:21 处理者: wangdan
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 305nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.923	371074	100.000	53190	1859	1.271	--
总计		371074	100.000	53190			

图24 氟伐他汀钠缓释片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2024041721批-pH6.8介质-篮法-100转-240min-片6
 供试品溶液-1




SMF-4060

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
 柱 温 : 30°C 波 长: 305nm
 数据文件名: RC\$SMF-4060 - 0-172/26-3130-2 - 2024041721p-zzp-1-pH6.8jz-lf100z-p1-6h.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-rcqx-FX275.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-20260224-FX275.lcb
 样品瓶号 : 1-4
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2026/02/25 11:32:35 实验者: wangdan
 处理时间(V2) : 2026/02/26 13:21:29 处理者: wangdan
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 305nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.922	626487	100.000	89594	1846	1.273	--
总计		626487	100.000	89594			

图25 氟伐他汀钠缓释片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2024041721批-pH6.8介质-篮法-100转-360min-片1
 供试品溶液-1




SMF-4060

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
 柱 温 : 30°C 波 长: 305nm
 数据文件名: RC\$SMF-4060 - 0-172/26-3131-2 - 2024041721p-zzp-1-pH6.8jz-lf100z-p2-6h.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-rcqx-FX275.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-20260224-FX275.lcb
 样品瓶号 : 1-13
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2026/02/25 11:35:59 实验者: wangdan
 处理时间(V2) : 2026/02/26 13:21:37 处理者: wangdan
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 305nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.922	640324	100.000	91498	1846	1.273	--
总计		640324	100.000	91498			

图26 氟伐他汀钠缓释片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2024041721批-pH6.8介质-篮法-100转-360min-片2
 供试品溶液-1




SMF-4060

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
 柱 温 : 30°C 波 长: 305nm
 数据文件名: RC\$SMF-4060 - 0-172/26-3132-2 - 2024041721p-zzp-1-pH6.8jz-lf100z-p3-6h.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-rcqx-FX275.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-20260224-FX275.lcb
 样品瓶号 : 1-22
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2026/02/25 11:39:23 实验者: wangdan
 处理时间(V2) : 2026/02/26 13:21:45 处理者: wangdan
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 305nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.923	636767	100.000	91017	1846	1.274	--
总计		636767	100.000	91017			

图27 氟伐他汀钠缓释片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2024041721批-pH6.8介质-篮法-100转-360min-片3
 供试品溶液-1




SMF-4060

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
 柱 温 : 30°C 波 长: 305nm
 数据文件名: RC\$SMF-4060 - 0-172/26-3133-2 - 2024041721p-zzp-1-pH6.8jz-lf100z-p4-6h.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-rcqx-FX275.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-20260224-FX275.lcb
 样品瓶号 : 1-31
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2026/02/25 11:42:45 实验者: wangdan
 处理时间(V2) : 2026/02/26 13:21:52 处理者: wangdan
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 305nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.923	592695	100.000	84674	1845	1.275	--
总计		592695	100.000	84674			

图28 氟伐他汀钠缓释片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2024041721批-pH6.8介质-篮法-100转-360min-片4
 供试品溶液-1




SMF-4060

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
 柱 温 : 30°C 波 长: 305nm
 数据文件名: RC\$SMF-4060 - 0-172/26-3134-2 - 2024041721p-zzp-1-pH6.8jz-lf100z-p5-6h.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-rcqx-FX275.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-20260224-FX275.lcb
 样品瓶号 : 1-40
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2026/02/25 11:46:08 实验者: wangdan
 处理时间(V2) : 2026/02/26 13:22:00 处理者: wangdan
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 305nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.923	692242	100.000	98848	1843	1.275	--
总计		692242	100.000	98848			

图29 氟伐他汀钠缓释片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2024041721批-pH6.8介质-篮法-100转-360min-片5
 供试品溶液-1




SMF-4060

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
 柱 温 : 30°C 波 长: 305nm
 数据文件名: RC\$SMF-4060 - 0-172/26-3135-2 - 2024041721p-zzp-1-pH6.8jz-lf100z-p6-6h.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-rcqx-FX275.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-20260224-FX275.lcb
 样品瓶号 : 1-49
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2026/02/25 11:49:30 实验者: wangdan
 处理时间(V2) : 2026/02/26 13:22:07 处理者: wangdan
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 305nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.923	556892	100.000	79557	1843	1.273	--
总计		556892	100.000	79557			

图30 氟伐他汀钠缓释片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2024041721批-pH6.8介质-篮法-100转-360min-片6
 供试品溶液-1




SMF-4060

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
 柱 温 : 30°C 波 长: 305nm
 数据文件名: RC\$SMF-4060 - 0-172/26-3136-2 - 2024041721p-zzp-1-pH6.8jz-lf100z-p1-8h.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-rcqx-FX275.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-20260224-FX275.lcb
 样品瓶号 : 1-5
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2026/02/25 11:52:53 实验者: wangdan
 处理时间(V2) : 2026/02/26 13:22:15 处理者: wangdan
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 305nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.923	814264	100.000	116138	1840	1.277	--
总计		814264	100.000	116138			

图31 氟伐他汀钠缓释片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2024041721批-pH6.8介质-篮法-100转-480min-片1
 供试品溶液-1




SMF-4060

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
 柱 温 : 30°C 波 长: 305nm
 数据文件名: RC\$SMF-4060 - 0-172/26-3137-2 - 2024041721p-zzp-1-pH6.8jz-lf100z-p2-8h.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-rcqx-FX275.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-20260224-FX275.lcb
 样品瓶号 : 1-14
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2026/02/25 11:56:16 实验者: wangdan
 处理时间(V2) : 2026/02/26 13:22:23 处理者: wangdan
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 305nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.923	828202	100.000	118136	1840	1.277	--
总计		828202	100.000	118136			

图32 氟伐他汀钠缓释片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2024041721批-pH6.8介质-篮法-100转-480min-片2
 供试品溶液-1




SMF-4060

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
 柱 温 : 30°C 波 长: 305nm
 数据文件名: RC\$SMF-4060 - 0-172/26-3138-2 - 2024041721p-zzp-1-pH6.8jz-lf100z-p3-8h.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-rcqx-FX275.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-20260224-FX275.lcb
 样品瓶号 : 1-23
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2026/02/25 11:59:40 实验者: wangdan
 处理时间(V2) : 2026/02/26 13:22:30 处理者: wangdan
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 305nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.923	844316	100.000	120367	1839	1.278	--
总计		844316	100.000	120367			

图33 氟伐他汀钠缓释片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2024041721批-pH6.8介质-篮法-100转-480min-片3
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
 柱 温 : 30°C 波 长: 305nm
 数据文件名: RC\$SMF-4060 - 0-172/26-3139-2 - 2024041721p-zzp-1-pH6.8jz-lf100z-p4-8h.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-rcqx-FX275.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-20260224-FX275.lcb
 样品瓶号 : 1-32
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2026/02/25 12:03:02 实验者: wangdan
 处理时间(V2) : 2026/02/26 13:22:38 处理者: wangdan
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 305nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.923	792406	100.000	112956	1840	1.277	--
总计		792406	100.000	112956			

图34 氟伐他汀钠缓释片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024041721批-pH6.8介质-篮法-100转-480min-片4
供试品溶液-1




SMF-4060

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
 柱 温 : 30°C 波 长: 305nm
 数据文件名: RC\$SMF-4060 - 0-172/26-3140-2 - 2024041721p-zzp-1-pH6.8jz-lf100z-p5-8h.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-rcqx-FX275.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-20260224-FX275.lcb
 样品瓶号 : 1-41
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2026/02/25 12:06:25 实验者: wangdan
 处理时间(V2) : 2026/02/26 13:22:46 处理者: wangdan
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 305nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.923	900243	100.000	128222	1835	1.278	--
总计		900243	100.000	128222			

图35 氟伐他汀钠缓释片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2024041721批-pH6.8介质-篮法-100转-480min-片5
 供试品溶液-1




SMF-4060

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
 柱 温 : 30°C 波 长: 305nm
 数据文件名: RC\$SMF-4060 - 0-172/26-3141-2 - 2024041721p-zzp-1-pH6.8jz-lf100z-p6-8h.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-rcqx-FX275.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-20260224-FX275.lcb
 样品瓶号 : 1-50
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2026/02/25 12:09:47 实验者: wangdan
 处理时间(V2) : 2026/02/26 13:22:53 处理者: wangdan
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 305nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.923	729373	100.000	103898	1835	1.277	--
总计		729373	100.000	103898			

图36 氟伐他汀钠缓释片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2024041721批-pH6.8介质-篮法-100转-480min-片6
 供试品溶液-1




SMF-4060

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
 柱 温 : 30°C 波 长: 305nm
 数据文件名: RC\$SMF-4060 - 0-172/26-3142-2 - 2024041721p-zzp-1-pH6.8jz-lf100z-p1-10h.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-rcqx-FX275.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-20260224-FX275.lcb
 样品瓶号 : 1-6
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2026/02/25 12:13:10 实验者: wangdan
 处理时间(V2) : 2026/02/26 13:23:01 处理者: wangdan
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 305nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.923	1019958	100.000	145147	1834	1.279	--
总计		1019958	100.000	145147			

图37 氟伐他汀钠缓释片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2024041721批-pH6.8介质-篮法-100转-600min-片1
 供试品溶液-1




SMF-4060

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流 速: 2.0ml/min
 柱 温 : 30°C 波 长: 305nm
 数据文件名: RC\$SMF-4060 - 0-172/26-3143-2 - 2024041721p-zzp-1-pH6.8jz-lf100z-p2-10h.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-rcqx-FX275.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-20260224-FX275.lcb
 样品瓶号 : 1-15
 进样体积 : 20 μ l 版本号: 6.115
 进样时间 : 2026/02/25 12:16:32 实验者: wangdan
 处理时间(V2) : 2026/02/26 13:23:08 处理者: wangdan
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 305nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.923	1021901	100.000	145360	1834	1.280	--
总计		1021901	100.000	145360			

图38 氟伐他汀钠缓释片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2024041721批-pH6.8介质-篮法-100转-600min-片2
 供试品溶液-1




SMF-4060

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
 柱 温 : 30°C 波 长: 305nm
 数据文件名: RC\$SMF-4060 - 0-172/26-3144-2 - 2024041721p-zzp-1-pH6.8jz-lf100z-p3-10h.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-rcqx-FX275.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-20260224-FX275.lcb
 样品瓶号 : 1-24
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2026/02/25 12:19:55 实验者: wangdan
 处理时间(V2) : 2026/02/26 13:23:16 处理者: wangdan
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 305nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.923	1028681	100.000	146338	1831	1.280	--
总计		1028681	100.000	146338			

图39 氟伐他汀钠缓释片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2024041721批-pH6.8介质-篮法-100转-600min-片3
 供试品溶液-1




SMF-4060

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
 柱 温 : 30°C 波 长: 305nm
 数据文件名: RC\$SMF-4060 - 0-172/26-3145-2 - 2024041721p-zzp-1-pH6.8jz-lf100z-p4-10h.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-rcqx-FX275.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-20260224-FX275.lcb
 样品瓶号 : 1-33
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2026/02/25 12:23:18 实验者: wangdan
 处理时间(V2) : 2026/02/26 13:23:23 处理者: wangdan
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 305nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.923	956182	100.000	136022	1831	1.279	--
总计		956182	100.000	136022			

图40 氟伐他汀钠缓释片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2024041721批-pH6.8介质-篮法-100转-600min-片4
 供试品溶液-1




SMF-4060

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
 柱 温 : 30°C 波 长: 305nm
 数据文件名: RC\$SMF-4060 - 0-172/26-3146-2 - 2024041721p-zzp-1-pH6.8jz-lf100z-p5-10h.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-rcqx-FX275.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-20260224-FX275.lcb
 样品瓶号 : 1-42
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2026/02/25 12:26:39 实验者: wangdan
 处理时间(V2) : 2026/02/26 13:23:31 处理者: wangdan
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 305nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.923	1082483	100.000	153899	1829	1.280	--
总计		1082483	100.000	153899			

图41 氟伐他汀钠缓释片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2024041721批-pH6.8介质-篮法-100转-600min-片5
 供试品溶液-1




SMF-4060

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
 柱 温 : 30°C 波 长: 305nm
 数据文件名: RC\$SMF-4060 - 0-172/26-3147-2 - 2024041721p-zzp-1-pH6.8jz-lf100z-p6-10h.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-rcqx-FX275.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-20260224-FX275.lcb
 样品瓶号 : 1-51
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2026/02/25 12:30:02 实验者: wangdan
 处理时间(V2) : 2026/02/26 13:23:38 处理者: wangdan
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 305nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.922	900624	100.000	128151	1829	1.279	--
总计		900624	100.000	128151			

图42 氟伐他汀钠缓释片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2024041721批-pH6.8介质-篮法-100转-600min-片6
 供试品溶液-1




SMF-4060

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
 柱 温 : 30°C 波 长: 305nm
 数据文件名: RC\$SMF-4060 - 0-172/26-3148-2 - 2024041721p-zzp-1-pH6.8jz-lf100z-p1-12h.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-rcqx-FX275.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-20260224-FX275.lcb
 样品瓶号 : 1-7
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2026/02/25 12:33:25 实验者: wangdan
 处理时间(V2) : 2026/02/26 13:23:46 处理者: wangdan
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 305nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.922	1182138	100.000	168080	1828	1.281	--
总计		1182138	100.000	168080			

图43 氟伐他汀钠缓释片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2024041721批-pH6.8介质-篮法-100转-720min-片1
 供试品溶液-1




SMF-4060

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
 柱 温 : 30°C 波 长: 305nm
 数据文件名: RC\$SMF-4060 - 0-172/26-3149-2 - 2024041721p-zzp-1-pH6.8jz-lf100z-p2-12h.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-rcqx-FX275.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-20260224-FX275.lcb
 样品瓶号 : 1-16
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2026/02/25 12:36:48 实验者: wangdan
 处理时间(V2) : 2026/02/26 13:23:53 处理者: wangdan
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 305nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.922	1177008	100.000	167286	1825	1.282	--
总计		1177008	100.000	167286			

图44 氟伐他汀钠缓释片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2024041721批-pH6.8介质-篮法-100转-720min-片2
 供试品溶液-1




SMF-4060

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
 柱 温 : 30°C 波 长: 305nm
 数据文件名: RC\$SMF-4060 - 0-172/26-3150-2 - 2024041721p-zzp-1-pH6.8jz-lf100z-p3-12h.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-rcqx-FX275.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-20260224-FX275.lcb
 样品瓶号 : 1-25
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2026/02/25 12:40:10 实验者: wangdan
 处理时间(V2) : 2026/02/26 13:24:01 处理者: wangdan
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 305nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.922	1186630	100.000	168600	1827	1.282	--
总计		1186630	100.000	168600			


图45 氟伐他汀钠缓释片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2024041721批-pH6.8介质-篮法-100转-720min-片3
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5µm) 流 速: 2.0ml/min
 柱 温 : 30°C 波 长: 305nm
 数据文件名: RC\$SMF-4060 - 0-172/26-3151-2 - 2024041721p-zzp-1-pH6.8jz-lf100z-p4-12h.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-rcqx-FX275.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-20260224-FX275.lcb
 样品瓶号 : 1-34
 进样体积 : 20 µl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2026/02/25 12:43:32 实验者: wangdan
 处理时间(V2) : 2026/02/26 13:24:08 处理者: wangdan
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 305nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.923	1111205	100.000	157818	1826	1.282	--
总计		1111205	100.000	157818			

图46 氟伐他汀钠缓释片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024041721批-pH6.8介质-篮法-100转-720min-片4
供试品溶液-1




SMF-4060

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
 柱 温 : 30°C 波 长: 305nm
 数据文件名: RC\$SMF-4060 - 0-172/26-3152-2 - 2024041721p-zzp-1-pH6.8jz-lf100z-p5-12h.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-rcqx-FX275.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-20260224-FX275.lcb
 样品瓶号 : 1-43
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2026/02/25 12:46:54 实验者: wangdan
 处理时间(V2) : 2026/02/26 13:24:16 处理者: wangdan
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 305nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.923	1235128	100.000	175296	1824	1.282	--
总计		1235128	100.000	175296			

图47 氟伐他汀钠缓释片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2024041721批-pH6.8介质-篮法-100转-720min-片5
 供试品溶液-1




SMF-4060

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
 柱 温 : 30°C 波 长: 305nm
 数据文件名: RC\$SMF-4060 - 0-172/26-3153-2 - 2024041721p-zzp-1-pH6.8jz-lf100z-p6-12h.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-rcqx-FX275.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-20260224-FX275.lcb
 样品瓶号 : 1-52
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2026/02/25 12:50:17 实验者: wangdan
 处理时间(V2) : 2026/02/26 13:24:24 处理者: wangdan
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 305nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.923	1052611	100.000	149415	1824	1.281	--
总计		1052611	100.000	149415			

图48 氟伐他汀钠缓释片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2024041721批-pH6.8介质-篮法-100转-720min-片6
 供试品溶液-1




SMF-4060

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
 柱 温 : 30°C 波 长: 305nm
 数据文件名: RC\$SMF-4060 - 0-172/26-3154-2 - 2024041721p-zzp-1-pH6.8jz-lf100z-p1-14h.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-rcqx-FX275.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-20260224-FX275.lcb
 样品瓶号 : 1-8
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2026/02/25 12:53:40 实验者: wangdan
 处理时间(V2) : 2026/02/26 13:24:31 处理者: wangdan
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 305nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.922	1328506	100.000	188381	1820	1.282	--
总计		1328506	100.000	188381			

图49 氟伐他汀钠缓释片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2024041721批-pH6.8介质-篮法-100转-840min-片1
 供试品溶液-1




SMF-4060

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
 柱 温 : 30°C 波 长: 305nm
 数据文件名: RC\$SMF-4060 - 0-172/26-3155-2 - 2024041721p-zzp-1-pH6.8jz-lf100z-p2-14h.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-rcqx-FX275.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-20260224-FX275.lcb
 样品瓶号 : 1-17
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2026/02/25 12:57:03 实验者: wangdan
 处理时间(V2) : 2026/02/26 13:24:39 处理者: wangdan
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 305nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.923	1317404	100.000	186886	1823	1.284	--
总计		1317404	100.000	186886			

图50 氟伐他汀钠缓释片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2024041721批-pH6.8介质-篮法-100转-840min-片2
 供试品溶液-1




SMF-4060

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
 柱 温 : 30°C 波 长: 305nm
 数据文件名: RC\$SMF-4060 - 0-172/26-3156-2 - 2024041721p-zzp-1-pH6.8jz-lf100z-p3-14h.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-rcqx-FX275.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-20260224-FX275.lcb
 样品瓶号 : 1-26
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2026/02/25 13:00:26 实验者: wangdan
 处理时间(V2) : 2026/02/26 13:24:46 处理者: wangdan
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 305nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.923	1356718	100.000	192294	1820	1.284	--
总计		1356718	100.000	192294			

图51 氟伐他汀钠缓释片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2024041721批-pH6.8介质-篮法-100转-840min-片3
 供试品溶液-1




SMF-4060

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
 柱 温 : 30°C 波 长: 305nm
 数据文件名: RC\$SMF-4060 - 0-172/26-3157-2 - 2024041721p-zzp-1-pH6.8jz-lf100z-p4-14h.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-rcqx-FX275.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-20260224-FX275.lcb
 样品瓶号 : 1-35
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2026/02/25 13:03:48 实验者: wangdan
 处理时间(V2) : 2026/02/26 13:24:54 处理者: wangdan
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 305nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.922	1261445	100.000	179039	1822	1.283	--
总计		1261445	100.000	179039			

图52 氟伐他汀钠缓释片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2024041721批-pH6.8介质-篮法-100转-840min-片4
 供试品溶液-1




SMF-4060

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
 柱 温 : 30°C 波 长: 305nm
 数据文件名: RC\$SMF-4060 - 0-172/26-3158-2 - 2024041721p-zzp-1-pH6.8jz-lf100z-p5-14h.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-rcqx-FX275.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-20260224-FX275.lcb
 样品瓶号 : 1-44
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2026/02/25 13:07:12 实验者: wangdan
 处理时间(V2) : 2026/02/26 13:25:02 处理者: wangdan
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 305nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.923	1370194	100.000	194222	1821	1.285	--
总计		1370194	100.000	194222			

图53 氟伐他汀钠缓释片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2024041721批-pH6.8介质-篮法-100转-840min-片5
 供试品溶液-1




SMF-4060

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
 柱 温 : 30°C 波 长: 305nm
 数据文件名: RC\$SMF-4060 - 0-172/26-3159-2 - 2024041721p-zzp-1-pH6.8jz-lf100z-p6-14h.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-rcqx-FX275.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-20260224-FX275.lcb
 样品瓶号 : 1-53
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2026/02/25 13:10:36 实验者: wangdan
 处理时间(V2) : 2026/02/26 13:25:09 处理者: wangdan
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 305nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.922	1194136	100.000	169435	1822	1.284	--
总计		1194136	100.000	169435			

图54 氟伐他汀钠缓释片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2024041721批-pH6.8介质-篮法-100转-840min-片6
 供试品溶液-1




SMF-4060

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
 柱 温 : 30°C 波 长: 305nm
 数据文件名: RC\$SMF-4060 - 0-172/26-3160-2 - 2024041721p-zzp-1-pH6.8jz-lf100z-p1-16h.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-rcqx-FX275.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-20260224-FX275.lcb
 样品瓶号 : 2-1
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2026/02/25 13:14:00 实验者: wangdan
 处理时间(V2) : 2026/02/26 13:25:18 处理者: wangdan
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 305nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.922	1459023	100.000	206762	1820	1.286	--
总计		1459023	100.000	206762			

图55 氟伐他汀钠缓释片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2024041721批-pH6.8介质-篮法-100转-960min-片1
 供试品溶液-1




SMF-4060

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
 柱 温 : 30°C 波 长: 305nm
 数据文件名: RC\$SMF-4060 - 0-172/26-3161-2 - 2024041721p-zzp-1-pH6.8jz-lf100z-p2-16h.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-rcqx-FX275.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-20260224-FX275.lcb
 样品瓶号 : 2-10
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2026/02/25 13:17:24 实验者: wangdan
 处理时间(V2) : 2026/02/26 13:25:26 处理者: wangdan
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 305nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.923	1477932	100.000	209581	1822	1.285	--
总计		1477932	100.000	209581			

图56 氟伐他汀钠缓释片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2024041721批-pH6.8介质-篮法-100转-960min-片2
 供试品溶液-1




SMF-4060

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
 柱 温 : 30°C 波 长: 305nm
 数据文件名: RC\$SMF-4060 - 0-172/26-3162-2 - 2024041721p-zzp-1-pH6.8jz-lf100z-p3-16h.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-rcqx-FX275.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-20260224-FX275.lcb
 样品瓶号 : 2-19
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2026/02/25 13:20:47 实验者: wangdan
 处理时间(V2) : 2026/02/26 13:25:34 处理者: wangdan
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 305nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.922	1488841	100.000	211042	1821	1.286	--
总计		1488841	100.000	211042			

图57 氟伐他汀钠缓释片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2024041721批-pH6.8介质-篮法-100转-960min-片3
 供试品溶液-1




SMF-4060

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
 柱 温 : 30°C 波 长: 305nm
 数据文件名: RC\$SMF-4060 - 0-172/26-3163-2 - 2024041721p-zzp-1-pH6.8jz-lf100z-p4-16h.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-rcqx-FX275.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-20260224-FX275.lcb
 样品瓶号 : 2-28
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2026/02/25 13:24:11 实验者: wangdan
 处理时间(V2) : 2026/02/26 13:25:42 处理者: wangdan
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 305nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.922	1470848	100.000	208346	1818	1.285	--
总计		1470848	100.000	208346			

图58 氟伐他汀钠缓释片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2024041721批-pH6.8介质-篮法-100转-960min-片4
 供试品溶液-1




SMF-4060

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
 柱 温 : 30°C 波 长: 305nm
 数据文件名: RC\$SMF-4060 - 0-172/26-3164-2 - 2024041721p-zzp-1-pH6.8jz-lf100z-p5-16h.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-rcqx-FX275.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-20260224-FX275.lcb
 样品瓶号 : 2-37
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2026/02/25 13:27:34 实验者: wangdan
 处理时间(V2) : 2026/02/26 13:25:49 处理者: wangdan
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 305nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.922	1483143	100.000	209983	1816	1.284	--
总计		1483143	100.000	209983			

图59 氟伐他汀钠缓释片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2024041721批-pH6.8介质-篮法-100转-960min-片5
 供试品溶液-1




SMF-4060

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
 柱 温 : 30°C 波 长: 305nm
 数据文件名: RC\$SMF-4060 - 0-172/26-3165-2 - 2024041721p-zzp-1-pH6.8jz-lf100z-p6-16h.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-rcqx-FX275.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-20260224-FX275.lcb
 样品瓶号 : 2-46
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2026/02/25 13:30:57 实验者: wangdan
 处理时间(V2) : 2026/02/26 13:25:57 处理者: wangdan
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 305nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.923	1396578	100.000	197612	1817	1.285	--
总计		1396578	100.000	197612			

图60 氟伐他汀钠缓释片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2024041721批-pH6.8介质-篮法-100转-960min-片6
 供试品溶液-1




SMF-4060

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
 柱 温 : 30°C 波 长: 305nm
 数据文件名: RC\$SMF-4060 - 0-172/26-3166-2 - 2024041721p-zzp-1-pH6.8jz-lf100z-p1-18h.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-rcqx-FX275.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-20260224-FX275.lcb
 样品瓶号 : 2-2
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2026/02/25 13:34:22 实验者: wangdan
 处理时间(V2) : 2026/02/26 13:26:05 处理者: wangdan
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 305nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.922	1485061	100.000	209853	1808	1.285	--
总计		1485061	100.000	209853			

图61 氟伐他汀钠缓释片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2024041721批-pH6.8介质-篮法-100转-1080min-片1
 供试品溶液-1




SMF-4060

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
 柱 温 : 30°C 波 长: 305nm
 数据文件名: RC\$SMF-4060 - 0-172/26-3167-2 - 2024041721p-zzp-1-pH6.8jz-lf100z-p2-18h.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-rcqx-FX275.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-20260224-FX275.lcb
 样品瓶号 : 2-11
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2026/02/25 13:37:45 实验者: wangdan
 处理时间(V2) : 2026/02/26 13:26:13 处理者: wangdan
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 305nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.922	1484607	100.000	210020	1812	1.285	--
总计		1484607	100.000	210020			

图62 氟伐他汀钠缓释片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2024041721批-pH6.8介质-篮法-100转-1080min-片2
 供试品溶液-1




SMF-4060

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
 柱 温 : 30°C 波 长: 305nm
 数据文件名: RC\$SMF-4060 - 0-172/26-3168-2 - 2024041721p-zzp-1-pH6.8jz-lf100z-p3-18h.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-rcqx-FX275.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-20260224-FX275.lcb
 样品瓶号 : 2-20
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2026/02/25 13:41:09 实验者: wangdan
 处理时间(V2) : 2026/02/26 13:26:20 处理者: wangdan
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 305nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.923	1500463	100.000	212161	1814	1.284	--
总计		1500463	100.000	212161			

图63 氟伐他汀钠缓释片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2024041721批-pH6.8介质-篮法-100转-1080min-片3
 供试品溶液-1




SMF-4060

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
 柱 温 : 30°C 波 长: 305nm
 数据文件名: RC\$SMF-4060 - 0-172/26-3169-2 - 2024041721p-zzp-1-pH6.8jz-lf100z-p4-18h.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-rcqx-FX275.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-20260224-FX275.lcb
 样品瓶号 : 2-29
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2026/02/25 13:44:32 实验者: wangdan
 处理时间(V2) : 2026/02/26 13:26:28 处理者: wangdan
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 305nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.923	1483554	100.000	209588	1811	1.285	--
总计		1483554	100.000	209588			

图64 氟伐他汀钠缓释片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2024041721批-pH6.8介质-篮法-100转-1080min-片4
 供试品溶液-1




SMF-4060

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
 柱 温 : 30°C 波 长: 305nm
 数据文件名: RC\$SMF-4060 - 0-172/26-3170-2 - 2024041721p-zzp-1-pH6.8jz-lf100z-p5-18h.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-rcqx-FX275.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-20260224-FX275.lcb
 样品瓶号 : 2-38
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2026/02/25 13:47:55 实验者: wangdan
 处理时间(V2) : 2026/02/26 13:26:36 处理者: wangdan
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 305nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.923	1485760	100.000	209856	1808	1.285	--
总计		1485760	100.000	209856			

图65 氟伐他汀钠缓释片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2024041721批-pH6.8介质-篮法-100转-1080min-片5
 供试品溶液-1




SMF-4060

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
 柱 温 : 30°C 波 长: 305nm
 数据文件名: RC\$SMF-4060 - 0-172/26-3171-2 - 2024041721p-zzp-1-pH6.8jz-lf100z-p6-18h.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-rcqx-FX275.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-20260224-FX275.lcb
 样品瓶号 : 2-47
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2026/02/25 13:51:19 实验者: wangdan
 处理时间(V2) : 2026/02/26 13:26:44 处理者: wangdan
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 305nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.922	1516463	100.000	214306	1811	1.285	--
总计		1516463	100.000	214306			


图66 氟伐他汀钠缓释片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2024041721批-pH6.8介质-篮法-100转-1080min-片6
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5µm) 流 速: 2.0ml/min
 柱 温 : 30°C 波 长: 305nm
 数据文件名: RC\$SMF-4060 - 0-172/26-3172-2 - 2024041721p-zzp-1-pH6.8jz-lf100z-p1-20h.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-rcqx-FX275.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-20260224-FX275.lcb
 样品瓶号 : 2-3
 进样体积 : 20 µl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2026/02/25 13:54:43 实验者: wangdan
 处理时间(V2) : 2026/02/26 13:26:51 处理者: wangdan
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 305nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.923	1478983	100.000	208786	1811	1.285	--
总计		1478983	100.000	208786			

图67 氟伐他汀钠缓释片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2024041721批-pH6.8介质-篮法-100转-1200min-片1
 供试品溶液-1




SMF-4060

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
 柱 温 : 30°C 波 长: 305nm
 数据文件名: RC\$SMF-4060 - 0-172/26-3173-2 - 2024041721p-zzp-1-pH6.8jz-lf100z-p2-20h.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-rcqx-FX275.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-20260224-FX275.lcb
 样品瓶号 : 2-12
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2026/02/25 13:58:07 实验者: wangdan
 处理时间(V2) : 2026/02/26 13:26:59 处理者: wangdan
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 305nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.922	1473975	100.000	208179	1809	1.285	--
总计		1473975	100.000	208179			


图68 氟伐他汀钠缓释片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2024041721批-pH6.8介质-篮法-100转-1200min-片2
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
 柱 温 : 30°C 波 长: 305nm
 数据文件名: RC\$SMF-4060 - 0-172/26-3174-2 - 2024041721p-zzp-1-pH6.8jz-lf100z-p3-20h.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-rcqx-FX275.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-20260224-FX275.lcb
 样品瓶号 : 2-21
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2026/02/25 14:01:30 实验者: wangdan
 处理时间(V2) : 2026/02/26 13:27:06 处理者: wangdan
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 305nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.923	1491266	100.000	210491	1810	1.285	--
总计		1491266	100.000	210491			

图69 氟伐他汀钠缓释片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2024041721批-pH6.8介质-篮法-100转-1200min-片3
 供试品溶液-1




SMF-4060

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
 柱 温 : 30°C 波 长: 305nm
 数据文件名: RC\$SMF-4060 - 0-172/26-3175-2 - 2024041721p-zzp-1-pH6.8jz-lf100z-p4-20h.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-rcqx-FX275.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-20260224-FX275.lcb
 样品瓶号 : 2-30
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2026/02/25 14:04:53 实验者: wangdan
 处理时间(V2) : 2026/02/26 13:27:14 处理者: wangdan
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 305nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.923	1475048	100.000	208170	1809	1.284	--
总计		1475048	100.000	208170			

图70 氟伐他汀钠缓释片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2024041721批-pH6.8介质-篮法-100转-1200min-片4
 供试品溶液-1




SMF-4060

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
 柱 温 : 30°C 波 长: 305nm
 数据文件名: RC\$SMF-4060 - 0-172/26-3176-2 - 2024041721p-zzp-1-pH6.8jz-lf100z-p5-20h.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-rcqx-FX275.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-20260224-FX275.lcb
 样品瓶号 : 2-39
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2026/02/25 14:08:18 实验者: wangdan
 处理时间(V2) : 2026/02/26 13:27:22 处理者: wangdan
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 305nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.924	1482314	100.000	208865	1806	1.284	--
总计		1482314	100.000	208865			

图71 氟伐他汀钠缓释片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2024041721批-pH6.8介质-篮法-100转-1200min-片5
 供试品溶液-1




SMF-4060

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
 柱 温 : 30°C 波 长: 305nm
 数据文件名: RC\$SMF-4060 - 0-172/26-3177-2 - 2024041721p-zzp-1-pH6.8jz-lf100z-p6-20h.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-rcqx-FX275.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-20260224-FX275.lcb
 样品瓶号 : 2-48
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2026/02/25 14:11:41 实验者: wangdan
 处理时间(V2) : 2026/02/26 13:27:29 处理者: wangdan
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 305nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.923	1516077	100.000	213694	1804	1.284	--
总计		1516077	100.000	213694			

图72 氟伐他汀钠缓释片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2024041721批-pH6.8介质-篮法-100转-1200min-片6
 供试品溶液-1




SMF-4060

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
 柱 温 : 30°C 波 长: 305nm
 数据文件名: RC\$SMF-4060 - 0-172/26-3178-2 - 2024041721p-zzp-1-pH6.8jz-lf100z-p1-22h.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-rcqx-FX275.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-20260224-FX275.lcb
 样品瓶号 : 2-4
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2026/02/25 14:15:06 实验者: wangdan
 处理时间(V2) : 2026/02/26 13:27:37 处理者: wangdan
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 305nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.924	1471067	100.000	207294	1806	1.284	--
总计		1471067	100.000	207294			

图73 氟伐他汀钠缓释片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2024041721批-pH6.8介质-篮法-100转-1320min-片1
 供试品溶液-1




SMF-4060

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
 柱 温 : 30°C 波 长: 305nm
 数据文件名: RC\$SMF-4060 - 0-172/26-3179-2 - 2024041721p-zzp-1-pH6.8jz-lf100z-p2-22h.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-rcqx-FX275.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-20260224-FX275.lcb
 样品瓶号 : 2-13
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2026/02/25 14:18:30 实验者: wangdan
 处理时间(V2) : 2026/02/26 13:27:44 处理者: wangdan
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 305nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.924	1470948	100.000	207313	1809	1.285	--
总计		1470948	100.000	207313			

图74 氟伐他汀钠缓释片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2024041721批-pH6.8介质-篮法-100转-1320min-片2
 供试品溶液-1




SMF-4060

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
 柱 温 : 30°C 波 长: 305nm
 数据文件名: RC\$SMF-4060 - 0-172/26-3180-2 - 2024041721p-zzp-1-pH6.8jz-lf100z-p3-22h.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-rcqx-FX275.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-20260224-FX275.lcb
 样品瓶号 : 2-22
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2026/02/25 14:21:54 实验者: wangdan
 处理时间(V2) : 2026/02/26 13:27:52 处理者: wangdan
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 305nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.924	1485932	100.000	209284	1808	1.285	--
总计		1485932	100.000	209284			

图75 氟伐他汀钠缓释片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2024041721批-pH6.8介质-篮法-100转-1320min-片3
 供试品溶液-1




SMF-4060

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
 柱 温 : 30°C 波 长: 305nm
 数据文件名: RC\$SMF-4060 - 0-172/26-3181-2 - 2024041721p-zzp-1-pH6.8jz-lf100z-p4-22h.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-rcqx-FX275.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-20260224-FX275.lcb
 样品瓶号 : 2-31
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2026/02/25 14:25:19 实验者: wangdan
 处理时间(V2) : 2026/02/26 13:27:59 处理者: wangdan
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 305nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.924	1471624	100.000	207272	1810	1.286	--
总计		1471624	100.000	207272			

图76 氟伐他汀钠缓释片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2024041721批-pH6.8介质-篮法-100转-1320min-片4
 供试品溶液-1




SMF-4060

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
 柱 温 : 30°C 波 长: 305nm
 数据文件名: RC\$SMF-4060 - 0-172/26-3182-2 - 2024041721p-zzp-1-pH6.8jz-lf100z-p5-22h.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-rcqx-FX275.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-20260224-FX275.lcb
 样品瓶号 : 2-40
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2026/02/25 14:28:42 实验者: wangdan
 处理时间(V2) : 2026/02/26 13:28:07 处理者: wangdan
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 305nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.924	1473863	100.000	207590	1810	1.286	--
总计		1473863	100.000	207590			

图77 氟伐他汀钠缓释片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2024041721批-pH6.8介质-篮法-100转-1320min-片5
 供试品溶液-1




SMF-4060

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
 柱 温 : 30°C 波 长: 305nm
 数据文件名: RC\$SMF-4060 - 0-172/26-3183-2 - 2024041721p-zzp-1-pH6.8jz-lf100z-p6-22h.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-rcqx-FX275.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-20260224-FX275.lcb
 样品瓶号 : 2-49
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2026/02/25 14:32:07 实验者: wangdan
 处理时间(V2) : 2026/02/26 13:28:14 处理者: wangdan
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 305nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.924	1508854	100.000	212504	1809	1.287	--
总计		1508854	100.000	212504			

图78 氟伐他汀钠缓释片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2024041721批-pH6.8介质-篮法-100转-1320min-片6
 供试品溶液-1




SMF-4060

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
 柱 温 : 30°C 波 长: 305nm
 数据文件名: RC\$SMF-4060 - 0-172/26-3184-2 - 2024041721p-zzp-1-pH6.8jz-lf100z-p1-24h.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-rcqx-FX275.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-20260224-FX275.lcb
 样品瓶号 : 2-5
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2026/02/25 14:35:31 实验者: wangdan
 处理时间(V2) : 2026/02/26 13:28:22 处理者: wangdan
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 305nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.924	1464996	100.000	206289	1810	1.287	--
总计		1464996	100.000	206289			

图79 氟伐他汀钠缓释片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2024041721批-pH6.8介质-篮法-100转-1440min-片1
 供试品溶液-1




SMF-4060

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5µm) 流 速: 2.0ml/min
 柱 温 : 30°C 波 长: 305nm
 数据文件名: RC\$SMF-4060 - 0-172/26-3185-2 - 2024041721p-zzp-1-pH6.8jz-lf100z-p2-24h.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-rcqx-FX275.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-20260224-FX275.lcb
 样品瓶号 : 2-14
 进样体积 : 20 µl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2026/02/25 14:38:56 实验者: wangdan
 处理时间(V2) : 2026/02/26 13:28:30 处理者: wangdan
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 305nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.924	1466601	100.000	206515	1809	1.286	--
总计		1466601	100.000	206515			

图80 氟伐他汀钠缓释片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2024041721批-pH6.8介质-篮法-100转-1440min-片2
 供试品溶液-1




SMF-4060

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
 柱 温 : 30°C 波 长: 305nm
 数据文件名: RC\$SMF-4060 - 0-172/26-3186-2 - 2024041721p-zzp-1-pH6.8jz-lf100z-p3-24h.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-rcqx-FX275.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-20260224-FX275.lcb
 样品瓶号 : 2-23
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2026/02/25 14:42:20 实验者: wangdan
 处理时间(V2) : 2026/02/26 13:28:37 处理者: wangdan
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 305nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.924	1484892	100.000	208946	1806	1.286	--
总计		1484892	100.000	208946			

图81 氟伐他汀钠缓释片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2024041721批-pH6.8介质-篮法-100转-1440min-片3
 供试品溶液-1




SMF-4060

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
 柱 温 : 30°C 波 长: 305nm
 数据文件名: RC\$SMF-4060 - 0-172/26-3187-2 - 2024041721p-zzp-1-pH6.8jz-lf100z-p4-24h.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-rcqx-FX275.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-20260224-FX275.lcb
 样品瓶号 : 2-32
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2026/02/25 14:45:43 实验者: wangdan
 处理时间(V2) : 2026/02/26 13:28:45 处理者: wangdan
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 305nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.924	1463834	100.000	205840	1805	1.286	--
总计		1463834	100.000	205840			

图82 氟伐他汀钠缓释片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2024041721批-pH6.8介质-篮法-100转-1440min-片4
 供试品溶液-1




SMF-4060

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
 柱 温 : 30°C 波 长: 305nm
 数据文件名: RC\$SMF-4060 - 0-172/26-3188-2 - 2024041721p-zzp-1-pH6.8jz-lf100z-p5-24h.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-rcqx-FX275.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-20260224-FX275.lcb
 样品瓶号 : 2-41
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2026/02/25 14:49:08 实验者: wangdan
 处理时间(V2) : 2026/02/26 13:28:52 处理者: wangdan
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 305nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.924	1469929	100.000	206819	1806	1.286	--
总计		1469929	100.000	206819			

图83 氟伐他汀钠缓释片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2024041721批-pH6.8介质-篮法-100转-1440min-片5
 供试品溶液-1




SMF-4060

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
 柱 温 : 30°C 波 长: 305nm
 数据文件名: RC\$SMF-4060 - 0-172/26-3189-2 - 2024041721p-zzp-1-pH6.8jz-lf100z-p6-24h.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-rcqx-FX275.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-20260224-FX275.lcb
 样品瓶号 : 2-50
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2026/02/25 14:52:32 实验者: wangdan
 处理时间(V2) : 2026/02/26 13:29:00 处理者: wangdan
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 305nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.924	1503945	100.000	211518	1805	1.286	--
总计		1503945	100.000	211518			

图84 氟伐他汀钠缓释片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2024041721批-pH6.8介质-篮法-100转-1440min-片6
 供试品溶液-1




SMF-4060

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
 柱 温 : 30°C 波 长: 305nm
 数据文件名: RC\$SMF-4060 - 0-172/26-3190-2 - 2024041721p-zzp-1-pH6.8jz-lf100z-p1-jx.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-rcqx-FX275.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-20260224-FX275.lcb
 样品瓶号 : 2-6
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2026/02/25 14:55:56 实验者: wangdan
 处理时间(V2) : 2026/02/26 13:29:07 处理者: wangdan
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 305nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.925	1466401	100.000	206046	1804	1.285	--
总计		1466401	100.000	206046			

图85 氟伐他汀钠缓释片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2024041721批-pH6.8介质-篮法-100转-极限转速-片1
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
 柱 温 : 30°C 波 长: 305nm
 数据文件名: RC\$SMF-4060 - 0-172/26-3191-2 - 2024041721p-zzp-1-pH6.8jz-lf100z-p2-jx.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-rcqx-FX275.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-20260224-FX275.lcb
 样品瓶号 : 2-15
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2026/02/25 14:59:21 实验者: wangdan
 处理时间(V2) : 2026/02/26 13:29:15 处理者: wangdan
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 305nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.924	1466298	100.000	206144	1802	1.286	--
总计		1466298	100.000	206144			

图86 氟伐他汀钠缓释片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2024041721批-pH6.8介质-篮法-100转-极限转速-片2
 供试品溶液-1




SMF-4060

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
 柱 温 : 30°C 波 长: 305nm
 数据文件名: RC\$SMF-4060 - 0-172/26-3192-2 - 2024041721p-zzp-1-pH6.8jz-lf100z-p3-jx.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-rcqx-FX275.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-20260224-FX275.lcb
 样品瓶号 : 2-24
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2026/02/25 15:02:45 实验者: wangdan
 处理时间(V2) : 2026/02/26 13:29:23 处理者: wangdan
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 305nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.924	1478847	100.000	207944	1803	1.286	--
总计		1478847	100.000	207944			

图87 氟伐他汀钠缓释片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2024041721批-pH6.8介质-篮法-100转-极限转速-片3
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
 柱 温 : 30°C 波 长: 305nm
 数据文件名: RC\$SMF-4060 - 0-172/26-3193-2 - 2024041721p-zzp-1-pH6.8jz-lf100z-p4-jx.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-rcqx-FX275.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-20260224-FX275.lcb
 样品瓶号 : 2-33
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2026/02/25 15:06:10 实验者: wangdan
 处理时间(V2) : 2026/02/26 13:29:30 处理者: wangdan
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 305nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.924	1460343	100.000	205307	1802	1.286	--
总计		1460343	100.000	205307			

图88 氟伐他汀钠缓释片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2024041721批-pH6.8介质-篮法-100转-极限转速-片4
 供试品溶液-1




SMF-4060

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
 柱 温 : 30°C 波 长: 305nm
 数据文件名: RC\$SMF-4060 - 0-172/26-3194-2 - 2024041721p-zzp-1-pH6.8jz-lf100z-p5-jx.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-rcqx-FX275.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-20260224-FX275.lcb
 样品瓶号 : 2-42
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2026/02/25 15:09:34 实验者: wangdan
 处理时间(V2) : 2026/02/26 13:29:38 处理者: wangdan
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 305nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.925	1463496	100.000	205636	1802	1.286	--
总计		1463496	100.000	205636			


图89 氟伐他汀钠缓释片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2024041721批-pH6.8介质-篮法-100转-极限转速-片5
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5µm) 流 速: 2.0ml/min
 柱 温 : 30°C 波 长: 305nm
 数据文件名: RC\$SMF-4060 - 0-172/26-3195-2 - 2024041721p-zzp-1-pH6.8jz-lf100z-p6-jx.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-rcqx-FX275.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-20260224-FX275.lcb
 样品瓶号 : 2-51
 进样体积 : 20 µl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2026/02/25 15:12:58 实验者: wangdan
 处理时间(V2) : 2026/02/26 13:29:45 处理者: wangdan
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 305nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.925	1502874	100.000	211007	1802	1.286	--
总计		1502874	100.000	211007			

图90 氟伐他汀钠缓释片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2024041721批-pH6.8介质-篮法-100转-极限转速-片6
 供试品溶液-1




SMF-4060

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
 柱 温 : 30°C 波 长: 305nm
 数据文件名: RC\$SMF-4060 - 0-172/26-3196-2 - 2024041721p-zzp-1-pH6.8jz-lf100z-dz2-1.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-rcqx-FX275.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-20260224-FX275.lcb
 样品瓶号 : 1-27
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2026/02/25 15:16:22 实验者: wangdan
 处理时间(V2) : 2026/02/26 13:29:53 处理者: wangdan
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 305nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.929	1494454	100.000	210378	1816	1.295	--
总计		1494454	100.000	210378			

图91 氟伐他汀钠缓释片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2024041721批-pH6.8介质-篮法-100转
 对照品溶液-2-1




SMF-4060

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
 柱 温 : 30°C 波 长: 305nm
 数据文件名: RC\$SMF-4060 - 0-172/26-3197-2 - 2024041721p-zzp-1-pH6.8jz-lf100z-dz2-2.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-rcqx-FX275.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-20260224-FX275.lcb
 样品瓶号 : 1-27
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2026/02/25 15:19:45 实验者: wangdan
 处理时间(V2) : 2026/02/26 13:30:01 处理者: wangdan
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 305nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.929	1493499	100.000	210391	1818	1.293	--
总计		1493499	100.000	210391			

图92 氟伐他汀钠缓释片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2024041721批-pH6.8介质-篮法-100转
 对照品溶液-2-2




SMF-4060

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
 柱 温 : 30°C 波 长: 305nm
 数据文件名: RC\$SMF-4060 - 0-172/26-3198-2 - 2024041721p-zzp-2-pH6.8jz-lf100z-rj.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-rcqx-FX275.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-20260224-FX275.lcb
 样品瓶号 : 3-9
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2026/02/25 15:23:07 实验者: wangdan
 处理时间(V2) : 2026/02/26 13:30:08 处理者: wangdan
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 305nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图93 氟伐他汀钠缓释片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2024041721批-pH6.8介质-篮法-100转
 溶剂




SMF-4060

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
 柱 温 : 30°C 波 长: 305nm
 数据文件名: RC\$SMF-4060 - 0-172/26-3199-2 - 2024041721p-zzp-2-pH6.8jz-lf100z-dz1-1.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-rcqx-FX275.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-20260224-FX275.lcb
 样品瓶号 : 3-18
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2026/02/25 15:26:30 实验者: wangdan
 处理时间(V2) : 2026/02/26 13:30:16 处理者: wangdan
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 305nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.928	1496487	100.000	210875	1818	1.294	--
总计		1496487	100.000	210875			

图94 氟伐他汀钠缓释片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2024041721批-pH6.8介质-篮法-100转
 对照品溶液-1-1




SMF-4060

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
 柱 温 : 30°C 波 长: 305nm
 数据文件名: RC\$SMF-4060 - 0-172/26-3200-2 - 2024041721p-zzp-2-pH6.8jz-lf100z-dz1-2.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-rcqx-FX275.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-20260224-FX275.lcb
 样品瓶号 : 3-18
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2026/02/25 15:29:53 实验者: wangdan
 处理时间(V2) : 2026/02/26 13:30:24 处理者: wangdan
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 305nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.929	1499515	100.000	211054	1819	1.293	--
总计		1499515	100.000	211054			

图95 氟伐他汀钠缓释片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2024041721批-pH6.8介质-篮法-100转
 对照品溶液-1-2




SMF-4060

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
 柱 温 : 30°C 波 长: 305nm
 数据文件名: RC\$SMF-4060 - 0-172/26-3201-2 - 2024041721p-zzp-2-pH6.8jz-lf100z-dz1-3.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-rcqx-FX275.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-20260224-FX275.lcb
 样品瓶号 : 3-18
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2026/02/25 15:33:16 实验者: wangdan
 处理时间(V2) : 2026/02/26 13:30:31 处理者: wangdan
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 305nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.929	1497319	100.000	210955	1818	1.292	--
总计		1497319	100.000	210955			

图96 氟伐他汀钠缓释片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2024041721批-pH6.8介质-篮法-100转
 对照品溶液-1-3




SMF-4060

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
 柱 温 : 30°C 波 长: 305nm
 数据文件名: RC\$SMF-4060 - 0-172/26-3202-2 - 2024041721p-zzp-2-pH6.8jz-lf100z-dz1-4.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-rcqx-FX275.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-20260224-FX275.lcb
 样品瓶号 : 3-18
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2026/02/25 15:36:38 实验者: wangdan
 处理时间(V2) : 2026/02/26 13:30:39 处理者: wangdan
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 305nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.929	1495960	100.000	210906	1822	1.292	--
总计		1495960	100.000	210906			

图97 氟伐他汀钠缓释片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2024041721批-pH6.8介质-篮法-100转
 对照品溶液-1-4




SMF-4060

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
 柱 温 : 30°C 波 长: 305nm
 数据文件名: RC\$SMF-4060 - 0-172/26-3203-2 - 2024041721p-zzp-2-pH6.8jz-lf100z-dz1-5.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-rcqx-FX275.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-20260224-FX275.lcb
 样品瓶号 : 3-18
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2026/02/25 15:40:02 实验者: wangdan
 处理时间(V2) : 2026/02/26 13:30:47 处理者: wangdan
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 305nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.929	1496160	100.000	210883	1819	1.292	--
总计		1496160	100.000	210883			

图98 氟伐他汀钠缓释片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2024041721批-pH6.8介质-篮法-100转
 对照品溶液-1-5




SMF-4060

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5µm) 流 速: 2.0ml/min
 柱 温 : 30°C 波 长: 305nm
 数据文件名: RC\$SMF-4060 - 0-172/26-3204-2 - 2024041721p-zzp-2-pH6.8jz-lf100z-p1-1h.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-rcqx-FX275.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-20260224-FX275.lcb
 样品瓶号 : 3-1
 进样体积 : 20 µl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2026/02/25 15:43:24 实验者: wangdan
 处理时间(V2) : 2026/02/26 13:30:55 处理者: wangdan
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 305nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.926	110786	100.000	15656	1820	1.272	--
总计		110786	100.000	15656			

图99 氟伐他汀钠缓释片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2024041721批-pH6.8介质-篮法-100转-60min-片1
 供试品溶液-1




SMF-4060

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
 柱 温 : 30°C 波 长: 305nm
 数据文件名: RC\$SMF-4060 - 0-172/26-3205-2 - 2024041721p-zzp-2-pH6.8jz-lf100z-p2-1h.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-rcqx-FX275.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-20260224-FX275.lcb
 样品瓶号 : 3-10
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2026/02/25 15:46:47 实验者: wangdan
 处理时间(V2) : 2026/02/26 13:31:02 处理者: wangdan
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 305nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.925	108364	100.000	15299	1813	1.271	--
总计		108364	100.000	15299			

图100 氟伐他汀钠缓释片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2024041721批-pH6.8介质-篮法-100转-60min-片2
 供试品溶液-1




SMF-4060

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
 柱 温 : 30°C 波 长: 305nm
 数据文件名: RC\$SMF-4060 - 0-172/26-3206-2 - 2024041721p-zzp-2-pH6.8jz-lf100z-p3-1h.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-rcqx-FX275.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-20260224-FX275.lcb
 样品瓶号 : 3-19
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2026/02/25 15:50:09 实验者: wangdan
 处理时间(V2) : 2026/02/26 13:31:10 处理者: wangdan
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 305nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.925	109970	100.000	15526	1814	1.271	--
总计		109970	100.000	15526			

图101 氟伐他汀钠缓释片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2024041721批-pH6.8介质-篮法-100转-60min-片3
 供试品溶液-1




SMF-4060

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
 柱 温 : 30°C 波 长: 305nm
 数据文件名: RC\$SMF-4060 - 0-172/26-3207-2 - 2024041721p-zzp-2-pH6.8jz-lf100z-p4-1h.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-rcqx-FX275.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-20260224-FX275.lcb
 样品瓶号 : 3-28
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2026/02/25 15:53:32 实验者: wangdan
 处理时间(V2) : 2026/02/26 13:31:17 处理者: wangdan
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 305nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.925	104585	100.000	14761	1813	1.278	--
总计		104585	100.000	14761			

图102 氟伐他汀钠缓释片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2024041721批-pH6.8介质-篮法-100转-60min-片4
 供试品溶液-1




SMF-4060

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
 柱 温 : 30°C 波 长: 305nm
 数据文件名: RC\$SMF-4060 - 0-172/26-3208-2 - 2024041721p-zzp-2-pH6.8jz-lf100z-p5-1h.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-rcqx-FX275.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-20260224-FX275.lcb
 样品瓶号 : 3-37
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2026/02/25 15:56:55 实验者: wangdan
 处理时间(V2) : 2026/02/26 13:31:25 处理者: wangdan
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 305nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.925	121194	100.000	17130	1817	1.267	--
总计		121194	100.000	17130			

图103 氟伐他汀钠缓释片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2024041721批-pH6.8介质-篮法-100转-60min-片5
 供试品溶液-1




SMF-4060

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
 柱 温 : 30°C 波 长: 305nm
 数据文件名: RC\$SMF-4060 - 0-172/26-3209-2 - 2024041721p-zzp-2-pH6.8jz-lf100z-p6-1h.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-rcqx-FX275.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-20260224-FX275.lcb
 样品瓶号 : 3-46
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2026/02/25 16:00:17 实验者: wangdan
 处理时间(V2) : 2026/02/26 13:31:32 处理者: wangdan
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 305nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.925	99538	100.000	14018	1812	1.272	--
总计		99538	100.000	14018			

图104 氟伐他汀钠缓释片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2024041721批-pH6.8介质-篮法-100转-60min-片6
 供试品溶液-1




SMF-4060

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
 柱 温 : 30°C 波 长: 305nm
 数据文件名: RC\$SMF-4060 - 0-172/26-3210-2 - 2024041721p-zzp-2-pH6.8jz-lf100z-p1-2h.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-rcqx-FX275.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-20260224-FX275.lcb
 样品瓶号 : 3-2
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2026/02/25 16:03:40 实验者: wangdan
 处理时间(V2) : 2026/02/26 13:31:40 处理者: wangdan
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 305nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.924	216031	100.000	30517	1809	1.273	--
总计		216031	100.000	30517			

图105 氟伐他汀钠缓释片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2024041721批-pH6.8介质-篮法-100转-120min-片1
 供试品溶液-1




SMF-4060

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
 柱 温 : 30°C 波 长: 305nm
 数据文件名: RC\$SMF-4060 - 0-172/26-3211-2 - 2024041721p-zzp-2-pH6.8jz-lf100z-p2-2h.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-rcqx-FX275.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-20260224-FX275.lcb
 样品瓶号 : 3-11
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2026/02/25 16:07:02 实验者: wangdan
 处理时间(V2) : 2026/02/26 13:31:47 处理者: wangdan
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 305nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.925	203318	100.000	28665	1809	1.275	--
总计		203318	100.000	28665			

图106 氟伐他汀钠缓释片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2024041721批-pH6.8介质-篮法-100转-120min-片2
 供试品溶液-1




SMF-4060

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
 柱 温 : 30°C 波 长: 305nm
 数据文件名: RC\$SMF-4060 - 0-172/26-3212-2 - 2024041721p-zzp-2-pH6.8jz-lf100z-p3-2h.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-rcqx-FX275.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-20260224-FX275.lcb
 样品瓶号 : 3-20
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2026/02/25 16:10:24 实验者: wangdan
 处理时间(V2) : 2026/02/26 13:31:55 处理者: wangdan
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 305nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.924	225974	100.000	31824	1804	1.275	--
总计		225974	100.000	31824			

图107 氟伐他汀钠缓释片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2024041721批-pH6.8介质-篮法-100转-120min-片3
 供试品溶液-1




SMF-4060

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
 柱 温 : 30°C 波 长: 305nm
 数据文件名: RC\$SMF-4060 - 0-172/26-3213-2 - 2024041721p-zzp-2-pH6.8jz-lf100z-p4-2h.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-rcqx-FX275.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-20260224-FX275.lcb
 样品瓶号 : 3-29
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2026/02/25 16:13:47 实验者: wangdan
 处理时间(V2) : 2026/02/26 13:32:03 处理者: wangdan
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 305nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.924	207683	100.000	29320	1803	1.276	--
总计		207683	100.000	29320			

图108 氟伐他汀钠缓释片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2024041721批-pH6.8介质-篮法-100转-120min-片4
 供试品溶液-1




SMF-4060

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
 柱 温 : 30°C 波 长: 305nm
 数据文件名: RC\$SMF-4060 - 0-172/26-3214-2 - 2024041721p-zzp-2-pH6.8jz-lf100z-p5-2h.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-rcqx-FX275.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-20260224-FX275.lcb
 样品瓶号 : 3-38
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2026/02/25 16:17:09 实验者: wangdan
 处理时间(V2) : 2026/02/26 13:32:10 处理者: wangdan
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 305nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.924	241405	100.000	34044	1805	1.272	--
总计		241405	100.000	34044			

图109 氟伐他汀钠缓释片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2024041721批-pH6.8介质-篮法-100转-120min-片5
 供试品溶液-1




SMF-4060

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
 柱 温 : 30°C 波 长: 305nm
 数据文件名: RC\$SMF-4060 - 0-172/26-3215-2 - 2024041721p-zzp-2-pH6.8jz-lf100z-p6-2h.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-rcqx-FX275.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-20260224-FX275.lcb
 样品瓶号 : 3-47
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2026/02/25 16:20:31 实验者: wangdan
 处理时间(V2) : 2026/02/26 13:32:18 处理者: wangdan
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 305nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.925	199661	100.000	28174	1806	1.274	--
总计		199661	100.000	28174			

图110 氟伐他汀钠缓释片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2024041721批-pH6.8介质-篮法-100转-120min-片6
 供试品溶液-1




SMF-4060

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
 柱 温 : 30°C 波 长: 305nm
 数据文件名: RC\$SMF-4060 - 0-172/26-3216-2 - 2024041721p-zzp-2-pH6.8jz-lf100z-p1-4h.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-rcqx-FX275.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-20260224-FX275.lcb
 样品瓶号 : 3-3
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2026/02/25 16:23:53 实验者: wangdan
 处理时间(V2) : 2026/02/26 13:32:26 处理者: wangdan
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 305nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.924	397594	100.000	55985	1799	1.274	--
总计		397594	100.000	55985			

图111 氟伐他汀钠缓释片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2024041721批-pH6.8介质-篮法-100转-240min-片1
 供试品溶液-1




SMF-4060

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
 柱 温 : 30°C 波 长: 305nm
 数据文件名: RC\$SMF-4060 - 0-172/26-3217-2 - 2024041721p-zzp-2-pH6.8jz-lf100z-p2-4h.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-rcqx-FX275.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-20260224-FX275.lcb
 样品瓶号 : 3-12
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2026/02/25 16:27:16 实验者: wangdan
 处理时间(V2) : 2026/02/26 13:32:34 处理者: wangdan
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 305nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.924	368170	100.000	51848	1798	1.274	--
总计		368170	100.000	51848			

图112 氟伐他汀钠缓释片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2024041721批-pH6.8介质-篮法-100转-240min-片2
 供试品溶液-1




SMF-4060

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
 柱 温 : 30°C 波 长: 305nm
 数据文件名: RC\$SMF-4060 - 0-172/26-3218-2 - 2024041721p-zzp-2-pH6.8jz-lf100z-p3-4h.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-rcqx-FX275.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-20260224-FX275.lcb
 样品瓶号 : 3-21
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2026/02/25 16:30:38 实验者: wangdan
 处理时间(V2) : 2026/02/26 13:32:41 处理者: wangdan
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 305nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.925	439171	100.000	61732	1795	1.276	--
总计		439171	100.000	61732			

图113 氟伐他汀钠缓释片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2024041721批-pH6.8介质-篮法-100转-240min-片3
 供试品溶液-1




SMF-4060

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
 柱 温 : 30°C 波 长: 305nm
 数据文件名: RC\$SMF-4060 - 0-172/26-3219-2 - 2024041721p-zzp-2-pH6.8jz-lf100z-p4-4h.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-rcqx-FX275.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-20260224-FX275.lcb
 样品瓶号 : 3-30
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2026/02/25 16:33:59 实验者: wangdan
 处理时间(V2) : 2026/02/26 13:32:49 处理者: wangdan
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 305nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.925	396782	100.000	55739	1795	1.275	--
总计		396782	100.000	55739			

图114 氟伐他汀钠缓释片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2024041721批-pH6.8介质-篮法-100转-240min-片4
 供试品溶液-1




SMF-4060

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
 柱 温 : 30°C 波 长: 305nm
 数据文件名: RC\$SMF-4060 - 0-172/26-3220-2 - 2024041721p-zzp-2-pH6.8jz-lf100z-p5-4h.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-rcqx-FX275.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-20260224-FX275.lcb
 样品瓶号 : 3-39
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2026/02/25 16:37:22 实验者: wangdan
 处理时间(V2) : 2026/02/26 13:32:56 处理者: wangdan
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 305nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.925	448295	100.000	62871	1794	1.276	--
总计		448295	100.000	62871			

图115 氟伐他汀钠缓释片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2024041721批-pH6.8介质-篮法-100转-240min-片5
 供试品溶液-1




SMF-4060

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
 柱 温 : 30°C 波 长: 305nm
 数据文件名: RC\$SMF-4060 - 0-172/26-3221-2 - 2024041721p-zzp-2-pH6.8jz-lf100z-p6-4h.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-rcqx-FX275.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-20260224-FX275.lcb
 样品瓶号 : 3-48
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2026/02/25 16:40:44 实验者: wangdan
 处理时间(V2) : 2026/02/26 13:33:04 处理者: wangdan
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 305nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.925	384240	100.000	53872	1792	1.276	--
总计		384240	100.000	53872			

图116 氟伐他汀钠缓释片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2024041721批-pH6.8介质-篮法-100转-240min-片6
 供试品溶液-1




SMF-4060

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
 柱 温 : 30°C 波 长: 305nm
 数据文件名: RC\$SMF-4060 - 0-172/26-3222-2 - 2024041721p-zzp-2-pH6.8jz-lf100z-p1-6h.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-rcqx-FX275.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-20260224-FX275.lcb
 样品瓶号 : 3-4
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2026/02/25 16:44:06 实验者: wangdan
 处理时间(V2) : 2026/02/26 13:33:11 处理者: wangdan
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 305nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.924	576937	100.000	80956	1786	1.277	--
总计		576937	100.000	80956			

图117 氟伐他汀钠缓释片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2024041721批-pH6.8介质-篮法-100转-360min-片1
 供试品溶液-1




SMF-4060

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
 柱 温 : 30°C 波 长: 305nm
 数据文件名: RC\$SMF-4060 - 0-172/26-3223-2 - 2024041721p-zzp-2-pH6.8jz-lf100z-p2-6h.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-rcqx-FX275.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-20260224-FX275.lcb
 样品瓶号 : 3-13
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2026/02/25 16:47:27 实验者: wangdan
 处理时间(V2) : 2026/02/26 13:33:19 处理者: wangdan
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 305nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.925	534739	100.000	74984	1787	1.276	--
总计		534739	100.000	74984			

图118 氟伐他汀钠缓释片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2024041721批-pH6.8介质-篮法-100转-360min-片2
 供试品溶液-1




SMF-4060

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
 柱 温 : 30°C 波 长: 305nm
 数据文件名: RC\$SMF-4060 - 0-172/26-3224-2 - 2024041721p-zzp-2-pH6.8jz-lf100z-p3-6h.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-rcqx-FX275.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-20260224-FX275.lcb
 样品瓶号 : 3-22
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2026/02/25 16:50:49 实验者: wangdan
 处理时间(V2) : 2026/02/26 13:33:26 处理者: wangdan
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 305nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.924	656874	100.000	92107	1783	1.278	--
总计		656874	100.000	92107			

图119 氟伐他汀钠缓释片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2024041721批-pH6.8介质-篮法-100转-360min-片3
 供试品溶液-1




SMF-4060

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
 柱 温 : 30°C 波 长: 305nm
 数据文件名: RC\$SMF-4060 - 0-172/26-3225-2 - 2024041721p-zzp-2-pH6.8jz-lf100z-p4-6h.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-rcqx-FX275.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-20260224-FX275.lcb
 样品瓶号 : 3-31
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2026/02/25 16:54:11 实验者: wangdan
 处理时间(V2) : 2026/02/26 13:33:34 处理者: wangdan
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 305nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.924	598037	100.000	83816	1782	1.277	--
总计		598037	100.000	83816			

图120 氟伐他汀钠缓释片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2024041721批-pH6.8介质-篮法-100转-360min-片4
 供试品溶液-1




SMF-4060

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
 柱 温 : 30°C 波 长: 305nm
 数据文件名: RC\$SMF-4060 - 0-172/26-3226-2 - 2024041721p-zzp-2-pH6.8jz-lf100z-p5-6h.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-rcqx-FX275.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-20260224-FX275.lcb
 样品瓶号 : 3-40
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2026/02/25 16:57:33 实验者: wangdan
 处理时间(V2) : 2026/02/26 13:33:41 处理者: wangdan
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 305nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.924	661791	100.000	92778	1783	1.278	--
总计		661791	100.000	92778			

图121 氟伐他汀钠缓释片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2024041721批-pH6.8介质-篮法-100转-360min-片5
 供试品溶液-1




SMF-4060

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
 柱 温 : 30°C 波 长: 305nm
 数据文件名: RC\$SMF-4060 - 0-172/26-3227-2 - 2024041721p-zzp-2-pH6.8jz-lf100z-p6-6h.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-rcqx-FX275.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-20260224-FX275.lcb
 样品瓶号 : 3-49
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2026/02/25 17:00:55 实验者: wangdan
 处理时间(V2) : 2026/02/26 13:33:49 处理者: wangdan
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 305nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.924	566930	100.000	79493	1782	1.277	--
总计		566930	100.000	79493			

图122 氟伐他汀钠缓释片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2024041721批-pH6.8介质-篮法-100转-360min-片6
 供试品溶液-1




SMF-4060

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
 柱 温 : 30°C 波 长: 305nm
 数据文件名: RC\$SMF-4060 - 0-172/26-3228-2 - 2024041721p-zzp-2-pH6.8jz-lf100z-p1-8h.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-rcqx-FX275.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-20260224-FX275.lcb
 样品瓶号 : 3-5
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2026/02/25 17:04:17 实验者: wangdan
 处理时间(V2) : 2026/02/26 13:33:56 处理者: wangdan
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 305nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.924	763906	100.000	106924	1778	1.280	--
总计		763906	100.000	106924			

图123 氟伐他汀钠缓释片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2024041721批-pH6.8介质-篮法-100转-480min-片1
 供试品溶液-1




SMF-4060

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
 柱 温 : 30°C 波 长: 305nm
 数据文件名: RC\$SMF-4060 - 0-172/26-3229-2 - 2024041721p-zzp-2-pH6.8jz-lf100z-p2-8h.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-rcqx-FX275.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-20260224-FX275.lcb
 样品瓶号 : 3-14
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2026/02/25 17:07:39 实验者: wangdan
 处理时间(V2) : 2026/02/26 13:34:04 处理者: wangdan
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 305nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.924	722178	100.000	101160	1780	1.279	--
总计		722178	100.000	101160			

图124 氟伐他汀钠缓释片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2024041721批-pH6.8介质-篮法-100转-480min-片2
 供试品溶液-1




SMF-4060

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
 柱 温 : 30°C 波 长: 305nm
 数据文件名: RC\$SMF-4060 - 0-172/26-3230-2 - 2024041721p-zzp-2-pH6.8jz-lf100z-p3-8h.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-rcqx-FX275.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-20260224-FX275.lcb
 样品瓶号 : 3-23
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2026/02/25 17:11:00 实验者: wangdan
 处理时间(V2) : 2026/02/26 13:34:11 处理者: wangdan
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 305nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.924	879975	100.000	123159	1777	1.281	--
总计		879975	100.000	123159			

图125 氟伐他汀钠缓释片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2024041721批-pH6.8介质-篮法-100转-480min-片3
 供试品溶液-1




SMF-4060

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
 柱 温 : 30°C 波 长: 305nm
 数据文件名: RC\$SMF-4060 - 0-172/26-3231-2 - 2024041721p-zzp-2-pH6.8jz-lf100z-p4-8h.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-rcqx-FX275.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-20260224-FX275.lcb
 样品瓶号 : 3-32
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2026/02/25 17:14:22 实验者: wangdan
 处理时间(V2) : 2026/02/26 13:34:19 处理者: wangdan
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 305nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.924	809044	100.000	113270	1778	1.280	--
总计		809044	100.000	113270			

图126 氟伐他汀钠缓释片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2024041721批-pH6.8介质-篮法-100转-480min-片4
 供试品溶液-1




SMF-4060

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
 柱 温 : 30°C 波 长: 305nm
 数据文件名: RC\$SMF-4060 - 0-172/26-3232-2 - 2024041721p-zzp-2-pH6.8jz-lf100z-p5-8h.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-rcqx-FX275.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-20260224-FX275.lcb
 样品瓶号 : 3-41
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2026/02/25 17:17:44 实验者: wangdan
 处理时间(V2) : 2026/02/26 13:34:27 处理者: wangdan
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 305nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.924	849265	100.000	118719	1775	1.281	--
总计		849265	100.000	118719			

图127 氟伐他汀钠缓释片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2024041721批-pH6.8介质-篮法-100转-480min-片5
 供试品溶液-1




SMF-4060

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
 柱 温 : 30°C 波 长: 305nm
 数据文件名: RC\$SMF-4060 - 0-172/26-3233-2 - 2024041721p-zzp-2-pH6.8jz-lf100z-p6-8h.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-rcqx-FX275.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-20260224-FX275.lcb
 样品瓶号 : 3-50
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2026/02/25 17:21:06 实验者: wangdan
 处理时间(V2) : 2026/02/26 13:34:35 处理者: wangdan
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 305nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.925	755036	100.000	105548	1780	1.281	--
总计		755036	100.000	105548			

图128 氟伐他汀钠缓释片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2024041721批-pH6.8介质-篮法-100转-480min-片6
 供试品溶液-1




SMF-4060

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
 柱 温 : 30°C 波 长: 305nm
 数据文件名: RC\$SMF-4060 - 0-172/26-3234-2 - 2024041721p-zzp-2-pH6.8jz-lf100z-p1-10h.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-rcqx-FX275.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-20260224-FX275.lcb
 样品瓶号 : 3-6
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2026/02/25 17:24:28 实验者: wangdan
 处理时间(V2) : 2026/02/26 13:34:43 处理者: wangdan
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 305nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.925	932091	100.000	130006	1774	1.282	--
总计		932091	100.000	130006			

图129 氟伐他汀钠缓释片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2024041721批-pH6.8介质-篮法-100转-600min-片1
 供试品溶液-1




SMF-4060

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
 柱 温 : 30°C 波 长: 305nm
 数据文件名: RC\$SMF-4060 - 0-172/26-3235-2 - 2024041721p-zzp-2-pH6.8jz-lf100z-p2-10h.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-rcqx-FX275.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-20260224-FX275.lcb
 样品瓶号 : 3-15
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2026/02/25 17:27:50 实验者: wangdan
 处理时间(V2) : 2026/02/26 13:34:51 处理者: wangdan
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 305nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.925	900343	100.000	125612	1773	1.282	--
总计		900343	100.000	125612			

图130 氟伐他汀钠缓释片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2024041721批-pH6.8介质-篮法-100转-600min-片2
 供试品溶液-1




SMF-4060

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
 柱 温 : 30°C 波 长: 305nm
 数据文件名: RC\$SMF-4060 - 0-172/26-3236-2 - 2024041721p-zzp-2-pH6.8jz-lf100z-p3-10h.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-rcqx-FX275.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-20260224-FX275.lcb
 样品瓶号 : 3-24
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2026/02/25 17:31:12 实验者: wangdan
 处理时间(V2) : 2026/02/26 13:34:59 处理者: wangdan
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 305nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.925	1052287	100.000	146648	1772	1.284	--
总计		1052287	100.000	146648			

图131 氟伐他汀钠缓释片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2024041721批-pH6.8介质-篮法-100转-600min-片3
 供试品溶液-1




SMF-4060

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
 柱 温 : 30°C 波 长: 305nm
 数据文件名: RC\$SMF-4060 - 0-172/26-3237-2 - 2024041721p-zzp-2-pH6.8jz-lf100z-p4-10h.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-rcqx-FX275.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-20260224-FX275.lcb
 样品瓶号 : 3-33
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2026/02/25 17:34:34 实验者: wangdan
 处理时间(V2) : 2026/02/26 13:35:06 处理者: wangdan
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 305nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.925	989632	100.000	138069	1770	1.284	--
总计		989632	100.000	138069			

图132 氟伐他汀钠缓释片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2024041721批-pH6.8介质-篮法-100转-600min-片4
 供试品溶液-1




SMF-4060

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
 柱 温 : 30°C 波 长: 305nm
 数据文件名: RC\$SMF-4060 - 0-172/26-3238-2 - 2024041721p-zzp-2-pH6.8jz-lf100z-p5-10h.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-rcqx-FX275.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-20260224-FX275.lcb
 样品瓶号 : 3-42
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2026/02/25 17:37:56 实验者: wangdan
 处理时间(V2) : 2026/02/26 13:35:14 处理者: wangdan
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 305nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.924	1035526	100.000	144627	1771	1.284	--
总计		1035526	100.000	144627			

图133 氟伐他汀钠缓释片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2024041721批-pH6.8介质-篮法-100转-600min-片5
 供试品溶液-1




SMF-4060

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
 柱 温 : 30°C 波 长: 305nm
 数据文件名: RC\$SMF-4060 - 0-172/26-3239-2 - 2024041721p-zzp-2-pH6.8jz-lf100z-p6-10h.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-rcqx-FX275.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-20260224-FX275.lcb
 样品瓶号 : 3-51
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2026/02/25 17:41:18 实验者: wangdan
 处理时间(V2) : 2026/02/26 13:35:22 处理者: wangdan
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 305nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.925	931790	100.000	130010	1776	1.283	--
总计		931790	100.000	130010			

图134 氟伐他汀钠缓释片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2024041721批-pH6.8介质-篮法-100转-600min-片6
 供试品溶液-1




SMF-4060

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
 柱 温 : 30°C 波 长: 305nm
 数据文件名: RC\$SMF-4060 - 0-172/26-3240-2 - 2024041721p-zzp-2-pH6.8jz-lf100z-p1-12h.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-rcqx-FX275.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-20260224-FX275.lcb
 样品瓶号 : 3-7
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2026/02/25 17:44:40 实验者: wangdan
 处理时间(V2) : 2026/02/26 13:35:30 处理者: wangdan
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 305nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.926	1128548	100.000	157037	1772	1.285	--
总计		1128548	100.000	157037			

图135 氟伐他汀钠缓释片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2024041721批-pH6.8介质-篮法-100转-720min-片1
 供试品溶液-1




SMF-4060

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
 柱 温 : 30°C 波 长: 305nm
 数据文件名: RC\$SMF-4060 - 0-172/26-3241-2 - 2024041721p-zzp-2-pH6.8jz-lf100z-p2-12h.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-rcqx-FX275.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-20260224-FX275.lcb
 样品瓶号 : 3-16
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2026/02/25 17:48:02 实验者: wangdan
 处理时间(V2) : 2026/02/26 13:35:38 处理者: wangdan
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 305nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.924	1066650	100.000	148957	1770	1.285	--
总计		1066650	100.000	148957			

图136 氟伐他汀钠缓释片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2024041721批-pH6.8介质-篮法-100转-720min-片2
 供试品溶液-1




SMF-4060

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
 柱 温 : 30°C 波 长: 305nm
 数据文件名: RC\$SMF-4060 - 0-172/26-3242-2 - 2024041721p-zzp-2-pH6.8jz-lf100z-p3-12h.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-rcqx-FX275.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-20260224-FX275.lcb
 样品瓶号 : 3-25
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2026/02/25 17:51:24 实验者: wangdan
 处理时间(V2) : 2026/02/26 13:35:46 处理者: wangdan
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 305nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.925	1202490	100.000	167868	1775	1.285	--
总计		1202490	100.000	167868			

图137 氟伐他汀钠缓释片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2024041721批-pH6.8介质-篮法-100转-720min-片3
 供试品溶液-1




SMF-4060

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
 柱 温 : 30°C 波 长: 305nm
 数据文件名: RC\$SMF-4060 - 0-172/26-3243-2 - 2024041721p-zzp-2-pH6.8jz-lf100z-p4-12h.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-rcqx-FX275.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-20260224-FX275.lcb
 样品瓶号 : 3-34
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2026/02/25 17:54:46 实验者: wangdan
 处理时间(V2) : 2026/02/26 13:35:55 处理者: wangdan
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 305nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.926	1150976	100.000	160425	1777	1.284	--
总计		1150976	100.000	160425			

图138 氟伐他汀钠缓释片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2024041721批-pH6.8介质-篮法-100转-720min-片4
 供试品溶液-1




SMF-4060

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
 柱 温 : 30°C 波 长: 305nm
 数据文件名: RC\$SMF-4060 - 0-172/26-3244-2 - 2024041721p-zzp-2-pH6.8jz-lf100z-p5-12h.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-rcqx-FX275.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-20260224-FX275.lcb
 样品瓶号 : 3-43
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2026/02/25 17:58:08 实验者: wangdan
 处理时间(V2) : 2026/02/26 13:36:03 处理者: wangdan
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 305nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.924	1200048	100.000	167432	1768	1.285	--
总计		1200048	100.000	167432			

图139 氟伐他汀钠缓释片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2024041721批-pH6.8介质-篮法-100转-720min-片5
 供试品溶液-1




SMF-4060

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
 柱 温 : 30°C 波 长: 305nm
 数据文件名: RC\$SMF-4060 - 0-172/26-3245-2 - 2024041721p-zzp-2-pH6.8jz-lf100z-p6-12h.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-rcqx-FX275.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-20260224-FX275.lcb
 样品瓶号 : 3-52
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2026/02/25 18:01:29 实验者: wangdan
 处理时间(V2) : 2026/02/26 13:36:10 处理者: wangdan
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 305nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.925	1101669	100.000	153693	1774	1.285	--
总计		1101669	100.000	153693			

图140 氟伐他汀钠缓释片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2024041721批-pH6.8介质-篮法-100转-720min-片6
 供试品溶液-1




SMF-4060

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
 柱 温 : 30°C 波 长: 305nm
 数据文件名: RC\$SMF-4060 - 0-172/26-3246-2 - 2024041721p-zzp-2-pH6.8jz-lf100z-p1-14h.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-rcqx-FX275.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-20260224-FX275.lcb
 样品瓶号 : 3-8
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2026/02/25 18:04:52 实验者: wangdan
 处理时间(V2) : 2026/02/26 13:36:18 处理者: wangdan
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 305nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.926	1235569	100.000	172140	1777	1.286	--
总计		1235569	100.000	172140			

图141 氟伐他汀钠缓释片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2024041721批-pH6.8介质-篮法-100转-840min-片1
 供试品溶液-1




SMF-4060

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
 柱 温 : 30°C 波 长: 305nm
 数据文件名: RC\$SMF-4060 - 0-172/26-3247-2 - 2024041721p-zzp-2-pH6.8jz-lf100z-p2-14h.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-rcqx-FX275.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-20260224-FX275.lcb
 样品瓶号 : 3-17
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2026/02/25 18:08:14 实验者: wangdan
 处理时间(V2) : 2026/02/26 13:36:26 处理者: wangdan
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 305nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.924	1228631	100.000	171488	1773	1.286	--
总计		1228631	100.000	171488			

图142 氟伐他汀钠缓释片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2024041721批-pH6.8介质-篮法-100转-840min-片2
 供试品溶液-1




SMF-4060

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
 柱 温 : 30°C 波 长: 305nm
 数据文件名: RC\$SMF-4060 - 0-172/26-3248-2 - 2024041721p-zzp-2-pH6.8jz-lf100z-p3-14h.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-rcqx-FX275.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-20260224-FX275.lcb
 样品瓶号 : 3-26
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2026/02/25 18:11:36 实验者: wangdan
 处理时间(V2) : 2026/02/26 13:36:34 处理者: wangdan
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 305nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.924	1352510	100.000	188772	1773	1.286	--
总计		1352510	100.000	188772			

图143 氟伐他汀钠缓释片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2024041721批-pH6.8介质-篮法-100转-840min-片3
 供试品溶液-1




SMF-4060

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
 柱 温 : 30°C 波 长: 305nm
 数据文件名: RC\$SMF-4060 - 0-172/26-3249-2 - 2024041721p-zzp-2-pH6.8jz-lf100z-p4-14h.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-rcqx-FX275.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-20260224-FX275.lcb
 样品瓶号 : 3-35
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2026/02/25 18:14:59 实验者: wangdan
 处理时间(V2) : 2026/02/26 13:36:42 处理者: wangdan
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 305nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.926	1288276	100.000	179270	1773	1.287	--
总计		1288276	100.000	179270			

图144 氟伐他汀钠缓释片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2024041721批-pH6.8介质-篮法-100转-840min-片4
 供试品溶液-1




SMF-4060

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
 柱 温 : 30°C 波 长: 305nm
 数据文件名: RC\$SMF-4060 - 0-172/26-3250-2 - 2024041721p-zzp-2-pH6.8jz-lf100z-p5-14h.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-rcqx-FX275.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-20260224-FX275.lcb
 样品瓶号 : 3-44
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2026/02/25 18:18:21 实验者: wangdan
 处理时间(V2) : 2026/02/26 13:36:50 处理者: wangdan
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 305nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.924	1334264	100.000	186144	1771	1.288	--
总计		1334264	100.000	186144			

图145 氟伐他汀钠缓释片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2024041721批-pH6.8介质-篮法-100转-840min-片5
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5µm) 流 速: 2.0ml/min
 柱 温 : 30°C 波 长: 305nm
 数据文件名: RC\$SMF-4060 - 0-172/26-3251-2 - 2024041721p-zzp-2-pH6.8jz-lf100z-p6-14h.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-rcqx-FX275.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-20260224-FX275.lcb
 样品瓶号 : 3-53
 进样体积 : 20 µl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2026/02/25 18:21:43 实验者: wangdan
 处理时间(V2) : 2026/02/26 13:36:58 处理者: wangdan
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 305nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.925	1275361	100.000	177710	1773	1.288	--
总计		1275361	100.000	177710			

图146 氟伐他汀钠缓释片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2024041721批-pH6.8介质-篮法-100转-840min-片6
 供试品溶液-1




SMF-4060

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
 柱 温 : 30°C 波 长: 305nm
 数据文件名: RC\$SMF-4060 - 0-172/26-3252-2 - 2024041721p-zzp-2-pH6.8jz-lf100z-p1-16h.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-rcqx-FX275.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-20260224-FX275.lcb
 样品瓶号 : 4-1
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2026/02/25 18:25:06 实验者: wangdan
 处理时间(V2) : 2026/02/26 13:37:06 处理者: wangdan
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 305nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.924	1412076	100.000	197105	1771	1.288	--
总计		1412076	100.000	197105			

图147 氟伐他汀钠缓释片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2024041721批-pH6.8介质-篮法-100转-960min-片1
 供试品溶液-1




SMF-4060

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
 柱 温 : 30°C 波 长: 305nm
 数据文件名: RC\$SMF-4060 - 0-172/26-3253-2 - 2024041721p-zzp-2-pH6.8jz-lf100z-p2-16h.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-rcqx-FX275.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-20260224-FX275.lcb
 样品瓶号 : 4-10
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2026/02/25 18:28:29 实验者: wangdan
 处理时间(V2) : 2026/02/26 13:37:14 处理者: wangdan
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 305nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.924	1410153	100.000	196967	1773	1.289	--
总计		1410153	100.000	196967			

图148 氟伐他汀钠缓释片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2024041721批-pH6.8介质-篮法-100转-960min-片2
 供试品溶液-1




SMF-4060

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
 柱 温 : 30°C 波 长: 305nm
 数据文件名: RC\$SMF-4060 - 0-172/26-3254-2 - 2024041721p-zzp-2-pH6.8jz-lf100z-p3-16h.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-rcqx-FX275.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-20260224-FX275.lcb
 样品瓶号 : 4-19
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2026/02/25 18:31:52 实验者: wangdan
 处理时间(V2) : 2026/02/26 13:37:22 处理者: wangdan
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 305nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.926	1480351	100.000	206129	1774	1.289	--
总计		1480351	100.000	206129			

图149 氟伐他汀钠缓释片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2024041721批-pH6.8介质-篮法-100转-960min-片3
 供试品溶液-1




SMF-4060

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5µm) 流 速: 2.0ml/min
 柱 温 : 30°C 波 长: 305nm
 数据文件名: RC\$SMF-4060 - 0-172/26-3255-2 - 2024041721p-zzp-2-pH6.8jz-lf100z-p4-16h.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-rcqx-FX275.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-20260224-FX275.lcb
 样品瓶号 : 4-28
 进样体积 : 20 µl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2026/02/25 18:35:15 实验者: wangdan
 处理时间(V2) : 2026/02/26 13:37:29 处理者: wangdan
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 305nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.923	1406409	100.000	196461	1770	1.288	--
总计		1406409	100.000	196461			

图150 氟伐他汀钠缓释片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2024041721批-pH6.8介质-篮法-100转-960min-片4
 供试品溶液-1




SMF-4060

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
 柱 温 : 30°C 波 长: 305nm
 数据文件名: RC\$SMF-4060 - 0-172/26-3256-2 - 2024041721p-zzp-2-pH6.8jz-lf100z-p5-16h.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-rcqx-FX275.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-20260224-FX275.lcb
 样品瓶号 : 4-37
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2026/02/25 18:38:38 实验者: wangdan
 处理时间(V2) : 2026/02/26 13:37:37 处理者: wangdan
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 305nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.924	1481036	100.000	206783	1773	1.289	--
总计		1481036	100.000	206783			

图151 氟伐他汀钠缓释片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2024041721批-pH6.8介质-篮法-100转-960min-片5
 供试品溶液-1




SMF-4060

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
 柱 温 : 30°C 波 长: 305nm
 数据文件名: RC\$SMF-4060 - 0-172/26-3257-2 - 2024041721p-zzp-2-pH6.8jz-lf100z-p6-16h.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-rcqx-FX275.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-20260224-FX275.lcb
 样品瓶号 : 4-46
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2026/02/25 18:42:00 实验者: wangdan
 处理时间(V2) : 2026/02/26 13:37:45 处理者: wangdan
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 305nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.925	1448433	100.000	201435	1770	1.289	--
总计		1448433	100.000	201435			

图152 氟伐他汀钠缓释片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2024041721批-pH6.8介质-篮法-100转-960min-片6
 供试品溶液-1




SMF-4060

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
 柱 温 : 30°C 波 长: 305nm
 数据文件名: RC\$SMF-4060 - 0-172/26-3258-2 - 2024041721p-zzp-2-pH6.8jz-lf100z-p1-18h.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-rcqx-FX275.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-20260224-FX275.lcb
 样品瓶号 : 4-2
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2026/02/25 18:45:23 实验者: wangdan
 处理时间(V2) : 2026/02/26 13:37:53 处理者: wangdan
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 305nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.924	1504410	100.000	209549	1767	1.289	--
总计		1504410	100.000	209549			

图153 氟伐他汀钠缓释片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2024041721批-pH6.8介质-篮法-100转-1080min-片1
 供试品溶液-1




SMF-4060

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
 柱 温 : 30°C 波 长: 305nm
 数据文件名: RC\$SMF-4060 - 0-172/26-3259-2 - 2024041721p-zzp-2-pH6.8jz-lf100z-p2-18h.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-rcqx-FX275.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-20260224-FX275.lcb
 样品瓶号 : 4-11
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2026/02/25 18:48:47 实验者: wangdan
 处理时间(V2) : 2026/02/26 13:38:00 处理者: wangdan
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 305nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.925	1497925	100.000	208326	1769	1.289	--
总计		1497925	100.000	208326			

图154 氟伐他汀钠缓释片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2024041721批-pH6.8介质-篮法-100转-1080min-片2
 供试品溶液-1




SMF-4060

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
 柱 温 : 30°C 波 长: 305nm
 数据文件名: RC\$SMF-4060 - 0-172/26-3260-2 - 2024041721p-zzp-2-pH6.8jz-lf100z-p3-18h.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-rcqx-FX275.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-20260224-FX275.lcb
 样品瓶号 : 4-20
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2026/02/25 18:52:10 实验者: wangdan
 处理时间(V2) : 2026/02/26 13:38:08 处理者: wangdan
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 305nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.924	1483913	100.000	206738	1765	1.288	--
总计		1483913	100.000	206738			

图155 氟伐他汀钠缓释片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2024041721批-pH6.8介质-篮法-100转-1080min-片3
 供试品溶液-1




SMF-4060

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
 柱 温 : 30°C 波 长: 305nm
 数据文件名: RC\$SMF-4060 - 0-172/26-3261-2 - 2024041721p-zzp-2-pH6.8jz-lf100z-p4-18h.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-rcqx-FX275.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-20260224-FX275.lcb
 样品瓶号 : 4-29
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2026/02/25 18:55:33 实验者: wangdan
 处理时间(V2) : 2026/02/26 13:38:16 处理者: wangdan
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 305nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.925	1486393	100.000	206699	1768	1.289	--
总计		1486393	100.000	206699			

图156 氟伐他汀钠缓释片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2024041721批-pH6.8介质-篮法-100转-1080min-片4
 供试品溶液-1




SMF-4060

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
 柱 温 : 30°C 波 长: 305nm
 数据文件名: RC\$SMF-4060 - 0-172/26-3262-2 - 2024041721p-zzp-2-pH6.8jz-lf100z-p5-18h.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-rcqx-FX275.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-20260224-FX275.lcb
 样品瓶号 : 4-38
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2026/02/25 18:58:56 实验者: wangdan
 处理时间(V2) : 2026/02/26 13:38:24 处理者: wangdan
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 305nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.925	1503501	100.000	209279	1767	1.287	--
总计		1503501	100.000	209279			

图157 氟伐他汀钠缓释片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2024041721批-pH6.8介质-篮法-100转-1080min-片5
 供试品溶液-1




SMF-4060

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
 柱 温 : 30°C 波 长: 305nm
 数据文件名: RC\$SMF-4060 - 0-172/26-3263-2 - 2024041721p-zzp-2-pH6.8jz-lf100z-p6-18h.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-rcqx-FX275.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-20260224-FX275.lcb
 样品瓶号 : 4-47
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2026/02/25 19:02:18 实验者: wangdan
 处理时间(V2) : 2026/02/26 13:38:31 处理者: wangdan
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 305nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.925	1523204	100.000	211826	1769	1.288	--
总计		1523204	100.000	211826			

图158 氟伐他汀钠缓释片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2024041721批-pH6.8介质-篮法-100转-1080min-片6
 供试品溶液-1




SMF-4060

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
 柱 温 : 30°C 波 长: 305nm
 数据文件名: RC\$SMF-4060 - 0-172/26-3264-2 - 2024041721p-zzp-2-pH6.8jz-lf100z-p1-20h.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-rcqx-FX275.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-20260224-FX275.lcb
 样品瓶号 : 4-3
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2026/02/25 19:05:41 实验者: wangdan
 处理时间(V2) : 2026/02/26 13:38:39 处理者: wangdan
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 305nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.926	1500049	100.000	208344	1768	1.288	--
总计		1500049	100.000	208344			

图159 氟伐他汀钠缓释片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2024041721批-pH6.8介质-篮法-100转-1200min-片1
 供试品溶液-1




SMF-4060

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
 柱 温 : 30°C 波 长: 305nm
 数据文件名: RC\$SMF-4060 - 0-172/26-3265-2 - 2024041721p-zzp-2-pH6.8jz-lf100z-p2-20h.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-rcqx-FX275.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-20260224-FX275.lcb
 样品瓶号 : 4-12
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2026/02/25 19:09:04 实验者: wangdan
 处理时间(V2) : 2026/02/26 13:38:47 处理者: wangdan
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 305nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.926	1496598	100.000	207829	1770	1.288	--
总计		1496598	100.000	207829			

图160 氟伐他汀钠缓释片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2024041721批-pH6.8介质-篮法-100转-1200min-片2
 供试品溶液-1




SMF-4060

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
 柱 温 : 30°C 波 长: 305nm
 数据文件名: RC\$SMF-4060 - 0-172/26-3266-2 - 2024041721p-zzp-2-pH6.8jz-lf100z-p3-20h.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-rcqx-FX275.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-20260224-FX275.lcb
 样品瓶号 : 4-21
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2026/02/25 19:12:27 实验者: wangdan
 处理时间(V2) : 2026/02/26 13:38:54 处理者: wangdan
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 305nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.925	1482445	100.000	206066	1766	1.287	--
总计		1482445	100.000	206066			

图161 氟伐他汀钠缓释片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2024041721批-pH6.8介质-篮法-100转-1200min-片3
 供试品溶液-1




SMF-4060

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
 柱 温 : 30°C 波 长: 305nm
 数据文件名: RC\$SMF-4060 - 0-172/26-3267-2 - 2024041721p-zzp-2-pH6.8jz-lf100z-p4-20h.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-rcqx-FX275.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-20260224-FX275.lcb
 样品瓶号 : 4-30
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2026/02/25 19:15:50 实验者: wangdan
 处理时间(V2) : 2026/02/26 13:39:02 处理者: wangdan
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 305nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.925	1481572	100.000	205894	1766	1.290	--
总计		1481572	100.000	205894			

图162 氟伐他汀钠缓释片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2024041721批-pH6.8介质-篮法-100转-1200min-片4
 供试品溶液-1




SMF-4060

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
 柱 温 : 30°C 波 长: 305nm
 数据文件名: RC\$SMF-4060 - 0-172/26-3268-2 - 2024041721p-zzp-2-pH6.8jz-lf100z-p5-20h.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-rcqx-FX275.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-20260224-FX275.lcb
 样品瓶号 : 4-39
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2026/02/25 19:19:13 实验者: wangdan
 处理时间(V2) : 2026/02/26 13:39:11 处理者: wangdan
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 305nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.926	1495859	100.000	207518	1766	1.288	--
总计		1495859	100.000	207518			

图163 氟伐他汀钠缓释片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2024041721批-pH6.8介质-篮法-100转-1200min-片5
 供试品溶液-1




SMF-4060

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
 柱 温 : 30°C 波 长: 305nm
 数据文件名: RC\$SMF-4060 - 0-172/26-3269-2 - 2024041721p-zzp-2-pH6.8jz-lf100z-p6-20h.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-rcqx-FX275.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-20260224-FX275.lcb
 样品瓶号 : 4-48
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2026/02/25 19:22:36 实验者: wangdan
 处理时间(V2) : 2026/02/26 13:39:19 处理者: wangdan
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 305nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.925	1509821	100.000	209723	1762	1.289	--
总计		1509821	100.000	209723			

图164 氟伐他汀钠缓释片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2024041721批-pH6.8介质-篮法-100转-1200min-片6
 供试品溶液-1




SMF-4060

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
 柱 温 : 30°C 波 长: 305nm
 数据文件名: RC\$SMF-4060 - 0-172/26-3270-2 - 2024041721p-zzp-2-pH6.8jz-lf100z-p1-22h.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-rcqx-FX275.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-20260224-FX275.lcb
 样品瓶号 : 4-4
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2026/02/25 19:25:59 实验者: wangdan
 处理时间(V2) : 2026/02/26 13:39:27 处理者: wangdan
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 305nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.925	1499205	100.000	208052	1760	1.288	--
总计		1499205	100.000	208052			

图165 氟伐他汀钠缓释片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2024041721批-pH6.8介质-篮法-100转-1320min-片1
 供试品溶液-1




SMF-4060

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
 柱 温 : 30°C 波 长: 305nm
 数据文件名: RC\$SMF-4060 - 0-172/26-3271-2 - 2024041721p-zzp-2-pH6.8jz-lf100z-p2-22h.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-rcqx-FX275.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-20260224-FX275.lcb
 样品瓶号 : 4-13
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2026/02/25 19:29:23 实验者: wangdan
 处理时间(V2) : 2026/02/26 13:39:34 处理者: wangdan
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 305nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.924	1491257	100.000	207392	1760	1.288	--
总计		1491257	100.000	207392			

图166 氟伐他汀钠缓释片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2024041721批-pH6.8介质-篮法-100转-1320min-片2
 供试品溶液-1




SMF-4060

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
 柱 温 : 30°C 波 长: 305nm
 数据文件名: RC\$SMF-4060 - 0-172/26-3272-2 - 2024041721p-zzp-2-pH6.8jz-lf100z-p3-22h.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-rcqx-FX275.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-20260224-FX275.lcb
 样品瓶号 : 4-22
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2026/02/25 19:32:47 实验者: wangdan
 处理时间(V2) : 2026/02/26 13:39:42 处理者: wangdan
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 305nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.925	1477152	100.000	205226	1760	1.288	--
总计		1477152	100.000	205226			

图167 氟伐他汀钠缓释片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2024041721批-pH6.8介质-篮法-100转-1320min-片3
 供试品溶液-1




SMF-4060

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
 柱 温 : 30°C 波 长: 305nm
 数据文件名: RC\$SMF-4060 - 0-172/26-3273-2 - 2024041721p-zzp-2-pH6.8jz-lf100z-p4-22h.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-rcqx-FX275.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-20260224-FX275.lcb
 样品瓶号 : 4-31
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2026/02/25 19:36:10 实验者: wangdan
 处理时间(V2) : 2026/02/26 13:39:49 处理者: wangdan
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 305nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.925	1482460	100.000	205510	1760	1.288	--
总计		1482460	100.000	205510			

图168 氟伐他汀钠缓释片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2024041721批-pH6.8介质-篮法-100转-1320min-片4
 供试品溶液-1




SMF-4060

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
 柱 温 : 30°C 波 长: 305nm
 数据文件名: RC\$SMF-4060 - 0-172/26-3274-2 - 2024041721p-zzp-2-pH6.8jz-lf100z-p5-22h.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-rcqx-FX275.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-20260224-FX275.lcb
 样品瓶号 : 4-40
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2026/02/25 19:39:33 实验者: wangdan
 处理时间(V2) : 2026/02/26 13:39:57 处理者: wangdan
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 305nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.923	1494803	100.000	207851	1755	1.288	--
总计		1494803	100.000	207851			

图169 氟伐他汀钠缓释片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2024041721批-pH6.8介质-篮法-100转-1320min-片5
 供试品溶液-1




SMF-4060

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
 柱 温 : 30°C 波 长: 305nm
 数据文件名: RC\$SMF-4060 - 0-172/26-3275-2 - 2024041721p-zzp-2-pH6.8jz-lf100z-p6-22h.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-rcqx-FX275.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-20260224-FX275.lcb
 样品瓶号 : 4-49
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2026/02/25 19:42:57 实验者: wangdan
 处理时间(V2) : 2026/02/26 13:40:05 处理者: wangdan
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 305nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.924	1512668	100.000	210160	1759	1.289	--
总计		1512668	100.000	210160			

图170 氟伐他汀钠缓释片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2024041721批-pH6.8介质-篮法-100转-1320min-片6
 供试品溶液-1




SMF-4060

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
 柱 温 : 30°C 波 长: 305nm
 数据文件名: RC\$SMF-4060 - 0-172/26-3276-2 - 2024041721p-zzp-2-pH6.8jz-lf100z-p1-24h.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-rcqx-FX275.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-20260224-FX275.lcb
 样品瓶号 : 4-5
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2026/02/25 19:46:21 实验者: wangdan
 处理时间(V2) : 2026/02/26 13:40:12 处理者: wangdan
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 305nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.925	1492114	100.000	206857	1761	1.289	--
总计		1492114	100.000	206857			

图171 氟伐他汀钠缓释片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2024041721批-pH6.8介质-篮法-100转-1440min-片1
 供试品溶液-1




SMF-4060

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
 柱 温 : 30°C 波 长: 305nm
 数据文件名: RC\$SMF-4060 - 0-172/26-3277-2 - 2024041721p-zzp-2-pH6.8jz-lf100z-p2-24h.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-rcqx-FX275.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-20260224-FX275.lcb
 样品瓶号 : 4-14
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2026/02/25 19:49:44 实验者: wangdan
 处理时间(V2) : 2026/02/26 13:40:21 处理者: wangdan
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 305nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.925	1489590	100.000	206461	1759	1.289	--
总计		1489590	100.000	206461			

图172 氟伐他汀钠缓释片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2024041721批-pH6.8介质-篮法-100转-1440min-片2
 供试品溶液-1




SMF-4060

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
 柱 温 : 30°C 波 长: 305nm
 数据文件名: RC\$SMF-4060 - 0-172/26-3278-2 - 2024041721p-zzp-2-pH6.8jz-lf100z-p3-24h.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-rcqx-FX275.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-20260224-FX275.lcb
 样品瓶号 : 4-23
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2026/02/25 19:53:08 实验者: wangdan
 处理时间(V2) : 2026/02/26 13:40:29 处理者: wangdan
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 305nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.924	1472259	100.000	204250	1753	1.288	--
总计		1472259	100.000	204250			

图173 氟伐他汀钠缓释片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2024041721批-pH6.8介质-篮法-100转-1440min-片3
 供试品溶液-1




SMF-4060

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
 柱 温 : 30°C 波 长: 305nm
 数据文件名: RC\$SMF-4060 - 0-172/26-3279-2 - 2024041721p-zzp-2-pH6.8jz-lf100z-p4-24h.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-rcqx-FX275.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-20260224-FX275.lcb
 样品瓶号 : 4-32
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2026/02/25 19:56:32 实验者: wangdan
 处理时间(V2) : 2026/02/26 13:40:38 处理者: wangdan
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 305nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.925	1497640	100.000	207646	1756	1.289	--
总计		1497640	100.000	207646			

图174 氟伐他汀钠缓释片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2024041721批-pH6.8介质-篮法-100转-1440min-片4
 供试品溶液-1




SMF-4060

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
 柱 温 : 30°C 波 长: 305nm
 数据文件名: RC\$SMF-4060 - 0-172/26-3280-2 - 2024041721p-zzp-2-pH6.8jz-lf100z-p5-24h.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-rcqx-FX275.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-20260224-FX275.lcb
 样品瓶号 : 4-41
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2026/02/25 19:59:56 实验者: wangdan
 处理时间(V2) : 2026/02/26 13:40:47 处理者: wangdan
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 305nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.925	1492957	100.000	206839	1757	1.289	--
总计		1492957	100.000	206839			

图175 氟伐他汀钠缓释片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2024041721批-pH6.8介质-篮法-100转-1440min-片5
 供试品溶液-1




SMF-4060

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
 柱 温 : 30°C 波 长: 305nm
 数据文件名: RC\$SMF-4060 - 0-172/26-3281-2 - 2024041721p-zzp-2-pH6.8jz-lf100z-p6-24h.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-rcqx-FX275.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-20260224-FX275.lcb
 样品瓶号 : 4-50
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2026/02/25 20:03:19 实验者: wangdan
 处理时间(V2) : 2026/02/26 13:40:55 处理者: wangdan
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 305nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.926	1518449	100.000	209874	1754	1.289	--
总计		1518449	100.000	209874			

图176 氟伐他汀钠缓释片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2024041721批-pH6.8介质-篮法-100转-1440min-片6
 供试品溶液-1




SMF-4060

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
 柱 温 : 30°C 波 长: 305nm
 数据文件名: RC\$SMF-4060 - 0-172/26-3282-2 - 2024041721p-zzp-2-pH6.8jz-lf100z-p1-jx.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-rcqx-FX275.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-20260224-FX275.lcb
 样品瓶号 : 4-6
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2026/02/25 20:06:43 实验者: wangdan
 处理时间(V2) : 2026/02/26 13:41:04 处理者: wangdan
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 305nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.924	1495432	100.000	207402	1751	1.289	--
总计		1495432	100.000	207402			

图177 氟伐他汀钠缓释片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2024041721批-pH6.8介质-篮法-100转-极限转速-片1
 供试品溶液-1




SMF-4060

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
 柱 温 : 30°C 波 长: 305nm
 数据文件名: RC\$SMF-4060 - 0-172/26-3283-2 - 2024041721p-zzp-2-pH6.8jz-lf100z-p2-jx.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-rcqx-FX275.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-20260224-FX275.lcb
 样品瓶号 : 4-15
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2026/02/25 20:10:07 实验者: wangdan
 处理时间(V2) : 2026/02/26 13:41:13 处理者: wangdan
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 305nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.925	1490980	100.000	206435	1751	1.290	--
总计		1490980	100.000	206435			

图178 氟伐他汀钠缓释片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2024041721批-pH6.8介质-篮法-100转-极限转速-片2
 供试品溶液-1




SMF-4060

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
 柱 温 : 30°C 波 长: 305nm
 数据文件名: RC\$SMF-4060 - 0-172/26-3284-2 - 2024041721p-zzp-2-pH6.8jz-lf100z-p3-jx.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-rcqx-FX275.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-20260224-FX275.lcb
 样品瓶号 : 4-24
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2026/02/25 20:13:31 实验者: wangdan
 处理时间(V2) : 2026/02/26 13:41:20 处理者: wangdan
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 305nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.925	1470941	100.000	203487	1752	1.290	--
总计		1470941	100.000	203487			

图179 氟伐他汀钠缓释片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2024041721批-pH6.8介质-篮法-100转-极限转速-片3
 供试品溶液-1




SMF-4060

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
 柱 温 : 30°C 波 长: 305nm
 数据文件名: RC\$SMF-4060 - 0-172/26-3285-2 - 2024041721p-zzp-2-pH6.8jz-lf100z-p4-jx.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-rcqx-FX275.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-20260224-FX275.lcb
 样品瓶号 : 4-33
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2026/02/25 20:16:55 实验者: wangdan
 处理时间(V2) : 2026/02/26 13:41:28 处理者: wangdan
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 305nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.925	1475410	100.000	203974	1752	1.290	--
总计		1475410	100.000	203974			

图180 氟伐他汀钠缓释片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2024041721批-pH6.8介质-篮法-100转-极限转速-片4
 供试品溶液-1




SMF-4060

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
 柱 温 : 30°C 波 长: 305nm
 数据文件名: RC\$SMF-4060 - 0-172/26-3286-2 - 2024041721p-zzp-2-pH6.8jz-lf100z-p5-jx.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-rcqx-FX275.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-20260224-FX275.lcb
 样品瓶号 : 4-42
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2026/02/25 20:20:18 实验者: wangdan
 处理时间(V2) : 2026/02/26 13:41:36 处理者: wangdan
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 305nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.924	1487032	100.000	206051	1747	1.290	--
总计		1487032	100.000	206051			

图181 氟伐他汀钠缓释片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2024041721批-pH6.8介质-篮法-100转-极限转速-片5
 供试品溶液-1




SMF-4060

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
 柱 温 : 30°C 波 长: 305nm
 数据文件名: RC\$SMF-4060 - 0-172/26-3287-2 - 2024041721p-zzp-2-pH6.8jz-lf100z-p6-jx.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-rcqx-FX275.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-20260224-FX275.lcb
 样品瓶号 : 4-51
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2026/02/25 20:23:42 实验者: wangdan
 处理时间(V2) : 2026/02/26 13:41:44 处理者: wangdan
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 305nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.925	1496077	100.000	206852	1751	1.291	--
总计		1496077	100.000	206852			

图182 氟伐他汀钠缓释片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2024041721批-pH6.8介质-篮法-100转-极限转速-片6
 供试品溶液-1




SMF-4060

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
 柱 温 : 30°C 波 长: 305nm
 数据文件名: RC\$SMF-4060 - 0-172/26-3288-2 - 2024041721p-zzp-2-pH6.8jz-lf100z-dz2-1.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-rcqx-FX275.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-20260224-FX275.lcb
 样品瓶号 : 3-27
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2026/02/25 20:27:05 实验者: wangdan
 处理时间(V2) : 2026/02/26 13:41:51 处理者: wangdan
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 305nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.931	1477813	100.000	204981	1768	1.299	--
总计		1477813	100.000	204981			

图183 氟伐他汀钠缓释片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2024041721批-pH6.8介质-篮法-100转
 对照品溶液-2-1




SMF-4060

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
 柱 温 : 30°C 波 长: 305nm
 数据文件名: RC\$SMF-4060 - 0-172/26-3289-2 - 2024041721p-zzp-2-pH6.8jz-lf100z-dz2-2.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-rcqx-FX275.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-20260224-FX275.lcb
 样品瓶号 : 3-27
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2026/02/25 20:30:28 实验者: wangdan
 处理时间(V2) : 2026/02/26 13:41:59 处理者: wangdan
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 305nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.929	1479506	100.000	204877	1764	1.298	--
总计		1479506	100.000	204877			

图184 氟伐他汀钠缓释片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2024041721批-pH6.8介质-篮法-100转
 对照品溶液-2-2