




SMF-4035

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 240nm
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 0-66/18-204-2 - zzp-2025021021p-cq12y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx1-rj.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-RC-Fx267.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20260310-FX267.lcb
 样品瓶号: 1-9
 进样体积: 10μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2026/03/10 13:45:55 实验者: wangdan
 处理时间 (V2) : 2026/03/11 11:40:14 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 240nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图1 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定长期12月HPLC图谱
 自制品-2025021021批-pH6.8介质-篮法-100转
 溶剂




SMF-4035

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 240nm
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 0-66/18-205-2 - zzp-2025021021p-cq12y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx1-dz1-1.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-RC-Fx267.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20260310-FX267.lcb
 样品瓶号: 1-18
 进样体积: 10μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2026/03/10 13:49:48 实验者: wangdan
 处理时间 (V2): 2026/03/11 11:40:23 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 240nm


峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.999	92489	19457	20.073	4125	1.260	--
2	2.287	368271	74376	79.927	4963	1.123	2.267
总计		460760	93833	100.000			

图2 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定长期12月HPLC图谱
 自制品-2025021021批-pH6.8介质-篮法-100转
 对照品溶液-1-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 240nm
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 0-66/18-206-2 - zzp-2025021021p-cq12y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx1-dz1-2.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-RC-Fx267.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20260310-FX267.lcb
 样品瓶号: 1-18
 进样体积: 10μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2026/03/10 13:53:41 实验者: wangdan
 处理时间 (V2): 2026/03/11 11:40:30 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 240nm


峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.001	92610	19367	20.099	4126	1.261	--
2	2.287	368165	74369	79.901	4972	1.122	2.251
总计		460775	93737	100.000			

图3 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定长期12月HPLC图谱
自制品-2025021021批-pH6.8介质-篮法-100转
对照品溶液-1-2

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 240nm
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 0-66/18-207-2 - zzp-2025021021p-cq12y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx1-dz1-3.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-RC-Fx267.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20260310-FX267.lcb
 样品瓶号: 1-18
 进样体积: 10μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2026/03/10 13:57:34 实验者: wangdan
 处理时间 (V2): 2026/03/11 11:40:38 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 240nm


峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.002	92514	19427	20.080	4134	1.261	--
2	2.288	368212	74287	79.920	4971	1.122	2.243
总计		460726	93714	100.000			

图4 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定长期12月HPLC图谱
 自制品-2025021021批-pH6.8介质-篮法-100转
 对照品溶液-1-3

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 240nm
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 0-66/18-209-2 - zzp-2025021021p-cq12y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx1-dz1-5.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-RC-Fx267.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20260310-FX267.lcb
 样品瓶号: 1-18
 进样体积: 10μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2026/03/10 14:05:18 实验者: wangdan
 处理时间 (V2) : 2026/03/11 11:40:53 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 240nm


峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.004	92441	19428	20.066	4131	1.259	--
2	2.288	368235	74336	79.934	4978	1.122	2.234
总计		460676	93764	100.000			

图6 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定长期12月HPLC图谱
 自制品-2025021021批-pH6.8介质-篮法-100转
 对照品溶液-1-5

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 240nm
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 0-66/18-210-2 - zzp-2025021021p-cq12y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx1-5min-P1.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-RC-Fx267.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20260310-FX267.lcb
 样品瓶号: 1-1
 进样体积: 10μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2026/03/10 14:09:10 实验者: wangdan
 处理时间 (V2) : 2026/03/11 11:41:01 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 240nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.020	49905	10986	18.462	4685	1.284	--
2	2.306	220403	47724	81.538	5822	1.109	2.394
总计		270309	58710	100.000			

图7 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定长期12月HPLC图谱
自制品-2025021021批-pH6.8介质-篮法-100转-5min-片1
供试品溶液-1




SMF-4035

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 240nm
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 0-66/18-211-2 - zzp-2025021021p-cq12y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx1-5min-P2.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-RC-Fx267.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20260310-FX267.lcb
 样品瓶号: 1-10
 进样体积: 10μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2026/03/10 14:13:01 实验者: wangdan
 处理时间 (V2) : 2026/03/11 11:41:08 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 240nm


峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.020	55680	11997	18.204	4509	1.313	--
2	2.305	250196	54271	81.796	5819	1.110	2.366
总计		305876	66267	100.000			

图8 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定长期12月HPLC图谱
 自制品-2025021021批-pH6.8介质-篮法-100转-5min-片2
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 240nm
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 0-66/18-213-2 - zzp-2025021021p-cq12y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx1-5min-P4.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-RC-Fx267.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20260310-FX267.lcb
 样品瓶号: 1-28
 进样体积: 10μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2026/03/10 14:20:46 实验者: wangdan
 处理时间 (V2) : 2026/03/11 11:41:24 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 240nm


峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.021	47826	10510	17.880	4675	1.278	--
2	2.305	219661	47771	82.120	5835	1.108	2.381
总计		267487	58282	100.000			

图10 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定长期12月HPLC图谱
自制品-2025021021批-pH6.8介质-篮法-100转-5min-片4
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 240nm
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 0-66/18-214-2 - zzp-2025021021p-cq12y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx1-5min-P5.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-RC-Fx267.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20260310-FX267.lcb
 样品瓶号: 1-37
 进样体积: 10μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2026/03/10 14:24:38 实验者: wangdan
 处理时间 (V2): 2026/03/11 11:41:31 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 240nm


峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.021	49578	10895	17.991	4671	1.279	--
2	2.305	225985	49122	82.009	5835	1.109	2.382
总计		275562	60017	100.000			

图11 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定长期12月HPLC图谱
自制品-2025021021批-pH6.8介质-篮法-100转-5min-片5
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 240nm
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 0-66/18-217-2 - zzp-2025021021p-cq12y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx1-10min-P2.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-RC-Fx267.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20260310-FX267.lcb
 样品瓶号: 1-11
 进样体积: 10μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2026/03/10 14:36:11 实验者: wangdan
 处理时间 (V2) : 2026/03/11 11:41:55 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 240nm


峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.021	77882	16858	20.633	4566	1.309	--
2	2.306	299578	64924	79.367	5826	1.110	2.366
总计		377460	81781	100.000			

图14 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定长期12月HPLC图谱
 自制品-2025021021批-pH6.8介质-篮法-100转-10min-片2
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 240nm
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 0-66/18-220-2 - zzp-2025021021p-cq12y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx1-10min-P5.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-RC-Fx267.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20260310-FX267.lcb
 样品瓶号: 1-38
 进样体积: 10μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2026/03/10 14:47:48 实验者: wangdan
 处理时间 (V2): 2026/03/11 11:42:19 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 240nm


峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.021	69735	15337	20.315	4693	1.281	--
2	2.306	273538	59249	79.685	5823	1.108	2.382
总计		343274	74586	100.000			

图17 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定长期12月HPLC图谱
 自制品-2025021021批-pH6.8介质-篮法-100转-10min-片5
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 240nm
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 0-66/18-222-2 - zzp-2025021021p-cq12y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx1-15min-P1.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-RC-Fx267.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20260310-FX267.lcb
 样品瓶号: 1-3
 进样体积: 10μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2026/03/10 14:55:30 实验者: wangdan
 处理时间 (V2): 2026/03/11 11:42:35 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 240nm


峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.023	81592	18000	22.076	4704	1.281	--
2	2.307	288008	62149	77.924	5827	1.109	2.384
总计		369600	80150	100.000			

图19 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定长期12月HPLC图谱
 自制品-2025021021批-pH6.8介质-篮法-100转-15min-片1
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 240nm
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 0-66/18-223-2 - zzp-2025021021p-cq12y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx1-15min-P2.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-RC-Fx267.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20260310-FX267.lcb
 样品瓶号: 1-12
 进样体积: 10μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2026/03/10 14:59:22 实验者: wangdan
 处理时间 (V2): 2026/03/11 11:42:43 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 240nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.024	83076	18044	21.120	4572	1.311	--
2	2.308	310285	67046	78.880	5841	1.109	2.364
总计		393361	85090	100.000			

图20 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定长期12月HPLC图谱
 自制品-2025021021批-pH6.8介质-篮法-100转-15min-片2
 供试品溶液-1




SMF-4035

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 240nm
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 0-66/18-224-2 - zzp-2025021021p-cq12y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx1-15min-P3.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-RC-Fx267.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20260310-FX267.lcb
 样品瓶号: 1-21
 进样体积: 10μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2026/03/10 15:03:14 实验者: wangdan
 处理时间 (V2) : 2026/03/11 11:42:50 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 240nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.023	73006	16064	20.273	4669	1.283	--
2	2.307	287105	61842	79.727	5816	1.112	2.374
总计		360111	77906	100.000			

图21 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定长期12月HPLC图谱
 自制品-2025021021批-pH6.8介质-篮法-100转-15min-片3
 供试品溶液-1




SMF-4035

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 240nm
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 0-66/18-225-2 - zzp-2025021021p-cq12y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx1-15min-P4.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-RC-Fx267.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20260310-FX267.lcb
 样品瓶号: 1-30
 进样体积: 10μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2026/03/10 15:07:05 实验者: wangdan
 处理时间 (V2) : 2026/03/11 11:42:58 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 240nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.023	73008	16102	20.369	4689	1.281	--
2	2.307	285415	61570	79.631	5832	1.109	2.380
总计		358423	77672	100.000			

图22 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定长期12月HPLC图谱
 自制品-2025021021批-pH6.8介质-篮法-100转-15min-片4
 供试品溶液-1




SMF-4035

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 240nm
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 0-66/18-226-2 - zzp-2025021021p-cq12y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx1-15min-P5.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-RC-Fx267.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20260310-FX267.lcb
 样品瓶号: 1-39
 进样体积: 10μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2026/03/10 15:10:58 实验者: wangdan
 处理时间 (V2): 2026/03/11 11:43:06 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 240nm


峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.022	75061	16513	20.853	4674	1.281	--
2	2.306	284887	61641	79.147	5825	1.108	2.376
总计		359948	78154	100.000			

图23 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定长期12月HPLC图谱
 自制品-2025021021批-pH6.8介质-篮法-100转-15min-片5
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 240nm
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 0-66/18-228-2 - zzp-2025021021p-cq12y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx1-20min-P1.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-RC-Fx267.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20260310-FX267.lcb
 样品瓶号: 1-4
 进样体积: 10μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2026/03/10 15:18:42 实验者: wangdan
 处理时间 (V2) : 2026/03/11 11:43:22 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 240nm


峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.023	83928	18544	22.264	4713	1.281	--
2	2.307	293047	63225	77.736	5839	1.107	2.381
总计		376975	81769	100.000			

图25 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定长期12月HPLC图谱
 自制品-2025021021批-pH6.8介质-篮法-100转-20min-片1
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 240nm
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 0-66/18-231-2 - zzp-2025021021p-cq12y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx1-20min-P4.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-RC-Fx267.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20260310-FX267.lcb
 样品瓶号: 1-31
 进样体积: 10μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2026/03/10 15:30:16 实验者: wangdan
 处理时间 (V2) : 2026/03/11 11:43:45 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 240nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.023	80007	17688	21.548	4716	1.280	--
2	2.307	291285	62850	78.452	5844	1.108	2.381
总计		371293	80538	100.000			

图28 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定长期12月HPLC图谱
 自制品-2025021021批-pH6.8介质-篮法-100转-20min-片4
 供试品溶液-1




SMF-4035

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 240nm
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 0-66/18-232-2 - zzp-2025021021p-cq12y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx1-20min-P5.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-RC-Fx267.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20260310-FX267.lcb
 样品瓶号: 1-40
 进样体积: 10μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2026/03/10 15:34:08 实验者: wangdan
 处理时间 (V2) : 2026/03/11 11:43:53 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 240nm


峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.023	79100	17480	21.390	4707	1.278	--
2	2.307	290702	62625	78.610	5834	1.107	2.379
总计		369801	80105	100.000			

图29 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定长期12月HPLC图谱
 自制品-2025021021批-pH6.8介质-篮法-100转-20min-片5
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 240nm
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 0-66/18-233-2 - zzp-2025021021p-cq12y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx1-20min-P6.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-RC-Fx267.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20260310-FX267.lcb
 样品瓶号: 1-49
 进样体积: 10μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2026/03/10 15:37:59 实验者: wangdan
 处理时间 (V2): 2026/03/11 11:44:01 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 240nm


峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.024	79845	17667	21.777	4715	1.280	--
2	2.308	286805	61871	78.223	5833	1.107	2.378
总计		366650	79538	100.000			

图30 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定长期12月HPLC图谱
 自制品-2025021021批-pH6.8介质-篮法-100转-20min-片6
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 240nm
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 0-66/18-234-2 - zzp-2025021021p-cq12y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx1-30min-P1.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-RC-Fx267.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20260310-FX267.lcb
 样品瓶号: 1-5
 进样体积: 10μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2026/03/10 15:41:52 实验者: wangdan
 处理时间 (V2): 2026/03/11 11:44:08 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 240nm


峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.024	86528	19121	22.439	4709	1.280	--
2	2.308	299078	64678	77.561	5849	1.107	2.379
总计		385606	83799	100.000			

图31 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定长期12月HPLC图谱
 自制品-2025021021批-pH6.8介质-篮法-100转-30min-片1
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5µm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 240nm
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 0-66/18-235-2 - zzp-2025021021p-cq12y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx1-30min-P2.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-RC-Fx267.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20260310-FX267.lcb
 样品瓶号: 1-14
 进样体积: 10µl 版本号: 6.115
 进样时间: 2026/03/10 15:45:43 实验者: wangdan
 处理时间 (V2) : 2026/03/11 11:44:16 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 240nm


峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.024	88935	19325	21.880	4573	1.311	--
2	2.308	317538	68597	78.120	5839	1.109	2.359
总计		406472	87922	100.000			

图32 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定长期12月HPLC图谱
 自制品-2025021021批-pH6.8介质-篮法-100转-30min-片2
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 240nm
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 0-66/18-236-2 - zzp-2025021021p-cq12y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx1-30min-P3.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-RC-Fx267.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20260310-FX267.lcb
 样品瓶号: 1-23
 进样体积: 10μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2026/03/10 15:49:34 实验者: wangdan
 处理时间 (V2) : 2026/03/11 11:44:24 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 240nm


峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.024	81261	17983	21.384	4721	1.281	--
2	2.307	298743	64456	78.616	5847	1.108	2.378
总计		380004	82439	100.000			

图33 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定长期12月HPLC图谱
 自制品-2025021021批-pH6.8介质-篮法-100转-30min-片3
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 240nm
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 0-66/18-238-2 - zzp-2025021021p-cq12y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx1-30min-P5.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-RC-Fx267.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20260310-FX267.lcb
 样品瓶号: 1-41
 进样体积: 10μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2026/03/10 15:57:18 实验者: wangdan
 处理时间 (V2): 2026/03/11 11:44:39 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 240nm


峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.023	80722	17857	21.466	4713	1.280	--
2	2.307	295326	63710	78.534	5829	1.108	2.377
总计		376048	81568	100.000			

图35 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定长期12月HPLC图谱
 自制品-2025021021批-pH6.8介质-篮法-100转-30min-片5
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5µm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 240nm
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 0-66/18-239-2 - zzp-2025021021p-cq12y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx1-30min-P6.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-RC-Fx267.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20260310-FX267.lcb
 样品瓶号: 1-50
 进样体积: 10µl 版本号: 6.115
 进样时间: 2026/03/10 16:01:10 实验者: wangdan
 处理时间 (V2): 2026/03/11 11:44:47 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 240nm


峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.024	82306	18186	21.981	4712	1.280	--
2	2.307	292126	63010	78.019	5837	1.107	2.377
总计		374432	81196	100.000			

图36 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定长期12月HPLC图谱
 自制品-2025021021批-pH6.8介质-篮法-100转-30min-片6
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 240nm
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 0-66/18-240-2 - zzp-2025021021p-cq12y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx1-45min-P1.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-RC-Fx267.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20260310-FX267.lcb
 样品瓶号: 1-6
 进样体积: 10μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2026/03/10 16:05:02 实验者: wangdan
 处理时间 (V2) : 2026/03/11 11:44:54 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 240nm


峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.024	91680	20260	23.110	4708	1.281	--
2	2.308	305030	65878	76.890	5831	1.108	2.379
总计		396710	86138	100.000			

图37 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定长期12月HPLC图谱
 自制品-2025021021批-pH6.8介质-篮法-100转-45min-片1
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5µm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 240nm
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 0-66/18-242-2 - zzp-2025021021p-cq12y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx1-45min-P3.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-RC-Fx267.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20260310-FX267.lcb
 样品瓶号: 1-24
 进样体积: 10µl 版本号: 6.115
 进样时间: 2026/03/10 16:12:47 实验者: wangdan
 处理时间 (V2) : 2026/03/11 11:45:10 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 240nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.025	84896	18706	21.716	4683	1.283	--
2	2.308	306046	65948	78.284	5819	1.110	2.368
总计		390942	84654	100.000			

图39 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定长期12月HPLC图谱
 自制品-2025021021批-pH6.8介质-篮法-100转-45min-片3
 供试品溶液-1




SMF-4035

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 240nm
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 0-66/18-243-2 - zzp-2025021021p-cq12y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx1-45min-P4.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-RC-Fx267.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20260310-FX267.lcb
 样品瓶号: 1-33
 进样体积: 10μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2026/03/10 16:16:40 实验者: wangdan
 处理时间 (V2) : 2026/03/11 11:45:18 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 240nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.024	86495	19125	22.092	4716	1.279	--
2	2.308	305032	65827	77.908	5831	1.107	2.375
总计		391527	84952	100.000			

图40 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定长期12月HPLC图谱
 自制品-2025021021批-pH6.8介质-篮法-100转-45min-片4
 供试品溶液-1




SMF-4035

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 240nm
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 0-66/18-245-2 - zzp-2025021021p-cq12y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx1-45min-P6.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-RC-Fx267.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20260310-FX267.lcb
 样品瓶号: 1-51
 进样体积: 10μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2026/03/10 16:24:22 实验者: wangdan
 处理时间 (V2) : 2026/03/11 11:45:33 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 240nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.024	89147	19705	22.670	4717	1.281	--
2	2.307	304091	65586	77.330	5826	1.109	2.374
总计		393238	85290	100.000			

图42 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定长期12月HPLC图谱
 自制品-2025021021批-pH6.8介质-篮法-100转-45min-片6
 供试品溶液-1




SMF-4035

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 240nm
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 0-66/18-246-2 - zzp-2025021021p-cq12y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx1-JX-P1.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-RC-Fx267.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20260310-FX267.lcb
 样品瓶号: 1-7
 进样体积: 10μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2026/03/10 16:28:14 实验者: wangdan
 处理时间 (V2) : 2026/03/11 11:45:41 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 240nm


峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.025	89948	19870	22.484	4711	1.283	--
2	2.308	310114	66995	77.516	5832	1.109	2.375
总计		400062	86865	100.000			

图43 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定长期12月HPLC图谱
 自制品-2025021021批-pH6.8介质-篮法-100转-极限转速-片1
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 240nm
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 0-66/18-248-2 - zzp-2025021021p-cq12y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx1-JX-P3.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-RC-Fx267.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20260310-FX267.lcb
 样品瓶号: 1-25
 进样体积: 10μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2026/03/10 16:35:58 实验者: wangdan
 处理时间 (V2) : 2026/03/11 11:45:56 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 240nm


峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.025	87099	19327	21.863	4753	1.279	--
2	2.307	311296	67418	78.137	5868	1.106	2.374
总计		398395	86745	100.000			

图45 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定长期12月HPLC图谱
 自制品-2025021021批-pH6.8介质-篮法-100转-极限转速-片3
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 240nm
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 0-66/18-249-2 - zzp-2025021021p-cq12y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx1-JX-P4.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-RC-Fx267.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20260310-FX267.lcb
 样品瓶号: 1-34
 进样体积: 10μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2026/03/10 16:41:22 实验者: wangdan
 处理时间 (V2): 2026/03/11 11:46:04 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 240nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.025	85979	18963	21.853	4702	1.281	--
2	2.308	307467	66235	78.147	5821	1.109	2.367
总计		393446	85198	100.000			

图46 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定长期12月HPLC图谱
 自制品-2025021021批-pH6.8介质-篮法-100转-极限转速-片4
 供试品溶液-1




SMF-4035

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 240nm
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 0-66/18-250-2 - zzp-2025021021p-cq12y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx1-JX-P5.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-RC-Fx267.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20260310-FX267.lcb
 样品瓶号: 1-43
 进样体积: 10μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2026/03/10 16:45:14 实验者: wangdan
 处理时间 (V2): 2026/03/11 11:46:12 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 240nm


峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.024	85044	18790	21.949	4712	1.279	--
2	2.307	302417	65419	78.051	5835	1.106	2.371
总计		387461	84210	100.000			

图47 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定长期12月HPLC图谱
 自制品-2025021021批-pH6.8介质-篮法-100转-极限转速-片5
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 240nm
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 0-66/18-251-2 - zzp-2025021021p-cq12y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx1-JX-P6.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-RC-Fx267.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20260310-FX267.lcb
 样品瓶号: 1-52
 进样体积: 10μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2026/03/10 16:49:06 实验者: wangdan
 处理时间 (V2) : 2026/03/11 11:46:19 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 240nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.024	89743	19806	22.486	4704	1.283	--
2	2.307	309364	66840	77.514	5826	1.107	2.368
总计		399107	86646	100.000			

图48 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定长期12月HPLC图谱
 自制品-2025021021批-pH6.8介质-篮法-100转-极限转速-片6
 供试品溶液-1




SMF-4035

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 240nm
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 0-66/18-252-2 - zzp-2025021021p-cq12y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx1-dz2-1.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-RC-Fx267.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20260310-FX267.lcb
 样品瓶号: 1-27
 进样体积: 10μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2026/03/10 16:52:58 实验者: wangdan
 处理时间 (V2) : 2026/03/11 11:46:27 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 240nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.009	92994	19520	20.006	4164	1.260	--
2	2.290	371841	75616	79.994	5021	1.118	2.217
总计		464835	95136	100.000			

图49 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定长期12月HPLC图谱
 自制品-2025021021批-pH6.8介质-篮法-100转
 对照品溶液-2-1




SMF-4035

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 240nm
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 0-66/18-253-2 - zzp-2025021021p-cq12y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx1-dz2-2.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-RC-Fx267.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20260310-FX267.lcb
 样品瓶号: 1-27
 进样体积: 10μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2026/03/10 16:56:51 实验者: wangdan
 处理时间 (V2) : 2026/03/11 11:46:35 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 240nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.009	93134	19566	19.997	4167	1.260	--
2	2.290	372603	75737	80.003	5009	1.118	2.215
总计		465737	95303	100.000			

图50 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定长期12月HPLC图谱
 自制品-2025021021批-pH6.8介质-篮法-100转
 对照品溶液-2-2




SMF-4035

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 240nm
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 0-66/18-254-2 - zzp-2025021021p-cq12y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-rj.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-RC-Fx267.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20260310-FX267.lcb
 样品瓶号: 2-9
 进样体积: 10μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2026/03/10 17:00:45 实验者: wangdan
 处理时间 (V2) : 2026/03/11 11:46:42 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 240nm


峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图51 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定长期12月HPLC图谱
 自制品-2025021021批-pH6.8介质-篮法-100转
 溶剂

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5µm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 240nm
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 0-66/18-256-2 - zzp-2025021021p-cq12y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-dz1-2.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-RC-Fx267.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20260310-FX267.lcb
 样品瓶号: 2-18
 进样体积: 10µl 版本号: 6.115
 进样时间: 2026/03/10 17:08:31 实验者: wangdan
 处理时间 (V2): 2026/03/11 11:46:58 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 240nm


峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.009	93473	19646	20.050	4167	1.259	--
2	2.291	372720	75817	79.950	5016	1.118	2.215
总计		466193	95464	100.000			

图53 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定长期12月HPLC图谱
 自制品-2025021021批-pH6.8介质-篮法-100转
 对照品溶液-1-2

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5µm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 240nm
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 0-66/18-257-2 - zzp-2025021021p-cq12y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-dz1-3.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-RC-Fx267.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20260310-FX267.lcb
 样品瓶号: 2-18
 进样体积: 10µl 版本号: 6.115
 进样时间: 2026/03/10 17:12:24 实验者: wangdan
 处理时间 (V2): 2026/03/11 11:47:05 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 240nm


峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.009	93621	19628	20.077	4153	1.259	--
2	2.290	372688	75759	79.923	5019	1.118	2.216
总计		466309	95387	100.000			

图54 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定长期12月HPLC图谱
 自制品-2025021021批-pH6.8介质-篮法-100转
 对照品溶液-1-3

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 240nm
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 0-66/18-258-2 - zzp-2025021021p-cq12y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-dz1-4.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-RC-Fx267.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20260310-FX267.lcb
 样品瓶号: 2-18
 进样体积: 10μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2026/03/10 17:16:19 实验者: wangdan
 处理时间 (V2): 2026/03/11 11:47:13 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 240nm


峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.009	93618	19663	20.074	4162	1.258	--
2	2.291	372742	75797	79.926	5017	1.119	2.215
总计		466360	95460	100.000			

图55 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定长期12月HPLC图谱
 自制品-2025021021批-pH6.8介质-篮法-100转
 对照品溶液-1-4

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5µm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 240nm
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 0-66/18-259-2 - zzp-2025021021p-cq12y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-dz1-5.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-RC-Fx267.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20260310-FX267.lcb
 样品瓶号: 2-18
 进样体积: 10µl 版本号: 6.115
 进样时间: 2026/03/10 17:20:13 实验者: wangdan
 处理时间 (V2): 2026/03/11 11:47:21 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 240nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.009	93537	19662	20.069	4166	1.256	--
2	2.291	372549	75706	79.931	5006	1.118	2.215
总计		466086	95367	100.000			

图56 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定长期12月HPLC图谱
 自制品-2025021021批-pH6.8介质-篮法-100转
 对照品溶液-1-5




SMF-4035

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 240nm
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 0-66/18-260-2 - zzp-2025021021p-cq12y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-5min-P1.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-RC-Fx267.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20260310-FX267.lcb
 样品瓶号: 2-1
 进样体积: 10μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2026/03/10 17:24:05 实验者: wangdan
 处理时间 (V2) : 2026/03/11 11:47:29 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 240nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.025	53482	11786	17.959	4689	1.281	--
2	2.308	244319	52744	82.041	5843	1.107	2.364
总计		297801	64530	100.000			

图57 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定长期12月HPLC图谱
 自制品-2025021021批-pH6.8介质-篮法-100转-5min-片1
 供试品溶液-1




SMF-4035

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 240nm
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 0-66/18-261-2 - zzp-2025021021p-cq12y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-5min-P2.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-RC-Fx267.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20260310-FX267.lcb
 样品瓶号: 2-10
 进样体积: 10μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2026/03/10 17:27:57 实验者: wangdan
 处理时间 (V2) : 2026/03/11 11:47:37 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 240nm


峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.026	52578	11566	18.152	4671	1.279	--
2	2.308	237070	51309	81.848	5840	1.107	2.363
总计		289648	62875	100.000			

图58 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定长期12月HPLC图谱
 自制品-2025021021批-pH6.8介质-篮法-100转-5min-片2
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 240nm
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 0-66/18-262-2 - zzp-2025021021p-cq12y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-5min-P3.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-RC-Fx267.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20260310-FX267.lcb
 样品瓶号: 2-19
 进样体积: 10μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2026/03/10 17:31:50 实验者: wangdan
 处理时间 (V2) : 2026/03/11 11:47:44 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 240nm


峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.025	51934	11419	17.927	4662	1.285	--
2	2.308	237754	51255	82.073	5828	1.109	2.361
总计		289688	62675	100.000			

图59 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定长期12月HPLC图谱
 自制品-2025021021批-pH6.8介质-篮法-100转-5min-片3
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 240nm
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 0-66/18-263-2 - zzp-2025021021p-cq12y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-5min-P4.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-RC-Fx267.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20260310-FX267.lcb
 样品瓶号: 2-28
 进样体积: 10μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2026/03/10 17:35:43 实验者: wangdan
 处理时间 (V2) : 2026/03/11 11:47:52 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 240nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.024	48754	10764	19.091	4681	1.277	--
2	2.307	206621	44770	80.909	5851	1.105	2.365
总计		255376	55533	100.000			

图60 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定长期12月HPLC图谱
自制品-2025021021批-pH6.8介质-篮法-100转-5min-片4
供试品溶液-1




SMF-4035

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 240nm
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 0-66/18-264-2 - zzp-2025021021p-cq12y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-5min-P5.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-RC-Fx267.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20260310-FX267.lcb
 样品瓶号: 2-37
 进样体积: 10μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2026/03/10 17:39:36 实验者: wangdan
 处理时间 (V2): 2026/03/11 11:48:00 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 240nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.026	54152	11919	18.635	4676	1.279	--
2	2.308	236436	51148	81.365	5846	1.109	2.364
总计		290588	63067	100.000			

图61 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定长期12月HPLC图谱
 自制品-2025021021批-pH6.8介质-篮法-100转-5min-片5
 供试品溶液-1




SMF-4035

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 240nm
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 0-66/18-265-2 - zzp-2025021021p-cq12y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-5min-P6.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-RC-Fx267.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20260310-FX267.lcb
 样品瓶号: 2-46
 进样体积: 10μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2026/03/10 17:43:29 实验者: wangdan
 处理时间 (V2): 2026/03/11 11:48:07 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 240nm


峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.025	51504	11328	17.454	4663	1.280	--
2	2.308	243586	52701	82.546	5841	1.110	2.362
总计		295090	64029	100.000			

图62 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定长期12月HPLC图谱
 自制品-2025021021批-pH6.8介质-篮法-100转-5min-片6
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 240nm
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 0-66/18-266-2 - zzp-2025021021p-cq12y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-10min-P1.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-RC-Fx267.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20260310-FX267.lcb
 样品瓶号: 2-2
 进样体积: 10μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2026/03/10 17:47:22 实验者: wangdan
 处理时间 (V2) : 2026/03/11 11:48:15 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 240nm


峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.025	76133	16781	20.324	4691	1.281	--
2	2.307	298468	64389	79.676	5844	1.108	2.365
总计		374601	81170	100.000			

图63 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定长期12月HPLC图谱
自制品-2025021021批-pH6.8介质-篮法-100转-10min-片1
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 240nm
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 0-66/18-267-2 - zzp-2025021021p-cq12y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-10min-P2.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-RC-Fx267.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20260310-FX267.lcb
 样品瓶号: 2-11
 进样体积: 10μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2026/03/10 17:51:15 实验者: wangdan
 处理时间 (V2) : 2026/03/11 11:48:23 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 240nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.025	74516	16465	20.515	4699	1.276	--
2	2.307	288716	62292	79.485	5832	1.106	2.366
总计		363231	78757	100.000			

图64 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定长期12月HPLC图谱
 自制品-2025021021批-pH6.8介质-篮法-100转-10min-片2
 供试品溶液-1




SMF-4035

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 240nm
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 0-66/18-268-2 - zzp-2025021021p-cq12y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-10min-P3.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-RC-Fx267.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20260310-FX267.lcb
 样品瓶号: 2-20
 进样体积: 10μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2026/03/10 17:55:08 实验者: wangdan
 处理时间 (V2) : 2026/03/11 11:48:30 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 240nm


峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.025	73992	16312	20.322	4693	1.279	--
2	2.308	290104	62563	79.678	5828	1.107	2.363
总计		364096	78875	100.000			

图65 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定长期12月HPLC图谱
 自制品-2025021021批-pH6.8介质-篮法-100转-10min-片3
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5µm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 240nm
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 0-66/18-270-2 - zzp-2025021021p-cq12y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-10min-P5.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-RC-Fx267.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20260310-FX267.lcb
 样品瓶号: 2-38
 进样体积: 10µl 版本号: 6.115
 进样时间: 2026/03/10 18:02:54 实验者: wangdan
 处理时间 (V2) : 2026/03/11 11:48:46 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 240nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.024	83282	18393	21.685	4706	1.280	--
2	2.307	300771	65032	78.315	5833	1.106	2.365
总计		384053	83426	100.000			

图67 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定长期12月HPLC图谱
 自制品-2025021021批-pH6.8介质-篮法-100转-10min-片5
 供试品溶液-1




SMF-4035

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 240nm
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 0-66/18-272-2 - zzp-2025021021p-cq12y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-15min-P1.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-RC-Fx267.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20260310-FX267.lcb
 样品瓶号: 2-3
 进样体积: 10μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2026/03/10 18:10:40 实验者: wangdan
 处理时间 (V2) : 2026/03/11 11:49:01 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 240nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.024	80873	17875	20.775	4700	1.278	--
2	2.307	308411	66755	79.225	5835	1.106	2.362
总计		389284	84630	100.000			

图69 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定长期12月HPLC图谱
 自制品-2025021021批-pH6.8介质-篮法-100转-15min-片1
 供试品溶液-1




SMF-4035

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 240nm
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 0-66/18-273-2 - zzp-2025021021p-cq12y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-15min-P2.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-RC-Fx267.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20260310-FX267.lcb
 样品瓶号: 2-12
 进样体积: 10μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2026/03/10 18:14:34 实验者: wangdan
 处理时间 (V2) : 2026/03/11 11:49:09 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 240nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.025	79851	17627	21.031	4707	1.279	--
2	2.307	299836	64733	78.969	5827	1.107	2.363
总计		379687	82360	100.000			

图70 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定长期12月HPLC图谱
 自制品-2025021021批-pH6.8介质-篮法-100转-15min-片2
 供试品溶液-1




SMF-4035

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 240nm
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 0-66/18-274-2 - zzp-2025021021p-cq12y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-15min-P3.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-RC-Fx267.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20260310-FX267.lcb
 样品瓶号: 2-21
 进样体积: 10μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2026/03/10 18:18:27 实验者: wangdan
 处理时间 (V2) : 2026/03/11 11:49:17 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 240nm


峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.025	79777	17569	20.970	4680	1.281	--
2	2.307	300664	64871	79.030	5824	1.108	2.359
总计		380441	82440	100.000			

图71 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定长期12月HPLC图谱
 自制品-2025021021批-pH6.8介质-篮法-100转-15min-片3
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 240nm
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 0-66/18-275-2 - zzp-2025021021p-cq12y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-15min-P4.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-RC-Fx267.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20260310-FX267.lcb
 样品瓶号: 2-30
 进样体积: 10μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2026/03/10 18:22:21 实验者: wangdan
 处理时间 (V2) : 2026/03/11 11:49:24 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 240nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.025	79680	17586	22.208	4698	1.279	--
2	2.307	279105	60412	77.792	5837	1.105	2.362
总计		358785	77998	100.000			

图72 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定长期12月HPLC图谱
 自制品-2025021021批-pH6.8介质-篮法-100转-15min-片4
 供试品溶液-1




SMF-4035

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 240nm
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 0-66/18-276-2 - zzp-2025021021p-cq12y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-15min-P5.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-RC-Fx267.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20260310-FX267.lcb
 样品瓶号: 2-39
 进样体积: 10μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2026/03/10 18:26:14 实验者: wangdan
 处理时间 (V2) : 2026/03/11 11:49:32 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 240nm


峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.024	91537	20209	22.527	4710	1.281	--
2	2.306	314800	68048	77.473	5808	1.108	2.363
总计		406336	88257	100.000			

图73 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定长期12月HPLC图谱
 自制品-2025021021批-pH6.8介质-篮法-100转-15min-片5
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 240nm
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 0-66/18-277-2 - zzp-2025021021p-cq12y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-15min-P6.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-RC-Fx267.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20260310-FX267.lcb
 样品瓶号: 2-48
 进样体积: 10μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2026/03/10 18:30:07 实验者: wangdan
 处理时间 (V2) : 2026/03/11 11:49:40 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 240nm


峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.026	76424	16872	20.268	4707	1.279	--
2	2.307	300644	64814	79.732	5834	1.106	2.359
总计		377068	81685	100.000			

图74 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定长期12月HPLC图谱
自制品-2025021021批-pH6.8介质-篮法-100转-15min-片6
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 240nm
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 0-66/18-278-2 - zzp-2025021021p-cq12y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-20min-P1.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-RC-Fx267.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20260310-FX267.lcb
 样品瓶号: 2-4
 进样体积: 10μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2026/03/10 18:34:00 实验者: wangdan
 处理时间 (V2): 2026/03/11 11:49:47 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 240nm


峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.025	83763	18522	21.179	4709	1.277	--
2	2.307	311738	67327	78.821	5819	1.108	2.359
总计		395500	85849	100.000			

图75 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定长期12月HPLC图谱
 自制品-2025021021批-pH6.8介质-篮法-100转-20min-片1
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 240nm
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 0-66/18-279-2 - zzp-2025021021p-cq12y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-20min-P2.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-RC-Fx267.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20260310-FX267.lcb
 样品瓶号: 2-13
 进样体积: 10μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2026/03/10 18:37:53 实验者: wangdan
 处理时间 (V2) : 2026/03/11 11:49:55 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 240nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.025	82251	18138	21.324	4706	1.280	--
2	2.307	303469	65439	78.676	5824	1.106	2.359
总计		385720	83577	100.000			

图76 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定长期12月HPLC图谱
 自制品-2025021021批-pH6.8介质-篮法-100转-20min-片2
 供试品溶液-1




SMF-4035

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 240nm
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 0-66/18-280-2 - zzp-2025021021p-cq12y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-20min-P3.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-RC-Fx267.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20260310-FX267.lcb
 样品瓶号: 2-22
 进样体积: 10μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2026/03/10 18:41:47 实验者: wangdan
 处理时间 (V2) : 2026/03/11 11:50:03 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 240nm


峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.026	80182	17709	20.888	4711	1.279	--
2	2.307	303680	65465	79.112	5821	1.108	2.357
总计		383862	83174	100.000			

图77 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定长期12月HPLC图谱
 自制品-2025021021批-pH6.8介质-篮法-100转-20min-片3
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5µm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 240nm
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 0-66/18-281-2 - zzp-2025021021p-cq12y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-20min-P4.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-RC-Fx267.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20260310-FX267.lcb
 样品瓶号: 2-31
 进样体积: 10µl 版本号: 6.115
 进样时间: 2026/03/10 18:45:40 实验者: wangdan
 处理时间 (V2) : 2026/03/11 11:50:10 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 240nm


峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.025	82125	18108	22.428	4705	1.281	--
2	2.307	284046	61240	77.572	5820	1.107	2.358
总计		366171	79349	100.000			

图78 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定长期12月HPLC图谱
 自制品-2025021021批-pH6.8介质-篮法-100转-20min-片4
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 240nm
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 0-66/18-282-2 - zzp-2025021021p-cq12y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-20min-P5.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-RC-Fx267.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20260310-FX267.lcb
 样品瓶号: 2-40
 进样体积: 10μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2026/03/10 18:49:34 实验者: wangdan
 处理时间 (V2) : 2026/03/11 11:50:18 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 240nm


峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.025	94850	20947	22.927	4719	1.281	--
2	2.307	318857	68869	77.073	5830	1.106	2.360
总计		413707	89815	100.000			

图79 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定长期12月HPLC图谱
 自制品-2025021021批-pH6.8介质-篮法-100转-20min-片5
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5µm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 240nm
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 0-66/18-283-2 - zzp-2025021021p-cq12y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-20min-P6.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-RC-Fx267.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20260310-FX267.lcb
 样品瓶号: 2-49
 进样体积: 10µl 版本号: 6.115
 进样时间: 2026/03/10 18:53:28 实验者: wangdan
 处理时间 (V2) : 2026/03/11 11:50:26 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 240nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.025	76472	16866	20.152	4700	1.282	--
2	2.307	302999	65361	79.848	5819	1.109	2.355
总计		379472	82226	100.000			

图80 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定长期12月HPLC图谱
自制品-2025021021批-pH6.8介质-篮法-100转-20min-片6
供试品溶液-1




SMF-4035

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 240nm
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 0-66/18-284-2 - zzp-2025021021p-cq12y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-30min-P1.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-RC-Fx267.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20260310-FX267.lcb
 样品瓶号: 2-5
 进样体积: 10μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2026/03/10 18:57:22 实验者: wangdan
 处理时间 (V2): 2026/03/11 11:50:33 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 240nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.025	85008	18766	21.274	4713	1.282	--
2	2.307	314571	67931	78.726	5818	1.108	2.355
总计		399579	86697	100.000			

图81 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定长期12月HPLC图谱
 自制品-2025021021批-pH6.8介质-篮法-100转-30min-片1
 供试品溶液-1




SMF-4035

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 240nm
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 0-66/18-285-2 - zzp-2025021021p-cq12y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-30min-P2.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-RC-Fx267.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20260310-FX267.lcb
 样品瓶号: 2-14
 进样体积: 10μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2026/03/10 19:01:15 实验者: wangdan
 处理时间 (V2) : 2026/03/11 11:50:41 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 240nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.025	83714	18453	21.463	4704	1.281	--
2	2.307	306325	66259	78.537	5832	1.106	2.356
总计		390039	84712	100.000			

图82 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定长期12月HPLC图谱
 自制品-2025021021批-pH6.8介质-篮法-100转-30min-片2
 供试品溶液-1




SMF-4035

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 240nm
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 0-66/18-286-2 - zzp-2025021021p-cq12y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-30min-P3.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-RC-Fx267.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20260310-FX267.lcb
 样品瓶号: 2-23
 进样体积: 10μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2026/03/10 19:05:10 实验者: wangdan
 处理时间 (V2) : 2026/03/11 11:50:49 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 240nm


峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.025	81608	18041	21.042	4722	1.283	--
2	2.307	306221	66171	78.958	5831	1.106	2.357
总计		387829	84213	100.000			

图83 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定长期12月HPLC图谱
 自制品-2025021021批-pH6.8介质-篮法-100转-30min-片3
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 240nm
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 0-66/18-287-2 - zzp-2025021021p-cq12y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-30min-P4.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-RC-Fx267.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20260310-FX267.lcb
 样品瓶号: 2-32
 进样体积: 10μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2026/03/10 19:09:04 实验者: wangdan
 处理时间 (V2) : 2026/03/11 11:50:56 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 240nm


峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.025	85302	18804	22.856	4700	1.282	--
2	2.306	287919	62226	77.144	5814	1.107	2.354
总计		373221	81030	100.000			

图84 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定长期12月HPLC图谱
 自制品-2025021021批-pH6.8介质-篮法-100转-30min-片4
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 240nm
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 0-66/18-289-2 - zzp-2025021021p-cq12y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-30min-P6.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-RC-Fx267.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20260310-FX267.lcb
 样品瓶号: 2-50
 进样体积: 10μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2026/03/10 19:16:51 实验者: wangdan
 处理时间 (V2) : 2026/03/11 11:51:11 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 240nm


峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.025	79064	17482	20.598	4716	1.277	--
2	2.306	304781	65908	79.402	5816	1.106	2.354
总计		383845	83390	100.000			

图86 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定长期12月HPLC图谱
 自制品-2025021021批-pH6.8介质-篮法-100转-30min-片6
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5µm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 240nm
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 0-66/18-290-2 - zzp-2025021021p-cq12y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-45min-P1.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-RC-Fx267.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20260310-FX267.lcb
 样品瓶号: 2-6
 进样体积: 10µl 版本号: 6.115
 进样时间: 2026/03/10 19:20:46 实验者: wangdan
 处理时间 (V2) : 2026/03/11 11:51:19 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 240nm


峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.024	87471	19288	21.618	4702	1.281	--
2	2.305	317151	68621	78.382	5807	1.108	2.353
总计		404621	87908	100.000			

图87 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定长期12月HPLC图谱
 自制品-2025021021批-pH6.8介质-篮法-100转-45min-片1
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 240nm
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 0-66/18-291-2 - zzp-2025021021p-cq12y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-45min-P2.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-RC-Fx267.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20260310-FX267.lcb
 样品瓶号: 2-15
 进样体积: 10μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2026/03/10 19:24:39 实验者: wangdan
 处理时间 (V2) : 2026/03/11 11:51:27 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 240nm


峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.024	84586	18679	21.543	4701	1.281	--
2	2.306	308057	66675	78.457	5812	1.106	2.353
总计		392643	85354	100.000			

图88 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定长期12月HPLC图谱
 自制品-2025021021批-pH6.8介质-篮法-100转-45min-片2
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 240nm
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 0-66/18-292-2 - zzp-2025021021p-cq12y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-45min-P3.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-RC-Fx267.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20260310-FX267.lcb
 样品瓶号: 2-24
 进样体积: 10μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2026/03/10 19:28:33 实验者: wangdan
 处理时间 (V2) : 2026/03/11 11:51:35 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 240nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.025	83276	18381	21.278	4704	1.281	--
2	2.306	308097	66626	78.722	5808	1.107	2.352
总计		391373	85007	100.000			

图89 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定长期12月HPLC图谱
 自制品-2025021021批-pH6.8介质-篮法-100转-45min-片3
 供试品溶液-1




SMF-4035

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 240nm
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 0-66/18-293-2 - zzp-2025021021p-cq12y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-45min-P4.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-RC-Fx267.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20260310-FX267.lcb
 样品瓶号: 2-33
 进样体积: 10μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2026/03/10 19:32:27 实验者: wangdan
 处理时间 (V2) : 2026/03/11 11:51:43 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 240nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.025	87281	19250	23.077	4699	1.282	--
2	2.306	290941	62963	76.923	5821	1.106	2.353
总计		378222	82213	100.000			

图90 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定长期12月HPLC图谱
 自制品-2025021021批-pH6.8介质-篮法-100转-45min-片4
 供试品溶液-1




SMF-4035

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 240nm
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 0-66/18-294-2 - zzp-2025021021p-cq12y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-45min-P5.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-RC-Fx267.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20260310-FX267.lcb
 样品瓶号: 2-42
 进样体积: 10μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2026/03/10 19:36:21 实验者: wangdan
 处理时间 (V2) : 2026/03/11 11:51:51 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 240nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.024	95134	21015	22.681	4710	1.281	--
2	2.305	324316	70364	77.319	5819	1.106	2.356
总计		419451	91379	100.000			

图91 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定长期12月HPLC图谱
 自制品-2025021021批-pH6.8介质-篮法-100转-45min-片5
 供试品溶液-1




SMF-4035

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 240nm
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 0-66/18-295-2 - zzp-2025021021p-cq12y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-45min-P6.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-RC-Fx267.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20260310-FX267.lcb
 样品瓶号: 2-51
 进样体积: 10μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2026/03/10 19:40:14 实验者: wangdan
 处理时间 (V2): 2026/03/11 11:51:59 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 240nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.025	79066	17464	20.562	4703	1.277	--
2	2.306	305453	66198	79.438	5833	1.105	2.353
总计		384519	83662	100.000			

图92 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定长期12月HPLC图谱
 自制品-2025021021批-pH6.8介质-篮法-100转-45min-片6
 供试品溶液-1




SMF-4035

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 240nm
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 0-66/18-296-2 - zzp-2025021021p-cq12y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-JX-P1.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-RC-Fx267.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20260310-FX267.lcb
 样品瓶号: 2-7
 进样体积: 10μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2026/03/10 19:44:08 实验者: wangdan
 处理时间 (V2) : 2026/03/11 11:52:07 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 240nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.025	87537	19346	21.540	4711	1.279	--
2	2.306	318857	68996	78.460	5825	1.107	2.353
总计		406394	88342	100.000			

图93 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定长期12月HPLC图谱
 自制品-2025021021批-pH6.8介质-篮法-100转-极限转速-片1
 供试品溶液-1




SMF-4035

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 240nm
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 0-66/18-297-2 - zzp-2025021021p-cq12y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-JX-P2.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-RC-Fx267.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20260310-FX267.lcb
 样品瓶号: 2-16
 进样体积: 10μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2026/03/10 19:48:02 实验者: wangdan
 处理时间 (V2) : 2026/03/11 11:52:14 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 240nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.025	86450	19061	21.815	4709	1.283	--
2	2.306	309833	66976	78.185	5810	1.108	2.353
总计		396283	86037	100.000			

图94 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定长期12月HPLC图谱
 自制品-2025021021批-pH6.8介质-篮法-100转-极限转速-片2
 供试品溶液-1




SMF-4035

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 240nm
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 0-66/18-303-2 - zzp-2025021021p-cq12y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-dz2-2.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-RC-Fx267.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20260310-FX267.lcb
 样品瓶号: 2-27
 进样体积: 10μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2026/03/10 20:11:26 实验者: wangdan
 处理时间 (V2) : 2026/03/11 11:53:00 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 240nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.010	92783	19471	19.995	4156	1.261	--
2	2.289	371238	75315	80.005	5002	1.118	2.198
总计		464021	94786	100.000			

图100 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定长期12月HPLC图谱
 自制品-2025021021批-pH6.8介质-篮法-100转
 对照品溶液-2-2




SMF-4035

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 240nm
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 0-66/18-304-2 - zzp-2025021121p-cq12y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx1-rj.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-RC-Fx267.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20260310-FX267.lcb
 样品瓶号: 3-9
 进样体积: 10μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2026/03/10 20:15:19 实验者: wangdan
 处理时间 (V2) : 2026/03/11 11:53:08 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 240nm


峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图101 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定长期12月HPLC图谱
 自制品-2025021121批-pH6.8介质-篮法-100转
 溶剂

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 240nm
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 0-66/18-306-2 - zzp-2025021121p-cq12y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx1-dz1-2.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-RC-Fx267.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20260310-FX267.lcb
 样品瓶号: 3-18
 进样体积: 10μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2026/03/10 20:23:05 实验者: wangdan
 处理时间 (V2): 2026/03/11 11:53:23 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 240nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.011	94157	19808	20.021	4174	1.259	--
2	2.290	376133	76545	79.979	5027	1.117	2.201
总计		470290	96354	100.000			

图103 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定长期12月HPLC图谱
自制品-2025021121批-pH6.8介质-篮法-100转
对照品溶液-1-2




SMF-4035

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 240nm
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 0-66/18-308-2 - zzp-2025021121p-cq12y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx1-dz1-4.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-RC-Fx267.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20260310-FX267.lcb
 样品瓶号: 3-18
 进样体积: 10μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2026/03/10 20:30:50 实验者: wangdan
 处理时间 (V2): 2026/03/11 11:53:38 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 240nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.011	94119	19831	20.013	4184	1.257	--
2	2.290	376172	76583	79.987	5028	1.115	2.202
总计		470291	96414	100.000			

图105 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定长期12月HPLC图谱
 自制品-2025021121批-pH6.8介质-篮法-100转
 对照品溶液-1-4




SMF-4035

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 240nm
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 0-66/18-309-2 - zzp-2025021121p-cq12y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx1-dz1-5.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-RC-Fx267.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20260310-FX267.lcb
 样品瓶号: 3-18
 进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2026/03/10 20:34:43 实验者: wangdan
 处理时间 (V2) : 2026/03/11 11:53:46 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 240nm


峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.011	94120	19791	20.024	4173	1.260	--
2	2.290	375923	76476	79.976	5025	1.117	2.200
总计		470042	96268	100.000			

图106 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定长期12月HPLC图谱
 自制品-2025021121批-pH6.8介质-篮法-100转
 对照品溶液-1-5

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 240nm
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 0-66/18-310-2 - zzp-2025021121p-cq12y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx1-5min-P1.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-RC-Fx267.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20260310-FX267.lcb
 样品瓶号: 3-1
 进样体积: 10μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2026/03/10 20:38:35 实验者: wangdan
 处理时间 (V2) : 2026/03/11 11:53:54 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 240nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.025	49800	10943	17.866	4671	1.282	--
2	2.306	228943	49668	82.134	5837	1.105	2.345
总计		278743	60611	100.000			

图107 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定长期12月HPLC图谱
自制品-2025021121批-pH6.8介质-篮法-100转-5min-片1
供试品溶液-1




SMF-4035

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 240nm
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 0-66/18-311-2 - zzp-2025021121p-cq12y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx1-5min-P2.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-RC-Fx267.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20260310-FX267.lcb
 样品瓶号: 3-10
 进样体积: 10μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2026/03/10 20:42:28 实验者: wangdan
 处理时间 (V2): 2026/03/11 11:54:01 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 240nm


峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.026	53214	11687	18.442	4680	1.283	--
2	2.307	235326	50901	81.558	5842	1.106	2.347
总计		288540	62587	100.000			

图108 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定长期12月HPLC图谱
 自制品-2025021121批-pH6.8介质-篮法-100转-5min-片2
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 240nm
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 0-66/18-312-2 - zzp-2025021121p-cq12y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx1-5min-P3.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-RC-Fx267.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20260310-FX267.lcb
 样品瓶号: 3-19
 进样体积: 10μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2026/03/10 20:46:20 实验者: wangdan
 处理时间 (V2) : 2026/03/11 11:54:09 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 240nm


峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.025	50416	11095	17.718	4681	1.281	--
2	2.306	234124	50756	82.282	5838	1.106	2.346
总计		284539	61852	100.000			

图109 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定长期12月HPLC图谱
 自制品-2025021121批-pH6.8介质-篮法-100转-5min-片3
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5µm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 240nm
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 0-66/18-313-2 - zzp-2025021121p-cq12y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx1-5min-P4.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-RC-Fx267.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20260310-FX267.lcb
 样品瓶号: 3-28
 进样体积: 10µl 版本号: 6.115
 进样时间: 2026/03/10 20:50:12 实验者: wangdan
 处理时间 (V2): 2026/03/11 11:54:16 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 240nm


峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.026	52550	11534	18.198	4676	1.282	--
2	2.307	236210	51043	81.802	5829	1.108	2.344
总计		288760	62577	100.000			

图110 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定长期12月HPLC图谱
自制品-2025021121批-pH6.8介质-篮法-100转-5min-片4
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 240nm
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 0-66/18-314-2 - zzp-2025021121p-cq12y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx1-5min-P5.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-RC-Fx267.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20260310-FX267.lcb
 样品瓶号: 3-37
 进样体积: 10μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2026/03/10 20:54:04 实验者: wangdan
 处理时间 (V2) : 2026/03/11 11:54:24 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 240nm


峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.026	56108	12342	18.580	4686	1.281	--
2	2.307	245878	53237	81.420	5833	1.106	2.345
总计		301986	65579	100.000			

图111 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定长期12月HPLC图谱
自制品-2025021121批-pH6.8介质-篮法-100转-5min-片5
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 240nm
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 0-66/18-315-2 - zzp-2025021121p-cq12y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx1-5min-P6.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-RC-Fx267.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20260310-FX267.lcb
 样品瓶号: 3-46
 进样体积: 10μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2026/03/10 20:57:56 实验者: wangdan
 处理时间 (V2) : 2026/03/11 11:54:32 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 240nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.026	54058	11884	17.939	4683	1.280	--
2	2.307	247288	53584	82.061	5840	1.106	2.345
总计		301346	65468	100.000			


图112 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定长期12月HPLC图谱
 自制品-2025021121批-pH6.8介质-篮法-100转-5min-片6
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 240nm
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 0-66/18-317-2 - zzp-2025021121p-cq12y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx1-10min-P2.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-RC-Fx267.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20260310-FX267.lcb
 样品瓶号: 3-11
 进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2026/03/10 21:05:39 实验者: wangdan
 处理时间 (V2): 2026/03/11 11:54:47 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 240nm


峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.026	76761	16937	20.758	4706	1.279	--
2	2.306	293029	63452	79.242	5826	1.108	2.347
总计		369791	80389	100.000			

图114 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定长期12月HPLC图谱
 自制品-2025021121批-pH6.8介质-篮法-100转-10min-片2
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 240nm
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 0-66/18-319-2 - zzp-2025021121p-cq12y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx1-10min-P4.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-RC-Fx267.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20260310-FX267.lcb
 样品瓶号: 3-29
 进样体积: 10μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2026/03/10 21:13:24 实验者: wangdan
 处理时间 (V2) : 2026/03/11 11:55:02 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 240nm


峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.025	75627	16701	20.567	4711	1.282	--
2	2.306	292075	63410	79.433	5832	1.107	2.348
总计		367701	80111	100.000			

图116 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定长期12月HPLC图谱
 自制品-2025021121批-pH6.8介质-篮法-100转-10min-片4
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5µm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 240nm
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 0-66/18-320-2 - zzp-2025021121p-cq12y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx1-10min-P5.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-RC-Fx267.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20260310-FX267.lcb
 样品瓶号: 3-38
 进样体积: 10µl 版本号: 6.115
 进样时间: 2026/03/10 21:17:16 实验者: wangdan
 处理时间 (V2) : 2026/03/11 11:55:10 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 240nm


峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.025	77764	17168	20.584	4705	1.279	--
2	2.306	300021	65117	79.416	5840	1.107	2.348
总计		377785	82285	100.000			

图117 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定长期12月HPLC图谱
 自制品-2025021121批-pH6.8介质-篮法-100转-10min-片5
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 240nm
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 0-66/18-327-2 - zzp-2025021121p-cq12y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx1-15min-P6.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-RC-Fx267.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20260310-FX267.lcb
 样品瓶号: 3-48
 进样体积: 10μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2026/03/10 21:44:20 实验者: wangdan
 处理时间 (V2) : 2026/03/11 11:56:04 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 240nm


峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.025	83974	18534	21.107	4722	1.280	--
2	2.305	313873	68121	78.893	5824	1.108	2.346
总计		397848	86655	100.000			

图124 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定长期12月HPLC图谱
 自制品-2025021121批-pH6.8介质-篮法-100转-15min-片6
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5µm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 240nm
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 0-66/18-328-2 - zzp-2025021121p-cq12y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx1-20min-P1.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-RC-Fx267.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20260310-FX267.lcb
 样品瓶号: 3-4
 进样体积: 10µl 版本号: 6.115
 进样时间: 2026/03/10 21:48:12 实验者: wangdan
 处理时间 (V2): 2026/03/11 11:56:12 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 240nm


峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.025	79859	17643	20.984	4698	1.278	--
2	2.305	300705	65296	79.016	5821	1.107	2.344
总计		380564	82939	100.000			

图125 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定长期12月HPLC图谱
 自制品-2025021121批-pH6.8介质-篮法-100转-20min-片1
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 240nm
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 0-66/18-330-2 - zzp-2025021121p-cq12y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx1-20min-P3.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-RC-Fx267.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20260310-FX267.lcb
 样品瓶号: 3-22
 进样体积: 10μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2026/03/10 21:55:56 实验者: wangdan
 处理时间 (V2): 2026/03/11 11:56:27 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 240nm


峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.026	81002	17899	20.821	4715	1.277	--
2	2.306	308031	66833	79.179	5827	1.108	2.346
总计		389033	84732	100.000			

图127 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定长期12月HPLC图谱
 自制品-2025021121批-pH6.8介质-篮法-100转-20min-片3
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 240nm
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 0-66/18-331-2 - zzp-2025021121p-cq12y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx1-20min-P4.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-RC-Fx267.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20260310-FX267.lcb
 样品瓶号: 3-31
 进样体积: 10μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2026/03/10 21:59:48 实验者: wangdan
 处理时间 (V2) : 2026/03/11 11:56:35 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 240nm


峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.025	84977	18776	21.768	4720	1.278	--
2	2.306	305393	66221	78.232	5829	1.108	2.347
总计		390370	84997	100.000			

图128 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定长期12月HPLC图谱
 自制品-2025021121批-pH6.8介质-篮法-100转-20min-片4
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5µm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 240nm
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 0-66/18-333-2 - zzp-2025021121p-cq12y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx1-20min-P6.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-RC-Fx267.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20260310-FX267.lcb
 样品瓶号: 3-49
 进样体积: 10µl 版本号: 6.115
 进样时间: 2026/03/10 22:07:32 实验者: wangdan
 处理时间 (V2) : 2026/03/11 11:56:50 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 240nm


峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.026	84902	18659	21.175	4690	1.286	--
2	2.305	316052	68465	78.825	5815	1.112	2.336
总计		400954	87124	100.000			

图130 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定长期12月HPLC图谱
 自制品-2025021121批-pH6.8介质-篮法-100转-20min-片6
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 240nm
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 0-66/18-335-2 - zzp-2025021121p-cq12y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx1-30min-P2.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-RC-Fx267.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20260310-FX267.lcb
 样品瓶号: 3-14
 进样体积: 10μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2026/03/10 22:15:15 实验者: wangdan
 处理时间 (V2) : 2026/03/11 11:57:06 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 240nm


峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.025	87710	19351	22.051	4714	1.281	--
2	2.305	310049	67236	77.949	5823	1.109	2.344
总计		397759	86587	100.000			

图132 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定长期12月HPLC图谱
 自制品-2025021121批-pH6.8介质-篮法-100转-30min-片2
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 240nm
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 0-66/18-336-2 - zzp-2025021121p-cq12y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx1-30min-P3.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-RC-Fx267.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20260310-FX267.lcb
 样品瓶号: 3-23
 进样体积: 10μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2026/03/10 22:19:07 实验者: wangdan
 处理时间 (V2) : 2026/03/11 11:57:14 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 240nm


峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.026	81721	18055	20.838	4716	1.278	--
2	2.305	310444	67382	79.162	5829	1.108	2.344
总计		392164	85437	100.000			

图133 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定长期12月HPLC图谱
 自制品-2025021121批-pH6.8介质-篮法-100转-30min-片3
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5µm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 240nm
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 0-66/18-337-2 - zzp-2025021121p-cq12y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx1-30min-P4.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-RC-Fx267.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20260310-FX267.lcb
 样品瓶号: 3-32
 进样体积: 10µl 版本号: 6.115
 进样时间: 2026/03/10 22:22:58 实验者: wangdan
 处理时间 (V2) : 2026/03/11 11:57:21 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 240nm


峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.025	85655	18912	21.801	4707	1.280	--
2	2.304	307238	66715	78.199	5819	1.107	2.343
总计		392892	85627	100.000			

图134 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定长期12月HPLC图谱
 自制品-2025021121批-pH6.8介质-篮法-100转-30min-片4
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 240nm
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 0-66/18-338-2 - zzp-2025021121p-cq12y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx1-30min-P5.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-RC-Fx267.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20260310-FX267.lcb
 样品瓶号: 3-41
 进样体积: 10μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2026/03/10 22:26:50 实验者: wangdan
 处理时间 (V2) : 2026/03/11 11:57:29 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 240nm


峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.025	88744	19550	21.881	4713	1.286	--
2	2.305	316836	68720	78.119	5825	1.109	2.339
总计		405581	88270	100.000			

图135 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定长期12月HPLC图谱
 自制品-2025021121批-pH6.8介质-篮法-100转-30min-片5
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 240nm
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 0-66/18-343-2 - zzp-2025021121p-cq12y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx1-45min-P4.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-RC-Fx267.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20260310-FX267.lcb
 样品瓶号: 3-33
 进样体积: 10μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2026/03/10 22:46:09 实验者: wangdan
 处理时间 (V2) : 2026/03/11 11:58:08 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 240nm


峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.026	87497	19241	22.061	4703	1.285	--
2	2.306	309123	66957	77.939	5833	1.109	2.339
总计		396620	86197	100.000			

图140 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定长期12月HPLC图谱
自制品-2025021121批-pH6.8介质-篮法-100转-45min-片4
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 240nm
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 0-66/18-344-2 - zzp-2025021121p-cq12y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx1-45min-P5.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-RC-Fx267.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20260310-FX267.lcb
 样品瓶号: 3-42
 进样体积: 10μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2026/03/10 22:50:00 实验者: wangdan
 处理时间 (V2) : 2026/03/11 11:58:16 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 240nm


峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.026	91091	20098	22.189	4724	1.279	--
2	2.306	319430	69224	77.811	5828	1.107	2.342
总计		410521	89322	100.000			

图141 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定长期12月HPLC图谱
 自制品-2025021121批-pH6.8介质-篮法-100转-45min-片5
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 240nm
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 0-66/18-345-2 - zzp-2025021121p-cq12y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx1-45min-P6.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-RC-Fx267.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20260310-FX267.lcb
 样品瓶号: 3-51
 进样体积: 10μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2026/03/10 22:53:51 实验者: wangdan
 处理时间 (V2) : 2026/03/11 11:58:23 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 240nm


峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.026	82300	18127	20.356	4719	1.281	--
2	2.305	322010	69804	79.644	5819	1.110	2.336
总计		404310	87931	100.000			

图142 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定长期12月HPLC图谱
 自制品-2025021121批-pH6.8介质-篮法-100转-45min-片6
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5µm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 240nm
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 0-66/18-346-2 - zzp-2025021121p-cq12y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx1-JX-P1.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-RC-Fx267.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20260310-FX267.lcb
 样品瓶号: 3-7
 进样体积: 10µl 版本号: 6.115
 进样时间: 2026/03/10 22:57:42 实验者: wangdan
 处理时间 (V2) : 2026/03/11 11:58:31 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 240nm


峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.026	81625	18016	21.127	4720	1.278	--
2	2.305	304728	66095	78.873	5817	1.109	2.339
总计		386353	84110	100.000			

图143 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定长期12月HPLC图谱
 自制品-2025021121批-pH6.8介质-篮法-100转-极限转速-片1
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5µm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 240nm
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 0-66/18-347-2 - zzp-2025021121p-cq12y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx1-JX-P2.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-RC-Fx267.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20260310-FX267.lcb
 样品瓶号: 3-16
 进样体积: 10µl 版本号: 6.115
 进样时间: 2026/03/10 23:01:34 实验者: wangdan
 处理时间 (V2) : 2026/03/11 11:58:39 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 240nm


峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.026	85535	18850	21.535	4715	1.279	--
2	2.306	311658	67649	78.465	5825	1.107	2.339
总计		397193	86499	100.000			

图144 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定长期12月HPLC图谱
 自制品-2025021121批-pH6.8介质-篮法-100转-极限转速-片2
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 240nm
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 0-66/18-348-2 - zzp-2025021121p-cq12y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx1-JX-P3.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-RC-Fx267.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20260310-FX267.lcb
 样品瓶号: 3-25
 进样体积: 10μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2026/03/10 23:05:25 实验者: wangdan
 处理时间 (V2) : 2026/03/11 11:58:46 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 240nm


峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.026	84618	18612	21.303	4703	1.283	--
2	2.305	312595	67756	78.697	5819	1.108	2.335
总计		397213	86368	100.000			

图145 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定长期12月HPLC图谱
 自制品-2025021121批-pH6.8介质-篮法-100转-极限转速-片3
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 240nm
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 0-66/18-349-2 - zzp-2025021121p-cq12y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx1-JX-P4.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-RC-Fx267.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20260310-FX267.lcb
 样品瓶号: 3-34
 进样体积: 10μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2026/03/10 23:09:16 实验者: wangdan
 处理时间 (V2) : 2026/03/11 11:58:54 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 240nm


峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.026	87439	19236	22.036	4706	1.284	--
2	2.305	309369	67052	77.964	5821	1.109	2.336
总计		396808	86288	100.000			

图146 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定长期12月HPLC图谱
 自制品-2025021121批-pH6.8介质-篮法-100转-极限转速-片4
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 240nm
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 0-66/18-350-2 - zzp-2025021121p-cq12y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx1-JX-P5.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-RC-Fx267.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20260310-FX267.lcb
 样品瓶号: 3-43
 进样体积: 10μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2026/03/10 23:13:07 实验者: wangdan
 处理时间 (V2) : 2026/03/11 11:59:03 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 240nm


峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.026	91108	20139	22.136	4731	1.280	--
2	2.305	320474	69547	77.864	5816	1.108	2.338
总计		411582	89687	100.000			

图147 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定长期12月HPLC图谱
 自制品-2025021121批-pH6.8介质-篮法-100转-极限转速-片5
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 240nm
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 0-66/18-352-2 - zzp-2025021121p-cq12y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx1-dz2-1.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-RC-Fx267.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20260310-FX267.lcb
 样品瓶号: 3-27
 进样体积: 10μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2026/03/10 23:20:50 实验者: wangdan
 处理时间 (V2) : 2026/03/11 11:59:19 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 240nm


峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.011	93359	19634	20.008	4168	1.259	--
2	2.288	373257	75665	79.992	5018	1.117	2.185
总计		466616	95299	100.000			

图149 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定长期12月HPLC图谱
 自制品-2025021121批-pH6.8介质-篮法-100转
 对照品溶液-2-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 240nm
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 0-66/18-353-2 - zzp-2025021121p-cq12y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx1-dz2-2.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-RC-Fx267.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20260310-FX267.lcb
 样品瓶号: 3-27
 进样体积: 10μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2026/03/10 23:24:42 实验者: wangdan
 处理时间 (V2) : 2026/03/11 11:59:27 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 240nm


峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.011	93276	19626	19.977	4168	1.258	--
2	2.288	373639	75793	80.023	5017	1.117	2.184
总计		466915	95419	100.000			

图150 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定长期12月HPLC图谱
 自制品-2025021121批-pH6.8介质-篮法-100转
 对照品溶液-2-2

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 240nm
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 0-66/18-354-2 - zzp-2025021121p-cq12y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-rj.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-RC-Fx267.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20260310-FX267.lcb
 样品瓶号: 4-9
 进样体积: 10μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2026/03/10 23:28:36 实验者: wangdan
 处理时间 (V2) : 2026/03/11 11:59:36 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 240nm


峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图151 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定长期12月HPLC图谱
自制品-2025021121批-pH6.8介质-篮法-100转
溶剂

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 240nm
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 0-66/18-356-2 - zzp-2025021121p-cq12y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-dz1-2.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-RC-Fx267.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20260310-FX267.lcb
 样品瓶号: 4-18
 进样体积: 10μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2026/03/10 23:36:23 实验者: wangdan
 处理时间 (V2): 2026/03/11 11:59:51 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 240nm


峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.010	92718	19507	19.943	4170	1.258	--
2	2.287	372188	75451	80.057	5006	1.118	2.183
总计		464906	94958	100.000			

图153 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定长期12月HPLC图谱
自制品-2025021121批-pH6.8介质-篮法-100转
对照品溶液-1-2

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 240nm
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 0-66/18-357-2 - zzp-2025021121p-cq12y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-dz1-3.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-RC-Fx267.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20260310-FX267.lcb
 样品瓶号: 4-18
 进样体积: 10μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2026/03/10 23:40:17 实验者: wangdan
 处理时间 (V2): 2026/03/11 11:59:59 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 240nm


峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.010	92674	19515	19.948	4177	1.258	--
2	2.287	371914	75396	80.052	5010	1.117	2.184
总计		464588	94911	100.000			

图154 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定长期12月HPLC图谱
 自制品-2025021121批-pH6.8介质-篮法-100转
 对照品溶液-1-3

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 240nm
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 0-66/18-358-2 - zzp-2025021121p-cq12y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-dz1-4.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-RC-Fx267.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20260310-FX267.lcb
 样品瓶号: 4-18
 进样体积: 10μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2026/03/10 23:44:11 实验者: wangdan
 处理时间 (V2): 2026/03/11 12:00:07 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 240nm


峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.010	92707	19508	19.952	4167	1.257	--
2	2.287	371945	75446	80.048	5016	1.117	2.182
总计		464653	94954	100.000			

图155 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定长期12月HPLC图谱
 自制品-2025021121批-pH6.8介质-篮法-100转
 对照品溶液-1-4

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 240nm
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 0-66/18-360-2 - zzp-2025021121p-cq12y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-5min-P1.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-RC-Fx267.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20260310-FX267.lcb
 样品瓶号: 4-1
 进样体积: 10μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2026/03/10 23:51:58 实验者: wangdan
 处理时间 (V2) : 2026/03/11 12:00:23 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 240nm


峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.026	52077	11447	17.573	4686	1.283	--
2	2.305	244264	53123	82.427	5829	1.105	2.329
总计		296340	64570	100.000			

图157 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定长期12月HPLC图谱
自制品-2025021121批-pH6.8介质-篮法-100转-5min-片1
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 240nm
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 0-66/18-361-2 - zzp-2025021121p-cq12y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-5min-P2.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-RC-Fx267.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20260310-FX267.lcb
 样品瓶号: 4-10
 进样体积: 10μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2026/03/10 23:55:51 实验者: wangdan
 处理时间 (V2): 2026/03/11 12:00:31 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 240nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.026	50615	11154	17.022	4696	1.280	--
2	2.305	246730	53589	82.978	5821	1.106	2.329
总计		297345	64743	100.000			

图158 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定长期12月HPLC图谱
自制品-2025021121批-pH6.8介质-篮法-100转-5min-片2
供试品溶液-1




SMF-4035

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 240nm
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 0-66/18-362-2 - zzp-2025021121p-cq12y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-5min-P3.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-RC-Fx267.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20260310-FX267.lcb
 样品瓶号: 4-19
 进样体积: 10μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2026/03/10 23:59:43 实验者: wangdan
 处理时间 (V2) : 2026/03/11 12:00:38 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 240nm


峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.025	39256	8660	19.134	4689	1.273	--
2	2.304	165909	36097	80.866	5834	1.101	2.333
总计		205165	44757	100.000			

图159 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定长期12月HPLC图谱
 自制品-2025021121批-pH6.8介质-篮法-100转-5min-片3
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 240nm
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 0-66/18-363-2 - zzp-2025021121p-cq12y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-5min-P4.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-RC-Fx267.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20260310-FX267.lcb
 样品瓶号: 4-28
 进样体积: 10μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2026/03/11 00:03:35 实验者: wangdan
 处理时间 (V2) : 2026/03/11 12:00:46 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 240nm


峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.025	50242	11071	17.557	4680	1.279	--
2	2.304	235921	51335	82.443	5837	1.103	2.328
总计		286163	62406	100.000			

图160 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定长期12月HPLC图谱
自制品-2025021121批-pH6.8介质-篮法-100转-5min-片4
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 240nm
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 0-66/18-364-2 - zzp-2025021121p-cq12y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-5min-P5.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-RC-Fx267.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20260310-FX267.lcb
 样品瓶号: 4-37
 进样体积: 10μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2026/03/11 00:07:27 实验者: wangdan
 处理时间 (V2): 2026/03/11 12:00:54 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 240nm


峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.026	46480	10256	17.195	4693	1.276	--
2	2.304	223824	48727	82.805	5842	1.103	2.329
总计		270304	58984	100.000			

图161 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定长期12月HPLC图谱
自制品-2025021121批-pH6.8介质-篮法-100转-5min-片5
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 240nm
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 0-66/18-365-2 - zzp-2025021121p-cq12y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-5min-P6.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-RC-Fx267.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20260310-FX267.lcb
 样品瓶号: 4-46
 进样体积: 10μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2026/03/11 00:11:19 实验者: wangdan
 处理时间 (V2): 2026/03/11 12:01:02 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 240nm


峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.026	48095	10576	17.819	4676	1.282	--
2	2.304	221814	48169	82.181	5832	1.106	2.327
总计		269909	58745	100.000			

图162 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定长期12月HPLC图谱
自制品-2025021121批-pH6.8介质-篮法-100转-5min-片6
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 240nm
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 0-66/18-368-2 - zzp-2025021121p-cq12y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-10min-P3.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-RC-Fx267.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20260310-FX267.lcb
 样品瓶号: 4-20
 进样体积: 10μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2026/03/11 00:22:57 实验者: wangdan
 处理时间 (V2) : 2026/03/11 12:01:25 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 240nm


峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.025	62942	13894	21.204	4695	1.276	--
2	2.303	233896	50848	78.796	5830	1.103	2.328
总计		296838	64742	100.000			

图165 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定长期12月HPLC图谱
 自制品-2025021121批-pH6.8介质-篮法-100转-10min-片3
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 240nm
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 0-66/18-369-2 - zzp-2025021121p-cq12y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-10min-P4.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-RC-Fx267.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20260310-FX267.lcb
 样品瓶号: 4-29
 进样体积: 10μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2026/03/11 00:26:49 实验者: wangdan
 处理时间 (V2) : 2026/03/11 12:01:32 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 240nm


峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.025	74345	16415	20.287	4711	1.280	--
2	2.303	292128	63409	79.713	5817	1.107	2.327
总计		366474	79824	100.000			

图166 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定长期12月HPLC图谱
 自制品-2025021121批-pH6.8介质-篮法-100转-10min-片4
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5µm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 240nm
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 0-66/18-370-2 - zzp-2025021121p-cq12y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-10min-P5.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-RC-Fx267.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20260310-FX267.lcb
 样品瓶号: 4-38
 进样体积: 10µl 版本号: 6.115
 进样时间: 2026/03/11 00:30:41 实验者: wangdan
 处理时间 (V2) : 2026/03/11 12:01:40 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 240nm


峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.026	70225	15486	19.647	4704	1.281	--
2	2.304	287211	62356	80.353	5818	1.106	2.325
总计		357435	77842	100.000			

图167 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定长期12月HPLC图谱
 自制品-2025021121批-pH6.8介质-篮法-100转-10min-片5
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5µm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 240nm
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 0-66/18-371-2 - zzp-2025021121p-cq12y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-10min-P6.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-RC-Fx267.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20260310-FX267.lcb
 样品瓶号: 4-47
 进样体积: 10µl 版本号: 6.115
 进样时间: 2026/03/11 00:34:33 实验者: wangdan
 处理时间 (V2) : 2026/03/11 12:01:48 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 240nm


峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.025	76892	16960	20.381	4702	1.280	--
2	2.303	300387	65177	79.619	5814	1.108	2.326
总计		377280	82137	100.000			

图168 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定长期12月HPLC图谱
 自制品-2025021121批-pH6.8介质-篮法-100转-10min-片6
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5µm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 240nm
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 0-66/18-372-2 - zzp-2025021121p-cq12y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-15min-P1.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-RC-Fx267.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20260310-FX267.lcb
 样品瓶号: 4-3
 进样体积: 10µl 版本号: 6.115
 进样时间: 2026/03/11 00:38:26 实验者: wangdan
 处理时间 (V2) : 2026/03/11 12:01:55 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 240nm


峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.027	78695	17326	20.292	4718	1.280	--
2	2.304	309118	67173	79.708	5827	1.107	2.326
总计		387813	84499	100.000			

图169 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定长期12月HPLC图谱
 自制品-2025021121批-pH6.8介质-篮法-100转-15min-片1
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 240nm
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 0-66/18-373-2 - zzp-2025021121p-cq12y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-15min-P2.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-RC-Fx267.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20260310-FX267.lcb
 样品瓶号: 4-12
 进样体积: 10μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2026/03/11 00:42:18 实验者: wangdan
 处理时间 (V2): 2026/03/11 12:02:03 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 240nm


峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.025	74243	16411	19.596	4723	1.281	--
2	2.303	304624	66103	80.404	5813	1.106	2.325
总计		378866	82514	100.000			

图170 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定长期12月HPLC图谱
 自制品-2025021121批-pH6.8介质-篮法-100转-15min-片2
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 240nm
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 0-66/18-374-2 - zzp-2025021121p-cq12y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-15min-P3.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-RC-Fx267.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20260310-FX267.lcb
 样品瓶号: 4-21
 进样体积: 10μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2026/03/11 00:46:11 实验者: wangdan
 处理时间 (V2) : 2026/03/11 12:02:12 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 240nm


峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.026	76946	16986	21.979	4710	1.279	--
2	2.304	273143	59301	78.021	5817	1.106	2.328
总计		350089	76287	100.000			

图171 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定长期12月HPLC图谱
 自制品-2025021121批-pH6.8介质-篮法-100转-15min-片3
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 240nm
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 0-66/18-376-2 - zzp-2025021121p-cq12y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-15min-P5.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-RC-Fx267.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20260310-FX267.lcb
 样品瓶号: 4-39
 进样体积: 10μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2026/03/11 00:53:57 实验者: wangdan
 处理时间 (V2): 2026/03/11 12:02:29 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 240nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.026	78936	17429	20.537	4712	1.279	--
2	2.303	305427	66285	79.463	5815	1.106	2.324
总计		384363	83714	100.000			

图173 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定长期12月HPLC图谱
 自制品-2025021121批-pH6.8介质-篮法-100转-15min-片5
 供试品溶液-1




SMF-4035

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 240nm
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 0-66/18-380-2 - zzp-2025021121p-cq12y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-20min-P3.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-RC-Fx267.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20260310-FX267.lcb
 样品瓶号: 4-22
 进样体积: 10μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2026/03/11 01:09:29 实验者: wangdan
 处理时间 (V2): 2026/03/11 12:03:00 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 240nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.026	81473	17919	22.236	4694	1.284	--
2	2.303	284926	61878	77.764	5827	1.107	2.323
总计		366399	79797	100.000			


图177 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定长期12月HPLC图谱
 自制品-2025021121批-pH6.8介质-篮法-100转-20min-片3
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 240nm
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 0-66/18-382-2 - zzp-2025021121p-cq12y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-20min-P5.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-RC-Fx267.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20260310-FX267.lcb
 样品瓶号: 4-40
 进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2026/03/11 01:17:16 实验者: wangdan
 处理时间(V2): 2026/03/11 12:03:15 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 240nm


峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.026	76962	16976	20.026	4707	1.278	--
2	2.303	307344	66706	79.974	5818	1.105	2.321
总计		384306	83682	100.000			

图179 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定长期12月HPLC图谱
 自制品-2025021121批-pH6.8介质-篮法-100转-20min-片5
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 240nm
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 0-66/18-383-2 - zzp-2025021121p-cq12y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-20min-P6.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-RC-Fx267.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20260310-FX267.lcb
 样品瓶号: 4-49
 进样体积: 10μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2026/03/11 01:21:09 实验者: wangdan
 处理时间 (V2) : 2026/03/11 12:03:23 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 240nm


峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.025	86150	19027	21.312	4701	1.279	--
2	2.302	318081	68823	78.688	5806	1.108	2.320
总计		404231	87850	100.000			

图180 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定长期12月HPLC图谱
 自制品-2025021121批-pH6.8介质-篮法-100转-20min-片6
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 240nm
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 0-66/18-384-2 - zzp-2025021121p-cq12y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-30min-P1.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-RC-Fx267.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20260310-FX267.lcb
 样品瓶号: 4-5
 进样体积: 10μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2026/03/11 01:25:03 实验者: wangdan
 处理时间 (V2) : 2026/03/11 12:03:30 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 240nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.026	81668	18005	20.523	4703	1.282	--
2	2.303	316264	68596	79.477	5814	1.107	2.318
总计		397932	86602	100.000			

图181 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定长期12月HPLC图谱
 自制品-2025021121批-pH6.8介质-篮法-100转-30min-片1
 供试品溶液-1




SMF-4035

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 240nm
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 0-66/18-385-2 - zzp-2025021121p-cq12y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-30min-P2.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-RC-Fx267.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20260310-FX267.lcb
 样品瓶号: 4-14
 进样体积: 10μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2026/03/11 01:28:56 实验者: wangdan
 处理时间 (V2): 2026/03/11 12:03:38 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 240nm


峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.026	77676	17125	20.082	4698	1.279	--
2	2.303	309119	67092	79.918	5826	1.104	2.319
总计		386794	84217	100.000			

图182 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定长期12月HPLC图谱
 自制品-2025021121批-pH6.8介质-篮法-100转-30min-片2
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 240nm
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 0-66/18-386-2 - zzp-2025021121p-cq12y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-30min-P3.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-RC-Fx267.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20260310-FX267.lcb
 样品瓶号: 4-23
 进样体积: 10μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2026/03/11 01:32:50 实验者: wangdan
 处理时间 (V2) : 2026/03/11 12:03:46 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 240nm


峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.026	84163	18480	22.329	4696	1.292	--
2	2.303	292753	63462	77.671	5808	1.107	2.319
总计		376916	81942	100.000			

图183 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定长期12月HPLC图谱
 自制品-2025021121批-pH6.8介质-篮法-100转-30min-片3
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 240nm
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 0-66/18-387-2 - zzp-2025021121p-cq12y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-30min-P4.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-RC-Fx267.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20260310-FX267.lcb
 样品瓶号: 4-32
 进样体积: 10μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2026/03/11 01:36:44 实验者: wangdan
 处理时间 (V2): 2026/03/11 12:03:54 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 240nm


峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.026	81062	17896	21.016	4713	1.280	--
2	2.303	304646	66145	78.984	5822	1.104	2.320
总计		385708	84041	100.000			

图184 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定长期12月HPLC图谱
 自制品-2025021121批-pH6.8介质-篮法-100转-30min-片4
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 240nm
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 0-66/18-389-2 - zzp-2025021121p-cq12y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-30min-P6.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-RC-Fx267.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20260310-FX267.lcb
 样品瓶号: 4-50
 进样体积: 10μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2026/03/11 01:44:29 实验者: wangdan
 处理时间 (V2) : 2026/03/11 12:04:09 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 240nm


峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.025	88419	19520	21.542	4714	1.279	--
2	2.302	322023	69712	78.458	5803	1.106	2.319
总计		410441	89232	100.000			

图186 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定长期12月HPLC图谱
 自制品-2025021121批-pH6.8介质-篮法-100转-30min-片6
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 240nm
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 0-66/18-390-2 - zzp-2025021121p-cq12y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-45min-P1.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-RC-Fx267.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20260310-FX267.lcb
 样品瓶号: 4-6
 进样体积: 10μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2026/03/11 01:48:23 实验者: wangdan
 处理时间 (V2) : 2026/03/11 12:04:17 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 240nm


峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.026	85189	18782	21.104	4707	1.281	--
2	2.303	318481	68998	78.896	5803	1.108	2.316
总计		403671	87779	100.000			

图187 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定长期12月HPLC图谱
 自制品-2025021121批-pH6.8介质-篮法-100转-45min-片1
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5µm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 240nm
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 0-66/18-391-2 - zzp-2025021121p-cq12y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-45min-P2.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-RC-Fx267.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20260310-FX267.lcb
 样品瓶号: 4-15
 进样体积: 10µl 版本号: 6.115
 进样时间: 2026/03/11 01:52:16 实验者: wangdan
 处理时间 (V2) : 2026/03/11 12:04:24 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 240nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.026	78689	17226	20.253	4683	1.288	--
2	2.303	309836	67025	79.747	5797	1.111	2.312
总计		388525	84252	100.000			

图188 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定长期12月HPLC图谱
 自制品-2025021121批-pH6.8介质-篮法-100转-45min-片2
 供试品溶液-1




SMF-4035

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 240nm
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 0-66/18-392-2 - zzp-2025021121p-cq12y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-45min-P3.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-RC-Fx267.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20260310-FX267.lcb
 样品瓶号: 4-24
 进样体积: 10μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2026/03/11 01:56:09 实验者: wangdan
 处理时间 (V2) : 2026/03/11 12:04:32 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 240nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.027	86028	18944	22.588	4713	1.279	--
2	2.304	294823	63995	77.412	5813	1.106	2.320
总计		380851	82939	100.000			

图189 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定长期12月HPLC图谱
 自制品-2025021121批-pH6.8介质-篮法-100转-45min-片3
 供试品溶液-1




SMF-4035

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 240nm
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 0-66/18-393-2 - zzp-2025021121p-cq12y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-45min-P4.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-RC-Fx267.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20260310-FX267.lcb
 样品瓶号: 4-33
 进样体积: 10μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2026/03/11 02:00:02 实验者: wangdan
 处理时间 (V2): 2026/03/11 12:04:40 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 240nm


峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.026	80762	17814	20.860	4702	1.279	--
2	2.303	306393	66413	79.140	5815	1.107	2.318
总计		387155	84227	100.000			

图190 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定长期12月HPLC图谱
 自制品-2025021121批-pH6.8介质-篮法-100转-45min-片4
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5µm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 240nm
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 0-66/18-394-2 - zzp-2025021121p-cq12y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-45min-P5.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-RC-Fx267.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20260310-FX267.lcb
 样品瓶号: 4-42
 进样体积: 10µl 版本号: 6.115
 进样时间: 2026/03/11 02:03:55 实验者: wangdan
 处理时间 (V2) : 2026/03/11 12:04:47 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 240nm


峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.026	83505	18444	21.052	4712	1.279	--
2	2.303	313163	67871	78.948	5812	1.106	2.317
总计		396668	86316	100.000			

图191 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定长期12月HPLC图谱
 自制品-2025021121批-pH6.8介质-篮法-100转-45min-片5
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 240nm
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 0-66/18-395-2 - zzp-2025021121p-cq12y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-45min-P6.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-RC-Fx267.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20260310-FX267.lcb
 样品瓶号: 4-51
 进样体积: 10μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2026/03/11 02:07:48 实验者: wangdan
 处理时间 (V2) : 2026/03/11 12:04:55 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 240nm


峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.026	88359	19470	21.511	4700	1.281	--
2	2.303	322411	69869	78.489	5812	1.107	2.316
总计		410771	89338	100.000			

图192 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定长期12月HPLC图谱
 自制品-2025021121批-pH6.8介质-篮法-100转-45min-片6
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5µm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 240nm
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 0-66/18-396-2 - zzp-2025021121p-cq12y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-JX-P1.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-RC-Fx267.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20260310-FX267.lcb
 样品瓶号: 4-7
 进样体积: 10µl 版本号: 6.115
 进样时间: 2026/03/11 02:11:41 实验者: wangdan
 处理时间 (V2) : 2026/03/11 12:05:03 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 240nm


峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.026	87244	19223	21.230	4702	1.281	--
2	2.302	323708	70057	78.770	5803	1.108	2.313
总计		410952	89280	100.000			

图193 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定长期12月HPLC图谱
 自制品-2025021121批-pH6.8介质-篮法-100转-极限转速-片1
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5µm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 240nm
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 0-66/18-397-2 - zzp-2025021121p-cq12y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-JX-P2.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-RC-Fx267.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20260310-FX267.lcb
 样品瓶号: 4-16
 进样体积: 10µl 版本号: 6.115
 进样时间: 2026/03/11 02:15:34 实验者: wangdan
 处理时间 (V2): 2026/03/11 12:05:11 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 240nm


峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.026	78398	17238	20.129	4684	1.283	--
2	2.302	311080	67341	79.871	5802	1.108	2.309
总计		389478	84579	100.000			

图194 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定长期12月HPLC图谱
 自制品-2025021121批-pH6.8介质-篮法-100转-极限转速-片2
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5µm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 240nm
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 0-66/18-398-2 - zzp-2025021121p-cq12y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-JX-P3.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-RC-Fx267.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20260310-FX267.lcb
 样品瓶号: 4-25
 进样体积: 10µl 版本号: 6.115
 进样时间: 2026/03/11 02:19:27 实验者: wangdan
 处理时间 (V2) : 2026/03/11 12:05:18 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 240nm


峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.026	86828	19159	22.624	4705	1.282	--
2	2.302	296966	64234	77.376	5803	1.108	2.315
总计		383794	83393	100.000			

图195 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定长期12月HPLC图谱
 自制品-2025021121批-pH6.8介质-篮法-100转-极限转速-片3
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5µm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 240nm
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 0-66/18-399-2 - zzp-2025021121p-cq12y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-JX-P4.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-RC-Fx267.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20260310-FX267.lcb
 样品瓶号: 4-34
 进样体积: 10µl 版本号: 6.115
 进样时间: 2026/03/11 02:23:21 实验者: wangdan
 处理时间 (V2): 2026/03/11 12:05:26 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 240nm


峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.026	81251	17913	20.964	4706	1.283	--
2	2.302	306320	66321	79.036	5809	1.108	2.314
总计		387571	84234	100.000			

图196 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定长期12月HPLC图谱
 自制品-2025021121批-pH6.8介质-篮法-100转-极限转速-片4
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5µm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 240nm
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 0-66/18-401-2 - zzp-2025021121p-cq12y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-JX-P6.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-RC-Fx267.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20260310-FX267.lcb
 样品瓶号: 4-52
 进样体积: 10µl 版本号: 6.115
 进样时间: 2026/03/11 02:31:07 实验者: wangdan
 处理时间 (V2): 2026/03/11 12:05:42 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 240nm


峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.026	89436	19721	21.647	4709	1.282	--
2	2.302	323725	70024	78.353	5801	1.109	2.313
总计		413160	89745	100.000			

图198 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定长期12月HPLC图谱
 自制品-2025021121批-pH6.8介质-篮法-100转-极限转速-片6
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 240nm
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 0-66/18-402-2 - zzp-2025021121p-cq12y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-dz2-1.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-RC-Fx267.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20260310-FX267.lcb
 样品瓶号: 4-27
 进样体积: 10μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2026/03/11 02:35:00 实验者: wangdan
 处理时间 (V2): 2026/03/11 12:05:49 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 240nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.010	93901	19833	19.882	4191	1.256	--
2	2.285	378381	77222	80.118	5034	1.115	2.171
总计		472283	97055	100.000			

图199 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定长期12月HPLC图谱
 自制品-2025021121批-pH6.8介质-篮法-100转
 对照品溶液-2-1




SMF-4035

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 240nm
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 0-66/18-403-2 - zzp-2025021121p-cq12y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-dz2-2.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-RC-Fx267.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20260310-FX267.lcb
 样品瓶号: 4-27
 进样体积: 10μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2026/03/11 02:38:53 实验者: wangdan
 处理时间 (V2) : 2026/03/11 12:05:57 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 240nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.011	94128	19839	19.913	4182	1.259	--
2	2.285	378565	77228	80.087	5032	1.116	2.169
总计		472694	97067	100.000			

图200 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定长期12月HPLC图谱
 自制品-2025021121批-pH6.8介质-篮法-100转
 对照品溶液-2-2