



非奈利酮恩格列净片项目信息

介质体积(ml)	900	取样体积(ml)	1.5	补液体积(ml)	1.5
对照品批号	101566-202301	对照品来源	中检院	对照品使用方法	直接使用
对照品含量(%)	100	对照品水分(%)	0	对照品稀释倍数	1000
标示量(mg)	10	供试品稀释倍数	1	系数	1

对照品溶液

序号	称样量(mg)	A ₁	A ₂	A ₃	A ₄	A ₅	A _{平均}	RSD%
1	11.10	309942	310256	310599	309824	310460	310216	0.11
2	11.07	310132	309501				309816	0.15

单位质量响应值		RSD%	判断
27947.39	27986.99	0.11	数据可信



操作者:

日期: 2026-08-16

复核者:

未审阅版本



供试品溶液-6031001批-恩格列净-pH4.5

时间 (分钟)	样品	A ₁	A ₂	A _{平均}	溶出量(%)	平均(%)	RSD%	累计溶 出量(%)	平均(%)	RSD%
5min	1	99070	-	99070	31.881	34.23	11.94	31.88	34.23	11.94
	2	131332	-	131332	42.263			42.26		
	3	105462	-	105462	33.938			33.94		
	4	105177	-	105177	33.847			33.85		
	5	100490	-	100490	32.338			32.34		
	6	96715	-	96715	31.123			31.12		
10min	1	273751	-	273751	88.095	88.58	2.07	88.15	88.64	2.08
	2	279966	-	279966	90.095			90.17		
	3	273074	-	273074	87.877			87.93		
	4	281322	-	281322	90.531			90.59		
	5	277693	-	277693	89.363			89.42		
	6	265753	-	265753	85.521			85.57		
15min	1	327501	-	327501	105.392	105.75	1.69	105.59	105.95	1.69
	2	328513	-	328513	105.717			105.94		
	3	327885	-	327885	105.515			105.72		
	4	338798	-	338798	109.027			109.23		
	5	326987	-	326987	105.226			105.43		
	6	321916	-	321916	103.594			103.79		
20min	1	353619	-	353619	113.797	114.47	1.47	114.17	114.85	1.47
	2	351181	-	351181	113.012			113.41		
	3	355522	-	355522	114.409			114.79		
	4	365950	-	365950	117.765			118.15		
	5	354582	-	354582	114.107			114.48		
	6	353458	-	353458	113.745			114.11		
30min	1	377662	-	377662	121.534	121.91	1.46	122.10	122.48	1.46
	2	372579	-	372579	119.898			120.48		
	3	378420	-	378420	121.778			122.35		
	4	389161	-	389161	125.234			125.82		
	5	378380	-	378380	121.765			122.33		
	6	376801	-	376801	121.257			121.81		
45min	1	390518	-	390518	125.671	125.59	1.29	126.44	126.37	1.28
	2	383090	-	383090	123.281			124.07		
	3	388672	-	388672	125.077			125.85		
	4	398409	-	398409	128.210			129.00		
	5	391951	-	391951	126.132			126.90		
	6	389010	-	389010	125.186			125.94		
60min	1	393444	-	393444	126.613	126.50	1.18	127.59	127.49	1.18
	2	386398	-	386398	124.345			125.34		
	3	391676	-	391676	126.044			127.02		
	4	400547	-	400547	128.898			129.91		
	5	394855	-	394855	127.067			128.05		
	6	391695	-	391695	126.050			127.02		
极限	1	393770	-	393770	126.717	126.28	1.27	127.91	127.48	1.27
	2	384580	-	384580	123.760			124.96		
	3	391671	-	391671	126.042			127.23		
	4	399857	-	399857	128.676			129.90		
	5	393827	-	393827	126.736			127.93		
	6	390838	-	390838	125.774			126.95		



操作者:

日期: 2026-08-16

复核者:

未审阅版本



非奈利酮恩格列净片项目信息

介质体积(ml)	900	取样体积(ml)	1.5	补液体积(ml)	1.5
对照品批号	D250501	对照品来源	中检院	对照品使用方法	直接使用
对照品含量(%)	99.9	对照品水分(%)	0	对照品稀释倍数	1000
标示量(mg)	10	供试品稀释倍数	1	系数	1

对照品溶液

序号	称样量(mg)	A ₁	A ₂	A ₃	A ₄	A ₅	A _{平均}	RSD%
1	11.12	409125	409309	409301	408147	409212	409019	0.13
2	11.18	409141	408676				408908	0.09

单位质量响应值	RSD%	判断
36782.28	0.40	数据可信



操作者:

日期: 2026-08-16

复核者:

未审阅版本



供试品溶液-6031001批-非奈利酮-pH4.5

时间 (分钟)	样品	A ₁	A ₂	A _{平均}	溶出量(%)	平均(%)	RSD%	累计溶 出量(%)	平均(%)	RSD%
5min	1		-		0.000	0.00	-	0.00	0.00	-
	2		-		0.000			0.00		
	3		-		0.000			0.00		
	4		-		0.000			0.00		
	5		-		0.000			0.00		
	6		-		0.000			0.00		
10min	1		-		0.000	0.00	-	0.00	0.00	-
	2		-		0.000			0.00		
	3		-		0.000			0.00		
	4		-		0.000			0.00		
	5		-		0.000			0.00		
	6		-		0.000			0.00		
15min	1		-		0.000	0.00	-	0.00	0.00	-
	2		-		0.000			0.00		
	3		-		0.000			0.00		
	4		-		0.000			0.00		
	5		-		0.000			0.00		
	6		-		0.000			0.00		
20min	1		-		0.000	0.00	-	0.00	0.00	-
	2		-		0.000			0.00		
	3		-		0.000			0.00		
	4		-		0.000			0.00		
	5		-		0.000			0.00		
	6		-		0.000			0.00		
30min	1		-		0.000	0.00	-	0.00	0.00	-
	2		-		0.000			0.00		
	3		-		0.000			0.00		
	4		-		0.000			0.00		
	5		-		0.000			0.00		
	6		-		0.000			0.00		
45min	1		-		0.000	0.00	-	0.00	0.00	-
	2		-		0.000			0.00		
	3		-		0.000			0.00		
	4		-		0.000			0.00		
	5		-		0.000			0.00		
	6		-		0.000			0.00		
60min	1		-		0.000	0.00	-	0.00	0.00	-
	2		-		0.000			0.00		
	3		-		0.000			0.00		
	4		-		0.000			0.00		
	5		-		0.000			0.00		
	6		-		0.000			0.00		
极限	1		-		0.000	0.00	-	0.00	0.00	-
	2		-		0.000			0.00		
	3		-		0.000			0.00		
	4		-		0.000			0.00		
	5		-		0.000			0.00		
	6		-		0.000			0.00		



操作者:

日期: 2026-08-16

复核者:

未审阅版本



非奈利酮恩格列净片项目信息

介质体积(ml)	900	取样体积(ml)	1.5	补液体积(ml)	1.5
对照品批号	101566-202301	对照品来源	中检院	对照品使用方法	直接使用
对照品含量(%)	100	对照品水分(%)	0	对照品稀释倍数	1000
标示量(mg)	10	供试品稀释倍数	1	系数	1

对照品溶液

序号	称样量(mg)	A ₁	A ₂	A ₃	A ₄	A ₅	A _{平均}	RSD%
1	11.10	310153	310290	310608	310311	310315	310335	0.06
2	11.07	309832	309808				309820	0.01
单位质量响应值				RSD%	判断			
27958.11				0.08	数据可信			



操作者:

日期: 2026-08-16

复核者:

未审阅版本



供试品溶液-6031002批-恩格列净-pH4.5

时间 (分钟)	样品	A ₁	A ₂	A _{平均}	溶出量(%)	平均(%)	RSD%	累计溶 出量(%)	平均(%)	RSD%
5min	1	95829	-	95829	30.832	32.05	19.37	30.83	32.05	19.36
	2	115522	-	115522	37.168			37.17		
	3	90891	-	90891	29.243			29.24		
	4	69979	-	69979	22.515			22.52		
	5	124860	-	124860	40.173			40.17		
	6	100649	-	100649	32.383			32.38		
10min	1	261060	-	261060	83.994	86.47	3.55	84.05	86.52	3.56
	2	275087	-	275087	88.507			88.57		
	3	265171	-	265171	85.317			85.37		
	4	260304	-	260304	83.751			83.79		
	5	284954	-	284954	91.682			91.75		
	6	265923	-	265923	85.559			85.61		
15min	1	326884	-	326884	105.172	105.90	1.53	105.36	106.10	1.54
	2	330794	-	330794	106.430			106.64		
	3	326397	-	326397	105.016			105.21		
	4	327193	-	327193	105.272			105.45		
	5	338605	-	338605	108.943			109.16		
	6	325032	-	325032	104.576			104.77		
20min	1	357844	-	357844	115.133	115.17	1.03	115.50	115.55	1.04
	2	358890	-	358890	115.470			115.86		
	3	353334	-	353334	113.682			114.05		
	4	358607	-	358607	115.379			115.73		
	5	364035	-	364035	117.125			117.53		
	6	355103	-	355103	114.252			114.62		
30min	1	385426	-	385426	124.008	123.66	0.50	124.57	124.23	0.50
	2	385423	-	385423	124.007			124.59		
	3	380942	-	380942	122.565			123.12		
	4	384711	-	384711	123.778			124.32		
	5	386091	-	386091	124.222			124.82		
	6	383524	-	383524	123.396			123.96		
45min	1	397577	-	397577	127.917	128.11	0.76	128.68	128.88	0.76
	2	397944	-	397944	128.035			128.82		
	3	395059	-	395059	127.107			127.87		
	4	395882	-	395882	127.372			128.12		
	5	398907	-	398907	128.345			129.15		
	6	403608	-	403608	129.858			130.62		
60min	1	400887	-	400887	128.982	128.59	0.51	129.96	129.58	0.51
	2	402091	-	402091	129.370			130.37		
	3	396525	-	396525	127.579			128.55		
	4	398109	-	398109	128.088			129.05		
	5	400240	-	400240	128.774			129.79		
	6	400150	-	400150	128.745			129.73		
极限	1	400515	-	400515	128.862	128.43	0.48	130.06	129.63	0.48
	2	400204	-	400204	128.762			129.98		
	3	396075	-	396075	127.434			128.62		
	4	397571	-	397571	127.915			129.09		
	5	400289	-	400289	128.790			130.02		
	6	400407	-	400407	128.828			130.03		



操作者:

日期: 2026-08-16

复核者:

未审阅版本



非奈利酮恩格列净片项目信息

介质体积(ml)	900	取样体积(ml)	1.5	补液体积(ml)	1.5
对照品批号	D250501	对照品来源	中检院	对照品使用方法	直接使用
对照品含量(%)	99.9	对照品水分(%)	0	对照品稀释倍数	1000
标示量(mg)	10	供试品稀释倍数	1	系数	1

对照品溶液

序号	称样量(mg)	A ₁	A ₂	A ₃	A ₄	A ₅	A _{平均}	RSD%
1	11.12	409709	410109	410439	409892	409845	409999	0.07
2	11.18	409081	409081				409081	0.00
单位质量响应值			RSD%	判断				
36870.41			0.54	数据可信				



操作者:

日期: 2026-08-16

复核者:

未审阅版本



供试品溶液-6031002批-非奈利酮-pH4.5

时间 (分钟)	样品	A ₁	A ₂	A _{平均}	溶出量(%)	平均(%)	RSD%	累计溶 出量(%)	平均(%)	RSD%
5min	1		-		0.000	0.00	-	0.00	0.00	-
	2		-		0.000			0.00		
	3		-		0.000			0.00		
	4		-		0.000			0.00		
	5		-		0.000			0.00		
	6		-		0.000			0.00		
10min	1		-		0.000	0.00	-	0.00	0.00	-
	2		-		0.000			0.00		
	3		-		0.000			0.00		
	4		-		0.000			0.00		
	5		-		0.000			0.00		
	6		-		0.000			0.00		
15min	1		-		0.000	0.00	-	0.00	0.00	-
	2		-		0.000			0.00		
	3		-		0.000			0.00		
	4		-		0.000			0.00		
	5		-		0.000			0.00		
	6		-		0.000			0.00		
20min	1		-		0.000	0.00	-	0.00	0.00	-
	2		-		0.000			0.00		
	3		-		0.000			0.00		
	4		-		0.000			0.00		
	5		-		0.000			0.00		
	6		-		0.000			0.00		
30min	1		-		0.000	0.00	-	0.00	0.00	-
	2		-		0.000			0.00		
	3		-		0.000			0.00		
	4		-		0.000			0.00		
	5		-		0.000			0.00		
	6		-		0.000			0.00		
45min	1		-		0.000	0.00	-	0.00	0.00	-
	2		-		0.000			0.00		
	3		-		0.000			0.00		
	4		-		0.000			0.00		
	5		-		0.000			0.00		
	6		-		0.000			0.00		
60min	1		-		0.000	0.00	-	0.00	0.00	-
	2		-		0.000			0.00		
	3		-		0.000			0.00		
	4		-		0.000			0.00		
	5		-		0.000			0.00		
	6		-		0.000			0.00		
极限	1		-		0.000	0.00	-	0.00	0.00	-
	2		-		0.000			0.00		
	3		-		0.000			0.00		
	4		-		0.000			0.00		
	5		-		0.000			0.00		
	6		-		0.000			0.00		



操作者:

日期: 2026-08-16

复核者:

未审阅版本



非奈利酮恩格列净片项目信息

介质体积(ml)	900	取样体积(ml)	1.5	补液体积(ml)	1.5
对照品批号	101566-202301	对照品来源	中检院	对照品使用方法	直接使用
对照品含量(%)	100	对照品水分(%)	0	对照品稀释倍数	1000
标示量(mg)	10	供试品稀释倍数	1	系数	1

对照品溶液

序号	称样量(mg)	A ₁	A ₂	A ₃	A ₄	A ₅	A _{平均}	RSD%
1	11.10	310690	310866	310701	310939	310758	310791	0.04
2	11.07	309823	310311				310067	0.12
单位质量响应值				RSD%	判断			
27999.19				0.03	数据可信			



操作者:

日期: 2026-08-16

复核者:

未审阅版本



供试品溶液-6031101批-恩格列净-pH4.5

时间 (分钟)	样品	A ₁	A ₂	A _{平均}	溶出量(%)	平均(%)	RSD%	累计溶 出量(%)	平均(%)	RSD%
5min	1	260564	-	260564	83.739	59.93	24.84	83.74	59.94	24.84
	2	156624	-	156624	50.335			50.34		
	3	147009	-	147009	47.245			47.25		
	4	207840	-	207840	66.795			66.80		
	5	204977	-	204977	65.875			65.88		
	6	141882	-	141882	45.598			45.60		
10min	1	308753	-	308753	99.226	97.31	4.16	99.37	97.42	4.17
	2	300555	-	300555	96.592			96.68		
	3	302632	-	302632	97.259			97.34		
	4	303335	-	303335	97.485			97.60		
	5	320029	-	320029	102.850			102.96		
	6	281511	-	281511	90.471			90.55		
15min	1	311377	-	311377	100.070	100.88	1.90	100.37	101.14	1.90
	2	309184	-	309184	99.365			99.61		
	3	314804	-	314804	101.171			101.41		
	4	309379	-	309379	99.428			99.70		
	5	325168	-	325168	104.502			104.78		
	6	313510	-	313510	100.755			100.98		
20min	1	310911	-	310911	99.920	101.14	1.81	100.39	101.57	1.81
	2	309411	-	309411	99.438			99.85		
	3	316404	-	316404	101.685			102.09		
	4	310969	-	310969	99.939			100.38		
	5	324786	-	324786	104.379			104.83		
	6	315712	-	315712	101.463			101.86		
30min	1	310345	-	310345	99.738	101.06	1.94	100.38	101.66	1.94
	2	309979	-	309979	99.620			100.20		
	3	316441	-	316441	101.697			102.28		
	4	309363	-	309363	99.422			100.03		
	5	325314	-	325314	104.549			105.18		
	6	315305	-	315305	101.332			101.90		
45min	1	311904	-	311904	100.239	101.34	1.66	101.04	102.11	1.66
	2	310289	-	310289	99.720			100.46		
	3	316884	-	316884	101.839			102.59		
	4	312706	-	312706	100.497			101.27		
	5	324833	-	324833	104.394			105.20		
	6	315363	-	315363	101.351			102.08		
60min	1	310468	-	310468	99.778	100.90	1.92	100.75	101.84	1.91
	2	309571	-	309571	99.489			100.40		
	3	317009	-	317009	101.880			102.80		
	4	307914	-	307914	98.957			99.90		
	5	324062	-	324062	104.146			105.12		
	6	314826	-	314826	101.178			102.08		
极限	1	310662	-	310662	99.840	100.88	1.87	100.98	101.99	1.87
	2	309729	-	309729	99.540			100.61		
	3	315274	-	315274	101.322			102.41		
	4	308663	-	308663	99.197			100.30		
	5	324594	-	324594	104.317			105.47		
	6	314558	-	314558	101.092			102.16		



操作者:

日期: 2026-08-16

复核者:

未审阅版本



非奈利酮恩格列净片项目信息

介质体积(ml)	900	取样体积(ml)	1.5	补液体积(ml)	1.5
对照品批号	D250501	对照品来源	中检院	对照品使用方法	直接使用
对照品含量(%)	99.9	对照品水分(%)	0	对照品稀释倍数	1000
标示量(mg)	10	供试品稀释倍数	1	系数	1

对照品溶液

序号	称样量(mg)	A ₁	A ₂	A ₃	A ₄	A ₅	A _{平均}	RSD%
1	11.12	410165	410438	410119	409933	410277	410186	0.05
2	11.18	408751	408929				408840	0.04
单位质量响应值				RSD%	判断			
36887.23				0.62	数据可信			



操作者:

日期: 2026-08-16

复核者:

未审阅版本



供试品溶液-6031101批-非奈利酮-pH4.5

时间 (分钟)	样品	A ₁	A ₂	A _{平均}	溶出量(%)	平均(%)	RSD%	累计溶 出量(%)	平均(%)	RSD%
5min	1	74400	-	74400	18.213	16.61	15.97	18.21	16.60	15.97
	2	62105	-	62105	15.204			15.20		
	3	73593	-	73593	18.016			18.02		
	4	82731	-	82731	20.253			20.25		
	5	53586	-	53586	13.118			13.12		
	6	60596	-	60596	14.834			14.83		
10min	1	277739	-	277739	67.992	64.83	6.69	68.02	64.86	6.69
	2	257807	-	257807	63.112			63.14		
	3	265832	-	265832	65.077			65.11		
	4	282617	-	282617	69.186			69.22		
	5	271537	-	271537	66.473			66.50		
	6	233404	-	233404	57.138			57.16		
15min	1	339819	-	339819	83.189	82.02	2.30	83.33	82.15	2.31
	2	333858	-	333858	81.730			81.86		
	3	337101	-	337101	82.524			82.66		
	4	341970	-	341970	83.716			83.86		
	5	337115	-	337115	82.527			82.66		
	6	320364	-	320364	78.426			78.55		
20min	1	363224	-	363224	88.919	88.16	1.48	89.20	88.43	1.49
	2	359304	-	359304	87.959			88.23		
	3	361716	-	361716	88.549			88.83		
	4	365113	-	365113	89.381			89.67		
	5	361302	-	361302	88.448			88.72		
	6	350045	-	350045	85.692			85.94		
30min	1	383388	-	383388	93.855	92.81	1.05	94.29	93.23	1.06
	2	378069	-	378069	92.553			92.97		
	3	378743	-	378743	92.718			93.14		
	4	380571	-	380571	93.165			93.60		
	5	381875	-	381875	93.484			93.90		
	6	372118	-	372118	91.096			91.49		
45min	1	393769	-	393769	96.396	94.71	1.13	96.98	95.28	1.13
	2	385052	-	385052	94.262			94.83		
	3	385233	-	385233	94.307			94.88		
	4	386370	-	386370	94.585			95.18		
	5	389597	-	389597	95.375			95.95		
	6	381151	-	381151	93.307			93.85		
60min	1	394093	-	394093	96.475	94.94	1.03	97.22	95.67	1.04
	2	385149	-	385149	94.286			95.01		
	3	387317	-	387317	94.817			95.55		
	4	387318	-	387318	94.817			95.57		
	5	390365	-	390365	95.563			96.30		
	6	382690	-	382690	93.684			94.38		
极限	1	394280	-	394280	96.521	94.92	1.12	97.43	95.82	1.13
	2	385470	-	385470	94.365			95.25		
	3	384895	-	384895	94.224			95.12		
	4	388424	-	388424	95.088			96.00		
	5	390930	-	390930	95.701			96.59		
	6	382508	-	382508	93.639			94.50		



操作者:

日期: 2026-08-16

复核者:

未审阅版本



非奈利酮恩格列净片项目信息

介质体积(ml)	900	取样体积(ml)	1.5	补液体积(ml)	1.5
对照品批号	101566-202301	对照品来源	中检院	对照品使用方法	直接使用
对照品含量(%)	100	对照品水分(%)	0	对照品稀释倍数	1000
标示量(mg)	10	供试品稀释倍数	1	系数	1

对照品溶液

序号	称样量(mg)	A ₁	A ₂	A ₃	A ₄	A ₅	A _{平均}	RSD%
1	11.10	311697	311639	311487	311522	311583	311586	0.03
2	11.07	311404	311323				311364	0.02
单位质量响应值				RSD%	判断			
28070.81				0.15	数据可信			



操作者:

日期: 2026-08-16

复核者:

未审阅版本



供试品溶液-6031101批-恩格列净-pH4.5

时间 (分钟)	样品	A ₁	A ₂	A _{平均}	溶出量(%)	平均(%)	RSD%	累计溶 出量(%)	平均(%)	RSD%
5min	1	288844	-	288844	92.516	88.56	11.39	92.52	88.56	11.39
	2	223278	-	223278	71.516			71.52		
	3	307816	-	307816	98.593			98.59		
	4	254397	-	254397	81.483			81.48		
	5	291418	-	291418	93.341			93.34		
	6	293161	-	293161	93.899			93.90		
10min	1	318282	-	318282	101.945	101.40	1.90	102.10	101.55	1.90
	2	314237	-	314237	100.650			100.77		
	3	322697	-	322697	103.359			103.52		
	4	307180	-	307180	98.389			98.53		
	5	322861	-	322861	103.412			103.57		
	6	314198	-	314198	100.637			100.79		
15min	1	320542	-	320542	102.669	102.12	1.83	102.99	102.44	1.83
	2	318853	-	318853	102.128			102.42		
	3	324073	-	324073	103.800			104.14		
	4	308687	-	308687	98.872			99.17		
	5	324324	-	324324	103.880			104.21		
	6	316513	-	316513	101.379			101.70		
20min	1	318717	-	318717	102.085	101.98	1.71	102.58	102.47	1.72
	2	318583	-	318583	102.042			102.50		
	3	323462	-	323462	103.604			104.11		
	4	309055	-	309055	98.990			99.45		
	5	323966	-	323966	103.766			104.27		
	6	316583	-	316583	101.401			101.89		
30min	1	318987	-	318987	102.171	101.96	1.78	102.84	102.62	1.78
	2	318516	-	318516	102.020			102.65		
	3	323508	-	323508	103.619			104.30		
	4	308924	-	308924	98.948			99.58		
	5	324407	-	324407	103.907			104.58		
	6	315676	-	315676	101.111			101.77		
45min	1	318698	-	318698	102.078	101.88	1.44	102.91	102.70	1.45
	2	317688	-	317688	101.755			102.55		
	3	323191	-	323191	103.518			104.37		
	4	310961	-	310961	99.600			100.39		
	5	322477	-	322477	103.289			104.14		
	6	315378	-	315378	101.015			101.85		
60min	1	318118	-	318118	101.893	101.87	1.70	102.90	102.86	1.71
	2	315949	-	315949	101.198			102.16		
	3	323499	-	323499	103.616			104.64		
	4	309728	-	309728	99.205			100.17		
	5	324378	-	324378	103.898			104.92		
	6	316544	-	316544	101.389			102.39		
极限	1	319134	-	319134	102.218	101.71	1.56	103.39	102.87	1.57
	2	317183	-	317183	101.593			102.73		
	3	321460	-	321460	102.963			104.16		
	4	308779	-	308779	98.901			100.03		
	5	322548	-	322548	103.312			104.50		
	6	316095	-	316095	101.245			102.41		



操作者:

日期: 2026-08-16

复核者:

未审阅版本



非奈利酮恩格列净片项目信息

介质体积(ml)	900	取样体积(ml)	1.5	补液体积(ml)	1.5
对照品批号	D250501	对照品来源	中检院	对照品使用方法	直接使用
对照品含量(%)	99.9	对照品水分(%)	0	对照品稀释倍数	1000
标示量(mg)	10	供试品稀释倍数	1	系数	1

对照品溶液

序号	称样量(mg)	A ₁	A ₂	A ₃	A ₄	A ₅	A _{平均}	RSD%
1	11.12	410771	411024	410919	411106	411292	411022	0.05
2	11.18	410868	410791				410830	0.02
单位质量响应值				RSD%	判断			
36962.41		36746.87		0.42	数据可信			



操作者:

日期: 2026-08-16

复核者:

未审阅版本



供试品溶液-6031101批-非奈利酮-pH4.5

时间 (分钟)	样品	A ₁	A ₂	A _{平均}	溶出量(%)	平均(%)	RSD%	累计溶 出量(%)	平均(%)	RSD%
5min	1	145792	-	145792	35.567	37.46	11.43	35.57	37.46	11.43
	2	143480	-	143480	35.003			35.00		
	3	162237	-	162237	39.579			39.58		
	4	183470	-	183470	44.759			44.76		
	5	133420	-	133420	32.549			32.55		
	6	152917	-	152917	37.306			37.31		
10min	1	300957	-	300957	73.422	73.40	2.60	73.48	73.47	2.60
	2	306150	-	306150	74.689			74.75		
	3	306636	-	306636	74.807			74.87		
	4	308482	-	308482	75.257			75.33		
	5	289121	-	289121	70.534			70.59		
	6	293959	-	293959	71.714			71.78		
15min	1	343996	-	343996	83.921	84.01	1.89	84.10	84.19	1.89
	2	355463	-	355463	86.719			86.90		
	3	346267	-	346267	84.475			84.67		
	4	344558	-	344558	84.059			84.26		
	5	338416	-	338416	82.560			82.73		
	6	337445	-	337445	82.323			82.50		
20min	1	360454	-	360454	87.937	88.46	1.70	88.26	88.78	1.70
	2	374211	-	374211	91.293			91.62		
	3	363436	-	363436	88.664			89.00		
	4	362011	-	362011	88.316			88.66		
	5	358282	-	358282	87.407			87.72		
	6	357087	-	357087	87.115			87.43		
30min	1	376652	-	376652	91.888	92.24	1.46	92.36	92.72	1.46
	2	388844	-	388844	94.863			95.34		
	3	377950	-	377950	92.205			92.68		
	4	374788	-	374788	91.433			91.92		
	5	376980	-	376980	91.968			92.42		
	6	373427	-	373427	91.101			91.57		
45min	1	383710	-	383710	93.610	93.69	1.23	94.23	94.31	1.23
	2	393270	-	393270	95.942			96.58		
	3	383417	-	383417	93.539			94.17		
	4	382208	-	382208	93.244			93.88		
	5	381182	-	381182	92.993			93.60		
	6	380407	-	380407	92.804			93.42		
60min	1	384002	-	384002	93.681	93.99	0.90	94.46	94.78	0.90
	2	392053	-	392053	95.645			96.44		
	3	385019	-	385019	93.929			94.72		
	4	382101	-	382101	93.218			94.01		
	5	384462	-	384462	93.794			94.56		
	6	384051	-	384051	93.693			94.46		
极限	1	385172	-	385172	93.967	93.89	1.17	94.90	94.82	1.16
	2	393532	-	393532	96.006			96.96		
	3	383022	-	383022	93.442			94.39		
	4	381078	-	381078	92.968			93.92		
	5	382456	-	382456	93.304			94.22		
	6	383795	-	383795	93.631			94.56		



操作者:

日期: 2026-08-16

复核者:

未审阅版本




SMF-228

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:40℃
数据文件名: RC\$SMF-228 - 0-53/27-502-3 - zzp-6031001p-pH4.5jz-lf100z-rj.lcd
方法文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-20260313-FX276.lcb
样品瓶号: 1-9
进样体积: 10μl
进样时间: 2026/03/13 18:12:26
处理时间 (V3) : 2026/03/19 19:39:31
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.0ml/min
波长: 224nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 224nm							
峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图1 非奈利酮恩格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6031001批-pH4.5介质-篮法-100转
溶剂




SMF-228

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:40℃
数据文件名: RC\$SMF-228 - 0-53/27-503-3 - zzp-6031001p-pH4.5jz-lf100z-dz1-1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-20260313-FX276.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 10μl
进样时间: 2026/03/13 18:17:50
处理时间 (V3) : 2026/03/19 19:39:35
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.0ml/min
波长: 224nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 224nm							
峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.123	309942	47618	43.103	2651	1.320	--
2	2.749	409125	54365	56.897	3359	1.303	3.530
总计		719067	101983	100.000			

图2 非奈利酮恩格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6031001批-pH4.5介质-篮法-100转
对照品溶液-1-1




SMF-228

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:40℃
数据文件名: RC\$SMF-228 - 0-53/27-504-3 - zzp-6031001p-pH4.5jz-lf100z-dz1-2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-20260313-FX276.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 10μl
进样时间: 2026/03/13 18:23:14
处理时间 (V3) : 2026/03/19 19:39:38
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.0ml/min
波长: 224nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 224nm							
峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.122	310256	47889	43.117	2672	1.316	--
2	2.748	409309	54686	56.883	3386	1.301	3.545
总计		719565	102575	100.000			

图3 非奈利酮恩格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6031001批-pH4.5介质-篮法-100转
对照品溶液-1-2




SMF-228

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:40℃
数据文件名: RC\$SMF-228 - 0-53/27-505-3 - zzp-6031001p-pH4.5jz-lf100z-dz1-3.lcd
方法文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-20260313-FX276.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 10μl
进样时间: 2026/03/13 18:28:37
处理时间 (V3) : 2026/03/19 19:39:41
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.0ml/min
波长: 224nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 224nm							
峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.124	310599	47645	43.145	2662	1.322	--
2	2.751	409301	54334	56.855	3372	1.305	3.539
总计		719900	101978	100.000			

图4 非奈利酮恩格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6031001批-pH4.5介质-篮法-100转
对照品溶液-1-3




SMF-228

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:40℃
数据文件名: RC\$SMF-228 - 0-53/27-506-3 - zzp-6031001p-pH4.5jz-lf100z-dz1-4.lcd
方法文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-20260313-FX276.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 10μl
进样时间: 2026/03/13 18:34:00
处理时间 (V3) : 2026/03/19 19:39:43
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.0ml/min
波长: 224nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 224nm							
峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.122	309824	47584	43.153	2650	1.323	--
2	2.749	408147	54285	56.847	3365	1.307	3.534
总计		717971	101868	100.000			

图5 非奈利酮恩格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6031001批-pH4.5介质-篮法-100转
对照品溶液-1-4




SMF-228

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:40℃
数据文件名: RC\$SMF-228 - 0-53/27-507-3 - zzp-6031001p-pH4.5jz-lf100z-dz1-5.lcd
方法文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-20260313-FX276.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 10μl
进样时间: 2026/03/13 18:39:23
处理时间 (V3) : 2026/03/19 19:39:46
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.0ml/min
波长: 224nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 224nm							
峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.122	310460	47754	43.139	2661	1.325	--
2	2.749	409212	54453	56.861	3374	1.308	3.539
总计		719672	102207	100.000			

图6 非奈利酮恩格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6031001批-pH4.5介质-篮法-100转
对照品溶液-1-5




SMF-228

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:40℃
数据文件名: RC\$SMF-228 - 0-53/27-508-3 - zzp-6031001p-pH4.5jz-lf100z-5min-P1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-20260313-FX276.lcb
样品瓶号: 1-1
进样体积: 10μl
进样时间: 2026/03/13 18:44:45
处理时间 (V3) : 2026/03/19 19:39:49
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.0ml/min
波长: 224nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 224nm							
峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.768	99070	13994	100.000	3924	1.324	--
总计		99070	13994	100.000			

图7 非奈利酮恩格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6031001批-pH4.5介质-篮法-100转-5min-片1
供试品溶液-1




SMF-228

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:40°C
数据文件名: RC\$SMF-228 - 0-53/27-509-3 - zzp-6031001p-pH4.5jz-lf100z-5min-P2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-20260313-FX276.lcb
样品瓶号: 1-10
进样体积: 10μl
进样时间: 2026/03/13 18:50:08
处理时间 (V3) : 2026/03/19 19:39:51
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.0ml/min
波长: 224nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 224nm							
峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.767	131332	18550	100.000	3913	1.325	--
总计		131332	18550	100.000			

图8 非奈利酮恩格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6031001批-pH4.5介质-篮法-100转-5min-片2
供试品溶液-1




SMF-228

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:40℃
数据文件名: RC\$SMF-228 - 0-53/27-510-3 - zzp-6031001p-pH4.5jz-lf100z-5min-P3.lcd
方法文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-20260313-FX276.lcb
样品瓶号: 1-19
进样体积: 10μl
进样时间: 2026/03/13 18:55:30
处理时间 (V3) : 2026/03/19 19:39:54
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.0ml/min
波长: 224nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 224nm							
峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.767	105462	14900	100.000	3918	1.325	--
总计		105462	14900	100.000			

图9 非奈利酮恩格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6031001批-pH4.5介质-篮法-100转-5min-片3
供试品溶液-1




SMF-228

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:40℃
数据文件名: RC\$SMF-228 - 0-53/27-511-3 - zzp-6031001p-pH4.5jz-lf100z-5min-P4.lcd
方法文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-20260313-FX276.lcb
样品瓶号: 1-28
进样体积: 10μl
进样时间: 2026/03/13 19:00:52
处理时间 (V3) : 2026/03/19 19:39:56
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.0ml/min
波长: 224nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 224nm							
峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.769	105177	14868	100.000	3916	1.324	--
总计		105177	14868	100.000			

图10 非奈利酮恩格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6031001批-pH4.5介质-篮法-100转-5min-片4
供试品溶液-1




SMF-228

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:40℃
数据文件名: RC\$SMF-228 - 0-53/27-512-3 - zzp-6031001p-pH4.5jz-lf100z-5min-P5.lcd
方法文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-20260313-FX276.lcb
样品瓶号: 1-37
进样体积: 10μl
进样时间: 2026/03/13 19:06:14
处理时间 (V3) : 2026/03/19 19:39:59
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.0ml/min
波长: 224nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 224nm							
峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.767	100490	14201	100.000	3915	1.327	--
总计		100490	14201	100.000			

图11 非奈利酮恩格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6031001批-pH4.5介质-篮法-100转-5min-片5
供试品溶液-1




SMF-228

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:40℃
数据文件名: RC\$SMF-228 - 0-53/27-513-3 - zzp-6031001p-pH4.5jz-lf100z-5min-P6.lcd
方法文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-20260313-FX276.lcb
样品瓶号: 1-46
进样体积: 10μl
进样时间: 2026/03/13 19:11:36
处理时间 (V3) : 2026/03/19 19:40:01
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.0ml/min
波长: 224nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 224nm							
峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.766	96715	13650	100.000	3908	1.327	--
总计		96715	13650	100.000			

图12 非奈利酮恩格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6031001批-pH4.5介质-篮法-100转-5min-片6
供试品溶液-1




SMF-228

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:40°C
数据文件名: RC\$SMF-228 - 0-53/27-514-3 - zzp-6031001p-pH4.5jz-lf100z-10min-P1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-20260313-FX276.lcb
样品瓶号: 1-2
进样体积: 10μl
进样时间: 2026/03/13 19:16:58
处理时间 (V3) : 2026/03/19 19:40:04
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.0ml/min
波长: 224nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 224nm							
峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.765	273751	38708	100.000	3919	1.329	--
总计		273751	38708	100.000			

图13 非奈利酮恩格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6031001批-pH4.5介质-篮法-100转-10min-片1
供试品溶液-1




SMF-228

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:40℃
数据文件名: RC\$SMF-228 - 0-53/27-515-3 - zzp-6031001p-pH4.5jz-lf100z-10min-P2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-20260313-FX276.lcb
样品瓶号: 1-11
进样体积: 10μl
进样时间: 2026/03/13 19:22:21
处理时间 (V3) : 2026/03/19 19:40:06
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.0ml/min
波长: 224nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 224nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.767	279966	39481	100.000	3921	1.330	--
总计		279966	39481	100.000			

图14 非奈利酮恩格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6031001批-pH4.5介质-篮法-100转-10min-片2
供试品溶液-1




SMF-228

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:40°C
数据文件名: RC\$SMF-228 - 0-53/27-516-3 - zzp-6031001p-pH4.5jz-lf100z-10min-P3.lcd
方法文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-20260313-FX276.lcb
样品瓶号: 1-20
进样体积: 10μl
进样时间: 2026/03/13 19:27:42
处理时间 (V3) : 2026/03/19 19:40:09
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.0ml/min
波长: 224nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 224nm							
峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.767	273074	38447	100.000	3915	1.331	--
总计		273074	38447	100.000			

图15 非奈利酮恩格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6031001批-pH4.5介质-篮法-100转-10min-片3
供试品溶液-1




SMF-228

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:40°C
数据文件名: RC\$SMF-228 - 0-53/27-517-3 - zzp-6031001p-pH4.5jz-lf100z-10min-P4.lcd
方法文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-20260313-FX276.lcb
样品瓶号: 1-29
进样体积: 10μl
进样时间: 2026/03/13 19:33:04
处理时间 (V3) : 2026/03/19 19:40:11
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.0ml/min
波长: 224nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 224nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.767	281322	39608	100.000	3922	1.332	--
总计		281322	39608	100.000			

图16 非奈利酮恩格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6031001批-pH4.5介质-篮法-100转-10min-片4
供试品溶液-1




SMF-228

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:40°C
数据文件名: RC\$SMF-228 - 0-53/27-518-3 - zzp-6031001p-pH4.5jz-lf100z-10min-P5.lcd
方法文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-20260313-FX276.lcb
样品瓶号: 1-38
进样体积: 10μl
进样时间: 2026/03/13 19:38:27
处理时间 (V3) : 2026/03/19 19:40:14
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.0ml/min
波长: 224nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 224nm							
峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.769	277693	39154	100.000	3917	1.331	--
总计		277693	39154	100.000			

图17 非奈利酮恩格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6031001批-pH4.5介质-篮法-100转-10min-片5
供试品溶液-1




SMF-228

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:40°C
数据文件名: RC\$SMF-228 - 0-53/27-519-3 - zzp-6031001p-pH4.5jz-lf100z-10min-P6.lcd
方法文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-20260313-FX276.lcb
样品瓶号: 1-47
进样体积: 10μl
进样时间: 2026/03/13 19:43:49
处理时间 (V3) : 2026/03/19 19:40:16
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.0ml/min
波长: 224nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 224nm							
峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.768	265753	37421	100.000	3914	1.332	--
总计		265753	37421	100.000			

图18 非奈利酮恩格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6031001批-pH4.5介质-篮法-100转-10min-片6
供试品溶液-1




SMF-228

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:40℃
数据文件名: RC\$SMF-228 - 0-53/27-520-3 - zzp-6031001p-pH4.5jz-lf100z-15min-P1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-20260313-FX276.lcb
样品瓶号: 1-3
进样体积: 10μl
进样时间: 2026/03/13 19:49:11
处理时间 (V3) : 2026/03/19 19:40:19
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.0ml/min
波长: 224nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 224nm							
峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.768	327501	46105	100.000	3916	1.333	--
总计		327501	46105	100.000			

图19 非奈利酮恩格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6031001批-pH4.5介质-篮法-100转-15min-片1
供试品溶液-1




SMF-228

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:40℃
数据文件名: RC\$SMF-228 - 0-53/27-521-3 - zzp-6031001p-pH4.5jz-lf100z-15min-P2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-20260313-FX276.lcb
样品瓶号: 1-12
进样体积: 10μl
进样时间: 2026/03/13 19:54:33
处理时间 (V3) : 2026/03/19 19:40:21
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.0ml/min
波长: 224nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 224nm							
峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.769	328513	46341	100.000	3924	1.333	--
总计		328513	46341	100.000			

图20 非奈利酮恩格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6031001批-pH4.5介质-篮法-100转-15min-片2
供试品溶液-1




SMF-228

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:40°C
数据文件名: RC\$SMF-228 - 0-53/27-522-3 - zzp-6031001p-pH4.5jz-lf100z-15min-P3.lcd
方法文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-20260313-FX276.lcb
样品瓶号: 1-21
进样体积: 10μl
进样时间: 2026/03/13 19:59:55
处理时间 (V3) : 2026/03/19 19:40:24
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.0ml/min
波长: 224nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 224nm							
峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.769	327885	46239	100.000	3923	1.334	--
总计		327885	46239	100.000			

图21 非奈利酮恩格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6031001批-pH4.5介质-篮法-100转-15min-片3
供试品溶液-1




SMF-228

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:40℃
数据文件名: RC\$SMF-228 - 0-53/27-523-3 - zzp-6031001p-pH4.5jz-lf100z-15min-P4.lcd
方法文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-20260313-FX276.lcb
样品瓶号: 1-30
进样体积: 10μl
进样时间: 2026/03/13 20:05:18
处理时间 (V3) : 2026/03/19 19:40:26
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.0ml/min
波长: 224nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 224nm							
峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.769	338798	47760	100.000	3919	1.334	--
总计		338798	47760	100.000			

图22 非奈利酮恩格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6031001批-pH4.5介质-篮法-100转-15min-片4
供试品溶液-1




SMF-228

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:40°C
数据文件名: RC\$SMF-228 - 0-53/27-524-3 - zzp-6031001p-pH4.5jz-lf100z-15min-P5.lcd
方法文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-20260313-FX276.lcb
样品瓶号: 1-39
进样体积: 10μl
进样时间: 2026/03/13 20:10:39
处理时间 (V3) : 2026/03/19 19:40:29
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.0ml/min
波长: 224nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 224nm							
峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.766	326987	46065	100.000	3912	1.335	--
总计		326987	46065	100.000			

图23 非奈利酮恩格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6031001批-pH4.5介质-篮法-100转-15min-片5
供试品溶液-1




SMF-228

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:40℃
数据文件名: RC\$SMF-228 - 0-53/27-525-3 - zzp-6031001p-pH4.5jz-lf100z-15min-P6.lcd
方法文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-20260313-FX276.lcb
样品瓶号: 1-48
进样体积: 10μl
进样时间: 2026/03/13 20:16:01
处理时间 (V3) : 2026/03/19 19:40:31
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.0ml/min
波长: 224nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 224nm							
峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.766	321916	45429	100.000	3919	1.335	--
总计		321916	45429	100.000			

图24 非奈利酮恩格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6031001批-pH4.5介质-篮法-100转-15min-片6
供试品溶液-1




SMF-228

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:40℃
数据文件名: RC\$SMF-228 - 0-53/27-526-3 - zzp-6031001p-pH4.5jz-lf100z-20min-P1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-20260313-FX276.lcb
样品瓶号: 1-4
进样体积: 10μl
进样时间: 2026/03/13 20:21:23
处理时间 (V3) : 2026/03/19 19:40:34
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.0ml/min
波长: 224nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 224nm							
峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.769	353619	49861	100.000	3922	1.335	--
总计		353619	49861	100.000			

图25 非奈利酮恩格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6031001批-pH4.5介质-篮法-100转-20min-片1
供试品溶液-1




SMF-228

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:40℃
数据文件名: RC\$SMF-228 - 0-53/27-527-3 - zzp-6031001p-pH4.5jz-lf100z-20min-P2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-20260313-FX276.lcb
样品瓶号: 1-13
进样体积: 10μl
进样时间: 2026/03/13 20:26:45
处理时间 (V3) : 2026/03/19 19:40:37
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.0ml/min
波长: 224nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 224nm							
峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.769	351181	49510	100.000	3923	1.335	--
总计		351181	49510	100.000			

图26 非奈利酮恩格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6031001批-pH4.5介质-篮法-100转-20min-片2
供试品溶液-1




SMF-228

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:40°C
数据文件名: RC\$SMF-228 - 0-53/27-528-3 - zzp-6031001p-pH4.5jz-lf100z-20min-P3.lcd
方法文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-20260313-FX276.lcb
样品瓶号: 1-22
进样体积: 10μl
进样时间: 2026/03/13 20:32:07
处理时间 (V3) : 2026/03/19 19:40:40
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.0ml/min
波长: 224nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 224nm							
峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.768	355522	50009	100.000	3919	1.336	--
总计		355522	50009	100.000			

图27 非奈利酮恩格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6031001批-pH4.5介质-篮法-100转-20min-片3
供试品溶液-1




SMF-228

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:40℃
数据文件名: RC\$SMF-228 - 0-53/27-529-3 - zzp-6031001p-pH4.5jz-lf100z-20min-P4.lcd
方法文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-20260313-FX276.lcb
样品瓶号: 1-31
进样体积: 10μl
进样时间: 2026/03/13 20:37:29
处理时间 (V3) : 2026/03/19 19:40:42
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.0ml/min
波长: 224nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 224nm							
峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.770	365950	51574	100.000	3916	1.336	--
总计		365950	51574	100.000			

图28 非奈利酮恩格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6031001批-pH4.5介质-篮法-100转-20min-片4
供试品溶液-1




SMF-228

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:40℃
数据文件名: RC\$SMF-228 - 0-53/27-530-3 - zzp-6031001p-pH4.5jz-lf100z-20min-P5.lcd
方法文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-20260313-FX276.lcb
样品瓶号: 1-40
进样体积: 10μl
进样时间: 2026/03/13 20:42:51
处理时间 (V3) : 2026/03/19 19:40:45
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.0ml/min
波长: 224nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 224nm							
峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.768	354582	49842	100.000	3908	1.337	--
总计		354582	49842	100.000			

图29 非奈利酮恩格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6031001批-pH4.5介质-篮法-100转-20min-片5
供试品溶液-1




SMF-228

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:40℃
数据文件名: RC\$SMF-228 - 0-53/27-531-3 - zzp-6031001p-pH4.5jz-lf100z-20min-P6.lcd
方法文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-20260313-FX276.lcb
样品瓶号: 1-49
进样体积: 10μl
进样时间: 2026/03/13 20:48:13
处理时间 (V3) : 2026/03/19 19:40:47
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.0ml/min
波长: 224nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 224nm							
峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.768	353458	49645	100.000	3911	1.338	--
总计		353458	49645	100.000			

图30 非奈利酮恩格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6031001批-pH4.5介质-篮法-100转-20min-片6
供试品溶液-1




SMF-228

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:40℃
数据文件名: RC\$SMF-228 - 0-53/27-532-3 - zzp-6031001p-pH4.5jz-lf100z-30min-P1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-20260313-FX276.lcb
样品瓶号: 1-5
进样体积: 10μl
进样时间: 2026/03/13 20:53:35
处理时间 (V3) : 2026/03/19 19:40:50
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.0ml/min
波长: 224nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 224nm							
峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.769	377662	53169	100.000	3916	1.337	--
总计		377662	53169	100.000			

图31 非奈利酮恩格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6031001批-pH4.5介质-篮法-100转-30min-片1
供试品溶液-1




SMF-228

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:40℃
数据文件名: RC\$SMF-228 - 0-53/27-533-3 - zzp-6031001p-pH4.5jz-lf100z-30min-P2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-20260313-FX276.lcb
样品瓶号: 1-14
进样体积: 10μl
进样时间: 2026/03/13 20:58:58
处理时间 (V3) : 2026/03/19 19:40:52
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.0ml/min
波长: 224nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 224nm							
峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.769	372579	52535	100.000	3924	1.337	--
总计		372579	52535	100.000			

图32 非奈利酮恩格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6031001批-pH4.5介质-篮法-100转-30min-片2
供试品溶液-1




SMF-228

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:40℃
数据文件名: RC\$SMF-228 - 0-53/27-534-3 - zzp-6031001p-pH4.5jz-lf100z-30min-P3.lcd
方法文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-20260313-FX276.lcb
样品瓶号: 1-23
进样体积: 10μl
进样时间: 2026/03/13 21:04:21
处理时间 (V3) : 2026/03/19 19:40:55
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.0ml/min
波长: 224nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 224nm							
峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.769	378420	53298	100.000	3913	1.337	--
总计		378420	53298	100.000			

图33 非奈利酮恩格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6031001批-pH4.5介质-篮法-100转-30min-片3
供试品溶液-1




SMF-228

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:40℃
数据文件名: RC\$SMF-228 - 0-53/27-535-3 - zzp-6031001p-pH4.5jz-lf100z-30min-P4.lcd
方法文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-20260313-FX276.lcb
样品瓶号: 1-32
进样体积: 10μl
进样时间: 2026/03/13 21:09:43
处理时间 (V3) : 2026/03/19 19:40:57
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.0ml/min
波长: 224nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 224nm							
峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.769	389161	54770	100.000	3915	1.337	--
总计		389161	54770	100.000			

图34 非奈利酮恩格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6031001批-pH4.5介质-篮法-100转-30min-片4
供试品溶液-1




SMF-228

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:40℃
数据文件名: RC\$SMF-228 - 0-53/27-536-3 - zzp-6031001p-pH4.5jz-lf100z-30min-P5.lcd
方法文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-20260313-FX276.lcb
样品瓶号: 1-41
进样体积: 10μl
进样时间: 2026/03/13 21:15:06
处理时间 (V3) : 2026/03/19 19:41:00
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.0ml/min
波长: 224nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 224nm							
峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.770	378380	53300	100.000	3914	1.339	--
总计		378380	53300	100.000			

图35 非奈利酮恩格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6031001批-pH4.5介质-篮法-100转-30min-片5
供试品溶液-1




SMF-228

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:40℃
数据文件名: RC\$SMF-228 - 0-53/27-537-3 - zzp-6031001p-pH4.5jz-lf100z-30min-P6.lcd
方法文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-20260313-FX276.lcb
样品瓶号: 1-50
进样体积: 10μl
进样时间: 2026/03/13 21:20:28
处理时间 (V3) : 2026/03/19 19:41:02
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.0ml/min
波长: 224nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 224nm							
峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.771	376801	53042	100.000	3908	1.339	--
总计		376801	53042	100.000			

图36 非奈利酮恩格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6031001批-pH4.5介质-篮法-100转-30min-片6
供试品溶液-1




SMF-228

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:40℃
数据文件名: RC\$SMF-228 - 0-53/27-538-3 - zzp-6031001p-pH4.5jz-lf100z-45min-P1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-20260313-FX276.lcb
样品瓶号: 1-6
进样体积: 10μl
进样时间: 2026/03/13 21:25:50
处理时间 (V3) : 2026/03/19 19:41:05
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.0ml/min
波长: 224nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 224nm							
峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.768	390518	54883	100.000	3910	1.340	--
总计		390518	54883	100.000			

图37 非奈利酮恩格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6031001批-pH4.5介质-篮法-100转-45min-片1
供试品溶液-1




SMF-228

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:40℃
数据文件名: RC\$SMF-228 - 0-53/27-539-3 - zzp-6031001p-pH4.5jz-lf100z-45min-P2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-20260313-FX276.lcb
样品瓶号: 1-15
进样体积: 10μl
进样时间: 2026/03/13 21:31:12
处理时间 (V3) : 2026/03/19 19:41:07
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.0ml/min
波长: 224nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 224nm							
峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.769	383090	53893	100.000	3914	1.340	--
总计		383090	53893	100.000			

图38 非奈利酮恩格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6031001批-pH4.5介质-篮法-100转-45min-片2
供试品溶液-1




SMF-228

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:40°C
数据文件名: RC\$SMF-228 - 0-53/27-540-3 - zzp-6031001p-pH4.5jz-lf100z-45min-P3.lcd
方法文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-20260313-FX276.lcb
样品瓶号: 1-24
进样体积: 10μl
进样时间: 2026/03/13 21:36:36
处理时间 (V3) : 2026/03/19 19:41:10
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.0ml/min
波长: 224nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 224nm							
峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.769	388672	54737	100.000	3922	1.340	--
总计		388672	54737	100.000			

图39 非奈利酮恩格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6031001批-pH4.5介质-篮法-100转-45min-片3
供试品溶液-1




SMF-228

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:40°C
数据文件名: RC\$SMF-228 - 0-53/27-541-3 - zzp-6031001p-pH4.5jz-lf100z-45min-P4.lcd
方法文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-20260313-FX276.lcb
样品瓶号: 1-33
进样体积: 10μl
进样时间: 2026/03/13 21:41:57
处理时间 (V3) : 2026/03/19 19:41:12
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.0ml/min
波长: 224nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 224nm							
峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.770	398409	56121	100.000	3915	1.340	--
总计		398409	56121	100.000			

图40 非奈利酮恩格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6031001批-pH4.5介质-篮法-100转-45min-片4
供试品溶液-1




SMF-228

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:40℃
数据文件名: RC\$SMF-228 - 0-53/27-542-3 - zzp-6031001p-pH4.5jz-lf100z-45min-P5.lcd
方法文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-20260313-FX276.lcb
样品瓶号: 1-42
进样体积: 10μl
进样时间: 2026/03/13 21:47:19
处理时间 (V3) : 2026/03/19 19:41:15
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.0ml/min
波长: 224nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 224nm							
峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.770	391951	55154	100.000	3910	1.340	--
总计		391951	55154	100.000			

图41 非奈利酮恩格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6031001批-pH4.5介质-篮法-100转-45min-片5
供试品溶液-1




SMF-228

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:40℃
数据文件名: RC\$SMF-228 - 0-53/27-543-3 - zzp-6031001p-pH4.5jz-lf100z-45min-P6.lcd
方法文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-20260313-FX276.lcb
样品瓶号: 1-51
进样体积: 10μl
进样时间: 2026/03/13 21:52:41
处理时间 (V3) : 2026/03/19 19:41:18
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.0ml/min
波长: 224nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 224nm							
峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.770	389010	54716	100.000	3906	1.340	--
总计		389010	54716	100.000			

图42 非奈利酮恩格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6031001批-pH4.5介质-篮法-100转-45min-片6
供试品溶液-1




SMF-228

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:40℃
数据文件名: RC\$SMF-228 - 0-53/27-544-3 - zzp-6031001p-pH4.5jz-lf100z-60min-P1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-20260313-FX276.lcb
样品瓶号: 1-7
进样体积: 10μl
进样时间: 2026/03/13 21:58:03
处理时间 (V3) : 2026/03/19 19:41:20
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.0ml/min
波长: 224nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 224nm							
峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.769	393444	55300	100.000	3904	1.341	--
总计		393444	55300	100.000			

图43 非奈利酮恩格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6031001批-pH4.5介质-篮法-100转-60min-片1
供试品溶液-1




SMF-228

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:40°C
数据文件名: RC\$SMF-228 - 0-53/27-545-3 - zzp-6031001p-pH4.5jz-lf100z-60min-P2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-20260313-FX276.lcb
样品瓶号: 1-16
进样体积: 10μl
进样时间: 2026/03/13 22:03:25
处理时间 (V3) : 2026/03/19 19:41:23
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.0ml/min
波长: 224nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 224nm							
峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.769	386398	54315	100.000	3905	1.341	--
总计		386398	54315	100.000			

图44 非奈利酮恩格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6031001批-pH4.5介质-篮法-100转-60min-片2
供试品溶液-1




SMF-228

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:40°C
数据文件名: RC\$SMF-228 - 0-53/27-546-3 - zzp-6031001p-pH4.5jz-lf100z-60min-P3.lcd
方法文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-20260313-FX276.lcb
样品瓶号: 1-25
进样体积: 10μl
进样时间: 2026/03/13 22:08:47
处理时间 (V3) : 2026/03/19 19:41:25
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.0ml/min
波长: 224nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 224nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.770	391676	55124	100.000	3913	1.341	--
总计		391676	55124	100.000			

图45 非奈利酮恩格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6031001批-pH4.5介质-篮法-100转-60min-片3
供试品溶液-1




SMF-228

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:40℃
数据文件名: RC\$SMF-228 - 0-53/27-547-3 - zzp-6031001p-pH4.5jz-lf100z-60min-P4.lcd
方法文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-20260313-FX276.lcb
样品瓶号: 1-34
进样体积: 10μl
进样时间: 2026/03/13 22:14:10
处理时间 (V3) : 2026/03/19 19:41:28
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.0ml/min
波长: 224nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 224nm							
峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.770	400547	56327	100.000	3907	1.341	--
总计		400547	56327	100.000			

图46 非奈利酮恩格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6031001批-pH4.5介质-篮法-100转-60min-片4
供试品溶液-1




SMF-228

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:40℃
数据文件名: RC\$SMF-228 - 0-53/27-548-3 - zzp-6031001p-pH4.5jz-lf100z-60min-P5.lcd
方法文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-20260313-FX276.lcb
样品瓶号: 1-43
进样体积: 10μl
进样时间: 2026/03/13 22:19:32
处理时间 (V3) : 2026/03/19 19:41:30
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.0ml/min
波长: 224nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 224nm							
峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.770	394855	55548	100.000	3908	1.341	--
总计		394855	55548	100.000			

图47 非奈利酮恩格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6031001批-pH4.5介质-篮法-100转-60min-片5
供试品溶液-1




SMF-228

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:40℃
数据文件名: RC\$SMF-228 - 0-53/27-549-3 - zzp-6031001p-pH4.5jz-lf100z-60min-P6.lcd
方法文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-20260313-FX276.lcb
样品瓶号: 1-52
进样体积: 10μl
进样时间: 2026/03/13 22:24:55
处理时间 (V3) : 2026/03/19 19:41:33
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.0ml/min
波长: 224nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 224nm							
峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.770	391695	55102	100.000	3906	1.340	--
总计		391695	55102	100.000			

图48 非奈利酮恩格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6031001批-pH4.5介质-篮法-100转-60min-片6
供试品溶液-1




SMF-228

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:40℃
数据文件名: RC\$SMF-228 - 0-53/27-550-3 - zzp-6031001p-pH4.5jz-lf100z-jxzs-P1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-20260313-FX276.lcb
样品瓶号: 1-8
进样体积: 10μl
进样时间: 2026/03/13 22:30:18
处理时间 (V3) : 2026/03/19 19:41:35
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.0ml/min
波长: 224nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 224nm							
峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.770	393770	55422	100.000	3911	1.340	--
总计		393770	55422	100.000			

图49 非奈利酮恩格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6031001批-pH4.5介质-篮法-100转-极限转速-片1
供试品溶液-1




SMF-228

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:40℃
数据文件名: RC\$SMF-228 - 0-53/27-551-3 - zzp-6031001p-pH4.5jz-lf100z-jxzs-P2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-20260313-FX276.lcb
样品瓶号: 1-17
进样体积: 10μl
进样时间: 2026/03/13 22:35:42
处理时间 (V3) : 2026/03/19 19:41:38
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.0ml/min
波长: 224nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 224nm							
峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.771	384580	54164	100.000	3915	1.340	--
总计		384580	54164	100.000			

图50 非奈利酮恩格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6031001批-pH4.5介质-篮法-100转-极限转速-片2
供试品溶液-1




SMF-228

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:40°C
数据文件名: RC\$SMF-228 - 0-53/27-552-3 - zzp-6031001p-pH4.5jz-lf100z-jxzs-P3.lcd
方法文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-20260313-FX276.lcb
样品瓶号: 1-26
进样体积: 10μl
进样时间: 2026/03/13 22:41:06
处理时间 (V3) : 2026/03/19 19:41:40
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.0ml/min
波长: 224nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 224nm							
峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.771	391671	55110	100.000	3909	1.341	--
总计		391671	55110	100.000			

图51 非奈利酮恩格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6031001批-pH4.5介质-篮法-100转-极限转速-片3
供试品溶液-1




SMF-228

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:40℃
数据文件名: RC\$SMF-228 - 0-53/27-553-3 - zzp-6031001p-pH4.5jz-lf100z-jxzs-P4.lcd
方法文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-20260313-FX276.lcb
样品瓶号: 1-35
进样体积: 10μl
进样时间: 2026/03/13 22:46:28
处理时间 (V3) : 2026/03/19 19:41:43
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.0ml/min
波长: 224nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 224nm							
峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.771	399857	56262	100.000	3908	1.341	--
总计		399857	56262	100.000			

图52 非奈利酮恩格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6031001批-pH4.5介质-篮法-100转-极限转速-片4
供试品溶液-1




SMF-228

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:40℃
数据文件名: RC\$SMF-228 - 0-53/27-554-3 - zzp-6031001p-pH4.5jz-lf100z-jxzs-P5.lcd
方法文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-20260313-FX276.lcb
样品瓶号: 1-44
进样体积: 10μl
进样时间: 2026/03/13 22:51:51
处理时间 (V3) : 2026/03/19 19:41:45
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.0ml/min
波长: 224nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 224nm							
峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.770	393827	55448	100.000	3914	1.341	--
总计		393827	55448	100.000			

图53 非奈利酮恩格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6031001批-pH4.5介质-篮法-100转-极限转速-片5
供试品溶液-1




SMF-228

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:40℃
数据文件名: RC\$SMF-228 - 0-53/27-555-3 - zzp-6031001p-pH4.5jz-lf100z-jxzs-P6.lcd
方法文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-20260313-FX276.lcb
样品瓶号: 1-53
进样体积: 10μl
进样时间: 2026/03/13 22:57:14
处理时间 (V3) : 2026/03/19 19:41:48
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.0ml/min
波长: 224nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 224nm							
峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.771	390838	55003	100.000	3911	1.342	--
总计		390838	55003	100.000			

图54 非奈利酮恩格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6031001批-pH4.5介质-篮法-100转-极限转速-片6
供试品溶液-1




SMF-228

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:40℃
数据文件名: RC\$SMF-228 - 0-53/27-556-3 - zzp-6031001p-pH4.5jz-lf100z-dz2-1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-20260313-FX276.lcb
样品瓶号: 1-27
进样体积: 10μl
进样时间: 2026/03/13 23:02:37
处理时间 (V3) : 2026/03/19 19:41:50
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.0ml/min
波长: 224nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 224nm							
峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.127	310132	47463	43.117	2672	1.343	--
2	2.752	409141	54126	56.883	3375	1.326	3.530
总计		719273	101590	100.000			

图55 非奈利酮恩格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6031001批-pH4.5介质-篮法-100转
对照品溶液-2-1




SMF-228

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:40℃
数据文件名: RC\$SMF-228 - 0-53/27-557-3 - zzp-6031001p-pH4.5jz-lf100z-dz2-2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-20260313-FX276.lcb
样品瓶号: 1-27
进样体积: 10μl
进样时间: 2026/03/13 23:08:00
处理时间 (V3) : 2026/03/19 19:41:53
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.0ml/min
波长: 224nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 224nm							
峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.127	309501	47306	43.095	2671	1.344	--
2	2.751	408676	53970	56.905	3368	1.327	3.527
总计		718177	101276	100.000			

图56 非奈利酮恩格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6031001批-pH4.5介质-篮法-100转
对照品溶液-2-2




SMF-228

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:40°C
数据文件名: RC\$SMF-228 - 0-53/27-558-3 - zzp-6031002p-pH4.5jz-lf100z-rj.lcd
方法文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-20260313-FX276.lcb
样品瓶号: 2-9
进样体积: 10μl
进样时间: 2026/03/13 23:13:24
处理时间 (V3) : 2026/03/19 19:41:55
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.0ml/min
波长: 224nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 224nm							
峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图57 非奈利酮恩格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6031002批-pH4.5介质-篮法-100转
溶剂




SMF-228

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:40℃
数据文件名: RC\$SMF-228 - 0-53/27-559-3 - zzp-6031002p-pH4.5jz-lf100z-dz1-1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-20260313-FX276.lcb
样品瓶号: 2-18
进样体积: 10μl
进样时间: 2026/03/13 23:18:48
处理时间 (V3) : 2026/03/19 19:41:58
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.0ml/min
波长: 224nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 224nm							
峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.127	310153	47479	43.085	2679	1.344	--
2	2.752	409709	54178	56.915	3377	1.326	3.532
总计		719861	101657	100.000			

图58 非奈利酮恩格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6031002批-pH4.5介质-篮法-100转
对照品溶液-1-1




SMF-228

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:40℃
数据文件名: RC\$SMF-228 - 0-53/27-560-3 - zzp-6031002p-pH4.5jz-lf100z-dz1-2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-20260313-FX276.lcb
样品瓶号: 2-18
进样体积: 10μl
进样时间: 2026/03/13 23:24:12
处理时间 (V3) : 2026/03/19 19:42:00
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.0ml/min
波长: 224nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 224nm							
峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.127	310290	47493	43.072	2677	1.343	--
2	2.752	410109	54226	56.928	3375	1.327	3.532
总计		720400	101719	100.000			

图59 非奈利酮恩格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6031002批-pH4.5介质-篮法-100转
对照品溶液-1-2




SMF-228

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:40℃
数据文件名: RC\$SMF-228 - 0-53/27-561-3 - zzp-6031002p-pH4.5jz-lf100z-dz1-3.lcd
方法文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-20260313-FX276.lcb
样品瓶号: 2-18
进样体积: 10μl
进样时间: 2026/03/13 23:29:37
处理时间 (V3) : 2026/03/19 19:42:03
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.0ml/min
波长: 224nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 224nm							
峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.127	310608	47558	43.077	2679	1.342	--
2	2.751	410439	54257	56.923	3377	1.327	3.532
总计		721048	101815	100.000			

图60 非奈利酮恩格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6031002批-pH4.5介质-篮法-100转
对照品溶液-1-3




SMF-228

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:40℃
数据文件名: RC\$SMF-228 - 0-53/27-562-3 - zzp-6031002p-pH4.5jz-lf100z-dz1-4.lcd
方法文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-20260313-FX276.lcb
样品瓶号: 2-18
进样体积: 10μl
进样时间: 2026/03/13 23:35:00
处理时间 (V3) : 2026/03/19 19:42:05
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.0ml/min
波长: 224nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 224nm							
峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.127	310311	47488	43.087	2672	1.344	--
2	2.752	409892	54182	56.913	3371	1.327	3.527
总计		720203	101670	100.000			

图61 非奈利酮恩格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6031002批-pH4.5介质-篮法-100转
对照品溶液-1-4




SMF-228

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:40℃
数据文件名: RC\$SMF-228 - 0-53/27-563-3 - zzp-6031002p-pH4.5jz-lf100z-dz1-5.lcd
方法文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-20260313-FX276.lcb
样品瓶号: 2-18
进样体积: 10μl
进样时间: 2026/03/13 23:40:25
处理时间 (V3) : 2026/03/19 19:42:08
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.0ml/min
波长: 224nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 224nm							
峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.128	310315	47540	43.090	2676	1.343	--
2	2.752	409845	54239	56.910	3379	1.327	3.532
总计		720161	101779	100.000			

图62 非奈利酮恩格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6031002批-pH4.5介质-篮法-100转
对照品溶液-1-5




SMF-228

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:40°C
数据文件名: RC\$SMF-228 - 0-53/27-564-3 - zzp-6031002p-pH4.5jz-lf100z-5min-P1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-20260313-FX276.lcb
样品瓶号: 2-1
进样体积: 10μl
进样时间: 2026/03/13 23:45:48
处理时间 (V3) : 2026/03/19 19:42:10
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.0ml/min
波长: 224nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 224nm							
峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.772	95829	13527	100.000	3927	1.341	--
总计		95829	13527	100.000			

图63 非奈利酮恩格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6031002批-pH4.5介质-篮法-100转-5min-片1
供试品溶液-1




SMF-228

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:40℃
数据文件名: RC\$SMF-228 - 0-53/27-565-3 - zzp-6031002p-pH4.5jz-lf100z-5min-P2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-20260313-FX276.lcb
样品瓶号: 2-10
进样体积: 10μl
进样时间: 2026/03/13 23:51:11
处理时间 (V3) : 2026/03/19 19:42:13
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.0ml/min
波长: 224nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 224nm							
峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.771	115522	16269	100.000	3908	1.341	--
总计		115522	16269	100.000			

图64 非奈利酮恩格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6031002批-pH4.5介质-篮法-100转-5min-片2
供试品溶液-1




SMF-228

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:40℃
数据文件名: RC\$SMF-228 - 0-53/27-566-3 - zzp-6031002p-pH4.5jz-lf100z-5min-P3.lcd
方法文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-20260313-FX276.lcb
样品瓶号: 2-19
进样体积: 10μl
进样时间: 2026/03/13 23:56:34
处理时间 (V3) : 2026/03/19 19:42:16
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.0ml/min
波长: 224nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 224nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.772	90891	12802	100.000	3910	1.342	--
总计		90891	12802	100.000			

图65 非奈利酮恩格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6031002批-pH4.5介质-篮法-100转-5min-片3
供试品溶液-1




SMF-228

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:40°C
数据文件名: RC\$SMF-228 - 0-53/27-567-3 - zzp-6031002p-pH4.5jz-lf100z-5min-P4.lcd
方法文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-20260313-FX276.lcb
样品瓶号: 2-28
进样体积: 10μl
进样时间: 2026/03/14 00:01:58
处理时间 (V3) : 2026/03/19 19:42:19
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.0ml/min
波长: 224nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 224nm							
峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.771	69979	9864	100.000	3904	1.341	--
总计		69979	9864	100.000			

图66 非奈利酮恩格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6031002批-pH4.5介质-篮法-100转-5min-片4
供试品溶液-1




SMF-228

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:40°C
数据文件名: RC\$SMF-228 - 0-53/27-568-3 - zzp-6031002p-pH4.5jz-lf100z-5min-P5.lcd
方法文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-20260313-FX276.lcb
样品瓶号: 2-37
进样体积: 10μl
进样时间: 2026/03/14 00:07:20
处理时间 (V3) : 2026/03/19 19:42:21
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.0ml/min
波长: 224nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 224nm							
峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.771	124860	17575	100.000	3907	1.341	--
总计		124860	17575	100.000			

图67 非奈利酮恩格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6031002批-pH4.5介质-篮法-100转-5min-片5
供试品溶液-1




SMF-228

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:40℃
数据文件名: RC\$SMF-228 - 0-53/27-569-3 - zzp-6031002p-pH4.5jz-lf100z-5min-P6.lcd
方法文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-20260313-FX276.lcb
样品瓶号: 2-46
进样体积: 10μl
进样时间: 2026/03/14 00:12:44
处理时间 (V3) : 2026/03/19 19:42:24
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.0ml/min
波长: 224nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 224nm							
峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.771	100649	14184	100.000	3912	1.342	--
总计		100649	14184	100.000			

图68 非奈利酮恩格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6031002批-pH4.5介质-篮法-100转-5min-片6
供试品溶液-1




SMF-228

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:40℃
数据文件名: RC\$SMF-228 - 0-53/27-570-3 - zzp-6031002p-pH4.5jz-lf100z-10min-P1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-20260313-FX276.lcb
样品瓶号: 2-2
进样体积: 10μl
进样时间: 2026/03/14 00:18:07
处理时间 (V3) : 2026/03/19 19:42:26
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.0ml/min
波长: 224nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 224nm							
峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.773	261060	36744	100.000	3916	1.343	--
总计		261060	36744	100.000			

图69 非奈利酮恩格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6031002批-pH4.5介质-篮法-100转-10min-片1
供试品溶液-1




SMF-228

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:40℃
数据文件名: RC\$SMF-228 - 0-53/27-571-3 - zzp-6031002p-pH4.5jz-lf100z-10min-P2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-20260313-FX276.lcb
样品瓶号: 2-11
进样体积: 10μl
进样时间: 2026/03/14 00:23:30
处理时间 (V3) : 2026/03/19 19:42:29
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.0ml/min
波长: 224nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 224nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.772	275087	38739	100.000	3921	1.342	--
总计		275087	38739	100.000			

图70 非奈利酮恩格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6031002批-pH4.5介质-篮法-100转-10min-片2
供试品溶液-1




SMF-228

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:40℃
数据文件名: RC\$SMF-228 - 0-53/27-572-3 - zzp-6031002p-pH4.5jz-lf100z-10min-P3.lcd
方法文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-20260313-FX276.lcb
样品瓶号: 2-20
进样体积: 10μl
进样时间: 2026/03/14 00:28:54
处理时间 (V3) : 2026/03/19 19:42:32
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.0ml/min
波长: 224nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 224nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.771	265171	37315	100.000	3909	1.343	--
总计		265171	37315	100.000			

图71 非奈利酮恩格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6031002批-pH4.5介质-篮法-100转-10min-片3
供试品溶液-1




SMF-228

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:40℃
数据文件名: RC\$SMF-228 - 0-53/27-573-3 - zzp-6031002p-pH4.5jz-lf100z-10min-P4.lcd
方法文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-20260313-FX276.lcb
样品瓶号: 2-29
进样体积: 10μl
进样时间: 2026/03/14 00:34:18
处理时间 (V3) : 2026/03/19 19:42:35
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.0ml/min
波长: 224nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 224nm							
峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.772	260304	36658	100.000	3919	1.343	--
总计		260304	36658	100.000			

图72 非奈利酮恩格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6031002批-pH4.5介质-篮法-100转-10min-片4
供试品溶液-1




SMF-228

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:40°C
数据文件名: RC\$SMF-228 - 0-53/27-574-3 - zzp-6031002p-pH4.5jz-lf100z-10min-P5.lcd
方法文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-20260313-FX276.lcb
样品瓶号: 2-38
进样体积: 10μl
进样时间: 2026/03/14 00:39:40
处理时间 (V3) : 2026/03/19 19:42:37
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.0ml/min
波长: 224nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 224nm							
峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.774	284954	40018	100.000	3911	1.344	--
总计		284954	40018	100.000			

图73 非奈利酮恩格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6031002批-pH4.5介质-篮法-100转-10min-片5
供试品溶液-1




SMF-228

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:40℃
数据文件名: RC\$SMF-228 - 0-53/27-575-3 - zzp-6031002p-pH4.5jz-lf100z-10min-P6.lcd
方法文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-20260313-FX276.lcb
样品瓶号: 2-47
进样体积: 10μl
进样时间: 2026/03/14 00:45:03
处理时间 (V3) : 2026/03/19 19:42:39
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.0ml/min
波长: 224nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 224nm							
峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.771	265923	37436	100.000	3914	1.343	--
总计		265923	37436	100.000			

图74 非奈利酮恩格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6031002批-pH4.5介质-篮法-100转-10min-片6
供试品溶液-1




SMF-228

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:40°C
数据文件名: RC\$SMF-228 - 0-53/27-576-3 - zzp-6031002p-pH4.5jz-lf100z-15min-P1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-20260313-FX276.lcb
样品瓶号: 2-3
进样体积: 10μl
进样时间: 2026/03/14 00:50:27
处理时间 (V3) : 2026/03/19 19:42:42
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.0ml/min
波长: 224nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 224nm							
峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.772	326884	45986	100.000	3911	1.343	--
总计		326884	45986	100.000			

图75 非奈利酮恩格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6031002批-pH4.5介质-篮法-100转-15min-片1
供试品溶液-1




SMF-228

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:40℃
数据文件名: RC\$SMF-228 - 0-53/27-577-3 - zzp-6031002p-pH4.5jz-lf100z-15min-P2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-20260313-FX276.lcb
样品瓶号: 2-12
进样体积: 10μl
进样时间: 2026/03/14 00:55:51
处理时间 (V3) : 2026/03/19 19:42:44
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.0ml/min
波长: 224nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 224nm							
峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.773	330794	46497	100.000	3908	1.343	--
总计		330794	46497	100.000			

图76 非奈利酮恩格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6031002批-pH4.5介质-篮法-100转-15min-片2
供试品溶液-1




SMF-228

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:40℃
数据文件名: RC\$SMF-228 - 0-53/27-578-3 - zzp-6031002p-pH4.5jz-lf100z-15min-P3.lcd
方法文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-20260313-FX276.lcb
样品瓶号: 2-21
进样体积: 10μl
进样时间: 2026/03/14 01:01:14
处理时间 (V3) : 2026/03/19 19:42:47
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.0ml/min
波长: 224nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 224nm							
峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.773	326397	45865	100.000	3910	1.344	--
总计		326397	45865	100.000			

图77 非奈利酮恩格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6031002批-pH4.5介质-篮法-100转-15min-片3
供试品溶液-1




SMF-228

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:40°C
数据文件名: RC\$SMF-228 - 0-53/27-579-3 - zzp-6031002p-pH4.5jz-lf100z-15min-P4.lcd
方法文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-20260313-FX276.lcb
样品瓶号: 2-30
进样体积: 10μl
进样时间: 2026/03/14 01:06:37
处理时间 (V3) : 2026/03/19 19:42:50
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.0ml/min
波长: 224nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 224nm							
峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.771	327193	46053	100.000	3914	1.343	--
总计		327193	46053	100.000			

图78 非奈利酮恩格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6031002批-pH4.5介质-篮法-100转-15min-片4
供试品溶液-1




SMF-228

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:40℃
数据文件名: RC\$SMF-228 - 0-53/27-580-3 - zzp-6031002p-pH4.5jz-lf100z-15min-P5.lcd
方法文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-20260313-FX276.lcb
样品瓶号: 2-39
进样体积: 10μl
进样时间: 2026/03/14 01:12:01
处理时间 (V3) : 2026/03/19 19:42:52
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.0ml/min
波长: 224nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 224nm							
峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.772	338605	47669	100.000	3918	1.343	--
总计		338605	47669	100.000			

图79 非奈利酮恩格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6031002批-pH4.5介质-篮法-100转-15min-片5
供试品溶液-1




SMF-228

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:40℃
数据文件名: RC\$SMF-228 - 0-53/27-581-3 - zzp-6031002p-pH4.5jz-lf100z-15min-P6.lcd
方法文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-20260313-FX276.lcb
样品瓶号: 2-48
进样体积: 10μl
进样时间: 2026/03/14 01:17:25
处理时间 (V3) : 2026/03/19 19:42:55
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.0ml/min
波长: 224nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 224nm							
峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.772	325032	45758	100.000	3917	1.343	--
总计		325032	45758	100.000			

图80 非奈利酮恩格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6031002批-pH4.5介质-篮法-100转-15min-片6
供试品溶液-1




SMF-228

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:40℃
数据文件名: RC\$SMF-228 - 0-53/27-582-3 - zzp-6031002p-pH4.5jz-lf100z-20min-P1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-20260313-FX276.lcb
样品瓶号: 2-4
进样体积: 10μl
进样时间: 2026/03/14 01:22:47
处理时间 (V3) : 2026/03/19 19:42:57
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.0ml/min
波长: 224nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 224nm							
峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.773	357844	50305	100.000	3912	1.344	--
总计		357844	50305	100.000			

图81 非奈利酮恩格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6031002批-pH4.5介质-篮法-100转-20min-片1
供试品溶液-1




SMF-228

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:40℃
数据文件名: RC\$SMF-228 - 0-53/27-583-3 - zzp-6031002p-pH4.5jz-lf100z-20min-P2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-20260313-FX276.lcb
样品瓶号: 2-13
进样体积: 10μl
进样时间: 2026/03/14 01:28:11
处理时间 (V3) : 2026/03/19 19:43:00
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.0ml/min
波长: 224nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 224nm							
峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.772	358890	50538	100.000	3920	1.344	--
总计		358890	50538	100.000			

图82 非奈利酮恩格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6031002批-pH4.5介质-篮法-100转-20min-片2
供试品溶液-1




SMF-228

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:40°C
数据文件名: RC\$SMF-228 - 0-53/27-584-3 - zzp-6031002p-pH4.5jz-lf100z-20min-P3.lcd
方法文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-20260313-FX276.lcb
样品瓶号: 2-22
进样体积: 10μl
进样时间: 2026/03/14 01:33:35
处理时间 (V3) : 2026/03/19 19:43:03
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.0ml/min
波长: 224nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 224nm							
峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.772	353334	49709	100.000	3912	1.344	--
总计		353334	49709	100.000			

图83 非奈利酮恩格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6031002批-pH4.5介质-篮法-100转-20min-片3
供试品溶液-1




SMF-228

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:40℃
数据文件名: RC\$SMF-228 - 0-53/27-585-3 - zzp-6031002p-pH4.5jz-lf100z-20min-P4.lcd
方法文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-20260313-FX276.lcb
样品瓶号: 2-31
进样体积: 10μl
进样时间: 2026/03/14 01:38:58
处理时间 (V3) : 2026/03/19 19:43:05
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.0ml/min
波长: 224nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 224nm							
峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.772	358607	50444	100.000	3911	1.344	--
总计		358607	50444	100.000			

图84 非奈利酮恩格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6031002批-pH4.5介质-篮法-100转-20min-片4
供试品溶液-1




SMF-228

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:40℃
数据文件名: RC\$SMF-228 - 0-53/27-586-3 - zzp-6031002p-pH4.5jz-lf100z-20min-P5.lcd
方法文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-20260313-FX276.lcb
样品瓶号: 2-40
进样体积: 10μl
进样时间: 2026/03/14 01:44:21
处理时间 (V3) : 2026/03/19 19:43:08
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.0ml/min
波长: 224nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 224nm							
峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.772	364035	51202	100.000	3913	1.344	--
总计		364035	51202	100.000			

图85 非奈利酮恩格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6031002批-pH4.5介质-篮法-100转-20min-片5
供试品溶液-1




SMF-228

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:40℃
数据文件名: RC\$SMF-228 - 0-53/27-587-3 - zzp-6031002p-pH4.5jz-lf100z-20min-P6.lcd
方法文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-20260313-FX276.lcb
样品瓶号: 2-49
进样体积: 10μl
进样时间: 2026/03/14 01:49:45
处理时间 (V3) : 2026/03/19 19:43:10
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.0ml/min
波长: 224nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 224nm							
峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.773	355103	49893	100.000	3911	1.344	--
总计		355103	49893	100.000			

图86 非奈利酮恩格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6031002批-pH4.5介质-篮法-100转-20min-片6
供试品溶液-1




SMF-228

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:40℃
数据文件名: RC\$SMF-228 - 0-53/27-588-3 - zzp-6031002p-pH4.5jz-lf100z-30min-P1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-20260313-FX276.lcb
样品瓶号: 2-5
进样体积: 10μl
进样时间: 2026/03/14 01:55:09
处理时间 (V3) : 2026/03/19 19:43:13
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.0ml/min
波长: 224nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 224nm							
峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.771	385426	54261	100.000	3915	1.344	--
总计		385426	54261	100.000			

图87 非奈利酮恩格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6031002批-pH4.5介质-篮法-100转-30min-片1
供试品溶液-1




SMF-228

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:40℃
数据文件名: RC\$SMF-228 - 0-53/27-589-3 - zzp-6031002p-pH4.5jz-lf100z-30min-P2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-20260313-FX276.lcb
样品瓶号: 2-14
进样体积: 10μl
进样时间: 2026/03/14 02:00:33
处理时间 (V3) : 2026/03/19 19:43:15
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.0ml/min
波长: 224nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 224nm							
峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.772	385423	54205	100.000	3912	1.344	--
总计		385423	54205	100.000			

图88 非奈利酮恩格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6031002批-pH4.5介质-篮法-100转-30min-片2
供试品溶液-1




SMF-228

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:40°C
数据文件名: RC\$SMF-228 - 0-53/27-590-3 - zzp-6031002p-pH4.5jz-lf100z-30min-P3.lcd
方法文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-20260313-FX276.lcb
样品瓶号: 2-23
进样体积: 10μl
进样时间: 2026/03/14 02:05:56
处理时间 (V3) : 2026/03/19 19:43:18
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.0ml/min
波长: 224nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 224nm							
峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.772	380942	53578	100.000	3910	1.344	--
总计		380942	53578	100.000			

图89 非奈利酮恩格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6031002批-pH4.5介质-篮法-100转-30min-片3
供试品溶液-1




SMF-228

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:40°C
数据文件名: RC\$SMF-228 - 0-53/27-591-3 - zzp-6031002p-pH4.5jz-lf100z-30min-P4.lcd
方法文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-20260313-FX276.lcb
样品瓶号: 2-32
进样体积: 10μl
进样时间: 2026/03/14 02:11:20
处理时间 (V3) : 2026/03/19 19:43:20
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.0ml/min
波长: 224nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 224nm							
峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.771	384711	54097	100.000	3908	1.344	--
总计		384711	54097	100.000			

图90 非奈利酮恩格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6031002批-pH4.5介质-篮法-100转-30min-片4
供试品溶液-1




SMF-228

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:40℃
数据文件名: RC\$SMF-228 - 0-53/27-592-3 - zzp-6031002p-pH4.5jz-lf100z-30min-P5.lcd
方法文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-20260313-FX276.lcb
样品瓶号: 2-41
进样体积: 10μl
进样时间: 2026/03/14 02:16:43
处理时间 (V3) : 2026/03/19 19:43:23
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.0ml/min
波长: 224nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 224nm							
峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.771	386091	54289	100.000	3908	1.344	--
总计		386091	54289	100.000			

图91 非奈利酮恩格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6031002批-pH4.5介质-篮法-100转-30min-片5
供试品溶液-1




SMF-228

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:40℃
数据文件名: RC\$SMF-228 - 0-53/27-593-3 - zzp-6031002p-pH4.5jz-lf100z-30min-P6.lcd
方法文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-20260313-FX276.lcb
样品瓶号: 2-50
进样体积: 10μl
进样时间: 2026/03/14 02:22:08
处理时间 (V3) : 2026/03/19 19:43:25
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.0ml/min
波长: 224nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 224nm							
峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.772	383524	53940	100.000	3910	1.344	--
总计		383524	53940	100.000			

图92 非奈利酮恩格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6031002批-pH4.5介质-篮法-100转-30min-片6
供试品溶液-1




SMF-228

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:40℃
数据文件名: RC\$SMF-228 - 0-53/27-594-3 - zzp-6031002p-pH4.5jz-lf100z-45min-P1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-20260313-FX276.lcb
样品瓶号: 2-6
进样体积: 10μl
进样时间: 2026/03/14 02:27:32
处理时间 (V3) : 2026/03/19 19:43:28
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.0ml/min
波长: 224nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 224nm							
峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.773	397577	55833	100.000	3899	1.344	--
总计		397577	55833	100.000			

图93 非奈利酮恩格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6031002批-pH4.5介质-篮法-100转-45min-片1
供试品溶液-1




SMF-228

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:40℃
数据文件名: RC\$SMF-228 - 0-53/27-595-3 - zzp-6031002p-pH4.5jz-lf100z-45min-P2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-20260313-FX276.lcb
样品瓶号: 2-15
进样体积: 10μl
进样时间: 2026/03/14 02:32:55
处理时间 (V3) : 2026/03/19 19:43:30
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.0ml/min
波长: 224nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 224nm							
峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.772	397944	56011	100.000	3916	1.344	--
总计		397944	56011	100.000			

图94 非奈利酮恩格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6031002批-pH4.5介质-篮法-100转-45min-片2
供试品溶液-1




SMF-228

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:40°C
数据文件名: RC\$SMF-228 - 0-53/27-596-3 - zzp-6031002p-pH4.5jz-lf100z-45min-P3.lcd
方法文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-20260313-FX276.lcb
样品瓶号: 2-24
进样体积: 10μl
进样时间: 2026/03/14 02:38:21
处理时间 (V3) : 2026/03/19 19:43:33
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.0ml/min
波长: 224nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 224nm							
峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.773	395059	55530	100.000	3909	1.344	--
总计		395059	55530	100.000			

图95 非奈利酮恩格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6031002批-pH4.5介质-篮法-100转-45min-片3
供试品溶液-1




SMF-228

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:40°C
数据文件名: RC\$SMF-228 - 0-53/27-597-3 - zzp-6031002p-pH4.5jz-lf100z-45min-P4.lcd
方法文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-20260313-FX276.lcb
样品瓶号: 2-33
进样体积: 10μl
进样时间: 2026/03/14 02:43:45
处理时间 (V3) : 2026/03/19 19:43:36
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.0ml/min
波长: 224nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 224nm							
峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.773	395882	55638	100.000	3907	1.344	--
总计		395882	55638	100.000			

图96 非奈利酮恩格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6031002批-pH4.5介质-篮法-100转-45min-片4
供试品溶液-1




SMF-228

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:40℃
数据文件名: RC\$SMF-228 - 0-53/27-598-3 - zzp-6031002p-pH4.5jz-lf100z-45min-P5.lcd
方法文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-20260313-FX276.lcb
样品瓶号: 2-42
进样体积: 10μl
进样时间: 2026/03/14 02:49:09
处理时间 (V3) : 2026/03/19 19:43:38
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.0ml/min
波长: 224nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 224nm							
峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.772	398907	56100	100.000	3912	1.344	--
总计		398907	56100	100.000			

图97 非奈利酮恩格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6031002批-pH4.5介质-篮法-100转-45min-片5
供试品溶液-1




SMF-228

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:40℃
数据文件名: RC\$SMF-228 - 0-53/27-599-3 - zzp-6031002p-pH4.5jz-lf100z-45min-P6.lcd
方法文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-20260313-FX276.lcb
样品瓶号: 2-51
进样体积: 10μl
进样时间: 2026/03/14 02:54:33
处理时间 (V3) : 2026/03/19 19:43:41
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.0ml/min
波长: 224nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 224nm							
峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.771	403608	56805	100.000	3915	1.344	--
总计		403608	56805	100.000			

图98 非奈利酮恩格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6031002批-pH4.5介质-篮法-100转-45min-片6
供试品溶液-1




SMF-228

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:40℃
数据文件名: RC\$SMF-228 - 0-53/27-600-3 - zzp-6031002p-pH4.5jz-lf100z-60min-P1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-20260313-FX276.lcb
样品瓶号: 2-7
进样体积: 10μl
进样时间: 2026/03/14 02:59:57
处理时间 (V3) : 2026/03/19 19:43:43
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.0ml/min
波长: 224nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 224nm							
峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.774	400887	56251	100.000	3909	1.345	--
总计		400887	56251	100.000			

图99 非奈利酮恩格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6031002批-pH4.5介质-篮法-100转-60min-片1
供试品溶液-1




SMF-228

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:40°C
数据文件名: RC\$SMF-228 - 0-53/27-601-3 - zzp-6031002p-pH4.5jz-lf100z-60min-P2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-20260313-FX276.lcb
样品瓶号: 2-16
进样体积: 10μl
进样时间: 2026/03/14 03:05:20
处理时间 (V3) : 2026/03/19 19:43:46
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.0ml/min
波长: 224nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 224nm							
峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.771	402091	56544	100.000	3909	1.343	--
总计		402091	56544	100.000			

图100 非奈利酮恩格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6031002批-pH4.5介质-篮法-100转-60min-片2
供试品溶液-1




SMF-228

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:40°C
数据文件名: RC\$SMF-228 - 0-53/27-602-3 - zzp-6031002p-pH4.5jz-lf100z-60min-P3.lcd
方法文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-20260313-FX276.lcb
样品瓶号: 2-25
进样体积: 10μl
进样时间: 2026/03/14 03:10:44
处理时间 (V3) : 2026/03/19 19:43:48
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.0ml/min
波长: 224nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 224nm							
峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.772	396525	55804	100.000	3918	1.345	--
总计		396525	55804	100.000			

图101 非奈利酮恩格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6031002批-pH4.5介质-篮法-100转-60min-片3
供试品溶液-1




SMF-228

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:40°C
数据文件名: RC\$SMF-228 - 0-53/27-603-3 - zzp-6031002p-pH4.5jz-lf100z-60min-P4.lcd
方法文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-20260313-FX276.lcb
样品瓶号: 2-34
进样体积: 10μl
进样时间: 2026/03/14 03:16:09
处理时间 (V3) : 2026/03/19 19:43:51
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.0ml/min
波长: 224nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 224nm							
峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.772	398109	55979	100.000	3909	1.344	--
总计		398109	55979	100.000			

图102 非奈利酮恩格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6031002批-pH4.5介质-篮法-100转-60min-片4
供试品溶液-1




SMF-228

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:40°C
数据文件名: RC\$SMF-228 - 0-53/27-604-3 - zzp-6031002p-pH4.5jz-lf100z-60min-P5.lcd
方法文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-20260313-FX276.lcb
样品瓶号: 2-43
进样体积: 10μl
进样时间: 2026/03/14 03:21:32
处理时间 (V3) : 2026/03/19 19:43:54
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.0ml/min
波长: 224nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 224nm							
峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.772	400240	56298	100.000	3913	1.344	--
总计		400240	56298	100.000			

图103 非奈利酮恩格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6031002批-pH4.5介质-篮法-100转-60min-片5
供试品溶液-1




SMF-228

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:40°C
数据文件名: RC\$SMF-228 - 0-53/27-605-3 - zzp-6031002p-pH4.5jz-lf100z-60min-P6.lcd
方法文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-20260313-FX276.lcb
样品瓶号: 2-52
进样体积: 10μl
进样时间: 2026/03/14 03:26:56
处理时间 (V3) : 2026/03/19 19:43:56
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.0ml/min
波长: 224nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 224nm							
峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.773	400150	56252	100.000	3912	1.345	--
总计		400150	56252	100.000			

图104 非奈利酮恩格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6031002批-pH4.5介质-篮法-100转-60min-片6
供试品溶液-1




SMF-228

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:40°C
数据文件名: RC\$SMF-228 - 0-53/27-606-3 - zzp-6031002p-pH4.5jz-lf100z-jxzs-P1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-20260313-FX276.lcb
样品瓶号: 2-8
进样体积: 10μl
进样时间: 2026/03/14 03:32:20
处理时间 (V3) : 2026/03/19 19:43:59
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.0ml/min
波长: 224nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 224nm							
峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.773	400515	56265	100.000	3902	1.344	--
总计		400515	56265	100.000			

图105 非奈利酮恩格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6031002批-pH4.5介质-篮法-100转-极限转速-片1
供试品溶液-1




SMF-228

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:40°C
数据文件名: RC\$SMF-228 - 0-53/27-607-3 - zzp-6031002p-pH4.5jz-lf100z-jxzs-P2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-20260313-FX276.lcb
样品瓶号: 2-17
进样体积: 10μl
进样时间: 2026/03/14 03:37:44
处理时间 (V3) : 2026/03/19 19:44:01
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.0ml/min
波长: 224nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 224nm							
峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.772	400204	56272	100.000	3910	1.344	--
总计		400204	56272	100.000			

图106 非奈利酮恩格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6031002批-pH4.5介质-篮法-100转-极限转速-片2
供试品溶液-1




SMF-228

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:40°C
数据文件名: RC\$SMF-228 - 0-53/27-608-3 - zzp-6031002p-pH4.5jz-lf100z-jxzs-P3.lcd
方法文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-20260313-FX276.lcb
样品瓶号: 2-26
进样体积: 10μl
进样时间: 2026/03/14 03:43:08
处理时间 (V3) : 2026/03/19 19:44:04
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.0ml/min
波长: 224nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 224nm							
峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.772	396075	55691	100.000	3909	1.343	--
总计		396075	55691	100.000			

图107 非奈利酮恩格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6031002批-pH4.5介质-篮法-100转-极限转速-片3
供试品溶液-1




SMF-228

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:40°C
数据文件名: RC\$SMF-228 - 0-53/27-609-3 - zzp-6031002p-pH4.5jz-lf100z-jxzs-P4.lcd
方法文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-20260313-FX276.lcb
样品瓶号: 2-35
进样体积: 10μl
进样时间: 2026/03/14 03:48:32
处理时间 (V3) : 2026/03/19 19:44:06
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.0ml/min
波长: 224nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 224nm							
峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.772	397571	55903	100.000	3908	1.344	--
总计		397571	55903	100.000			

图108 非奈利酮恩格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6031002批-pH4.5介质-篮法-100转-极限转速-片4
供试品溶液-1




SMF-228

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:40℃
数据文件名: RC\$SMF-228 - 0-53/27-610-3 - zzp-6031002p-pH4.5jz-lf100z-jxzs-P5.lcd
方法文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-20260313-FX276.lcb
样品瓶号: 2-44
进样体积: 10μl
进样时间: 2026/03/14 03:53:56
处理时间 (V3) : 2026/03/19 19:44:09
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.0ml/min
波长: 224nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 224nm							
峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.772	400289	56295	100.000	3910	1.343	--
总计		400289	56295	100.000			

图109 非奈利酮恩格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6031002批-pH4.5介质-篮法-100转-极限转速-片5
供试品溶液-1




SMF-228

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:40℃
数据文件名: RC\$SMF-228 - 0-53/27-611-3 - zzp-6031002p-pH4.5jz-lf100z-jxzs-P6.lcd
方法文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-20260313-FX276.lcb
样品瓶号: 2-53
进样体积: 10μl
进样时间: 2026/03/14 03:59:19
处理时间 (V3) : 2026/03/19 19:44:12
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.0ml/min
波长: 224nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 224nm							
峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.772	400407	56273	100.000	3906	1.344	--
总计		400407	56273	100.000			

图110 非奈利酮恩格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6031002批-pH4.5介质-篮法-100转-极限转速-片6
供试品溶液-1




SMF-228

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:40℃
数据文件名: RC\$SMF-228 - 0-53/27-612-3 - zzp-6031002p-pH4.5jz-lf100z-dz2-1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-20260313-FX276.lcb
样品瓶号: 2-27
进样体积: 10μl
进样时间: 2026/03/14 04:04:44
处理时间 (V3) : 2026/03/19 19:44:14
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.0ml/min
波长: 224nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 224nm							
峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.130	309832	47565	43.097	2685	1.344	--
2	2.754	409081	54168	56.903	3380	1.328	3.529
总计		718913	101734	100.000			

图111 非奈利酮恩格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6031002批-pH4.5介质-篮法-100转
对照品溶液-2-1




SMF-228

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:40℃
数据文件名: RC\$SMF-228 - 0-53/27-613-3 - zzp-6031002p-pH4.5jz-lf100z-dz2-2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-20260313-FX276.lcb
样品瓶号: 2-27
进样体积: 10μl
进样时间: 2026/03/14 04:10:09
处理时间 (V3) : 2026/03/19 19:44:16
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.0ml/min
波长: 224nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 224nm							
峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.129	309808	47510	43.095	2680	1.344	--
2	2.753	409081	54093	56.905	3374	1.329	3.525
总计		718889	101603	100.000			

图112 非奈利酮恩格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6031002批-pH4.5介质-篮法-100转
对照品溶液-2-2




SMF-228

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:40°C
数据文件名: RC\$SMF-228 - 0-53/27-614-3 - zzp-6031101p-pH4.5jz-lf100z-rj.lcd
方法文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-20260313-FX276.lcb
样品瓶号: 3-9
进样体积: 10μl
进样时间: 2026/03/14 04:15:31
处理时间 (V3) : 2026/03/19 19:44:19
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.0ml/min
波长: 224nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 224nm							
峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图113 非奈利酮恩格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6031101批-pH4.5介质-篮法-100转
溶剂




SMF-228

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:40℃
数据文件名: RC\$SMF-228 - 0-53/27-615-3 - zzp-6031101p-pH4.5jz-lf100z-dz1-1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-20260313-FX276.lcb
样品瓶号: 3-18
进样体积: 10μl
进样时间: 2026/03/14 04:20:54
处理时间 (V3) : 2026/03/19 19:44:22
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.0ml/min
波长: 224nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 224nm							
峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.130	310690	47724	43.100	2687	1.343	--
2	2.754	410165	54357	56.900	3383	1.327	3.530
总计		720854	102081	100.000			

图114 非奈利酮恩格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6031101批-pH4.5介质-篮法-100转
对照品溶液-1-1




SMF-228

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:40℃
数据文件名: RC\$SMF-228 - 0-53/27-616-3 - zzp-6031101p-pH4.5jz-lf100z-dz1-2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-20260313-FX276.lcb
样品瓶号: 3-18
进样体积: 10μl
进样时间: 2026/03/14 04:26:16
处理时间 (V3) : 2026/03/19 19:44:24
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.0ml/min
波长: 224nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 224nm							
峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.129	310866	47649	43.098	2674	1.344	--
2	2.754	410438	54292	56.902	3372	1.328	3.524
总计		721304	101941	100.000			

图115 非奈利酮恩格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6031101批-pH4.5介质-篮法-100转
对照品溶液-1-2




SMF-228

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:40℃
数据文件名: RC\$SMF-228 - 0-53/27-617-3 - zzp-6031101p-pH4.5jz-lf100z-dz1-3.lcd
方法文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-20260313-FX276.lcb
样品瓶号: 3-18
进样体积: 10μl
进样时间: 2026/03/14 04:31:38
处理时间 (V3) : 2026/03/19 19:44:27
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.0ml/min
波长: 224nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 224nm							
峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.129	310701	47884	43.104	2705	1.340	--
2	2.753	410119	54499	56.896	3404	1.326	3.539
总计		720820	102383	100.000			

图116 非奈利酮恩格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6031101批-pH4.5介质-篮法-100转
对照品溶液-1-3




SMF-228

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:40℃
数据文件名: RC\$SMF-228 - 0-53/27-618-3 - zzp-6031101p-pH4.5jz-lf100z-dz1-4.lcd
方法文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-20260313-FX276.lcb
样品瓶号: 3-18
进样体积: 10μl
进样时间: 2026/03/14 04:37:01
处理时间 (V3) : 2026/03/19 19:44:29
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.0ml/min
波长: 224nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 224nm							
峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.130	310939	47667	43.134	2677	1.344	--
2	2.755	409933	54319	56.866	3382	1.328	3.526
总计		720872	101986	100.000			

图117 非奈利酮恩格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6031101批-pH4.5介质-篮法-100转
对照品溶液-1-4




SMF-228

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:40℃
数据文件名: RC\$SMF-228 - 0-53/27-619-3 - zzp-6031101p-pH4.5jz-lf100z-dz1-5.lcd
方法文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-20260313-FX276.lcb
样品瓶号: 3-18
进样体积: 10μl
进样时间: 2026/03/14 04:42:24
处理时间 (V3) : 2026/03/19 19:44:32
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.0ml/min
波长: 224nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 224nm							
峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.130	310758	47667	43.099	2680	1.344	--
2	2.754	410277	54317	56.901	3377	1.328	3.527
总计		721035	101984	100.000			

图118 非奈利酮恩格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6031101批-pH4.5介质-篮法-100转
对照品溶液-1-5




SMF-228

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:40℃
数据文件名: RC\$SMF-228 - 0-53/27-620-3 - zzp-6031101p-pH4.5jz-lf100z-5min-P1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-20260313-FX276.lcb
样品瓶号: 3-1
进样体积: 10μl
进样时间: 2026/03/14 04:47:46
处理时间 (V3) : 2026/03/19 19:44:34
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.0ml/min
波长: 224nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 224nm							
峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.150	260564	43611	77.789	3353	1.365	--
2	2.772	74400	10482	22.211	3908	1.343	3.814
总计		334964	54093	100.000			

图119 非奈利酮恩格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6031101批-pH4.5介质-篮法-100转-5min-片1
供试品溶液-1




SMF-228

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:40℃
数据文件名: RC\$SMF-228 - 0-53/27-621-3 - zzp-6031101p-pH4.5jz-lf100z-5min-P2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-20260313-FX276.lcb
样品瓶号: 3-10
进样体积: 10μl
进样时间: 2026/03/14 04:53:07
处理时间 (V3) : 2026/03/19 19:44:37
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.0ml/min
波长: 224nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 224nm							
峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.151	156624	26202	71.606	3357	1.364	--
2	2.772	62105	8751	28.394	3909	1.341	3.815
总计		218729	34953	100.000			

图120 非奈利酮恩格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6031101批-pH4.5介质-篮法-100转-5min-片2
供试品溶液-1




SMF-228

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:40°C
数据文件名: RC\$SMF-228 - 0-53/27-622-3 - zzp-6031101p-pH4.5jz-lf100z-5min-P3.lcd
方法文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-20260313-FX276.lcb
样品瓶号: 3-19
进样体积: 10μl
进样时间: 2026/03/14 04:58:29
处理时间 (V3) : 2026/03/19 19:44:40
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.0ml/min
波长: 224nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 224nm							
峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.151	147009	24622	66.640	3352	1.361	--
2	2.773	73593	10360	33.360	3911	1.344	3.815
总计		220602	34982	100.000			

图121 非奈利酮恩格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6031101批-pH4.5介质-篮法-100转-5min-片3
供试品溶液-1




SMF-228

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:40℃
数据文件名: RC\$SMF-228 - 0-53/27-623-3 - zzp-6031101p-pH4.5jz-lf100z-5min-P4.lcd
方法文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-20260313-FX276.lcb
样品瓶号: 3-28
进样体积: 10μl
进样时间: 2026/03/14 05:03:53
处理时间 (V3) : 2026/03/19 19:44:42
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.0ml/min
波长: 224nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 224nm							
峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.151	207840	34732	71.528	3351	1.365	--
2	2.773	82731	11631	28.472	3904	1.345	3.813
总计		290571	46363	100.000			

图122 非奈利酮恩格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6031101批-pH4.5介质-篮法-100转-5min-片4
供试品溶液-1




SMF-228

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:40℃
数据文件名: RC\$SMF-228 - 0-53/27-624-3 - zzp-6031101p-pH4.5jz-lf100z-5min-P5.lcd
方法文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-20260313-FX276.lcb
样品瓶号: 3-37
进样体积: 10μl
进样时间: 2026/03/14 05:09:15
处理时间 (V3) : 2026/03/19 19:44:45
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.0ml/min
波长: 224nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 224nm							
峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.151	204977	34323	79.275	3354	1.364	--
2	2.773	53586	7550	20.725	3908	1.345	3.811
总计		258563	41873	100.000			

图123 非奈利酮恩格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6031101批-pH4.5介质-篮法-100转-5min-片5
供试品溶液-1




SMF-228

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:40°C
数据文件名: RC\$SMF-228 - 0-53/27-625-3 - zzp-6031101p-pH4.5jz-lf100z-5min-P6.lcd
方法文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-20260313-FX276.lcb
样品瓶号: 3-46
进样体积: 10μl
进样时间: 2026/03/14 05:14:36
处理时间 (V3) : 2026/03/19 19:44:47
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.0ml/min
波长: 224nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 224nm							
峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.150	141882	23812	70.073	3354	1.364	--
2	2.771	60596	8534	29.927	3905	1.343	3.813
总计		202478	32346	100.000			

图124 非奈利酮恩格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6031101批-pH4.5介质-篮法-100转-5min-片6
供试品溶液-1




SMF-228

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:40℃
数据文件名: RC\$SMF-228 - 0-53/27-626-3 - zzp-6031101p-pH4.5jz-lf100z-10min-P1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-20260313-FX276.lcb
样品瓶号: 3-2
进样体积: 10μl
进样时间: 2026/03/14 05:19:58
处理时间 (V3) : 2026/03/19 19:44:50
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.0ml/min
波长: 224nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 224nm							
峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.151	308753	51664	52.644	3357	1.364	--
2	2.772	277739	39040	47.356	3905	1.344	3.813
总计		586492	90705	100.000			

图125 非奈利酮恩格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6031101批-pH4.5介质-篮法-100转-10min-片1
供试品溶液-1




SMF-228

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:40℃
数据文件名: RC\$SMF-228 - 0-53/27-627-3 - zzp-6031101p-pH4.5jz-lf100z-10min-P2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-20260313-FX276.lcb
样品瓶号: 3-11
进样体积: 10μl
进样时间: 2026/03/14 05:25:21
处理时间 (V3) : 2026/03/19 19:44:52
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.0ml/min
波长: 224nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 224nm							
峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.151	300555	50359	53.828	3355	1.363	--
2	2.773	257807	36265	46.172	3916	1.345	3.813
总计		558362	86624	100.000			

图126 非奈利酮恩格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6031101批-pH4.5介质-篮法-100转-10min-片2
供试品溶液-1




SMF-228

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:40℃
数据文件名: RC\$SMF-228 - 0-53/27-628-3 - zzp-6031101p-pH4.5jz-lf100z-10min-P3.lcd
方法文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-20260313-FX276.lcb
样品瓶号: 3-20
进样体积: 10μl
进样时间: 2026/03/14 05:30:42
处理时间 (V3) : 2026/03/19 19:44:55
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.0ml/min
波长: 224nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 224nm							
峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.151	302632	50666	53.237	3357	1.364	--
2	2.772	265832	37385	46.763	3910	1.345	3.813
总计		568464	88051	100.000			

图127 非奈利酮恩格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6031101批-pH4.5介质-篮法-100转-10min-片3
供试品溶液-1




SMF-228

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:40℃
数据文件名: RC\$SMF-228 - 0-53/27-629-3 - zzp-6031101p-pH4.5jz-lf100z-10min-P4.lcd
方法文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-20260313-FX276.lcb
样品瓶号: 3-29
进样体积: 10μl
进样时间: 2026/03/14 05:36:05
处理时间 (V3) : 2026/03/19 19:44:57
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.0ml/min
波长: 224nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 224nm							
峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.152	303335	50907	51.768	3360	1.362	--
2	2.773	282617	39734	48.232	3914	1.345	3.813
总计		585952	90640	100.000			

图128 非奈利酮恩格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6031101批-pH4.5介质-篮法-100转-10min-片4
供试品溶液-1




SMF-228

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:40℃
数据文件名: RC\$SMF-228 - 0-53/27-630-3 - zzp-6031101p-pH4.5jz-lf100z-10min-P5.lcd
方法文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-20260313-FX276.lcb
样品瓶号: 3-38
进样体积: 10μl
进样时间: 2026/03/14 05:41:26
处理时间 (V3) : 2026/03/19 19:45:00
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.0ml/min
波长: 224nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 224nm							
峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.151	320029	53626	54.099	3356	1.363	--
2	2.773	271537	38175	45.901	3910	1.344	3.812
总计		591566	91801	100.000			

图129 非奈利酮恩格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6031101批-pH4.5介质-篮法-100转-10min-片5
供试品溶液-1




SMF-228

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:40℃
数据文件名: RC\$SMF-228 - 0-53/27-631-3 - zzp-6031101p-pH4.5jz-lf100z-10min-P6.lcd
方法文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-20260313-FX276.lcb
样品瓶号: 3-47
进样体积: 10μl
进样时间: 2026/03/14 05:46:47
处理时间 (V3) : 2026/03/19 19:45:03
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.0ml/min
波长: 224nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 224nm							
峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.153	281511	47290	54.671	3358	1.362	--
2	2.774	233404	32780	45.329	3915	1.346	3.812
总计		514916	80070	100.000			

图130 非奈利酮恩格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6031101批-pH4.5介质-篮法-100转-10min-片6
供试品溶液-1




SMF-228

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:40℃
数据文件名: RC\$SMF-228 - 0-53/27-632-3 - zzp-6031101p-pH4.5jz-lf100z-15min-P1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-20260313-FX276.lcb
样品瓶号: 3-3
进样体积: 10μl
进样时间: 2026/03/14 05:52:09
处理时间 (V3) : 2026/03/19 19:45:05
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.0ml/min
波长: 224nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 224nm							
峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.150	311377	52194	47.816	3354	1.363	--
2	2.772	339819	47779	52.184	3909	1.345	3.814
总计		651196	99973	100.000			

图131 非奈利酮恩格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6031101批-pH4.5介质-篮法-100转-15min-片1
供试品溶液-1




SMF-228

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:40℃
数据文件名: RC\$SMF-228 - 0-53/27-633-3 - zzp-6031101p-pH4.5jz-lf100z-15min-P2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-20260313-FX276.lcb
样品瓶号: 3-12
进样体积: 10μl
进样时间: 2026/03/14 05:57:31
处理时间 (V3) : 2026/03/19 19:45:08
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.0ml/min
波长: 224nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 224nm							
峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.152	309184	51797	48.082	3351	1.363	--
2	2.773	333858	46900	51.918	3910	1.346	3.812
总计		643042	98697	100.000			

图132 非奈利酮恩格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6031101批-pH4.5介质-篮法-100转-15min-片2
供试品溶液-1




SMF-228

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:40℃
数据文件名: RC\$SMF-228 - 0-53/27-634-3 - zzp-6031101p-pH4.5jz-lf100z-15min-P3.lcd
方法文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-20260313-FX276.lcb
样品瓶号: 3-21
进样体积: 10μl
进样时间: 2026/03/14 06:02:53
处理时间 (V3) : 2026/03/19 19:45:11
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.0ml/min
波长: 224nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 224nm							
峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.152	314804	52851	48.290	3364	1.362	--
2	2.773	337101	47407	51.710	3915	1.345	3.814
总计		651905	100258	100.000			

图133 非奈利酮恩格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6031101批-pH4.5介质-篮法-100转-15min-片3
供试品溶液-1




SMF-228

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:40℃
数据文件名: RC\$SMF-228 - 0-53/27-635-3 - zzp-6031101p-pH4.5jz-lf100z-15min-P4.lcd
方法文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-20260313-FX276.lcb
样品瓶号: 3-30
进样体积: 10μl
进样时间: 2026/03/14 06:08:15
处理时间 (V3) : 2026/03/19 19:45:13
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.0ml/min
波长: 224nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 224nm							
峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.150	309379	51850	47.498	3353	1.363	--
2	2.772	341970	48074	52.502	3908	1.345	3.813
总计		651349	99924	100.000			

图134 非奈利酮恩格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6031101批-pH4.5介质-篮法-100转-15min-片4
供试品溶液-1




SMF-228

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:40℃
数据文件名: RC\$SMF-228 - 0-53/27-636-3 - zzp-6031101p-pH4.5jz-lf100z-15min-P5.lcd
方法文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-20260313-FX276.lcb
样品瓶号: 3-39
进样体积: 10μl
进样时间: 2026/03/14 06:13:37
处理时间 (V3) : 2026/03/19 19:45:16
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.0ml/min
波长: 224nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 224nm							
峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.151	325168	54420	49.098	3355	1.364	--
2	2.772	337115	47399	50.902	3911	1.345	3.814
总计		662284	101819	100.000			

图135 非奈利酮恩格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6031101批-pH4.5介质-篮法-100转-15min-片5
供试品溶液-1




SMF-228

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:40℃
数据文件名: RC\$SMF-228 - 0-53/27-637-3 - zzp-6031101p-pH4.5jz-lf100z-15min-P6.lcd
方法文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-20260313-FX276.lcb
样品瓶号: 3-48
进样体积: 10μl
进样时间: 2026/03/14 06:18:59
处理时间 (V3) : 2026/03/19 19:45:18
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.0ml/min
波长: 224nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 224nm							
峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.152	313510	52625	49.459	3359	1.363	--
2	2.773	320364	45021	50.541	3911	1.345	3.811
总计		633874	97647	100.000			

图136 非奈利酮恩格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6031101批-pH4.5介质-篮法-100转-15min-片6
供试品溶液-1




SMF-228

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:40℃
数据文件名: RC\$SMF-228 - 0-53/27-638-3 - zzp-6031101p-pH4.5jz-lf100z-20min-P1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-20260313-FX276.lcb
样品瓶号: 3-4
进样体积: 10μl
进样时间: 2026/03/14 06:24:20
处理时间 (V3) : 2026/03/19 19:45:21
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.0ml/min
波长: 224nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 224nm							
峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.152	310911	52243	46.120	3363	1.361	--
2	2.774	363224	50991	53.880	3913	1.346	3.813
总计		674135	103233	100.000			

图137 非奈利酮恩格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6031101批-pH4.5介质-篮法-100转-20min-片1
供试品溶液-1




SMF-228

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:40℃
数据文件名: RC\$SMF-228 - 0-53/27-639-3 - zzp-6031101p-pH4.5jz-lf100z-20min-P2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-20260313-FX276.lcb
样品瓶号: 3-13
进样体积: 10μl
进样时间: 2026/03/14 06:29:42
处理时间 (V3) : 2026/03/19 19:45:23
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.0ml/min
波长: 224nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 224nm							
峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.151	309411	51872	46.269	3358	1.363	--
2	2.772	359304	50505	53.731	3910	1.345	3.811
总计		668716	102377	100.000			

图138 非奈利酮恩格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6031101批-pH4.5介质-篮法-100转-20min-片2
供试品溶液-1




SMF-228

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:40℃
数据文件名: RC\$SMF-228 - 0-53/27-640-3 - zzp-6031101p-pH4.5jz-lf100z-20min-P3.lcd
方法文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-20260313-FX276.lcb
样品瓶号: 3-22
进样体积: 10μl
进样时间: 2026/03/14 06:35:03
处理时间 (V3) : 2026/03/19 19:45:26
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.0ml/min
波长: 224nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 224nm							
峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.153	316404	53228	46.659	3363	1.361	--
2	2.774	361716	50757	53.341	3916	1.346	3.812
总计		678120	103985	100.000			

图139 非奈利酮恩格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6031101批-pH4.5介质-篮法-100转-20min-片3
供试品溶液-1




SMF-228

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:40℃
数据文件名: RC\$SMF-228 - 0-53/27-641-3 - zzp-6031101p-pH4.5jz-lf100z-20min-P4.lcd
方法文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-20260313-FX276.lcb
样品瓶号: 3-31
进样体积: 10μl
进样时间: 2026/03/14 06:40:25
处理时间 (V3) : 2026/03/19 19:45:29
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.0ml/min
波长: 224nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 224nm							
峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.152	310969	52224	45.996	3360	1.362	--
2	2.774	365113	51249	54.004	3911	1.346	3.812
总计		676081	103473	100.000			

图140 非奈利酮恩格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6031101批-pH4.5介质-篮法-100转-20min-片4
供试品溶液-1




SMF-228

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:40℃
数据文件名: RC\$SMF-228 - 0-53/27-642-3 - zzp-6031101p-pH4.5jz-lf100z-20min-P5.lcd
方法文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-20260313-FX276.lcb
样品瓶号: 3-40
进样体积: 10μl
进样时间: 2026/03/14 06:45:46
处理时间 (V3) : 2026/03/19 19:45:31
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.0ml/min
波长: 224nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 224nm							
峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.152	324786	54454	47.339	3355	1.363	--
2	2.773	361302	50732	52.661	3909	1.345	3.813
总计		686088	105186	100.000			

图141 非奈利酮恩格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6031101批-pH4.5介质-篮法-100转-20min-片5
供试品溶液-1




SMF-228

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:40℃
数据文件名: RC\$SMF-228 - 0-53/27-643-3 - zzp-6031101p-pH4.5jz-lf100z-20min-P6.lcd
方法文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-20260313-FX276.lcb
样品瓶号: 3-49
进样体积: 10μl
进样时间: 2026/03/14 06:51:07
处理时间 (V3) : 2026/03/19 19:45:34
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.0ml/min
波长: 224nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 224nm							
峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.152	315712	53011	47.421	3360	1.362	--
2	2.773	350045	49221	52.579	3917	1.345	3.813
总计		665757	102233	100.000			

图142 非奈利酮恩格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6031101批-pH4.5介质-篮法-100转-20min-片6
供试品溶液-1




SMF-228

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:40℃
数据文件名: RC\$SMF-228 - 0-53/27-644-3 - zzp-6031101p-pH4.5jz-lf100z-30min-P1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-20260313-FX276.lcb
样品瓶号: 3-5
进样体积: 10μl
进样时间: 2026/03/14 06:56:29
处理时间 (V3) : 2026/03/19 19:45:36
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.0ml/min
波长: 224nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 224nm							
峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.153	310345	52132	44.735	3356	1.361	--
2	2.774	383388	53776	55.265	3911	1.346	3.812
总计		693733	105908	100.000			

图143 非奈利酮恩格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6031101批-pH4.5介质-篮法-100转-30min-片1
供试品溶液-1




SMF-228

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:40℃
数据文件名: RC\$SMF-228 - 0-53/27-645-3 - zzp-6031101p-pH4.5jz-lf100z-30min-P2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-20260313-FX276.lcb
样品瓶号: 3-14
进样体积: 10μl
进样时间: 2026/03/14 07:01:51
处理时间 (V3) : 2026/03/19 19:45:39
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.0ml/min
波长: 224nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 224nm							
峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.151	309979	51917	45.052	3357	1.363	--
2	2.772	378069	53148	54.948	3910	1.345	3.812
总计		688048	105065	100.000			

图144 非奈利酮恩格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6031101批-pH4.5介质-篮法-100转-30min-片2
供试品溶液-1




SMF-228

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:40℃
数据文件名: RC\$SMF-228 - 0-53/27-646-3 - zzp-6031101p-pH4.5jz-lf100z-30min-P3.lcd
方法文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-20260313-FX276.lcb
样品瓶号: 3-23
进样体积: 10μl
进样时间: 2026/03/14 07:07:13
处理时间 (V3) : 2026/03/19 19:45:41
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.0ml/min
波长: 224nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 224nm							
峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.152	316441	53115	45.519	3360	1.362	--
2	2.773	378743	53260	54.481	3914	1.345	3.812
总计		695184	106376	100.000			

图145 非奈利酮恩格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6031101批-pH4.5介质-篮法-100转-30min-片3
供试品溶液-1




SMF-228

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:40℃
数据文件名: RC\$SMF-228 - 0-53/27-647-3 - zzp-6031101p-pH4.5jz-lf100z-30min-P4.lcd
方法文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-20260313-FX276.lcb
样品瓶号: 3-32
进样体积: 10μl
进样时间: 2026/03/14 07:12:34
处理时间 (V3) : 2026/03/19 19:45:44
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.0ml/min
波长: 224nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 224nm							
峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.152	309363	51898	44.839	3358	1.363	--
2	2.773	380571	53479	55.161	3912	1.345	3.813
总计		689934	105377	100.000			

图146 非奈利酮恩格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6031101批-pH4.5介质-篮法-100转-30min-片4
供试品溶液-1




SMF-228

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:40℃
数据文件名: RC\$SMF-228 - 0-53/27-648-3 - zzp-6031101p-pH4.5jz-lf100z-30min-P5.lcd
方法文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-20260313-FX276.lcb
样品瓶号: 3-41
进样体积: 10μl
进样时间: 2026/03/14 07:17:56
处理时间 (V3) : 2026/03/19 19:45:46
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.0ml/min
波长: 224nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 224nm							
峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.151	325314	54517	46.001	3357	1.363	--
2	2.773	381875	53667	53.999	3910	1.345	3.813
总计		707190	108183	100.000			

图147 非奈利酮恩格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6031101批-pH4.5介质-篮法-100转-30min-片5
供试品溶液-1




SMF-228

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:40℃
数据文件名: RC\$SMF-228 - 0-53/27-649-3 - zzp-6031101p-pH4.5jz-lf100z-30min-P6.lcd
方法文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-20260313-FX276.lcb
样品瓶号: 3-50
进样体积: 10μl
进样时间: 2026/03/14 07:23:17
处理时间 (V3) : 2026/03/19 19:45:49
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.0ml/min
波长: 224nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 224nm							
峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.154	315305	53063	45.868	3363	1.360	--
2	2.776	372118	52088	54.132	3918	1.346	3.814
总计		687424	105151	100.000			

图148 非奈利酮恩格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6031101批-pH4.5介质-篮法-100转-30min-片6
供试品溶液-1




SMF-228

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:40℃
数据文件名: RC\$SMF-228 - 0-53/27-650-3 - zzp-6031101p-pH4.5jz-lf100z-45min-P1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-20260313-FX276.lcb
样品瓶号: 3-6
进样体积: 10μl
进样时间: 2026/03/14 07:28:38
处理时间 (V3) : 2026/03/19 19:45:52
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.0ml/min
波长: 224nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 224nm							
峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.152	311904	52331	44.199	3357	1.362	--
2	2.773	393769	55324	55.801	3911	1.345	3.811
总计		705673	107655	100.000			

图149 非奈利酮恩格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6031101批-pH4.5介质-篮法-100转-45min-片1
供试品溶液-1




SMF-228

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:40℃
数据文件名: RC\$SMF-228 - 0-53/27-651-3 - zzp-6031101p-pH4.5jz-lf100z-45min-P2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-20260313-FX276.lcb
样品瓶号: 3-15
进样体积: 10μl
进样时间: 2026/03/14 07:34:00
处理时间 (V3) : 2026/03/19 19:45:55
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.0ml/min
波长: 224nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 224nm							
峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.152	310289	52093	44.624	3359	1.362	--
2	2.773	385052	54064	55.376	3910	1.346	3.812
总计		695341	106157	100.000			

图150 非奈利酮恩格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6031101批-pH4.5介质-篮法-100转-45min-片2
供试品溶液-1




SMF-228

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:40℃
数据文件名: RC\$SMF-228 - 0-53/27-652-3 - zzp-6031101p-pH4.5jz-lf100z-45min-P3.lcd
方法文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-20260313-FX276.lcb
样品瓶号: 3-24
进样体积: 10μl
进样时间: 2026/03/14 07:39:20
处理时间 (V3) : 2026/03/19 19:45:57
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.0ml/min
波长: 224nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 224nm							
峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.153	316884	53272	45.133	3359	1.361	--
2	2.774	385233	54029	54.867	3914	1.346	3.812
总计		702117	107301	100.000			

图151 非奈利酮恩格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6031101批-pH4.5介质-篮法-100转-45min-片3
供试品溶液-1




SMF-228

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:40℃
数据文件名: RC\$SMF-228 - 0-53/27-653-3 - zzp-6031101p-pH4.5jz-lf100z-45min-P4.lcd
方法文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-20260313-FX276.lcb
样品瓶号: 3-33
进样体积: 10μl
进样时间: 2026/03/14 07:44:42
处理时间 (V3) : 2026/03/19 19:46:00
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.0ml/min
波长: 224nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 224nm							
峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.153	312706	52585	44.731	3359	1.361	--
2	2.774	386370	54173	55.269	3912	1.347	3.812
总计		699077	106757	100.000			

图152 非奈利酮恩格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6031101批-pH4.5介质-篮法-100转-45min-片4
供试品溶液-1




SMF-228

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:40℃
数据文件名: RC\$SMF-228 - 0-53/27-654-3 - zzp-6031101p-pH4.5jz-lf100z-45min-P5.lcd
方法文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-20260313-FX276.lcb
样品瓶号: 3-42
进样体积: 10μl
进样时间: 2026/03/14 07:50:04
处理时间 (V3) : 2026/03/19 19:46:03
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.0ml/min
波长: 224nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 224nm							
峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.153	324833	54595	45.467	3357	1.361	--
2	2.774	389597	54603	54.533	3908	1.346	3.810
总计		714430	109198	100.000			

图153 非奈利酮恩格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6031101批-pH4.5介质-篮法-100转-45min-片5
供试品溶液-1




SMF-228

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:40℃
数据文件名: RC\$SMF-228 - 0-53/27-655-3 - zzp-6031101p-pH4.5jz-lf100z-45min-P6.lcd
方法文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-20260313-FX276.lcb
样品瓶号: 3-51
进样体积: 10μl
进样时间: 2026/03/14 07:55:25
处理时间 (V3) : 2026/03/19 19:46:05
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.0ml/min
波长: 224nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 224nm							
峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.153	315363	52996	45.277	3359	1.361	--
2	2.774	381151	53499	54.723	3913	1.346	3.812
总计		696514	106495	100.000			

图154 非奈利酮恩格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6031101批-pH4.5介质-篮法-100转-45min-片6
供试品溶液-1




SMF-228

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:40℃
数据文件名: RC\$SMF-228 - 0-53/27-656-3 - zzp-6031101p-pH4.5jz-lf100z-60min-P1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-20260313-FX276.lcb
样品瓶号: 3-7
进样体积: 10μl
进样时间: 2026/03/14 08:00:46
处理时间 (V3) : 2026/03/19 19:46:08
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.0ml/min
波长: 224nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 224nm							
峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.152	310468	52148	44.066	3361	1.361	--
2	2.773	394093	55356	55.934	3913	1.345	3.813
总计		704561	107504	100.000			

图155 非奈利酮恩格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6031101批-pH4.5介质-篮法-100转-60min-片1
供试品溶液-1




SMF-228

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:40℃
数据文件名: RC\$SMF-228 - 0-53/27-657-3 - zzp-6031101p-pH4.5jz-lf100z-60min-P2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-20260313-FX276.lcb
样品瓶号: 3-16
进样体积: 10μl
进样时间: 2026/03/14 08:06:08
处理时间 (V3) : 2026/03/19 19:46:10
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.0ml/min
波长: 224nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 224nm							
峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.153	309571	52032	44.561	3360	1.362	--
2	2.774	385149	54041	55.439	3912	1.346	3.812
总计		694721	106073	100.000			

图156 非奈利酮恩格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6031101批-pH4.5介质-篮法-100转-60min-片2
供试品溶液-1




SMF-228

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:40℃
数据文件名: RC\$SMF-228 - 0-53/27-658-3 - zzp-6031101p-pH4.5jz-lf100z-60min-P3.lcd
方法文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-20260313-FX276.lcb
样品瓶号: 3-25
进样体积: 10μl
进样时间: 2026/03/14 08:11:29
处理时间 (V3) : 2026/03/19 19:46:13
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.0ml/min
波长: 224nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 224nm							
峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.153	317009	53298	45.009	3362	1.361	--
2	2.774	387317	54395	54.991	3916	1.346	3.812
总计		704326	107693	100.000			

图157 非奈利酮恩格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6031101批-pH4.5介质-篮法-100转-60min-片3
供试品溶液-1




SMF-228

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:40℃
数据文件名: RC\$SMF-228 - 0-53/27-659-3 - zzp-6031101p-pH4.5jz-lf100z-60min-P4.lcd
方法文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-20260313-FX276.lcb
样品瓶号: 3-34
进样体积: 10μl
进样时间: 2026/03/14 08:16:50
处理时间 (V3) : 2026/03/19 19:46:15
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.0ml/min
波长: 224nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 224nm							
峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.153	307914	51795	44.289	3364	1.361	--
2	2.774	387318	54369	55.711	3915	1.346	3.812
总计		695232	106164	100.000			

图158 非奈利酮恩格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6031101批-pH4.5介质-篮法-100转-60min-片4
供试品溶液-1




SMF-228

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:40℃
数据文件名: RC\$SMF-228 - 0-53/27-660-3 - zzp-6031101p-pH4.5jz-lf100z-60min-P5.lcd
方法文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-20260313-FX276.lcb
样品瓶号: 3-43
进样体积: 10μl
进样时间: 2026/03/14 08:22:11
处理时间 (V3) : 2026/03/19 19:46:18
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.0ml/min
波长: 224nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 224nm							
峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.152	324062	54407	45.360	3359	1.362	--
2	2.773	390365	54800	54.640	3910	1.346	3.811
总计		714427	109207	100.000			

图159 非奈利酮恩格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6031101批-pH4.5介质-篮法-100转-60min-片5
供试品溶液-1




SMF-228

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:40℃
数据文件名: RC\$SMF-228 - 0-53/27-661-3 - zzp-6031101p-pH4.5jz-lf100z-60min-P6.lcd
方法文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-20260313-FX276.lcb
样品瓶号: 3-52
进样体积: 10μl
进样时间: 2026/03/14 08:27:32
处理时间 (V3) : 2026/03/19 19:46:20
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.0ml/min
波长: 224nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 224nm							
峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.153	314826	52915	45.135	3358	1.361	--
2	2.774	382690	53672	54.865	3907	1.346	3.810
总计		697516	106587	100.000			

图160 非奈利酮恩格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6031101批-pH4.5介质-篮法-100转-60min-片6
供试品溶液-1




SMF-228

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:40℃
数据文件名: RC\$SMF-228 - 0-53/27-662-3 - zzp-6031101p-pH4.5jz-lf100z-jxzs-P1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-20260313-FX276.lcb
样品瓶号: 3-8
进样体积: 10μl
进样时间: 2026/03/14 08:32:55
处理时间 (V3) : 2026/03/19 19:46:23
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.0ml/min
波长: 224nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 224nm							
峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.153	310662	52216	44.069	3362	1.361	--
2	2.773	394280	55369	55.931	3913	1.346	3.812
总计		704942	107584	100.000			

图161 非奈利酮恩格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6031101批-pH4.5介质-篮法-100转-极限转速-片1
供试品溶液-1




SMF-228

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:40℃
数据文件名: RC\$SMF-228 - 0-53/27-663-3 - zzp-6031101p-pH4.5jz-lf100z-jxzs-P2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-20260313-FX276.lcb
样品瓶号: 3-17
进样体积: 10μl
进样时间: 2026/03/14 08:38:18
处理时间 (V3) : 2026/03/19 19:46:26
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.0ml/min
波长: 224nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 224nm							
峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.152	309729	52053	44.553	3367	1.361	--
2	2.774	385470	54144	55.447	3916	1.346	3.816
总计		695199	106198	100.000			

图162 非奈利酮恩格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6031101批-pH4.5介质-篮法-100转-极限转速-片2
供试品溶液-1




SMF-228

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:40℃
数据文件名: RC\$SMF-228 - 0-53/27-664-3 - zzp-6031101p-pH4.5jz-lf100z-jxzs-P3.lcd
方法文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-20260313-FX276.lcb
样品瓶号: 3-26
进样体积: 10μl
进样时间: 2026/03/14 08:43:40
处理时间 (V3) : 2026/03/19 19:46:28
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.0ml/min
波长: 224nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 224nm							
峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.153	315274	53037	45.028	3362	1.361	--
2	2.775	384895	53973	54.972	3915	1.346	3.813
总计		700169	107010	100.000			

图163 非奈利酮恩格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6031101批-pH4.5介质-篮法-100转-极限转速-片3
供试品溶液-1




SMF-228

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:40℃
数据文件名: RC\$SMF-228 - 0-53/27-665-3 - zzp-6031101p-pH4.5jz-lf100z-jxzs-P4.lcd
方法文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-20260313-FX276.lcb
样品瓶号: 3-35
进样体积: 10μl
进样时间: 2026/03/14 08:49:03
处理时间 (V3) : 2026/03/19 19:46:31
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.0ml/min
波长: 224nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 224nm							
峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.153	308663	51892	44.279	3359	1.361	--
2	2.774	388424	54488	55.721	3908	1.346	3.810
总计		697087	106379	100.000			

图164 非奈利酮恩格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6031101批-pH4.5介质-篮法-100转-极限转速-片4
供试品溶液-1




SMF-228

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:40℃
数据文件名: RC\$SMF-228 - 0-53/27-666-3 - zzp-6031101p-pH4.5jz-lf100z-jxzs-P5.lcd
方法文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-20260313-FX276.lcb
样品瓶号: 3-44
进样体积: 10μl
进样时间: 2026/03/14 08:54:25
处理时间 (V3) : 2026/03/19 19:46:34
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.0ml/min
波长: 224nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 224nm							
峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.154	324594	54637	45.365	3363	1.360	--
2	2.775	390930	54814	54.635	3922	1.347	3.813
总计		715523	109452	100.000			

图165 非奈利酮恩格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6031101批-pH4.5介质-篮法-100转-极限转速-片5
供试品溶液-1




SMF-228

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:40℃
数据文件名: RC\$SMF-228 - 0-53/27-667-3 - zzp-6031101p-pH4.5jz-lf100z-jxzs-P6.lcd
方法文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-20260313-FX276.lcb
样品瓶号: 3-53
进样体积: 10μl
进样时间: 2026/03/14 08:59:47
处理时间 (V3) : 2026/03/19 19:46:36
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.0ml/min
波长: 224nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 224nm							
峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.153	314558	52944	45.126	3366	1.361	--
2	2.775	382508	53614	54.874	3919	1.346	3.816
总计		697066	106559	100.000			

图166 非奈利酮恩格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6031101批-pH4.5介质-篮法-100转-极限转速-片6
供试品溶液-1




SMF-228

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:40℃
数据文件名: RC\$SMF-228 - 0-53/27-668-3 - zzp-6031101p-pH4.5jz-lf100z-dz2-1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-20260313-FX276.lcb
样品瓶号: 3-27
进样体积: 10μl
进样时间: 2026/03/14 09:05:09
处理时间 (V3) : 2026/03/19 19:46:39
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.0ml/min
波长: 224nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 224nm							
峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.132	309823	47454	43.116	2686	1.345	--
2	2.756	408751	54130	56.884	3384	1.328	3.524
总计		718573	101583	100.000			

图167 非奈利酮恩格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6031101批-pH4.5介质-篮法-100转
对照品溶液-2-1




SMF-228

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:40℃
数据文件名: RC\$SMF-228 - 0-53/27-669-3 - zzp-6031101p-pH4.5jz-lf100z-dz2-2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-20260313-FX276.lcb
样品瓶号: 3-27
进样体积: 10μl
进样时间: 2026/03/14 09:10:32
处理时间 (V3) : 2026/03/19 19:46:41
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.0ml/min
波长: 224nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 224nm							
峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.132	310311	47468	43.144	2682	1.346	--
2	2.757	408929	54122	56.856	3387	1.328	3.526
总计		719240	101591	100.000			

图168 非奈利酮恩格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6031101批-pH4.5介质-篮法-100转
对照品溶液-2-2




SMF-228

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:40°C
数据文件名: RC\$SMF-228 - 0-53/27-670-3 - zzp-6031101p-SP-pH4.5jz-lf100z-rj.lcd
方法文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-20260313-FX276.lcb
样品瓶号: 4-9
进样体积: 10μl
进样时间: 2026/03/14 09:15:56
处理时间 (V3) : 2026/03/19 19:46:44
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.0ml/min
波长: 224nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 224nm							
峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图169 非奈利酮恩格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6031101批-pH4.5介质-篮法-100转
溶剂




SMF-228

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:40℃
数据文件名: RC\$SMF-228 - 0-53/27-671-3 - zzp-6031101p-SP-pH4.5jz-lf100z-dz1-1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-20260313-FX276.lcb
样品瓶号: 4-18
进样体积: 10μl
进样时间: 2026/03/14 09:21:20
处理时间 (V3) : 2026/03/19 19:46:47
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.0ml/min
波长: 224nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 224nm							
峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.132	311697	47878	43.143	2698	1.343	--
2	2.756	410771	54538	56.857	3403	1.327	3.536
总计		722468	102416	100.000			

图170 非奈利酮恩格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6031101批-pH4.5介质-篮法-100转
对照品溶液-1-1




SMF-228

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:40℃
数据文件名: RC\$SMF-228 - 0-53/27-672-3 - zzp-6031101p-SP-pH4.5jz-lf100z-dz1-2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-20260313-FX276.lcb
样品瓶号: 4-18
进样体积: 10μl
进样时间: 2026/03/14 09:26:44
处理时间 (V3) : 2026/03/19 19:46:49
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.0ml/min
波长: 224nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 224nm							
峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.131	311639	47841	43.124	2691	1.345	--
2	2.756	411024	54483	56.876	3390	1.328	3.532
总计		722663	102324	100.000			

图171 非奈利酮恩格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6031101批-pH4.5介质-篮法-100转
对照品溶液-1-2




SMF-228

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:40℃
数据文件名: RC\$SMF-228 - 0-53/27-673-3 - zzp-6031101p-SP-pH4.5jz-lf100z-dz1-3.lcd
方法文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-20260313-FX276.lcb
样品瓶号: 4-18
进样体积: 10μl
进样时间: 2026/03/14 09:32:08
处理时间 (V3) : 2026/03/19 19:46:52
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.0ml/min
波长: 224nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 224nm							
峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.131	311487	47852	43.118	2692	1.344	--
2	2.755	410919	54491	56.882	3388	1.328	3.529
总计		722406	102344	100.000			

图172 非奈利酮恩格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6031101批-pH4.5介质-篮法-100转
对照品溶液-1-3




SMF-228

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:40℃
数据文件名: RC\$SMF-228 - 0-53/27-674-3 - zzp-6031101p-SP-pH4.5jz-lf100z-dz1-4.lcd
方法文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-20260313-FX276.lcb
样品瓶号: 4-18
进样体积: 10μl
进样时间: 2026/03/14 09:37:32
处理时间 (V3) : 2026/03/19 19:46:54
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.0ml/min
波长: 224nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 224nm							
峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.132	311522	47818	43.110	2697	1.345	--
2	2.757	411106	54469	56.890	3391	1.328	3.534
总计		722628	102287	100.000			

图173 非奈利酮恩格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6031101批-pH4.5介质-篮法-100转
对照品溶液-1-4




SMF-228

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:40℃
数据文件名: RC\$SMF-228 - 0-53/27-675-3 - zzp-6031101p-SP-pH4.5jz-lf100z-dz1-5.lcd
方法文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-20260313-FX276.lcb
样品瓶号: 4-18
进样体积: 10μl
进样时间: 2026/03/14 09:42:55
处理时间 (V3) : 2026/03/19 19:46:57
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.0ml/min
波长: 224nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 224nm							
峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.131	311583	48050	43.103	2713	1.341	--
2	2.755	411292	54694	56.897	3410	1.326	3.544
总计		722876	102744	100.000			

图174 非奈利酮恩格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6031101批-pH4.5介质-篮法-100转
对照品溶液-1-5




SMF-228

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:40℃
数据文件名: RC\$SMF-228 - 0-53/27-676-3 - zzp-6031101p-SP-pH4.5jz-lf100z-5min-P1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-20260313-FX276.lcb
样品瓶号: 4-1
进样体积: 10μl
进样时间: 2026/03/14 09:48:19
处理时间 (V3) : 2026/03/19 19:46:59
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.0ml/min
波长: 224nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 224nm							
峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.153	288844	48596	66.457	3370	1.361	--
2	2.774	145792	20496	33.543	3924	1.345	3.818
总计		434635	69092	100.000			

图175 非奈利酮恩格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6031101批-pH4.5介质-篮法-100转-5min-片1
供试品溶液-1




SMF-228

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:40°C
数据文件名: RC\$SMF-228 - 0-53/27-677-3 - zzp-6031101p-SP-pH4.5jz-lf100z-5min-P2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-20260313-FX276.lcb
样品瓶号: 4-10
进样体积: 10μl
进样时间: 2026/03/14 09:53:42
处理时间 (V3) : 2026/03/19 19:47:02
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.0ml/min
波长: 224nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 224nm							
峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.152	223278	37516	60.879	3370	1.362	--
2	2.773	143480	20185	39.121	3919	1.344	3.817
总计		366759	57701	100.000			

图176 非奈利酮恩格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6031101批-pH4.5介质-篮法-100转-5min-片2
供试品溶液-1




SMF-228

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:40℃
数据文件名: RC\$SMF-228 - 0-53/27-678-3 - zzp-6031101p-SP-pH4.5jz-lf100z-5min-P3.lcd
方法文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-20260313-FX276.lcb
样品瓶号: 4-19
进样体积: 10μl
进样时间: 2026/03/14 09:59:04
处理时间 (V3) : 2026/03/19 19:47:05
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.0ml/min
波长: 224nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 224nm							
峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.153	307816	51708	65.485	3362	1.362	--
2	2.775	162237	22767	34.515	3920	1.344	3.818
总计		470053	74474	100.000			

图177 非奈利酮恩格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6031101批-pH4.5介质-篮法-100转-5min-片3
供试品溶液-1




SMF-228

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:40°C
数据文件名: RC\$SMF-228 - 0-53/27-679-3 - zzp-6031101p-SP-pH4.5jz-lf100z-5min-P4.lcd
方法文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-20260313-FX276.lcb
样品瓶号: 4-28
进样体积: 10μl
进样时间: 2026/03/14 10:04:27
处理时间 (V3) : 2026/03/19 19:47:07
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.0ml/min
波长: 224nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 224nm							
峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.152	254397	42682	58.099	3360	1.363	--
2	2.774	183470	25781	41.901	3915	1.345	3.815
总计		437867	68463	100.000			

图178 非奈利酮恩格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6031101批-pH4.5介质-篮法-100转-5min-片4
供试品溶液-1




SMF-228

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:40℃
数据文件名: RC\$SMF-228 - 0-53/27-680-3 - zzp-6031101p-SP-pH4.5jz-lf100z-5min-P5.lcd
方法文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-20260313-FX276.lcb
样品瓶号: 4-37
进样体积: 10μl
进样时间: 2026/03/14 10:09:50
处理时间 (V3) : 2026/03/19 19:47:10
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.0ml/min
波长: 224nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 224nm							
峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.151	291418	48815	68.595	3361	1.363	--
2	2.773	133420	18776	31.405	3916	1.343	3.818
总计		424837	67591	100.000			

图179 非奈利酮恩格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6031101批-pH4.5介质-篮法-100转-5min-片5
供试品溶液-1




SMF-228

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:40℃
数据文件名: RC\$SMF-228 - 0-53/27-681-3 - zzp-6031101p-SP-pH4.5jz-lf100z-5min-P6.lcd
方法文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-20260313-FX276.lcb
样品瓶号: 4-46
进样体积: 10μl
进样时间: 2026/03/14 10:15:12
处理时间 (V3) : 2026/03/19 19:47:12
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.0ml/min
波长: 224nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 224nm							
峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.152	293161	49134	65.720	3358	1.363	--
2	2.774	152917	21493	34.280	3913	1.344	3.816
总计		446078	70627	100.000			

图180 非奈利酮恩格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6031101批-pH4.5介质-篮法-100转-5min-片6
供试品溶液-1




SMF-228

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:40℃
数据文件名: RC\$SMF-228 - 0-53/27-682-3 - zzp-6031101p-SP-pH4.5jz-lf100z-10min-P1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-20260313-FX276.lcb
样品瓶号: 4-2
进样体积: 10μl
进样时间: 2026/03/14 10:20:36
处理时间 (V3) : 2026/03/19 19:47:15
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.0ml/min
波长: 224nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 224nm							
峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.151	318282	53324	51.399	3358	1.362	--
2	2.773	300957	42298	48.601	3912	1.344	3.817
总计		619239	95622	100.000			

图181 非奈利酮恩格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6031101批-pH4.5介质-篮法-100转-10min-片1
供试品溶液-1




SMF-228

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:40℃
数据文件名: RC\$SMF-228 - 0-53/27-683-3 - zzp-6031101p-SP-pH4.5jz-lf100z-10min-P2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-20260313-FX276.lcb
样品瓶号: 4-11
进样体积: 10μl
进样时间: 2026/03/14 10:25:59
处理时间 (V3) : 2026/03/19 19:47:17
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.0ml/min
波长: 224nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 224nm							
峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.151	314237	52586	50.652	3358	1.363	--
2	2.773	306150	43023	49.348	3909	1.343	3.817
总计		620388	95609	100.000			

图182 非奈利酮恩格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6031101批-pH4.5介质-篮法-100转-10min-片2
供试品溶液-1




SMF-228

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:40℃
数据文件名: RC\$SMF-228 - 0-53/27-684-3 - zzp-6031101p-SP-pH4.5jz-lf100z-10min-P3.lcd
方法文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-20260313-FX276.lcb
样品瓶号: 4-20
进样体积: 10μl
进样时间: 2026/03/14 10:31:22
处理时间 (V3) : 2026/03/19 19:47:20
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.0ml/min
波长: 224nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 224nm							
峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.151	322697	54101	51.276	3367	1.363	--
2	2.773	306636	43157	48.724	3922	1.344	3.824
总计		629332	97258	100.000			

图183 非奈利酮恩格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6031101批-pH4.5介质-篮法-100转-10min-片3
供试品溶液-1




SMF-228

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:40℃
数据文件名: RC\$SMF-228 - 0-53/27-685-3 - zzp-6031101p-SP-pH4.5jz-lf100z-10min-P4.lcd
方法文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-20260313-FX276.lcb
样品瓶号: 4-29
进样体积: 10μl
进样时间: 2026/03/14 10:36:44
处理时间 (V3) : 2026/03/19 19:47:22
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.0ml/min
波长: 224nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 224nm							
峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.152	307180	51483	49.894	3356	1.362	--
2	2.773	308482	43310	50.106	3909	1.344	3.815
总计		615661	94793	100.000			

图184 非奈利酮恩格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6031101批-pH4.5介质-篮法-100转-10min-片4
供试品溶液-1




SMF-228

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:40℃
数据文件名: RC\$SMF-228 - 0-53/27-686-3 - zzp-6031101p-SP-pH4.5jz-lf100z-10min-P5.lcd
方法文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-20260313-FX276.lcb
样品瓶号: 4-38
进样体积: 10μl
进样时间: 2026/03/14 10:42:07
处理时间 (V3) : 2026/03/19 19:47:25
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.0ml/min
波长: 224nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 224nm							
峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.152	322861	54220	52.757	3361	1.361	--
2	2.773	289121	40637	47.243	3918	1.344	3.815
总计		611982	94857	100.000			

图185 非奈利酮恩格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6031101批-pH4.5介质-篮法-100转-10min-片5
供试品溶液-1




SMF-228

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:40℃
数据文件名: RC\$SMF-228 - 0-53/27-687-3 - zzp-6031101p-SP-pH4.5jz-lf100z-10min-P6.lcd
方法文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-20260313-FX276.lcb
样品瓶号: 4-47
进样体积: 10μl
进样时间: 2026/03/14 10:47:30
处理时间 (V3) : 2026/03/19 19:47:28
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.0ml/min
波长: 224nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 224nm							
峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.151	314198	52679	51.664	3366	1.363	--
2	2.772	293959	41366	48.336	3918	1.344	3.821
总计		608157	94044	100.000			

图186 非奈利酮恩格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6031101批-pH4.5介质-篮法-100转-10min-片6
供试品溶液-1




SMF-228

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:40℃
数据文件名: RC\$SMF-228 - 0-53/27-688-3 - zzp-6031101p-SP-pH4.5jz-lf100z-15min-P1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-20260313-FX276.lcb
样品瓶号: 4-3
进样体积: 10μl
进样时间: 2026/03/14 10:52:52
处理时间 (V3) : 2026/03/19 19:47:31
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.0ml/min
波长: 224nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 224nm							
峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.151	320542	53702	48.235	3356	1.362	--
2	2.773	343996	48323	51.765	3911	1.344	3.816
总计		664538	102025	100.000			

图187 非奈利酮恩格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6031101批-pH4.5介质-篮法-100转-15min-片1
供试品溶液-1




SMF-228

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:40℃
数据文件名: RC\$SMF-228 - 0-53/27-689-3 - zzp-6031101p-SP-pH4.5jz-lf100z-15min-P2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-20260313-FX276.lcb
样品瓶号: 4-12
进样体积: 10μl
进样时间: 2026/03/14 10:58:15
处理时间 (V3) : 2026/03/19 19:47:34
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.0ml/min
波长: 224nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 224nm							
峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.152	318853	53460	47.285	3357	1.361	--
2	2.773	355463	49981	52.715	3920	1.344	3.817
总计		674315	103441	100.000			

图188 非奈利酮恩格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6031101批-pH4.5介质-篮法-100转-15min-片2
供试品溶液-1




SMF-228

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:40℃
数据文件名: RC\$SMF-228 - 0-53/27-690-3 - zzp-6031101p-SP-pH4.5jz-lf100z-15min-P3.lcd
方法文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-20260313-FX276.lcb
样品瓶号: 4-21
进样体积: 10μl
进样时间: 2026/03/14 11:03:38
处理时间 (V3) : 2026/03/19 19:47:36
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.0ml/min
波长: 224nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 224nm							
峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.150	324073	54417	48.345	3362	1.361	--
2	2.772	346267	48721	51.655	3914	1.343	3.820
总计		670339	103138	100.000			

图189 非奈利酮恩格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6031101批-pH4.5介质-篮法-100转-15min-片3
供试品溶液-1




SMF-228

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:40℃
数据文件名: RC\$SMF-228 - 0-53/27-691-3 - zzp-6031101p-SP-pH4.5jz-lf100z-15min-P4.lcd
方法文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-20260313-FX276.lcb
样品瓶号: 4-30
进样体积: 10μl
进样时间: 2026/03/14 11:09:01
处理时间 (V3) : 2026/03/19 19:47:39
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.0ml/min
波长: 224nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 224nm							
峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.151	308687	51672	47.254	3358	1.363	--
2	2.773	344558	48431	52.746	3910	1.343	3.818
总计		653245	100103	100.000			

图190 非奈利酮恩格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6031101批-pH4.5介质-篮法-100转-15min-片4
供试品溶液-1




SMF-228

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:40℃
数据文件名: RC\$SMF-228 - 0-53/27-692-3 - zzp-6031101p-SP-pH4.5jz-lf100z-15min-P5.lcd
方法文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-20260313-FX276.lcb
样品瓶号: 4-39
进样体积: 10μl
进样时间: 2026/03/14 11:14:23
处理时间 (V3) : 2026/03/19 19:47:42
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.0ml/min
波长: 224nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 224nm							
峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.150	324324	54439	48.937	3358	1.362	--
2	2.772	338416	47598	51.063	3913	1.343	3.819
总计		662740	102037	100.000			

图191 非奈利酮恩格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6031101批-pH4.5介质-篮法-100转-15min-片5
供试品溶液-1




SMF-228

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:40℃
数据文件名: RC\$SMF-228 - 0-53/27-693-3 - zzp-6031101p-SP-pH4.5jz-lf100z-15min-P6.lcd
方法文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-20260313-FX276.lcb
样品瓶号: 4-48
进样体积: 10μl
进样时间: 2026/03/14 11:19:45
处理时间 (V3) : 2026/03/19 19:47:44
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.0ml/min
波长: 224nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 224nm							
峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.151	316513	53040	48.400	3364	1.363	--
2	2.772	337445	47492	51.600	3917	1.343	3.818
总计		653958	100532	100.000			

图192 非奈利酮恩格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6031101批-pH4.5介质-篮法-100转-15min-片6
供试品溶液-1




SMF-228

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:40℃
数据文件名: RC\$SMF-228 - 0-53/27-694-3 - zzp-6031101p-SP-pH4.5jz-lf100z-20min-P1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-20260313-FX276.lcb
样品瓶号: 4-4
进样体积: 10μl
进样时间: 2026/03/14 11:25:08
处理时间 (V3) : 2026/03/19 19:47:47
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.0ml/min
波长: 224nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 224nm							
峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.150	318717	53565	46.927	3366	1.362	--
2	2.772	360454	50779	53.073	3925	1.344	3.823
总计		679170	104344	100.000			

图193 非奈利酮恩格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6031101批-pH4.5介质-篮法-100转-20min-片1
供试品溶液-1




SMF-228

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:40℃
数据文件名: RC\$SMF-228 - 0-53/27-695-3 - zzp-6031101p-SP-pH4.5jz-lf100z-20min-P2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-20260313-FX276.lcb
样品瓶号: 4-13
进样体积: 10μl
进样时间: 2026/03/14 11:30:31
处理时间 (V3) : 2026/03/19 19:47:50
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.0ml/min
波长: 224nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 224nm							
峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.150	318583	53458	45.985	3354	1.362	--
2	2.771	374211	52631	54.015	3910	1.343	3.816
总计		692794	106089	100.000			

图194 非奈利酮恩格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6031101批-pH4.5介质-篮法-100转-20min-片2
供试品溶液-1




SMF-228

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:40℃
数据文件名: RC\$SMF-228 - 0-53/27-696-3 - zzp-6031101p-SP-pH4.5jz-lf100z-20min-P3.lcd
方法文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-20260313-FX276.lcb
样品瓶号: 4-22
进样体积: 10μl
进样时间: 2026/03/14 11:35:55
处理时间 (V3) : 2026/03/19 19:47:52
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.0ml/min
波长: 224nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 224nm							
峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.150	323462	54342	47.090	3364	1.362	--
2	2.772	363436	51154	52.910	3919	1.343	3.822
总计		686898	105497	100.000			

图195 非奈利酮恩格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6031101批-pH4.5介质-篮法-100转-20min-片3
供试品溶液-1




SMF-228

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:40℃
数据文件名: RC\$SMF-228 - 0-53/27-697-3 - zzp-6031101p-SP-pH4.5jz-lf100z-20min-P4.lcd
方法文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-20260313-FX276.lcb
样品瓶号: 4-31
进样体积: 10μl
进样时间: 2026/03/14 11:41:18
处理时间 (V3) : 2026/03/19 19:47:55
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.0ml/min
波长: 224nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 224nm							
峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.150	309055	51985	46.054	3361	1.361	--
2	2.772	362011	50954	53.946	3919	1.344	3.823
总计		671066	102940	100.000			

图196 非奈利酮恩格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6031101批-pH4.5介质-篮法-100转-20min-片4
供试品溶液-1




SMF-228

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:40℃
数据文件名: RC\$SMF-228 - 0-53/27-698-3 - zzp-6031101p-SP-pH4.5jz-lf100z-20min-P5.lcd
方法文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-20260313-FX276.lcb
样品瓶号: 4-40
进样体积: 10μl
进样时间: 2026/03/14 11:46:41
处理时间 (V3) : 2026/03/19 19:47:58
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.0ml/min
波长: 224nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 224nm							
峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.150	323966	54309	47.485	3357	1.362	--
2	2.772	358282	50369	52.515	3910	1.344	3.818
总计		682248	104678	100.000			

图197 非奈利酮恩格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6031101批-pH4.5介质-篮法-100转-20min-片5
供试品溶液-1




SMF-228

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:40℃
数据文件名: RC\$SMF-228 - 0-53/27-699-3 - zzp-6031101p-SP-pH4.5jz-lf100z-20min-P6.lcd
方法文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-20260313-FX276.lcb
样品瓶号: 4-49
进样体积: 10μl
进样时间: 2026/03/14 11:52:04
处理时间 (V3) : 2026/03/19 19:48:01
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.0ml/min
波长: 224nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 224nm							
峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.151	316583	53018	46.994	3356	1.363	--
2	2.772	357087	50186	53.006	3907	1.344	3.815
总计		673670	103205	100.000			

图198 非奈利酮恩格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6031101批-pH4.5介质-篮法-100转-20min-片6
供试品溶液-1




SMF-228

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:40℃
数据文件名: RC\$SMF-228 - 0-53/27-700-3 - zzp-6031101p-SP-pH4.5jz-lf100z-30min-P1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-20260313-FX276.lcb
样品瓶号: 4-5
进样体积: 10μl
进样时间: 2026/03/14 11:57:28
处理时间 (V3) : 2026/03/19 19:48:03
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.0ml/min
波长: 224nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 224nm							
峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.151	318987	53414	45.855	3362	1.362	--
2	2.772	376652	52953	54.145	3909	1.344	3.816
总计		695639	106367	100.000			

图199 非奈利酮恩格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6031101批-pH4.5介质-篮法-100转-30min-片1
供试品溶液-1




SMF-228

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:40℃
数据文件名: RC\$SMF-228 - 0-53/27-701-3 - zzp-6031101p-SP-pH4.5jz-lf100z-30min-P2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-20260313-FX276.lcb
样品瓶号: 4-14
进样体积: 10μl
进样时间: 2026/03/14 12:02:52
处理时间 (V3) : 2026/03/19 19:48:06
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.0ml/min
波长: 224nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 224nm							
峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.151	318516	53340	45.029	3358	1.362	--
2	2.772	388844	54662	54.971	3910	1.344	3.816
总计		707360	108002	100.000			

图200 非奈利酮恩格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6031101批-pH4.5介质-篮法-100转-30min-片2
供试品溶液-1




SMF-228

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:40℃
数据文件名: RC\$SMF-228 - 0-53/27-702-3 - zzp-6031101p-SP-pH4.5jz-lf100z-30min-P3.lcd
方法文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-20260313-FX276.lcb
样品瓶号: 4-23
进样体积: 10μl
进样时间: 2026/03/14 12:08:16
处理时间 (V3) : 2026/03/19 19:48:08
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.0ml/min
波长: 224nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 224nm							
峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.152	323508	54355	46.119	3364	1.361	--
2	2.774	377950	53076	53.881	3917	1.345	3.818
总计		701458	107431	100.000			

图201 非奈利酮恩格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6031101批-pH4.5介质-篮法-100转-30min-片3
供试品溶液-1




SMF-228

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:40℃
数据文件名: RC\$SMF-228 - 0-53/27-703-3 - zzp-6031101p-SP-pH4.5jz-lf100z-30min-P4.lcd
方法文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-20260313-FX276.lcb
样品瓶号: 4-32
进样体积: 10μl
进样时间: 2026/03/14 12:13:40
处理时间 (V3) : 2026/03/19 19:48:11
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.0ml/min
波长: 224nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 224nm							
峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.151	308924	51778	45.183	3359	1.361	--
2	2.773	374788	52672	54.817	3910	1.343	3.816
总计		683713	104450	100.000			

图202 非奈利酮恩格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6031101批-pH4.5介质-篮法-100转-30min-片4
供试品溶液-1




SMF-228

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:40℃
数据文件名: RC\$SMF-228 - 0-53/27-704-3 - zzp-6031101p-SP-pH4.5jz-lf100z-30min-P5.lcd
方法文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-20260313-FX276.lcb
样品瓶号: 4-41
进样体积: 10μl
进样时间: 2026/03/14 12:19:03
处理时间 (V3) : 2026/03/19 19:48:14
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.0ml/min
波长: 224nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 224nm							
峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.151	324407	54282	46.252	3352	1.362	--
2	2.773	376980	52958	53.748	3906	1.343	3.814
总计		701387	107240	100.000			

图203 非奈利酮恩格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6031101批-pH4.5介质-篮法-100转-30min-片5
供试品溶液-1




SMF-228

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:40℃
数据文件名: RC\$SMF-228 - 0-53/27-705-3 - zzp-6031101p-SP-pH4.5jz-lf100z-30min-P6.lcd
方法文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-20260313-FX276.lcb
样品瓶号: 4-50
进样体积: 10μl
进样时间: 2026/03/14 12:24:26
处理时间 (V3) : 2026/03/19 19:48:16
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.0ml/min
波长: 224nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 224nm							
峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.151	315676	52928	45.810	3359	1.361	--
2	2.773	373427	52459	54.190	3909	1.343	3.816
总计		689103	105387	100.000			

图204 非奈利酮恩格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6031101批-pH4.5介质-篮法-100转-30min-片6
供试品溶液-1




SMF-228

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:40℃
数据文件名: RC\$SMF-228 - 0-53/27-706-3 - zzp-6031101p-SP-pH4.5jz-lf100z-45min-P1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-20260313-FX276.lcb
样品瓶号: 4-6
进样体积: 10μl
进样时间: 2026/03/14 12:29:50
处理时间 (V3) : 2026/03/19 19:48:19
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.0ml/min
波长: 224nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 224nm							
峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.152	318698	53507	45.372	3363	1.361	--
2	2.774	383710	53900	54.628	3915	1.344	3.818
总计		702409	107408	100.000			

图205 非奈利酮恩格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6031101批-pH4.5介质-篮法-100转-45min-片1
供试品溶液-1




SMF-228

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:40℃
数据文件名: RC\$SMF-228 - 0-53/27-707-3 - zzp-6031101p-SP-pH4.5jz-lf100z-45min-P2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-20260313-FX276.lcb
样品瓶号: 4-15
进样体积: 10μl
进样时间: 2026/03/14 12:35:13
处理时间 (V3) : 2026/03/19 19:48:22
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.0ml/min
波长: 224nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 224nm							
峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.150	317688	53384	44.684	3376	1.361	--
2	2.772	393270	55395	55.316	3930	1.344	3.829
总计		710958	108779	100.000			

图206 非奈利酮恩格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6031101批-pH4.5介质-篮法-100转-45min-片2
供试品溶液-1




SMF-228

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:40℃
数据文件名: RC\$SMF-228 - 0-53/27-708-3 - zzp-6031101p-SP-pH4.5jz-lf100z-45min-P3.lcd
方法文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-20260313-FX276.lcb
样品瓶号: 4-24
进样体积: 10μl
进样时间: 2026/03/14 12:40:36
处理时间 (V3) : 2026/03/19 19:48:24
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.0ml/min
波长: 224nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 224nm							
峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.151	323191	54233	45.738	3377	1.362	--
2	2.773	383417	54009	54.262	3929	1.344	3.827
总计		706608	108242	100.000			

图207 非奈利酮恩格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6031101批-pH4.5介质-篮法-100转-45min-片3
供试品溶液-1




SMF-228

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:40℃
数据文件名: RC\$SMF-228 - 0-53/27-709-3 - zzp-6031101p-SP-pH4.5jz-lf100z-45min-P4.lcd
方法文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-20260313-FX276.lcb
样品瓶号: 4-33
进样体积: 10μl
进样时间: 2026/03/14 12:45:59
处理时间 (V3) : 2026/03/19 19:48:27
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.0ml/min
波长: 224nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 224nm							
峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.152	310961	52247	44.861	3372	1.361	--
2	2.773	382208	53799	55.139	3930	1.344	3.825
总计		693169	106046	100.000			

图208 非奈利酮恩格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6031101批-pH4.5介质-篮法-100转-45min-片4
供试品溶液-1




SMF-228

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:40℃
数据文件名: RC\$SMF-228 - 0-53/27-710-3 - zzp-6031101p-SP-pH4.5jz-lf100z-45min-P5.lcd
方法文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-20260313-FX276.lcb
样品瓶号: 4-42
进样体积: 10μl
进样时间: 2026/03/14 12:51:22
处理时间 (V3) : 2026/03/19 19:48:29
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.0ml/min
波长: 224nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 224nm							
峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.150	322477	54154	45.829	3363	1.362	--
2	2.772	381182	53641	54.171	3917	1.343	3.819
总计		703659	107795	100.000			

图209 非奈利酮恩格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6031101批-pH4.5介质-篮法-100转-45min-片5
供试品溶液-1




SMF-228

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:40℃
数据文件名: RC\$SMF-228 - 0-53/27-711-3 - zzp-6031101p-SP-pH4.5jz-lf100z-45min-P6.lcd
方法文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-20260313-FX276.lcb
样品瓶号: 4-51
进样体积: 10μl
进样时间: 2026/03/14 12:56:45
处理时间 (V3) : 2026/03/19 19:48:32
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.0ml/min
波长: 224nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 224nm							
峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.151	315378	52905	45.327	3369	1.362	--
2	2.773	380407	53533	54.673	3928	1.344	3.826
总计		695785	106438	100.000			

图210 非奈利酮恩格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6031101批-pH4.5介质-篮法-100转-45min-片6
供试品溶液-1




SMF-228

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:40℃
数据文件名: RC\$SMF-228 - 0-53/27-712-3 - zzp-6031101p-SP-pH4.5jz-lf100z-60min-P1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-20260313-FX276.lcb
样品瓶号: 4-7
进样体积: 10μl
进样时间: 2026/03/14 13:02:09
处理时间 (V3) : 2026/03/19 19:48:35
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.0ml/min
波长: 224nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 224nm							
峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.152	318118	53446	45.308	3368	1.361	--
2	2.773	384002	54033	54.692	3923	1.343	3.819
总计		702120	107479	100.000			

图211 非奈利酮恩格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6031101批-pH4.5介质-篮法-100转-60min-片1
供试品溶液-1




SMF-228

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:40℃
数据文件名: RC\$SMF-228 - 0-53/27-713-3 - zzp-6031101p-SP-pH4.5jz-lf100z-60min-P2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-20260313-FX276.lcb
样品瓶号: 4-16
进样体积: 10μl
进样时间: 2026/03/14 13:07:32
处理时间 (V3) : 2026/03/19 19:48:37
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.0ml/min
波长: 224nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 224nm							
峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.151	315949	53061	44.625	3374	1.361	--
2	2.772	392053	55194	55.375	3924	1.343	3.825
总计		708002	108255	100.000			

图212 非奈利酮恩格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6031101批-pH4.5介质-篮法-100转-60min-片2
供试品溶液-1




SMF-228

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:40℃
数据文件名: RC\$SMF-228 - 0-53/27-714-3 - zzp-6031101p-SP-pH4.5jz-lf100z-60min-P3.lcd
方法文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-20260313-FX276.lcb
样品瓶号: 4-25
进样体积: 10μl
进样时间: 2026/03/14 13:12:56
处理时间 (V3) : 2026/03/19 19:48:40
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.0ml/min
波长: 224nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 224nm							
峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.151	323499	54254	45.659	3364	1.362	--
2	2.773	385019	54108	54.341	3916	1.344	3.819
总计		708518	108362	100.000			

图213 非奈利酮恩格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6031101批-pH4.5介质-篮法-100转-60min-片3
供试品溶液-1




SMF-228

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:40℃
数据文件名: RC\$SMF-228 - 0-53/27-715-3 - zzp-6031101p-SP-pH4.5jz-lf100z-60min-P4.lcd
方法文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-20260313-FX276.lcb
样品瓶号: 4-34
进样体积: 10μl
进样时间: 2026/03/14 13:18:20
处理时间 (V3) : 2026/03/19 19:48:42
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.0ml/min
波长: 224nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 224nm							
峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.152	309728	52071	44.769	3372	1.360	--
2	2.774	382101	53716	55.231	3925	1.344	3.823
总计		691829	105787	100.000			

图214 非奈利酮恩格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6031101批-pH4.5介质-篮法-100转-60min-片4
供试品溶液-1




SMF-228

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:40℃
数据文件名: RC\$SMF-228 - 0-53/27-716-3 - zzp-6031101p-SP-pH4.5jz-lf100z-60min-P5.lcd
方法文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-20260313-FX276.lcb
样品瓶号: 4-43
进样体积: 10μl
进样时间: 2026/03/14 13:23:43
处理时间 (V3) : 2026/03/19 19:48:45
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.0ml/min
波长: 224nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 224nm							
峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.152	324378	54578	45.762	3375	1.360	--
2	2.774	384462	54009	54.238	3925	1.344	3.824
总计		708840	108587	100.000			

图215 非奈利酮恩格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6031101批-pH4.5介质-篮法-100转-60min-片5
供试品溶液-1




SMF-228

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:40℃
数据文件名: RC\$SMF-228 - 0-53/27-717-3 - zzp-6031101p-SP-pH4.5jz-lf100z-60min-P6.lcd
方法文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-20260313-FX276.lcb
样品瓶号: 4-52
进样体积: 10μl
进样时间: 2026/03/14 13:29:06
处理时间 (V3) : 2026/03/19 19:48:47
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.0ml/min
波长: 224nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 224nm							
峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.153	316544	53327	45.182	3374	1.360	--
2	2.775	384051	53939	54.818	3925	1.344	3.821
总计		700596	107265	100.000			

图216 非奈利酮恩格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6031101批-pH4.5介质-篮法-100转-60min-片6
供试品溶液-1




SMF-228

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:40℃
数据文件名: RC\$SMF-228 - 0-53/27-718-3 - zzp-6031101p-SP-pH4.5jz-lf100z-jxzs-P1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-20260313-FX276.lcb
样品瓶号: 4-8
进样体积: 10μl
进样时间: 2026/03/14 13:34:30
处理时间 (V3) : 2026/03/19 19:48:50
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.0ml/min
波长: 224nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 224nm							
峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.152	319134	53675	45.312	3375	1.361	--
2	2.773	385172	54205	54.688	3929	1.344	3.822
总计		704306	107879	100.000			

图217 非奈利酮恩格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6031101批-pH4.5介质-篮法-100转-极限转速-片1
供试品溶液-1




SMF-228

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:40℃
数据文件名: RC\$SMF-228 - 0-53/27-719-3 - zzp-6031101p-SP-pH4.5jz-lf100z-jxzs-P2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-20260313-FX276.lcb
样品瓶号: 4-17
进样体积: 10μl
进样时间: 2026/03/14 13:39:54
处理时间 (V3) : 2026/03/19 19:48:52
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.0ml/min
波长: 224nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 224nm							
峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.153	317183	53384	44.629	3369	1.360	--
2	2.775	393532	55238	55.371	3925	1.344	3.821
总计		710715	108622	100.000			

图218 非奈利酮恩格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6031101批-pH4.5介质-篮法-100转-极限转速-片2
供试品溶液-1




SMF-228

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:40℃
数据文件名: RC\$SMF-228 - 0-53/27-720-3 - zzp-6031101p-SP-pH4.5jz-lf100z-jxzs-P3.lcd
方法文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-20260313-FX276.lcb
样品瓶号: 4-26
进样体积: 10μl
进样时间: 2026/03/14 13:45:17
处理时间 (V3) : 2026/03/19 19:48:55
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.0ml/min
波长: 224nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 224nm							
峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.151	321460	54025	45.631	3378	1.360	--
2	2.773	383022	53966	54.369	3934	1.344	3.827
总计		704482	107991	100.000			

图219 非奈利酮恩格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6031101批-pH4.5介质-篮法-100转-极限转速-片3
供试品溶液-1




SMF-228

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:40℃
数据文件名: RC\$SMF-228 - 0-53/27-721-3 - zzp-6031101p-SP-pH4.5jz-lf100z-jxzs-P4.lcd
方法文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-20260313-FX276.lcb
样品瓶号: 4-35
进样体积: 10μl
进样时间: 2026/03/14 13:50:41
处理时间 (V3) : 2026/03/19 19:48:58
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.0ml/min
波长: 224nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 224nm							
峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.153	308779	52004	44.760	3371	1.360	--
2	2.775	381078	53513	55.240	3933	1.345	3.824
总计		689856	105517	100.000			

图220 非奈利酮恩格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6031101批-pH4.5介质-篮法-100转-极限转速-片4
供试品溶液-1




SMF-228

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:40℃
数据文件名: RC\$SMF-228 - 0-53/27-722-3 - zzp-6031101p-SP-pH4.5jz-lf100z-jxzs-P5.lcd
方法文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-20260313-FX276.lcb
样品瓶号: 4-44
进样体积: 10μl
进样时间: 2026/03/14 13:56:04
处理时间 (V3) : 2026/03/19 19:49:00
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.0ml/min
波长: 224nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 224nm							
峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.152	322548	54268	45.751	3376	1.361	--
2	2.773	382456	53842	54.249	3930	1.344	3.823
总计		705005	108110	100.000			

图221 非奈利酮恩格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6031101批-pH4.5介质-篮法-100转-极限转速-片5
供试品溶液-1




SMF-228

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:40℃
数据文件名: RC\$SMF-228 - 0-53/27-723-3 - zzp-6031101p-SP-pH4.5jz-lf100z-jxzs-P6.lcd
方法文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-20260313-FX276.lcb
样品瓶号: 4-53
进样体积: 10μl
进样时间: 2026/03/14 14:01:27
处理时间 (V3) : 2026/03/19 19:49:03
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.0ml/min
波长: 224nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 224nm							
峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.150	316095	53111	45.164	3375	1.362	--
2	2.772	383795	54047	54.836	3926	1.344	3.825
总计		699891	107158	100.000			

图222 非奈利酮恩格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6031101批-pH4.5介质-篮法-100转-极限转速-片6
供试品溶液-1




SMF-228

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:40℃
数据文件名: RC\$SMF-228 - 0-53/27-724-3 - zzp-6031101p-SP-pH4.5jz-lf100z-dz2-1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-20260313-FX276.lcb
样品瓶号: 4-27
进样体积: 10μl
进样时间: 2026/03/14 14:06:51
处理时间 (V3) : 2026/03/19 19:49:05
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.0ml/min
波长: 224nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 224nm							
峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.130	311404	47911	43.114	2701	1.345	--
2	2.754	410868	54519	56.886	3396	1.328	3.538
总计		722272	102430	100.000			

图223 非奈利酮恩格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6031101批-pH4.5介质-篮法-100转
对照品溶液-2-1




SMF-228

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:40℃
数据文件名: RC\$SMF-228 - 0-53/27-725-3 - zzp-6031101p-SP-pH4.5jz-lf100z-dz2-2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-20260313-FX276.lcb
样品瓶号: 4-27
进样体积: 10μl
进样时间: 2026/03/14 14:12:15
处理时间 (V3) : 2026/03/19 19:49:08
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.0ml/min
波长: 224nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 224nm							
峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.130	311323	47979	43.113	2711	1.344	--
2	2.755	410791	54577	56.887	3404	1.326	3.542
总计		722114	102556	100.000			

图224 非奈利酮恩格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6031101批-pH4.5介质-篮法-100转
对照品溶液-2-2