



盐酸伐地那非片项目信息

介质体积(ml)	900	取样体积(ml)	1.5	补液体积(ml)	1.5
对照品批号	D23106010771	对照品来源	中检所	对照品使用方法	直接使用
对照品含量(%)	90.12	对照品水分(%)	0	对照品稀释倍数	1000
标示量(mg)	10	供试品稀释倍数	1	系数	0.9306

对照品溶液

序号	称样量(mg)	A ₁	A ₂	A ₃	A ₄	A ₅	A _{平均}	RSD%
1	12.10	384664	383853	383196	384163	385451	384265	0.23
2	12.13	383785	383656				383720	0.03

单位质量响应值		RSD%	判断
31757.44	31633.97	0.28	数据可信



操作者:

日期: 2026-08-16

复核者:

未审阅版本



供试品溶液-6031101批-pH6.8

时间 (分钟)	样品	A ₁	A ₂	A _{平均}	溶出量(%)	平均(%)	RSD%	累计溶 出量(%)	平均(%)	RSD%
5min	1	220837	-	220837	52.590	48.69	16.80	52.59	48.69	16.80
	2	177178	-	177178	42.193			42.19		
	3	152560	-	152560	36.330			36.33		
	4	211402	-	211402	50.343			50.34		
	5	249421	-	249421	59.397			59.40		
	6	215368	-	215368	51.287			51.29		
10min	1	255328	-	255328	60.803	57.17	13.50	60.89	57.25	13.50
	2	213987	-	213987	50.958			51.03		
	3	190431	-	190431	45.349			45.41		
	4	247125	-	247125	58.850			58.93		
	5	280792	-	280792	66.867			66.97		
	6	252713	-	252713	60.180			60.27		
15min	1	277290	-	277290	66.033	64.29	10.41	66.22	64.47	10.42
	2	250546	-	250546	59.664			59.82		
	3	227684	-	227684	54.220			54.36		
	4	274806	-	274806	65.442			65.62		
	5	310187	-	310187	73.867			74.08		
	6	279347	-	279347	66.523			66.71		
20min	1	302710	-	302710	72.087	69.96	8.46	72.39	70.25	8.48
	2	273612	-	273612	65.157			65.41		
	3	258559	-	258559	61.573			61.80		
	4	300178	-	300178	71.484			71.77		
	5	329873	-	329873	78.555			78.89		
	6	297863	-	297863	70.932			71.23		
30min	1	330962	-	330962	78.815	77.67	6.03	79.23	78.07	6.06
	2	314744	-	314744	74.952			75.32		
	3	297850	-	297850	70.929			71.26		
	4	329826	-	329826	78.544			78.95		
	5	357166	-	357166	85.055			85.52		
	6	326438	-	326438	77.737			78.15		
45min	1	353452	-	353452	84.170	84.27	4.12	84.72	84.80	4.15
	2	349287	-	349287	83.178			83.67		
	3	332323	-	332323	79.139			79.59		
	4	357439	-	357439	85.120			85.66		
	5	377587	-	377587	89.918			90.52		
	6	353163	-	353163	84.101			84.65		
60min	1	367188	-	367188	87.441	88.36	3.72	88.13	89.02	3.76
	2	365589	-	365589	87.060			87.69		
	3	353649	-	353649	84.217			84.80		
	4	370410	-	370410	88.209			88.89		
	5	395464	-	395464	94.175			94.93		
	6	373856	-	373856	89.029			89.71		
90min	1	378057	-	378057	90.030	91.81	3.36	90.87	92.63	3.39
	2	386702	-	386702	92.088			92.86		
	3	369406	-	369406	87.969			88.69		
	4	384029	-	384029	91.452			92.28		
	5	408188	-	408188	97.205			98.12		
	6	386817	-	386817	92.116			92.95		
120min	1	381518	-	381518	90.854	92.74	2.98	91.84	93.71	3.01
	2	389928	-	389928	92.857			93.78		
	3	376082	-	376082	89.559			90.43		
	4	386325	-	386325	91.999			92.98		
	5	409592	-	409592	97.539			98.61		
	6	393123	-	393123	93.617			94.60		



操作者:

日期: 2026-08-16

复核者:

未审阅版本



时间 (分钟)	样品	A ₁	A ₂	A _{平均}	溶出量(%)	平均(%)	RSD%	累计溶 出量(%)	平均(%)	RSD%
极限	1	386953	-	386953	92.148	94.19	2.58	93.29	95.32	2.60
	2	400160	-	400160	95.293			96.37		
	3	383567	-	383567	91.342			92.36		
	4	394075	-	394075	93.844			94.98		
	5	412150	-	412150	98.148			99.39		
	6	396301	-	396301	94.374			95.52		



操作者:

日 期: 2026-08-16

复核者:

未审阅版本



盐酸伐地那非片项目信息

介质体积(ml)	900	取样体积(ml)	1.5	补液体积(ml)	1.5
对照品批号	D23106010771	对照品来源	中检所	对照品使用方法	直接使用
对照品含量(%)	90.12	对照品水分(%)	0	对照品稀释倍数	1000
标示量(mg)	10	供试品稀释倍数	1	系数	0.9306

对照品溶液

序号	称样量(mg)	A ₁	A ₂	A ₃	A ₄	A ₅	A _{平均}	RSD%
1	12.10	382700	385022	383840	384891	382704	383831	0.30
2	12.13	385696	384949				385322	0.14
单位质量响应值				RSD%	判断			
31721.57				0.10	数据可信			



操作者:

日期: 2026-08-16

复核者:

未审阅版本



供试品溶液-6031102批-pH6.8

时间 (分钟)	样品	A ₁	A ₂	A _{平均}	溶出量(%)	平均(%)	RSD%	累计溶出量(%)	平均(%)	RSD%
5min	1	160635	-	160635	38.195	41.39	17.45	38.20	41.39	17.45
	2	205212	-	205212	48.794			48.79		
	3	119795	-	119795	28.484			28.48		
	4	179650	-	179650	42.716			42.72		
	5	190630	-	190630	45.327			45.33		
	6	188526	-	188526	44.827			44.83		
10min	1	223000	-	223000	53.024	53.62	8.79	53.09	53.70	8.80
	2	247616	-	247616	58.877			58.96		
	3	189155	-	189155	44.977			45.02		
	4	225612	-	225612	53.645			53.72		
	5	235407	-	235407	55.974			56.05		
	6	232374	-	232374	55.253			55.33		
15min	1	261180	-	261180	62.102	62.21	6.46	62.25	62.37	6.48
	2	282575	-	282575	67.190			67.37		
	3	231133	-	231133	54.958			55.08		
	4	261717	-	261717	62.230			62.39		
	5	268655	-	268655	63.880			64.05		
	6	264598	-	264598	62.915			63.08		
20min	1	289947	-	289947	68.942	68.21	5.54	69.20	68.47	5.56
	2	304798	-	304798	72.474			72.77		
	3	257381	-	257381	61.199			61.41		
	4	287564	-	287564	68.376			68.64		
	5	294554	-	294554	70.038			70.31		
	6	286842	-	286842	68.204			68.48		
30min	1	326082	-	326082	77.534	75.80	3.60	77.90	76.18	3.62
	2	329812	-	329812	78.421			78.83		
	3	298693	-	298693	71.022			71.34		
	4	321323	-	321323	76.403			76.78		
	5	324444	-	324444	77.145			77.54		
	6	312497	-	312497	74.304			74.69		
45min	1	351608	-	351608	83.604	82.00	2.94	84.10	82.50	2.96
	2	354733	-	354733	84.347			84.89		
	3	327857	-	327857	77.957			78.39		
	4	348085	-	348085	82.766			83.27		
	5	349220	-	349220	83.036			83.56		
	6	337672	-	337672	80.290			80.80		
60min	1	361949	-	361949	86.063	84.80	2.13	86.70	85.44	2.15
	2	361374	-	361374	85.926			86.61		
	3	344100	-	344100	81.819			82.38		
	4	358033	-	358033	85.132			85.78		
	5	363353	-	363353	86.397			87.06		
	6	350990	-	350990	83.457			84.10		
90min	1	378575	-	378575	90.016	87.97	2.25	90.80	88.75	2.28
	2	377462	-	377462	89.751			90.58		
	3	357156	-	357156	84.923			85.62		
	4	369231	-	369231	87.794			88.58		
	5	373557	-	373557	88.823			89.63		
	6	363769	-	363769	86.496			87.28		
120min	1	379097	-	379097	90.140	89.19	2.25	91.07	90.12	2.28
	2	383970	-	383970	91.299			92.28		
	3	361565	-	361565	85.971			86.81		
	4	378011	-	378011	89.882			90.81		
	5	379750	-	379750	90.295			91.25		
	6	368162	-	368162	87.540			88.47		



操作者:

日期: 2026-08-16

复核者:

未审阅版本



时间 (分钟)	样品	A ₁	A ₂	A _{平均}	溶出量(%)	平均(%)	RSD%	累计溶 出量(%)	平均(%)	RSD%
极限	1	390272	-	390272	92.797	92.00	1.86	93.88	93.08	1.88
	2	393759	-	393759	93.626			94.75		
	3	377582	-	377582	89.780			90.77		
	4	388545	-	388545	92.387			93.47		
	5	392954	-	392954	93.435			94.54		
	6	378376	-	378376	89.969			91.04		



操作者:

日 期: 2026-08-16

复核者:

未审阅版本



盐酸伐地那非片项目信息

介质体积(ml)	900	取样体积(ml)	1.5	补液体积(ml)	1.5
对照品批号	D23106010771	对照品来源	中检所	对照品使用方法	直接使用
对照品含量(%)	90.12	对照品水分(%)	0	对照品稀释倍数	1000
标示量(mg)	10	供试品稀释倍数	1	系数	0.9306

对照品溶液

序号	称样量(mg)	A ₁	A ₂	A ₃	A ₄	A ₅	A _{平均}	RSD%
1	12.10	384689	384979	382082	384451	385547	384350	0.35
2	12.13	385017	382715				383866	0.43
单位质量响应值				RSD%	判断			
31764.46				0.27	数据可信			



操作者:

日期: 2026-08-16

复核者:

未审阅版本



供试品溶液-6031103批-pH6.8

时间 (分钟)	样品	A ₁	A ₂	A _{平均}	溶出量(%)	平均(%)	RSD%	累计溶出量(%)	平均(%)	RSD%
5min	1	154451	-	154451	36.770	42.21	11.15	36.77	42.21	11.15
	2	168276	-	168276	40.061			40.06		
	3	203043	-	203043	48.338			48.34		
	4	200285	-	200285	47.681			47.68		
	5	165967	-	165967	39.511			39.51		
	6	171816	-	171816	40.904			40.90		
10min	1	201503	-	201503	47.971	53.38	7.97	48.03	53.45	7.98
	2	221154	-	221154	52.649			52.72		
	3	247548	-	247548	58.933			59.01		
	4	242920	-	242920	57.831			57.91		
	5	211402	-	211402	50.328			50.39		
	6	220736	-	220736	52.550			52.62		
15min	1	241500	-	241500	57.493	61.61	6.10	57.63	61.76	6.11
	2	256716	-	256716	61.115			61.27		
	3	278367	-	278367	66.270			66.45		
	4	277456	-	277456	66.053			66.23		
	5	245549	-	245549	58.457			58.61		
	6	253053	-	253053	60.243			60.40		
20min	1	270079	-	270079	64.297	67.57	4.38	64.53	67.83	4.39
	2	282597	-	282597	67.277			67.53		
	3	295896	-	295896	70.443			70.73		
	4	301000	-	301000	71.658			71.94		
	5	272321	-	272321	64.830			65.08		
	6	280985	-	280985	66.893			67.15		
30min	1	305367	-	305367	72.697	75.15	2.85	73.04	75.52	2.87
	2	312564	-	312564	74.411			74.78		
	3	326514	-	326514	77.732			78.14		
	4	327062	-	327062	77.862			78.27		
	5	310781	-	310781	73.986			74.34		
	6	311640	-	311640	74.191			74.56		
45min	1	329758	-	329758	78.504	80.90	2.38	78.97	81.40	2.40
	2	341344	-	341344	81.262			81.75		
	3	345828	-	345828	82.330			82.87		
	4	351429	-	351429	83.663			84.20		
	5	337536	-	337536	80.356			80.83		
	6	333094	-	333094	79.298			79.79		
60min	1	344377	-	344377	81.984	83.47	2.06	82.58	84.10	2.07
	2	356234	-	356234	84.807			85.44		
	3	350732	-	350732	83.497			84.17		
	4	360896	-	360896	85.917			86.59		
	5	350017	-	350017	83.327			83.94		
	6	341440	-	341440	81.285			81.91		
90min	1	355213	-	355213	84.564	86.65	1.68	85.30	87.43	1.70
	2	364826	-	364826	86.853			87.62		
	3	368813	-	368813	87.802			88.61		
	4	372218	-	372218	88.612			89.43		
	5	362931	-	362931	86.402			87.15		
	6	359932	-	359932	85.688			86.45		
120min	1	367704	-	367704	87.538	88.41	1.34	88.41	89.32	1.36
	2	372310	-	372310	88.634			89.55		
	3	376128	-	376128	89.543			90.50		
	4	377691	-	377691	89.915			90.88		
	5	369325	-	369325	87.924			88.82		
	6	364964	-	364964	86.886			87.79		



操作者:

日期: 2026-08-16

复核者:

未审阅版本



时间 (分钟)	样品	A ₁	A ₂	A _{平均}	溶出量(%)	平均(%)	RSD%	累计溶 出量(%)	平均(%)	RSD%
极限	1	379362	-	379362	90.313	91.41	1.37	91.33	92.48	1.39
	2	385805	-	385805	91.847			92.91		
	3	391253	-	391253	93.144			94.25		
	4	388118	-	388118	92.398			93.51		
	5	378102	-	378102	90.013			91.06		
	6	381271	-	381271	90.768			91.81		



操作者:

日 期: 2026-08-16

复核者:

未审阅版本




J632

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.8ml/min
柱温:40°C 波长: 245nm
数据文件名: RC\$J632 - 11-11/11-965-2 - zzp-6031101p-rcqx-pH6.8jz-10mg-jyx1-rj.lcd
方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$J632 - J632-20260320-FX260.lcb
样品瓶号: 1-9
进样体积: 20 μ L 版本号 : 6.115
进样时间: 2026/03/20 16:57:22 实验者 : jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2026/03/23 14:30:38 处理者 : jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 245nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图1 盐酸伐地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6031101批(10mg规格)-均一性1-pH6.8介质
溶剂




J632

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.8ml/min
柱温:40°C 波长: 245nm
数据文件名: RC\$J632 - 11-11/11-966-2 - zzp-6031101p-rcqx-pH6.8jz-10mg-jyx1-dz1-1.lcd
方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$J632 - J632-20260320-FX260.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 20 μ L 版本号 : 6.115
进样时间: 2026/03/20 17:00:46 实验者 : jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2026/03/23 14:30:43 处理者 : jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 245nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.890	384664	100.000	61400	2200	1.195	--
总计		384664	100.000	61400			

图2 盐酸伐地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6031101批(10mg规格)-均一性1-pH6.8介质
对照品溶液-1-1




J632

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.8ml/min
柱温:40°C 波长: 245nm
数据文件名: RC\$J632 - 11-11/11-967-2 - zzp-6031101p-rcqx-pH6.8jz-10mg-jyx1-dz1-2.lcd
方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$J632 - J632-20260320-FX260.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 20 μ L 版本号 : 6.115
进样时间: 2026/03/20 17:04:10 实验者 : jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2026/03/23 14:30:46 处理者 : jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 245nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.888	383853	100.000	61256	2188	1.195	--
总计		383853	100.000	61256			

图3 盐酸伐地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6031101批(10mg规格)-均一性1-pH6.8介质
对照品溶液-1-2




J632

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.8ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长: 245nm
数据文件名: RC\$J632 - 11-11/11-968-2 - zzp-6031101p-rcqx-pH6.8jz-10mg-jyx1-dz1-3.lcd
方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$J632 - J632-20260320-FX260.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 20 μ L 版本号 : 6.115
进样时间: 2026/03/20 17:07:34 实验者 : jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2026/03/23 14:30:48 处理者 : jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 245nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.887	383196	100.000	61311	2194	1.195	--
总计		383196	100.000	61311			

图4 盐酸伐地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6031101批(10mg规格)-均一性1-pH6.8介质
对照品溶液-1-3




J632

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.8ml/min
柱温:40°C 波长: 245nm
数据文件名: RC\$J632 - 11-11/11-969-2 - zzp-6031101p-rcqx-pH6.8jz-10mg-jyx1-dz1-4.lcd
方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$J632 - J632-20260320-FX260.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 20 μ L 版本号 : 6.115
进样时间: 2026/03/20 17:10:58 实验者 : jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2026/03/23 14:30:51 处理者 : jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 245nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.891	384163	100.000	61228	2191	1.195	--
总计		384163	100.000	61228			

图5 盐酸伐地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6031101批(10mg规格)-均一性1-pH6.8介质
对照品溶液-1-4




J632

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.8ml/min
柱温:40°C 波长: 245nm
数据文件名: RC\$J632 - 11-11/11-970-2 - zzp-6031101p-rcqx-pH6.8jz-10mg-jyx1-dz1-5.lcd
方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$J632 - J632-20260320-FX260.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 20 μ L 版本号 : 6.115
进样时间: 2026/03/20 17:14:22 实验者 : jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2026/03/23 14:30:53 处理者 : jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 245nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.893	385451	100.000	61079	2193	1.198	--
总计		385451	100.000	61079			

图6 盐酸伐地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6031101批(10mg规格)-均一性1-pH6.8介质
对照品溶液-1-5




J632

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.8ml/min
柱温:40°C 波长: 245nm
数据文件名: RC\$J632 - 11-11/11-971-2 - zzp-6031101p-rcqx-pH6.8jz-10mg-jyx1-5min-P1.lcd
方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$J632 - J632-20260320-FX260.lcb
样品瓶号: 1-1
进样体积: 20 μ L 版本号 : 6.115
进样时间: 2026/03/20 17:17:45 实验者 : jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2026/03/23 14:30:56 处理者 : jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 245nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.929	220837	100.000	36447	2438	1.160	--
总计		220837	100.000	36447			

图7 盐酸伐地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6031101批(10mg规格)-均一性1-pH6.8介质-5min-片1
供试品溶液-1




J632

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.8ml/min
柱温:40°C 波长: 245nm
数据文件名: RC\$J632 - 11-11/11-972-2 - zzp-6031101p-rcqx-pH6.8jz-10mg-jyx1-5min-P2.lcd
方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$J632 - J632-20260320-FX260.lcb
样品瓶号: 1-10
进样体积: 20 μ L 版本号 : 6.115
进样时间: 2026/03/20 17:21:08 实验者 : jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2026/03/23 14:30:58 处理者 : jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 245nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.926	177178	100.000	28988	2408	1.156	--
总计		177178	100.000	28988			

图8 盐酸伐地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6031101批(10mg规格)-均一性1-pH6.8介质-5min-片2
供试品溶液-1




J632

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.8ml/min
柱温:40°C 波长: 245nm
数据文件名: RC\$J632 - 11-11/11-973-2 - zzp-6031101p-rcqx-pH6.8jz-10mg-jyx1-5min-P3.lcd
方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$J632 - J632-20260320-FX260.lcb
样品瓶号: 1-19
进样体积: 20 μ L 版本号 : 6.115
进样时间: 2026/03/20 17:24:31 实验者 : jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2026/03/23 14:31:01 处理者 : jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 245nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.926	152560	100.000	25013	2411	1.149	--
总计		152560	100.000	25013			

图9 盐酸伐地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6031101批(10mg规格)-均一性1-pH6.8介质-5min-片3
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.8ml/min
柱温:40°C 波长: 245nm
数据文件名: RC\$J632 - 11-11/11-974-2 - zzp-6031101p-rcqx-pH6.8jz-10mg-jyx1-5min-P4.lcd
方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$J632 - J632-20260320-FX260.lcb
样品瓶号: 1-28
进样体积: 20 μ L 版本号 : 6.115
进样时间: 2026/03/20 17:27:53 实验者 : jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2026/03/23 14:31:03 处理者 : jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 245nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.926	211402	100.000	34621	2404	1.157	--
总计		211402	100.000	34621			

图10 盐酸伐地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6031101批(10mg规格)-均一性1-pH6.8介质-5min-片4
供试品溶液-1




J632

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.8ml/min
柱温:40°C 波长: 245nm
数据文件名: RC\$J632 - 11-11/11-975-2 - zzp-6031101p-rcqx-pH6.8jz-10mg-jyx1-5min-P5.lcd
方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$J632 - J632-20260320-FX260.lcb
样品瓶号: 1-37
进样体积: 20 μ L 版本号 : 6.115
进样时间: 2026/03/20 17:31:16 实验者 : jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2026/03/23 14:31:06 处理者 : jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 245nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.925	249421	100.000	41004	2422	1.163	--
总计		249421	100.000	41004			

图11 盐酸伐地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6031101批(10mg规格)-均一性1-pH6.8介质-5min-片5
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.8ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长: 245nm
数据文件名: RC\$J632 - 11-11/11-976-2 - zzp-6031101p-rcqx-pH6.8jz-10mg-jyx1-5min-P6.lcd
方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$J632 - J632-20260320-FX260.lcb
样品瓶号: 1-46
进样体积: 20 μ L 版本号 : 6.115
进样时间: 2026/03/20 17:34:39 实验者 : jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2026/03/23 14:31:09 处理者 : jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 245nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.926	215368	100.000	35303	2410	1.159	--
总计		215368	100.000	35303			

图12 盐酸伐地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6031101批(10mg规格)-均一性1-pH6.8介质-5min-片6
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.8ml/min
柱温:40°C 波长: 245nm
数据文件名: RC\$J632 - 11-11/11-977-2 - zzp-6031101p-rcqx-pH6.8jz-10mg-jyx1-10min-P1.lcd
方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$J632 - J632-20260320-FX260.lcb
样品瓶号: 1-2
进样体积: 20 μ L 版本号 : 6.115
进样时间: 2026/03/20 17:38:02 实验者 : jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2026/03/23 14:31:11 处理者 : jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 245nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.924	255328	100.000	42334	2436	1.158	--
总计		255328	100.000	42334			

图13 盐酸伐地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6031101批(10mg规格)-均一性1-pH6.8介质-10min-片1
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.8ml/min
柱温:40°C 波长: 245nm
数据文件名: RC\$J632 - 11-11/11-978-2 - zzp-6031101p-rcqx-pH6.8jz-10mg-jyx1-10min-P2.lcd
方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$J632 - J632-20260320-FX260.lcb
样品瓶号: 1-11
进样体积: 20 μ L 版本号 : 6.115
进样时间: 2026/03/20 17:41:25 实验者 : jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2026/03/23 14:31:14 处理者 : jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 245nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.925	213987	100.000	35739	2493	1.166	--
总计		213987	100.000	35739			

图14 盐酸伐地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6031101批(10mg规格)-均一性1-pH6.8介质-10min-片2
供试品溶液-1




J632

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.8ml/min
柱温:40°C 波长: 245nm
数据文件名: RC\$J632 - 11-11/11-979-2 - zzp-6031101p-rcqx-pH6.8jz-10mg-jyx1-10min-P3.lcd
方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$J632 - J632-20260320-FX260.lcb
样品瓶号: 1-20
进样体积: 20 μ L 版本号 : 6.115
进样时间: 2026/03/20 17:44:48 实验者 : jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2026/03/23 14:31:16 处理者 : jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 245nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.926	190431	100.000	31693	2491	1.166	--
总计		190431	100.000	31693			

图15 盐酸伐地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6031101批(10mg规格)-均一性1-pH6.8介质-10min-片3
供试品溶液-1




J632

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.8ml/min
柱温:40°C 波长: 245nm
数据文件名: RC\$J632 - 11-11/11-980-2 - zzp-6031101p-rcqx-pH6.8jz-10mg-jyx1-10min-P4.lcd
方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$J632 - J632-20260320-FX260.lcb
样品瓶号: 1-29
进样体积: 20 μ L 版本号 : 6.115
进样时间: 2026/03/20 17:48:10 实验者 : jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2026/03/23 14:31:19 处理者 : jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 245nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.927	247125	100.000	41220	2491	1.170	--
总计		247125	100.000	41220			

图16 盐酸伐地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6031101批(10mg规格)-均一性1-pH6.8介质-10min-片4
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.8ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长: 245nm
数据文件名: RC\$J632 - 11-12/11-981-2 - zzp-6031101p-rcqx-pH6.8jz-10mg-jyx1-10min-P5.lcd
方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$J632 - J632-20260320-FX260.lcb
样品瓶号: 1-38
进样体积: 20 μ L 版本号 : 6.115
进样时间: 2026/03/20 17:51:33 实验者 : jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2026/03/23 14:32:20 处理者 : jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 245nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.926	280792	100.000	47160	2507	1.160	--
总计		280792	100.000	47160			

图17 盐酸伐地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6031101批(10mg规格)-均一性1-pH6.8介质-10min-片5
供试品溶液-1




J632

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.8ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长: 245nm
数据文件名: RC\$J632 - 11-13/11-982-2 - zzp-6031101p-rcqx-pH6.8jz-10mg-jyx1-10min-P6.lcd
方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$J632 - J632-20260320-FX260.lcb
样品瓶号: 1-47
进样体积: 20 μ L 版本号 : 6.115
进样时间: 2026/03/20 17:54:56 实验者 : jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2026/03/23 14:33:34 处理者 : jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 245nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.926	252713	100.000	41902	2484	1.170	--
总计		252713	100.000	41902			

图18 盐酸伐地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6031101批(10mg规格)-均一性1-pH6.8介质-10min-片6
供试品溶液-1




J632

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.8ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长: 245nm
数据文件名: RC\$J632 - 11-13/11-983-2 - zzp-6031101p-rcqx-pH6.8jz-10mg-jyx1-15min-P1.lcd
方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$J632 - J632-20260320-FX260.lcb
样品瓶号: 1-3
进样体积: 20 μ L 版本号 : 6.115
进样时间: 2026/03/20 17:58:19 实验者 : jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2026/03/23 14:33:37 处理者 : jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 245nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.924	277290	100.000	46274	2476	1.168	--
总计		277290	100.000	46274			

图19 盐酸伐地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6031101批(10mg规格)-均一性1-pH6.8介质-15min-片1
供试品溶液-1




J632

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.8ml/min
柱温:40°C 波长: 245nm
数据文件名: RC\$J632 - 11-13/11-984-2 - zzp-6031101p-rcqx-pH6.8jz-10mg-jyx1-15min-P2.lcd
方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$J632 - J632-20260320-FX260.lcb
样品瓶号: 1-12
进样体积: 20 μ L 版本号 : 6.115
进样时间: 2026/03/20 18:01:42 实验者 : jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2026/03/23 14:33:39 处理者 : jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 245nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.924	250546	100.000	41723	2469	1.163	--
总计		250546	100.000	41723			

图20 盐酸伐地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6031101批(10mg规格)-均一性1-pH6.8介质-15min-片2
供试品溶液-1




J632

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.8ml/min
柱温:40°C 波长: 245nm
数据文件名: RC\$J632 - 11-13/11-985-2 - zzp-6031101p-rcqx-pH6.8jz-10mg-jyx1-15min-P3.lcd
方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$J632 - J632-20260320-FX260.lcb
样品瓶号: 1-21
进样体积: 20 μ L 版本号 : 6.115
进样时间: 2026/03/20 18:05:05 实验者 : jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2026/03/23 14:33:42 处理者 : jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 245nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.925	227684	100.000	37894	2476	1.169	--
总计		227684	100.000	37894			

图21 盐酸伐地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6031101批(10mg规格)-均一性1-pH6.8介质-15min-片3
供试品溶液-1




J632

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.8ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长: 245nm
数据文件名: RC\$J632 - 11-13/11-986-2 - zzp-6031101p-rcqx-pH6.8jz-10mg-jyx1-15min-P4.lcd
方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$J632 - J632-20260320-FX260.lcb
样品瓶号: 1-30
进样体积: 20 μ L 版本号 : 6.115
进样时间: 2026/03/20 18:08:27 实验者 : jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2026/03/23 14:33:45 处理者 : jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 245nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.925	274806	100.000	45700	2473	1.172	--
总计		274806	100.000	45700			

图22 盐酸伐地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6031101批(10mg规格)-均一性1-pH6.8介质-15min-片4
供试品溶液-1




J632

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.8ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长: 245nm
数据文件名: RC\$J632 - 11-13/11-987-2 - zzp-6031101p-rcqx-pH6.8jz-10mg-jyx1-15min-P5.lcd
方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$J632 - J632-20260320-FX260.lcb
样品瓶号: 1-39
进样体积: 20 μ L 版本号 : 6.115
进样时间: 2026/03/20 18:11:50 实验者 : jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2026/03/23 14:33:47 处理者 : jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 245nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.926	310187	100.000	51613	2489	1.171	--
总计		310187	100.000	51613			

图23 盐酸伐地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6031101批(10mg规格)-均一性1-pH6.8介质-15min-片5
供试品溶液-1




J632

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.8ml/min
柱温:40°C 波长: 245nm
数据文件名: RC\$J632 - 11-13/11-988-2 - zzp-6031101p-rcqx-pH6.8jz-10mg-jyx1-15min-P6.lcd
方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$J632 - J632-20260320-FX260.lcb
样品瓶号: 1-48
进样体积: 20 μ L 版本号 : 6.115
进样时间: 2026/03/20 18:15:12 实验者 : jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2026/03/23 14:33:50 处理者 : jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 245nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.924	279347	100.000	46682	2482	1.167	--
总计		279347	100.000	46682			

图24 盐酸伐地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6031101批(10mg规格)-均一性1-pH6.8介质-15min-片6
供试品溶液-1




J632

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.8ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长: 245nm
数据文件名: RC\$J632 - 11-13/11-989-2 - zzp-6031101p-rcqx-pH6.8jz-10mg-jyx1-20min-P1.lcd
方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$J632 - J632-20260320-FX260.lcb
样品瓶号: 1-4
进样体积: 20 μ L 版本号 : 6.115
进样时间: 2026/03/20 18:18:35 实验者 : jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2026/03/23 14:33:53 处理者 : jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 245nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.925	302710	100.000	50425	2487	1.169	--
总计		302710	100.000	50425			

图25 盐酸伐地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6031101批(10mg规格)-均一性1-pH6.8介质-20min-片1
供试品溶液-1




J632

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.8ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长: 245nm
数据文件名: RC\$J632 - 11-13/11-990-2 - zzp-6031101p-rcqx-pH6.8jz-10mg-jyx1-20min-P2.lcd
方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$J632 - J632-20260320-FX260.lcb
样品瓶号: 1-13
进样体积: 20 μ L 版本号 : 6.115
进样时间: 2026/03/20 18:21:58 实验者 : jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2026/03/23 14:33:55 处理者 : jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 245nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.924	273612	100.000	45766	2487	1.169	--
总计		273612	100.000	45766			

图26 盐酸伐地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6031101批(10mg规格)-均一性1-pH6.8介质-20min-片2
供试品溶液-1




J632

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.8ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长: 245nm
数据文件名: RC\$J632 - 11-13/11-991-2 - zzp-6031101p-rcqx-pH6.8jz-10mg-jyx1-20min-P3.lcd
方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$J632 - J632-20260320-FX260.lcb
样品瓶号: 1-22
进样体积: 20 μ L 版本号 : 6.115
进样时间: 2026/03/20 18:25:21 实验者 : jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2026/03/23 14:33:58 处理者 : jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 245nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.926	258559	100.000	43062	2491	1.171	--
总计		258559	100.000	43062			

图27 盐酸伐地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6031101批(10mg规格)-均一性1-pH6.8介质-20min-片3
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.8ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长: 245nm
数据文件名: RC\$J632 - 11-13/11-992-2 - zzp-6031101p-rcqx-pH6.8jz-10mg-jyx1-20min-P4.lcd
方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$J632 - J632-20260320-FX260.lcb
样品瓶号: 1-31
进样体积: 20 μ L 版本号 : 6.115
进样时间: 2026/03/20 18:28:43 实验者 : jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2026/03/23 14:34:01 处理者 : jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 245nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.926	300178	100.000	49823	2475	1.173	--
总计		300178	100.000	49823			

图28 盐酸伐地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6031101批(10mg规格)-均一性1-pH6.8介质-20min-片4
供试品溶液-1




J632

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.8ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长: 245nm
数据文件名: RC\$J632 - 11-13/11-993-2 - zzp-6031101p-rcqx-pH6.8jz-10mg-jyx1-20min-P5.lcd
方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$J632 - J632-20260320-FX260.lcb
样品瓶号: 1-40
进样体积: 20 μ L 版本号 : 6.115
进样时间: 2026/03/20 18:32:06 实验者 : jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2026/03/23 14:34:03 处理者 : jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 245nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.925	329873	100.000	54896	2479	1.172	--
总计		329873	100.000	54896			

图29 盐酸伐地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6031101批(10mg规格)-均一性1-pH6.8介质-20min-片5
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.8ml/min
柱温:40°C 波长: 245nm
数据文件名: RC\$J632 - 11-13/11-994-2 - zzp-6031101p-rcqx-pH6.8jz-10mg-jyx1-20min-P6.lcd
方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$J632 - J632-20260320-FX260.lcb
样品瓶号: 1-49
进样体积: 20 μ L 版本号 : 6.115
进样时间: 2026/03/20 18:35:29 实验者 : jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2026/03/23 14:34:06 处理者 : jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 245nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.925	297863	100.000	49589	2473	1.172	--
总计		297863	100.000	49589			

图30 盐酸伐地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6031101批(10mg规格)-均一性1-pH6.8介质-20min-片6
供试品溶液-1




J632

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.8ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长: 245nm
数据文件名: RC\$J632 - 11-13/11-995-2 - zzp-6031101p-rcqx-pH6.8jz-10mg-jyx1-30min-P1.lcd
方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$J632 - J632-20260320-FX260.lcb
样品瓶号: 1-5
进样体积: 20 μ L 版本号 : 6.115
进样时间: 2026/03/20 18:38:52 实验者 : jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2026/03/23 14:34:09 处理者 : jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 245nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.925	330962	100.000	54920	2458	1.171	--
总计		330962	100.000	54920			

图31 盐酸伐地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6031101批(10mg规格)-均一性1-pH6.8介质-30min-片1
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.8ml/min
柱温:40°C 波长: 245nm
数据文件名: RC\$J632 - 11-13/11-996-2 - zzp-6031101p-rcqx-pH6.8jz-10mg-jyx1-30min-P2.lcd
方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$J632 - J632-20260320-FX260.lcb
样品瓶号: 1-14
进样体积: 20 μ L 版本号 : 6.115
进样时间: 2026/03/20 18:42:15 实验者 : jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2026/03/23 14:34:11 处理者 : jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 245nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.924	314744	100.000	52311	2460	1.167	--
总计		314744	100.000	52311			

图32 盐酸伐地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6031101批(10mg规格)-均一性1-pH6.8介质-30min-片2
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.8ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长: 245nm
数据文件名: RC\$J632 - 11-13/11-997-2 - zzp-6031101p-rcqx-pH6.8jz-10mg-jyx1-30min-P3.lcd
方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$J632 - J632-20260320-FX260.lcb
样品瓶号: 1-23
进样体积: 20 μ L 版本号 : 6.115
进样时间: 2026/03/20 18:45:38 实验者 : jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2026/03/23 14:34:14 处理者 : jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 245nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.925	297850	100.000	49568	2472	1.167	--
总计		297850	100.000	49568			

图33 盐酸伐地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6031101批(10mg规格)-均一性1-pH6.8介质-30min-片3
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.8ml/min
柱温:40°C 波长: 245nm
数据文件名: RC\$J632 - 11-13/11-998-2 - zzp-6031101p-rcqx-pH6.8jz-10mg-jyx1-30min-P4.lcd
方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$J632 - J632-20260320-FX260.lcb
样品瓶号: 1-32
进样体积: 20 μ L 版本号 : 6.115
进样时间: 2026/03/20 18:49:00 实验者 : jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2026/03/23 14:34:17 处理者 : jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 245nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.928	329826	100.000	55003	2484	1.167	--
总计		329826	100.000	55003			

图34 盐酸伐地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6031101批(10mg规格)-均一性1-pH6.8介质-30min-片4
供试品溶液-1




J632

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.8ml/min
柱温:40°C 波长: 245nm
数据文件名: RC\$J632 - 11-13/11-999-2 - zzp-6031101p-rcqx-pH6.8jz-10mg-jyx1-30min-P5.lcd
方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$J632 - J632-20260320-FX260.lcb
样品瓶号: 1-41
进样体积: 20 μ L 版本号 : 6.115
进样时间: 2026/03/20 18:52:23 实验者 : jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2026/03/23 14:34:19 处理者 : jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 245nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.926	357166	100.000	59493	2487	1.170	--
总计		357166	100.000	59493			

图35 盐酸伐地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6031101批(10mg规格)-均一性1-pH6.8介质-30min-片5
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.8ml/min
柱温:40°C 波长: 245nm
数据文件名: RC\$J632 - 11-13/11-1000-2 - zzp-6031101p-rcqx-pH6.8jz-10mg-jyx1-30min-P6.lcd
方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$J632 - J632-20260320-FX260.lcb
样品瓶号: 1-50
进样体积: 20 μ L 版本号 : 6.115
进样时间: 2026/03/20 18:55:45 实验者 : jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2026/03/23 14:34:22 处理者 : jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 245nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.925	326438	100.000	54348	2477	1.169	--
总计		326438	100.000	54348			

图36 盐酸伐地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6031101批(10mg规格)-均一性1-pH6.8介质-30min-片6
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.8ml/min
柱温:40°C 波长: 245nm
数据文件名: RC\$J632 - 11-13/11-1001-2 - zzp-6031101p-rcqx-pH6.8jz-10mg-jyx1-45min-P1.lcd
方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$J632 - J632-20260320-FX260.lcb
样品瓶号: 1-6
进样体积: 20 μ L 版本号 : 6.115
进样时间: 2026/03/20 18:59:09 实验者 : jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2026/03/23 14:34:25 处理者 : jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 245nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.928	353452	100.000	58986	2486	1.170	--
总计		353452	100.000	58986			

图37 盐酸伐地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6031101批(10mg规格)-均一性1-pH6.8介质-45min-片1
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.8ml/min
柱温:40°C 波长: 245nm
数据文件名: RC\$J632 - 11-13/11-1002-2 - zzp-6031101p-rcqx-pH6.8jz-10mg-jyx1-45min-P2.lcd
方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$J632 - J632-20260320-FX260.lcb
样品瓶号: 1-15
进样体积: 20 μ L 版本号 : 6.115
进样时间: 2026/03/20 19:02:32 实验者 : jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2026/03/23 14:34:27 处理者 : jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 245nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.925	349287	100.000	58094	2474	1.170	--
总计		349287	100.000	58094			

图38 盐酸伐地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6031101批(10mg规格)-均一性1-pH6.8介质-45min-片2
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.8ml/min
柱温:40°C 波长: 245nm
数据文件名: RC\$J632 - 11-13/11-1003-2 - zzp-6031101p-rcqx-pH6.8jz-10mg-jyx1-45min-P3.lcd
方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$J632 - J632-20260320-FX260.lcb
样品瓶号: 1-24
进样体积: 20 μ L 版本号 : 6.115
进样时间: 2026/03/20 19:05:55 实验者 : jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2026/03/23 14:34:30 处理者 : jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 245nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.926	332323	100.000	55242	2483	1.170	--
总计		332323	100.000	55242			

图39 盐酸伐地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6031101批(10mg规格)-均一性1-pH6.8介质-45min-片3
供试品溶液-1




J632

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.8ml/min
柱温:40°C 波长: 245nm
数据文件名: RC\$J632 - 11-13/11-1004-2 - zzp-6031101p-rcqx-pH6.8jz-10mg-jyx1-45min-P4.lcd
方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$J632 - J632-20260320-FX260.lcb
样品瓶号: 1-33
进样体积: 20 μ L 版本号 : 6.115
进样时间: 2026/03/20 19:09:18 实验者 : jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2026/03/23 14:34:33 处理者 : jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 245nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.929	357439	100.000	59591	2479	1.167	--
总计		357439	100.000	59591			

图40 盐酸伐地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6031101批(10mg规格)-均一性1-pH6.8介质-45min-片4
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.8ml/min
柱温:40°C 波长: 245nm
数据文件名: RC\$J632 - 11-13/11-1005-2 - zzp-6031101p-rcqx-pH6.8jz-10mg-jyx1-45min-P5.lcd
方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$J632 - J632-20260320-FX260.lcb
样品瓶号: 1-42
进样体积: 20 μ L 版本号 : 6.115
进样时间: 2026/03/20 19:12:40 实验者 : jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2026/03/23 14:34:35 处理者 : jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 245nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.926	377587	100.000	62679	2469	1.166	--
总计		377587	100.000	62679			

图41 盐酸伐地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6031101批(10mg规格)-均一性1-pH6.8介质-45min-片5
供试品溶液-1




J632

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.8ml/min
柱温:40°C 波长: 245nm
数据文件名: RC\$J632 - 11-13/11-1006-2 - zzp-6031101p-rcqx-pH6.8jz-10mg-jyx1-45min-P6.lcd
方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$J632 - J632-20260320-FX260.lcb
样品瓶号: 1-51
进样体积: 20 μ L 版本号 : 6.115
进样时间: 2026/03/20 19:16:03 实验者 : jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2026/03/23 14:34:38 处理者 : jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 245nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.924	353163	100.000	58752	2465	1.166	--
总计		353163	100.000	58752			

图42 盐酸伐地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6031101批(10mg规格)-均一性1-pH6.8介质-45min-片6
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.8ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长: 245nm
数据文件名: RC\$J632 - 11-13/11-1007-2 - zzp-6031101p-rcqx-pH6.8jz-10mg-jyx1-60min-P1.lcd
方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$J632 - J632-20260320-FX260.lcb
样品瓶号: 1-7
进样体积: 20 μ L 版本号 : 6.115
进样时间: 2026/03/20 19:19:26 实验者 : jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2026/03/23 14:34:41 处理者 : jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 245nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.927	367188	100.000	61108	2474	1.167	--
总计		367188	100.000	61108			

图43 盐酸伐地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6031101批(10mg规格)-均一性1-pH6.8介质-60min-片1
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.8ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长: 245nm
数据文件名: RC\$J632 - 11-13/11-1008-2 - zzp-6031101p-rcqx-pH6.8jz-10mg-jyx1-60min-P2.lcd
方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$J632 - J632-20260320-FX260.lcb
样品瓶号: 1-16
进样体积: 20 μ L 版本号 : 6.115
进样时间: 2026/03/20 19:22:49 实验者 : jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2026/03/23 14:34:43 处理者 : jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 245nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.927	365589	100.000	60474	2453	1.168	--
总计		365589	100.000	60474			

图44 盐酸伐地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6031101批(10mg规格)-均一性1-pH6.8介质-60min-片2
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.8ml/min
柱温:40°C 波长: 245nm
数据文件名: RC\$J632 - 11-13/11-1009-2 - zzp-6031101p-rcqx-pH6.8jz-10mg-jyx1-60min-P3.lcd
方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$J632 - J632-20260320-FX260.lcb
样品瓶号: 1-25
进样体积: 20 μ L 版本号 : 6.115
进样时间: 2026/03/20 19:26:12 实验者 : jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2026/03/23 14:34:46 处理者 : jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 245nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.928	353649	100.000	58706	2460	1.169	--
总计		353649	100.000	58706			

图45 盐酸伐地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6031101批(10mg规格)-均一性1-pH6.8介质-60min-片3
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.8ml/min
柱温:40°C 波长: 245nm
数据文件名: RC\$J632 - 11-13/11-1010-2 - zzp-6031101p-rcqx-pH6.8jz-10mg-jyx1-60min-P4.lcd
方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$J632 - J632-20260320-FX260.lcb
样品瓶号: 1-34
进样体积: 20 μ L 版本号 : 6.115
进样时间: 2026/03/20 19:29:34 实验者 : jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2026/03/23 14:34:49 处理者 : jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 245nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.929	370410	100.000	61406	2453	1.170	--
总计		370410	100.000	61406			

图46 盐酸伐地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6031101批(10mg规格)-均一性1-pH6.8介质-60min-片4
供试品溶液-1




J632

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.8ml/min
柱温:40°C 波长: 245nm
数据文件名: RC\$J632 - 11-13/11-1011-2 - zzp-6031101p-rcqx-pH6.8jz-10mg-jyx1-60min-P5.lcd
方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$J632 - J632-20260320-FX260.lcb
样品瓶号: 1-43
进样体积: 20 μ L 版本号 : 6.115
进样时间: 2026/03/20 19:32:57 实验者 : jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2026/03/23 14:34:51 处理者 : jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 245nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.926	395464	100.000	65067	2422	1.170	--
总计		395464	100.000	65067			

图47 盐酸伐地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6031101批(10mg规格)-均一性1-pH6.8介质-60min-片5
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.8ml/min
柱温:40°C 波长: 245nm
数据文件名: RC\$J632 - 11-13/11-1012-2 - zzp-6031101p-rcqx-pH6.8jz-10mg-jyx1-60min-P6.lcd
方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$J632 - J632-20260320-FX260.lcb
样品瓶号: 1-52
进样体积: 20 μ L 版本号 : 6.115
进样时间: 2026/03/20 19:36:20 实验者 : jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2026/03/23 14:34:54 处理者 : jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 245nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.927	373856	100.000	61585	2421	1.166	--
总计		373856	100.000	61585			

图48 盐酸伐地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6031101批(10mg规格)-均一性1-pH6.8介质-60min-片6
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.8ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长: 245nm
数据文件名: RC\$J632 - 11-13/11-1013-2 - zzp-6031101p-rcqx-pH6.8jz-10mg-jyx1-90min-P1.lcd
方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$J632 - J632-20260320-FX260.lcb
样品瓶号: 1-8
进样体积: 20 μ L 版本号 : 6.115
进样时间: 2026/03/20 19:39:45 实验者 : jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2026/03/23 14:34:56 处理者 : jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 245nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.929	378057	100.000	62268	2415	1.166	--
总计		378057	100.000	62268			

图49 盐酸伐地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6031101批(10mg规格)-均一性1-pH6.8介质-90min-片1
供试品溶液-1




J632

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.8ml/min
柱温:40°C 波长: 245nm
数据文件名: RC\$J632 - 11-13/11-1014-2 - zzp-6031101p-rcqx-pH6.8jz-10mg-jyx1-90min-P2.lcd
方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$J632 - J632-20260320-FX260.lcb
样品瓶号: 1-17
进样体积: 20 μ L 版本号 : 6.115
进样时间: 2026/03/20 19:43:08 实验者 : jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2026/03/23 14:34:59 处理者 : jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 245nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.927	386702	100.000	63542	2410	1.167	--
总计		386702	100.000	63542			

图50 盐酸伐地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6031101批(10mg规格)-均一性1-pH6.8介质-90min-片2
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.8ml/min
柱温:40°C 波长: 245nm
数据文件名: RC\$J632 - 11-13/11-1015-2 - zzp-6031101p-rcqx-pH6.8jz-10mg-jyx1-90min-P3.lcd
方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$J632 - J632-20260320-FX260.lcb
样品瓶号: 1-26
进样体积: 20 μ L 版本号 : 6.115
进样时间: 2026/03/20 19:46:32 实验者 : jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2026/03/23 14:35:02 处理者 : jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 245nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.926	369406	100.000	60646	2411	1.168	--
总计		369406	100.000	60646			

图51 盐酸伐地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6031101批(10mg规格)-均一性1-pH6.8介质-90min-片3
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.8ml/min
柱温:40°C 波长: 245nm
数据文件名: RC\$J632 - 11-13/11-1016-2 - zzp-6031101p-rcqx-pH6.8jz-10mg-jyx1-90min-P4.lcd
方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$J632 - J632-20260320-FX260.lcb
样品瓶号: 1-35
进样体积: 20 μ L 版本号 : 6.115
进样时间: 2026/03/20 19:49:56 实验者 : jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2026/03/23 14:35:05 处理者 : jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 245nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.929	384029	100.000	63283	2412	1.168	--
总计		384029	100.000	63283			

图52 盐酸伐地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6031101批(10mg规格)-均一性1-pH6.8介质-90min-片4
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.8ml/min
柱温:40°C 波长: 245nm
数据文件名: RC\$J632 - 11-13/11-1017-2 - zzp-6031101p-rcqx-pH6.8jz-10mg-jyx1-90min-P5.lcd
方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$J632 - J632-20260320-FX260.lcb
样品瓶号: 1-44
进样体积: 20 μ L 版本号 : 6.115
进样时间: 2026/03/20 19:53:19 实验者 : jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2026/03/23 14:35:08 处理者 : jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 245nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.930	408188	100.000	67271	2417	1.168	--
总计		408188	100.000	67271			

图53 盐酸伐地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6031101批(10mg规格)-均一性1-pH6.8介质-90min-片5
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.8ml/min
柱温:40°C 波长: 245nm
数据文件名: RC\$J632 - 11-13/11-1018-2 - zzp-6031101p-rcqx-pH6.8jz-10mg-jyx1-90min-P6.lcd
方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$J632 - J632-20260320-FX260.lcb
样品瓶号: 1-53
进样体积: 20 μ L 版本号 : 6.115
进样时间: 2026/03/20 19:56:43 实验者 : jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2026/03/23 14:35:10 处理者 : jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 245nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.926	386817	100.000	63782	2434	1.170	--
总计		386817	100.000	63782			

图54 盐酸伐地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6031101批(10mg规格)-均一性1-pH6.8介质-90min-片6
供试品溶液-1




J632

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.8ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长: 245nm
数据文件名: RC\$J632 - 11-13/11-1019-2 - zzp-6031101p-rcqx-pH6.8jz-10mg-jyx1-120min-P1.lcd
方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$J632 - J632-20260320-FX260.lcb
样品瓶号: 4-1
进样体积: 20 μ L 版本号 : 6.115
进样时间: 2026/03/20 20:00:06 实验者 : jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2026/03/23 14:35:13 处理者 : jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 245nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.927	381518	100.000	62987	2428	1.165	--
总计		381518	100.000	62987			

图55 盐酸伐地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6031101批(10mg规格)-均一性1-pH6.8介质-120min-片1
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.8ml/min
柱温:40°C 波长: 245nm
数据文件名: RC\$J632 - 11-13/11-1020-2 - zzp-6031101p-rcqx-pH6.8jz-10mg-jyx1-120min-P2.lcd
方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$J632 - J632-20260320-FX260.lcb
样品瓶号: 4-10
进样体积: 20 μ L 版本号 : 6.115
进样时间: 2026/03/20 20:03:29 实验者 : jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2026/03/23 14:35:16 处理者 : jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 245nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.930	389928	100.000	64571	2435	1.164	--
总计		389928	100.000	64571			

图56 盐酸伐地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6031101批(10mg规格)-均一性1-pH6.8介质-120min-片2
供试品溶液-1




J632

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.8ml/min
柱温:40°C 波长: 245nm
数据文件名: RC\$J632 - 11-13/11-1021-2 - zzp-6031101p-rcqx-pH6.8jz-10mg-jyx1-120min-P3.lcd
方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$J632 - J632-20260320-FX260.lcb
样品瓶号: 4-19
进样体积: 20 μ L 版本号 : 6.115
进样时间: 2026/03/20 20:06:52 实验者 : jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2026/03/23 14:35:19 处理者 : jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 245nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.926	376082	100.000	62180	2449	1.167	--
总计		376082	100.000	62180			

图57 盐酸伐地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6031101批(10mg规格)-均一性1-pH6.8介质-120min-片3
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.8ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长: 245nm
数据文件名: RC\$J632 - 11-13/11-1022-2 - zzp-6031101p-rcqx-pH6.8jz-10mg-jyx1-120min-P4.lcd
方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$J632 - J632-20260320-FX260.lcb
样品瓶号: 4-28
进样体积: 20 μ L 版本号 : 6.115
进样时间: 2026/03/20 20:10:15 实验者 : jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2026/03/23 14:35:22 处理者 : jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 245nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.926	386325	100.000	63655	2437	1.166	--
总计		386325	100.000	63655			

图58 盐酸伐地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6031101批(10mg规格)-均一性1-pH6.8介质-120min-片4
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.8ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长: 245nm
数据文件名: RC\$J632 - 11-13/11-1023-2 - zzp-6031101p-rcqx-pH6.8jz-10mg-jyx1-120min-P5.lcd
方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$J632 - J632-20260320-FX260.lcb
样品瓶号: 4-37
进样体积: 20 μ L 版本号 : 6.115
进样时间: 2026/03/20 20:13:38 实验者 : jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2026/03/23 14:35:24 处理者 : jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 245nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.927	409592	100.000	67907	2458	1.168	--
总计		409592	100.000	67907			

图59 盐酸伐地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6031101批(10mg规格)-均一性1-pH6.8介质-120min-片5
供试品溶液-1




J632

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.8ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长: 245nm
数据文件名: RC\$J632 - 11-13/11-1024-2 - zzp-6031101p-rcqx-pH6.8jz-10mg-jyx1-120min-P6.lcd
方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$J632 - J632-20260320-FX260.lcb
样品瓶号: 4-46
进样体积: 20 μ L 版本号 : 6.115
进样时间: 2026/03/20 20:17:00 实验者 : jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2026/03/23 14:35:27 处理者 : jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 245nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.927	393123	100.000	65068	2446	1.165	--
总计		393123	100.000	65068			

图60 盐酸伐地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6031101批(10mg规格)-均一性1-pH6.8介质-120min-片6
供试品溶液-1




J632

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.8ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长: 245nm
数据文件名: RC\$J632 - 11-13/11-1025-2 - zzp-6031101p-rcqx-pH6.8jz-10mg-jyx1-jx-P1.lcd
方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$J632 - J632-20260320-FX260.lcb
样品瓶号: 4-2
进样体积: 20 μ L 版本号 : 6.115
进样时间: 2026/03/20 20:20:23 实验者 : jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2026/03/23 14:35:29 处理者 : jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 245nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.929	386953	100.000	64250	2456	1.166	--
总计		386953	100.000	64250			

图61 盐酸伐地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6031101批(10mg规格)-均一性1-pH6.8介质-极限转速-片1
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.8ml/min
柱温:40°C 波长: 245nm
数据文件名: RC\$J632 - 11-13/11-1026-2 - zzp-6031101p-rcqx-pH6.8jz-10mg-jyx1-jx-P2.lcd
方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$J632 - J632-20260320-FX260.lcb
样品瓶号: 4-11
进样体积: 20 μ L 版本号 : 6.115
进样时间: 2026/03/20 20:23:47 实验者 : jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2026/03/23 14:35:32 处理者 : jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 245nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.925	400160	100.000	65915	2425	1.165	--
总计		400160	100.000	65915			

图62 盐酸伐地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6031101批(10mg规格)-均一性1-pH6.8介质-极限转速-片2
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.8ml/min
柱温:40°C 波长: 245nm
数据文件名: RC\$J632 - 11-13/11-1027-2 - zzp-6031101p-rcqx-pH6.8jz-10mg-jyx1-jx-P3.lcd
方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$J632 - J632-20260320-FX260.lcb
样品瓶号: 4-20
进样体积: 20 μ L 版本号 : 6.115
进样时间: 2026/03/20 20:27:10 实验者 : jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2026/03/23 14:35:35 处理者 : jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 245nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.930	383567	100.000	63336	2429	1.163	--
总计		383567	100.000	63336			

图63 盐酸伐地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6031101批(10mg规格)-均一性1-pH6.8介质-极限转速-片3
供试品溶液-1




J632

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.8ml/min
柱温:40°C 波长: 245nm
数据文件名: RC\$J632 - 11-13/11-1028-2 - zzp-6031101p-rcqx-pH6.8jz-10mg-jyx1-jx-P4.lcd
方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$J632 - J632-20260320-FX260.lcb
样品瓶号: 4-29
进样体积: 20 μ L 版本号 : 6.115
进样时间: 2026/03/20 20:30:33 实验者 : jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2026/03/23 14:35:37 处理者 : jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 245nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.929	394075	100.000	65028	2428	1.166	--
总计		394075	100.000	65028			

图64 盐酸伐地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6031101批(10mg规格)-均一性1-pH6.8介质-极限转速-片4
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.8ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长: 245nm
数据文件名: RC\$J632 - 11-13/11-1029-2 - zzp-6031101p-rcqx-pH6.8jz-10mg-jyx1-jx-P5.lcd
方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$J632 - J632-20260320-FX260.lcb
样品瓶号: 4-38
进样体积: 20 μ L 版本号 : 6.115
进样时间: 2026/03/20 20:33:57 实验者 : jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2026/03/23 14:35:40 处理者 : jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 245nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.928	412150	100.000	68134	2437	1.166	--
总计		412150	100.000	68134			

图65 盐酸伐地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6031101批(10mg规格)-均一性1-pH6.8介质-极限转速-片5
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.8ml/min
柱温:40°C 波长: 245nm
数据文件名: RC\$J632 - 11-13/11-1030-2 - zzp-6031101p-rcqx-pH6.8jz-10mg-jyx1-jx-P6.lcd
方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$J632 - J632-20260320-FX260.lcb
样品瓶号: 4-47
进样体积: 20 μ L 版本号 : 6.115
进样时间: 2026/03/20 20:37:19 实验者 : jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2026/03/23 14:35:43 处理者 : jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 245nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.925	396301	100.000	65265	2420	1.167	--
总计		396301	100.000	65265			

图66 盐酸伐地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6031101批(10mg规格)-均一性1-pH6.8介质-极限转速-片6
供试品溶液-1




J632

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.8ml/min
柱温:40°C 波长: 245nm
数据文件名: RC\$J632 - 11-13/11-1031-2 - zzp-6031101p-rcqx-pH6.8jz-10mg-jyx1-dz2-1.lcd
方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$J632 - J632-20260320-FX260.lcb
样品瓶号: 1-27
进样体积: 20 μ L 版本号 : 6.115
进样时间: 2026/03/20 20:40:43 实验者 : jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2026/03/23 14:35:45 处理者 : jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 245nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.891	383785	100.000	61078	2188	1.191	--
总计		383785	100.000	61078			

图67 盐酸伐地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6031101批(10mg规格)-均一性1-pH6.8介质
对照品溶液-2-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.8ml/min
柱温:40°C 波长: 245nm
数据文件名: RC\$J632 - 11-13/11-1032-2 - zzp-6031101p-rcqx-pH6.8jz-10mg-jyx1-dz2-2.lcd
方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$J632 - J632-20260320-FX260.lcb
样品瓶号: 1-27
进样体积: 20 μ L 版本号 : 6.115
进样时间: 2026/03/20 20:44:07 实验者 : jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2026/03/23 14:35:48 处理者 : jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 245nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.894	383656	100.000	61073	2194	1.193	--
总计		383656	100.000	61073			

图68 盐酸伐地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6031101批(10mg规格)-均一性1-pH6.8介质
对照品溶液-2-2




J632

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.8ml/min
柱温:40°C 波长: 245nm
数据文件名: RC\$J632 - 11-13/11-1033-2 - zzp-6031102p-rcqx-pH6.8jz-10mg-jyx1-rj.lcd
方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$J632 - J632-20260320-FX260.lcb
样品瓶号: 2-9
进样体积: 20 μ L 版本号 : 6.115
进样时间: 2026/03/20 20:47:32 实验者 : jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2026/03/23 14:35:51 处理者 : jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 245nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图69 盐酸伐地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6031102批(10mg规格)-均一性1-pH6.8介质
溶剂

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.8ml/min
柱温:40°C 波长: 245nm
数据文件名: RC\$J632 - 11-13/11-1034-2 - zzp-6031102p-rcqx-pH6.8jz-10mg-jyx1-dz1-1.lcd
方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$J632 - J632-20260320-FX260.lcb
样品瓶号: 2-18
进样体积: 20 μ L 版本号 : 6.115
进样时间: 2026/03/20 20:50:56 实验者 : jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2026/03/23 14:35:53 处理者 : jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 245nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.891	382700	100.000	61256	2211	1.194	--
总计		382700	100.000	61256			

图70 盐酸伐地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6031102批(10mg规格)-均一性1-pH6.8介质
对照品溶液-1-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.8ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长: 245nm
数据文件名: RC\$J632 - 11-13/11-1035-2 - zzp-6031102p-rcqx-pH6.8jz-10mg-jyx1-dz1-2.lcd
方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$J632 - J632-20260320-FX260.lcb
样品瓶号: 2-18
进样体积: 20 μ L 版本号 : 6.115
进样时间: 2026/03/20 20:54:20 实验者 : jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2026/03/23 14:35:56 处理者 : jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 245nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.891	385022	100.000	61196	2181	1.195	--
总计		385022	100.000	61196			

图71 盐酸伐地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6031102批(10mg规格)-均一性1-pH6.8介质
对照品溶液-1-2




J632

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.8ml/min
柱温:40°C 波长: 245nm
数据文件名: RC\$J632 - 11-13/11-1036-2 - zzp-6031102p-rcqx-pH6.8jz-10mg-jyx1-dz1-3.lcd
方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$J632 - J632-20260320-FX260.lcb
样品瓶号: 2-18
进样体积: 20 μ L 版本号 : 6.115
进样时间: 2026/03/20 20:57:45 实验者 : jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2026/03/23 14:35:59 处理者 : jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 245nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.892	383840	100.000	61041	2190	1.195	--
总计		383840	100.000	61041			

图72 盐酸伐地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6031102批(10mg规格)-均一性1-pH6.8介质
对照品溶液-1-3

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.8ml/min
柱温:40°C 波长: 245nm
数据文件名: RC\$J632 - 11-13/11-1037-2 - zzp-6031102p-rcqx-pH6.8jz-10mg-jyx1-dz1-4.lcd
方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$J632 - J632-20260320-FX260.lcb
样品瓶号: 2-18
进样体积: 20 μ L 版本号 : 6.115
进样时间: 2026/03/20 21:01:10 实验者 : jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2026/03/23 14:36:01 处理者 : jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 245nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.896	384891	100.000	61200	2182	1.195	--
总计		384891	100.000	61200			

图73 盐酸伐地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6031102批(10mg规格)-均一性1-pH6.8介质
对照品溶液-1-4

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.8ml/min
柱温:40°C 波长: 245nm
数据文件名: RC\$J632 - 11-13/11-1038-2 - zzp-6031102p-rcqx-pH6.8jz-10mg-jyx1-dz1-5.lcd
方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$J632 - J632-20260320-FX260.lcb
样品瓶号: 2-18
进样体积: 20 μ L 版本号 : 6.115
进样时间: 2026/03/20 21:04:35 实验者 : jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2026/03/23 14:36:04 处理者 : jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 245nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.892	382704	100.000	61087	2207	1.197	--
总计		382704	100.000	61087			

图74 盐酸伐地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6031102批(10mg规格)-均一性1-pH6.8介质
对照品溶液-1-5

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.8ml/min
柱温:40°C 波长: 245nm
数据文件名: RC\$J632 - 11-13/11-1039-2 - zzp-6031102p-rcqx-pH6.8jz-10mg-jyx1-5min-P1.lcd
方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$J632 - J632-20260320-FX260.lcb
样品瓶号: 2-1
进样体积: 20 μ L 版本号 : 6.115
进样时间: 2026/03/20 21:07:59 实验者 : jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2026/03/23 14:36:06 处理者 : jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 245nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.932	160635	100.000	26504	2433	1.167	--
总计		160635	100.000	26504			

图75 盐酸伐地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6031102批(10mg规格)-均一性1-pH6.8介质-5min-片1
供试品溶液-1




J632

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.8ml/min
柱温:40°C 波长: 245nm
数据文件名: RC\$J632 - 11-13/11-1040-2 - zzp-6031102p-rcqx-pH6.8jz-10mg-jyx1-5min-P2.lcd
方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$J632 - J632-20260320-FX260.lcb
样品瓶号: 2-10
进样体积: 20 μ L 版本号 : 6.115
进样时间: 2026/03/20 21:11:23 实验者 : jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2026/03/23 14:36:09 处理者 : jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 245nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.936	205212	100.000	33749	2430	1.170	--
总计		205212	100.000	33749			

图76 盐酸伐地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6031102批(10mg规格)-均一性1-pH6.8介质-5min-片2
供试品溶液-1




J632

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.8ml/min
柱温:40°C 波长: 245nm
数据文件名: RC\$J632 - 11-13/11-1041-2 - zzp-6031102p-rcqx-pH6.8jz-10mg-jyx1-5min-P3.lcd
方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$J632 - J632-20260320-FX260.lcb
样品瓶号: 2-19
进样体积: 20 μ L 版本号 : 6.115
进样时间: 2026/03/20 21:14:46 实验者 : jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2026/03/23 14:36:11 处理者 : jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 245nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.930	119795	100.000	19736	2400	1.158	--
总计		119795	100.000	19736			

图77 盐酸伐地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6031102批(10mg规格)-均一性1-pH6.8介质-5min-片3
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.8ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长: 245nm
数据文件名: RC\$J632 - 11-13/11-1042-2 - zzp-6031102p-rcqx-pH6.8jz-10mg-jyx1-5min-P4.lcd
方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$J632 - J632-20260320-FX260.lcb
样品瓶号: 2-28
进样体积: 20 μ L 版本号 : 6.115
进样时间: 2026/03/20 21:18:11 实验者 : jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2026/03/23 14:36:14 处理者 : jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 245nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.934	179650	100.000	29393	2424	1.170	--
总计		179650	100.000	29393			

图78 盐酸伐地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6031102批(10mg规格)-均一性1-pH6.8介质-5min-片4
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.8ml/min
柱温:40°C 波长: 245nm
数据文件名: RC\$J632 - 11-13/11-1043-2 - zzp-6031102p-rcqx-pH6.8jz-10mg-jyx1-5min-P5.lcd
方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$J632 - J632-20260320-FX260.lcb
样品瓶号: 2-37
进样体积: 20 μ L 版本号 : 6.115
进样时间: 2026/03/20 21:21:34 实验者 : jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2026/03/23 14:36:17 处理者 : jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 245nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.933	190630	100.000	31357	2441	1.169	--
总计		190630	100.000	31357			

图79 盐酸伐地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6031102批(10mg规格)-均一性1-pH6.8介质-5min-片5
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.8ml/min
柱温:40°C 波长: 245nm
数据文件名: RC\$J632 - 11-13/11-1044-2 - zzp-6031102p-rcqx-pH6.8jz-10mg-jyx1-5min-P6.lcd
方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$J632 - J632-20260320-FX260.lcb
样品瓶号: 2-46
进样体积: 20 μ L 版本号 : 6.115
进样时间: 2026/03/20 21:24:58 实验者 : jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2026/03/23 14:36:19 处理者 : jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 245nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.932	188526	100.000	31237	2455	1.166	--
总计		188526	100.000	31237			

图80 盐酸伐地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6031102批(10mg规格)-均一性1-pH6.8介质-5min-片6
供试品溶液-1




J632

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.8ml/min
柱温:40°C 波长: 245nm
数据文件名: RC\$J632 - 11-13/11-1045-2 - zzp-6031102p-rcqx-pH6.8jz-10mg-jyx1-10min-P1.lcd
方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$J632 - J632-20260320-FX260.lcb
样品瓶号: 2-2
进样体积: 20 μ L 版本号 : 6.115
进样时间: 2026/03/20 21:28:22 实验者 : jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2026/03/23 14:36:22 处理者 : jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 245nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.933	223000	100.000	37009	2464	1.169	--
总计		223000	100.000	37009			

图81 盐酸伐地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6031102批(10mg规格)-均一性1-pH6.8介质-10min-片1
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.8ml/min
柱温:40°C 波长: 245nm
数据文件名: RC\$J632 - 11-13/11-1046-2 - zzp-6031102p-rcqx-pH6.8jz-10mg-jyx1-10min-P2.lcd
方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$J632 - J632-20260320-FX260.lcb
样品瓶号: 2-11
进样体积: 20 μ L 版本号 : 6.115
进样时间: 2026/03/20 21:31:46 实验者 : jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2026/03/23 14:36:25 处理者 : jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 245nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.932	247616	100.000	41202	2474	1.171	--
总计		247616	100.000	41202			

图82 盐酸伐地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6031102批(10mg规格)-均一性1-pH6.8介质-10min-片2
供试品溶液-1




J632

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.8ml/min
柱温:40°C 波长: 245nm
数据文件名: RC\$J632 - 11-13/11-1047-2 - zzp-6031102p-rcqx-pH6.8jz-10mg-jyx1-10min-P3.lcd
方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$J632 - J632-20260320-FX260.lcb
样品瓶号: 2-20
进样体积: 20 μ L 版本号 : 6.115
进样时间: 2026/03/20 21:35:10 实验者 : jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2026/03/23 14:36:28 处理者 : jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 245nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.928	189155	100.000	31237	2440	1.171	--
总计		189155	100.000	31237			

图83 盐酸伐地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6031102批(10mg规格)-均一性1-pH6.8介质-10min-片3
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.8ml/min
柱温:40°C 波长: 245nm
数据文件名: RC\$J632 - 11-13/11-1048-2 - zzp-6031102p-rcqx-pH6.8jz-10mg-jyx1-10min-P4.lcd
方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$J632 - J632-20260320-FX260.lcb
样品瓶号: 2-29
进样体积: 20 μ L 版本号 : 6.115
进样时间: 2026/03/20 21:38:34 实验者 : jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2026/03/23 14:36:30 处理者 : jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 245nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.929	225612	100.000	37492	2455	1.172	--
总计		225612	100.000	37492			

图84 盐酸伐地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6031102批(10mg规格)-均一性1-pH6.8介质-10min-片4
供试品溶液-1




J632

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.8ml/min
柱温:40°C 波长: 245nm
数据文件名: RC\$J632 - 11-13/11-1049-2 - zzp-6031102p-rcqx-pH6.8jz-10mg-jyx1-10min-P5.lcd
方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$J632 - J632-20260320-FX260.lcb
样品瓶号: 2-38
进样体积: 20 μ L 版本号 : 6.115
进样时间: 2026/03/20 21:41:57 实验者 : jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2026/03/23 14:36:33 处理者 : jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 245nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.931	235407	100.000	39219	2479	1.171	--
总计		235407	100.000	39219			

图85 盐酸伐地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6031102批(10mg规格)-均一性1-pH6.8介质-10min-片5
供试品溶液-1




J632

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.8ml/min
柱温:40°C 波长: 245nm
数据文件名: RC\$J632 - 11-13/11-1050-2 - zzp-6031102p-rcqx-pH6.8jz-10mg-jyx1-10min-P6.lcd
方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$J632 - J632-20260320-FX260.lcb
样品瓶号: 2-47
进样体积: 20 μ L 版本号 : 6.115
进样时间: 2026/03/20 21:45:21 实验者 : jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2026/03/23 14:36:36 处理者 : jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 245nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.931	232374	100.000	38709	2471	1.172	--
总计		232374	100.000	38709			

图86 盐酸伐地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6031102批(10mg规格)-均一性1-pH6.8介质-10min-片6
供试品溶液-1




J632

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.8ml/min
柱温:40°C 波长: 245nm
数据文件名: RC\$J632 - 11-13/11-1051-2 - zzp-6031102p-rcqx-pH6.8jz-10mg-jyx1-15min-P1.lcd
方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$J632 - J632-20260320-FX260.lcb
样品瓶号: 2-3
进样体积: 20 μ L 版本号 : 6.115
进样时间: 2026/03/20 21:48:45 实验者 : jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2026/03/23 14:36:38 处理者 : jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 245nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.932	261180	100.000	43343	2464	1.176	--
总计		261180	100.000	43343			

图87 盐酸伐地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6031102批(10mg规格)-均一性1-pH6.8介质-15min-片1
供试品溶液-1




J632

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.8ml/min
柱温:40°C 波长: 245nm
数据文件名: RC\$J632 - 11-13/11-1052-2 - zzp-6031102p-rcqx-pH6.8jz-10mg-jyx1-15min-P2.lcd
方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$J632 - J632-20260320-FX260.lcb
样品瓶号: 2-12
进样体积: 20 μ L 版本号 : 6.115
进样时间: 2026/03/20 21:52:08 实验者 : jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2026/03/23 14:36:41 处理者 : jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 245nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.930	282575	100.000	47006	2475	1.177	--
总计		282575	100.000	47006			

图88 盐酸伐地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6031102批(10mg规格)-均一性1-pH6.8介质-15min-片2
供试品溶液-1




J632

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.8ml/min
柱温:40°C 波长: 245nm
数据文件名: RC\$J632 - 11-13/11-1053-2 - zzp-6031102p-rcqx-pH6.8jz-10mg-jyx1-15min-P3.lcd
方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$J632 - J632-20260320-FX260.lcb
样品瓶号: 2-21
进样体积: 20 μ L 版本号 : 6.115
进样时间: 2026/03/20 21:55:31 实验者 : jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2026/03/23 14:36:43 处理者 : jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 245nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.935	231133	100.000	38637	2518	1.171	--
总计		231133	100.000	38637			

图89 盐酸伐地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6031102批(10mg规格)-均一性1-pH6.8介质-15min-片3
供试品溶液-1




J632

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.8ml/min
柱温:40°C 波长: 245nm
数据文件名: RC\$J632 - 11-13/11-1054-2 - zzp-6031102p-rcqx-pH6.8jz-10mg-jyx1-15min-P4.lcd
方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$J632 - J632-20260320-FX260.lcb
样品瓶号: 2-30
进样体积: 20 μ L 版本号 : 6.115
进样时间: 2026/03/20 21:58:55 实验者 : jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2026/03/23 14:36:46 处理者 : jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 245nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.931	261717	100.000	43823	2511	1.172	--
总计		261717	100.000	43823			

图90 盐酸伐地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6031102批(10mg规格)-均一性1-pH6.8介质-15min-片4
供试品溶液-1




J632

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.8ml/min
柱温:40°C 波长: 245nm
数据文件名: RC\$J632 - 11-13/11-1055-2 - zzp-6031102p-rcqx-pH6.8jz-10mg-jyx1-15min-P5.lcd
方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$J632 - J632-20260320-FX260.lcb
样品瓶号: 2-39
进样体积: 20 μ L 版本号 : 6.115
进样时间: 2026/03/20 22:02:19 实验者 : jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2026/03/23 14:36:49 处理者 : jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 245nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.934	268655	100.000	44616	2499	1.172	--
总计		268655	100.000	44616			

图91 盐酸伐地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6031102批(10mg规格)-均一性1-pH6.8介质-15min-片5
供试品溶液-1




J632

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.8ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长: 245nm
数据文件名: RC\$J632 - 11-13/11-1056-2 - zzp-6031102p-rcqx-pH6.8jz-10mg-jyx1-15min-P6.lcd
方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$J632 - J632-20260320-FX260.lcb
样品瓶号: 2-48
进样体积: 20 μ L 版本号 : 6.115
进样时间: 2026/03/20 22:05:43 实验者 : jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2026/03/23 14:36:51 处理者 : jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 245nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.928	264598	100.000	44031	2472	1.169	--
总计		264598	100.000	44031			

图92 盐酸伐地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6031102批(10mg规格)-均一性1-pH6.8介质-15min-片6
供试品溶液-1




J632

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.8ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长: 245nm
数据文件名: RC\$J632 - 11-13/11-1057-2 - zzp-6031102p-rcqx-pH6.8jz-10mg-jyx1-20min-P1.lcd
方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$J632 - J632-20260320-FX260.lcb
样品瓶号: 2-4
进样体积: 20 μ L 版本号 : 6.115
进样时间: 2026/03/20 22:09:07 实验者 : jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2026/03/23 14:36:54 处理者 : jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 245nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.931	289947	100.000	48338	2486	1.173	--
总计		289947	100.000	48338			

图93 盐酸伐地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6031102批(10mg规格)-均一性1-pH6.8介质-20min-片1
供试品溶液-1




J632

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.8ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长: 245nm
数据文件名: RC\$J632 - 11-13/11-1058-2 - zzp-6031102p-rcqx-pH6.8jz-10mg-jyx1-20min-P2.lcd
方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$J632 - J632-20260320-FX260.lcb
样品瓶号: 2-13
进样体积: 20 μ L 版本号 : 6.115
进样时间: 2026/03/20 22:12:31 实验者 : jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2026/03/23 14:36:56 处理者 : jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 245nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.931	304798	100.000	50771	2479	1.173	--
总计		304798	100.000	50771			

图94 盐酸伐地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6031102批(10mg规格)-均一性1-pH6.8介质-20min-片2
供试品溶液-1




J632

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.8ml/min
柱温:40°C 波长: 245nm
数据文件名: RC\$J632 - 11-13/11-1059-2 - zzp-6031102p-rcqx-pH6.8jz-10mg-jyx1-20min-P3.lcd
方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$J632 - J632-20260320-FX260.lcb
样品瓶号: 2-22
进样体积: 20 μ L 版本号 : 6.115
进样时间: 2026/03/20 22:15:54 实验者 : jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2026/03/23 14:36:59 处理者 : jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 245nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.930	257381	100.000	42954	2480	1.171	--
总计		257381	100.000	42954			

图95 盐酸伐地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6031102批(10mg规格)-均一性1-pH6.8介质-20min-片3
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.8ml/min
柱温:40°C 波长: 245nm
数据文件名: RC\$J632 - 11-13/11-1060-2 - zzp-6031102p-rcqx-pH6.8jz-10mg-jyx1-20min-P4.lcd
方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$J632 - J632-20260320-FX260.lcb
样品瓶号: 2-31
进样体积: 20 μ L 版本号 : 6.115
进样时间: 2026/03/20 22:19:19 实验者 : jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2026/03/23 14:37:02 处理者 : jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 245nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.925	287564	100.000	47699	2455	1.173	--
总计		287564	100.000	47699			

图96 盐酸伐地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6031102批(10mg规格)-均一性1-pH6.8介质-20min-片4
供试品溶液-1




J632

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.8ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长: 245nm
数据文件名: RC\$J632 - 11-13/11-1061-2 - zzp-6031102p-rcqx-pH6.8jz-10mg-jyx1-20min-P5.lcd
方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$J632 - J632-20260320-FX260.lcb
样品瓶号: 2-40
进样体积: 20 μ L 版本号 : 6.115
进样时间: 2026/03/20 22:22:43 实验者 : jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2026/03/23 14:37:04 处理者 : jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 245nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.930	294554	100.000	49058	2475	1.174	--
总计		294554	100.000	49058			

图97 盐酸伐地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6031102批(10mg规格)-均一性1-pH6.8介质-20min-片5
供试品溶液-1




J632

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.8ml/min
柱温:40°C 波长: 245nm
数据文件名: RC\$J632 - 11-13/11-1062-2 - zzp-6031102p-rcqx-pH6.8jz-10mg-jyx1-20min-P6.lcd
方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$J632 - J632-20260320-FX260.lcb
样品瓶号: 2-49
进样体积: 20 μ L 版本号 : 6.115
进样时间: 2026/03/20 22:26:07 实验者 : jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2026/03/23 14:37:07 处理者 : jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 245nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.934	286842	100.000	47665	2493	1.174	--
总计		286842	100.000	47665			

图98 盐酸伐地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6031102批(10mg规格)-均一性1-pH6.8介质-20min-片6
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.8ml/min
柱温:40°C 波长: 245nm
数据文件名: RC\$J632 - 11-13/11-1063-2 - zzp-6031102p-rcqx-pH6.8jz-10mg-jyx1-30min-P1.lcd
方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$J632 - J632-20260320-FX260.lcb
样品瓶号: 2-5
进样体积: 20 μ L 版本号 : 6.115
进样时间: 2026/03/20 22:29:30 实验者 : jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2026/03/23 14:37:10 处理者 : jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 245nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.933	326082	100.000	54078	2480	1.174	--
总计		326082	100.000	54078			

图99 盐酸伐地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6031102批(10mg规格)-均一性1-pH6.8介质-30min-片1
供试品溶液-1




J632

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.8ml/min
柱温:40°C 波长: 245nm
数据文件名: RC\$J632 - 11-13/11-1064-2 - zzp-6031102p-rcqx-pH6.8jz-10mg-jyx1-30min-P2.lcd
方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$J632 - J632-20260320-FX260.lcb
样品瓶号: 2-14
进样体积: 20 μ L 版本号 : 6.115
进样时间: 2026/03/20 22:32:53 实验者 : jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2026/03/23 14:37:12 处理者 : jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 245nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.932	329812	100.000	55062	2498	1.176	--
总计		329812	100.000	55062			

图100 盐酸伐地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6031102批(10mg规格)-均一性1-pH6.8介质-30min-片2
供试品溶液-1




J632

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.8ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长: 245nm
数据文件名: RC\$J632 - 11-13/11-1065-2 - zzp-6031102p-rcqx-pH6.8jz-10mg-jyx1-30min-P3.lcd
方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$J632 - J632-20260320-FX260.lcb
样品瓶号: 2-23
进样体积: 20 μ L 版本号 : 6.115
进样时间: 2026/03/20 22:36:18 实验者 : jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2026/03/23 14:37:15 处理者 : jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 245nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.929	298693	100.000	49814	2472	1.169	--
总计		298693	100.000	49814			

图101 盐酸伐地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6031102批(10mg规格)-均一性1-pH6.8介质-30min-片3
供试品溶液-1




J632

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.8ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长: 245nm
数据文件名: RC\$J632 - 11-13/11-1066-2 - zzp-6031102p-rcqx-pH6.8jz-10mg-jyx1-30min-P4.lcd
方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$J632 - J632-20260320-FX260.lcb
样品瓶号: 2-32
进样体积: 20 μ L 版本号 : 6.115
进样时间: 2026/03/20 22:39:42 实验者 : jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2026/03/23 14:37:18 处理者 : jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 245nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.934	321323	100.000	53163	2479	1.173	--
总计		321323	100.000	53163			

图102 盐酸伐地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6031102批(10mg规格)-均一性1-pH6.8介质-30min-片4
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.8ml/min
柱温:40°C 波长: 245nm
数据文件名: RC\$J632 - 11-13/11-1067-2 - zzp-6031102p-rcqx-pH6.8jz-10mg-jyx1-30min-P5.lcd
方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$J632 - J632-20260320-FX260.lcb
样品瓶号: 2-41
进样体积: 20 μ L 版本号 : 6.115
进样时间: 2026/03/20 22:43:06 实验者 : jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2026/03/23 14:37:20 处理者 : jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 245nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.935	324444	100.000	53863	2480	1.172	--
总计		324444	100.000	53863			




J632

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.8ml/min
柱温:40°C 波长: 245nm
数据文件名: RC\$J632 - 11-13/11-1068-2 - zzp-6031102p-rcqx-pH6.8jz-10mg-jyx1-30min-P6.lcd
方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$J632 - J632-20260320-FX260.lcb
样品瓶号: 2-50
进样体积: 20 μ L 版本号 : 6.115
进样时间: 2026/03/20 22:46:30 实验者 : jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2026/03/23 14:37:23 处理者 : jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 245nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.932	312497	100.000	52048	2479	1.172	--
总计		312497	100.000	52048			

图104 盐酸伐地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6031102批(10mg规格)-均一性1-pH6.8介质-30min-片6
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.8ml/min
柱温:40°C 波长: 245nm
数据文件名: RC\$J632 - 11-13/11-1069-2 - zzp-6031102p-rcqx-pH6.8jz-10mg-jyx1-45min-P1.lcd
方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$J632 - J632-20260320-FX260.lcb
样品瓶号: 2-6
进样体积: 20 μ L 版本号 : 6.115
进样时间: 2026/03/20 22:49:55 实验者 : jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2026/03/23 14:37:26 处理者 : jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>


检测器A Ch1 245nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.935	351608	100.000	58079	2468	1.173	--
总计		351608	100.000	58079			

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.8ml/min
柱温:40°C 波长: 245nm
数据文件名: RC\$J632 - 11-13/11-1070-2 - zzp-6031102p-rcqx-pH6.8jz-10mg-jyx1-45min-P2.lcd
方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$J632 - J632-20260320-FX260.lcb
样品瓶号: 2-15
进样体积: 20 μ L 版本号 : 6.115
进样时间: 2026/03/20 22:53:20 实验者 : jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2026/03/23 14:37:29 处理者 : jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 245nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.934	354733	100.000	58542	2458	1.171	--
总计		354733	100.000	58542			

图106 盐酸伐地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6031102批(10mg规格)-均一性1-pH6.8介质-45min-片2
供试品溶液-1




J632

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.8ml/min
柱温:40°C 波长: 245nm
数据文件名: RC\$J632 - 11-13/11-1071-2 - zzp-6031102p-rcqx-pH6.8jz-10mg-jyx1-45min-P3.lcd
方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$J632 - J632-20260320-FX260.lcb
样品瓶号: 2-24
进样体积: 20 μ L 版本号 : 6.115
进样时间: 2026/03/20 22:56:44 实验者 : jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2026/03/23 14:37:31 处理者 : jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 245nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.930	327857	100.000	54307	2443	1.171	--
总计		327857	100.000	54307			

图107 盐酸伐地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6031102批(10mg规格)-均一性1-pH6.8介质-45min-片3
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.8ml/min
柱温:40°C 波长: 245nm
数据文件名: RC\$J632 - 11-13/11-1072-2 - zzp-6031102p-rcqx-pH6.8jz-10mg-jyx1-45min-P4.lcd
方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$J632 - J632-20260320-FX260.lcb
样品瓶号: 2-33
进样体积: 20 μ L 版本号 : 6.115
进样时间: 2026/03/20 23:00:08 实验者 : jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2026/03/23 14:37:34 处理者 : jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>


检测器A Ch1 245nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.937	348085	100.000	57731	2470	1.169	--
总计		348085	100.000	57731			

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.8ml/min
柱温:40°C 波长: 245nm
数据文件名: RC\$J632 - 11-13/11-1073-2 - zzp-6031102p-rcqx-pH6.8jz-10mg-jyx1-45min-P5.lcd
方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$J632 - J632-20260320-FX260.lcb
样品瓶号: 2-42
进样体积: 20 μ L 版本号 : 6.115
进样时间: 2026/03/20 23:03:32 实验者 : jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2026/03/23 14:37:37 处理者 : jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 245nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.932	349220	100.000	57762	2443	1.167	--
总计		349220	100.000	57762			

图109 盐酸伐地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6031102批(10mg规格)-均一性1-pH6.8介质-45min-片5
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.8ml/min
柱温:40°C 波长: 245nm
数据文件名: RC\$J632 - 11-13/11-1074-2 - zzp-6031102p-rcqx-pH6.8jz-10mg-jyx1-45min-P6.lcd
方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$J632 - J632-20260320-FX260.lcb
样品瓶号: 2-51
进样体积: 20 μ L 版本号 : 6.115
进样时间: 2026/03/20 23:06:56 实验者 : jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2026/03/23 14:37:39 处理者 : jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 245nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.931	337672	100.000	55866	2440	1.165	--
总计		337672	100.000	55866			

图110 盐酸伐地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6031102批(10mg规格)-均一性1-pH6.8介质-45min-片6
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.8ml/min
柱温:40°C 波长: 245nm
数据文件名: RC\$J632 - 11-13/11-1075-2 - zzp-6031102p-rcqx-pH6.8jz-10mg-jyx1-60min-P1.lcd
方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$J632 - J632-20260320-FX260.lcb
样品瓶号: 2-7
进样体积: 20 μ L 版本号 : 6.115
进样时间: 2026/03/20 23:10:20 实验者 : jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2026/03/23 14:37:42 处理者 : jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 245nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.933	361949	100.000	59942	2462	1.169	--
总计		361949	100.000	59942			

图111 盐酸伐地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6031102批(10mg规格)-均一性1-pH6.8介质-60min-片1
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.8ml/min
柱温:40°C 波长: 245nm
数据文件名: RC\$J632 - 11-13/11-1076-2 - zzp-6031102p-rcqx-pH6.8jz-10mg-jyx1-60min-P2.lcd
方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$J632 - J632-20260320-FX260.lcb
样品瓶号: 2-16
进样体积: 20 μ L 版本号 : 6.115
进样时间: 2026/03/20 23:13:45 实验者 : jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2026/03/23 14:37:44 处理者 : jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 245nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.930	361374	100.000	60265	2478	1.167	--
总计		361374	100.000	60265			

图112 盐酸伐地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6031102批(10mg规格)-均一性1-pH6.8介质-60min-片2
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.8ml/min
柱温:40°C 波长: 245nm
数据文件名: RC\$J632 - 11-13/11-1077-2 - zzp-6031102p-rcqx-pH6.8jz-10mg-jyx1-60min-P3.lcd
方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$J632 - J632-20260320-FX260.lcb
样品瓶号: 2-25
进样体积: 20 μ L 版本号 : 6.115
进样时间: 2026/03/20 23:17:09 实验者 : jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2026/03/23 14:37:47 处理者 : jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 245nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.936	344100	100.000	57405	2508	1.171	--
总计		344100	100.000	57405			

图113 盐酸伐地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6031102批(10mg规格)-均一性1-pH6.8介质-60min-片3
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.8ml/min
柱温:40°C 波长: 245nm
数据文件名: RC\$J632 - 11-13/11-1078-2 - zzp-6031102p-rcqx-pH6.8jz-10mg-jyx1-60min-P4.lcd
方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$J632 - J632-20260320-FX260.lcb
样品瓶号: 2-34
进样体积: 20 μ L 版本号 : 6.115
进样时间: 2026/03/20 23:20:33 实验者 : jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2026/03/23 14:37:50 处理者 : jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 245nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.936	358033	100.000	59684	2499	1.168	--
总计		358033	100.000	59684			

图114 盐酸伐地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6031102批(10mg规格)-均一性1-pH6.8介质-60min-片4
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.8ml/min
柱温:40°C 波长: 245nm
数据文件名: RC\$J632 - 11-13/11-1079-2 - zzp-6031102p-rcqx-pH6.8jz-10mg-jyx1-60min-P5.lcd
方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$J632 - J632-20260320-FX260.lcb
样品瓶号: 2-43
进样体积: 20 μ L 版本号 : 6.115
进样时间: 2026/03/20 23:23:58 实验者 : jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2026/03/23 14:37:52 处理者 : jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 245nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.933	363353	100.000	60089	2469	1.170	--
总计		363353	100.000	60089			

图115 盐酸伐地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6031102批(10mg规格)-均一性1-pH6.8介质-60min-片5
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.8ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长: 245nm
数据文件名: RC\$J632 - 11-13/11-1080-2 - zzp-6031102p-rcqx-pH6.8jz-10mg-jyx1-60min-P6.lcd
方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$J632 - J632-20260320-FX260.lcb
样品瓶号: 2-52
进样体积: 20 μ L 版本号 : 6.115
进样时间: 2026/03/20 23:27:22 实验者 : jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2026/03/23 14:37:55 处理者 : jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 245nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.935	350990	100.000	58118	2468	1.167	--
总计		350990	100.000	58118			

图116 盐酸伐地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6031102批(10mg规格)-均一性1-pH6.8介质-60min-片6
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.8ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长: 245nm
数据文件名: RC\$J632 - 11-13/11-1081-2 - zzp-6031102p-rcqx-pH6.8jz-10mg-jyx1-90min-P1.lcd
方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$J632 - J632-20260320-FX260.lcb
样品瓶号: 2-8
进样体积: 20 μ L 版本号 : 6.115
进样时间: 2026/03/20 23:30:47 实验者 : jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2026/03/23 14:37:58 处理者 : jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 245nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.934	378575	100.000	62656	2476	1.170	--
总计		378575	100.000	62656			

图117 盐酸伐地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6031102批(10mg规格)-均一性1-pH6.8介质-90min-片1
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.8ml/min
柱温:40°C 波长: 245nm
数据文件名: RC\$J632 - 11-13/11-1082-2 - zzp-6031102p-rcqx-pH6.8jz-10mg-jyx1-90min-P2.lcd
方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$J632 - J632-20260320-FX260.lcb
样品瓶号: 2-17
进样体积: 20 μ L 版本号 : 6.115
进样时间: 2026/03/20 23:34:11 实验者 : jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2026/03/23 14:38:00 处理者 : jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 245nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.931	377462	100.000	62886	2470	1.168	--
总计		377462	100.000	62886			

图118 盐酸伐地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6031102批(10mg规格)-均一性1-pH6.8介质-90min-片2
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.8ml/min
柱温:40°C 波长: 245nm
数据文件名: RC\$J632 - 11-13/11-1083-2 - zzp-6031102p-rcqx-pH6.8jz-10mg-jyx1-90min-P3.lcd
方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$J632 - J632-20260320-FX260.lcb
样品瓶号: 2-26
进样体积: 20 μ L 版本号 : 6.115
进样时间: 2026/03/20 23:37:36 实验者 : jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2026/03/23 14:38:03 处理者 : jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 245nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.937	357156	100.000	59474	2488	1.167	--
总计		357156	100.000	59474			

图119 盐酸伐地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6031102批(10mg规格)-均一性1-pH6.8介质-90min-片3
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.8ml/min
柱温:40°C 波长: 245nm
数据文件名: RC\$J632 - 11-13/11-1084-2 - zzp-6031102p-rcqx-pH6.8jz-10mg-jyx1-90min-P4.lcd
方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$J632 - J632-20260320-FX260.lcb
样品瓶号: 2-35
进样体积: 20 μ L 版本号 : 6.115
进样时间: 2026/03/20 23:41:01 实验者 : jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2026/03/23 14:38:05 处理者 : jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 245nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.932	369231	100.000	61336	2474	1.167	--
总计		369231	100.000	61336			

图120 盐酸伐地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6031102批(10mg规格)-均一性1-pH6.8介质-90min-片4
供试品溶液-1




J632

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.8ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长: 245nm
数据文件名: RC\$J632 - 11-13/11-1085-2 - zzp-6031102p-rcqx-pH6.8jz-10mg-jyx1-90min-P5.lcd
方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$J632 - J632-20260320-FX260.lcb
样品瓶号: 2-44
进样体积: 20 μ L 版本号 : 6.115
进样时间: 2026/03/20 23:44:25 实验者 : jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2026/03/23 14:38:08 处理者 : jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 245nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.936	373557	100.000	61939	2475	1.168	--
总计		373557	100.000	61939			

图121 盐酸伐地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6031102批(10mg规格)-均一性1-pH6.8介质-90min-片5
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.8ml/min
柱温:40°C 波长: 245nm
数据文件名: RC\$J632 - 11-13/11-1086-2 - zzp-6031102p-rcqx-pH6.8jz-10mg-jyx1-90min-P6.lcd
方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$J632 - J632-20260320-FX260.lcb
样品瓶号: 2-53
进样体积: 20 μ L 版本号 : 6.115
进样时间: 2026/03/20 23:47:50 实验者 : jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2026/03/23 14:38:11 处理者 : jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 245nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.936	363769	100.000	60361	2473	1.168	--
总计		363769	100.000	60361			

图122 盐酸伐地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6031102批(10mg规格)-均一性1-pH6.8介质-90min-片6
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.8ml/min
柱温:40°C 波长: 245nm
数据文件名: RC\$J632 - 11-13/11-1087-2 - zzp-6031102p-rcqx-pH6.8jz-10mg-jyx1-120min-P1.lcd
方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$J632 - J632-20260320-FX260.lcb
样品瓶号: 4-3
进样体积: 20 μ L 版本号 : 6.115
进样时间: 2026/03/20 23:51:13 实验者 : jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2026/03/23 14:38:13 处理者 : jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 245nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.936	379097	100.000	62703	2463	1.168	--
总计		379097	100.000	62703			

图123 盐酸伐地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6031102批(10mg规格)-均一性1-pH6.8介质-120min-片1
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.8ml/min
柱温:40°C 波长: 245nm
数据文件名: RC\$J632 - 11-13/11-1088-2 - zzp-6031102p-rcqx-pH6.8jz-10mg-jyx1-120min-P2.lcd
方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$J632 - J632-20260320-FX260.lcb
样品瓶号: 4-12
进样体积: 20 μ L 版本号 : 6.115
进样时间: 2026/03/20 23:54:36 实验者 : jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2026/03/23 14:38:16 处理者 : jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 245nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.931	383970	100.000	63725	2466	1.170	--
总计		383970	100.000	63725			

图124 盐酸伐地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6031102批(10mg规格)-均一性1-pH6.8介质-120min-片2
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.8ml/min
柱温:40°C 波长: 245nm
数据文件名: RC\$J632 - 11-13/11-1089-2 - zzp-6031102p-rcqx-pH6.8jz-10mg-jyx1-120min-P3.lcd
方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$J632 - J632-20260320-FX260.lcb
样品瓶号: 4-21
进样体积: 20 μ L 版本号 : 6.115
进样时间: 2026/03/20 23:57:59 实验者 : jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2026/03/23 14:38:19 处理者 : jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 245nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.931	361565	100.000	60215	2472	1.167	--
总计		361565	100.000	60215			

图125 盐酸伐地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6031102批(10mg规格)-均一性1-pH6.8介质-120min-片3
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.8ml/min
柱温:40°C 波长: 245nm
数据文件名: RC\$J632 - 11-13/11-1090-2 - zzp-6031102p-rcqx-pH6.8jz-10mg-jyx1-120min-P4.lcd
方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$J632 - J632-20260320-FX260.lcb
样品瓶号: 4-30
进样体积: 20 μ L 版本号 : 6.115
进样时间: 2026/03/21 00:01:23 实验者 : jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2026/03/23 14:38:21 处理者 : jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 245nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.931	378011	100.000	62621	2454	1.167	--
总计		378011	100.000	62621			

图126 盐酸伐地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6031102批(10mg规格)-均一性1-pH6.8介质-120min-片4
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.8ml/min
柱温:40°C 波长: 245nm
数据文件名: RC\$J632 - 11-13/11-1091-2 - zzp-6031102p-rcqx-pH6.8jz-10mg-jyx1-120min-P5.lcd
方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$J632 - J632-20260320-FX260.lcb
样品瓶号: 4-39
进样体积: 20 μ L 版本号 : 6.115
进样时间: 2026/03/21 00:04:46 实验者 : jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2026/03/23 14:38:24 处理者 : jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 245nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.930	379750	100.000	63018	2455	1.172	--
总计		379750	100.000	63018			

图127 盐酸伐地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6031102批(10mg规格)-均一性1-pH6.8介质-120min-片5
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.8ml/min
柱温:40°C 波长: 245nm
数据文件名: RC\$J632 - 11-13/11-1092-2 - zzp-6031102p-rcqx-pH6.8jz-10mg-jyx1-120min-P6.lcd
方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$J632 - J632-20260320-FX260.lcb
样品瓶号: 4-48
进样体积: 20 μ L 版本号 : 6.115
进样时间: 2026/03/21 00:08:11 实验者 : jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2026/03/23 14:38:26 处理者 : jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 245nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.931	368162	100.000	61054	2457	1.167	--
总计		368162	100.000	61054			

图128 盐酸伐地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6031102批(10mg规格)-均一性1-pH6.8介质-120min-片6
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.8ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长: 245nm
数据文件名: RC\$J632 - 11-13/11-1093-2 - zzp-6031102p-rcqx-pH6.8jz-10mg-jyx1-jx-P1.lcd
方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$J632 - J632-20260320-FX260.lcb
样品瓶号: 4-4
进样体积: 20 μ L 版本号 : 6.115
进样时间: 2026/03/21 00:11:35 实验者 : jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2026/03/23 14:38:29 处理者 : jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 245nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.932	390272	100.000	64726	2457	1.169	--
总计		390272	100.000	64726			

图129 盐酸伐地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6031102批(10mg规格)-均一性1-pH6.8介质-极限转速-片1
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.8ml/min
柱温:40°C 波长: 245nm
数据文件名: RC\$J632 - 11-13/11-1094-2 - zzp-6031102p-rcqx-pH6.8jz-10mg-jyx1-jx-P2.lcd
方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$J632 - J632-20260320-FX260.lcb
样品瓶号: 4-13
进样体积: 20 μ L 版本号 : 6.115
进样时间: 2026/03/21 00:14:58 实验者 : jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2026/03/23 14:38:32 处理者 : jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 245nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.929	393759	100.000	65382	2454	1.166	--
总计		393759	100.000	65382			

图130 盐酸伐地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6031102批(10mg规格)-均一性1-pH6.8介质-极限转速-片2
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.8ml/min
柱温:40°C 波长: 245nm
数据文件名: RC\$J632 - 11-13/11-1095-2 - zzp-6031102p-rcqx-pH6.8jz-10mg-jyx1-jx-P3.lcd
方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$J632 - J632-20260320-FX260.lcb
样品瓶号: 4-22
进样体积: 20 μ L 版本号 : 6.115
进样时间: 2026/03/21 00:18:22 实验者 : jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2026/03/23 14:38:34 处理者 : jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 245nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.931	377582	100.000	62798	2468	1.167	--
总计		377582	100.000	62798			

图131 盐酸伐地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6031102批(10mg规格)-均一性1-pH6.8介质-极限转速-片3
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.8ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长: 245nm
数据文件名: RC\$J632 - 11-13/11-1096-2 - zzp-6031102p-rcqx-pH6.8jz-10mg-jyx1-jx-P4.lcd
方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$J632 - J632-20260320-FX260.lcb
样品瓶号: 4-31
进样体积: 20 μ L 版本号 : 6.115
进样时间: 2026/03/21 00:21:45 实验者 : jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2026/03/23 14:38:37 处理者 : jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 245nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.937	388545	100.000	64493	2478	1.170	--
总计		388545	100.000	64493			

图132 盐酸伐地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6031102批(10mg规格)-均一性1-pH6.8介质-极限转速-片4
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.8ml/min
柱温:40°C 波长: 245nm
数据文件名: RC\$J632 - 11-13/11-1097-2 - zzp-6031102p-rcqx-pH6.8jz-10mg-jyx1-jx-P5.lcd
方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$J632 - J632-20260320-FX260.lcb
样品瓶号: 4-40
进样体积: 20 μ L 版本号 : 6.115
进样时间: 2026/03/21 00:25:09 实验者 : jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2026/03/23 14:38:40 处理者 : jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 245nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.932	392954	100.000	65222	2462	1.169	--
总计		392954	100.000	65222			

图133 盐酸伐地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6031102批(10mg规格)-均一性1-pH6.8介质-极限转速-片5
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.8ml/min
柱温:40°C 波长: 245nm
数据文件名: RC\$J632 - 11-13/11-1098-2 - zzp-6031102p-rcqx-pH6.8jz-10mg-jyx1-jx-P6.lcd
方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$J632 - J632-20260320-FX260.lcb
样品瓶号: 4-49
进样体积: 20 μ L 版本号 : 6.115
进样时间: 2026/03/21 00:28:32 实验者 : jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2026/03/23 14:38:43 处理者 : jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 245nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.927	378376	100.000	62744	2465	1.170	--
总计		378376	100.000	62744			

图134 盐酸伐地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6031102批(10mg规格)-均一性1-pH6.8介质-极限转速-片6
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.8ml/min
柱温:40°C 波长: 245nm
数据文件名: RC\$J632 - 11-13/11-1099-2 - zzp-6031102p-rcqx-pH6.8jz-10mg-jyx1-dz2-1.lcd
方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$J632 - J632-20260320-FX260.lcb
样品瓶号: 2-27
进样体积: 20 μ L 版本号 : 6.115
进样时间: 2026/03/21 00:31:56 实验者 : jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2026/03/23 14:38:45 处理者 : jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 245nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.899	385696	100.000	61681	2220	1.194	--
总计		385696	100.000	61681			

图135 盐酸伐地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6031102批(10mg规格)-均一性1-pH6.8介质
对照品溶液-2-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.8ml/min
柱温:40°C 波长: 245nm
数据文件名: RC\$J632 - 11-13/11-1100-2 - zzp-6031102p-rcqx-pH6.8jz-10mg-jyx1-dz2-2.lcd
方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$J632 - J632-20260320-FX260.lcb
样品瓶号: 2-27
进样体积: 20 μ L 版本号 : 6.115
进样时间: 2026/03/21 00:35:21 实验者 : jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2026/03/23 14:38:48 处理者 : jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 245nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.898	384949	100.000	61867	2240	1.192	--
总计		384949	100.000	61867			

图136 盐酸伐地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6031102批(10mg规格)-均一性1-pH6.8介质
对照品溶液-2-2




J632

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.8ml/min
柱 温:40°C 波长: 245nm
数据文件名: RC\$J632 - 11-13/11-1101-2 - zzp-6031103p-rcqx-pH6.8jz-10mg-jyx1-rj.lcd
方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$J632 - J632-20260320-FX260.lcb
样品瓶号: 3-9
进样体积: 20 μL 版本号 : 6.115
进样时间: 2026/03/21 00:38:44 实验者 : jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2026/03/23 14:38:51 处理者 : jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>


检测器A Ch1 245nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图137 盐酸伐地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6031103批(10mg规格)-均一性1-pH6.8介质
溶剂

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.8ml/min
柱温:40°C 波长: 245nm
数据文件名: RC\$J632 - 11-13/11-1102-2 - zzp-6031103p-rcqx-pH6.8jz-10mg-jyx1-dz1-1.lcd
方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$J632 - J632-20260320-FX260.lcb
样品瓶号: 3-18
进样体积: 20 μ L 版本号 : 6.115
进样时间: 2026/03/21 00:42:07 实验者 : jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2026/03/23 14:38:53 处理者 : jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 245nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.894	384689	100.000	61729	2226	1.189	--
总计		384689	100.000	61729			

图138 盐酸伐地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6031103批(10mg规格)-均一性1-pH6.8介质
对照品溶液-1-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.8ml/min
柱温:40°C 波长: 245nm
数据文件名: RC\$J632 - 11-13/11-1103-2 - zzp-6031103p-rcqx-pH6.8jz-10mg-jyx1-dz1-2.lcd
方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$J632 - J632-20260320-FX260.lcb
样品瓶号: 3-18
进样体积: 20 μ L 版本号 : 6.115
进样时间: 2026/03/21 00:45:30 实验者 : jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2026/03/23 14:38:56 处理者 : jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 245nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.896	384979	100.000	61742	2224	1.193	--
总计		384979	100.000	61742			

图139 盐酸伐地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6031103批(10mg规格)-均一性1-pH6.8介质
对照品溶液-1-2

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.8ml/min
柱温:40°C 波长: 245nm
数据文件名: RC\$J632 - 11-13/11-1104-2 - zzp-6031103p-rcqx-pH6.8jz-10mg-jyx1-dz1-3.lcd
方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$J632 - J632-20260320-FX260.lcb
样品瓶号: 3-18
进样体积: 20 μ L 版本号 : 6.115
进样时间: 2026/03/21 00:48:53 实验者 : jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2026/03/23 14:38:58 处理者 : jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 245nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.889	382082	100.000	61528	2219	1.193	--
总计		382082	100.000	61528			

图140 盐酸伐地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6031103批(10mg规格)-均一性1-pH6.8介质
对照品溶液-1-3

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.8ml/min
柱温:40°C 波长: 245nm
数据文件名: RC\$J632 - 11-13/11-1105-2 - zzp-6031103p-rcqx-pH6.8jz-10mg-jyx1-dz1-4.lcd
方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$J632 - J632-20260320-FX260.lcb
样品瓶号: 3-18
进样体积: 20 μ L 版本号 : 6.115
进样时间: 2026/03/21 00:52:17 实验者 : jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2026/03/23 14:39:01 处理者 : jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 245nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.898	384451	100.000	61664	2228	1.191	--
总计		384451	100.000	61664			

图141 盐酸伐地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6031103批(10mg规格)-均一性1-pH6.8介质
对照品溶液-1-4

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.8ml/min
柱温:40°C 波长: 245nm
数据文件名: RC\$J632 - 11-13/11-1106-2 - zzp-6031103p-rcqx-pH6.8jz-10mg-jyx1-dz1-5.lcd
方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$J632 - J632-20260320-FX260.lcb
样品瓶号: 3-18
进样体积: 20 μ L 版本号 : 6.115
进样时间: 2026/03/21 00:55:40 实验者 : jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2026/03/23 14:39:04 处理者 : jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 245nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.894	385547	100.000	61455	2204	1.194	--
总计		385547	100.000	61455			

图142 盐酸伐地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6031103批(10mg规格)-均一性1-pH6.8介质
对照品溶液-1-5

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.8ml/min
柱温:40°C 波长: 245nm
数据文件名: RC\$J632 - 11-13/11-1107-2 - zzp-6031103p-rcqx-pH6.8jz-10mg-jyx1-5min-P1.lcd
方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$J632 - J632-20260320-FX260.lcb
样品瓶号: 3-1
进样体积: 20 μ L 版本号 : 6.115
进样时间: 2026/03/21 00:59:03 实验者 : jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2026/03/23 14:39:06 处理者 : jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 245nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.932	154451	100.000	25613	2464	1.161	--
总计		154451	100.000	25613			

图143 盐酸伐地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6031103批(10mg规格)-均一性1-pH6.8介质-5min-片1
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.8ml/min
柱温:40°C 波长: 245nm
数据文件名: RC\$J632 - 11-13/11-1108-2 - zzp-6031103p-rcqx-pH6.8jz-10mg-jyx1-5min-P2.lcd
方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$J632 - J632-20260320-FX260.lcb
样品瓶号: 3-10
进样体积: 20 μ L 版本号 : 6.115
进样时间: 2026/03/21 01:02:25 实验者 : jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2026/03/23 14:39:09 处理者 : jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 245nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.931	168276	100.000	28065	2476	1.161	--
总计		168276	100.000	28065			

图144 盐酸伐地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6031103批(10mg规格)-均一性1-pH6.8介质-5min-片2
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.8ml/min
柱温:40°C 波长: 245nm
数据文件名: RC\$J632 - 11-13/11-1109-2 - zzp-6031103p-rcqx-pH6.8jz-10mg-jyx1-5min-P3.lcd
方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$J632 - J632-20260320-FX260.lcb
样品瓶号: 3-19
进样体积: 20 μ L 版本号 : 6.115
进样时间: 2026/03/21 01:05:47 实验者 : jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2026/03/23 14:39:12 处理者 : jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 245nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.931	203043	100.000	33808	2474	1.162	--
总计		203043	100.000	33808			

图145 盐酸伐地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6031103批(10mg规格)-均一性1-pH6.8介质-5min-片3
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.8ml/min
柱温:40°C 波长: 245nm
数据文件名: RC\$J632 - 11-13/11-1110-2 - zzp-6031103p-rcqx-pH6.8jz-10mg-jyx1-5min-P4.lcd
方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$J632 - J632-20260320-FX260.lcb
样品瓶号: 3-28
进样体积: 20 μ L 版本号 : 6.115
进样时间: 2026/03/21 01:09:10 实验者 : jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2026/03/23 14:39:15 处理者 : jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 245nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.930	200285	100.000	33459	2481	1.160	--
总计		200285	100.000	33459			

图146 盐酸伐地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6031103批(10mg规格)-均一性1-pH6.8介质-5min-片4
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.8ml/min
柱温:40°C 波长: 245nm
数据文件名: RC\$J632 - 11-13/11-1111-2 - zzp-6031103p-rcqx-pH6.8jz-10mg-jyx1-5min-P5.lcd
方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$J632 - J632-20260320-FX260.lcb
样品瓶号: 3-37
进样体积: 20 μ L 版本号 : 6.115
进样时间: 2026/03/21 01:12:32 实验者 : jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2026/03/23 14:39:18 处理者 : jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 245nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.930	165967	100.000	27790	2485	1.157	--
总计		165967	100.000	27790			

图147 盐酸伐地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6031103批(10mg规格)-均一性1-pH6.8介质-5min-片5
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.8ml/min
柱温:40°C 波长: 245nm
数据文件名: RC\$J632 - 11-13/11-1112-2 - zzp-6031103p-rcqx-pH6.8jz-10mg-jyx1-5min-P6.lcd
方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$J632 - J632-20260320-FX260.lcb
样品瓶号: 3-46
进样体积: 20 μ L 版本号 : 6.115
进样时间: 2026/03/21 01:15:54 实验者 : jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2026/03/23 14:39:20 处理者 : jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 245nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.930	171816	100.000	28648	2471	1.157	--
总计		171816	100.000	28648			

图148 盐酸伐地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6031103批(10mg规格)-均一性1-pH6.8介质-5min-片6
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.8ml/min
柱温:40°C 波长: 245nm
数据文件名: RC\$J632 - 11-13/11-1113-2 - zzp-6031103p-rcqx-pH6.8jz-10mg-jyx1-10min-P1.lcd
方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$J632 - J632-20260320-FX260.lcb
样品瓶号: 3-2
进样体积: 20 μ L 版本号 : 6.115
进样时间: 2026/03/21 01:19:17 实验者 : jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2026/03/23 14:39:23 处理者 : jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 245nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.932	201503	100.000	33612	2477	1.160	--
总计		201503	100.000	33612			

图149 盐酸伐地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6031103批(10mg规格)-均一性1-pH6.8介质-10min-片1
供试品溶液-1




J632

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.8ml/min
柱温:40°C 波长: 245nm
数据文件名: RC\$J632 - 11-13/11-1114-2 - zzp-6031103p-rcqx-pH6.8jz-10mg-jyx1-10min-P2.lcd
方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$J632 - J632-20260320-FX260.lcb
样品瓶号: 3-11
进样体积: 20 μ L 版本号 : 6.115
进样时间: 2026/03/21 01:22:39 实验者 : jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2026/03/23 14:39:25 处理者 : jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 245nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.930	221154	100.000	36863	2476	1.165	--
总计		221154	100.000	36863			

图150 盐酸伐地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6031103批(10mg规格)-均一性1-pH6.8介质-10min-片2
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.8ml/min
柱温:40°C 波长: 245nm
数据文件名: RC\$J632 - 11-13/11-1115-2 - zzp-6031103p-rcqx-pH6.8jz-10mg-jyx1-10min-P3.lcd
方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$J632 - J632-20260320-FX260.lcb
样品瓶号: 3-20
进样体积: 20 μ L 版本号 : 6.115
进样时间: 2026/03/21 01:26:01 实验者 : jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2026/03/23 14:39:28 处理者 : jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 245nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.932	247548	100.000	41225	2481	1.163	--
总计		247548	100.000	41225			

图151 盐酸伐地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6031103批(10mg规格)-均一性1-pH6.8介质-10min-片3
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.8ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长: 245nm
数据文件名: RC\$J632 - 11-13/11-1116-2 - zzp-6031103p-rcqx-pH6.8jz-10mg-jyx1-10min-P4.lcd
方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$J632 - J632-20260320-FX260.lcb
样品瓶号: 3-29
进样体积: 20 μ L 版本号 : 6.115
进样时间: 2026/03/21 01:29:23 实验者 : jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2026/03/23 14:39:31 处理者 : jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 245nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.932	242920	100.000	40627	2496	1.160	--
总计		242920	100.000	40627			

图152 盐酸伐地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6031103批(10mg规格)-均一性1-pH6.8介质-10min-片4
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.8ml/min
柱温:40°C 波长: 245nm
数据文件名: RC\$J632 - 11-13/11-1117-2 - zzp-6031103p-rcqx-pH6.8jz-10mg-jyx1-10min-P5.lcd
方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$J632 - J632-20260320-FX260.lcb
样品瓶号: 3-38
进样体积: 20 μ L 版本号 : 6.115
进样时间: 2026/03/21 01:32:46 实验者 : jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2026/03/23 14:39:34 处理者 : jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 245nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.938	211402	100.000	35373	2505	1.161	--
总计		211402	100.000	35373			

图153 盐酸伐地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6031103批(10mg规格)-均一性1-pH6.8介质-10min-片5
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.8ml/min
柱温:40°C 波长: 245nm
数据文件名: RC\$J632 - 11-13/11-1118-2 - zzp-6031103p-rcqx-pH6.8jz-10mg-jyx1-10min-P6.lcd
方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$J632 - J632-20260320-FX260.lcb
样品瓶号: 3-47
进样体积: 20 μ L 版本号 : 6.115
进样时间: 2026/03/21 01:36:08 实验者 : jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2026/03/23 14:39:36 处理者 : jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 245nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.933	220736	100.000	36819	2492	1.160	--
总计		220736	100.000	36819			

图154 盐酸伐地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6031103批(10mg规格)-均一性1-pH6.8介质-10min-片6
供试品溶液-1




J632

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.8ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长: 245nm
数据文件名: RC\$J632 - 11-13/11-1119-2 - zzp-6031103p-rcqx-pH6.8jz-10mg-jyx1-15min-P1.lcd
方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$J632 - J632-20260320-FX260.lcb
样品瓶号: 3-3
进样体积: 20 μ L 版本号 : 6.115
进样时间: 2026/03/21 01:39:30 实验者 : jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2026/03/23 14:39:39 处理者 : jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 245nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.934	241500	100.000	40284	2515	1.162	--
总计		241500	100.000	40284			

图155 盐酸伐地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6031103批(10mg规格)-均一性1-pH6.8介质-15min-片1
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.8ml/min
柱温:40°C 波长: 245nm
数据文件名: RC\$J632 - 11-13/11-1120-2 - zzp-6031103p-rcqx-pH6.8jz-10mg-jyx1-15min-P2.lcd
方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$J632 - J632-20260320-FX260.lcb
样品瓶号: 3-12
进样体积: 20 μ L 版本号 : 6.115
进样时间: 2026/03/21 01:42:53 实验者 : jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2026/03/23 14:39:42 处理者 : jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 245nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.929	256716	100.000	42851	2478	1.160	--
总计		256716	100.000	42851			

图156 盐酸伐地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6031103批(10mg规格)-均一性1-pH6.8介质-15min-片2
供试品溶液-1




J632

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.8ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长: 245nm
数据文件名: RC\$J632 - 11-13/11-1121-2 - zzp-6031103p-rcqx-pH6.8jz-10mg-jyx1-15min-P3.lcd
方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$J632 - J632-20260320-FX260.lcb
样品瓶号: 3-21
进样体积: 20 μ L 版本号 : 6.115
进样时间: 2026/03/21 01:46:15 实验者 : jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2026/03/23 14:39:44 处理者 : jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 245nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.932	278367	100.000	46524	2495	1.160	--
总计		278367	100.000	46524			

图157 盐酸伐地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6031103批(10mg规格)-均一性1-pH6.8介质-15min-片3
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.8ml/min
柱温:40°C 波长: 245nm
数据文件名: RC\$J632 - 11-13/11-1122-2 - zzp-6031103p-rcqx-pH6.8jz-10mg-jyx1-15min-P4.lcd
方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$J632 - J632-20260320-FX260.lcb
样品瓶号: 3-30
进样体积: 20 μ L 版本号 : 6.115
进样时间: 2026/03/21 01:49:37 实验者 : jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2026/03/23 14:39:47 处理者 : jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 245nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.926	277456	100.000	46382	2501	1.164	--
总计		277456	100.000	46382			

图158 盐酸伐地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6031103批(10mg规格)-均一性1-pH6.8介质-15min-片4
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.8ml/min
柱温:40°C 波长: 245nm
数据文件名: RC\$J632 - 11-13/11-1123-2 - zzp-6031103p-rcqx-pH6.8jz-10mg-jyx1-15min-P5.lcd
方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$J632 - J632-20260320-FX260.lcb
样品瓶号: 3-39
进样体积: 20 μ L 版本号 : 6.115
进样时间: 2026/03/21 01:52:59 实验者 : jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2026/03/23 14:39:50 处理者 : jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 245nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.930	245549	100.000	41174	2499	1.161	--
总计		245549	100.000	41174			

图159 盐酸伐地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6031103批(10mg规格)-均一性1-pH6.8介质-15min-片5
供试品溶液-1




J632

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.8ml/min
柱温:40°C 波长: 245nm
数据文件名: RC\$J632 - 11-13/11-1124-2 - zzp-6031103p-rcqx-pH6.8jz-10mg-jyx1-15min-P6.lcd
方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$J632 - J632-20260320-FX260.lcb
样品瓶号: 3-48
进样体积: 20 μ L 版本号 : 6.115
进样时间: 2026/03/21 01:56:22 实验者 : jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2026/03/23 14:39:52 处理者 : jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 245nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.931	253053	100.000	42413	2500	1.159	--
总计		253053	100.000	42413			

图160 盐酸伐地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6031103批(10mg规格)-均一性1-pH6.8介质-15min-片6
供试品溶液-1




J632

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.8ml/min
柱温:40°C 波长: 245nm
数据文件名: RC\$J632 - 11-13/11-1125-2 - zzp-6031103p-rcqx-pH6.8jz-10mg-jyx1-20min-P1.lcd
方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$J632 - J632-20260320-FX260.lcb
样品瓶号: 3-4
进样体积: 20 μ L 版本号 : 6.115
进样时间: 2026/03/21 01:59:44 实验者 : jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2026/03/23 14:39:55 处理者 : jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 245nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.938	270079	100.000	44966	2488	1.159	--
总计		270079	100.000	44966			

图161 盐酸伐地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6031103批(10mg规格)-均一性1-pH6.8介质-20min-片1
供试品溶液-1




J632

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.8ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长: 245nm
数据文件名: RC\$J632 - 11-13/11-1126-2 - zzp-6031103p-rcqx-pH6.8jz-10mg-jyx1-20min-P2.lcd
方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$J632 - J632-20260320-FX260.lcb
样品瓶号: 3-13
进样体积: 20 μ L 版本号 : 6.115
进样时间: 2026/03/21 02:03:06 实验者 : jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2026/03/23 14:39:57 处理者 : jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 245nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.933	282597	100.000	46978	2480	1.160	--
总计		282597	100.000	46978			

图162 盐酸伐地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6031103批(10mg规格)-均一性1-pH6.8介质-20min-片2
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.8ml/min
柱温:40°C 波长: 245nm
数据文件名: RC\$J632 - 11-13/11-1127-2 - zzp-6031103p-rcqx-pH6.8jz-10mg-jyx1-20min-P3.lcd
方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$J632 - J632-20260320-FX260.lcb
样品瓶号: 3-22
进样体积: 20 μ L 版本号 : 6.115
进样时间: 2026/03/21 02:06:28 实验者 : jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2026/03/23 14:40:00 处理者 : jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 245nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.932	295896	100.000	49225	2478	1.161	--
总计		295896	100.000	49225			

图163 盐酸伐地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6031103批(10mg规格)-均一性1-pH6.8介质-20min-片3
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.8ml/min
柱温:40°C 波长: 245nm
数据文件名: RC\$J632 - 11-13/11-1128-2 - zzp-6031103p-rcqx-pH6.8jz-10mg-jyx1-20min-P4.lcd
方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$J632 - J632-20260320-FX260.lcb
样品瓶号: 3-31
进样体积: 20 μ L 版本号 : 6.115
进样时间: 2026/03/21 02:09:50 实验者 : jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2026/03/23 14:40:03 处理者 : jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 245nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.928	301000	100.000	49990	2454	1.156	--
总计		301000	100.000	49990			

图164 盐酸伐地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6031103批(10mg规格)-均一性1-pH6.8介质-20min-片4
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.8ml/min
柱温:40°C 波长: 245nm
数据文件名: RC\$J632 - 11-13/11-1129-2 - zzp-6031103p-rcqx-pH6.8jz-10mg-jyx1-20min-P5.lcd
方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$J632 - J632-20260320-FX260.lcb
样品瓶号: 3-40
进样体积: 20 μ L 版本号 : 6.115
进样时间: 2026/03/21 02:13:12 实验者 : jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2026/03/23 14:40:05 处理者 : jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 245nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.933	272321	100.000	45235	2471	1.160	--
总计		272321	100.000	45235			

图165 盐酸伐地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6031103批(10mg规格)-均一性1-pH6.8介质-20min-片5
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.8ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长: 245nm
数据文件名: RC\$J632 - 11-13/11-1130-2 - zzp-6031103p-rcqx-pH6.8jz-10mg-jyx1-20min-P6.lcd
方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$J632 - J632-20260320-FX260.lcb
样品瓶号: 3-49
进样体积: 20 μ L 版本号 : 6.115
进样时间: 2026/03/21 02:16:35 实验者 : jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2026/03/23 14:40:08 处理者 : jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 245nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.935	280985	100.000	46763	2498	1.162	--
总计		280985	100.000	46763			

图166 盐酸伐地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6031103批(10mg规格)-均一性1-pH6.8介质-20min-片6
供试品溶液-1




J632

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.8ml/min
柱温:40°C 波长: 245nm
数据文件名: RC\$J632 - 11-13/11-1131-2 - zzp-6031103p-rcqx-pH6.8jz-10mg-jyx1-30min-P1.lcd
方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$J632 - J632-20260320-FX260.lcb
样品瓶号: 3-5
进样体积: 20 μ L 版本号 : 6.115
进样时间: 2026/03/21 02:19:56 实验者 : jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2026/03/23 14:40:10 处理者 : jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 245nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.933	305367	100.000	50600	2467	1.162	--
总计		305367	100.000	50600			

图167 盐酸伐地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6031103批(10mg规格)-均一性1-pH6.8介质-30min-片1
供试品溶液-1




J632

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.8ml/min
柱温:40°C 波长: 245nm
数据文件名: RC\$J632 - 11-13/11-1132-2 - zzp-6031103p-rcqx-pH6.8jz-10mg-jyx1-30min-P2.lcd
方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$J632 - J632-20260320-FX260.lcb
样品瓶号: 3-14
进样体积: 20 μ L 版本号 : 6.115
进样时间: 2026/03/21 02:23:18 实验者 : jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2026/03/23 14:40:13 处理者 : jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 245nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.927	312564	100.000	51886	2466	1.161	--
总计		312564	100.000	51886			

图168 盐酸伐地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6031103批(10mg规格)-均一性1-pH6.8介质-30min-片2
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.8ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长: 245nm
数据文件名: RC\$J632 - 11-13/11-1133-2 - zzp-6031103p-rcqx-pH6.8jz-10mg-jyx1-30min-P3.lcd
方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$J632 - J632-20260320-FX260.lcb
样品瓶号: 3-23
进样体积: 20 μ L 版本号 : 6.115
进样时间: 2026/03/21 02:26:40 实验者 : jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2026/03/23 14:40:15 处理者 : jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 245nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.929	326514	100.000	54418	2478	1.161	--
总计		326514	100.000	54418			

图169 盐酸伐地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6031103批(10mg规格)-均一性1-pH6.8介质-30min-片3
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.8ml/min
柱温:40°C 波长: 245nm
数据文件名: RC\$J632 - 11-13/11-1134-2 - zzp-6031103p-rcqx-pH6.8jz-10mg-jyx1-30min-P4.lcd
方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$J632 - J632-20260320-FX260.lcb
样品瓶号: 3-32
进样体积: 20 μ L 版本号 : 6.115
进样时间: 2026/03/21 02:30:02 实验者 : jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2026/03/23 14:40:18 处理者 : jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 245nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.937	327062	100.000	54348	2484	1.162	--
总计		327062	100.000	54348			

图170 盐酸伐地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6031103批(10mg规格)-均一性1-pH6.8介质-30min-片4
供试品溶液-1




J632

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.8ml/min
柱温:40°C 波长: 245nm
数据文件名: RC\$J632 - 11-13/11-1135-2 - zzp-6031103p-rcqx-pH6.8jz-10mg-jyx1-30min-P5.lcd
方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$J632 - J632-20260320-FX260.lcb
样品瓶号: 3-41
进样体积: 20 μ L 版本号 : 6.115
进样时间: 2026/03/21 02:33:24 实验者 : jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2026/03/23 14:40:21 处理者 : jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 245nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.934	310781	100.000	51239	2451	1.157	--
总计		310781	100.000	51239			

图171 盐酸伐地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6031103批(10mg规格)-均一性1-pH6.8介质-30min-片5
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.8ml/min
柱温:40°C 波长: 245nm
数据文件名: RC\$J632 - 11-13/11-1136-2 - zzp-6031103p-rcqx-pH6.8jz-10mg-jyx1-30min-P6.lcd
方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$J632 - J632-20260320-FX260.lcb
样品瓶号: 3-50
进样体积: 20 μ L 版本号 : 6.115
进样时间: 2026/03/21 02:36:46 实验者 : jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2026/03/23 14:40:24 处理者 : jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 245nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.931	311640	100.000	51686	2453	1.155	--
总计		311640	100.000	51686			

图172 盐酸伐地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6031103批(10mg规格)-均一性1-pH6.8介质-30min-片6
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.8ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长: 245nm
数据文件名: RC\$J632 - 11-13/11-1137-2 - zzp-6031103p-rcqx-pH6.8jz-10mg-jyx1-45min-P1.lcd
方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$J632 - J632-20260320-FX260.lcb
样品瓶号: 3-6
进样体积: 20 μ L 版本号 : 6.115
进样时间: 2026/03/21 02:40:08 实验者 : jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2026/03/23 14:40:26 处理者 : jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 245nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.928	329758	100.000	54871	2460	1.155	--
总计		329758	100.000	54871			

图173 盐酸伐地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6031103批(10mg规格)-均一性1-pH6.8介质-45min-片1
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.8ml/min
柱温:40°C 波长: 245nm
数据文件名: RC\$J632 - 11-13/11-1138-2 - zzp-6031103p-rcqx-pH6.8jz-10mg-jyx1-45min-P2.lcd
方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$J632 - J632-20260320-FX260.lcb
样品瓶号: 3-15
进样体积: 20 μ L 版本号 : 6.115
进样时间: 2026/03/21 02:43:30 实验者 : jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2026/03/23 14:40:29 处理者 : jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 245nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.931	341344	100.000	56614	2445	1.155	--
总计		341344	100.000	56614			

图174 盐酸伐地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6031103批(10mg规格)-均一性1-pH6.8介质-45min-片2
供试品溶液-1




J632

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.8ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长: 245nm
数据文件名: RC\$J632 - 11-13/11-1139-2 - zzp-6031103p-rcqx-pH6.8jz-10mg-jyx1-45min-P3.lcd
方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$J632 - J632-20260320-FX260.lcb
样品瓶号: 3-24
进样体积: 20 μ L 版本号 : 6.115
进样时间: 2026/03/21 02:46:52 实验者 : jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2026/03/23 14:40:32 处理者 : jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 245nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.932	345828	100.000	57023	2426	1.153	--
总计		345828	100.000	57023			

图175 盐酸伐地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6031103批(10mg规格)-均一性1-pH6.8介质-45min-片3
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.8ml/min
柱温:40°C 波长: 245nm
数据文件名: RC\$J632 - 11-13/11-1140-2 - zzp-6031103p-rcqx-pH6.8jz-10mg-jyx1-45min-P4.lcd
方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$J632 - J632-20260320-FX260.lcb
样品瓶号: 3-33
进样体积: 20 μ L 版本号 : 6.115
进样时间: 2026/03/21 02:50:14 实验者 : jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2026/03/23 14:40:34 处理者 : jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 245nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.933	351429	100.000	57824	2426	1.151	--
总计		351429	100.000	57824			

图176 盐酸伐地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6031103批(10mg规格)-均一性1-pH6.8介质-45min-片4
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.8ml/min
柱温:40°C 波长: 245nm
数据文件名: RC\$J632 - 11-13/11-1141-2 - zzp-6031103p-rcqx-pH6.8jz-10mg-jyx1-45min-P5.lcd
方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$J632 - J632-20260320-FX260.lcb
样品瓶号: 3-42
进样体积: 20 μ L 版本号 : 6.115
进样时间: 2026/03/21 02:53:37 实验者 : jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2026/03/23 14:40:37 处理者 : jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 245nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.932	337536	100.000	55764	2449	1.154	--
总计		337536	100.000	55764			

图177 盐酸伐地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6031103批(10mg规格)-均一性1-pH6.8介质-45min-片5
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.8ml/min
柱温:40°C 波长: 245nm
数据文件名: RC\$J632 - 11-13/11-1142-2 - zzp-6031103p-rcqx-pH6.8jz-10mg-jyx1-45min-P6.lcd
方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$J632 - J632-20260320-FX260.lcb
样品瓶号: 3-51
进样体积: 20 μ L 版本号 : 6.115
进样时间: 2026/03/21 02:56:57 实验者 : jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2026/03/23 14:40:39 处理者 : jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 245nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.939	333094	100.000	54975	2441	1.151	--
总计		333094	100.000	54975			

图178 盐酸伐地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6031103批(10mg规格)-均一性1-pH6.8介质-45min-片6
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.8ml/min
柱温:40°C 波长: 245nm
数据文件名: RC\$J632 - 11-13/11-1143-2 - zzp-6031103p-rcqx-pH6.8jz-10mg-jyx1-60min-P1.lcd
方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$J632 - J632-20260320-FX260.lcb
样品瓶号: 3-7
进样体积: 20 μ L 版本号 : 6.115
进样时间: 2026/03/21 03:00:19 实验者 : jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2026/03/23 14:40:42 处理者 : jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 245nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.930	344377	100.000	57021	2436	1.152	--
总计		344377	100.000	57021			

图179 盐酸伐地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6031103批(10mg规格)-均一性1-pH6.8介质-60min-片1
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.8ml/min
柱温:40°C 波长: 245nm
数据文件名: RC\$J632 - 11-13/11-1144-2 - zzp-6031103p-rcqx-pH6.8jz-10mg-jyx1-60min-P2.lcd
方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$J632 - J632-20260320-FX260.lcb
样品瓶号: 3-16
进样体积: 20 μ L 版本号 : 6.115
进样时间: 2026/03/21 03:03:42 实验者 : jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2026/03/23 14:40:45 处理者 : jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 245nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.929	356234	100.000	58664	2413	1.153	--
总计		356234	100.000	58664			

图180 盐酸伐地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6031103批(10mg规格)-均一性1-pH6.8介质-60min-片2
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.8ml/min
柱温:40°C 波长: 245nm
数据文件名: RC\$J632 - 11-13/11-1145-2 - zzp-6031103p-rcqx-pH6.8jz-10mg-jyx1-60min-P3.lcd
方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$J632 - J632-20260320-FX260.lcb
样品瓶号: 3-25
进样体积: 20 μ L 版本号 : 6.115
进样时间: 2026/03/21 03:07:04 实验者 : jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2026/03/23 14:40:47 处理者 : jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 245nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.930	350732	100.000	57787	2414	1.147	--
总计		350732	100.000	57787			

图181 盐酸伐地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6031103批(10mg规格)-均一性1-pH6.8介质-60min-片3
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.8ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长: 245nm
数据文件名: RC\$J632 - 11-13/11-1146-2 - zzp-6031103p-rcqx-pH6.8jz-10mg-jyx1-60min-P4.lcd
方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$J632 - J632-20260320-FX260.lcb
样品瓶号: 3-34
进样体积: 20 μ L 版本号 : 6.115
进样时间: 2026/03/21 03:10:26 实验者 : jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2026/03/23 14:40:50 处理者 : jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 245nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.933	360896	100.000	59095	2410	1.149	--
总计		360896	100.000	59095			

图182 盐酸伐地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6031103批(10mg规格)-均一性1-pH6.8介质-60min-片4
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.8ml/min
柱温:40°C 波长: 245nm
数据文件名: RC\$J632 - 11-13/11-1147-2 - zzp-6031103p-rcqx-pH6.8jz-10mg-jyx1-60min-P5.lcd
方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$J632 - J632-20260320-FX260.lcb
样品瓶号: 3-43
进样体积: 20 μ L 版本号 : 6.115
进样时间: 2026/03/21 03:13:46 实验者 : jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2026/03/23 14:40:52 处理者 : jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 245nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.931	350017	100.000	57718	2427	1.147	--
总计		350017	100.000	57718			

图183 盐酸伐地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6031103批(10mg规格)-均一性1-pH6.8介质-60min-片5
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.8ml/min
柱温:40°C 波长: 245nm
数据文件名: RC\$J632 - 11-13/11-1148-2 - zzp-6031103p-rcqx-pH6.8jz-10mg-jyx1-60min-P6.lcd
方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$J632 - J632-20260320-FX260.lcb
样品瓶号: 3-52
进样体积: 20 μ L 版本号 : 6.115
进样时间: 2026/03/21 03:17:08 实验者 : jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2026/03/23 14:40:55 处理者 : jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 245nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.931	341440	100.000	56303	2430	1.151	--
总计		341440	100.000	56303			

图184 盐酸伐地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6031103批(10mg规格)-均一性1-pH6.8介质-60min-片6
供试品溶液-1




J632

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.8ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长: 245nm
数据文件名: RC\$J632 - 11-13/11-1149-2 - zzp-6031103p-rcqx-pH6.8jz-10mg-jyx1-90min-P1.lcd
方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$J632 - J632-20260320-FX260.lcb
样品瓶号: 3-8
进样体积: 20 μ L 版本号 : 6.115
进样时间: 2026/03/21 03:20:31 实验者 : jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2026/03/23 14:40:58 处理者 : jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 245nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.928	355213	100.000	58603	2422	1.147	--
总计		355213	100.000	58603			

图185 盐酸伐地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6031103批(10mg规格)-均一性1-pH6.8介质-90min-片1
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.8ml/min
柱温:40°C 波长: 245nm
数据文件名: RC\$J632 - 11-13/11-1150-2 - zzp-6031103p-rcqx-pH6.8jz-10mg-jyx1-90min-P2.lcd
方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$J632 - J632-20260320-FX260.lcb
样品瓶号: 3-17
进样体积: 20 μ L 版本号 : 6.115
进样时间: 2026/03/21 03:23:54 实验者 : jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2026/03/23 14:41:00 处理者 : jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 245nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.931	364826	100.000	60443	2444	1.150	--
总计		364826	100.000	60443			

图186 盐酸伐地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6031103批(10mg规格)-均一性1-pH6.8介质-90min-片2
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.8ml/min
柱温:40°C 波长: 245nm
数据文件名: RC\$J632 - 11-13/11-1151-2 - zzp-6031103p-rcqx-pH6.8jz-10mg-jyx1-90min-P3.lcd
方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$J632 - J632-20260320-FX260.lcb
样品瓶号: 3-26
进样体积: 20 μ L 版本号 : 6.115
进样时间: 2026/03/21 03:27:17 实验者 : jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2026/03/23 14:41:03 处理者 : jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 245nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.929	368813	100.000	61170	2447	1.149	--
总计		368813	100.000	61170			

图187 盐酸伐地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6031103批(10mg规格)-均一性1-pH6.8介质-90min-片3
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.8ml/min
柱温:40°C 波长: 245nm
数据文件名: RC\$J632 - 11-13/11-1152-2 - zzp-6031103p-rcqx-pH6.8jz-10mg-jyx1-90min-P4.lcd
方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$J632 - J632-20260320-FX260.lcb
样品瓶号: 3-35
进样体积: 20 μ L 版本号 : 6.115
进样时间: 2026/03/21 03:30:38 实验者 : jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2026/03/23 14:41:06 处理者 : jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 245nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.931	372218	100.000	61235	2414	1.149	--
总计		372218	100.000	61235			

图188 盐酸伐地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6031103批(10mg规格)-均一性1-pH6.8介质-90min-片4
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.8ml/min
柱温:40°C 波长: 245nm
数据文件名: RC\$J632 - 11-13/11-1153-2 - zzp-6031103p-rcqx-pH6.8jz-10mg-jyx1-90min-P5.lcd
方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$J632 - J632-20260320-FX260.lcb
样品瓶号: 3-44
进样体积: 20 μ L 版本号 : 6.115
进样时间: 2026/03/21 03:34:01 实验者 : jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2026/03/23 14:41:08 处理者 : jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 245nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.931	362931	100.000	59880	2433	1.151	--
总计		362931	100.000	59880			

图189 盐酸伐地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6031103批(10mg规格)-均一性1-pH6.8介质-90min-片5
供试品溶液-1




J632

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.8ml/min
柱温:40°C 波长: 245nm
数据文件名: RC\$J632 - 11-13/11-1154-2 - zzp-6031103p-rcqx-pH6.8jz-10mg-jyx1-90min-P6.lcd
方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$J632 - J632-20260320-FX260.lcb
样品瓶号: 3-53
进样体积: 20 μ L 版本号 : 6.115
进样时间: 2026/03/21 03:37:23 实验者 : jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2026/03/23 14:41:11 处理者 : jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 245nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.934	359932	100.000	58989	2420	1.148	--
总计		359932	100.000	58989			

图190 盐酸伐地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6031103批(10mg规格)-均一性1-pH6.8介质-90min-片6
供试品溶液-1




J632

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.8ml/min
柱温:40°C 波长: 245nm
数据文件名: RC\$J632 - 11-13/11-1155-2 - zzp-6031103p-rcqx-pH6.8jz-10mg-jyx1-120min-P1.lcd
方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$J632 - J632-20260320-FX260.lcb
样品瓶号: 4-5
进样体积: 20 μ L 版本号 : 6.115
进样时间: 2026/03/21 03:40:47 实验者 : jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2026/03/23 14:41:14 处理者 : jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 245nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.935	367704	100.000	60147	2417	1.149	--
总计		367704	100.000	60147			

图191 盐酸伐地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6031103批(10mg规格)-均一性1-pH6.8介质-120min-片1
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.8ml/min
柱温:40°C 波长: 245nm
数据文件名: RC\$J632 - 11-13/11-1156-2 - zzp-6031103p-rcqx-pH6.8jz-10mg-jyx1-120min-P2.lcd
方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$J632 - J632-20260320-FX260.lcb
样品瓶号: 4-14
进样体积: 20 μ L 版本号 : 6.115
进样时间: 2026/03/21 03:44:12 实验者 : jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2026/03/23 14:41:16 处理者 : jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>


检测器A Ch1 245nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.936	372310	100.000	61215	2440	1.152	--
总计		372310	100.000	61215			

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.8ml/min
柱温:40°C 波长: 245nm
数据文件名: RC\$J632 - 11-13/11-1157-2 - zzp-6031103p-rcqx-pH6.8jz-10mg-jyx1-120min-P3.lcd
方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$J632 - J632-20260320-FX260.lcb
样品瓶号: 4-23
进样体积: 20 μ L 版本号 : 6.115
进样时间: 2026/03/21 03:47:35 实验者 : jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2026/03/23 14:41:19 处理者 : jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>


检测器A Ch1 245nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.938	376128	100.000	61840	2425	1.151	--
总计		376128	100.000	61840			

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.8ml/min
柱温:40°C 波长: 245nm
数据文件名: RC\$J632 - 11-13/11-1158-2 - zzp-6031103p-rcqx-pH6.8jz-10mg-jyx1-120min-P4.lcd
方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$J632 - J632-20260320-FX260.lcb
样品瓶号: 4-32
进样体积: 20 μ L 版本号 : 6.115
进样时间: 2026/03/21 03:50:59 实验者 : jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2026/03/23 14:41:22 处理者 : jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 245nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.935	377691	100.000	61845	2423	1.154	--
总计		377691	100.000	61845			

图194 盐酸伐地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6031103批(10mg规格)-均一性1-pH6.8介质-120min-片4
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.8ml/min
柱温:40°C 波长: 245nm
数据文件名: RC\$J632 - 11-13/11-1159-2 - zzp-6031103p-rcqx-pH6.8jz-10mg-jyx1-120min-P5.lcd
方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$J632 - J632-20260320-FX260.lcb
样品瓶号: 4-41
进样体积: 20 μ L 版本号 : 6.115
进样时间: 2026/03/21 03:54:22 实验者 : jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2026/03/23 14:41:25 处理者 : jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 245nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.932	369325	100.000	60965	2442	1.153	--
总计		369325	100.000	60965			

图195 盐酸伐地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6031103批(10mg规格)-均一性1-pH6.8介质-120min-片5
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.8ml/min
柱温:40°C 波长: 245nm
数据文件名: RC\$J632 - 11-13/11-1160-2 - zzp-6031103p-rcqx-pH6.8jz-10mg-jyx1-120min-P6.lcd
方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$J632 - J632-20260320-FX260.lcb
样品瓶号: 4-50
进样体积: 20 μ L 版本号 : 6.115
进样时间: 2026/03/21 03:57:46 实验者 : jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2026/03/23 14:41:28 处理者 : jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 245nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.931	364964	100.000	60256	2429	1.150	--
总计		364964	100.000	60256			

图196 盐酸伐地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6031103批(10mg规格)-均一性1-pH6.8介质-120min-片6
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.8ml/min
柱温:40°C 波长: 245nm
数据文件名: RC\$J632 - 11-13/11-1161-2 - zzp-6031103p-rcqx-pH6.8jz-10mg-jyx1-jx-P1.lcd
方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$J632 - J632-20260320-FX260.lcb
样品瓶号: 4-6
进样体积: 20 μ L 版本号 : 6.115
进样时间: 2026/03/21 04:01:10 实验者 : jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2026/03/23 14:41:30 处理者 : jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 245nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.932	379362	100.000	62613	2432	1.152	--
总计		379362	100.000	62613			

图197 盐酸伐地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6031103批(10mg规格)-均一性1-pH6.8介质-极限转速-片1
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.8ml/min
柱温:40°C 波长: 245nm
数据文件名: RC\$J632 - 11-13/11-1162-2 - zzp-6031103p-rcqx-pH6.8jz-10mg-jyx1-jx-P2.lcd
方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$J632 - J632-20260320-FX260.lcb
样品瓶号: 4-15
进样体积: 20 μ L 版本号 : 6.115
进样时间: 2026/03/21 04:04:33 实验者 : jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2026/03/23 14:41:33 处理者 : jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 245nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.930	385805	100.000	63661	2426	1.152	--
总计		385805	100.000	63661			

图198 盐酸伐地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6031103批(10mg规格)-均一性1-pH6.8介质-极限转速-片2
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.8ml/min
柱温:40°C 波长: 245nm
数据文件名: RC\$J632 - 11-13/11-1163-2 - zzp-6031103p-rcqx-pH6.8jz-10mg-jyx1-jx-P3.lcd
方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$J632 - J632-20260320-FX260.lcb
样品瓶号: 4-24
进样体积: 20 μ L 版本号 : 6.115
进样时间: 2026/03/21 04:07:57 实验者 : jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2026/03/23 14:41:36 处理者 : jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 245nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.930	391253	100.000	64452	2419	1.149	--
总计		391253	100.000	64452			

图199 盐酸伐地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6031103批(10mg规格)-均一性1-pH6.8介质-极限转速-片3
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.8ml/min
柱温:40°C 波长: 245nm
数据文件名: RC\$J632 - 11-13/11-1164-2 - zzp-6031103p-rcqx-pH6.8jz-10mg-jyx1-jx-P4.lcd
方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$J632 - J632-20260320-FX260.lcb
样品瓶号: 4-33
进样体积: 20 μ L 版本号 : 6.115
进样时间: 2026/03/21 04:11:21 实验者 : jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2026/03/23 14:41:38 处理者 : jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>


检测器A Ch1 245nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.932	388118	100.000	63861	2426	1.152	--
总计		388118	100.000	63861			

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.8ml/min
柱温:40°C 波长: 245nm
数据文件名: RC\$J632 - 11-13/11-1165-2 - zzp-6031103p-rcqx-pH6.8jz-10mg-jyx1-jx-P5.lcd
方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$J632 - J632-20260320-FX260.lcb
样品瓶号: 4-42
进样体积: 20 μ L 版本号 : 6.115
进样时间: 2026/03/21 04:14:45 实验者 : jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2026/03/23 14:41:41 处理者 : jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>


检测器A Ch1 245nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.929	378102	100.000	62527	2437	1.152	--
总计		378102	100.000	62527			

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.8ml/min
柱温:40°C 波长: 245nm
数据文件名: RC\$J632 - 11-13/11-1166-2 - zzp-6031103p-rcqx-pH6.8jz-10mg-jyx1-jx-P6.lcd
方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$J632 - J632-20260320-FX260.lcb
样品瓶号: 4-51
进样体积: 20 μ L 版本号 : 6.115
进样时间: 2026/03/21 04:18:09 实验者 : jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2026/03/23 14:41:43 处理者 : jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 245nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.933	381271	100.000	62563	2417	1.150	--
总计		381271	100.000	62563			




J632

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.8ml/min
柱温:40°C 波长: 245nm
数据文件名: RC\$J632 - 11-13/11-1167-2 - zzp-6031103p-rcqx-pH6.8jz-10mg-jyx1-dz2-1.lcd
方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$J632 - J632-20260320-FX260.lcb
样品瓶号: 3-27
进样体积: 20 μ L 版本号 : 6.115
进样时间: 2026/03/21 04:21:31 实验者 : jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2026/03/23 14:41:46 处理者 : jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 245nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.893	385017	100.000	61036	2178	1.179	--
总计		385017	100.000	61036			

图203 盐酸伐地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6031103批(10mg规格)-均一性1-pH6.8介质
对照品溶液-2-1




J632

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.8ml/min
柱 温:40°C 波长: 245nm
数据文件名: RC\$J632 - 11-13/11-1168-2 - zzp-6031103p-rcqx-pH6.8jz-10mg-jyx1-dz2-2.lcd
方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$J632 - J632-20260320-FX260.lcb
样品瓶号: 3-27
进样体积: 20 μL
进样时间: 2026/03/21 04:24:53
处理时间 (V2) : 2026/03/23 14:41:49
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

版本号 : 6.115
实验者 : jiangjinwei
处理者 : jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 245nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.897	382715	100.000	61365	2221	1.180	--
总计		382715	100.000	61365			

图204 盐酸伐地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6031103批(10mg规格)-均一性1-pH6.8介质
对照品溶液-2-2