



盐酸伐地那非片项目信息

介质体积(ml)	900	取样体积(ml)	1.5	补液体积(ml)	1.5
对照品批号	D23106010771	对照品来源	中检所	对照品使用方法	直接使用
对照品含量(%)	90.12	对照品水分(%)	0	对照品稀释倍数	1000
标示量(mg)	10	供试品稀释倍数	1	系数	0.9306

对照品溶液

序号	称样量(mg)	A ₁	A ₂	A ₃	A ₄	A ₅	A _{平均}	RSD%
1	12.10	388253	388503	388259	388651	388298	388393	0.05
2	12.13	388032	388200				388116	0.04

单位质量响应值		RSD%	判断
32098.60	31996.37	0.23	数据可信



操作者:

日期: 2026-08-16

复核者:

未审阅版本



供试品溶液-6031101批-pH6.8

时间 (分钟)	样品	A ₁	A ₂	A _{平均}	溶出量(%)	平均(%)	RSD%	累计溶 出量(%)	平均(%)	RSD%
5min	1	208144	-	208144	49.023	48.93	8.47	49.02	48.93	8.47
	2	208033	-	208033	48.997			49.00		
	3	182945	-	182945	43.088			43.09		
	4	236602	-	236602	55.725			55.73		
	5	211967	-	211967	49.923			49.92		
	6	198764	-	198764	46.814			46.81		
10min	1	251581	-	251581	59.253	58.16	5.78	59.33	58.24	5.78
	2	246490	-	246490	58.054			58.14		
	3	227589	-	227589	53.603			53.67		
	4	269723	-	269723	63.526			63.62		
	5	249105	-	249105	58.670			58.75		
	6	237152	-	237152	55.855			55.93		
15min	1	278902	-	278902	65.688	64.71	4.83	65.87	64.89	4.83
	2	274744	-	274744	64.709			64.89		
	3	255829	-	255829	60.254			60.41		
	4	296147	-	296147	69.750			69.95		
	5	274873	-	274873	64.739			64.92		
	6	268104	-	268104	63.145			63.32		
20min	1	297011	-	297011	69.953	70.42	3.97	70.24	70.71	3.98
	2	299447	-	299447	70.527			70.81		
	3	284443	-	284443	66.993			67.25		
	4	319854	-	319854	75.333			75.65		
	5	301184	-	301184	70.936			71.22		
	6	292107	-	292107	68.798			69.07		
30min	1	330564	-	330564	77.856	77.87	3.97	78.26	78.27	3.97
	2	336615	-	336615	79.281			79.68		
	3	321200	-	321200	75.650			76.02		
	4	349366	-	349366	82.284			82.72		
	5	334533	-	334533	78.790			79.20		
	6	311453	-	311453	73.354			73.75		
45min	1	361804	-	361804	85.213	85.06	2.44	85.75	85.59	2.45
	2	367594	-	367594	86.577			87.11		
	3	357929	-	357929	84.301			84.80		
	4	373546	-	373546	87.979			88.56		
	5	357791	-	357791	84.268			84.81		
	6	348144	-	348144	81.996			82.51		
60min	1	378376	-	378376	89.116	88.83	2.95	89.79	89.51	2.94
	2	384018	-	384018	90.445			91.13		
	3	383154	-	383154	90.242			90.88		
	4	388339	-	388339	91.463			92.19		
	5	371273	-	371273	87.443			88.12		
	6	357879	-	357879	84.289			84.94		
90min	1	391510	-	391510	92.210	92.58	3.11	93.04	93.40	3.10
	2	399391	-	399391	94.066			94.90		
	3	404498	-	404498	95.269			96.06		
	4	401020	-	401020	94.450			95.33		
	5	391542	-	391542	92.217			93.04		
	6	370540	-	370540	87.271			88.06		
120min	1	394289	-	394289	92.864	93.25	3.05	93.84	94.23	3.04
	2	397473	-	397473	93.614			94.60		
	3	409404	-	409404	96.424			97.37		
	4	406971	-	406971	95.851			96.89		
	5	391536	-	391536	92.216			93.19		
	6	375942	-	375942	88.543			89.48		



操作者:

日期: 2026-08-16

复核者:

未审阅版本



时间 (分钟)	样品	A ₁	A ₂	A _{平均}	溶出量(%)	平均(%)	RSD%	累计溶 出量(%)	平均(%)	RSD%
极限	1	409144	-	409144	96.363	95.36	3.19	97.50	96.49	3.16
	2	414211	-	414211	97.556			98.70		
	3	418606	-	418606	98.591			99.70		
	4	403770	-	403770	95.097			96.29		
	5	401582	-	401582	94.582			95.71		
	6	381991	-	381991	89.968			91.05		



操作者:

日 期: 2026-08-16

复核者:

未审阅版本



盐酸伐地那非片项目信息

介质体积(ml)	900	取样体积(ml)	1.5	补液体积(ml)	1.5
对照品批号	D23106010771	对照品来源	中检所	对照品使用方法	直接使用
对照品含量(%)	90.12	对照品水分(%)	0	对照品稀释倍数	1000
标示量(mg)	10	供试品稀释倍数	1	系数	0.9306

对照品溶液

序号	称样量(mg)	A ₁	A ₂	A ₃	A ₄	A ₅	A _{平均}	RSD%
1	12.10	387775	387825	387703	388258	388329	387978	0.08
2	12.13	388321	387189				387755	0.21
单位质量响应值				RSD%	判断			
32064.30				0.22	数据可信			



操作者:

日期: 2026-08-16

复核者:

未审阅版本



供试品溶液-6031102批-pH6.8

时间 (分钟)	样品	A ₁	A ₂	A _{平均}	溶出量(%)	平均(%)	RSD%	累计溶出量(%)	平均(%)	RSD%
5min	1	185949	-	185949	43.839	43.43	8.09	43.84	43.43	8.09
	2	170620	-	170620	40.225			40.23		
	3	208349	-	208349	49.120			49.12		
	4	166673	-	166673	39.295			39.29		
	5	189701	-	189701	44.724			44.72		
	6	184071	-	184071	43.396			43.40		
10min	1	229213	-	229213	54.039	54.07	6.33	54.11	54.15	6.33
	2	215357	-	215357	50.772			50.84		
	3	249065	-	249065	58.719			58.80		
	4	211027	-	211027	49.751			49.82		
	5	240823	-	240823	56.776			56.85		
	6	230703	-	230703	54.390			54.46		
15min	1	261696	-	261696	61.697	62.25	5.46	61.86	62.41	5.47
	2	251830	-	251830	59.371			59.52		
	3	283205	-	283205	66.768			66.95		
	4	245219	-	245219	57.813			57.96		
	5	276711	-	276711	65.237			65.41		
	6	265527	-	265527	62.600			62.76		
20min	1	285518	-	285518	67.313	67.75	4.75	67.58	68.02	4.76
	2	276810	-	276810	65.260			65.51		
	3	304417	-	304417	71.769			72.06		
	4	268630	-	268630	63.332			63.58		
	5	300484	-	300484	70.842			71.12		
	6	288446	-	288446	68.004			68.27		
30min	1	323093	-	323093	76.172	75.79	4.05	76.55	76.17	4.06
	2	316107	-	316107	74.525			74.88		
	3	334252	-	334252	78.803			79.21		
	4	299356	-	299356	70.576			70.93		
	5	334257	-	334257	78.804			79.20		
	6	321724	-	321724	75.849			76.23		
45min	1	345964	-	345964	81.564	81.74	3.36	82.07	82.24	3.37
	2	343247	-	343247	80.924			81.41		
	3	355670	-	355670	83.852			84.39		
	4	326398	-	326398	76.951			77.42		
	5	359609	-	359609	84.781			85.31		
	6	349252	-	349252	82.339			82.85		
60min	1	361411	-	361411	85.206	85.04	3.00	85.85	85.68	3.01
	2	360345	-	360345	84.955			85.57		
	3	369506	-	369506	87.114			87.80		
	4	340911	-	340911	80.373			80.97		
	5	371343	-	371343	87.547			88.22		
	6	360665	-	360665	85.030			85.67		
90min	1	373609	-	373609	88.082	88.10	2.79	88.86	88.88	2.81
	2	371647	-	371647	87.619			88.38		
	3	382600	-	382600	90.201			91.03		
	4	354480	-	354480	83.572			84.30		
	5	382471	-	382471	90.171			90.99		
	6	377268	-	377268	88.944			89.73		
120min	1	379527	-	379527	89.477	89.34	2.70	90.41	90.26	2.71
	2	379106	-	379106	89.378			90.28		
	3	388455	-	388455	91.582			92.56		
	4	359480	-	359480	84.751			85.62		
	5	385658	-	385658	90.922			91.89		
	6	381322	-	381322	89.900			90.83		



操作者:

日期: 2026-08-16

复核者:

未审阅版本



时间 (分钟)	样品	A ₁	A ₂	A _{平均}	溶出量(%)	平均(%)	RSD%	累计溶 出量(%)	平均(%)	RSD%
极限	1	390443	-	390443	92.050	92.08	2.43	93.13	93.16	2.44
	2	390360	-	390360	92.031			93.09		
	3	400791	-	400791	94.490			95.62		
	4	372879	-	372879	87.910			88.92		
	5	393916	-	393916	92.869			93.99		
	6	394940	-	394940	93.111			94.19		



操作者:

日 期: 2026-08-16

复核者:

未审阅版本



盐酸伐地那非片项目信息

介质体积(ml)	900	取样体积(ml)	1.5	补液体积(ml)	1.5
对照品批号	D23106010771	对照品来源	中检所	对照品使用方法	直接使用
对照品含量(%)	90.12	对照品水分(%)	0	对照品稀释倍数	1000
标示量(mg)	10	供试品稀释倍数	1	系数	0.9306

对照品溶液

序号	称样量(mg)	A ₁	A ₂	A ₃	A ₄	A ₅	A _{平均}	RSD%
1	12.10	388199	388204	388763	388065	388487	388344	0.08
2	12.13	388170	387832				388001	0.07
单位质量响应值				RSD%	判断			
32094.55				0.24	数据可信			



操作者:

日期: 2026-08-16

复核者:

未审阅版本



供试品溶液-6031103批-pH6.8

时间 (分钟)	样品	A ₁	A ₂	A _{平均}	溶出量(%)	平均(%)	RSD%	累计溶出量(%)	平均(%)	RSD%
5min	1	196707	-	196707	46.339	39.48	26.20	46.34	39.48	26.20
	2	153248	-	153248	36.101			36.10		
	3	175820	-	175820	41.418			41.42		
	4	212680	-	212680	50.102			50.10		
	5	87925	-	87925	20.713			20.71		
	6	179146	-	179146	42.202			42.20		
10min	1	238331	-	238331	56.144	52.74	10.87	56.22	52.80	10.89
	2	201996	-	201996	47.585			47.64		
	3	224060	-	224060	52.783			52.85		
	4	256425	-	256425	60.407			60.49		
	5	190119	-	190119	44.787			44.82		
	6	232236	-	232236	54.709			54.78		
15min	1	272932	-	272932	64.295	61.12	7.43	64.47	61.28	7.46
	2	242279	-	242279	57.074			57.21		
	3	257843	-	257843	60.741			60.90		
	4	285549	-	285549	67.268			67.45		
	5	233580	-	233580	55.025			55.13		
	6	264587	-	264587	62.330			62.49		
20min	1	296507	-	296507	69.849	67.52	5.63	70.13	67.78	5.66
	2	270421	-	270421	63.704			63.94		
	3	284580	-	284580	67.039			67.30		
	4	309764	-	309764	72.972			73.27		
	5	267161	-	267161	62.936			63.14		
	6	291275	-	291275	68.617			68.88		
30min	1	326609	-	326609	76.940	75.52	4.09	77.33	75.89	4.12
	2	305069	-	305069	71.866			72.21		
	3	315619	-	315619	74.351			74.72		
	4	338943	-	338943	79.846			80.26		
	5	308354	-	308354	72.640			72.95		
	6	329003	-	329003	77.504			77.88		
45min	1	350903	-	350903	82.663	82.00	3.17	83.19	82.50	3.20
	2	335311	-	335311	78.990			79.45		
	3	341728	-	341728	80.502			81.00		
	4	363527	-	363527	85.637			86.19		
	5	339698	-	339698	80.024			80.45		
	6	357425	-	357425	84.200			84.71		
60min	1	363896	-	363896	85.724	85.27	2.24	86.38	85.90	2.28
	2	353658	-	353658	83.312			83.90		
	3	356423	-	356423	83.964			84.59		
	4	375688	-	375688	88.502			89.20		
	5	356960	-	356960	84.090			84.65		
	6	365282	-	365282	86.051			86.70		
90min	1	374370	-	374370	88.192	88.48	1.92	88.99	89.25	1.95
	2	368957	-	368957	86.916			87.65		
	3	370126	-	370126	87.192			87.96		
	4	386860	-	386860	91.134			91.98		
	5	371431	-	371431	87.499			88.20		
	6	381776	-	381776	89.936			90.73		
120min	1	382657	-	382657	90.144	90.20	2.11	91.09	91.12	2.13
	2	375609	-	375609	88.483			89.36		
	3	374522	-	374522	88.227			89.14		
	4	392525	-	392525	92.468			93.46		
	5	379446	-	379446	89.387			90.23		
	6	392725	-	392725	92.515			93.46		



操作者:

日期: 2026-08-16

复核者:

未审阅版本



时间 (分钟)	样品	A ₁	A ₂	A _{平均}	溶出量(%)	平均(%)	RSD%	累计溶 出量(%)	平均(%)	RSD%
极限	1	391716	-	391716	92.278	92.43	1.55	93.38	93.50	1.57
	2	383162	-	383162	90.263			91.29		
	3	389340	-	389340	91.718			92.78		
	4	399601	-	399601	94.135			95.28		
	5	391963	-	391963	92.336			93.33		
	6	398466	-	398466	93.868			94.96		



操作者:

日 期: 2026-08-16

复核者:

未审阅版本




J632

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.8ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长: 245nm
数据文件名: RC\$J632 - 11-10/29-2234-2 - zzp-6031101p-rcqx-pH6.8jz-10mg-jyx2-rj.lcd
方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$J632 - J632-20260320-FX278.lcb
样品瓶号: 1-9
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2026/03/20 16:57:10 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2): 2026/03/23 09:03:06 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 245nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图1 盐酸伐地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6031101批(10mg规格)-均一性2-pH6.8介质
溶剂

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.8ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长: 245nm
数据文件名: RC\$J632 - 11-10/29-2235-2 - zzp-6031101p-rcqx-pH6.8jz-10mg-jyx2-dz1-1.lcd
方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$J632 - J632-20260320-FX278.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2026/03/20 17:00:34 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2): 2026/03/23 09:03:12 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 245nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.026	388253	100.000	61952	2442	1.046	--
总计		388253	100.000	61952			

图2 盐酸伐地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6031101批(10mg规格)-均一性2-pH6.8介质
对照品溶液-1-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.8ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长: 245nm
数据文件名: RC\$J632 - 11-10/29-2236-2 - zzp-6031101p-rcqx-pH6.8jz-10mg-jyx2-dz1-2.lcd
方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$J632 - J632-20260320-FX278.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2026/03/20 17:03:58 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2): 2026/03/23 09:03:15 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 245nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.026	388503	100.000	61891	2436	1.046	--
总计		388503	100.000	61891			

图3 盐酸伐地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6031101批(10mg规格)-均一性2-pH6.8介质
对照品溶液-1-2

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.8ml/min
柱温:40°C 波长: 245nm
数据文件名: RC\$J632 - 11-10/29-2237-2 - zzp-6031101p-rcqx-pH6.8jz-10mg-jyx2-dz1-3.lcd
方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$J632 - J632-20260320-FX278.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2026/03/20 17:07:22 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2): 2026/03/23 09:03:17 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 245nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.026	388259	100.000	61909	2437	1.046	--
总计		388259	100.000	61909			

图4 盐酸伐地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6031101批(10mg规格)-均一性2-pH6.8介质
对照品溶液-1-3

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.8ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长: 245nm
数据文件名: RC\$J632 - 11-10/29-2238-2 - zzp-6031101p-rcqx-pH6.8jz-10mg-jyx2-dz1-4.lcd
方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$J632 - J632-20260320-FX278.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2026/03/20 17:10:46 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2): 2026/03/23 09:03:20 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 245nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.026	388651	100.000	61918	2436	1.046	--
总计		388651	100.000	61918			

图5 盐酸伐地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6031101批(10mg规格)-均一性2-pH6.8介质
对照品溶液-1-4

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.8ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长: 245nm
数据文件名: RC\$J632 - 11-10/29-2239-2 - zzp-6031101p-rcqx-pH6.8jz-10mg-jyx2-dz1-5.lcd
方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$J632 - J632-20260320-FX278.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2026/03/20 17:14:10 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2): 2026/03/23 09:03:23 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 245nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.026	388298	100.000	61993	2445	1.046	--
总计		388298	100.000	61993			

图6 盐酸伐地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6031101批(10mg规格)-均一性2-pH6.8介质
对照品溶液-1-5




J632

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.8ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长: 245nm
数据文件名: RC\$J632 - 11-10/29-2240-2 - zzp-6031101p-rcqx-pH6.8jz-10mg-jyx2-5min-P1.lcd
方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$J632 - J632-20260320-FX278.lcb
样品瓶号: 1-1
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2026/03/20 17:17:34 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2026/03/23 09:03:25 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 245nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.078	208144	100.000	35512	2915	1.028	--
总计		208144	100.000	35512			

图7 盐酸伐地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6031101批(10mg规格)-均一性2-pH6.8介质-5min-片1
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.8ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长: 245nm
数据文件名: RC\$J632 - 11-10/29-2241-2 - zzp-6031101p-rcqx-pH6.8jz-10mg-jyx2-5min-P2.lcd
方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$J632 - J632-20260320-FX278.lcb
样品瓶号: 1-10
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2026/03/20 17:20:57 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2): 2026/03/23 09:03:28 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 245nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.077	208033	100.000	35457	2916	1.029	--
总计		208033	100.000	35457			

图8 盐酸伐地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6031101批(10mg规格)-均一性2-pH6.8介质-5min-片2
供试品溶液-1




J632

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.8ml/min
柱温:40°C 波长: 245nm
数据文件名: RC\$J632 - 11-10/29-2242-2 - zzp-6031101p-rcqx-pH6.8jz-10mg-jyx2-5min-P3.lcd
方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$J632 - J632-20260320-FX278.lcb
样品瓶号: 1-19
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2026/03/20 17:24:20 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2): 2026/03/23 09:03:31 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 245nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.078	182945	100.000	31179	2913	1.029	--
总计		182945	100.000	31179			

图9 盐酸伐地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6031101批(10mg规格)-均一性2-pH6.8介质-5min-片3
供试品溶液-1




J632

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.8ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长: 245nm
数据文件名: RC\$J632 - 11-10/29-2243-2 - zzp-6031101p-rcqx-pH6.8jz-10mg-jyx2-5min-P4.lcd
方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$J632 - J632-20260320-FX278.lcb
样品瓶号: 1-28
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2026/03/20 17:27:43 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2): 2026/03/23 09:03:33 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 245nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.077	236602	100.000	40317	2912	1.032	--
总计		236602	100.000	40317			

图10 盐酸伐地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6031101批(10mg规格)-均一性2-pH6.8介质-5min-片4
供试品溶液-1




J632

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.8ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长: 245nm
数据文件名: RC\$J632 - 11-10/29-2244-2 - zzp-6031101p-rcqx-pH6.8jz-10mg-jyx2-5min-P5.lcd
方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$J632 - J632-20260320-FX278.lcb
样品瓶号: 1-37
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2026/03/20 17:31:04 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2): 2026/03/23 09:03:36 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 245nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.077	211967	100.000	36148	2916	1.031	--
总计		211967	100.000	36148			

图11 盐酸伐地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6031101批(10mg规格)-均一性2-pH6.8介质-5min-片5
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.8ml/min
柱温:40°C 波长: 245nm
数据文件名: RC\$J632 - 11-10/29-2245-2 - zzp-6031101p-rcqx-pH6.8jz-10mg-jyx2-5min-P6.lcd
方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$J632 - J632-20260320-FX278.lcb
样品瓶号: 1-46
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2026/03/20 17:34:27 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2): 2026/03/23 09:03:38 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 245nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.077	198764	100.000	33873	2909	1.029	--
总计		198764	100.000	33873			

图12 盐酸伐地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6031101批(10mg规格)-均一性2-pH6.8介质-5min-片6
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.8ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长: 245nm
数据文件名: RC\$J632 - 11-10/29-2246-2 - zzp-6031101p-rcqx-pH6.8jz-10mg-jyx2-10min-P1.lcd
方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$J632 - J632-20260320-FX278.lcb
样品瓶号: 1-2
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2026/03/20 17:37:51 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2026/03/23 09:03:41 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 245nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.077	251581	100.000	42805	2910	1.032	--
总计		251581	100.000	42805			

图13 盐酸伐地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6031101批(10mg规格)-均一性2-pH6.8介质-10min-片1
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.8ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长: 245nm
数据文件名: RC\$J632 - 11-10/29-2247-2 - zzp-6031101p-rcqx-pH6.8jz-10mg-jyx2-10min-P2.lcd
方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$J632 - J632-20260320-FX278.lcb
样品瓶号: 1-11
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2026/03/20 17:41:14 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2): 2026/03/23 09:03:44 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 245nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.077	246490	100.000	41911	2904	1.031	--
总计		246490	100.000	41911			

图14 盐酸伐地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6031101批(10mg规格)-均一性2-pH6.8介质-10min-片2
供试品溶液-1




J632

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.8ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长: 245nm
数据文件名: RC\$J632 - 11-10/29-2248-2 - zzp-6031101p-rcqx-pH6.8jz-10mg-jyx2-10min-P3.lcd
方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$J632 - J632-20260320-FX278.lcb
样品瓶号: 1-20
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2026/03/20 17:44:37 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2): 2026/03/23 09:03:46 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 245nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.077	227589	100.000	38704	2908	1.030	--
总计		227589	100.000	38704			

图15 盐酸伐地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6031101批(10mg规格)-均一性2-pH6.8介质-10min-片3
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.8ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长: 245nm
数据文件名: RC\$J632 - 11-10/29-2249-2 - zzp-6031101p-rcqx-pH6.8jz-10mg-jyx2-10min-P4.lcd
方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$J632 - J632-20260320-FX278.lcb
样品瓶号: 1-29
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2026/03/20 17:48:00 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2): 2026/03/23 09:03:49 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 245nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.077	269723	100.000	45821	2908	1.032	--
总计		269723	100.000	45821			

图16 盐酸伐地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6031101批(10mg规格)-均一性2-pH6.8介质-10min-片4
供试品溶液-1




J632

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.8ml/min
柱温:40°C 波长: 245nm
数据文件名: RC\$J632 - 11-10/29-2250-2 - zzp-6031101p-rcqx-pH6.8jz-10mg-jyx2-10min-P5.lcd
方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$J632 - J632-20260320-FX278.lcb
样品瓶号: 1-38
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2026/03/20 17:51:23 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2026/03/23 09:03:51 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 245nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.077	249105	100.000	42354	2906	1.031	--
总计		249105	100.000	42354			

图17 盐酸伐地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6031101批(10mg规格)-均一性2-pH6.8介质-10min-片5
供试品溶液-1




J632

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.8ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长: 245nm
数据文件名: RC\$J632 - 11-10/29-2251-2 - zzp-6031101p-rcqx-pH6.8jz-10mg-jyx2-10min-P6.lcd
方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$J632 - J632-20260320-FX278.lcb
样品瓶号: 1-47
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2026/03/20 17:54:45 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2): 2026/03/23 09:03:54 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 245nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.077	237152	100.000	40388	2912	1.030	--
总计		237152	100.000	40388			

图18 盐酸伐地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6031101批(10mg规格)-均一性2-pH6.8介质-10min-片6
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.8ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长: 245nm
数据文件名: RC\$J632 - 11-10/29-2252-2 - zzp-6031101p-rcqx-pH6.8jz-10mg-jyx2-15min-P1.lcd
方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$J632 - J632-20260320-FX278.lcb
样品瓶号: 1-3
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2026/03/20 17:58:08 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2): 2026/03/23 09:03:57 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 245nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.077	278902	100.000	47434	2907	1.032	--
总计		278902	100.000	47434			

图19 盐酸伐地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6031101批(10mg规格)-均一性2-pH6.8介质-15min-片1
供试品溶液-1




J632

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.8ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长: 245nm
数据文件名: RC\$J632 - 11-10/29-2253-2 - zzp-6031101p-rcqx-pH6.8jz-10mg-jyx2-15min-P2.lcd
方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$J632 - J632-20260320-FX278.lcb
样品瓶号: 1-12
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2026/03/20 18:01:31 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2): 2026/03/23 09:03:59 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 245nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.077	274744	100.000	46775	2913	1.031	--
总计		274744	100.000	46775			

图20 盐酸伐地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6031101批(10mg规格)-均一性2-pH6.8介质-15min-片2
供试品溶液-1




J632

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.8ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长: 245nm
数据文件名: RC\$J632 - 11-10/29-2254-2 - zzp-6031101p-rcqx-pH6.8jz-10mg-jyx2-15min-P3.lcd
方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$J632 - J632-20260320-FX278.lcb
样品瓶号: 1-21
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2026/03/20 18:04:54 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2): 2026/03/23 09:04:02 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 245nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.077	255829	100.000	43531	2908	1.032	--
总计		255829	100.000	43531			

图21 盐酸伐地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6031101批(10mg规格)-均一性2-pH6.8介质-15min-片3
供试品溶液-1




J632

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.8ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长: 245nm
数据文件名: RC\$J632 - 11-10/29-2255-2 - zzp-6031101p-rcqx-pH6.8jz-10mg-jyx2-15min-P4.lcd
方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$J632 - J632-20260320-FX278.lcb
样品瓶号: 1-30
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2026/03/20 18:08:17 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2): 2026/03/23 09:04:05 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 245nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.077	296147	100.000	50384	2912	1.034	--
总计		296147	100.000	50384			

图22 盐酸伐地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6031101批(10mg规格)-均一性2-pH6.8介质-15min-片4
供试品溶液-1




J632

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.8ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长: 245nm
数据文件名: RC\$J632 - 11-10/29-2256-2 - zzp-6031101p-rcqx-pH6.8jz-10mg-jyx2-15min-P5.lcd
方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$J632 - J632-20260320-FX278.lcb
样品瓶号: 1-39
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2026/03/20 18:11:39 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2): 2026/03/23 09:04:07 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 245nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.077	274873	100.000	46847	2916	1.034	--
总计		274873	100.000	46847			

图23 盐酸伐地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6031101批(10mg规格)-均一性2-pH6.8介质-15min-片5
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.8ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长: 245nm
数据文件名: RC\$J632 - 11-10/29-2257-2 - zzp-6031101p-rcqx-pH6.8jz-10mg-jyx2-15min-P6.lcd
方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$J632 - J632-20260320-FX278.lcb
样品瓶号: 1-48
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2026/03/20 18:15:02 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2): 2026/03/23 09:04:10 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 245nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.077	268104	100.000	45675	2909	1.033	--
总计		268104	100.000	45675			

图24 盐酸伐地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6031101批(10mg规格)-均一性2-pH6.8介质-15min-片6
供试品溶液-1




J632

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.8ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长: 245nm
数据文件名: RC\$J632 - 11-10/29-2258-2 - zzp-6031101p-rcqx-pH6.8jz-10mg-jyx2-20min-P1.lcd
方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$J632 - J632-20260320-FX278.lcb
样品瓶号: 1-4
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2026/03/20 18:18:25 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2): 2026/03/23 09:04:13 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 245nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.077	297011	100.000	50476	2902	1.033	--
总计		297011	100.000	50476			

图25 盐酸伐地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6031101批(10mg规格)-均一性2-pH6.8介质-20min-片1
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.8ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长: 245nm
数据文件名: RC\$J632 - 11-10/29-2259-2 - zzp-6031101p-rcqx-pH6.8jz-10mg-jyx2-20min-P2.lcd
方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$J632 - J632-20260320-FX278.lcb
样品瓶号: 1-13
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2026/03/20 18:21:49 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2): 2026/03/23 09:04:15 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 245nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.078	299447	100.000	50975	2903	1.032	--
总计		299447	100.000	50975			

图26 盐酸伐地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6031101批(10mg规格)-均一性2-pH6.8介质-20min-片2
供试品溶液-1




J632

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.8ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长: 245nm
数据文件名: RC\$J632 - 11-10/29-2260-2 - zzp-6031101p-rcqx-pH6.8jz-10mg-jyx2-20min-P3.lcd
方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$J632 - J632-20260320-FX278.lcb
样品瓶号: 1-22
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2026/03/20 18:25:12 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2): 2026/03/23 09:04:18 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 245nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.077	284443	100.000	48303	2893	1.032	--
总计		284443	100.000	48303			

图27 盐酸伐地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6031101批(10mg规格)-均一性2-pH6.8介质-20min-片3
供试品溶液-1




J632

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.8ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长: 245nm
数据文件名: RC\$J632 - 11-10/29-2261-2 - zzp-6031101p-rcqx-pH6.8jz-10mg-jyx2-20min-P4.lcd
方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$J632 - J632-20260320-FX278.lcb
样品瓶号: 1-31
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2026/03/20 18:28:36 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2): 2026/03/23 09:04:21 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 245nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.078	319854	100.000	54388	2900	1.033	--
总计		319854	100.000	54388			

图28 盐酸伐地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6031101批(10mg规格)-均一性2-pH6.8介质-20min-片4
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.8ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长: 245nm
数据文件名: RC\$J632 - 11-10/29-2262-2 - zzp-6031101p-rcqx-pH6.8jz-10mg-jyx2-20min-P5.lcd
方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$J632 - J632-20260320-FX278.lcb
样品瓶号: 1-40
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2026/03/20 18:31:58 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2): 2026/03/23 09:04:24 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 245nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.078	301184	100.000	51155	2892	1.032	--
总计		301184	100.000	51155			

图29 盐酸伐地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6031101批(10mg规格)-均一性2-pH6.8介质-20min-片5
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.8ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长: 245nm
数据文件名: RC\$J632 - 11-10/29-2263-2 - zzp-6031101p-rcqx-pH6.8jz-10mg-jyx2-20min-P6.lcd
方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$J632 - J632-20260320-FX278.lcb
样品瓶号: 1-49
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2026/03/20 18:35:21 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2): 2026/03/23 09:04:26 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 245nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.078	292107	100.000	49631	2895	1.031	--
总计		292107	100.000	49631			

图30 盐酸伐地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6031101批(10mg规格)-均一性2-pH6.8介质-20min-片6
供试品溶液-1




J632

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.8ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长: 245nm
数据文件名: RC\$J632 - 11-10/29-2264-2 - zzp-6031101p-rcqx-pH6.8jz-10mg-jyx2-30min-P1.lcd
方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$J632 - J632-20260320-FX278.lcb
样品瓶号: 1-5
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2026/03/20 18:38:44 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2): 2026/03/23 09:04:29 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 245nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.077	330564	100.000	56143	2897	1.033	--
总计		330564	100.000	56143			

图31 盐酸伐地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6031101批(10mg规格)-均一性2-pH6.8介质-30min-片1
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.8ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长: 245nm
数据文件名: RC\$J632 - 11-10/29-2265-2 - zzp-6031101p-rcqx-pH6.8jz-10mg-jyx2-30min-P2.lcd
方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$J632 - J632-20260320-FX278.lcb
样品瓶号: 1-14
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2026/03/20 18:42:07 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2026/03/23 09:04:31 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 245nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.077	336615	100.000	57151	2896	1.033	--
总计		336615	100.000	57151			

图32 盐酸伐地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6031101批(10mg规格)-均一性2-pH6.8介质-30min-片2
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.8ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长: 245nm
数据文件名: RC\$J632 - 11-10/29-2266-2 - zzp-6031101p-rcqx-pH6.8jz-10mg-jyx2-30min-P3.lcd
方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$J632 - J632-20260320-FX278.lcb
样品瓶号: 1-23
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2026/03/20 18:45:30 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2): 2026/03/23 09:04:34 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 245nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.077	321200	100.000	54551	2898	1.033	--
总计		321200	100.000	54551			

图33 盐酸伐地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6031101批(10mg规格)-均一性2-pH6.8介质-30min-片3
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.8ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长: 245nm
数据文件名: RC\$J632 - 11-10/29-2267-2 - zzp-6031101p-rcqx-pH6.8jz-10mg-jyx2-30min-P4.lcd
方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$J632 - J632-20260320-FX278.lcb
样品瓶号: 1-32
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2026/03/20 18:48:52 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2): 2026/03/23 09:04:37 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 245nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.078	349366	100.000	59325	2895	1.033	--
总计		349366	100.000	59325			

图34 盐酸伐地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6031101批(10mg规格)-均一性2-pH6.8介质-30min-片4
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.8ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长: 245nm
数据文件名: RC\$J632 - 11-10/29-2268-2 - zzp-6031101p-rcqx-pH6.8jz-10mg-jyx2-30min-P5.lcd
方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$J632 - J632-20260320-FX278.lcb
样品瓶号: 1-41
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2026/03/20 18:52:15 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2): 2026/03/23 09:04:39 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 245nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.078	334533	100.000	56824	2895	1.033	--
总计		334533	100.000	56824			

图35 盐酸伐地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6031101批(10mg规格)-均一性2-pH6.8介质-30min-片5
供试品溶液-1




J632

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.8ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长: 245nm
数据文件名: RC\$J632 - 11-10/29-2269-2 - zzp-6031101p-rcqx-pH6.8jz-10mg-jyx2-30min-P6.lcd
方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$J632 - J632-20260320-FX278.lcb
样品瓶号: 1-50
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2026/03/20 18:55:38 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2): 2026/03/23 09:04:42 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 245nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.078	311453	100.000	53020	2901	1.033	--
总计		311453	100.000	53020			

图36 盐酸伐地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6031101批(10mg规格)-均一性2-pH6.8介质-30min-片6
供试品溶液-1




J632

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.8ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长: 245nm
数据文件名: RC\$J632 - 11-10/29-2270-2 - zzp-6031101p-rcqx-pH6.8jz-10mg-jyx2-45min-P1.lcd
方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$J632 - J632-20260320-FX278.lcb
样品瓶号: 1-6
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2026/03/20 18:59:01 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2): 2026/03/23 09:04:44 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 245nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.076	361804	100.000	61325	2893	1.035	--
总计		361804	100.000	61325			

图37 盐酸伐地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6031101批(10mg规格)-均一性2-pH6.8介质-45min-片1
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.8ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长: 245nm
数据文件名: RC\$J632 - 11-10/29-2271-2 - zzp-6031101p-rcqx-pH6.8jz-10mg-jyx2-45min-P2.lcd
方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$J632 - J632-20260320-FX278.lcb
样品瓶号: 1-15
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2026/03/20 19:02:24 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2): 2026/03/23 09:04:47 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 245nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.078	367594	100.000	62455	2892	1.034	--
总计		367594	100.000	62455			

图38 盐酸伐地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6031101批(10mg规格)-均一性2-pH6.8介质-45min-片2
供试品溶液-1




J632

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.8ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长: 245nm
数据文件名: RC\$J632 - 11-10/29-2272-2 - zzp-6031101p-rcqx-pH6.8jz-10mg-jyx2-45min-P3.lcd
方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$J632 - J632-20260320-FX278.lcb
样品瓶号: 1-24
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2026/03/20 19:05:48 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2): 2026/03/23 09:04:50 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 245nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.077	357929	100.000	60731	2888	1.033	--
总计		357929	100.000	60731			

图39 盐酸伐地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6031101批(10mg规格)-均一性2-pH6.8介质-45min-片3
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.8ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长: 245nm
数据文件名: RC\$J632 - 11-10/29-2273-2 - zzp-6031101p-rcqx-pH6.8jz-10mg-jyx2-45min-P4.lcd
方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$J632 - J632-20260320-FX278.lcb
样品瓶号: 1-33
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2026/03/20 19:09:09 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2): 2026/03/23 09:04:52 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 245nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.077	373546	100.000	63346	2884	1.034	--
总计		373546	100.000	63346			

图40 盐酸伐地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6031101批(10mg规格)-均一性2-pH6.8介质-45min-片4
供试品溶液-1




J632

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.8ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长: 245nm
数据文件名: RC\$J632 - 11-10/29-2274-2 - zzp-6031101p-rcqx-pH6.8jz-10mg-jyx2-45min-P5.lcd
方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$J632 - J632-20260320-FX278.lcb
样品瓶号: 1-42
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2026/03/20 19:12:33 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2): 2026/03/23 09:04:55 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 245nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.078	357791	100.000	60725	2885	1.033	--
总计		357791	100.000	60725			

图41 盐酸伐地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6031101批(10mg规格)-均一性2-pH6.8介质-45min-片5
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.8ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长: 245nm
数据文件名: RC\$J632 - 11-10/29-2275-2 - zzp-6031101p-rcqx-pH6.8jz-10mg-jyx2-45min-P6.lcd
方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$J632 - J632-20260320-FX278.lcb
样品瓶号: 1-51
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2026/03/20 19:15:55 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2): 2026/03/23 09:04:57 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 245nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.078	348144	100.000	59049	2884	1.034	--
总计		348144	100.000	59049			

图42 盐酸伐地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6031101批(10mg规格)-均一性2-pH6.8介质-45min-片6
供试品溶液-1




J632

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.8ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长: 245nm
数据文件名: RC\$J632 - 11-10/29-2276-2 - zzp-6031101p-rcqx-pH6.8jz-10mg-jyx2-60min-P1.lcd
方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$J632 - J632-20260320-FX278.lcb
样品瓶号: 1-7
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2026/03/20 19:19:18 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2): 2026/03/23 09:05:00 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 245nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.077	378376	100.000	64187	2885	1.035	--
总计		378376	100.000	64187			

图43 盐酸伐地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6031101批(10mg规格)-均一性2-pH6.8介质-60min-片1
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.8ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长: 245nm
数据文件名: RC\$J632 - 11-10/29-2277-2 - zzp-6031101p-rcqx-pH6.8jz-10mg-jyx2-60min-P2.lcd
方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$J632 - J632-20260320-FX278.lcb
样品瓶号: 1-16
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2026/03/20 19:22:41 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2): 2026/03/23 09:05:03 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 245nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.078	384018	100.000	65298	2894	1.035	--
总计		384018	100.000	65298			

图44 盐酸伐地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6031101批(10mg规格)-均一性2-pH6.8介质-60min-片2
供试品溶液-1




J632

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.8ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长: 245nm
数据文件名: RC\$J632 - 11-10/29-2278-2 - zzp-6031101p-rcqx-pH6.8jz-10mg-jyx2-60min-P3.lcd
方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$J632 - J632-20260320-FX278.lcb
样品瓶号: 1-25
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2026/03/20 19:26:04 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2026/03/23 09:05:05 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 245nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.077	383154	100.000	65097	2893	1.035	--
总计		383154	100.000	65097			

图45 盐酸伐地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6031101批(10mg规格)-均一性2-pH6.8介质-60min-片3
供试品溶液-1




J632

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.8ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长: 245nm
数据文件名: RC\$J632 - 11-10/29-2279-2 - zzp-6031101p-rcqx-pH6.8jz-10mg-jyx2-60min-P4.lcd
方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$J632 - J632-20260320-FX278.lcb
样品瓶号: 1-34
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2026/03/20 19:29:26 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2026/03/23 09:05:08 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 245nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.078	388339	100.000	66007	2896	1.037	--
总计		388339	100.000	66007			

图46 盐酸伐地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6031101批(10mg规格)-均一性2-pH6.8介质-60min-片4
供试品溶液-1




J632

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.8ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长: 245nm
数据文件名: RC\$J632 - 11-10/29-2280-2 - zzp-6031101p-rcqx-pH6.8jz-10mg-jyx2-60min-P5.lcd
方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$J632 - J632-20260320-FX278.lcb
样品瓶号: 1-43
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2026/03/20 19:32:50 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2): 2026/03/23 09:05:10 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 245nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.077	371273	100.000	63039	2893	1.035	--
总计		371273	100.000	63039			

图47 盐酸伐地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6031101批(10mg规格)-均一性2-pH6.8介质-60min-片5
供试品溶液-1




J632

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.8ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长: 245nm
数据文件名: RC\$J632 - 11-10/29-2281-2 - zzp-6031101p-rcqx-pH6.8jz-10mg-jyx2-60min-P6.lcd
方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$J632 - J632-20260320-FX278.lcb
样品瓶号: 1-52
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2026/03/20 19:36:12 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2026/03/23 09:05:13 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 245nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.077	357879	100.000	60648	2887	1.034	--
总计		357879	100.000	60648			

图48 盐酸伐地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6031101批(10mg规格)-均一性2-pH6.8介质-60min-片6
供试品溶液-1




J632

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.8ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长: 245nm
数据文件名: RC\$J632 - 11-10/29-2282-2 - zzp-6031101p-rcqx-pH6.8jz-10mg-jyx2-90min-P1.lcd
方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$J632 - J632-20260320-FX278.lcb
样品瓶号: 1-8
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2026/03/20 19:39:36 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2026/03/23 09:05:16 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 245nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.078	391510	100.000	66558	2898	1.036	--
总计		391510	100.000	66558			

图49 盐酸伐地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6031101批(10mg规格)-均一性2-pH6.8介质-90min-片1
供试品溶液-1




J632

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.8ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长: 245nm
数据文件名: RC\$J632 - 11-10/29-2283-2 - zzp-6031101p-rcqx-pH6.8jz-10mg-jyx2-90min-P2.lcd
方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$J632 - J632-20260320-FX278.lcb
样品瓶号: 1-17
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2026/03/20 19:42:59 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2026/03/23 09:05:18 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 245nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.077	399391	100.000	67825	2890	1.037	--
总计		399391	100.000	67825			

图50 盐酸伐地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6031101批(10mg规格)-均一性2-pH6.8介质-90min-片2
供试品溶液-1




J632

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.8ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长: 245nm
数据文件名: RC\$J632 - 11-10/29-2284-2 - zzp-6031101p-rcqx-pH6.8jz-10mg-jyx2-90min-P3.lcd
方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$J632 - J632-20260320-FX278.lcb
样品瓶号: 1-26
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2026/03/20 19:46:23 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2): 2026/03/23 09:05:21 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 245nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.077	404498	100.000	68709	2892	1.036	--
总计		404498	100.000	68709			

图51 盐酸伐地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6031101批(10mg规格)-均一性2-pH6.8介质-90min-片3
供试品溶液-1




J632

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.8ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长: 245nm
数据文件名: RC\$J632 - 11-10/29-2285-2 - zzp-6031101p-rcqx-pH6.8jz-10mg-jyx2-90min-P4.lcd
方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$J632 - J632-20260320-FX278.lcb
样品瓶号: 1-35
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2026/03/20 19:49:46 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2): 2026/03/23 09:05:24 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 245nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.078	401020	100.000	68076	2891	1.036	--
总计		401020	100.000	68076			

图52 盐酸伐地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6031101批(10mg规格)-均一性2-pH6.8介质-90min-片4
供试品溶液-1




J632

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.8ml/min
柱温:40°C 波长: 245nm
数据文件名: RC\$J632 - 11-10/29-2286-2 - zzp-6031101p-rcqx-pH6.8jz-10mg-jyx2-90min-P5.lcd
方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$J632 - J632-20260320-FX278.lcb
样品瓶号: 1-44
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2026/03/20 19:53:10 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2): 2026/03/23 09:05:26 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 245nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.078	391542	100.000	66457	2885	1.036	--
总计		391542	100.000	66457			

图53 盐酸伐地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6031101批(10mg规格)-均一性2-pH6.8介质-90min-片5
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.8ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长: 245nm
数据文件名: RC\$J632 - 11-10/29-2287-2 - zzp-6031101p-rcqx-pH6.8jz-10mg-jyx2-90min-P6.lcd
方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$J632 - J632-20260320-FX278.lcb
样品瓶号: 1-53
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2026/03/20 19:56:33 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2): 2026/03/23 09:05:29 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 245nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.077	370540	100.000	62766	2883	1.036	--
总计		370540	100.000	62766			

图54 盐酸伐地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6031101批(10mg规格)-均一性2-pH6.8介质-90min-片6
供试品溶液-1




J632

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.8ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长: 245nm
数据文件名: RC\$J632 - 11-10/29-2288-2 - zzp-6031101p-rcqx-pH6.8jz-10mg-jyx2-120min-P1.lcd
方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$J632 - J632-20260320-FX278.lcb
样品瓶号: 4-1
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2026/03/20 19:59:56 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2): 2026/03/23 09:05:32 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 245nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.077	394289	100.000	66914	2891	1.036	--
总计		394289	100.000	66914			

图55 盐酸伐地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6031101批(10mg规格)-均一性2-pH6.8介质-120min-片1
供试品溶液-1




J632

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.8ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长: 245nm
数据文件名: RC\$J632 - 11-10/29-2289-2 - zzp-6031101p-rcqx-pH6.8jz-10mg-jyx2-120min-P2.lcd
方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$J632 - J632-20260320-FX278.lcb
样品瓶号: 4-10
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2026/03/20 20:03:19 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2): 2026/03/23 09:05:35 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 245nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.077	397473	100.000	67347	2889	1.037	--
总计		397473	100.000	67347			

图56 盐酸伐地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6031101批(10mg规格)-均一性2-pH6.8介质-120min-片2
供试品溶液-1




J632

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.8ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长: 245nm
数据文件名: RC\$J632 - 11-10/29-2290-2 - zzp-6031101p-rcqx-pH6.8jz-10mg-jyx2-120min-P3.lcd
方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$J632 - J632-20260320-FX278.lcb
样品瓶号: 4-19
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2026/03/20 20:06:42 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2): 2026/03/23 09:05:37 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 245nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.077	409404	100.000	69445	2890	1.037	--
总计		409404	100.000	69445			

图57 盐酸伐地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6031101批(10mg规格)-均一性2-pH6.8介质-120min-片3
供试品溶液-1




J632

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.8ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长: 245nm
数据文件名: RC\$J632 - 11-10/29-2291-2 - zzp-6031101p-rcqx-pH6.8jz-10mg-jyx2-120min-P4.lcd
方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$J632 - J632-20260320-FX278.lcb
样品瓶号: 4-28
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2026/03/20 20:10:05 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2026/03/23 09:05:40 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 245nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.077	406971	100.000	68983	2886	1.036	--
总计		406971	100.000	68983			

图58 盐酸伐地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6031101批(10mg规格)-均一性2-pH6.8介质-120min-片4
供试品溶液-1




J632

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.8ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长: 245nm
数据文件名: RC\$J632 - 11-10/29-2292-2 - zzp-6031101p-rcqx-pH6.8jz-10mg-jyx2-120min-P5.lcd
方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$J632 - J632-20260320-FX278.lcb
样品瓶号: 4-37
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2026/03/20 20:13:29 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2): 2026/03/23 09:05:45 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 245nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.077	391536	100.000	66411	2888	1.038	--
总计		391536	100.000	66411			

图59 盐酸伐地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6031101批(10mg规格)-均一性2-pH6.8介质-120min-片5
供试品溶液-1




J632

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.8ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长: 245nm
数据文件名: RC\$J632 - 11-10/29-2293-2 - zzp-6031101p-rcqx-pH6.8jz-10mg-jyx2-120min-P6.lcd
方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$J632 - J632-20260320-FX278.lcb
样品瓶号: 4-46
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2026/03/20 20:16:51 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2): 2026/03/23 09:05:48 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 245nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.077	375942	100.000	63725	2887	1.037	--
总计		375942	100.000	63725			

图60 盐酸伐地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6031101批(10mg规格)-均一性2-pH6.8介质-120min-片6
供试品溶液-1




J632

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.8ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长: 245nm
数据文件名: RC\$J632 - 11-10/29-2294-2 - zzp-6031101p-rcqx-pH6.8jz-10mg-jyx2-jx-P1.lcd
方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$J632 - J632-20260320-FX278.lcb
样品瓶号: 4-2
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2026/03/20 20:20:14 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2026/03/23 09:05:50 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 245nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.078	409144	100.000	69509	2890	1.038	--
总计		409144	100.000	69509			

图61 盐酸伐地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6031101批(10mg规格)-均一性2-pH6.8介质-极限转速-片1
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.8ml/min
柱温:40°C 波长: 245nm
数据文件名: RC\$J632 - 11-10/29-2295-2 - zzp-6031101p-rcqx-pH6.8jz-10mg-jyx2-jx-P2.lcd
方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$J632 - J632-20260320-FX278.lcb
样品瓶号: 4-11
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2026/03/20 20:23:39 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2026/03/23 09:05:53 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 245nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.077	414211	100.000	70167	2882	1.038	--
总计		414211	100.000	70167			

图62 盐酸伐地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6031101批(10mg规格)-均一性2-pH6.8介质-极限转速-片2
供试品溶液-1




J632

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.8ml/min
柱温:40°C 波长: 245nm
数据文件名: RC\$J632 - 11-10/29-2296-2 - zzp-6031101p-rcqx-pH6.8jz-10mg-jyx2-jx-P3.lcd
方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$J632 - J632-20260320-FX278.lcb
样品瓶号: 4-20
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2026/03/20 20:27:02 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2026/03/23 09:05:55 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 245nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.077	418606	100.000	70849	2879	1.038	--
总计		418606	100.000	70849			

图63 盐酸伐地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6031101批(10mg规格)-均一性2-pH6.8介质-极限转速-片3
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.8ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长: 245nm
数据文件名: RC\$J632 - 11-10/29-2297-2 - zzp-6031101p-rcqx-pH6.8jz-10mg-jyx2-jx-P4.lcd
方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$J632 - J632-20260320-FX278.lcb
样品瓶号: 4-29
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2026/03/20 20:30:25 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2026/03/23 09:05:58 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 245nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.077	403770	100.000	68511	2884	1.038	--
总计		403770	100.000	68511			

图64 盐酸伐地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6031101批(10mg规格)-均一性2-pH6.8介质-极限转速-片4
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.8ml/min
柱温:40°C 波长: 245nm
数据文件名: RC\$J632 - 11-10/29-2298-2 - zzp-6031101p-rcqx-pH6.8jz-10mg-jyx2-jx-P5.lcd
方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$J632 - J632-20260320-FX278.lcb
样品瓶号: 4-38
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2026/03/20 20:33:48 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2026/03/23 09:06:01 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 245nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.078	401582	100.000	68192	2888	1.039	--
总计		401582	100.000	68192			

图65 盐酸伐地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6031101批(10mg规格)-均一性2-pH6.8介质-极限转速-片5
供试品溶液-1




J632

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.8ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长: 245nm
数据文件名: RC\$J632 - 11-10/29-2299-2 - zzp-6031101p-rcqx-pH6.8jz-10mg-jyx2-jx-P6.lcd
方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$J632 - J632-20260320-FX278.lcb
样品瓶号: 4-47
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2026/03/20 20:37:12 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2026/03/23 09:06:03 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 245nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.078	381991	100.000	64998	2897	1.038	--
总计		381991	100.000	64998			

图66 盐酸伐地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6031101批(10mg规格)-均一性2-pH6.8介质-极限转速-片6
供试品溶液-1




J632

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.8ml/min
柱温:40°C 波长: 245nm
数据文件名: RC\$J632 - 11-10/29-2300-2 - zzp-6031101p-rcqx-pH6.8jz-10mg-jyx2-dz2-1.lcd
方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$J632 - J632-20260320-FX278.lcb
样品瓶号: 1-27
进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
进样时间: 2026/03/20 20:40:37 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2): 2026/03/23 09:06:06 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 245nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.026	388032	100.000	62077	2449	1.049	--
总计		388032	100.000	62077			

图67 盐酸伐地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6031101批(10mg规格)-均一性2-pH6.8介质
对照品溶液-2-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.8ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长: 245nm
数据文件名: RC\$J632 - 11-10/29-2301-2 - zzp-6031101p-rcqx-pH6.8jz-10mg-jyx2-dz2-2.lcd
方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$J632 - J632-20260320-FX278.lcb
样品瓶号: 1-27
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2026/03/20 20:44:00 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2): 2026/03/23 09:06:09 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 245nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.025	388200	100.000	62114	2446	1.050	--
总计		388200	100.000	62114			

图68 盐酸伐地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6031101批(10mg规格)-均一性2-pH6.8介质
对照品溶液-2-2




J632

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.8ml/min
柱温:40°C 波长: 245nm
数据文件名: RC\$J632 - 11-10/29-2302-2 - zzp-6031102p-rcqx-pH6.8jz-10mg-jyx2-rj.lcd
方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$J632 - J632-20260320-FX278.lcb
样品瓶号: 2-9
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2026/03/20 20:47:25 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2): 2026/03/23 09:06:11 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 245nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图69 盐酸伐地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6031102批(10mg规格)-均一性2-pH6.8介质
溶剂




J632

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.8ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长: 245nm
数据文件名: RC\$J632 - 11-10/29-2303-2 - zzp-6031102p-rcqx-pH6.8jz-10mg-jyx2-dz1-1.lcd
方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$J632 - J632-20260320-FX278.lcb
样品瓶号: 2-18
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2026/03/20 20:50:51 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2): 2026/03/23 09:06:14 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 245nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.026	387775	100.000	62057	2449	1.049	--
总计		387775	100.000	62057			

图70 盐酸伐地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6031102批(10mg规格)-均一性2-pH6.8介质
对照品溶液-1-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.8ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长: 245nm
数据文件名: RC\$J632 - 11-10/29-2304-2 - zzp-6031102p-rcqx-pH6.8jz-10mg-jyx2-dz1-2.lcd
方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$J632 - J632-20260320-FX278.lcb
样品瓶号: 2-18
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2026/03/20 20:54:16 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2): 2026/03/23 09:06:16 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 245nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.026	387825	100.000	62040	2449	1.049	--
总计		387825	100.000	62040			

图71 盐酸伐地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6031102批(10mg规格)-均一性2-pH6.8介质
对照品溶液-1-2

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.8ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长: 245nm
数据文件名: RC\$J632 - 11-10/29-2305-2 - zzp-6031102p-rcqx-pH6.8jz-10mg-jyx2-dz1-3.lcd
方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$J632 - J632-20260320-FX278.lcb
样品瓶号: 2-18
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2026/03/20 20:57:41 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2): 2026/03/23 09:06:19 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 245nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.025	387703	100.000	62069	2448	1.050	--
总计		387703	100.000	62069			

图72 盐酸伐地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6031102批(10mg规格)-均一性2-pH6.8介质
对照品溶液-1-3

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.8ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长: 245nm
数据文件名: RC\$J632 - 11-10/29-2306-2 - zzp-6031102p-rcqx-pH6.8jz-10mg-jyx2-dz1-4.lcd
方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$J632 - J632-20260320-FX278.lcb
样品瓶号: 2-18
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2026/03/20 21:01:05 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2): 2026/03/23 09:06:22 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 245nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.026	388258	100.000	62040	2444	1.049	--
总计		388258	100.000	62040			

图73 盐酸伐地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6031102批(10mg规格)-均一性2-pH6.8介质
对照品溶液-1-4

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.8ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长: 245nm
数据文件名: RC\$J632 - 11-10/29-2307-2 - zzp-6031102p-rcqx-pH6.8jz-10mg-jyx2-dz1-5.lcd
方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$J632 - J632-20260320-FX278.lcb
样品瓶号: 2-18
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2026/03/20 21:04:30 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2): 2026/03/23 09:06:24 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 245nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.026	388329	100.000	62120	2449	1.050	--
总计		388329	100.000	62120			

图74 盐酸伐地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6031102批(10mg规格)-均一性2-pH6.8介质
对照品溶液-1-5

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.8ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长: 245nm
数据文件名: RC\$J632 - 11-10/29-2308-2 - zzp-6031102p-rcqx-pH6.8jz-10mg-jyx2-5min-P1.lcd
方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$J632 - J632-20260320-FX278.lcb
样品瓶号: 2-1
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2026/03/20 21:07:55 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2): 2026/03/23 09:06:27 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 245nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.079	185949	100.000	31739	2908	1.032	--
总计		185949	100.000	31739			

图75 盐酸伐地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6031102批(10mg规格)-均一性2-pH6.8介质-5min-片1
供试品溶液-1




J632

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.8ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长: 245nm
数据文件名: RC\$J632 - 11-10/29-2309-2 - zzp-6031102p-rcqx-pH6.8jz-10mg-jyx2-5min-P2.lcd
方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$J632 - J632-20260320-FX278.lcb
样品瓶号: 2-10
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2026/03/20 21:11:19 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2): 2026/03/23 09:06:30 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 245nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.080	170620	100.000	29167	2909	1.031	--
总计		170620	100.000	29167			

图76 盐酸伐地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6031102批(10mg规格)-均一性2-pH6.8介质-5min-片2
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.8ml/min
柱温:40°C 波长: 245nm
数据文件名: RC\$J632 - 11-10/29-2310-2 - zzp-6031102p-rcqx-pH6.8jz-10mg-jyx2-5min-P3.lcd
方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$J632 - J632-20260320-FX278.lcb
样品瓶号: 2-19
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2026/03/20 21:14:43 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2026/03/23 09:06:32 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 245nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.079	208349	100.000	35529	2900	1.030	--
总计		208349	100.000	35529			

图77 盐酸伐地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6031102批(10mg规格)-均一性2-pH6.8介质-5min-片3
供试品溶液-1




J632

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.8ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长: 245nm
数据文件名: RC\$J632 - 11-10/29-2311-2 - zzp-6031102p-rcqx-pH6.8jz-10mg-jyx2-5min-P4.lcd
方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$J632 - J632-20260320-FX278.lcb
样品瓶号: 2-28
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2026/03/20 21:18:07 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2): 2026/03/23 09:06:35 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 245nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.080	166673	100.000	28455	2904	1.030	--
总计		166673	100.000	28455			

图78 盐酸伐地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6031102批(10mg规格)-均一性2-pH6.8介质-5min-片4
供试品溶液-1




J632

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.8ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长: 245nm
数据文件名: RC\$J632 - 11-10/29-2312-2 - zzp-6031102p-rcqx-pH6.8jz-10mg-jyx2-5min-P5.lcd
方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$J632 - J632-20260320-FX278.lcb
样品瓶号: 2-37
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2026/03/20 21:21:30 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2): 2026/03/23 09:06:38 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 245nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.079	189701	100.000	32346	2902	1.033	--
总计		189701	100.000	32346			

图79 盐酸伐地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6031102批(10mg规格)-均一性2-pH6.8介质-5min-片5
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.8ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长: 245nm
数据文件名: RC\$J632 - 11-10/29-2313-2 - zzp-6031102p-rcqx-pH6.8jz-10mg-jyx2-5min-P6.lcd
方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$J632 - J632-20260320-FX278.lcb
样品瓶号: 2-46
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2026/03/20 21:24:54 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2026/03/23 09:06:40 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 245nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.079	184071	100.000	31403	2911	1.032	--
总计		184071	100.000	31403			

图80 盐酸伐地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6031102批(10mg规格)-均一性2-pH6.8介质-5min-片6
供试品溶液-1




J632

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.8ml/min
柱温:40°C 波长: 245nm
数据文件名: RC\$J632 - 11-10/29-2314-2 - zzp-6031102p-rcqx-pH6.8jz-10mg-jyx2-10min-P1.lcd
方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$J632 - J632-20260320-FX278.lcb
样品瓶号: 2-2
进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
进样时间: 2026/03/20 21:28:19 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2): 2026/03/23 09:06:43 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 245nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.079	229213	100.000	39143	2913	1.033	--
总计		229213	100.000	39143			

图81 盐酸伐地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6031102批(10mg规格)-均一性2-pH6.8介质-10min-片1
供试品溶液-1




J632

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.8ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长: 245nm
数据文件名: RC\$J632 - 11-10/29-2315-2 - zzp-6031102p-rcqx-pH6.8jz-10mg-jyx2-10min-P2.lcd
方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$J632 - J632-20260320-FX278.lcb
样品瓶号: 2-11
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2026/03/20 21:31:44 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2): 2026/03/23 09:06:45 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 245nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.079	215357	100.000	36807	2915	1.033	--
总计		215357	100.000	36807			

图82 盐酸伐地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6031102批(10mg规格)-均一性2-pH6.8介质-10min-片2
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.8ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长: 245nm
数据文件名: RC\$J632 - 11-10/29-2316-2 - zzp-6031102p-rcqx-pH6.8jz-10mg-jyx2-10min-P3.lcd
方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$J632 - J632-20260320-FX278.lcb
样品瓶号: 2-20
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2026/03/20 21:35:07 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2026/03/23 09:06:48 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 245nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.079	249065	100.000	42556	2914	1.034	--
总计		249065	100.000	42556			

图83 盐酸伐地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6031102批(10mg规格)-均一性2-pH6.8介质-10min-片3
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.8ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长: 245nm
数据文件名: RC\$J632 - 11-10/29-2317-2 - zzp-6031102p-rcqx-pH6.8jz-10mg-jyx2-10min-P4.lcd
方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$J632 - J632-20260320-FX278.lcb
样品瓶号: 2-29
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2026/03/20 21:38:31 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2026/03/23 09:06:50 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 245nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.079	211027	100.000	36092	2914	1.032	--
总计		211027	100.000	36092			

图84 盐酸伐地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6031102批(10mg规格)-均一性2-pH6.8介质-10min-片4
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.8ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长: 245nm
数据文件名: RC\$J632 - 11-10/29-2318-2 - zzp-6031102p-rcqx-pH6.8jz-10mg-jyx2-10min-P5.lcd
方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$J632 - J632-20260320-FX278.lcb
样品瓶号: 2-38
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2026/03/20 21:41:55 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2): 2026/03/23 09:06:53 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 245nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.079	240823	100.000	41132	2912	1.034	--
总计		240823	100.000	41132			

图85 盐酸伐地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6031102批(10mg规格)-均一性2-pH6.8介质-10min-片5
供试品溶液-1




J632

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.8ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长: 245nm
数据文件名: RC\$J632 - 11-10/29-2319-2 - zzp-6031102p-rcqx-pH6.8jz-10mg-jyx2-10min-P6.lcd
方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$J632 - J632-20260320-FX278.lcb
样品瓶号: 2-47
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2026/03/20 21:45:20 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2026/03/23 09:06:56 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 245nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.079	230703	100.000	39383	2911	1.034	--
总计		230703	100.000	39383			

图86 盐酸伐地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6031102批(10mg规格)-均一性2-pH6.8介质-10min-片6
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.8ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长: 245nm
数据文件名: RC\$J632 - 11-10/29-2320-2 - zzp-6031102p-rcqx-pH6.8jz-10mg-jyx2-15min-P1.lcd
方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$J632 - J632-20260320-FX278.lcb
样品瓶号: 2-3
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2026/03/20 21:48:44 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2026/03/23 09:06:58 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 245nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.079	261696	100.000	44626	2905	1.035	--
总计		261696	100.000	44626			

图87 盐酸伐地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6031102批(10mg规格)-均一性2-pH6.8介质-15min-片1
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.8ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长: 245nm
数据文件名: RC\$J632 - 11-10/29-2321-2 - zzp-6031102p-rcqx-pH6.8jz-10mg-jyx2-15min-P2.lcd
方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$J632 - J632-20260320-FX278.lcb
样品瓶号: 2-12
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2026/03/20 21:52:09 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2): 2026/03/23 09:07:01 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 245nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.079	251830	100.000	42924	2902	1.033	--
总计		251830	100.000	42924			

图88 盐酸伐地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6031102批(10mg规格)-均一性2-pH6.8介质-15min-片2
供试品溶液-1




J632

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.8ml/min
柱温:40°C 波长: 245nm
数据文件名: RC\$J632 - 11-10/29-2322-2 - zzp-6031102p-rcqx-pH6.8jz-10mg-jyx2-15min-P3.lcd
方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$J632 - J632-20260320-FX278.lcb
样品瓶号: 2-21
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2026/03/20 21:55:33 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2): 2026/03/23 09:07:04 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 245nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.079	283205	100.000	48260	2904	1.035	--
总计		283205	100.000	48260			

图89 盐酸伐地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6031102批(10mg规格)-均一性2-pH6.8介质-15min-片3
供试品溶液-1




J632

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.8ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长: 245nm
数据文件名: RC\$J632 - 11-10/29-2323-2 - zzp-6031102p-rcqx-pH6.8jz-10mg-jyx2-15min-P4.lcd
方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$J632 - J632-20260320-FX278.lcb
样品瓶号: 2-30
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2026/03/20 21:58:57 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2): 2026/03/23 09:07:06 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 245nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.079	245219	100.000	41845	2906	1.034	--
总计		245219	100.000	41845			

图90 盐酸伐地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6031102批(10mg规格)-均一性2-pH6.8介质-15min-片4
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.8ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长: 245nm
数据文件名: RC\$J632 - 11-10/29-2324-2 - zzp-6031102p-rcqx-pH6.8jz-10mg-jyx2-15min-P5.lcd
方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$J632 - J632-20260320-FX278.lcb
样品瓶号: 2-39
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2026/03/20 22:02:21 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2): 2026/03/23 09:07:09 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 245nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.079	276711	100.000	47090	2897	1.035	--
总计		276711	100.000	47090			

图91 盐酸伐地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6031102批(10mg规格)-均一性2-pH6.8介质-15min-片5
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.8ml/min
柱温:40°C 波长: 245nm
数据文件名: RC\$J632 - 11-10/29-2325-2 - zzp-6031102p-rcqx-pH6.8jz-10mg-jyx2-15min-P6.lcd
方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$J632 - J632-20260320-FX278.lcb
样品瓶号: 2-48
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2026/03/20 22:05:46 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2026/03/23 09:07:12 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 245nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.079	265527	100.000	45239	2900	1.033	--
总计		265527	100.000	45239			

图92 盐酸伐地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6031102批(10mg规格)-均一性2-pH6.8介质-15min-片6
供试品溶液-1




J632

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.8ml/min
柱温:40°C 波长: 245nm
数据文件名: RC\$J632 - 11-10/29-2326-2 - zzp-6031102p-rcqx-pH6.8jz-10mg-jyx2-20min-P1.lcd
方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$J632 - J632-20260320-FX278.lcb
样品瓶号: 2-4
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2026/03/20 22:09:10 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2026/03/23 09:07:14 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 245nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.080	285518	100.000	48690	2907	1.034	--
总计		285518	100.000	48690			

图93 盐酸伐地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6031102批(10mg规格)-均一性2-pH6.8介质-20min-片1
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.8ml/min
柱温:40°C 波长: 245nm
数据文件名: RC\$J632 - 11-10/29-2327-2 - zzp-6031102p-rcqx-pH6.8jz-10mg-jyx2-20min-P2.lcd
方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$J632 - J632-20260320-FX278.lcb
样品瓶号: 2-13
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2026/03/20 22:12:35 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2): 2026/03/23 09:07:17 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 245nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.079	276810	100.000	47196	2900	1.035	--
总计		276810	100.000	47196			

图94 盐酸伐地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6031102批(10mg规格)-均一性2-pH6.8介质-20min-片2
供试品溶液-1




J632

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.8ml/min
柱温:40°C 波长: 245nm
数据文件名: RC\$J632 - 11-10/29-2328-2 - zzp-6031102p-rcqx-pH6.8jz-10mg-jyx2-20min-P3.lcd
方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$J632 - J632-20260320-FX278.lcb
样品瓶号: 2-22
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2026/03/20 22:16:00 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2026/03/23 09:07:20 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 245nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.079	304417	100.000	51871	2899	1.036	--
总计		304417	100.000	51871			

图95 盐酸伐地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6031102批(10mg规格)-均一性2-pH6.8介质-20min-片3
供试品溶液-1




J632

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.8ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长: 245nm
数据文件名: RC\$J632 - 11-10/29-2329-2 - zzp-6031102p-rcqx-pH6.8jz-10mg-jyx2-20min-P4.lcd
方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$J632 - J632-20260320-FX278.lcb
样品瓶号: 2-31
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2026/03/20 22:19:23 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2): 2026/03/23 09:07:22 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 245nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.079	268630	100.000	45776	2903	1.035	--
总计		268630	100.000	45776			

图96 盐酸伐地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6031102批(10mg规格)-均一性2-pH6.8介质-20min-片4
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.8ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长: 245nm
数据文件名: RC\$J632 - 11-10/29-2330-2 - zzp-6031102p-rcqx-pH6.8jz-10mg-jyx2-20min-P5.lcd
方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$J632 - J632-20260320-FX278.lcb
样品瓶号: 2-40
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2026/03/20 22:22:48 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2026/03/23 09:07:25 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 245nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.079	300484	100.000	51239	2906	1.035	--
总计		300484	100.000	51239			

图97 盐酸伐地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6031102批(10mg规格)-均一性2-pH6.8介质-20min-片5
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.8ml/min
柱温:40°C 波长: 245nm
数据文件名: RC\$J632 - 11-10/29-2331-2 - zzp-6031102p-rcqx-pH6.8jz-10mg-jyx2-20min-P6.lcd
方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$J632 - J632-20260320-FX278.lcb
样品瓶号: 2-49
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2026/03/20 22:26:12 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2026/03/23 09:07:27 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 245nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.079	288446	100.000	49140	2904	1.035	--
总计		288446	100.000	49140			

图98 盐酸伐地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6031102批(10mg规格)-均一性2-pH6.8介质-20min-片6
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.8ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长: 245nm
数据文件名: RC\$J632 - 11-10/29-2332-2 - zzp-6031102p-rcqx-pH6.8jz-10mg-jyx2-30min-P1.lcd
方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$J632 - J632-20260320-FX278.lcb
样品瓶号: 2-5
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2026/03/20 22:29:36 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2): 2026/03/23 09:07:30 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 245nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.079	323093	100.000	55136	2907	1.036	--
总计		323093	100.000	55136			

图99 盐酸伐地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6031102批(10mg规格)-均一性2-pH6.8介质-30min-片1
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.8ml/min
柱温:40°C 波长: 245nm
数据文件名: RC\$J632 - 11-10/29-2333-2 - zzp-6031102p-rcqx-pH6.8jz-10mg-jyx2-30min-P2.lcd
方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$J632 - J632-20260320-FX278.lcb
样品瓶号: 2-14
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2026/03/20 22:33:01 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2): 2026/03/23 09:07:32 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 245nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.078	316107	100.000	53822	2902	1.037	--
总计		316107	100.000	53822			

图100 盐酸伐地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6031102批(10mg规格)-均一性2-pH6.8介质-30min-片2
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.8ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长: 245nm
数据文件名: RC\$J632 - 11-10/29-2334-2 - zzp-6031102p-rcqx-pH6.8jz-10mg-jyx2-30min-P3.lcd
方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$J632 - J632-20260320-FX278.lcb
样品瓶号: 2-23
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2026/03/20 22:36:26 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2): 2026/03/23 09:07:35 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>


检测器A Ch1 245nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.078	334252	100.000	56848	2894	1.037	--
总计		334252	100.000	56848			

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.8ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长: 245nm
数据文件名: RC\$J632 - 11-10/29-2335-2 - zzp-6031102p-rcqx-pH6.8jz-10mg-jyx2-30min-P4.lcd
方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$J632 - J632-20260320-FX278.lcb
样品瓶号: 2-32
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2026/03/20 22:39:49 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2): 2026/03/23 09:07:38 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 245nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.079	299356	100.000	50984	2897	1.036	--
总计		299356	100.000	50984			




J632

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.8ml/min
柱温:40°C 波长: 245nm
数据文件名: RC\$J632 - 11-10/29-2336-2 - zzp-6031102p-rcqx-pH6.8jz-10mg-jyx2-30min-P5.lcd
方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$J632 - J632-20260320-FX278.lcb
样品瓶号: 2-41
进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
进样时间: 2026/03/20 22:43:13 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2): 2026/03/23 09:07:40 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 245nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.078	334257	100.000	56898	2899	1.037	--
总计		334257	100.000	56898			

图103 盐酸伐地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6031102批(10mg规格)-均一性2-pH6.8介质-30min-片5
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.8ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长: 245nm
数据文件名: RC\$J632 - 11-10/29-2337-2 - zzp-6031102p-rcqx-pH6.8jz-10mg-jyx2-30min-P6.lcd
方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$J632 - J632-20260320-FX278.lcb
样品瓶号: 2-50
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2026/03/20 22:46:37 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2): 2026/03/23 09:07:43 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 245nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.079	321724	100.000	54851	2900	1.037	--
总计		321724	100.000	54851			

图104 盐酸伐地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6031102批(10mg规格)-均一性2-pH6.8介质-30min-片6
供试品溶液-1




J632

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.8ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长: 245nm
数据文件名: RC\$J632 - 11-10/29-2338-2 - zzp-6031102p-rcqx-pH6.8jz-10mg-jyx2-45min-P1.lcd
方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$J632 - J632-20260320-FX278.lcb
样品瓶号: 2-6
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2026/03/20 22:50:02 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2): 2026/03/23 09:07:45 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 245nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.079	345964	100.000	59034	2907	1.038	--
总计		345964	100.000	59034			

图105 盐酸伐地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6031102批(10mg规格)-均一性2-pH6.8介质-45min-片1
供试品溶液-1




J632

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.8ml/min
柱温:40°C 波长: 245nm
数据文件名: RC\$J632 - 11-10/29-2339-2 - zzp-6031102p-rcqx-pH6.8jz-10mg-jyx2-45min-P2.lcd
方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$J632 - J632-20260320-FX278.lcb
样品瓶号: 2-15
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2026/03/20 22:53:27 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2): 2026/03/23 09:07:48 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 245nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.078	343247	100.000	58513	2908	1.038	--
总计		343247	100.000	58513			

图106 盐酸伐地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6031102批(10mg规格)-均一性2-pH6.8介质-45min-片2
供试品溶液-1




J632

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.8ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长: 245nm
数据文件名: RC\$J632 - 11-10/29-2340-2 - zzp-6031102p-rcqx-pH6.8jz-10mg-jyx2-45min-P3.lcd
方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$J632 - J632-20260320-FX278.lcb
样品瓶号: 2-24
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2026/03/20 22:56:51 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2): 2026/03/23 09:07:50 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 245nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.078	355670	100.000	60679	2911	1.039	--
总计		355670	100.000	60679			

图107 盐酸伐地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6031102批(10mg规格)-均一性2-pH6.8介质-45min-片3
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.8ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长: 245nm
数据文件名: RC\$J632 - 11-10/29-2341-2 - zzp-6031102p-rcqx-pH6.8jz-10mg-jyx2-45min-P4.lcd
方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$J632 - J632-20260320-FX278.lcb
样品瓶号: 2-33
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2026/03/20 23:00:16 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2): 2026/03/23 09:07:53 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 245nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.078	326398	100.000	55670	2909	1.038	--
总计		326398	100.000	55670			




J632

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.8ml/min
柱温:40°C 波长: 245nm
数据文件名: RC\$J632 - 11-10/29-2342-2 - zzp-6031102p-rcqx-pH6.8jz-10mg-jyx2-45min-P5.lcd
方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$J632 - J632-20260320-FX278.lcb
样品瓶号: 2-42
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2026/03/20 23:03:40 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2): 2026/03/23 09:07:56 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 245nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.078	359609	100.000	61279	2907	1.039	--
总计		359609	100.000	61279			

图109 盐酸伐地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6031102批(10mg规格)-均一性2-pH6.8介质-45min-片5
供试品溶液-1




J632

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.8ml/min
柱温:40°C 波长: 245nm
数据文件名: RC\$J632 - 11-10/29-2343-2 - zzp-6031102p-rcqx-pH6.8jz-10mg-jyx2-45min-P6.lcd
方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$J632 - J632-20260320-FX278.lcb
样品瓶号: 2-51
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2026/03/20 23:07:04 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2): 2026/03/23 09:07:58 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 245nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.078	349252	100.000	59557	2909	1.039	--
总计		349252	100.000	59557			

图110 盐酸伐地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6031102批(10mg规格)-均一性2-pH6.8介质-45min-片6
供试品溶液-1




J632

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.8ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长: 245nm
数据文件名: RC\$J632 - 11-10/29-2344-2 - zzp-6031102p-rcqx-pH6.8jz-10mg-jyx2-60min-P1.lcd
方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$J632 - J632-20260320-FX278.lcb
样品瓶号: 2-7
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2026/03/20 23:10:28 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2026/03/23 09:08:01 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 245nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.078	361411	100.000	61636	2909	1.039	--
总计		361411	100.000	61636			

图111 盐酸伐地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6031102批(10mg规格)-均一性2-pH6.8介质-60min-片1
供试品溶液-1




J632

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.8ml/min
柱温:40°C 波长: 245nm
数据文件名: RC\$J632 - 11-10/29-2345-2 - zzp-6031102p-rcqx-pH6.8jz-10mg-jyx2-60min-P2.lcd
方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$J632 - J632-20260320-FX278.lcb
样品瓶号: 2-16
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2026/03/20 23:13:53 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2): 2026/03/23 09:08:03 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 245nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.078	360345	100.000	61402	2904	1.038	--
总计		360345	100.000	61402			

图112 盐酸伐地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6031102批(10mg规格)-均一性2-pH6.8介质-60min-片2
供试品溶液-1




J632

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.8ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长: 245nm
数据文件名: RC\$J632 - 11-10/29-2346-2 - zzp-6031102p-rcqx-pH6.8jz-10mg-jyx2-60min-P3.lcd
方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$J632 - J632-20260320-FX278.lcb
样品瓶号: 2-25
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2026/03/20 23:17:18 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2): 2026/03/23 09:08:06 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 245nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.079	369506	100.000	62993	2905	1.040	--
总计		369506	100.000	62993			

图113 盐酸伐地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6031102批(10mg规格)-均一性2-pH6.8介质-60min-片3
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.8ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长: 245nm
数据文件名: RC\$J632 - 11-10/29-2347-2 - zzp-6031102p-rcqx-pH6.8jz-10mg-jyx2-60min-P4.lcd
方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$J632 - J632-20260320-FX278.lcb
样品瓶号: 2-34
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2026/03/20 23:20:43 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2): 2026/03/23 09:08:09 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 245nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.079	340911	100.000	58102	2900	1.038	--
总计		340911	100.000	58102			

图114 盐酸伐地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6031102批(10mg规格)-均一性2-pH6.8介质-60min-片4
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.8ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长: 245nm
数据文件名: RC\$J632 - 11-10/29-2348-2 - zzp-6031102p-rcqx-pH6.8jz-10mg-jyx2-60min-P5.lcd
方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$J632 - J632-20260320-FX278.lcb
样品瓶号: 2-43
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2026/03/20 23:24:08 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2): 2026/03/23 09:08:11 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 245nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.078	371343	100.000	63209	2901	1.039	--
总计		371343	100.000	63209			

图115 盐酸伐地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6031102批(10mg规格)-均一性2-pH6.8介质-60min-片5
供试品溶液-1




J632

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.8ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长: 245nm
数据文件名: RC\$J632 - 11-10/29-2349-2 - zzp-6031102p-rcqx-pH6.8jz-10mg-jyx2-60min-P6.lcd
方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$J632 - J632-20260320-FX278.lcb
样品瓶号: 2-52
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2026/03/20 23:27:32 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2026/03/23 09:08:14 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 245nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.079	360665	100.000	61557	2906	1.040	--
总计		360665	100.000	61557			

图116 盐酸伐地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6031102批(10mg规格)-均一性2-pH6.8介质-60min-片6
供试品溶液-1




J632

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.8ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长: 245nm
数据文件名: RC\$J632 - 11-10/29-2350-2 - zzp-6031102p-rcqx-pH6.8jz-10mg-jyx2-90min-P1.lcd
方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$J632 - J632-20260320-FX278.lcb
样品瓶号: 2-8
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2026/03/20 23:30:57 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2): 2026/03/23 09:08:17 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 245nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.078	373609	100.000	63765	2914	1.039	--
总计		373609	100.000	63765			

图117 盐酸伐地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6031102批(10mg规格)-均一性2-pH6.8介质-90min-片1
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.8ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长: 245nm
数据文件名: RC\$J632 - 11-10/29-2351-2 - zzp-6031102p-rcqx-pH6.8jz-10mg-jyx2-90min-P2.lcd
方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$J632 - J632-20260320-FX278.lcb
样品瓶号: 2-17
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2026/03/20 23:34:22 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2): 2026/03/23 09:08:19 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 245nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.078	371647	100.000	63396	2911	1.039	--
总计		371647	100.000	63396			

图118 盐酸伐地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6031102批(10mg规格)-均一性2-pH6.8介质-90min-片2
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.8ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长: 245nm
数据文件名: RC\$J632 - 11-10/29-2352-2 - zzp-6031102p-rcqx-pH6.8jz-10mg-jyx2-90min-P3.lcd
方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$J632 - J632-20260320-FX278.lcb
样品瓶号: 2-26
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2026/03/20 23:37:46 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2026/03/23 09:08:22 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 245nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.078	382600	100.000	65253	2911	1.039	--
总计		382600	100.000	65253			

图119 盐酸伐地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6031102批(10mg规格)-均一性2-pH6.8介质-90min-片3
供试品溶液-1




J632

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.8ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长: 245nm
数据文件名: RC\$J632 - 11-10/29-2353-2 - zzp-6031102p-rcqx-pH6.8jz-10mg-jyx2-90min-P4.lcd
方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$J632 - J632-20260320-FX278.lcb
样品瓶号: 2-35
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2026/03/20 23:41:11 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2026/03/23 09:08:25 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 245nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.079	354480	100.000	60493	2909	1.039	--
总计		354480	100.000	60493			

图120 盐酸伐地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6031102批(10mg规格)-均一性2-pH6.8介质-90min-片4
供试品溶液-1




J632

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.8ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长: 245nm
数据文件名: RC\$J632 - 11-10/29-2354-2 - zzp-6031102p-rcqx-pH6.8jz-10mg-jyx2-90min-P5.lcd
方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$J632 - J632-20260320-FX278.lcb
样品瓶号: 2-44
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2026/03/20 23:44:36 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2): 2026/03/23 09:08:28 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 245nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.080	382471	100.000	65273	2911	1.040	--
总计		382471	100.000	65273			

图121 盐酸伐地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6031102批(10mg规格)-均一性2-pH6.8介质-90min-片5
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.8ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长: 245nm
数据文件名: RC\$J632 - 11-10/29-2355-2 - zzp-6031102p-rcqx-pH6.8jz-10mg-jyx2-90min-P6.lcd
方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$J632 - J632-20260320-FX278.lcb
样品瓶号: 2-53
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2026/03/20 23:48:02 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2026/03/23 09:08:31 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 245nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.079	377268	100.000	64313	2905	1.040	--
总计		377268	100.000	64313			

图122 盐酸伐地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6031102批(10mg规格)-均一性2-pH6.8介质-90min-片6
供试品溶液-1




J632

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.8ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长: 245nm
数据文件名: RC\$J632 - 11-10/29-2356-2 - zzp-6031102p-rcqx-pH6.8jz-10mg-jyx2-120min-P1.lcd
方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$J632 - J632-20260320-FX278.lcb
样品瓶号: 4-3
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2026/03/20 23:51:26 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2): 2026/03/23 09:08:33 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 245nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.079	379527	100.000	64715	2903	1.040	--
总计		379527	100.000	64715			

图123 盐酸伐地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6031102批(10mg规格)-均一性2-pH6.8介质-120min-片1
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.8ml/min
柱温:40°C 波长: 245nm
数据文件名: RC\$J632 - 11-10/29-2357-2 - zzp-6031102p-rcqx-pH6.8jz-10mg-jyx2-120min-P2.lcd
方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$J632 - J632-20260320-FX278.lcb
样品瓶号: 4-12
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2026/03/20 23:54:48 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2): 2026/03/23 09:08:36 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 245nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.079	379106	100.000	64679	2905	1.040	--
总计		379106	100.000	64679			

图124 盐酸伐地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6031102批(10mg规格)-均一性2-pH6.8介质-120min-片2
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.8ml/min
柱温:40°C 波长: 245nm
数据文件名: RC\$J632 - 11-10/29-2358-2 - zzp-6031102p-rcqx-pH6.8jz-10mg-jyx2-120min-P3.lcd
方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$J632 - J632-20260320-FX278.lcb
样品瓶号: 4-21
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2026/03/20 23:58:11 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2): 2026/03/23 09:08:39 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>


检测器A Ch1 245nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.079	388455	100.000	66255	2905	1.040	--
总计		388455	100.000	66255			

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.8ml/min
柱温:40°C 波长: 245nm
数据文件名: RC\$J632 - 11-10/29-2359-2 - zzp-6031102p-rcqx-pH6.8jz-10mg-jyx2-120min-P4.lcd
方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$J632 - J632-20260320-FX278.lcb
样品瓶号: 4-30
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2026/03/21 00:01:35 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2): 2026/03/23 09:08:41 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 245nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.079	359480	100.000	61246	2900	1.040	--
总计		359480	100.000	61246			

图126 盐酸伐地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6031102批(10mg规格)-均一性2-pH6.8介质-120min-片4
供试品溶液-1




J632

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.8ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长: 245nm
数据文件名: RC\$J632 - 11-10/29-2360-2 - zzp-6031102p-rcqx-pH6.8jz-10mg-jyx2-120min-P5.lcd
方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$J632 - J632-20260320-FX278.lcb
样品瓶号: 4-39
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2026/03/21 00:04:58 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2): 2026/03/23 09:08:44 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 245nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.079	385658	100.000	65743	2904	1.040	--
总计		385658	100.000	65743			

图127 盐酸伐地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6031102批(10mg规格)-均一性2-pH6.8介质-120min-片5
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.8ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长: 245nm
数据文件名: RC\$J632 - 11-10/29-2361-2 - zzp-6031102p-rcqx-pH6.8jz-10mg-jyx2-120min-P6.lcd
方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$J632 - J632-20260320-FX278.lcb
样品瓶号: 4-48
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2026/03/21 00:08:21 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2): 2026/03/23 09:08:46 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 245nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.079	381322	100.000	64998	2903	1.040	--
总计		381322	100.000	64998			

图128 盐酸伐地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6031102批(10mg规格)-均一性2-pH6.8介质-120min-片6
供试品溶液-1




J632

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.8ml/min
柱温:40°C 波长: 245nm
数据文件名: RC\$J632 - 11-10/29-2362-2 - zzp-6031102p-rcqx-pH6.8jz-10mg-jyx2-jx-P1.lcd
方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$J632 - J632-20260320-FX278.lcb
样品瓶号: 4-4
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2026/03/21 00:11:46 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2): 2026/03/23 09:08:49 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 245nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.079	390443	100.000	66610	2909	1.040	--
总计		390443	100.000	66610			

图129 盐酸伐地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6031102批(10mg规格)-均一性2-pH6.8介质-极限转速-片1
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.8ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长: 245nm
数据文件名: RC\$J632 - 11-10/29-2363-2 - zzp-6031102p-rcqx-pH6.8jz-10mg-jyx2-jx-P2.lcd
方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$J632 - J632-20260320-FX278.lcb
样品瓶号: 4-13
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2026/03/21 00:15:10 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2): 2026/03/23 09:08:51 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 245nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.079	390360	100.000	66620	2911	1.041	--
总计		390360	100.000	66620			

图130 盐酸伐地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6031102批(10mg规格)-均一性2-pH6.8介质-极限转速-片2
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.8ml/min
柱温:40°C 波长: 245nm
数据文件名: RC\$J632 - 11-10/29-2364-2 - zzp-6031102p-rcqx-pH6.8jz-10mg-jyx2-jx-P3.lcd
方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$J632 - J632-20260320-FX278.lcb
样品瓶号: 4-22
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2026/03/21 00:18:33 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2): 2026/03/23 09:08:54 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 245nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.079	400791	100.000	68405	2910	1.041	--
总计		400791	100.000	68405			

图131 盐酸伐地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6031102批(10mg规格)-均一性2-pH6.8介质-极限转速-片3
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.8ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长: 245nm
数据文件名: RC\$J632 - 11-10/29-2365-2 - zzp-6031102p-rcqx-pH6.8jz-10mg-jyx2-jx-P4.lcd
方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$J632 - J632-20260320-FX278.lcb
样品瓶号: 4-31
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2026/03/21 00:21:55 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2026/03/23 09:08:56 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 245nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.079	372879	100.000	63690	2916	1.040	--
总计		372879	100.000	63690			

图132 盐酸伐地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6031102批(10mg规格)-均一性2-pH6.8介质-极限转速-片4
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.8ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长: 245nm
数据文件名: RC\$J632 - 11-10/29-2366-2 - zzp-6031102p-rcqx-pH6.8jz-10mg-jyx2-jx-P5.lcd
方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$J632 - J632-20260320-FX278.lcb
样品瓶号: 4-40
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2026/03/21 00:25:19 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2): 2026/03/23 09:08:59 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 245nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.079	393916	100.000	67300	2911	1.041	--
总计		393916	100.000	67300			

图133 盐酸伐地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6031102批(10mg规格)-均一性2-pH6.8介质-极限转速-片5
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.8ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长: 245nm
数据文件名: RC\$J632 - 11-10/29-2367-2 - zzp-6031102p-rcqx-pH6.8jz-10mg-jyx2-jx-P6.lcd
方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$J632 - J632-20260320-FX278.lcb
样品瓶号: 4-49
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2026/03/21 00:28:43 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2026/03/23 09:09:01 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 245nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.079	394940	100.000	67418	2910	1.040	--
总计		394940	100.000	67418			

图134 盐酸伐地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6031102批(10mg规格)-均一性2-pH6.8介质-极限转速-片6
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.8ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长: 245nm
数据文件名: RC\$J632 - 11-10/29-2368-2 - zzp-6031102p-rcqx-pH6.8jz-10mg-jyx2-dz2-1.lcd
方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$J632 - J632-20260320-FX278.lcb
样品瓶号: 2-27
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2026/03/21 00:32:07 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2): 2026/03/23 09:09:04 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 245nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.027	388321	100.000	62244	2449	1.051	--
总计		388321	100.000	62244			

图135 盐酸伐地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6031102批(10mg规格)-均一性2-pH6.8介质
对照品溶液-2-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.8ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长: 245nm
数据文件名: RC\$J632 - 11-10/29-2369-2 - zzp-6031102p-rcqx-pH6.8jz-10mg-jyx2-dz2-2.lcd
方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$J632 - J632-20260320-FX278.lcb
样品瓶号: 2-27
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2026/03/21 00:35:33 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2): 2026/03/23 09:09:07 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 245nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.027	387189	100.000	62199	2455	1.051	--
总计		387189	100.000	62199			

图136 盐酸伐地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6031102批(10mg规格)-均一性2-pH6.8介质
对照品溶液-2-2




J632

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.8ml/min
柱温:40°C 波长: 245nm
数据文件名: RC\$J632 - 11-10/29-2370-2 - zzp-6031103p-rcqx-pH6.8jz-10mg-jyx2-rj.lcd
方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$J632 - J632-20260320-FX278.lcb
样品瓶号: 3-9
进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
进样时间: 2026/03/21 00:38:56 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2): 2026/03/23 09:09:09 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 245nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图137 盐酸伐地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6031103批(10mg规格)-均一性2-pH6.8介质
溶剂

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.8ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长: 245nm
数据文件名: RC\$J632 - 11-10/29-2371-2 - zzp-6031103p-rcqx-pH6.8jz-10mg-jyx2-dz1-1.lcd
方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$J632 - J632-20260320-FX278.lcb
样品瓶号: 3-18
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2026/03/21 00:42:19 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2): 2026/03/23 09:09:12 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 245nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.026	388199	100.000	62242	2457	1.051	--
总计		388199	100.000	62242			

图138 盐酸伐地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6031103批(10mg规格)-均一性2-pH6.8介质
对照品溶液-1-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.8ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长: 245nm
数据文件名: RC\$J632 - 11-10/29-2372-2 - zzp-6031103p-rcqx-pH6.8jz-10mg-jyx2-dz1-2.lcd
方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$J632 - J632-20260320-FX278.lcb
样品瓶号: 3-18
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2026/03/21 00:45:42 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2): 2026/03/23 09:09:14 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 245nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.027	388204	100.000	62341	2460	1.051	--
总计		388204	100.000	62341			

图139 盐酸伐地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6031103批(10mg规格)-均一性2-pH6.8介质
对照品溶液-1-2




J632

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.8ml/min
柱 温:40℃ 波长: 245nm
数据文件名: RC\$J632 - 11-10/29-2373-2 - zzp-6031103p-rcqx-pH6.8jz-10mg-jyx2-dz1-3.lcd
方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$J632 - J632-20260320-FX278.lcb
样品瓶号: 3-18
进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
进样时间: 2026/03/21 00:49:05 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2026/03/23 09:09:17 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>


检测器A Ch1 245nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.027	388763	100.000	62351	2454	1.052	--
总计		388763	100.000	62351			

图140 盐酸伐地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6031103批(10mg规格)-均一性2-pH6.8介质
对照品溶液-1-3

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.8ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长: 245nm
数据文件名: RC\$J632 - 11-10/29-2374-2 - zzp-6031103p-rcqx-pH6.8jz-10mg-jyx2-dz1-4.lcd
方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$J632 - J632-20260320-FX278.lcb
样品瓶号: 3-18
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2026/03/21 00:52:28 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2): 2026/03/23 09:09:19 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 245nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.026	388065	100.000	62261	2454	1.051	--
总计		388065	100.000	62261			

图141 盐酸伐地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6031103批(10mg规格)-均一性2-pH6.8介质
对照品溶液-1-4

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.8ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长: 245nm
数据文件名: RC\$J632 - 11-10/29-2375-2 - zzp-6031103p-rcqx-pH6.8jz-10mg-jyx2-dz1-5.lcd
方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$J632 - J632-20260320-FX278.lcb
样品瓶号: 3-18
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2026/03/21 00:55:50 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2): 2026/03/23 09:09:22 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 245nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.027	388487	100.000	62281	2456	1.052	--
总计		388487	100.000	62281			

图142 盐酸伐地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6031103批(10mg规格)-均一性2-pH6.8介质
对照品溶液-1-5




J632

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.8ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长: 245nm
数据文件名: RC\$J632 - 11-10/29-2376-2 - zzp-6031103p-rcqx-pH6.8jz-10mg-jyx2-5min-P1.lcd
方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$J632 - J632-20260320-FX278.lcb
样品瓶号: 3-1
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2026/03/21 00:59:14 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2): 2026/03/23 09:09:25 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 245nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.080	196707	100.000	33647	2927	1.036	--
总计		196707	100.000	33647			

图143 盐酸伐地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6031103批(10mg规格)-均一性2-pH6.8介质-5min-片1
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.8ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长: 245nm
数据文件名: RC\$J632 - 11-10/29-2377-2 - zzp-6031103p-rcqx-pH6.8jz-10mg-jyx2-5min-P2.lcd
方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$J632 - J632-20260320-FX278.lcb
样品瓶号: 3-10
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2026/03/21 01:02:36 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2): 2026/03/23 09:09:27 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 245nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.081	153248	100.000	26257	2929	1.036	--
总计		153248	100.000	26257			

图144 盐酸伐地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6031103批(10mg规格)-均一性2-pH6.8介质-5min-片2
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.8ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长: 245nm
数据文件名: RC\$J632 - 11-10/29-2378-2 - zzp-6031103p-rcqx-pH6.8jz-10mg-jyx2-5min-P3.lcd
方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$J632 - J632-20260320-FX278.lcb
样品瓶号: 3-19
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2026/03/21 01:05:59 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2): 2026/03/23 09:09:30 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 245nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.082	175820	100.000	30148	2933	1.033	--
总计		175820	100.000	30148			

图145 盐酸伐地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6031103批(10mg规格)-均一性2-pH6.8介质-5min-片3
供试品溶液-1




J632

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.8ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长: 245nm
数据文件名: RC\$J632 - 11-10/29-2379-2 - zzp-6031103p-rcqx-pH6.8jz-10mg-jyx2-5min-P4.lcd
方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$J632 - J632-20260320-FX278.lcb
样品瓶号: 3-28
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2026/03/21 01:09:20 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2): 2026/03/23 09:09:32 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 245nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.081	212680	100.000	36457	2934	1.036	--
总计		212680	100.000	36457			

图146 盐酸伐地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6031103批(10mg规格)-均一性2-pH6.8介质-5min-片4
供试品溶液-1




J632

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.8ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长: 245nm
数据文件名: RC\$J632 - 11-10/29-2380-2 - zzp-6031103p-rcqx-pH6.8jz-10mg-jyx2-5min-P5.lcd
方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$J632 - J632-20260320-FX278.lcb
样品瓶号: 3-37
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2026/03/21 01:12:43 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2): 2026/03/23 09:09:35 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 245nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.081	87925	100.000	15075	2932	1.030	--
总计		87925	100.000	15075			

图147 盐酸伐地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6031103批(10mg规格)-均一性2-pH6.8介质-5min-片5
供试品溶液-1




J632

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.8ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长: 245nm
数据文件名: RC\$J632 - 11-10/29-2381-2 - zzp-6031103p-rcqx-pH6.8jz-10mg-jyx2-5min-P6.lcd
方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$J632 - J632-20260320-FX278.lcb
样品瓶号: 3-46
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2026/03/21 01:16:06 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2): 2026/03/23 09:09:37 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 245nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.081	179146	100.000	30617	2922	1.034	--
总计		179146	100.000	30617			

图148 盐酸伐地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6031103批(10mg规格)-均一性2-pH6.8介质-5min-片6
供试品溶液-1




J632

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.8ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长: 245nm
数据文件名: RC\$J632 - 11-10/29-2382-2 - zzp-6031103p-rcqx-pH6.8jz-10mg-jyx2-10min-P1.lcd
方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$J632 - J632-20260320-FX278.lcb
样品瓶号: 3-2
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2026/03/21 01:19:28 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2): 2026/03/23 09:09:40 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 245nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.080	238331	100.000	40731	2920	1.037	--
总计		238331	100.000	40731			

图149 盐酸伐地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6031103批(10mg规格)-均一性2-pH6.8介质-10min-片1
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.8ml/min
柱温:40°C 波长: 245nm
数据文件名: RC\$J632 - 11-10/29-2383-2 - zzp-6031103p-rcqx-pH6.8jz-10mg-jyx2-10min-P2.lcd
方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$J632 - J632-20260320-FX278.lcb
样品瓶号: 3-11
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2026/03/21 01:22:51 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2): 2026/03/23 09:09:43 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 245nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.081	201996	100.000	34569	2918	1.036	--
总计		201996	100.000	34569			

图150 盐酸伐地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6031103批(10mg规格)-均一性2-pH6.8介质-10min-片2
供试品溶液-1




J632

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.8ml/min
柱温:40°C 波长: 245nm
数据文件名: RC\$J632 - 11-10/29-2384-2 - zzp-6031103p-rcqx-pH6.8jz-10mg-jyx2-10min-P3.lcd
方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$J632 - J632-20260320-FX278.lcb
样品瓶号: 3-20
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2026/03/21 01:26:14 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2): 2026/03/23 09:09:45 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 245nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.081	224060	100.000	38369	2922	1.035	--
总计		224060	100.000	38369			

图151 盐酸伐地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6031103批(10mg规格)-均一性2-pH6.8介质-10min-片3
供试品溶液-1




J632

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.8ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长: 245nm
数据文件名: RC\$J632 - 11-10/29-2385-2 - zzp-6031103p-rcqx-pH6.8jz-10mg-jyx2-10min-P4.lcd
方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$J632 - J632-20260320-FX278.lcb
样品瓶号: 3-29
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2026/03/21 01:29:36 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2): 2026/03/23 09:09:48 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 245nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.080	256425	100.000	43929	2926	1.037	--
总计		256425	100.000	43929			

图152 盐酸伐地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6031103批(10mg规格)-均一性2-pH6.8介质-10min-片4
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.8ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长: 245nm
数据文件名: RC\$J632 - 11-10/29-2386-2 - zzp-6031103p-rcqx-pH6.8jz-10mg-jyx2-10min-P5.lcd
方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$J632 - J632-20260320-FX278.lcb
样品瓶号: 3-38
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2026/03/21 01:32:57 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2): 2026/03/23 09:09:50 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 245nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.081	190119	100.000	32521	2924	1.034	--
总计		190119	100.000	32521			

图153 盐酸伐地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6031103批(10mg规格)-均一性2-pH6.8介质-10min-片5
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.8ml/min
柱温:40°C 波长: 245nm
数据文件名: RC\$J632 - 11-10/29-2387-2 - zzp-6031103p-rcqx-pH6.8jz-10mg-jyx2-10min-P6.lcd
方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$J632 - J632-20260320-FX278.lcb
样品瓶号: 3-47
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2026/03/21 01:36:21 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2): 2026/03/23 09:09:53 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 245nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.080	232236	100.000	39723	2922	1.037	--
总计		232236	100.000	39723			

图154 盐酸伐地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6031103批(10mg规格)-均一性2-pH6.8介质-10min-片6
供试品溶液-1




J632

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.8ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长: 245nm
数据文件名: RC\$J632 - 11-10/29-2388-2 - zzp-6031103p-rcqx-pH6.8jz-10mg-jyx2-15min-P1.lcd
方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$J632 - J632-20260320-FX278.lcb
样品瓶号: 3-3
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2026/03/21 01:39:44 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2): 2026/03/23 09:09:56 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 245nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.079	272932	100.000	46688	2924	1.038	--
总计		272932	100.000	46688			

图155 盐酸伐地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6031103批(10mg规格)-均一性2-pH6.8介质-15min-片1
供试品溶液-1




J632

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.8ml/min
柱温:40°C 波长: 245nm
数据文件名: RC\$J632 - 11-10/29-2389-2 - zzp-6031103p-rcqx-pH6.8jz-10mg-jyx2-15min-P2.lcd
方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$J632 - J632-20260320-FX278.lcb
样品瓶号: 3-12
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2026/03/21 01:43:06 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2): 2026/03/23 09:09:58 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 245nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.080	242279	100.000	41458	2923	1.036	--
总计		242279	100.000	41458			

图156 盐酸伐地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6031103批(10mg规格)-均一性2-pH6.8介质-15min-片2
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.8ml/min
柱温:40°C 波长: 245nm
数据文件名: RC\$J632 - 11-10/29-2390-2 - zzp-6031103p-rcqx-pH6.8jz-10mg-jyx2-15min-P3.lcd
方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$J632 - J632-20260320-FX278.lcb
样品瓶号: 3-21
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2026/03/21 01:46:28 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2): 2026/03/23 09:10:01 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 245nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.079	257843	100.000	44180	2926	1.035	--
总计		257843	100.000	44180			

图157 盐酸伐地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6031103批(10mg规格)-均一性2-pH6.8介质-15min-片3
供试品溶液-1




J632

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.8ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长: 245nm
数据文件名: RC\$J632 - 11-10/29-2391-2 - zzp-6031103p-rcqx-pH6.8jz-10mg-jyx2-15min-P4.lcd
方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$J632 - J632-20260320-FX278.lcb
样品瓶号: 3-30
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2026/03/21 01:49:50 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2): 2026/03/23 09:10:03 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 245nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.080	285549	100.000	48880	2926	1.037	--
总计		285549	100.000	48880			

图158 盐酸伐地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6031103批(10mg规格)-均一性2-pH6.8介质-15min-片4
供试品溶液-1




J632

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.8ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长: 245nm
数据文件名: RC\$J632 - 11-10/29-2392-2 - zzp-6031103p-rcqx-pH6.8jz-10mg-jyx2-15min-P5.lcd
方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$J632 - J632-20260320-FX278.lcb
样品瓶号: 3-39
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2026/03/21 01:53:12 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2): 2026/03/23 09:10:06 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 245nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.080	233580	100.000	39953	2920	1.036	--
总计		233580	100.000	39953			

图159 盐酸伐地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6031103批(10mg规格)-均一性2-pH6.8介质-15min-片5
供试品溶液-1




J632

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.8ml/min
柱温:40°C 波长: 245nm
数据文件名: RC\$J632 - 11-10/29-2393-2 - zzp-6031103p-rcqx-pH6.8jz-10mg-jyx2-15min-P6.lcd
方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$J632 - J632-20260320-FX278.lcb
样品瓶号: 3-48
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2026/03/21 01:56:34 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2): 2026/03/23 09:10:09 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 245nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.080	264587	100.000	45195	2912	1.035	--
总计		264587	100.000	45195			

图160 盐酸伐地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6031103批(10mg规格)-均一性2-pH6.8介质-15min-片6
供试品溶液-1




J632

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.8ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长: 245nm
数据文件名: RC\$J632 - 11-10/29-2394-2 - zzp-6031103p-rcqx-pH6.8jz-10mg-jyx2-20min-P1.lcd
方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$J632 - J632-20260320-FX278.lcb
样品瓶号: 3-4
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2026/03/21 01:59:58 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2): 2026/03/23 09:10:11 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 245nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.079	296507	100.000	50615	2909	1.036	--
总计		296507	100.000	50615			

图161 盐酸伐地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6031103批(10mg规格)-均一性2-pH6.8介质-20min-片1
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.8ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长: 245nm
数据文件名: RC\$J632 - 11-10/29-2395-2 - zzp-6031103p-rcqx-pH6.8jz-10mg-jyx2-20min-P2.lcd
方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$J632 - J632-20260320-FX278.lcb
样品瓶号: 3-13
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2026/03/21 02:03:20 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2): 2026/03/23 09:10:14 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 245nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.079	270421	100.000	46200	2911	1.036	--
总计		270421	100.000	46200			

图162 盐酸伐地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6031103批(10mg规格)-均一性2-pH6.8介质-20min-片2
供试品溶液-1




J632

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.8ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长: 245nm
数据文件名: RC\$J632 - 11-10/29-2396-2 - zzp-6031103p-rcqx-pH6.8jz-10mg-jyx2-20min-P3.lcd
方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$J632 - J632-20260320-FX278.lcb
样品瓶号: 3-22
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2026/03/21 02:06:42 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2): 2026/03/23 09:10:17 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 245nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.080	284580	100.000	48646	2916	1.036	--
总计		284580	100.000	48646			

图163 盐酸伐地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6031103批(10mg规格)-均一性2-pH6.8介质-20min-片3
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.8ml/min
柱温:40°C 波长: 245nm
数据文件名: RC\$J632 - 11-10/29-2397-2 - zzp-6031103p-rcqx-pH6.8jz-10mg-jyx2-20min-P4.lcd
方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$J632 - J632-20260320-FX278.lcb
样品瓶号: 3-31
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2026/03/21 02:10:06 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2): 2026/03/23 09:10:20 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 245nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.079	309764	100.000	52960	2914	1.037	--
总计		309764	100.000	52960			

图164 盐酸伐地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6031103批(10mg规格)-均一性2-pH6.8介质-20min-片4
供试品溶液-1




J632

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.8ml/min
柱温:40°C 波长: 245nm
数据文件名: RC\$J632 - 11-10/29-2398-2 - zzp-6031103p-rcqx-pH6.8jz-10mg-jyx2-20min-P5.lcd
方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$J632 - J632-20260320-FX278.lcb
样品瓶号: 3-40
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2026/03/21 02:13:27 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2): 2026/03/23 09:10:22 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 245nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.079	267161	100.000	45636	2911	1.035	--
总计		267161	100.000	45636			

图165 盐酸伐地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6031103批(10mg规格)-均一性2-pH6.8介质-20min-片5
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.8ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长: 245nm
数据文件名: RC\$J632 - 11-10/29-2399-2 - zzp-6031103p-rcqx-pH6.8jz-10mg-jyx2-20min-P6.lcd
方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$J632 - J632-20260320-FX278.lcb
样品瓶号: 3-49
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2026/03/21 02:16:49 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2): 2026/03/23 09:10:25 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 245nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.081	291275	100.000	49604	2903	1.037	--
总计		291275	100.000	49604			

图166 盐酸伐地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6031103批(10mg规格)-均一性2-pH6.8介质-20min-片6
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.8ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长: 245nm
数据文件名: RC\$J632 - 11-10/29-2400-2 - zzp-6031103p-rcqx-pH6.8jz-10mg-jyx2-30min-P1.lcd
方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$J632 - J632-20260320-FX278.lcb
样品瓶号: 3-5
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2026/03/21 02:20:13 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2): 2026/03/23 09:10:27 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 245nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.080	326609	100.000	55719	2909	1.038	--
总计		326609	100.000	55719			

图167 盐酸伐地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6031103批(10mg规格)-均一性2-pH6.8介质-30min-片1
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.8ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长: 245nm
数据文件名: RC\$J632 - 11-10/29-2401-2 - zzp-6031103p-rcqx-pH6.8jz-10mg-jyx2-30min-P2.lcd
方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$J632 - J632-20260320-FX278.lcb
样品瓶号: 3-14
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2026/03/21 02:23:35 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2): 2026/03/23 09:10:30 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 245nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.080	305069	100.000	52036	2906	1.038	--
总计		305069	100.000	52036			

图168 盐酸伐地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6031103批(10mg规格)-均一性2-pH6.8介质-30min-片2
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.8ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长: 245nm
数据文件名: RC\$J632 - 11-10/29-2402-2 - zzp-6031103p-rcqx-pH6.8jz-10mg-jyx2-30min-P3.lcd
方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$J632 - J632-20260320-FX278.lcb
样品瓶号: 3-23
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2026/03/21 02:26:57 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2): 2026/03/23 09:10:33 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 245nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.079	315619	100.000	53867	2901	1.036	--
总计		315619	100.000	53867			

图169 盐酸伐地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6031103批(10mg规格)-均一性2-pH6.8介质-30min-片3
供试品溶液-1




J632

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.8ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长: 245nm
数据文件名: RC\$J632 - 11-10/29-2403-2 - zzp-6031103p-rcqx-pH6.8jz-10mg-jyx2-30min-P4.lcd
方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$J632 - J632-20260320-FX278.lcb
样品瓶号: 3-32
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2026/03/21 02:30:18 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2): 2026/03/23 09:10:35 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 245nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.080	338943	100.000	57806	2907	1.038	--
总计		338943	100.000	57806			

图170 盐酸伐地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6031103批(10mg规格)-均一性2-pH6.8介质-30min-片4
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.8ml/min
柱温:40°C 波长: 245nm
数据文件名: RC\$J632 - 11-10/29-2404-2 - zzp-6031103p-rcqx-pH6.8jz-10mg-jyx2-30min-P5.lcd
方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$J632 - J632-20260320-FX278.lcb
样品瓶号: 3-41
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2026/03/21 02:33:40 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2): 2026/03/23 09:10:38 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 245nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.080	308354	100.000	52673	2915	1.036	--
总计		308354	100.000	52673			

图171 盐酸伐地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6031103批(10mg规格)-均一性2-pH6.8介质-30min-片5
供试品溶液-1




J632

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.8ml/min
柱温:40°C 波长: 245nm
数据文件名: RC\$J632 - 11-10/29-2405-2 - zzp-6031103p-rcqx-pH6.8jz-10mg-jyx2-30min-P6.lcd
方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$J632 - J632-20260320-FX278.lcb
样品瓶号: 3-50
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2026/03/21 02:37:03 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2): 2026/03/23 09:10:41 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 245nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.080	329003	100.000	56161	2912	1.038	--
总计		329003	100.000	56161			

图172 盐酸伐地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6031103批(10mg规格)-均一性2-pH6.8介质-30min-片6
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.8ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长: 245nm
数据文件名: RC\$J632 - 11-10/29-2406-2 - zzp-6031103p-rcqx-pH6.8jz-10mg-jyx2-45min-P1.lcd
方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$J632 - J632-20260320-FX278.lcb
样品瓶号: 3-6
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2026/03/21 02:40:25 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2): 2026/03/23 09:10:43 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 245nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.079	350903	100.000	59923	2908	1.039	--
总计		350903	100.000	59923			

图173 盐酸伐地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6031103批(10mg规格)-均一性2-pH6.8介质-45min-片1
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.8ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长: 245nm
数据文件名: RC\$J632 - 11-10/29-2407-2 - zzp-6031103p-rcqx-pH6.8jz-10mg-jyx2-45min-P2.lcd
方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$J632 - J632-20260320-FX278.lcb
样品瓶号: 3-15
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2026/03/21 02:43:47 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2): 2026/03/23 09:10:46 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 245nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.079	335311	100.000	57278	2913	1.039	--
总计		335311	100.000	57278			

图174 盐酸伐地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6031103批(10mg规格)-均一性2-pH6.8介质-45min-片2
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.8ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长: 245nm
数据文件名: RC\$J632 - 11-10/29-2408-2 - zzp-6031103p-rcqx-pH6.8jz-10mg-jyx2-45min-P3.lcd
方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$J632 - J632-20260320-FX278.lcb
样品瓶号: 3-24
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2026/03/21 02:47:09 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2): 2026/03/23 09:10:49 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 245nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.079	341728	100.000	58380	2914	1.038	--
总计		341728	100.000	58380			

图175 盐酸伐地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6031103批(10mg规格)-均一性2-pH6.8介质-45min-片3
供试品溶液-1




J632

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.8ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长: 245nm
数据文件名: RC\$J632 - 11-10/29-2409-2 - zzp-6031103p-rcqx-pH6.8jz-10mg-jyx2-45min-P4.lcd
方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$J632 - J632-20260320-FX278.lcb
样品瓶号: 3-33
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2026/03/21 02:50:31 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2): 2026/03/23 09:10:51 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 245nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.079	363527	100.000	62004	2913	1.039	--
总计		363527	100.000	62004			

图176 盐酸伐地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6031103批(10mg规格)-均一性2-pH6.8介质-45min-片4
供试品溶液-1




J632

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.8ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长: 245nm
数据文件名: RC\$J632 - 11-10/29-2410-2 - zzp-6031103p-rcqx-pH6.8jz-10mg-jyx2-45min-P5.lcd
方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$J632 - J632-20260320-FX278.lcb
样品瓶号: 3-42
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2026/03/21 02:53:52 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2): 2026/03/23 09:10:54 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 245nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.079	339698	100.000	57992	2915	1.039	--
总计		339698	100.000	57992			

图177 盐酸伐地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6031103批(10mg规格)-均一性2-pH6.8介质-45min-片5
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.8ml/min
柱温:40°C 波长: 245nm
数据文件名: RC\$J632 - 11-10/29-2411-2 - zzp-6031103p-rcqx-pH6.8jz-10mg-jyx2-45min-P6.lcd
方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$J632 - J632-20260320-FX278.lcb
样品瓶号: 3-51
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2026/03/21 02:57:15 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2): 2026/03/23 09:10:56 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 245nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.079	357425	100.000	61073	2912	1.039	--
总计		357425	100.000	61073			

图178 盐酸伐地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6031103批(10mg规格)-均一性2-pH6.8介质-45min-片6
供试品溶液-1




J632

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.8ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长: 245nm
数据文件名: RC\$J632 - 11-10/29-2412-2 - zzp-6031103p-rcqx-pH6.8jz-10mg-jyx2-60min-P1.lcd
方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$J632 - J632-20260320-FX278.lcb
样品瓶号: 3-7
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2026/03/21 03:00:37 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2): 2026/03/23 09:10:59 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 245nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.079	363896	100.000	62135	2912	1.039	--
总计		363896	100.000	62135			

图179 盐酸伐地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6031103批(10mg规格)-均一性2-pH6.8介质-60min-片1
供试品溶液-1




J632

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.8ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长: 245nm
数据文件名: RC\$J632 - 11-10/29-2413-2 - zzp-6031103p-rcqx-pH6.8jz-10mg-jyx2-60min-P2.lcd
方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$J632 - J632-20260320-FX278.lcb
样品瓶号: 3-16
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2026/03/21 03:04:01 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2): 2026/03/23 09:11:01 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 245nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.079	353658	100.000	60409	2914	1.039	--
总计		353658	100.000	60409			

图180 盐酸伐地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6031103批(10mg规格)-均一性2-pH6.8介质-60min-片2
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.8ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长: 245nm
数据文件名: RC\$J632 - 11-10/29-2414-2 - zzp-6031103p-rcqx-pH6.8jz-10mg-jyx2-60min-P3.lcd
方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$J632 - J632-20260320-FX278.lcb
样品瓶号: 3-25
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2026/03/21 03:07:23 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2): 2026/03/23 09:11:04 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 245nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.079	356423	100.000	60902	2916	1.039	--
总计		356423	100.000	60902			

图181 盐酸伐地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6031103批(10mg规格)-均一性2-pH6.8介质-60min-片3
供试品溶液-1




J632

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.8ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长: 245nm
数据文件名: RC\$J632 - 11-10/29-2415-2 - zzp-6031103p-rcqx-pH6.8jz-10mg-jyx2-60min-P4.lcd
方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$J632 - J632-20260320-FX278.lcb
样品瓶号: 3-34
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2026/03/21 03:10:45 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2): 2026/03/23 09:11:07 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 245nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.079	375688	100.000	64210	2917	1.040	--
总计		375688	100.000	64210			

图182 盐酸伐地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6031103批(10mg规格)-均一性2-pH6.8介质-60min-片4
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.8ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长: 245nm
数据文件名: RC\$J632 - 11-10/29-2416-2 - zzp-6031103p-rcqx-pH6.8jz-10mg-jyx2-60min-P5.lcd
方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$J632 - J632-20260320-FX278.lcb
样品瓶号: 3-43
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2026/03/21 03:14:07 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2): 2026/03/23 09:11:09 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 245nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.080	356960	100.000	61063	2923	1.039	--
总计		356960	100.000	61063			

图183 盐酸伐地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6031103批(10mg规格)-均一性2-pH6.8介质-60min-片5
供试品溶液-1




J632

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.8ml/min
柱 温:40℃ 波长: 245nm
数据文件名: RC\$J632 - 11-10/29-2417-2 - zzp-6031103p-rcqx-pH6.8jz-10mg-jyx2-60min-P6.lcd
方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$J632 - J632-20260320-FX278.lcb
样品瓶号: 3-52
进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
进样时间: 2026/03/21 03:17:30 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2026/03/23 09:11:12 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>


检测器A Ch1 245nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.080	365282	100.000	62408	2917	1.039	--
总计		365282	100.000	62408			

图184 盐酸伐地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6031103批(10mg规格)-均一性2-pH6.8介质-60min-片6
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.8ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长: 245nm
数据文件名: RC\$J632 - 11-10/29-2418-2 - zzp-6031103p-rcqx-pH6.8jz-10mg-jyx2-90min-P1.lcd
方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$J632 - J632-20260320-FX278.lcb
样品瓶号: 3-8
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2026/03/21 03:20:53 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2): 2026/03/23 09:11:15 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 245nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.080	374370	100.000	63950	2919	1.039	--
总计		374370	100.000	63950			

图185 盐酸伐地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6031103批(10mg规格)-均一性2-pH6.8介质-90min-片1
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.8ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长: 245nm
数据文件名: RC\$J632 - 11-10/29-2419-2 - zzp-6031103p-rcqx-pH6.8jz-10mg-jyx2-90min-P2.lcd
方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$J632 - J632-20260320-FX278.lcb
样品瓶号: 3-17
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2026/03/21 03:24:16 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2): 2026/03/23 09:11:17 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 245nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.080	368957	100.000	63176	2926	1.039	--
总计		368957	100.000	63176			

图186 盐酸伐地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6031103批(10mg规格)-均一性2-pH6.8介质-90min-片2
供试品溶液-1




J632

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.8ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长: 245nm
数据文件名: RC\$J632 - 11-10/29-2420-2 - zzp-6031103p-rcqx-pH6.8jz-10mg-jyx2-90min-P3.lcd
方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$J632 - J632-20260320-FX278.lcb
样品瓶号: 3-26
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2026/03/21 03:27:37 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2): 2026/03/23 09:11:20 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 245nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.079	370126	100.000	63282	2919	1.039	--
总计		370126	100.000	63282			

图187 盐酸伐地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6031103批(10mg规格)-均一性2-pH6.8介质-90min-片3
供试品溶液-1




J632

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.8ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长: 245nm
数据文件名: RC\$J632 - 11-10/29-2421-2 - zzp-6031103p-rcqx-pH6.8jz-10mg-jyx2-90min-P4.lcd
方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$J632 - J632-20260320-FX278.lcb
样品瓶号: 3-35
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2026/03/21 03:31:01 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2): 2026/03/23 09:11:22 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 245nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.079	386860	100.000	66076	2912	1.041	--
总计		386860	100.000	66076			

图188 盐酸伐地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6031103批(10mg规格)-均一性2-pH6.8介质-90min-片4
供试品溶液-1




J632

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.8ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长: 245nm
数据文件名: RC\$J632 - 11-10/29-2422-2 - zzp-6031103p-rcqx-pH6.8jz-10mg-jyx2-90min-P5.lcd
方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$J632 - J632-20260320-FX278.lcb
样品瓶号: 3-44
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2026/03/21 03:34:25 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2): 2026/03/23 09:11:25 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 245nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.079	371431	100.000	63415	2912	1.039	--
总计		371431	100.000	63415			

图189 盐酸伐地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6031103批(10mg规格)-均一性2-pH6.8介质-90min-片5
供试品溶液-1




J632

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.8ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长: 245nm
数据文件名: RC\$J632 - 11-10/29-2423-2 - zzp-6031103p-rcqx-pH6.8jz-10mg-jyx2-90min-P6.lcd
方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$J632 - J632-20260320-FX278.lcb
样品瓶号: 3-53
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2026/03/21 03:37:47 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2): 2026/03/23 09:11:28 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 245nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.080	381776	100.000	65237	2918	1.040	--
总计		381776	100.000	65237			

图190 盐酸伐地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6031103批(10mg规格)-均一性2-pH6.8介质-90min-片6
供试品溶液-1




J632

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.8ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长: 245nm
数据文件名: RC\$J632 - 11-10/29-2424-2 - zzp-6031103p-rcqx-pH6.8jz-10mg-jyx2-120min-P1.lcd
方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$J632 - J632-20260320-FX278.lcb
样品瓶号: 4-5
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2026/03/21 03:41:11 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2): 2026/03/23 09:11:30 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 245nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.080	382657	100.000	65392	2921	1.040	--
总计		382657	100.000	65392			

图191 盐酸伐地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6031103批(10mg规格)-均一性2-pH6.8介质-120min-片1
供试品溶液-1




J632

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.8ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长: 245nm
数据文件名: RC\$J632 - 11-10/29-2425-2 - zzp-6031103p-rcqx-pH6.8jz-10mg-jyx2-120min-P2.lcd
方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$J632 - J632-20260320-FX278.lcb
样品瓶号: 4-14
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2026/03/21 03:44:35 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2): 2026/03/23 09:11:33 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 245nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.080	375609	100.000	64252	2924	1.040	--
总计		375609	100.000	64252			

图192 盐酸伐地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6031103批(10mg规格)-均一性2-pH6.8介质-120min-片2
供试品溶液-1




J632

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.8ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长: 245nm
数据文件名: RC\$J632 - 11-10/29-2426-2 - zzp-6031103p-rcqx-pH6.8jz-10mg-jyx2-120min-P3.lcd
方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$J632 - J632-20260320-FX278.lcb
样品瓶号: 4-23
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2026/03/21 03:47:59 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2): 2026/03/23 09:11:35 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 245nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.079	374522	100.000	64016	2916	1.039	--
总计		374522	100.000	64016			

图193 盐酸伐地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6031103批(10mg规格)-均一性2-pH6.8介质-120min-片3
供试品溶液-1




J632

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.8ml/min
柱 温:40°C 波长: 245nm
数据文件名: RC\$J632 - 11-10/29-2427-2 - zzp-6031103p-rcqx-pH6.8jz-10mg-jyx2-120min-P4.lcd
方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$J632 - J632-20260320-FX278.lcb
样品瓶号: 4-32
进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
进样时间: 2026/03/21 03:51:22 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2026/03/23 09:11:38 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>


检测器A Ch1 245nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.079	392525	100.000	67093	2920	1.041	--
总计		392525	100.000	67093			

图194 盐酸伐地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6031103批(10mg规格)-均一性2-pH6.8介质-120min-片4
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.8ml/min
柱温:40°C 波长: 245nm
数据文件名: RC\$J632 - 11-10/29-2428-2 - zzp-6031103p-rcqx-pH6.8jz-10mg-jyx2-120min-P5.lcd
方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$J632 - J632-20260320-FX278.lcb
样品瓶号: 4-41
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2026/03/21 03:54:46 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2026/03/23 09:11:40 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 245nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.080	379446	100.000	64865	2920	1.040	--
总计		379446	100.000	64865			




J632

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.8ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长: 245nm
数据文件名: RC\$J632 - 11-10/29-2429-2 - zzp-6031103p-rcqx-pH6.8jz-10mg-jyx2-120min-P6.lcd
方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$J632 - J632-20260320-FX278.lcb
样品瓶号: 4-50
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2026/03/21 03:58:09 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2026/03/23 09:11:43 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 245nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.080	392725	100.000	67120	2919	1.041	--
总计		392725	100.000	67120			

图196 盐酸伐地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6031103批(10mg规格)-均一性2-pH6.8介质-120min-片6
供试品溶液-1




J632

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.8ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长: 245nm
数据文件名: RC\$J632 - 11-10/29-2430-2 - zzp-6031103p-rcqx-pH6.8jz-10mg-jyx2-jx-P1.lcd
方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$J632 - J632-20260320-FX278.lcb
样品瓶号: 4-6
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2026/03/21 04:01:33 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2): 2026/03/23 09:11:46 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 245nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.080	391716	100.000	66919	2917	1.041	--
总计		391716	100.000	66919			

图197 盐酸伐地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6031103批(10mg规格)-均一性2-pH6.8介质-极限转速-片1
供试品溶液-1




J632

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.8ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长: 245nm
数据文件名: RC\$J632 - 11-10/29-2431-2 - zzp-6031103p-rcqx-pH6.8jz-10mg-jyx2-jx-P2.lcd
方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$J632 - J632-20260320-FX278.lcb
样品瓶号: 4-15
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2026/03/21 04:04:57 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2026/03/23 09:11:48 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 245nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.080	383162	100.000	65459	2916	1.041	--
总计		383162	100.000	65459			

图198 盐酸伐地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6031103批(10mg规格)-均一性2-pH6.8介质-极限转速-片2
供试品溶液-1




J632

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.8ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长: 245nm
数据文件名: RC\$J632 - 11-10/29-2432-2 - zzp-6031103p-rcqx-pH6.8jz-10mg-jyx2-jx-P3.lcd
方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$J632 - J632-20260320-FX278.lcb
样品瓶号: 4-24
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2026/03/21 04:08:21 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2): 2026/03/23 09:11:51 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 245nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.080	389340	100.000	66500	2917	1.040	--
总计		389340	100.000	66500			

图199 盐酸伐地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6031103批(10mg规格)-均一性2-pH6.8介质-极限转速-片3
供试品溶液-1




J632

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.8ml/min
柱 温:40℃ 波长: 245nm
数据文件名: RC\$J632 - 11-10/29-2433-2 - zzp-6031103p-rcqx-pH6.8jz-10mg-jyx2-jx-P4.lcd
方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$J632 - J632-20260320-FX278.lcb
样品瓶号: 4-33
进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
进样时间: 2026/03/21 04:11:45 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2026/03/23 09:11:53 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 245nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.081	399601	100.000	68233	2915	1.042	--
总计		399601	100.000	68233			

图200 盐酸伐地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6031103批(10mg规格)-均一性2-pH6.8介质-极限转速-片4
供试品溶液-1




J632

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.8ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长: 245nm
数据文件名: RC\$J632 - 11-10/29-2434-2 - zzp-6031103p-rcqx-pH6.8jz-10mg-jyx2-jx-P5.lcd
方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$J632 - J632-20260320-FX278.lcb
样品瓶号: 4-42
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2026/03/21 04:15:08 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2): 2026/03/23 09:11:56 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 245nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.080	391963	100.000	66960	2919	1.041	--
总计		391963	100.000	66960			

图201 盐酸伐地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6031103批(10mg规格)-均一性2-pH6.8介质-极限转速-片5
供试品溶液-1

201




J632

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.8ml/min
柱温:40°C 波长: 245nm
数据文件名: RC\$J632 - 11-10/29-2435-2 - zzp-6031103p-rcqx-pH6.8jz-10mg-jyx2-jx-P6.lcd
方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$J632 - J632-20260320-FX278.lcb
样品瓶号: 4-51
进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
进样时间: 2026/03/21 04:18:33 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2): 2026/03/23 09:11:58 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 245nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.080	398466	100.000	68031	2919	1.042	--
总计		398466	100.000	68031			

图202 盐酸伐地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6031103批(10mg规格)-均一性2-pH6.8介质-极限转速-片6
供试品溶液-1




J632

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.8ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长: 245nm
数据文件名: RC\$J632 - 11-10/29-2436-2 - zzp-6031103p-rcqx-pH6.8jz-10mg-jyx2-dz2-1.lcd
方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$J632 - J632-20260320-FX278.lcb
样品瓶号: 3-27
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2026/03/21 04:21:56 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2): 2026/03/23 09:12:01 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 245nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.028	388170	100.000	62375	2459	1.051	--
总计		388170	100.000	62375			


图203 盐酸伐地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6031103批(10mg规格)-均一性2-pH6.8介质
对照品溶液-2-1

203

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.8ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长: 245nm
数据文件名: RC\$J632 - 11-10/29-2437-2 - zzp-6031103p-rcqx-pH6.8jz-10mg-jyx2-dz2-2.lcd
方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$J632 - J632-20260320-FX278.lcb
样品瓶号: 3-27
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2026/03/21 04:25:18 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2): 2026/03/23 09:12:04 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 245nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.028	387832	100.000	62357	2458	1.051	--
总计		387832	100.000	62357			