



塞来昔布片项目信息

介质体积(ml)	1000	取样体积(ml)	1.5	补液体积(ml)	1.5
对照品批号	510141-202102	对照品来源	中检院	对照品使用方法	直接使用
对照品含量(%)	99.6	对照品水分(%)	0	对照品稀释倍数	50
标示量(mg)	200	供试品稀释倍数	1	系数	1

对照品溶液

序号	称样量(mg)	A ₁	A ₂	A ₃	A ₄	A ₅	A _{平均}	RSD%
1	10.04	3045242	3048220	3057914	3046363	3053505	3050249	0.18
2	10.17	3046422	3044342				3045382	0.05

单位质量响应值		RSD%	判断
303809.66	299447.59	1.03	数据可信



操作者:

日期: 2026-08-16

复核者:

未审阅版本



供试品溶液-6031901批-pH1.0(内含0.5%Tween)

时间 (分钟)	样品	A ₁	A ₂	A _{平均}	溶出量(%)	平均(%)	RSD%	累计溶 出量(%)	平均(%)	RSD%
5min	1	319927	-	319927	10.565	10.05	7.40	10.56	10.05	7.38
	2	269176	-	269176	8.889			8.89		
	3	328259	-	328259	10.840			10.84		
	4	295194	-	295194	9.748			9.75		
	5	320800	-	320800	10.594			10.59		
	6	293197	-	293197	9.682			9.68		
10min	1	784900	-	784900	25.919	25.69	4.52	25.94	25.71	4.52
	2	728871	-	728871	24.069			24.08		
	3	831997	-	831997	27.475			27.49		
	4	764163	-	764163	25.235			25.25		
	5	796335	-	796335	26.297			26.31		
	6	761779	-	761779	25.156			25.17		
15min	1	1212183	-	1212183	40.029	40.29	3.77	40.08	40.34	3.78
	2	1172525	-	1172525	38.720			38.77		
	3	1294514	-	1294514	42.748			42.81		
	4	1194736	-	1194736	39.453			39.51		
	5	1255272	-	1255272	41.452			41.51		
	6	1191269	-	1191269	39.339			39.39		
20min	1	1588256	-	1588256	52.448	53.17	3.81	52.56	53.28	3.82
	2	1556971	-	1556971	51.415			51.52		
	3	1689113	-	1689113	55.779			55.90		
	4	1589557	-	1589557	52.491			52.60		
	5	1683964	-	1683964	55.609			55.73		
	6	1551948	-	1551948	51.249			51.36		
30min	1	2165192	-	2165192	71.500	71.63	1.72	71.69	71.82	1.73
	2	2120948	-	2120948	70.039			70.22		
	3	2211204	-	2211204	73.019			73.22		
	4	2177008	-	2177008	71.890			72.08		
	5	2207337	-	2207337	72.892			73.09		
	6	2133024	-	2133024	70.438			70.63		
45min	1	2691641	-	2691641	88.885	86.89	1.52	89.19	87.20	1.52
	2	2615522	-	2615522	86.371			86.66		
	3	2611925	-	2611925	86.252			86.57		
	4	2627943	-	2627943	86.781			87.08		
	5	2662116	-	2662116	87.910			88.22		
	6	2578965	-	2578965	85.164			85.46		
60min	1	2856423	-	2856423	94.326	93.21	0.68	94.76	93.64	0.68
	2	2824791	-	2824791	93.282			93.70		
	3	2805437	-	2805437	92.642			93.09		
	4	2813741	-	2813741	92.917			93.35		
	5	2829068	-	2829068	93.423			93.86		
	6	2806510	-	2806510	92.678			93.10		
极限	1	2934636	-	2934636	96.909	96.29	0.34	97.48	96.86	0.34
	2	2913607	-	2913607	96.214			96.77		
	3	2912257	-	2912257	96.170			96.75		
	4	2916642	-	2916642	96.315			96.88		
	5	2906867	-	2906867	95.992			96.57		
	6	2911593	-	2911593	96.148			96.71		



操作者:

日期: 2026-08-16

复核者:

未审阅版本



塞来昔布片项目信息

介质体积(ml)	1000	取样体积(ml)	1.5	补液体积(ml)	1.5
对照品批号	510141-202102	对照品来源	中检院	对照品使用方法	直接使用
对照品含量(%)	99.6	对照品水分(%)	0	对照品稀释倍数	50
标示量(mg)	200	供试品稀释倍数	1	系数	1

对照品溶液

序号	称样量(mg)	A ₁	A ₂	A ₃	A ₄	A ₅	A _{平均}	RSD%
1	10.04	3058233	3052995	3050163	3052226	3050923	3052908	0.11
2	10.17	3081099	3092100				3086600	0.26
单位质量响应值			RSD%	判断				
304074.50			0.14	数据可信				



操作者:

日期: 2026-08-16

复核者:

未审阅版本



供试品溶液-6031902批-pH1.0(内含0.5%Tween)

时间 (分钟)	样品	A ₁	A ₂	A _{平均}	溶出量(%)	平均(%)	RSD%	累计溶 出量(%)	平均(%)	RSD%
5min	1	220949	-	220949	7.244	7.66	7.71	7.24	7.66	7.74
	2	250099	-	250099	8.200			8.20		
	3	227995	-	227995	7.475			7.48		
	4	206605	-	206605	6.774			6.77		
	5	246641	-	246641	8.086			8.09		
	6	249694	-	249694	8.186			8.19		
10min	1	600257	-	600257	19.680	20.26	7.71	19.69	20.27	7.71
	2	684384	-	684384	22.438			22.45		
	3	577440	-	577440	18.932			18.94		
	4	567213	-	567213	18.597			18.61		
	5	666626	-	666626	21.856			21.87		
	6	612204	-	612204	20.072			20.08		
15min	1	976436	-	976436	32.014	33.04	9.35	32.05	33.08	9.35
	2	1133260	-	1133260	37.155			37.20		
	3	919357	-	919357	30.142			30.18		
	4	922147	-	922147	30.234			30.27		
	5	1115768	-	1115768	36.582			36.63		
	6	979148	-	979148	32.102			32.14		
20min	1	1340196	-	1340196	43.940	44.74	8.49	44.03	44.84	8.49
	2	1540411	-	1540411	50.504			50.61		
	3	1255200	-	1255200	41.153			41.24		
	4	1259096	-	1259096	41.281			41.36		
	5	1468505	-	1468505	48.147			48.25		
	6	1324718	-	1324718	43.432			43.52		
30min	1	1904834	-	1904834	62.452	62.99	4.88	62.61	63.15	4.89
	2	2050028	-	2050028	67.212			67.39		
	3	1818269	-	1818269	59.614			59.76		
	4	1832698	-	1832698	60.087			60.23		
	5	2012897	-	2012897	65.995			66.17		
	6	1908516	-	1908516	62.573			62.73		
45min	1	2446932	-	2446932	80.225	79.89	1.43	80.47	80.14	1.45
	2	2490123	-	2490123	81.641			81.92		
	3	2385043	-	2385043	78.196			78.43		
	4	2417402	-	2417402	79.257			79.49		
	5	2444470	-	2444470	80.145			80.42		
	6	2435789	-	2435789	79.860			80.11		
60min	1	2647219	-	2647219	86.792	86.89	0.48	87.16	87.26	0.49
	2	2658197	-	2658197	87.152			87.55		
	3	2629008	-	2629008	86.195			86.55		
	4	2650375	-	2650375	86.895			87.25		
	5	2648860	-	2648860	86.846			87.24		
	6	2666721	-	2666721	87.431			87.80		
极限	1	2764273	-	2764273	90.630	91.51	0.57	91.13	92.01	0.56
	2	2791627	-	2791627	91.527			92.06		
	3	2786577	-	2786577	91.361			91.84		
	4	2807631	-	2807631	92.051			92.54		
	5	2789900	-	2789900	91.470			91.99		
	6	2806171	-	2806171	92.003			92.50		



操作者:

日期: 2026-08-16

复核者:

未审阅版本




PCH-938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温:30°C 波长: 256nm
数据文件名: RC\$PCH-938 - 29-2/29-2-2 - zzp-6031901p-rcqx-pH1.0+0.5twjz-rj.lcd
方法文件名: RC\$PCH-938 - PCH-938-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-938 - 20260324-RCQX-FX278.lcb
样品瓶号: 1-9 版本号: 6.115
进样体积: 5 μ l 实验者: jiangjinwei
进样时间:2026/03/24 17:17:17 处理者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2026/03/25 10:02:04
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图1 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6031901批-pH1.0(内含0.5%Tween)介质
溶剂




PCH-938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温:30°C 波长: 256nm
数据文件名: RC\$PCH-938 - 29-2/29-3-2 - zzp-6031901p-rcqx-pH1.0+0.5twjz-dz1-1.lcd
方法文件名: RC\$PCH-938 - PCH-938-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-938 - 20260324-RCQX-FX278.lcb
样品瓶号: 1-18 版本号: 6.115
进样体积: 5 μ l 实验者: jiangjinwei
进样时间:2026/03/24 17:21:40 处理者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2026/03/25 10:02:09
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.142	3045242	100.000	418653	4485	1.175	--
总计		3045242	100.000	418653			

图2 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6031901批-pH1.0(内含0.5%Tween)介质
对照品溶液-1-1




PCH-938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温:30°C 波长: 256nm
数据文件名: RC\$PCH-938 - 29-2/29-4-2 - zzp-6031901p-rcqx-pH1.0+0.5twjz-dz1-2.lcd
方法文件名: RC\$PCH-938 - PCH-938-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-938 - 20260324-RCQX-FX278.lcb
样品瓶号: 1-18 版本号: 6.115
进样体积: 5 μ l 实验者: jiangjinwei
进样时间:2026/03/24 17:26:02 处理者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2026/03/25 10:02:12
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.143	3048220	100.000	418862	4480	1.177	--
总计		3048220	100.000	418862			

图3 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6031901批-pH1.0(内含0.5%Tween)介质
对照品溶液-1-2




PCH-938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温:30°C 波长: 256nm
数据文件名: RC\$PCH-938 - 29-2/29-5-2 - zzp-6031901p-rcqx-pH1.0+0.5twjz-dz1-3.lcd
方法文件名: RC\$PCH-938 - PCH-938-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-938 - 20260324-RCQX-FX278.lcb
样品瓶号: 1-18 版本号: 6.115
进样体积: 5 μ l 实验者: jiangjinwei
进样时间:2026/03/24 17:30:25 处理者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2026/03/25 10:02:15
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.143	3057914	100.000	419340	4469	1.178	--
总计		3057914	100.000	419340			

图4 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6031901批-pH1.0(内含0.5%Tween)介质
对照品溶液-1-3




PCH-938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温:30°C 波长: 256nm
数据文件名: RC\$PCH-938 - 29-2/29-6-2 - zzp-6031901p-rcqx-pH1.0+0.5twjz-dz1-4.lcd
方法文件名: RC\$PCH-938 - PCH-938-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-938 - 20260324-RCQX-FX278.lcb
样品瓶号: 1-18 版本号: 6.115
进样体积: 5 μ l 实验者: jiangjinwei
进样时间:2026/03/24 17:34:47 处理者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2026/03/25 10:02:18
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.142	3046363	100.000	417836	4475	1.179	--
总计		3046363	100.000	417836			

图5 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6031901批-pH1.0(内含0.5%Tween)介质
对照品溶液-1-4




PCH-938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温:30°C 波长: 256nm
数据文件名: RC\$PCH-938 - 29-2/29-7-2 - zzp-6031901p-rcqx-pH1.0+0.5twjz-dz1-5.lcd
方法文件名: RC\$PCH-938 - PCH-938-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-938 - 20260324-RCQX-FX278.lcb
样品瓶号: 1-18 版本号: 6.115
进样体积: 5 μ l 实验者: jiangjinwei
进样时间:2026/03/24 17:39:10 处理者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2026/03/25 10:02:20
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.142	3053505	100.000	418425	4471	1.183	--
总计		3053505	100.000	418425			

图6 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6031901批-pH1.0(内含0.5%Tween)介质
对照品溶液-1-5




PCH-938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温:30°C 波长: 256nm
数据文件名: RC\$PCH-938 - 29-2/29-8-2 - zzp-6031901p-rcqx-pH1.0+0.5twjz-p1-5min.lcd
方法文件名: RC\$PCH-938 - PCH-938-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-938 - 20260324-RCQX-FX278.lcb
样品瓶号: 1-1 版本号: 6.115
进样体积: 5 μ l 实验者: jiangjinwei
进样时间:2026/03/24 17:43:33 处理者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2026/03/25 10:02:23
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.150	319927	100.000	45294	4816	1.180	--
总计		319927	100.000	45294			

图7 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6031901批-pH1.0(内含0.5%Tween)介质-5min-片1
供试品溶液-1




PCH-938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温:30°C 波长: 256nm
数据文件名: RC\$PCH-938 - 29-2/29-9-2 - zzp-6031901p-rcqx-pH1.0+0.5twjz-p2-5min.lcd
方法文件名: RC\$PCH-938 - PCH-938-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-938 - 20260324-RCQX-FX278.lcb
样品瓶号: 1-10 版本号: 6.115
进样体积: 5 μ l 实验者: jiangjinwei
进样时间:2026/03/24 17:47:55 处理者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2026/03/25 10:02:26
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.150	269176	100.000	38135	4799	1.181	--
总计		269176	100.000	38135			

图8 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6031901批-pH1.0(内含0.5%Tween)介质-5min-片2
供试品溶液-1




PCH-938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温:30°C 波长: 256nm
数据文件名: RC\$PCH-938 - 29-2/29-10-2 - zzp-6031901p-rcqx-pH1.0+0.5twjz-p3-5min.lcd
方法文件名: RC\$PCH-938 - PCH-938-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-938 - 20260324-RCQX-FX278.lcb
样品瓶号: 1-19 版本号: 6.115
进样体积: 5 μ l 实验者: jiangjinwei
进样时间:2026/03/24 17:52:16 处理者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2026/03/25 10:02:28
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.150	328259	100.000	46393	4800	1.185	--
总计		328259	100.000	46393			

图9 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6031901批-pH1.0(内含0.5%Tween)介质-5min-片3
供试品溶液-1




PCH-938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温:30°C 波长: 256nm
数据文件名: RC\$PCH-938 - 29-2/29-11-2 - zzp-6031901p-rcqx-pH1.0+0.5twjz-p4-5min.lcd
方法文件名: RC\$PCH-938 - PCH-938-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-938 - 20260324-RCQX-FX278.lcb
样品瓶号: 1-28 版本号: 6.115
进样体积: 5 μ l 实验者: jiangjinwei
进样时间:2026/03/24 17:56:37 处理者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2026/03/25 10:02:31
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.151	295194	100.000	41670	4801	1.183	--
总计		295194	100.000	41670			

图10 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6031901批-pH1.0(内含0.5%Tween)介质-5min-片4
供试品溶液-1




PCH-938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温:30°C 波长: 256nm
数据文件名: RC\$PCH-938 - 29-2/29-12-2 - zzp-6031901p-rcqx-pH1.0+0.5twjz-p5-5min.lcd
方法文件名: RC\$PCH-938 - PCH-938-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-938 - 20260324-RCQX-FX278.lcb
样品瓶号: 1-37 版本号: 6.115
进样体积: 5 μ l 实验者: jiangjinwei
进样时间:2026/03/24 18:00:59 处理者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2026/03/25 10:02:33
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.150	320800	100.000	45248	4790	1.183	--
总计		320800	100.000	45248			

图11 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6031901批-pH1.0(内含0.5%Tween)介质-5min-片5
供试品溶液-1




PCH-938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温:30°C 波长: 256nm
数据文件名: RC\$PCH-938 - 29-2/29-13-2 - zzp-6031901p-rcqx-pH1.0+0.5twjz-p6-5min.lcd
方法文件名: RC\$PCH-938 - PCH-938-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-938 - 20260324-RCQX-FX278.lcb
样品瓶号: 1-46
进样体积: 5 μ l 版本号: 6.115
进样时间:2026/03/24 18:05:20 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2026/03/25 10:02:36 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.149	293197	100.000	41372	4787	1.184	--
总计		293197	100.000	41372			

图12 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6031901批-pH1.0(内含0.5%Tween)介质-5min-片6
供试品溶液-1




PCH-938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温:30°C 波长: 256nm
数据文件名: RC\$PCH-938 - 29-2/29-14-2 - zzp-6031901p-rcqx-pH1.0+0.5twjz-p1-10min.lcd
方法文件名: RC\$PCH-938 - PCH-938-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-938 - 20260324-RCQX-FX278.lcb
样品瓶号: 1-2 版本号: 6.115
进样体积: 5 μ l 实验者: jiangjinwei
进样时间:2026/03/24 18:09:42 处理者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2026/03/25 10:02:38
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.151	784900	100.000	110429	4783	1.182	--
总计		784900	100.000	110429			

图13 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6031901批-pH1.0(内含0.5%Tween)介质-10min-片1
供试品溶液-1




PCH-938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温:30°C 波长: 256nm
数据文件名: RC\$PCH-938 - 29-2/29-15-2 - zzp-6031901p-rcqx-pH1.0+0.5twjz-p2-10min.lcd
方法文件名: RC\$PCH-938 - PCH-938-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-938 - 20260324-RCQX-FX278.lcb
样品瓶号: 1-11 版本号: 6.115
进样体积: 5 μ l 实验者: jiangjinwei
进样时间:2026/03/24 18:14:04 处理者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2026/03/25 10:02:40
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.151	728871	100.000	102413	4777	1.181	--
总计		728871	100.000	102413			

图14 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6031901批-pH1.0(内含0.5%Tween)介质-10min-片2
供试品溶液-1




PCH-938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温:30°C 波长: 256nm
数据文件名: RC\$PCH-938 - 29-2/29-16-2 - zzp-6031901p-rcqx-pH1.0+0.5twjz-p3-10min.lcd
方法文件名: RC\$PCH-938 - PCH-938-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-938 - 20260324-RCQX-FX278.lcb
样品瓶号: 1-20 版本号: 6.115
进样体积: 5 μ l 实验者: jiangjinwei
进样时间:2026/03/24 18:18:25 处理者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2026/03/25 10:02:43
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.150	831997	100.000	117038	4777	1.180	--
总计		831997	100.000	117038			

图15 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6031901批-pH1.0(内含0.5%Tween)介质-10min-片3
供试品溶液-1




PCH-938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温:30°C 波长: 256nm
数据文件名: RC\$PCH-938 - 29-2/29-17-2 - zzp-6031901p-rcqx-pH1.0+0.5twjz-p4-10min.lcd
方法文件名: RC\$PCH-938 - PCH-938-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-938 - 20260324-RCQX-FX278.lcb
样品瓶号: 1-29 版本号: 6.115
进样体积: 5 μ l 实验者: jiangjinwei
进样时间:2026/03/24 18:22:46 处理者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2026/03/25 10:02:45
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.150	764163	100.000	107420	4768	1.179	--
总计		764163	100.000	107420			

图16 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6031901批-pH1.0(内含0.5%Tween)介质-10min-片4
供试品溶液-1




PCH-938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温:30°C 波长: 256nm
数据文件名: RC\$PCH-938 - 29-2/29-18-2 - zzp-6031901p-rcqx-pH1.0+0.5twjz-p5-10min.lcd
方法文件名: RC\$PCH-938 - PCH-938-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-938 - 20260324-RCQX-FX278.lcb
样品瓶号: 1-38
进样体积: 5 μ l 版本号: 6.115
进样时间:2026/03/24 18:27:08 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2026/03/25 10:02:48 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.150	796335	100.000	111936	4763	1.179	--
总计		796335	100.000	111936			

图17 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6031901批-pH1.0(内含0.5%Tween)介质-10min-片5
供试品溶液-1




PCH-938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温:30°C 波长: 256nm
数据文件名: RC\$PCH-938 - 29-2/29-19-2 - zzp-6031901p-rcqx-pH1.0+0.5twjz-p6-10min.lcd
方法文件名: RC\$PCH-938 - PCH-938-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-938 - 20260324-RCQX-FX278.lcb
样品瓶号: 1-47 版本号: 6.115
进样体积: 5 μ l 实验者: jiangjinwei
进样时间:2026/03/24 18:31:30 处理者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2026/03/25 10:02:50
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.149	761779	100.000	107074	4757	1.178	--
总计		761779	100.000	107074			

图18 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6031901批-pH1.0(内含0.5%Tween)介质-10min-片6
供试品溶液-1




PCH-938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温:30°C 波长: 256nm
数据文件名: RC\$PCH-938 - 29-2/29-20-2 - zzp-6031901p-rcqx-pH1.0+0.5twjz-p1-15min.lcd
方法文件名: RC\$PCH-938 - PCH-938-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-938 - 20260324-RCQX-FX278.lcb
样品瓶号: 1-3 版本号: 6.115
进样体积: 5 μ l 实验者: jiangjinwei
进样时间:2026/03/24 18:35:52 处理者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2026/03/25 10:02:53
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.149	1212183	100.000	170357	4748	1.176	--
总计		1212183	100.000	170357			

图19 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6031901批-pH1.0(内含0.5%Tween)介质-15min-片1
供试品溶液-1




PCH-938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温:30°C 波长: 256nm
数据文件名: RC\$PCH-938 - 29-2/29-21-2 - zzp-6031901p-rcqx-pH1.0+0.5twjz-p2-15min.lcd
方法文件名: RC\$PCH-938 - PCH-938-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-938 - 20260324-RCQX-FX278.lcb
样品瓶号: 1-12 版本号: 6.115
进样体积: 5 μ l 实验者: jiangjinwei
进样时间:2026/03/24 18:40:15 处理者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2026/03/25 10:02:55
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.150	1172525	100.000	164487	4748	1.175	--
总计		1172525	100.000	164487			

图20 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6031901批-pH1.0(内含0.5%Tween)介质-15min-片2
供试品溶液-1




PCH-938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温:30°C 波长: 256nm
数据文件名: RC\$PCH-938 - 29-2/29-22-2 - zzp-6031901p-rcqx-pH1.0+0.5twjz-p3-15min.lcd
方法文件名: RC\$PCH-938 - PCH-938-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-938 - 20260324-RCQX-FX278.lcb
样品瓶号: 1-21 版本号: 6.115
进样体积: 5 μ l 实验者: jiangjinwei
进样时间:2026/03/24 18:44:37 处理者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2026/03/25 10:02:58
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.150	1294514	100.000	181564	4739	1.174	--
总计		1294514	100.000	181564			

图21 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6031901批-pH1.0(内含0.5%Tween)介质-15min-片3
供试品溶液-1




PCH-938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温:30°C 波长: 256nm
数据文件名: RC\$PCH-938 - 29-2/29-23-2 - zzp-6031901p-rcqx-pH1.0+0.5twjz-p4-15min.lcd
方法文件名: RC\$PCH-938 - PCH-938-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-938 - 20260324-RCQX-FX278.lcb
样品瓶号: 1-30 版本号: 6.115
进样体积: 5 μ l 实验者: jiangjinwei
进样时间:2026/03/24 18:48:58 处理者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2026/03/25 10:03:00
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.149	1194736	100.000	167573	4733	1.174	--
总计		1194736	100.000	167573			

图22 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6031901批-pH1.0(内含0.5%Tween)介质-15min-片4
供试品溶液-1




PCH-938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温:30°C 波长: 256nm
数据文件名: RC\$PCH-938 - 29-2/29-24-2 - zzp-6031901p-rcqx-pH1.0+0.5twjz-p5-15min.lcd
方法文件名: RC\$PCH-938 - PCH-938-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-938 - 20260324-RCQX-FX278.lcb
样品瓶号: 1-39
进样体积: 5 μ l 版本号: 6.115
进样时间:2026/03/24 18:53:20 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2026/03/25 10:03:03 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.150	1255272	100.000	175758	4732	1.174	--
总计		1255272	100.000	175758			

图23 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6031901批-pH1.0(内含0.5%Tween)介质-15min-片5
供试品溶液-1




PCH-938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温:30°C 波长: 256nm
数据文件名: RC\$PCH-938 - 29-2/29-25-2 - zzp-6031901p-rcqx-pH1.0+0.5twjz-p6-15min.lcd
方法文件名: RC\$PCH-938 - PCH-938-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-938 - 20260324-RCQX-FX278.lcb
样品瓶号: 1-48
进样体积: 5 μ l 版本号: 6.115
进样时间:2026/03/24 18:57:42 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2026/03/25 10:03:05 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.150	1191269	100.000	166947	4736	1.174	--
总计		1191269	100.000	166947			

图24 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6031901批-pH1.0(内含0.5%Tween)介质-15min-片6
供试品溶液-1




PCH-938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温:30°C 波长: 256nm
数据文件名: RC\$PCH-938 - 29-2/29-26-2 - zzp-6031901p-rcqx-pH1.0+0.5twjz-p1-20min.lcd
方法文件名: RC\$PCH-938 - PCH-938-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-938 - 20260324-RCQX-FX278.lcb
样品瓶号: 1-4
进样体积: 5 μ l 版本号: 6.115
进样时间:2026/03/24 19:02:03 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2026/03/25 10:03:08 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.149	1588256	100.000	222706	4733	1.175	--
总计		1588256	100.000	222706			

图25 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6031901批-pH1.0(内含0.5%Tween)介质-20min-片1
供试品溶液-1




PCH-938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温:30°C 波长: 256nm
数据文件名: RC\$PCH-938 - 29-2/29-27-2 - zzp-6031901p-rcqx-pH1.0+0.5twjz-p2-20min.lcd
方法文件名: RC\$PCH-938 - PCH-938-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-938 - 20260324-RCQX-FX278.lcb
样品瓶号: 1-13 版本号: 6.115
进样体积: 5 μ l 实验者: jiangjinwei
进样时间:2026/03/24 19:06:25 处理者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2026/03/25 10:03:10
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.149	1556971	100.000	218274	4728	1.173	--
总计		1556971	100.000	218274			

图26 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6031901批-pH1.0(内含0.5%Tween)介质-20min-片2
供试品溶液-1




PCH-938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温:30°C 波长: 256nm
数据文件名: RC\$PCH-938 - 29-2/29-28-2 - zzp-6031901p-rcqx-pH1.0+0.5twjz-p3-20min.lcd
方法文件名: RC\$PCH-938 - PCH-938-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-938 - 20260324-RCQX-FX278.lcb
样品瓶号: 1-22 版本号: 6.115
进样体积: 5 μ l 实验者: jiangjinwei
进样时间:2026/03/24 19:10:47 处理者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2026/03/25 10:03:13
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.149	1689113	100.000	236602	4725	1.172	--
总计		1689113	100.000	236602			

图27 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6031901批-pH1.0(内含0.5%Tween)介质-20min-片3
供试品溶液-1




PCH-938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温:30°C 波长: 256nm
数据文件名: RC\$PCH-938 - 29-2/29-29-2 - zzp-6031901p-rcqx-pH1.0+0.5twjz-p4-20min.lcd
方法文件名: RC\$PCH-938 - PCH-938-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-938 - 20260324-RCQX-FX278.lcb
样品瓶号: 1-31 版本号: 6.115
进样体积: 5 μ l 实验者: jiangjinwei
进样时间:2026/03/24 19:15:09 处理者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2026/03/25 10:03:15
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.148	1589557	100.000	222901	4720	1.171	--
总计		1589557	100.000	222901			

图28 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6031901批-pH1.0(内含0.5%Tween)介质-20min-片4
供试品溶液-1




PCH-938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温:30°C 波长: 256nm
数据文件名: RC\$PCH-938 - 29-2/29-30-2 - zzp-6031901p-rcqx-pH1.0+0.5twjz-p5-20min.lcd
方法文件名: RC\$PCH-938 - PCH-938-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-938 - 20260324-RCQX-FX278.lcb
样品瓶号: 1-40 版本号: 6.115
进样体积: 5 μ l 实验者: jiangjinwei
进样时间:2026/03/24 19:19:31 处理者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2026/03/25 10:03:18
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.148	1683964	100.000	235893	4707	1.170	--
总计		1683964	100.000	235893			

图29 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6031901批-pH1.0(内含0.5%Tween)介质-20min-片5
供试品溶液-1




PCH-938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温:30°C 波长: 256nm
数据文件名: RC\$PCH-938 - 29-2/29-31-2 - zzp-6031901p-rcqx-pH1.0+0.5twjz-p6-20min.lcd
方法文件名: RC\$PCH-938 - PCH-938-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-938 - 20260324-RCQX-FX278.lcb
样品瓶号: 1-49
进样体积: 5 μ l 版本号: 6.115
进样时间:2026/03/24 19:23:53 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2026/03/25 10:03:20 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.148	1551948	100.000	217359	4702	1.168	--
总计		1551948	100.000	217359			

图30 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6031901批-pH1.0(内含0.5%Tween)介质-20min-片6
供试品溶液-1




PCH-938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温:30°C 波长: 256nm
数据文件名: RC\$PCH-938 - 29-2/29-32-2 - zzp-6031901p-rcqx-pH1.0+0.5twjz-p1-30min.lcd
方法文件名: RC\$PCH-938 - PCH-938-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-938 - 20260324-RCQX-FX278.lcb
样品瓶号: 1-5 版本号: 6.115
进样体积: 5 μ l 实验者: jiangjinwei
进样时间:2026/03/24 19:28:14 处理者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2026/03/25 10:03:23
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.149	2165192	100.000	302769	4690	1.168	--
总计		2165192	100.000	302769			

图31 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6031901批-pH1.0(内含0.5%Tween)介质-30min-片1
供试品溶液-1




PCH-938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温:30°C 波长: 256nm
数据文件名: RC\$PCH-938 - 29-2/29-33-2 - zzp-6031901p-rcqx-pH1.0+0.5twjz-p2-30min.lcd
方法文件名: RC\$PCH-938 - PCH-938-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-938 - 20260324-RCQX-FX278.lcb
样品瓶号: 1-14 版本号: 6.115
进样体积: 5 μ l 实验者: jiangjinwei
进样时间:2026/03/24 19:32:36 处理者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2026/03/25 10:03:26
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.148	2120948	100.000	296628	4692	1.166	--
总计		2120948	100.000	296628			

图32 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6031901批-pH1.0(内含0.5%Tween)介质-30min-片2
供试品溶液-1




PCH-938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温:30°C 波长: 256nm
数据文件名: RC\$PCH-938 - 29-2/29-34-2 - zzp-6031901p-rcqx-pH1.0+0.5twjz-p3-30min.lcd
方法文件名: RC\$PCH-938 - PCH-938-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-938 - 20260324-RCQX-FX278.lcb
样品瓶号: 1-23 版本号: 6.115
进样体积: 5 μ l 实验者: jiangjinwei
进样时间:2026/03/24 19:36:57 处理者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2026/03/25 10:03:28
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.149	2211204	100.000	308681	4687	1.165	--
总计		2211204	100.000	308681			

图33 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6031901批-pH1.0(内含0.5%Tween)介质-30min-片3
供试品溶液-1




PCH-938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温:30°C 波长: 256nm
数据文件名: RC\$PCH-938 - 29-2/29-35-2 - zzp-6031901p-rcqx-pH1.0+0.5twjz-p4-30min.lcd
方法文件名: RC\$PCH-938 - PCH-938-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-938 - 20260324-RCQX-FX278.lcb
样品瓶号: 1-32 版本号: 6.115
进样体积: 5 μ l 实验者: jiangjinwei
进样时间:2026/03/24 19:41:19 处理者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2026/03/25 10:03:31
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.148	2177008	100.000	304091	4683	1.163	--
总计		2177008	100.000	304091			

图34 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6031901批-pH1.0(内含0.5%Tween)介质-30min-片4
供试品溶液-1




PCH-938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温:30°C 波长: 256nm
数据文件名: RC\$PCH-938 - 29-2/29-36-2 - zzp-6031901p-rcqx-pH1.0+0.5twjz-p5-30min.lcd
方法文件名: RC\$PCH-938 - PCH-938-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-938 - 20260324-RCQX-FX278.lcb
样品瓶号: 1-41 版本号: 6.115
进样体积: 5 μ l 实验者: jiangjinwei
进样时间:2026/03/24 19:45:40 处理者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2026/03/25 10:03:34
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.149	2207337	100.000	307977	4674	1.162	--
总计		2207337	100.000	307977			

图35 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6031901批-pH1.0(内含0.5%Tween)介质-30min-片5
供试品溶液-1




PCH-938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温:30°C 波长: 256nm
数据文件名: RC\$PCH-938 - 29-2/29-37-2 - zzp-6031901p-rcqx-pH1.0+0.5twjz-p6-30min.lcd
方法文件名: RC\$PCH-938 - PCH-938-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-938 - 20260324-RCQX-FX278.lcb
样品瓶号: 1-50 版本号: 6.115
进样体积: 5 μ l 实验者: jiangjinwei
进样时间:2026/03/24 19:50:02 处理者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2026/03/25 10:03:36
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.149	2133024	100.000	297408	4665	1.160	--
总计		2133024	100.000	297408			

图36 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6031901批-pH1.0(内含0.5%Tween)介质-30min-片6
供试品溶液-1




PCH-938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温:30°C 波长: 256nm
数据文件名: RC\$PCH-938 - 29-2/29-38-2 - zzp-6031901p-rcqx-pH1.0+0.5twjz-p1-45min.lcd
方法文件名: RC\$PCH-938 - PCH-938-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-938 - 20260324-RCQX-FX278.lcb
样品瓶号: 1-6 版本号: 6.115
进样体积: 5 μ l 实验者: jiangjinwei
进样时间:2026/03/24 19:54:25 处理者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2026/03/25 10:03:39
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.149	2691641	100.000	375040	4660	1.159	--
总计		2691641	100.000	375040			

图37 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6031901批-pH1.0(内含0.5%Tween)介质-45min-片1
供试品溶液-1




PCH-938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温:30°C 波长: 256nm
数据文件名: RC\$PCH-938 - 29-2/29-39-2 - zzp-6031901p-rcqx-pH1.0+0.5twjz-p2-45min.lcd
方法文件名: RC\$PCH-938 - PCH-938-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-938 - 20260324-RCQX-FX278.lcb
样品瓶号: 1-15 版本号: 6.115
进样体积: 5 μ l 实验者: jiangjinwei
进样时间:2026/03/24 19:58:47 处理者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2026/03/25 10:03:41
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.149	2615522	100.000	364182	4656	1.157	--
总计		2615522	100.000	364182			

图38 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6031901批-pH1.0(内含0.5%Tween)介质-45min-片2
供试品溶液-1




PCH-938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温:30°C 波长: 256nm
数据文件名: RC\$PCH-938 - 29-2/29-40-2 - zzp-6031901p-rcqx-pH1.0+0.5twjz-p3-45min.lcd
方法文件名: RC\$PCH-938 - PCH-938-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-938 - 20260324-RCQX-FX278.lcb
样品瓶号: 1-24 版本号: 6.115
进样体积: 5 μ l 实验者: jiangjinwei
进样时间:2026/03/24 20:03:08 处理者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2026/03/25 10:03:44
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.148	2611925	100.000	363805	4651	1.156	--
总计		2611925	100.000	363805			

图39 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6031901批-pH1.0(内含0.5%Tween)介质-45min-片3
供试品溶液-1




PCH-938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm) 流速: 1.0ml/min
柱温:30°C 波长: 256nm
数据文件名: RC\$PCH-938 - 29-2/29-41-2 - zzp-6031901p-rcqx-pH1.0+0.5twjz-p4-45min.lcd
方法文件名: RC\$PCH-938 - PCH-938-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-938 - 20260324-RCQX-FX278.lcb
样品瓶号: 1-33 版本号: 6.115
进样体积: 5 μl 实验者: jiangjinwei
进样时间:2026/03/24 20:07:30 处理者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2026/03/25 10:03:46
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.148	2627943	100.000	365609	4642	1.154	--
总计		2627943	100.000	365609			

图40 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6031901批-pH1.0(内含0.5%Tween)介质-45min-片4
供试品溶液-1




PCH-938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温:30°C 波长: 256nm
数据文件名: RC\$PCH-938 - 29-2/29-42-2 - zzp-6031901p-rcqx-pH1.0+0.5twjz-p5-45min.lcd
方法文件名: RC\$PCH-938 - PCH-938-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-938 - 20260324-RCQX-FX278.lcb
样品瓶号: 1-42 版本号: 6.115
进样体积: 5 μ l 实验者: jiangjinwei
进样时间:2026/03/24 20:11:52 处理者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2026/03/25 10:03:48
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.148	2662116	100.000	370259	4636	1.153	--
总计		2662116	100.000	370259			

图41 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6031901批-pH1.0(内含0.5%Tween)介质-45min-片5
供试品溶液-1




PCH-938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温:30°C 波长: 256nm
数据文件名: RC\$PCH-938 - 29-2/29-43-2 - zzp-6031901p-rcqx-pH1.0+0.5twjz-p6-45min.lcd
方法文件名: RC\$PCH-938 - PCH-938-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-938 - 20260324-RCQX-FX278.lcb
样品瓶号: 1-51 版本号: 6.115
进样体积: 5 μ l 实验者: jiangjinwei
进样时间:2026/03/24 20:16:13 处理者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2026/03/25 10:03:51
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.149	2578965	100.000	358095	4625	1.151	--
总计		2578965	100.000	358095			

图42 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6031901批-pH1.0(内含0.5%Tween)介质-45min-片6
供试品溶液-1




PCH-938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温:30°C 波长: 256nm
数据文件名: RC\$PCH-938 - 29-2/29-44-2 - zzp-6031901p-rcqx-pH1.0+0.5twjz-p1-60min.lcd
方法文件名: RC\$PCH-938 - PCH-938-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-938 - 20260324-RCQX-FX278.lcb
样品瓶号: 1-7 版本号: 6.115
进样体积: 5 μ l 实验者: jiangjinwei
进样时间:2026/03/24 20:20:35 处理者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2026/03/25 10:03:53
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.148	2856423	100.000	396417	4616	1.150	--
总计		2856423	100.000	396417			

图43 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6031901批-pH1.0(内含0.5%Tween)介质-60min-片1
供试品溶液-1




PCH-938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温:30°C 波长: 256nm
数据文件名: RC\$PCH-938 - 29-2/29-45-2 - zzp-6031901p-rcqx-pH1.0+0.5twjz-p2-60min.lcd
方法文件名: RC\$PCH-938 - PCH-938-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-938 - 20260324-RCQX-FX278.lcb
样品瓶号: 1-16 版本号: 6.115
进样体积: 5 μ l 实验者: jiangjinwei
进样时间:2026/03/24 20:24:57 处理者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2026/03/25 10:03:56
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.149	2824791	100.000	391136	4611	1.147	--
总计		2824791	100.000	391136			

图44 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6031901批-pH1.0(内含0.5%Tween)介质-60min-片2
供试品溶液-1




PCH-938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温:30°C 波长: 256nm
数据文件名: RC\$PCH-938 - 29-2/29-46-2 - zzp-6031901p-rcqx-pH1.0+0.5twjz-p3-60min.lcd
方法文件名: RC\$PCH-938 - PCH-938-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-938 - 20260324-RCQX-FX278.lcb
样品瓶号: 1-25 版本号: 6.115
进样体积: 5 μ l 实验者: jiangjinwei
进样时间:2026/03/24 20:29:18 处理者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2026/03/25 10:03:58
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.149	2805437	100.000	388324	4602	1.146	--
总计		2805437	100.000	388324			

图45 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6031901批-pH1.0(内含0.5%Tween)介质-60min-片3
供试品溶液-1




PCH-938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温:30°C 波长: 256nm
数据文件名: RC\$PCH-938 - 29-2/29-47-2 - zzp-6031901p-rcqx-pH1.0+0.5twjz-p4-60min.lcd
方法文件名: RC\$PCH-938 - PCH-938-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-938 - 20260324-RCQX-FX278.lcb
样品瓶号: 1-34 版本号: 6.115
进样体积: 5 μ l 实验者: jiangjinwei
进样时间:2026/03/24 20:33:39 处理者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2026/03/25 10:04:01
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.149	2813741	100.000	388999	4598	1.144	--
总计		2813741	100.000	388999			

图46 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6031901批-pH1.0(内含0.5%Tween)介质-60min-片4
供试品溶液-1




PCH-938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温:30°C 波长: 256nm
数据文件名: RC\$PCH-938 - 29-2/29-48-2 - zzp-6031901p-rcqx-pH1.0+0.5twjz-p5-60min.lcd
方法文件名: RC\$PCH-938 - PCH-938-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-938 - 20260324-RCQX-FX278.lcb
样品瓶号: 1-43 版本号: 6.115
进样体积: 5 μ l 实验者: jiangjinwei
进样时间:2026/03/24 20:38:00 处理者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2026/03/25 10:04:03
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.149	2829068	100.000	390798	4583	1.142	--
总计		2829068	100.000	390798			

图47 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6031901批-pH1.0(内含0.5%Tween)介质-60min-片5
供试品溶液-1




PCH-938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温:30°C 波长: 256nm
数据文件名: RC\$PCH-938 - 29-2/29-49-2 - zzp-6031901p-rcqx-pH1.0+0.5twjz-p6-60min.lcd
方法文件名: RC\$PCH-938 - PCH-938-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-938 - 20260324-RCQX-FX278.lcb
样品瓶号: 1-52 版本号: 6.115
进样体积: 5 μ l 实验者: jiangjinwei
进样时间:2026/03/24 20:42:22 处理者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2026/03/25 10:04:06
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.149	2806510	100.000	387647	4575	1.140	--
总计		2806510	100.000	387647			

图48 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6031901批-pH1.0(内含0.5%Tween)介质-60min-片6
供试品溶液-1




PCH-938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温:30°C 波长: 256nm
数据文件名: RC\$PCH-938 - 29-2/29-50-2 - zzp-6031901p-rcqx-pH1.0+0.5twjz-p1-jx.lcd
方法文件名: RC\$PCH-938 - PCH-938-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-938 - 20260324-RCQX-FX278.lcb
样品瓶号: 1-8 版本号: 6.115
进样体积: 5 μ l 实验者: jiangjinwei
进样时间:2026/03/24 20:46:44 处理者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2026/03/25 10:04:08
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.149	2934636	100.000	404868	4569	1.138	--
总计		2934636	100.000	404868			

图49 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6031901批-pH1.0(内含0.5%Tween)介质-极限转速-片1
供试品溶液-1




PCH-938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温:30°C 波长: 256nm
数据文件名: RC\$PCH-938 - 29-2/29-51-2 - zzp-6031901p-rcqx-pH1.0+0.5twjz-p2-jx.lcd
方法文件名: RC\$PCH-938 - PCH-938-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-938 - 20260324-RCQX-FX278.lcb
样品瓶号: 1-17 版本号: 6.115
进样体积: 5 μ l 实验者: jiangjinwei
进样时间:2026/03/24 20:51:07 处理者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2026/03/25 10:04:11
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.149	2913607	100.000	401699	4570	1.137	--
总计		2913607	100.000	401699			

图50 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6031901批-pH1.0(内含0.5%Tween)介质-极限转速-片2
供试品溶液-1




PCH-938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温:30°C 波长: 256nm
数据文件名: RC\$PCH-938 - 29-2/29-52-2 - zzp-6031901p-rcqx-pH1.0+0.5twjz-p3-jx.lcd
方法文件名: RC\$PCH-938 - PCH-938-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-938 - 20260324-RCQX-FX278.lcb
样品瓶号: 1-26 版本号: 6.115
进样体积: 5 μ l 实验者: jiangjinwei
进样时间:2026/03/24 20:55:29 处理者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2026/03/25 10:04:13
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.149	2912257	100.000	401081	4562	1.135	--
总计		2912257	100.000	401081			

图51 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6031901批-pH1.0(内含0.5%Tween)介质-极限转速-片3
供试品溶液-1




PCH-938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温:30°C 波长: 256nm
数据文件名: RC\$PCH-938 - 29-2/29-53-2 - zzp-6031901p-rcqx-pH1.0+0.5twjz-p4-jx.lcd
方法文件名: RC\$PCH-938 - PCH-938-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-938 - 20260324-RCQX-FX278.lcb
样品瓶号: 1-35 版本号: 6.115
进样体积: 5 μ l 实验者: jiangjinwei
进样时间:2026/03/24 20:59:52 处理者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2026/03/25 10:04:16
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.149	2916642	100.000	401225	4550	1.132	--
总计		2916642	100.000	401225			

图52 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6031901批-pH1.0(内含0.5%Tween)介质-极限转速-片4
供试品溶液-1




PCH-938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温:30°C 波长: 256nm
数据文件名: RC\$PCH-938 - 29-2/29-54-2 - zzp-6031901p-rcqx-pH1.0+0.5twjz-p5-jx.lcd
方法文件名: RC\$PCH-938 - PCH-938-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-938 - 20260324-RCQX-FX278.lcb
样品瓶号: 1-44 版本号: 6.115
进样体积: 5 μ l 实验者: jiangjinwei
进样时间:2026/03/24 21:04:14 处理者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2026/03/25 10:04:18
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.149	2906867	100.000	399749	4541	1.130	--
总计		2906867	100.000	399749			

图53 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6031901批-pH1.0(内含0.5%Tween)介质-极限转速-片5
供试品溶液-1




PCH-938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温:30°C 波长: 256nm
数据文件名: RC\$PCH-938 - 29-2/29-55-2 - zzp-6031901p-rcqx-pH1.0+0.5twjz-p6-jx.lcd
方法文件名: RC\$PCH-938 - PCH-938-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-938 - 20260324-RCQX-FX278.lcb
样品瓶号: 1-53
进样体积: 5 μ l 版本号: 6.115
进样时间:2026/03/24 21:08:37 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2026/03/25 10:04:21 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.149	2911593	100.000	399972	4539	1.128	--
总计		2911593	100.000	399972			

图54 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6031901批-pH1.0(内含0.5%Tween)介质-极限转速-片6
供试品溶液-1




PCH-938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温:30°C 波长: 256nm
数据文件名: RC\$PCH-938 - 29-2/29-56-2 - zzp-6031901p-rcqx-pH1.0+0.5twjz-dz2-1.lcd
方法文件名: RC\$PCH-938 - PCH-938-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-938 - 20260324-RCQX-FX278.lcb
样品瓶号: 1-27
进样体积: 5 μ l 版本号: 6.115
进样时间:2026/03/24 21:13:00 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2026/03/25 10:04:23 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.141	3046422	100.000	405072	4204	1.125	--
总计		3046422	100.000	405072			

图55 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6031901批-pH1.0(内含0.5%Tween)介质
对照品溶液-2-1




PCH-938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温:30°C 波长: 256nm
数据文件名: RC\$PCH-938 - 29-2/29-57-2 - zzp-6031901p-rcqx-pH1.0+0.5twjz-dz2-2.lcd
方法文件名: RC\$PCH-938 - PCH-938-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-938 - 20260324-RCQX-FX278.lcb
样品瓶号: 1-27
进样体积: 5 μ l 版本号: 6.115
进样时间:2026/03/24 21:17:23 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2026/03/25 10:04:26 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.141	3044342	100.000	404574	4206	1.124	--
总计		3044342	100.000	404574			

图56 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6031901批-pH1.0(内含0.5%Tween)介质
对照品溶液-2-2




PCH-938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm)
柱 温:30°C
数据文件名: RC\$PCH-938 - 29-2/29-58-2 - zzp-6031902p-rcqx-pH1.0+0.5twjz-rj.lcd
方法文件名: RC\$PCH-938 - PCH-938-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-938 - 20260324-RCQX-FX278.lcb
样品瓶号: 2-9
进样体积: 5 μl
进样时间:2026/03/24 21:21:46
处理时间 (V2) : 2026/03/25 10:04:28
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

流速: 1.0ml/min
波长: 256nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图57 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6031902批-pH1.0(内含0.5%Tween)介质
溶剂




PCH-938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温:30°C 波长: 256nm
数据文件名: RC\$PCH-938 - 29-2/29-59-2 - zzp-6031902p-rcqx-pH1.0+0.5twjz-dz1-1.lcd
方法文件名: RC\$PCH-938 - PCH-938-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-938 - 20260324-RCQX-FX278.lcb
样品瓶号: 2-18
进样体积: 5 μ l 版本号: 6.115
进样时间:2026/03/24 21:26:10 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2026/03/25 10:04:31 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.140	3058233	100.000	406489	4191	1.122	--
总计		3058233	100.000	406489			

图58 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6031902批-pH1.0(内含0.5%Tween)介质
对照品溶液-1-1




PCH-938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温:30°C 波长: 256nm
数据文件名: RC\$PCH-938 - 29-2/29-60-2 - zzp-6031902p-rcqx-pH1.0+0.5twjz-dz1-2.lcd
方法文件名: RC\$PCH-938 - PCH-938-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-938 - 20260324-RCQX-FX278.lcb
样品瓶号: 2-18 版本号: 6.115
进样体积: 5 μ l 实验者: jiangjinwei
进样时间:2026/03/24 21:30:33 处理者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2026/03/25 10:04:33
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.140	3052995	100.000	405499	4183	1.119	--
总计		3052995	100.000	405499			

图59 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6031902批-pH1.0(内含0.5%Tween)介质
对照品溶液-1-2




PCH-938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温:30°C 波长: 256nm
数据文件名: RC\$PCH-938 - 29-2/29-61-2 - zzp-6031902p-rcqx-pH1.0+0.5twjz-dz1-3.lcd
方法文件名: RC\$PCH-938 - PCH-938-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-938 - 20260324-RCQX-FX278.lcb
样品瓶号: 2-18
进样体积: 5 μ l 版本号: 6.115
进样时间:2026/03/24 21:34:57 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2026/03/25 10:04:36 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.140	3050163	100.000	404910	4182	1.117	--
总计		3050163	100.000	404910			

图60 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6031902批-pH1.0(内含0.5%Tween)介质
对照品溶液-1-3




PCH-938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温:30°C 波长: 256nm
数据文件名: RC\$PCH-938 - 29-2/29-62-2 - zzp-6031902p-rcqx-pH1.0+0.5twjz-dz1-4.lcd
方法文件名: RC\$PCH-938 - PCH-938-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-938 - 20260324-RCQX-FX278.lcb
样品瓶号: 2-18 版本号: 6.115
进样体积: 5 μ l 实验者: jiangjinwei
进样时间:2026/03/24 21:39:21 处理者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2026/03/25 10:04:38
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.140	3052226	100.000	404663	4170	1.115	--
总计		3052226	100.000	404663			

图61 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6031902批-pH1.0(内含0.5%Tween)介质
对照品溶液-1-4




PCH-938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温:30°C 波长: 256nm
数据文件名: RC\$PCH-938 - 29-2/29-63-2 - zzp-6031902p-rcqx-pH1.0+0.5twjz-dz1-5.lcd
方法文件名: RC\$PCH-938 - PCH-938-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-938 - 20260324-RCQX-FX278.lcb
样品瓶号: 2-18 版本号: 6.115
进样体积: 5 μ l 实验者: jiangjinwei
进样时间:2026/03/24 21:43:44 处理者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2026/03/25 10:04:41
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.139	3050923	100.000	404165	4162	1.113	--
总计		3050923	100.000	404165			

图62 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6031902批-pH1.0(内含0.5%Tween)介质
对照品溶液-1-5




PCH-938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温:30°C 波长: 256nm
数据文件名: RC\$PCH-938 - 29-2/29-64-2 - zzp-6031902p-rcqx-pH1.0+0.5twjz-p1-5min.lcd
方法文件名: RC\$PCH-938 - PCH-938-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-938 - 20260324-RCQX-FX278.lcb
样品瓶号: 2-1 版本号: 6.115
进样体积: 5 μ l 实验者: jiangjinwei
进样时间:2026/03/24 21:48:07 处理者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2026/03/25 10:04:43
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.148	220949	100.000	30259	4492	1.108	--
总计		220949	100.000	30259			

图63 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6031902批-pH1.0(内含0.5%Tween)介质-5min-片1
供试品溶液-1




PCH-938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温:30°C 波长: 256nm
数据文件名: RC\$PCH-938 - 29-2/29-65-2 - zzp-6031902p-rcqx-pH1.0+0.5twjz-p2-5min.lcd
方法文件名: RC\$PCH-938 - PCH-938-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-938 - 20260324-RCQX-FX278.lcb
样品瓶号: 2-10 版本号: 6.115
进样体积: 5 μ l 实验者: jiangjinwei
进样时间:2026/03/24 21:52:30 处理者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2026/03/25 10:04:46
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.148	250099	100.000	34135	4476	1.110	--
总计		250099	100.000	34135			

图64 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6031902批-pH1.0(内含0.5%Tween)介质-5min-片2
供试品溶液-1




PCH-938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温:30°C 波长: 256nm
数据文件名: RC\$PCH-938 - 29-2/29-66-2 - zzp-6031902p-rcqx-pH1.0+0.5twjz-p3-5min.lcd
方法文件名: RC\$PCH-938 - PCH-938-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-938 - 20260324-RCQX-FX278.lcb
样品瓶号: 2-19 版本号: 6.115
进样体积: 5 μ l 实验者: jiangjinwei
进样时间:2026/03/24 21:56:52 处理者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2026/03/25 10:04:48
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.149	227995	100.000	31026	4460	1.107	--
总计		227995	100.000	31026			

图65 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6031902批-pH1.0(内含0.5%Tween)介质-5min-片3
供试品溶液-1




PCH-938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温:30°C 波长: 256nm
数据文件名: RC\$PCH-938 - 29-2/29-67-2 - zzp-6031902p-rcqx-pH1.0+0.5twjz-p4-5min.lcd
方法文件名: RC\$PCH-938 - PCH-938-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-938 - 20260324-RCQX-FX278.lcb
样品瓶号: 2-28 版本号: 6.115
进样体积: 5 μ l 实验者: jiangjinwei
进样时间:2026/03/24 22:01:15 处理者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2026/03/25 10:04:51
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.149	206605	100.000	28043	4456	1.105	--
总计		206605	100.000	28043			

图66 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6031902批-pH1.0(内含0.5%Tween)介质-5min-片4
供试品溶液-1




PCH-938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温:30°C 波长: 256nm
数据文件名: RC\$PCH-938 - 29-2/29-68-2 - zzp-6031902p-rcqx-pH1.0+0.5twjz-p5-5min.lcd
方法文件名: RC\$PCH-938 - PCH-938-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-938 - 20260324-RCQX-FX278.lcb
样品瓶号: 2-37 版本号: 6.115
进样体积: 5 μ l 实验者: jiangjinwei
进样时间:2026/03/24 22:05:38 处理者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2026/03/25 10:04:53
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.149	246641	100.000	33466	4429	1.103	--
总计		246641	100.000	33466			

图67 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6031902批-pH1.0(内含0.5%Tween)介质-5min-片5
供试品溶液-1




PCH-938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温:30°C 波长: 256nm
数据文件名: RC\$PCH-938 - 29-2/29-69-2 - zzp-6031902p-rcqx-pH1.0+0.5twjz-p6-5min.lcd
方法文件名: RC\$PCH-938 - PCH-938-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-938 - 20260324-RCQX-FX278.lcb
样品瓶号: 2-46
进样体积: 5 μ l 版本号: 6.115
进样时间:2026/03/24 22:10:00 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2026/03/25 10:04:56 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.150	249694	100.000	33810	4424	1.098	--
总计		249694	100.000	33810			

图68 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6031902批-pH1.0(内含0.5%Tween)介质-5min-片6
供试品溶液-1




PCH-938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温:30°C 波长: 256nm
数据文件名: RC\$PCH-938 - 29-2/29-70-2 - zzp-6031902p-rcqx-pH1.0+0.5twjz-p1-10min.lcd
方法文件名: RC\$PCH-938 - PCH-938-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-938 - 20260324-RCQX-FX278.lcb
样品瓶号: 2-2 版本号: 6.115
进样体积: 5 μ l 实验者: jiangjinwei
进样时间:2026/03/24 22:14:23 处理者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2026/03/25 10:04:58
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.149	600257	100.000	81239	4414	1.101	--
总计		600257	100.000	81239			

图69 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6031902批-pH1.0(内含0.5%Tween)介质-10min-片1
供试品溶液-1




PCH-938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温:30°C 波长: 256nm
数据文件名: RC\$PCH-938 - 29-2/29-71-2 - zzp-6031902p-rcqx-pH1.0+0.5twjz-p2-10min.lcd
方法文件名: RC\$PCH-938 - PCH-938-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-938 - 20260324-RCQX-FX278.lcb
样品瓶号: 2-11 版本号: 6.115
进样体积: 5 μ l 实验者: jiangjinwei
进样时间:2026/03/24 22:18:47 处理者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2026/03/25 10:05:01
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.149	684384	100.000	92603	4406	1.100	--
总计		684384	100.000	92603			

图70 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6031902批-pH1.0(内含0.5%Tween)介质-10min-片2
供试品溶液-1




PCH-938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温:30°C 波长: 256nm
数据文件名: RC\$PCH-938 - 29-2/29-72-2 - zzp-6031902p-rcqx-pH1.0+0.5twjz-p3-10min.lcd
方法文件名: RC\$PCH-938 - PCH-938-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-938 - 20260324-RCQX-FX278.lcb
样品瓶号: 2-20 版本号: 6.115
进样体积: 5 μ l 实验者: jiangjinwei
进样时间:2026/03/24 22:23:11 处理者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2026/03/25 10:05:03
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.150	577440	100.000	77974	4400	1.097	--
总计		577440	100.000	77974			

图71 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6031902批-pH1.0(内含0.5%Tween)介质-10min-片3
供试品溶液-1




PCH-938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温:30°C 波长: 256nm
数据文件名: RC\$PCH-938 - 29-2/29-73-2 - zzp-6031902p-rcqx-pH1.0+0.5twjz-p4-10min.lcd
方法文件名: RC\$PCH-938 - PCH-938-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-938 - 20260324-RCQX-FX278.lcb
样品瓶号: 2-29 版本号: 6.115
进样体积: 5 μ l 实验者: jiangjinwei
进样时间:2026/03/24 22:27:34 处理者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2026/03/25 10:05:06
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.151	567213	100.000	76356	4391	1.095	--
总计		567213	100.000	76356			

图72 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6031902批-pH1.0(内含0.5%Tween)介质-10min-片4
供试品溶液-1




PCH-938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温:30°C 波长: 256nm
数据文件名: RC\$PCH-938 - 29-2/29-74-2 - zzp-6031902p-rcqx-pH1.0+0.5twjz-p5-10min.lcd
方法文件名: RC\$PCH-938 - PCH-938-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-938 - 20260324-RCQX-FX278.lcb
样品瓶号: 2-38 版本号: 6.115
进样体积: 5 μ l 实验者: jiangjinwei
进样时间:2026/03/24 22:31:56 处理者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2026/03/25 10:05:08
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.150	666626	100.000	89812	4383	1.094	--
总计		666626	100.000	89812			

图73 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6031902批-pH1.0(内含0.5%Tween)介质-10min-片5
供试品溶液-1




PCH-938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温:30°C 波长: 256nm
数据文件名: RC\$PCH-938 - 29-2/29-75-2 - zzp-6031902p-rcqx-pH1.0+0.5twjz-p6-10min.lcd
方法文件名: RC\$PCH-938 - PCH-938-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-938 - 20260324-RCQX-FX278.lcb
样品瓶号: 2-47
进样体积: 5 μ l 版本号: 6.115
进样时间:2026/03/24 22:36:19 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2026/03/25 10:05:11 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.150	612204	100.000	82363	4370	1.092	--
总计		612204	100.000	82363			

图74 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6031902批-pH1.0(内含0.5%Tween)介质-10min-片6
供试品溶液-1




PCH-938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温:30°C 波长: 256nm
数据文件名: RC\$PCH-938 - 29-2/29-76-2 - zzp-6031902p-rcqx-pH1.0+0.5twjz-p1-15min.lcd
方法文件名: RC\$PCH-938 - PCH-938-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-938 - 20260324-RCQX-FX278.lcb
样品瓶号: 2-3 版本号: 6.115
进样体积: 5 μ l 实验者: jiangjinwei
进样时间:2026/03/24 22:40:42 处理者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2026/03/25 10:05:13
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.150	976436	100.000	131297	4362	1.091	--
总计		976436	100.000	131297			

图75 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6031902批-pH1.0(内含0.5%Tween)介质-15min-片1
供试品溶液-1




PCH-938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温:30°C 波长: 256nm
数据文件名: RC\$PCH-938 - 29-2/29-77-2 - zzp-6031902p-rcqx-pH1.0+0.5twjz-p2-15min.lcd
方法文件名: RC\$PCH-938 - PCH-938-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-938 - 20260324-RCQX-FX278.lcb
样品瓶号: 2-12 版本号: 6.115
进样体积: 5 μ l 实验者: jiangjinwei
进样时间:2026/03/24 22:45:05 处理者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2026/03/25 10:05:16
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.151	1133260	100.000	151979	4350	1.088	--
总计		1133260	100.000	151979			

图76 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6031902批-pH1.0(内含0.5%Tween)介质-15min-片2
供试品溶液-1




PCH-938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温:30°C 波长: 256nm
数据文件名: RC\$PCH-938 - 29-2/29-78-2 - zzp-6031902p-rcqx-pH1.0+0.5twjz-p3-15min.lcd
方法文件名: RC\$PCH-938 - PCH-938-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-938 - 20260324-RCQX-FX278.lcb
样品瓶号: 2-21 版本号: 6.115
进样体积: 5 μ l 实验者: jiangjinwei
进样时间:2026/03/24 22:49:28 处理者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2026/03/25 10:05:19
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.151	919357	100.000	123178	4341	1.085	--
总计		919357	100.000	123178			

图77 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6031902批-pH1.0(内含0.5%Tween)介质-15min-片3
供试品溶液-1




PCH-938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温:30°C 波长: 256nm
数据文件名: RC\$PCH-938 - 29-2/29-79-2 - zzp-6031902p-rcqx-pH1.0+0.5twjz-p4-15min.lcd
方法文件名: RC\$PCH-938 - PCH-938-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-938 - 20260324-RCQX-FX278.lcb
样品瓶号: 2-30 版本号: 6.115
进样体积: 5 μ l 实验者: jiangjinwei
进样时间:2026/03/24 22:53:51 处理者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2026/03/25 10:05:22
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.151	922147	100.000	123474	4331	1.084	--
总计		922147	100.000	123474			

图78 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6031902批-pH1.0(内含0.5%Tween)介质-15min-片4
供试品溶液-1




PCH-938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温:30°C 波长: 256nm
数据文件名: RC\$PCH-938 - 29-2/29-80-2 - zzp-6031902p-rcqx-pH1.0+0.5twjz-p5-15min.lcd
方法文件名: RC\$PCH-938 - PCH-938-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-938 - 20260324-RCQX-FX278.lcb
样品瓶号: 2-39
进样体积: 5 μ l 版本号: 6.115
进样时间:2026/03/24 22:58:13 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2026/03/25 10:05:24 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.152	1115768	100.000	149228	4319	1.081	--
总计		1115768	100.000	149228			

图79 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6031902批-pH1.0(内含0.5%Tween)介质-15min-片5
供试品溶液-1




PCH-938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温:30°C 波长: 256nm
数据文件名: RC\$PCH-938 - 29-2/29-81-2 - zzp-6031902p-rcqx-pH1.0+0.5twjz-p6-15min.lcd
方法文件名: RC\$PCH-938 - PCH-938-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-938 - 20260324-RCQX-FX278.lcb
样品瓶号: 2-48 版本号: 6.115
进样体积: 5 μ l 实验者: jiangjinwei
进样时间:2026/03/24 23:02:36 处理者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2026/03/25 10:05:27
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.152	979148	100.000	130818	4314	1.079	--
总计		979148	100.000	130818			

图80 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6031902批-pH1.0(内含0.5%Tween)介质-15min-片6
供试品溶液-1




PCH-938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温:30°C 波长: 256nm
数据文件名: RC\$PCH-938 - 29-2/29-82-2 - zzp-6031902p-rcqx-pH1.0+0.5twjz-p1-20min.lcd
方法文件名: RC\$PCH-938 - PCH-938-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-938 - 20260324-RCQX-FX278.lcb
样品瓶号: 2-4 版本号: 6.115
进样体积: 5 μ l 实验者: jiangjinwei
进样时间:2026/03/24 23:07:00 处理者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2026/03/25 10:05:30
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.152	1340196	100.000	178970	4306	1.078	--
总计		1340196	100.000	178970			

图81 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6031902批-pH1.0(内含0.5%Tween)介质-20min-片1
供试品溶液-1




PCH-938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温:30°C 波长: 256nm
数据文件名: RC\$PCH-938 - 29-2/29-83-2 - zzp-6031902p-rcqx-pH1.0+0.5twjz-p2-20min.lcd
方法文件名: RC\$PCH-938 - PCH-938-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-938 - 20260324-RCQX-FX278.lcb
样品瓶号: 2-13 版本号: 6.115
进样体积: 5 μ l 实验者: jiangjinwei
进样时间:2026/03/24 23:11:24 处理者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2026/03/25 10:05:32
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.152	1540411	100.000	205402	4293	1.075	--
总计		1540411	100.000	205402			

图82 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6031902批-pH1.0(内含0.5%Tween)介质-20min-片2
供试品溶液-1




PCH-938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温:30°C 波长: 256nm
数据文件名: RC\$PCH-938 - 29-2/29-84-2 - zzp-6031902p-rcqx-pH1.0+0.5twjz-p3-20min.lcd
方法文件名: RC\$PCH-938 - PCH-938-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-938 - 20260324-RCQX-FX278.lcb
样品瓶号: 2-22 版本号: 6.115
进样体积: 5 μ l 实验者: jiangjinwei
进样时间:2026/03/24 23:15:47 处理者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2026/03/25 10:05:35
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.151	1255200	100.000	166944	4278	1.073	--
总计		1255200	100.000	166944			

图83 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6031902批-pH1.0(内含0.5%Tween)介质-20min-片3
供试品溶液-1




PCH-938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温:30°C 波长: 256nm
数据文件名: RC\$PCH-938 - 29-2/29-85-2 - zzp-6031902p-rcqx-pH1.0+0.5twjz-p4-20min.lcd
方法文件名: RC\$PCH-938 - PCH-938-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-938 - 20260324-RCQX-FX278.lcb
样品瓶号: 2-31 版本号: 6.115
进样体积: 5 μ l 实验者: jiangjinwei
进样时间:2026/03/24 23:20:10 处理者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2026/03/25 10:05:37
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.152	1259096	100.000	167275	4266	1.072	--
总计		1259096	100.000	167275			

图84 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6031902批-pH1.0(内含0.5%Tween)介质-20min-片4
供试品溶液-1




PCH-938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温:30°C 波长: 256nm
数据文件名: RC\$PCH-938 - 29-2/29-86-2 - zzp-6031902p-rcqx-pH1.0+0.5twjz-p5-20min.lcd
方法文件名: RC\$PCH-938 - PCH-938-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-938 - 20260324-RCQX-FX278.lcb
样品瓶号: 2-40 版本号: 6.115
进样体积: 5 μ l 实验者: jiangjinwei
进样时间:2026/03/24 23:24:34 处理者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2026/03/25 10:05:40
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.152	1468505	100.000	195000	4261	1.070	--
总计		1468505	100.000	195000			

图85 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6031902批-pH1.0(内含0.5%Tween)介质-20min-片5
供试品溶液-1




PCH-938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温:30°C 波长: 256nm
数据文件名: RC\$PCH-938 - 29-2/29-87-2 - zzp-6031902p-rcqx-pH1.0+0.5twjz-p6-20min.lcd
方法文件名: RC\$PCH-938 - PCH-938-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-938 - 20260324-RCQX-FX278.lcb
样品瓶号: 2-49 版本号: 6.115
进样体积: 5 μ l 实验者: jiangjinwei
进样时间:2026/03/24 23:28:57 处理者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2026/03/25 10:05:42
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.152	1324718	100.000	175721	4252	1.068	--
总计		1324718	100.000	175721			

图86 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6031902批-pH1.0(内含0.5%Tween)介质-20min-片6
供试品溶液-1




PCH-938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温:30°C 波长: 256nm
数据文件名: RC\$PCH-938 - 29-2/29-88-2 - zzp-6031902p-rcqx-pH1.0+0.5twjz-p1-30min.lcd
方法文件名: RC\$PCH-938 - PCH-938-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-938 - 20260324-RCQX-FX278.lcb
样品瓶号: 2-5 版本号: 6.115
进样体积: 5 μ l 实验者: jiangjinwei
进样时间:2026/03/24 23:33:21 处理者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2026/03/25 10:05:45
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.153	1904834	100.000	252546	4234	1.066	--
总计		1904834	100.000	252546			

图87 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6031902批-pH1.0(内含0.5%Tween)介质-30min-片1
供试品溶液-1




PCH-938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温:30°C 波长: 256nm
数据文件名: RC\$PCH-938 - 29-2/29-89-2 - zzp-6031902p-rcqx-pH1.0+0.5twjz-p2-30min.lcd
方法文件名: RC\$PCH-938 - PCH-938-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-938 - 20260324-RCQX-FX278.lcb
样品瓶号: 2-14 版本号: 6.115
进样体积: 5 μ l 实验者: jiangjinwei
进样时间:2026/03/24 23:37:44 处理者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2026/03/25 10:05:47
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.154	2050028	100.000	271678	4226	1.064	--
总计		2050028	100.000	271678			

图88 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6031902批-pH1.0(内含0.5%Tween)介质-30min-片2
供试品溶液-1




PCH-938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温:30°C 波长: 256nm
数据文件名: RC\$PCH-938 - 29-2/29-90-2 - zzp-6031902p-rcqx-pH1.0+0.5twjz-p3-30min.lcd
方法文件名: RC\$PCH-938 - PCH-938-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-938 - 20260324-RCQX-FX278.lcb
样品瓶号: 2-23 版本号: 6.115
进样体积: 5 μ l 实验者: jiangjinwei
进样时间:2026/03/24 23:42:08 处理者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2026/03/25 10:05:50
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.153	1818269	100.000	240547	4219	1.061	--
总计		1818269	100.000	240547			

图89 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6031902批-pH1.0(内含0.5%Tween)介质-30min-片3
供试品溶液-1




PCH-938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温:30°C 波长: 256nm
数据文件名: RC\$PCH-938 - 29-2/29-91-2 - zzp-6031902p-rcqx-pH1.0+0.5twjz-p4-30min.lcd
方法文件名: RC\$PCH-938 - PCH-938-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-938 - 20260324-RCQX-FX278.lcb
样品瓶号: 2-32 版本号: 6.115
进样体积: 5 μ l 实验者: jiangjinwei
进样时间:2026/03/24 23:46:31 处理者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2026/03/25 10:05:52
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.152	1832698	100.000	241978	4201	1.060	--
总计		1832698	100.000	241978			

图90 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6031902批-pH1.0(内含0.5%Tween)介质-30min-片4
供试品溶液-1




PCH-938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温:30°C 波长: 256nm
数据文件名: RC\$PCH-938 - 29-2/29-92-2 - zzp-6031902p-rcqx-pH1.0+0.5twjz-p5-30min.lcd
方法文件名: RC\$PCH-938 - PCH-938-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-938 - 20260324-RCQX-FX278.lcb
样品瓶号: 2-41 版本号: 6.115
进样体积: 5 μ l 实验者: jiangjinwei
进样时间:2026/03/24 23:50:55 处理者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2026/03/25 10:05:55
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.153	2012897	100.000	265579	4198	1.059	--
总计		2012897	100.000	265579			

图91 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6031902批-pH1.0(内含0.5%Tween)介质-30min-片5
供试品溶液-1




PCH-938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温:30°C 波长: 256nm
数据文件名: RC\$PCH-938 - 29-2/29-93-2 - zzp-6031902p-rcqx-pH1.0+0.5twjz-p6-30min.lcd
方法文件名: RC\$PCH-938 - PCH-938-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-938 - 20260324-RCQX-FX278.lcb
样品瓶号: 2-50 版本号: 6.115
进样体积: 5 μ l 实验者: jiangjinwei
进样时间:2026/03/24 23:55:18 处理者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2026/03/25 10:05:58
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.153	1908516	100.000	251516	4187	1.057	--
总计		1908516	100.000	251516			

图92 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6031902批-pH1.0(内含0.5%Tween)介质-30min-片6
供试品溶液-1




PCH-938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温:30°C 波长: 256nm
数据文件名: RC\$PCH-938 - 29-2/29-94-2 - zzp-6031902p-rcqx-pH1.0+0.5twjz-p1-45min.lcd
方法文件名: RC\$PCH-938 - PCH-938-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-938 - 20260324-RCQX-FX278.lcb
样品瓶号: 2-6 版本号: 6.115
进样体积: 5 μ l 实验者: jiangjinwei
进样时间:2026/03/24 23:59:42 处理者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2026/03/25 10:06:00
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.154	2446932	100.000	322477	4178	1.056	--
总计		2446932	100.000	322477			

图93 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6031902批-pH1.0(内含0.5%Tween)介质-45min-片1
供试品溶液-1




PCH-938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温:30°C 波长: 256nm
数据文件名: RC\$PCH-938 - 29-2/29-95-2 - zzp-6031902p-rcqx-pH1.0+0.5twjz-p2-45min.lcd
方法文件名: RC\$PCH-938 - PCH-938-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-938 - 20260324-RCQX-FX278.lcb
样品瓶号: 2-15 版本号: 6.115
进样体积: 5 μ l 实验者: jiangjinwei
进样时间:2026/03/25 00:04:06 处理者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2026/03/25 10:06:03
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.153	2490123	100.000	327457	4163	1.054	--
总计		2490123	100.000	327457			

图94 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6031902批-pH1.0(内含0.5%Tween)介质-45min-片2
供试品溶液-1




PCH-938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温:30°C 波长: 256nm
数据文件名: RC\$PCH-938 - 29-2/29-96-2 - zzp-6031902p-rcqx-pH1.0+0.5twjz-p3-45min.lcd
方法文件名: RC\$PCH-938 - PCH-938-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-938 - 20260324-RCQX-FX278.lcb
样品瓶号: 2-24 版本号: 6.115
进样体积: 5 μ l 实验者: jiangjinwei
进样时间:2026/03/25 00:08:30 处理者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2026/03/25 10:06:05
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.153	2385043	100.000	312927	4148	1.051	--
总计		2385043	100.000	312927			

图95 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6031902批-pH1.0(内含0.5%Tween)介质-45min-片3
供试品溶液-1




PCH-938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温:30°C 波长: 256nm
数据文件名: RC\$PCH-938 - 29-2/29-97-2 - zzp-6031902p-rcqx-pH1.0+0.5twjz-p4-45min.lcd
方法文件名: RC\$PCH-938 - PCH-938-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-938 - 20260324-RCQX-FX278.lcb
样品瓶号: 2-33 版本号: 6.115
进样体积: 5 μ l 实验者: jiangjinwei
进样时间:2026/03/25 00:12:54 处理者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2026/03/25 10:06:08
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.153	2417402	100.000	317072	4145	1.050	--
总计		2417402	100.000	317072			

图96 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6031902批-pH1.0(内含0.5%Tween)介质-45min-片4
供试品溶液-1




PCH-938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温:30°C 波长: 256nm
数据文件名: RC\$PCH-938 - 29-2/29-98-2 - zzp-6031902p-rcqx-pH1.0+0.5twjz-p5-45min.lcd
方法文件名: RC\$PCH-938 - PCH-938-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-938 - 20260324-RCQX-FX278.lcb
样品瓶号: 2-42 版本号: 6.115
进样体积: 5 μ l 实验者: jiangjinwei
进样时间:2026/03/25 00:17:17 处理者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2026/03/25 10:06:10
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.153	2444470	100.000	320171	4131	1.048	--
总计		2444470	100.000	320171			

图97 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6031902批-pH1.0(内含0.5%Tween)介质-45min-片5
供试品溶液-1




PCH-938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温:30°C 波长: 256nm
数据文件名: RC\$PCH-938 - 29-2/29-99-2 - zzp-6031902p-rcqx-pH1.0+0.5twjz-p6-45min.lcd
方法文件名: RC\$PCH-938 - PCH-938-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-938 - 20260324-RCQX-FX278.lcb
样品瓶号: 2-51
进样体积: 5 μ l 版本号: 6.115
进样时间:2026/03/25 00:21:41 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2026/03/25 10:06:13 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.153	2435789	100.000	318590	4119	1.046	--
总计		2435789	100.000	318590			

图98 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6031902批-pH1.0(内含0.5%Tween)介质-45min-片6
供试品溶液-1




PCH-938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温:30°C 波长: 256nm
数据文件名: RC\$PCH-938 - 29-2/29-100-2 - zzp-6031902p-rcqx-pH1.0+0.5twjz-p1-60min.lcd
方法文件名: RC\$PCH-938 - PCH-938-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-938 - 20260324-RCQX-FX278.lcb
样品瓶号: 2-7 版本号: 6.115
进样体积: 5 μ l 实验者: jiangjinwei
进样时间:2026/03/25 00:26:05 处理者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2026/03/25 10:06:15
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.154	2647219	100.000	345707	4103	1.044	--
总计		2647219	100.000	345707			

图99 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6031902批-pH1.0(内含0.5%Tween)介质-60min-片1
供试品溶液-1




PCH-938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温:30°C 波长: 256nm
数据文件名: RC\$PCH-938 - 29-2/29-101-2 - zzp-6031902p-rcqx-pH1.0+0.5twjz-p2-60min.lcd
方法文件名: RC\$PCH-938 - PCH-938-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-938 - 20260324-RCQX-FX278.lcb
样品瓶号: 2-16 版本号: 6.115
进样体积: 5 μ l 实验者: jiangjinwei
进样时间:2026/03/25 00:30:29 处理者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2026/03/25 10:06:18
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.154	2658197	100.000	346673	4095	1.042	--
总计		2658197	100.000	346673			

图100 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6031902批-pH1.0(内含0.5%Tween)介质-60min-片2
供试品溶液-1




PCH-938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温:30°C 波长: 256nm
数据文件名: RC\$PCH-938 - 29-2/29-102-2 - zzp-6031902p-rcqx-pH1.0+0.5twjz-p3-60min.lcd
方法文件名: RC\$PCH-938 - PCH-938-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-938 - 20260324-RCQX-FX278.lcb
样品瓶号: 2-25 版本号: 6.115
进样体积: 5 μ l 实验者: jiangjinwei
进样时间:2026/03/25 00:34:52 处理者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2026/03/25 10:06:20
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.154	2629008	100.000	342588	4088	1.041	--
总计		2629008	100.000	342588			

图101 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6031902批-pH1.0(内含0.5%Tween)介质-60min-片3
供试品溶液-1




PCH-938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温:30°C 波长: 256nm
数据文件名: RC\$PCH-938 - 29-2/29-103-2 - zzp-6031902p-rcqx-pH1.0+0.5twjz-p4-60min.lcd
方法文件名: RC\$PCH-938 - PCH-938-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-938 - 20260324-RCQX-FX278.lcb
样品瓶号: 2-34 版本号: 6.115
进样体积: 5 μ l 实验者: jiangjinwei
进样时间:2026/03/25 00:39:16 处理者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2026/03/25 10:06:23
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.154	2650375	100.000	345045	4080	1.039	--
总计		2650375	100.000	345045			

图102 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6031902批-pH1.0(内含0.5%Tween)介质-60min-片4
供试品溶液-1




PCH-938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温:30°C 波长: 256nm
数据文件名: RC\$PCH-938 - 29-2/29-104-2 - zzp-6031902p-rcqx-pH1.0+0.5twjz-p5-60min.lcd
方法文件名: RC\$PCH-938 - PCH-938-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-938 - 20260324-RCQX-FX278.lcb
样品瓶号: 2-43
进样体积: 5 μ l 版本号: 6.115
进样时间:2026/03/25 00:43:39 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2026/03/25 10:06:26 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.154	2648860	100.000	344420	4069	1.037	--
总计		2648860	100.000	344420			

图103 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6031902批-pH1.0(内含0.5%Tween)介质-60min-片5
供试品溶液-1




PCH-938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温:30°C 波长: 256nm
数据文件名: RC\$PCH-938 - 29-2/29-105-2 - zzp-6031902p-rcqx-pH1.0+0.5twjz-p6-60min.lcd
方法文件名: RC\$PCH-938 - PCH-938-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-938 - 20260324-RCQX-FX278.lcb
样品瓶号: 2-52
进样体积: 5 μ l 版本号: 6.115
进样时间:2026/03/25 00:48:03 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2026/03/25 10:06:28 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.154	2666721	100.000	346213	4056	1.035	--
总计		2666721	100.000	346213			

图104 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6031902批-pH1.0(内含0.5%Tween)介质-60min-片6
供试品溶液-1




PCH-938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温:30°C 波长: 256nm
数据文件名: RC\$PCH-938 - 29-2/29-106-2 - zzp-6031902p-rcqx-pH1.0+0.5twjz-p1-jx.lcd
方法文件名: RC\$PCH-938 - PCH-938-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-938 - 20260324-RCQX-FX278.lcb
样品瓶号: 2-8 版本号: 6.115
进样体积: 5 μ l 实验者: jiangjinwei
进样时间:2026/03/25 00:52:27 处理者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2026/03/25 10:06:31
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.154	2764273	100.000	358376	4048	1.033	--
总计		2764273	100.000	358376			

图105 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6031902批-pH1.0(内含0.5%Tween)介质-极限转速-片1
供试品溶液-1




PCH-938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm) 流速: 1.0ml/min
柱温:30°C 波长: 256nm
数据文件名: RC\$PCH-938 - 29-2/29-107-2 - zzp-6031902p-rcqx-pH1.0+0.5twjz-p2-jx.lcd
方法文件名: RC\$PCH-938 - PCH-938-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-938 - 20260324-RCQX-FX278.lcb
样品瓶号: 2-17 版本号: 6.115
进样体积: 5 μl 实验者: jiangjinwei
进样时间:2026/03/25 00:56:50 处理者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2026/03/25 10:06:33
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.155	2791627	100.000	361356	4039	1.031	--
总计		2791627	100.000	361356			

图106 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6031902批-pH1.0(内含0.5%Tween)介质-极限转速-片2
供试品溶液-1




PCH-938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm) 流速: 1.0ml/min
柱温:30°C 波长: 256nm
数据文件名: RC\$PCH-938 - 29-2/29-108-2 - zzp-6031902p-rcqx-pH1.0+0.5twjz-p3-jx.lcd
方法文件名: RC\$PCH-938 - PCH-938-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-938 - 20260324-RCQX-FX278.lcb
样品瓶号: 2-26
进样体积: 5 μl 版本号: 6.115
进样时间:2026/03/25 01:01:14 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2): 2026/03/25 10:06:36 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.155	2786577	100.000	360231	4024	1.029	--
总计		2786577	100.000	360231			

图107 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6031902批-pH1.0(内含0.5%Tween)介质-极限转速-片3
供试品溶液-1




PCH-938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温:30°C 波长: 256nm
数据文件名: RC\$PCH-938 - 29-2/29-109-2 - zzp-6031902p-rcqx-pH1.0+0.5twjz-p4-jx.lcd
方法文件名: RC\$PCH-938 - PCH-938-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-938 - 20260324-RCQX-FX278.lcb
样品瓶号: 2-35 版本号: 6.115
进样体积: 5 μ l 实验者: jiangjinwei
进样时间:2026/03/25 01:05:38 处理者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2026/03/25 10:06:38
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.155	2807631	100.000	362391	4014	1.027	--
总计		2807631	100.000	362391			

图108 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6031902批-pH1.0(内含0.5%Tween)介质-极限转速-片4
供试品溶液-1




PCH-938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温:30°C 波长: 256nm
数据文件名: RC\$PCH-938 - 29-2/29-110-2 - zzp-6031902p-rcqx-pH1.0+0.5twjz-p5-jx.lcd
方法文件名: RC\$PCH-938 - PCH-938-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-938 - 20260324-RCQX-FX278.lcb
样品瓶号: 2-44 版本号: 6.115
进样体积: 5 μ l 实验者: jiangjinwei
进样时间:2026/03/25 01:10:02 处理者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2026/03/25 10:06:41
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.155	2789900	100.000	359376	4002	1.025	--
总计		2789900	100.000	359376			

图109 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6031902批-pH1.0(内含0.5%Tween)介质-极限转速-片5
供试品溶液-1




PCH-938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温:30°C 波长: 256nm
数据文件名: RC\$PCH-938 - 29-2/29-111-2 - zzp-6031902p-rcqx-pH1.0+0.5twjz-p6-jx.lcd
方法文件名: RC\$PCH-938 - PCH-938-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-938 - 20260324-RCQX-FX278.lcb
样品瓶号: 2-53
进样体积: 5 μ l 版本号: 6.115
进样时间:2026/03/25 01:14:26 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2026/03/25 10:06:43 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.156	2806171	100.000	360875	3989	1.023	--
总计		2806171	100.000	360875			

图110 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6031902批-pH1.0(内含0.5%Tween)介质-极限转速-片6
供试品溶液-1




PCH-938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温:30°C 波长: 256nm
数据文件名: RC\$PCH-938 - 29-2/29-112-2 - zzp-6031902p-rcqx-pH1.0+0.5twjz-dz2-1.lcd
方法文件名: RC\$PCH-938 - PCH-938-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-938 - 20260324-RCQX-FX278.lcb
样品瓶号: 2-27
进样体积: 5 μ l 版本号: 6.115
进样时间:2026/03/25 01:18:51 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2026/03/25 10:06:46 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.148	3081099	100.000	383572	3693	1.024	--
总计		3081099	100.000	383572			

图111 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6031902批-pH1.0(内含0.5%Tween)介质
对照品溶液-2-1




PCH-938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温:30°C 波长: 256nm
数据文件名: RC\$PCH-938 - 29-2/29-113-2 - zzp-6031902p-rcqx-pH1.0+0.5twjz-dz2-2.lcd
方法文件名: RC\$PCH-938 - PCH-938-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-938 - 20260324-RCQX-FX278.lcb
样品瓶号: 2-27
进样体积: 5 μ l 版本号: 6.115
进样时间:2026/03/25 01:23:15 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2026/03/25 10:06:48 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.148	3092100	100.000	384091	3677	1.022	--
总计		3092100	100.000	384091			

图112 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6031902批-pH1.0(内含0.5%Tween)介质
对照品溶液-2-2