



普瑞巴林口崩片项目信息

介质体积(ml)	900	取样体积(ml)	0	补液体积(ml)	0
对照品批号	101106-202003	对照品来源	中检院	对照品使用方法	直接使用
对照品含量(%)	99.4	对照品水分(%)	0	对照品稀释倍数	100
标示量(mg)	150	供试品稀释倍数	1	系数	1

对照品溶液

序号	称样量(mg)	A ₁	A ₂	A ₃	A ₄	A ₅	A _{平均}	RSD%
1	16.99	17439	17340	17457	17565	17514	17463	0.49
2	17.08	17473	17352				17412	0.50

单位质量响应值		RSD%	判断
1027.84	1019.44	0.59	数据可信



操作者:

日期: 2026-08-16

复核者:

未审阅版本



供试品溶液-LW0489批-pH1.2

时间 (分钟)	样品	A ₁	A ₂	A _{平均}	溶出量(%)	平均(%)	RSD%	累计溶 出量(%)	平均(%)	RSD%
2min	1	16312	-	16312	95.040	92.76	1.99	95.04	92.76	1.99
	2	15407	-	15407	89.767			89.77		
	3	15935	-	15935	92.843			92.84		
	4	15735	-	15735	91.678			91.68		
	5	16115	-	16115	93.892			93.89		
	6	16019	-	16019	93.333			93.33		
5min	1	18373	-	18373	107.048	108.06	1.16	107.05	108.06	1.16
	2	18370	-	18370	107.030			107.03		
	3	18801	-	18801	109.542			109.54		
	4	18593	-	18593	108.330			108.33		
	5	18792	-	18792	109.489			109.49		
	6	18347	-	18347	106.896			106.90		
10min	1	18521	-	18521	107.910	108.55	0.83	107.91	108.54	0.83
	2	18456	-	18456	107.532			107.53		
	3	18849	-	18849	109.821			109.82		
	4	18544	-	18544	108.044			108.04		
	5	18771	-	18771	109.367			109.37		
	6	18639	-	18639	108.598			108.60		
15min	1	18213	-	18213	106.116	108.07	1.32	106.12	108.08	1.32
	2	18549	-	18549	108.073			108.07		
	3	18731	-	18731	109.134			109.13		
	4	18615	-	18615	108.458			108.46		
	5	18862	-	18862	109.897			109.90		
	6	18325	-	18325	106.768			106.77		
30min	1	18414	-	18414	107.287	108.36	1.34	107.29	108.36	1.34
	2	18495	-	18495	107.759			107.76		
	3	18887	-	18887	110.043			110.04		
	4	18754	-	18754	109.268			109.27		
	5	18787	-	18787	109.460			109.46		
	6	18250	-	18250	106.331			106.33		



操作者:

日期: 2026-08-16

复核者:

未审阅版本



普瑞巴林口崩片项目信息

介质体积(ml)	900	取样体积(ml)	0	补液体积(ml)	0
对照品批号	101106-202003	对照品来源	中检院	对照品使用方法	直接使用
对照品含量(%)	99.4	对照品水分(%)	0	对照品稀释倍数	100
标示量(mg)	150	供试品稀释倍数	1	系数	1

对照品溶液

序号	称样量(mg)	A ₁	A ₂	A ₃	A ₄	A ₅	A _{平均}	RSD%
1	16.99	17381	17507	17438	17335	17287	17390	0.50
2	17.08	17251	17388				17320	0.56
单位质量响应值				RSD%	判断			
1023.54				0.66	数据可信			



操作者:

日期: 2026-08-16

复核者:

未审阅版本



供试品溶液-LW0489批-pH1.2

时间 (分钟)	样品	A ₁	A ₂	A _{平均}	溶出量(%)	平均(%)	RSD%	累计溶 出量(%)	平均(%)	RSD%
2min	1	15447	-	15447	90.428	92.91	1.79	90.43	92.91	1.79
	2	15844	-	15844	92.752			92.75		
	3	15822	-	15822	92.623			92.62		
	4	15876	-	15876	92.939			92.94		
	5	16335	-	16335	95.627			95.63		
	6	15905	-	15905	93.109			93.11		
5min	1	18436	-	18436	107.926	108.26	1.03	107.93	108.26	1.03
	2	18725	-	18725	109.618			109.62		
	3	18608	-	18608	108.933			108.93		
	4	18618	-	18618	108.991			108.99		
	5	18221	-	18221	106.667			106.67		
	6	18354	-	18354	107.446			107.45		
10min	1	18481	-	18481	108.189	109.04	0.80	108.19	109.04	0.80
	2	18408	-	18408	107.762			107.76		
	3	18748	-	18748	109.752			109.75		
	4	18739	-	18739	109.700			109.70		
	5	18650	-	18650	109.179			109.18		
	6	18735	-	18735	109.676			109.68		
15min	1	18719	-	18719	109.583	108.74	0.69	109.58	108.74	0.69
	2	18424	-	18424	107.856			107.86		
	3	18650	-	18650	109.179			109.18		
	4	18461	-	18461	108.072			108.07		
	5	18506	-	18506	108.336			108.34		
	6	18691	-	18691	109.419			109.42		
30min	1	18618	-	18618	108.991	109.21	1.22	108.99	109.21	1.22
	2	18345	-	18345	107.393			107.39		
	3	18610	-	18610	108.945			108.94		
	4	19042	-	19042	111.474			111.47		
	5	18599	-	18599	108.880			108.88		
	6	18721	-	18721	109.594			109.59		



操作者:

日期: 2026-08-16

复核者:

未审阅版本



普瑞巴林口崩片项目信息

介质体积(ml)	900	取样体积(ml)	0	补液体积(ml)	0
对照品批号	101106-202003	对照品来源	中检院	对照品使用方法	直接使用
对照品含量(%)	99.4	对照品水分(%)	0	对照品稀释倍数	100
标示量(mg)	150	供试品稀释倍数	1	系数	1

对照品溶液

序号	称样量(mg)	A ₁	A ₂	A ₃	A ₄	A ₅	A _{平均}	RSD%
1	16.99	55725	55618	56044	55801	56011	55840	0.33
2	17.08	55841	55780				55810	0.08
单位质量响应值			RSD%	判断				
3286.64			0.42	数据可信				



操作者:

日期: 2026-08-16

复核者:

未审阅版本



供试品溶液-LR6707批-pH1.2

时间 (分钟)	样品	A ₁	A ₂	A _{平均}	溶出量(%)	平均(%)	RSD%	累计溶 出量(%)	平均(%)	RSD%
2min	1	47017	-	47017	85.567	74.50	23.56	85.57	74.50	23.56
	2	44666	-	44666	81.288			81.29		
	3	43598	-	43598	79.345			79.34		
	4	42013	-	42013	76.460			76.46		
	5	21635	-	21635	39.374			39.37		
	6	46692	-	46692	84.976			84.98		
5min	1	56957	-	56957	103.657	101.16	1.45	103.66	101.16	1.45
	2	54678	-	54678	99.509			99.51		
	3	55001	-	55001	100.097			100.10		
	4	55651	-	55651	101.280			101.28		
	5	55313	-	55313	100.665			100.67		
	6	55897	-	55897	101.728			101.73		
10min	1	57283	-	57283	104.250	102.08	1.28	104.25	102.08	1.28
	2	55528	-	55528	101.056			101.06		
	3	55243	-	55243	100.538			100.54		
	4	56305	-	56305	102.470			102.47		
	5	56232	-	56232	102.338			102.34		
	6	55946	-	55946	101.817			101.82		
15min	1	57062	-	57062	103.848	102.12	1.26	103.85	102.12	1.26
	2	55293	-	55293	100.629			100.63		
	3	55277	-	55277	100.600			100.60		
	4	56161	-	56161	102.208			102.21		
	5	56419	-	56419	102.678			102.68		
	6	56468	-	56468	102.767			102.77		
30min	1	56945	-	56945	103.635	102.00	0.97	103.64	102.00	0.97
	2	55481	-	55481	100.971			100.97		
	3	55609	-	55609	101.204			101.20		
	4	56346	-	56346	102.545			102.54		
	5	56067	-	56067	102.037			102.04		
	6	55839	-	55839	101.622			101.62		



操作者:

日期: 2026-08-16

复核者:

未审阅版本



普瑞巴林口崩片项目信息

介质体积(ml)	900	取样体积(ml)	0	补液体积(ml)	0
对照品批号	101106-202003	对照品来源	中检院	对照品使用方法	直接使用
对照品含量(%)	99.4	对照品水分(%)	0	对照品稀释倍数	100
标示量(mg)	150	供试品稀释倍数	1	系数	1

对照品溶液

序号	称样量(mg)	A ₁	A ₂	A ₃	A ₄	A ₅	A _{平均}	RSD%
1	16.99	55500	55523	55630	55521	55569	55549	0.10
2	17.08	55368	55465				55416	0.13
单位质量响应值				RSD%	判断			
3269.51				0.55	数据可信			



操作者:

日期: 2026-08-16

复核者:

未审阅版本



供试品溶液-LR6707批-pH1.2

时间 (分钟)	样品	A ₁	A ₂	A _{平均}	溶出量(%)	平均(%)	RSD%	累计溶 出量(%)	平均(%)	RSD%
2min	1	30010	-	30010	54.953	68.88	25.21	54.95	68.88	25.21
	2	43389	-	43389	79.452			79.45		
	3	44634	-	44634	81.732			81.73		
	4	43432	-	43432	79.531			79.53		
	5	42465	-	42465	77.760			77.76		
	6	21756	-	21756	39.839			39.84		
5min	1	54901	-	54901	100.532	101.55	0.79	100.53	101.56	0.79
	2	56084	-	56084	102.699			102.70		
	3	55222	-	55222	101.120			101.12		
	4	55170	-	55170	101.025			101.02		
	5	55700	-	55700	101.995			102.00		
	6	55679	-	55679	101.957			101.96		
10min	1	55468	-	55468	101.571	102.55	0.99	101.57	102.55	0.99
	2	56142	-	56142	102.805			102.80		
	3	56728	-	56728	103.878			103.88		
	4	55291	-	55291	101.247			101.25		
	5	55980	-	55980	102.508			102.51		
	6	56416	-	56416	103.307			103.31		
15min	1	55507	-	55507	101.642	102.41	1.35	101.64	102.41	1.35
	2	56092	-	56092	102.713			102.71		
	3	56894	-	56894	104.182			104.18		
	4	56132	-	56132	102.787			102.79		
	5	54685	-	54685	100.137			100.14		
	6	56258	-	56258	103.017			103.02		
30min	1	55312	-	55312	101.285	102.69	1.37	101.28	102.69	1.38
	2	55824	-	55824	102.223			102.22		
	3	57162	-	57162	104.673			104.67		
	4	56348	-	56348	103.182			103.18		
	5	55208	-	55208	101.095			101.09		
	6	56619	-	56619	103.678			103.68		



操作者:

日期: 2026-08-16

复核者:

未审阅版本



普瑞巴林口崩片项目信息

介质体积(ml)	900	取样体积(ml)	0	补液体积(ml)	0
对照品批号	101106-202003	对照品来源	中检院	对照品使用方法	直接使用
对照品含量(%)	99.4	对照品水分(%)	0	对照品稀释倍数	100
标示量(mg)	150	供试品稀释倍数	1	系数	1

对照品溶液

序号	称样量(mg)	A ₁	A ₂	A ₃	A ₄	A ₅	A _{平均}	RSD%
1	16.99	105262	105217	105595	105395	105466	105387	0.15
2	17.08	105404	105620				105512	0.15
单位质量响应值				RSD%	判断			
6202.88				0.29	数据可信			



操作者:

日期: 2026-08-16

复核者:

未审阅版本



供试品溶液-LW0477批-pH1.2

时间 (分钟)	样品	A ₁	A ₂	A _{平均}	溶出量(%)	平均(%)	RSD%	累计溶 出量(%)	平均(%)	RSD%
2min	1	68427	-	68427	65.927	64.39	2.77	65.93	64.39	2.78
	2	66002	-	66002	63.590			63.59		
	3	65012	-	65012	62.637			62.64		
	4	66289	-	66289	63.867			63.87		
	5	69758	-	69758	67.209			67.21		
	6	65517	-	65517	63.123			63.12		
5min	1	101040	-	101040	97.348	96.77	0.49	97.35	96.77	0.49
	2	100355	-	100355	96.688			96.69		
	3	99679	-	99679	96.037			96.04		
	4	100738	-	100738	97.057			97.06		
	5	100127	-	100127	96.469			96.47		
	6	100685	-	100685	97.006			97.01		
10min	1	102117	-	102117	98.386	98.69	0.47	98.39	98.69	0.47
	2	103117	-	103117	99.349			99.35		
	3	102303	-	102303	98.565			98.57		
	4	102861	-	102861	99.103			99.10		
	5	102379	-	102379	98.638			98.64		
	6	101818	-	101818	98.098			98.10		
15min	1	102752	-	102752	98.998	98.84	0.20	99.00	98.83	0.20
	2	102695	-	102695	98.943			98.94		
	3	102271	-	102271	98.534			98.53		
	4	102777	-	102777	99.022			99.02		
	5	102592	-	102592	98.844			98.84		
	6	102412	-	102412	98.670			98.67		
30min	1	102785	-	102785	99.029	98.62	0.79	99.03	98.62	0.79
	2	103355	-	103355	99.579			99.58		
	3	102324	-	102324	98.585			98.59		
	4	102603	-	102603	98.854			98.85		
	5	100978	-	100978	97.288			97.29		
	6	102129	-	102129	98.397			98.40		



操作者:

日期: 2026-08-16

复核者:

未审阅版本



普瑞巴林口崩片项目信息

介质体积(ml)	900	取样体积(ml)	0	补液体积(ml)	0
对照品批号	101106-202003	对照品来源	中检院	对照品使用方法	直接使用
对照品含量(%)	99.4	对照品水分(%)	0	对照品稀释倍数	100
标示量(mg)	150	供试品稀释倍数	1	系数	1

对照品溶液

序号	称样量(mg)	A ₁	A ₂	A ₃	A ₄	A ₅	A _{平均}	RSD%
1	16.99	105355	105168	105230	104977	105601	105266	0.23
2	17.08	104959	104900				104930	0.04
单位质量响应值				RSD%	判断			
6195.76				0.60	数据可信			



操作者:

日期: 2026-08-16

复核者:

未审阅版本



供试品溶液-LW0477批-pH1.2

时间 (分钟)	样品	A ₁	A ₂	A _{平均}	溶出量(%)	平均(%)	RSD%	累计溶 出量(%)	平均(%)	RSD%
2min	1	68666	-	68666	66.379	65.04	2.31	66.38	65.04	2.31
	2	66719	-	66719	64.497			64.50		
	3	65100	-	65100	62.932			62.93		
	4	68211	-	68211	65.939			65.94		
	5	66056	-	66056	63.856			63.86		
	6	68911	-	68911	66.616			66.62		
5min	1	100865	-	100865	97.505	96.92	0.50	97.51	96.92	0.50
	2	100351	-	100351	97.009			97.01		
	3	100699	-	100699	97.345			97.34		
	4	100211	-	100211	96.873			96.87		
	5	99857	-	99857	96.531			96.53		
	6	99556	-	99556	96.240			96.24		
10min	1	102788	-	102788	99.364	98.55	0.79	99.36	98.55	0.79
	2	101719	-	101719	98.331			98.33		
	3	101083	-	101083	97.716			97.72		
	4	102303	-	102303	98.896			98.90		
	5	102793	-	102793	99.369			99.37		
	6	101004	-	101004	97.640			97.64		
15min	1	102849	-	102849	99.423	98.82	0.81	99.42	98.82	0.81
	2	102226	-	102226	98.821			98.82		
	3	103257	-	103257	99.818			99.82		
	4	101980	-	101980	98.583			98.58		
	5	102198	-	102198	98.794			98.79		
	6	100868	-	100868	97.508			97.51		
30min	1	102794	-	102794	99.370	98.96	0.79	99.37	98.96	0.79
	2	102227	-	102227	98.822			98.82		
	3	103687	-	103687	100.233			100.23		
	4	102198	-	102198	98.794			98.79		
	5	101312	-	101312	97.938			97.94		
	6	101975	-	101975	98.578			98.58		



操作者:

日期: 2026-08-16

复核者:

未审阅版本




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 0-34/24-313-2 - cbzj-25mg-LW0489p-rcqx-1-jf50z-pH1.2jz-rj.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20260324-FX273.lcb
样品瓶号: 1-9
进样体积: 50μl
进样时间: 2026/03/24 14:51:57
处理时间 (V2) : 2026/03/25 09:08:24
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图1 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-LW0489批(25mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转
溶剂




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 0-34/24-314-2 - cbzj-25mg-LW0489p-rcqx-1-jf50z-pH1.2jz-dz-1-1.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20260324-FX273.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 50μl
进样时间: 2026/03/24 14:55:23
处理时间 (V2) : 2026/03/25 09:08:28
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.111	17439	100.000	3924	1448	1.216	--
总计		17439	100.000	3924			

图2 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-LW0489批(25mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转
对照品溶液-1-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 0-34/24-315-2 - cbzj-25mg-LW0489p-rcqx-1-jf50z-pH1.2jz-dz-1-2.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20260324-FX273.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 50μl
进样时间: 2026/03/24 14:58:49
处理时间 (V2) : 2026/03/25 09:08:31
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.107	17340	100.000	3889	1423	1.226	--
总计		17340	100.000	3889			

图3 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-LW0489批(25mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转
对照品溶液-1-2




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 0-34/24-316-2 - cbzj-25mg-LW0489p-rcqx-1-jf50z-pH1.2jz-dz-1-3.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20260324-FX273.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 50μl
进样时间: 2026/03/24 15:02:16
处理时间 (V2) : 2026/03/25 09:08:34
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.110	17457	100.000	3867	1388	1.229	--
总计		17457	100.000	3867			

图4 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-LW0489批(25mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转
对照品溶液-1-3




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 0-34/24-317-2 - cbzj-25mg-LW0489p-rcqx-1-jf50z-pH1.2jz-dz-1-4.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20260324-FX273.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 50μl
进样时间: 2026/03/24 15:05:42
处理时间 (V2) : 2026/03/25 09:08:37
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.108	17565	100.000	3896	1405	1.234	--
总计		17565	100.000	3896			

图5 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-LW0489批(25mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转
对照品溶液-1-4




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 0-34/24-318-2 - cbzj-25mg-LW0489p-rcqx-1-jf50z-pH1.2jz-dz-1-5.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20260324-FX273.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 50μl
进样时间: 2026/03/24 15:09:08
处理时间 (V2) : 2026/03/25 09:08:40
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.110	17514	100.000	3849	1377	1.223	--
总计		17514	100.000	3849			

图6 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-LW0489批(25mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转
对照品溶液-1-5




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 0-34/24-319-2 - cbzj-25mg-LW0489p-rcqx-1-jf50z-pH1.2jz-2min-P1.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20260324-FX273.lcb
样品瓶号: 1-1
进样体积: 50μl
进样时间: 2026/03/24 15:12:33
处理时间 (V2) : 2026/03/25 09:08:43
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.137	16312	100.000	4218	1976	1.196	--
总计		16312	100.000	4218			

图7 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-LW0489批(25mg规格)-pH1.2介质-浆法-50转-2min-片1
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 0-34/24-320-2 - cbzj-25mg-LW0489p-rcqx-1-jf50z-pH1.2jz-2min-P2.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20260324-FX273.lcb
样品瓶号: 1-10
进样体积: 50μl
进样时间: 2026/03/24 15:15:58
处理时间 (V2) : 2026/03/25 09:08:45
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.138	15407	100.000	3951	1938	1.202	--
总计		15407	100.000	3951			

图8 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-LW0489批(25mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-2min-片2
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 0-34/24-321-2 - cbzj-25mg-LW0489p-rcqx-1-jf50z-pH1.2jz-2min-P3.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20260324-FX273.lcb
样品瓶号: 1-19
进样体积: 50μl
进样时间: 2026/03/24 15:19:22
处理时间 (V2) : 2026/03/25 09:08:48
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.137	15935	100.000	4112	1978	1.198	--
总计		15935	100.000	4112			

图9 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-LW0489批(25mg规格)-pH1.2介质-浆法-50转-2min-片3
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5µm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 0-34/24-322-2 - cbzj-25mg-LW0489p-rcqx-1-jf50z-pH1.2jz-2min-P4.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20260324-FX273.lcb
样品瓶号: 1-28
进样体积: 50µl
进样时间: 2026/03/24 15:22:47
处理时间 (V2) : 2026/03/25 09:08:51
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.139	15735	100.000	4072	1974	1.200	--
总计		15735	100.000	4072			

图10 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-LW0489批(25mg规格)-pH1.2介质-浆法-50转-2min-片4
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 0-34/24-323-2 - cbzj-25mg-LW0489p-rcqx-1-jf50z-pH1.2jz-2min-P5.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20260324-FX273.lcb
样品瓶号: 1-37
进样体积: 50μl
进样时间: 2026/03/24 15:26:12
处理时间 (V2) : 2026/03/25 09:08:53
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.139	16115	100.000	4186	2015	1.196	--
总计		16115	100.000	4186			

图11 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-LW0489批(25mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-2min-片5
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 0-34/24-324-2 - cbzj-25mg-LW0489p-rcqx-1-jf50z-pH1.2jz-2min-P6.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20260324-FX273.lcb
样品瓶号: 1-46
进样体积: 50μl
进样时间: 2026/03/24 15:29:37
处理时间 (V2) : 2026/03/25 09:08:56
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.141	16019	100.000	4159	2020	1.182	--
总计		16019	100.000	4159			

图12 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-LW0489批(25mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-2min-片6
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 0-34/24-325-2 - cbzj-25mg-LW0489p-rcqx-1-jf50z-pH1.2jz-5min-P1.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20260324-FX273.lcb
样品瓶号: 1-2
进样体积: 50μl
进样时间: 2026/03/24 15:33:01
处理时间 (V2) : 2026/03/25 09:08:59
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.137	18373	100.000	4680	1933	1.190	--
总计		18373	100.000	4680			

图13 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-LW0489批(25mg规格)-pH1.2介质-浆法-50转-5min-片1
供试品溶液-1



JSS-3362


<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 0-34/24-326-2 - cbzj-25mg-LW0489p-rcqx-1-jf50z-pH1.2jz-5min-P2.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20260324-FX273.lcb
样品瓶号: 1-11
进样体积: 50μl
进样时间: 2026/03/24 15:36:26
处理时间 (V2) : 2026/03/25 09:09:01
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.138	18370	100.000	4819	2075	1.179	--
总计		18370	100.000	4819			

图14 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-LW0489批(25mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-5min-片2
供试品溶液-1



JSS-3362


<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 0-34/24-327-2 - cbzj-25mg-LW0489p-rcqx-1-jf50z-pH1.2jz-5min-P3.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20260324-FX273.lcb
样品瓶号: 1-20
进样体积: 50μl
进样时间: 2026/03/24 15:39:50
处理时间 (V2) : 2026/03/25 09:09:04
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.138	18801	100.000	4885	2013	1.185	--
总计		18801	100.000	4885			

图15 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-LW0489批(25mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-5min-片3
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 0-34/24-328-2 - cbzj-25mg-LW0489p-rcqx-1-jf50z-pH1.2jz-5min-P4.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20260324-FX273.lcb
样品瓶号: 1-29
进样体积: 50μl
进样时间: 2026/03/24 15:43:15
处理时间 (V2) : 2026/03/25 09:09:07
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.141	18593	100.000	4862	2068	1.203	--
总计		18593	100.000	4862			

图16 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-LW0489批(25mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-5min-片4
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 0-34/24-329-2 - cbzj-25mg-LW0489p-rcqx-1-jf50z-pH1.2jz-5min-P5.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20260324-FX273.lcb
样品瓶号: 1-38
进样体积: 50μl
进样时间: 2026/03/24 15:46:40
处理时间 (V2) : 2026/03/25 09:09:09
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.136	18792	100.000	4904	2045	1.188	--
总计		18792	100.000	4904			

图17 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-LW0489批(25mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-5min-片5
供试品溶液-1



JSS-3362


<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 0-34/24-330-2 - cbzj-25mg-LW0489p-rcqx-1-jf50z-pH1.2jz-5min-P6.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20260324-FX273.lcb
样品瓶号: 1-47
进样体积: 50μl
进样时间: 2026/03/24 15:50:04
处理时间 (V2) : 2026/03/25 09:09:12
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.138	18347	100.000	4783	2035	1.200	--
总计		18347	100.000	4783			

图18 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-LW0489批(25mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-5min-片6
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 0-34/24-331-2 - cbzj-25mg-LW0489p-rcqx-1-jf50z-pH1.2jz-10min-P1.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20260324-FX273.lcb
样品瓶号: 1-3
进样体积: 50μl
进样时间: 2026/03/24 15:53:30
处理时间 (V2) : 2026/03/25 09:09:15
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.141	18521	100.000	4767	2010	1.192	--
总计		18521	100.000	4767			

图19 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-LW0489批(25mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-10min-片1
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 0-34/24-332-2 - cbzj-25mg-LW0489p-rcqx-1-jf50z-pH1.2jz-10min-P2.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20260324-FX273.lcb
样品瓶号: 1-12
进样体积: 50μl
进样时间: 2026/03/24 15:56:55
处理时间 (V2) : 2026/03/25 09:09:17
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.139	18456	100.000	4876	2084	1.181	--
总计		18456	100.000	4876			

图20 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-LW0489批(25mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-10min-片2
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 0-34/24-333-2 - cbzj-25mg-LW0489p-rcqx-1-jf50z-pH1.2jz-10min-P3.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20260324-FX273.lcb
样品瓶号: 1-21
进样体积: 50μl
进样时间: 2026/03/24 16:00:19
处理时间 (V2) : 2026/03/25 09:09:20
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.137	18849	100.000	4924	2043	1.192	--
总计		18849	100.000	4924			

图21 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-LW0489批(25mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-10min-片3
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 0-34/24-334-2 - cbzj-25mg-LW0489p-rcqx-1-jf50z-pH1.2jz-10min-P4.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20260324-FX273.lcb
样品瓶号: 1-30
进样体积: 50μl
进样时间: 2026/03/24 16:03:44
处理时间 (V2) : 2026/03/25 09:09:23
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.136	18544	100.000	4814	2013	1.186	--
总计		18544	100.000	4814			

图22 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-LW0489批(25mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-10min-片4
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 0-34/24-335-2 - cbzj-25mg-LW0489p-rcqx-1-jf50z-pH1.2jz-10min-P5.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20260324-FX273.lcb
样品瓶号: 1-39
进样体积: 50μl
进样时间: 2026/03/24 16:07:09
处理时间 (V2) : 2026/03/25 09:09:26
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.136	18771	100.000	4811	1980	1.177	--
总计		18771	100.000	4811			

图23 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-LW0489批(25mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-10min-片5
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 0-34/24-336-2 - cbzj-25mg-LW0489p-rcqx-1-jf50z-pH1.2jz-10min-P6.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20260324-FX273.lcb
样品瓶号: 1-48
进样体积: 50μl
进样时间: 2026/03/24 16:10:33
处理时间 (V2) : 2026/03/25 09:09:29
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.138	18639	100.000	4748	1933	1.189	--
总计		18639	100.000	4748			

图24 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-LW0489批(25mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-10min-片6
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 0-34/24-337-2 - cbzj-25mg-LW0489p-rcqx-1-jf50z-pH1.2jz-15min-P1.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20260324-FX273.lcb
样品瓶号: 1-4
进样体积: 50μl
进样时间: 2026/03/24 16:13:58
处理时间 (V2) : 2026/03/25 09:09:32
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.136	18213	100.000	4735	2026	1.202	--
总计		18213	100.000	4735			

图25 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-LW0489批(25mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-15min-片1
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 0-34/24-338-2 - cbzj-25mg-LW0489p-rcqx-1-jf50z-pH1.2jz-15min-P2.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20260324-FX273.lcb
样品瓶号: 1-13
进样体积: 50μl
进样时间: 2026/03/24 16:17:23
处理时间 (V2) : 2026/03/25 09:09:35
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.136	18549	100.000	4853	2065	1.197	--
总计		18549	100.000	4853			

图26 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-LW0489批(25mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-15min-片2
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 0-34/24-339-2 - cbzj-25mg-LW0489p-rcqx-1-jf50z-pH1.2jz-15min-P3.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20260324-FX273.lcb
样品瓶号: 1-22
进样体积: 50μl
进样时间: 2026/03/24 16:20:48
处理时间 (V2) : 2026/03/25 09:09:37
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.135	18731	100.000	4967	2125	1.180	--
总计		18731	100.000	4967			

图27 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-LW0489批(25mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-15min-片3
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 0-34/24-340-2 - cbzj-25mg-LW0489p-rcqx-1-jf50z-pH1.2jz-15min-P4.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20260324-FX273.lcb
样品瓶号: 1-31
进样体积: 50μl
进样时间: 2026/03/24 16:24:13
处理时间 (V2) : 2026/03/25 09:09:40
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.135	18615	100.000	4853	2057	1.186	--
总计		18615	100.000	4853			

图28 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-LW0489批(25mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-15min-片4
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 0-34/24-341-2 - cbzj-25mg-LW0489p-rcqx-1-jf50z-pH1.2jz-15min-P5.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20260324-FX273.lcb
样品瓶号: 1-40
进样体积: 50μl
进样时间: 2026/03/24 16:27:38
处理时间 (V2) : 2026/03/25 09:09:43
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.137	18862	100.000	4903	2028	1.188	--
总计		18862	100.000	4903			

图29 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-LW0489批(25mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-15min-片5
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 0-34/24-342-2 - cbzj-25mg-LW0489p-rcqx-1-jf50z-pH1.2jz-15min-P6.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20260324-FX273.lcb
样品瓶号: 1-49
进样体积: 50μl
进样时间: 2026/03/24 16:31:02
处理时间 (V2) : 2026/03/25 09:09:45
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.135	18325	100.000	4782	2055	1.198	--
总计		18325	100.000	4782			

图30 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-LW0489批(25mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-15min-片6
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 0-34/24-343-2 - cbzj-25mg-LW0489p-rcqx-1-jf50z-pH1.2jz-30min-P1.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20260324-FX273.lcb
样品瓶号: 1-5
进样体积: 50μl
进样时间: 2026/03/24 16:34:27
处理时间 (V2) : 2026/03/25 09:09:48
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.136	18414	100.000	4816	2063	1.186	--
总计		18414	100.000	4816			

图31 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-LW0489批(25mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-30min-片1
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 0-34/24-344-2 - cbzj-25mg-LW0489p-rcqx-1-jf50z-pH1.2jz-30min-P2.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20260324-FX273.lcb
样品瓶号: 1-14
进样体积: 50μl
进样时间: 2026/03/24 16:37:52
处理时间 (V2) : 2026/03/25 09:09:52
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.137	18495	100.000	4873	2087	1.193	--
总计		18495	100.000	4873			

图32 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-LW0489批(25mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-30min-片2
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 0-34/24-345-2 - cbzj-25mg-LW0489p-rcqx-1-jf50z-pH1.2jz-30min-P3.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20260324-FX273.lcb
样品瓶号: 1-23
进样体积: 50μl
进样时间: 2026/03/24 16:41:17
处理时间 (V2) : 2026/03/25 09:09:55
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.135	18887	100.000	4927	2046	1.195	--
总计		18887	100.000	4927			

图33 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-LW0489批(25mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-30min-片3
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 0-34/24-346-2 - cbzj-25mg-LW0489p-rcqx-1-jf50z-pH1.2jz-30min-P4.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20260324-FX273.lcb
样品瓶号: 1-32
进样体积: 50μl
进样时间: 2026/03/24 16:44:41
处理时间 (V2) : 2026/03/25 09:09:58
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.135	18754	100.000	4843	2016	1.203	--
总计		18754	100.000	4843			

图34 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-LW0489批(25mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-30min-片4
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 0-34/24-347-2 - cbzj-25mg-LW0489p-rcqx-1-jf50z-pH1.2jz-30min-P5.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20260324-FX273.lcb
样品瓶号: 1-41
进样体积: 50μl
进样时间: 2026/03/24 16:48:06
处理时间 (V2) : 2026/03/25 09:10:00
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.135	18787	100.000	4868	2027	1.185	--
总计		18787	100.000	4868			

图35 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-LW0489批(25mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-30min-片5
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 0-34/24-348-2 - cbzj-25mg-LW0489p-rcqx-1-jf50z-pH1.2jz-30min-P6.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20260324-FX273.lcb
样品瓶号: 1-50
进样体积: 50μl
进样时间: 2026/03/24 16:51:31
处理时间 (V2) : 2026/03/25 09:10:03
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.134	18250	100.000	4732	2041	1.198	--
总计		18250	100.000	4732			

图36 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-LW0489批(25mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-30min-片6
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 0-34/24-349-2 - cbzj-25mg-LW0489p-rcqx-1-jf50z-pH1.2jz-dz-2-1.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20260324-FX273.lcb
样品瓶号: 1-27
进样体积: 50μl
进样时间: 2026/03/24 16:54:56
处理时间 (V2) : 2026/03/25 09:10:06
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.107	17473	100.000	3927	1431	1.226	--
总计		17473	100.000	3927			

图37 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-LW0489批(25mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转
对照品溶液-2-1



JSS-3362


<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 0-34/24-350-2 - cbzj-25mg-LW0489p-rcqx-1-jf50z-pH1.2jz-dz-2-2.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20260324-FX273.lcb
样品瓶号: 1-27
进样体积: 50μl
进样时间: 2026/03/24 16:58:22
处理时间 (V2) : 2026/03/25 09:10:09
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.109	17352	100.000	3882	1426	1.218	--
总计		17352	100.000	3882			

图38 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-LW0489批(25mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转
对照品溶液-2-2




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 0-34/24-351-2 - cbzj-25mg-LW0489p-rcqx-2-jf50z-pH1.2jz-rj.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20260324-FX273.lcb
样品瓶号: 2-9
进样体积: 50μl
进样时间: 2026/03/24 17:01:48
处理时间 (V2) : 2026/03/25 09:10:11
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图39 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-LW0489批(25mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转
溶剂



JSS-3362


<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 0-34/24-352-2 - cbzj-25mg-LW0489p-rcqx-2-jf50z-pH1.2jz-dz-1-1.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20260324-FX273.lcb
样品瓶号: 2-18
进样体积: 50μl
进样时间: 2026/03/24 17:05:15
处理时间 (V2) : 2026/03/25 09:10:14
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.108	17381	100.000	3914	1443	1.224	--
总计		17381	100.000	3914			

图40 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-LW0489批(25mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转
对照品溶液-1-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 0-34/24-353-2 - cbzj-25mg-LW0489p-rcqx-2-jf50z-pH1.2jz-dz-1-2.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20260324-FX273.lcb
样品瓶号: 2-18
进样体积: 50μl
进样时间: 2026/03/24 17:08:42
处理时间 (V2) : 2026/03/25 09:10:17
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.105	17507	100.000	3949	1434	1.226	--
总计		17507	100.000	3949			

图41 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-LW0489批(25mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转
对照品溶液-1-2




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 0-34/24-354-2 - cbzj-25mg-LW0489p-rcqx-2-jf50z-pH1.2jz-dz-1-3.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20260324-FX273.lcb
样品瓶号: 2-18
进样体积: 50μl
进样时间: 2026/03/24 17:12:10
处理时间 (V2) : 2026/03/25 09:10:19
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.106	17438	100.000	3968	1443	1.219	--
总计		17438	100.000	3968			

图42 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-LW0489批(25mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转
对照品溶液-1-3




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 0-34/24-355-2 - cbzj-25mg-LW0489p-rcqx-2-jf50z-pH1.2jz-dz-1-4.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20260324-FX273.lcb
样品瓶号: 2-18
进样体积: 50μl
进样时间: 2026/03/24 17:15:36
处理时间 (V2) : 2026/03/25 09:10:22
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.106	17335	100.000	3949	1443	1.212	--
总计		17335	100.000	3949			

图43 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-LW0489批(25mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转
对照品溶液-1-4



JSS-3362


<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 0-34/24-356-2 - cbzj-25mg-LW0489p-rcqx-2-jf50z-pH1.2jz-dz-1-5.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20260324-FX273.lcb
样品瓶号: 2-18
进样体积: 50μl
进样时间: 2026/03/24 17:19:02
处理时间 (V2) : 2026/03/25 09:10:25
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.105	17287	100.000	3931	1441	1.200	--
总计		17287	100.000	3931			

图44 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-LW0489批(25mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转
对照品溶液-1-5




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 0-34/24-357-2 - cbzj-25mg-LW0489p-rcqx-2-jf50z-pH1.2jz-2min-P1.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20260324-FX273.lcb
样品瓶号: 2-1
进样体积: 50μl
进样时间: 2026/03/24 17:22:27
处理时间 (V2) : 2026/03/25 09:10:27
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.134	15447	100.000	4015	2034	1.208	--
总计		15447	100.000	4015			

图45 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-LW0489批(25mg规格)-pH1.2介质-浆法-50转-2min-片1
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 0-34/24-358-2 - cbzj-25mg-LW0489p-rcqx-2-jf50z-pH1.2jz-2min-P2.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20260324-FX273.lcb
样品瓶号: 2-10
进样体积: 50μl
进样时间: 2026/03/24 17:25:53
处理时间 (V2) : 2026/03/25 09:10:30
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.136	15844	100.000	4153	2051	1.186	--
总计		15844	100.000	4153			

图46 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-LW0489批(25mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-2min-片2
供试品溶液-1



JSS-3362


<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 0-34/24-359-2 - cbzj-25mg-LW0489p-rcqx-2-jf50z-pH1.2jz-2min-P3.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20260324-FX273.lcb
样品瓶号: 2-19
进样体积: 50μl
进样时间: 2026/03/24 17:29:19
处理时间 (V2) : 2026/03/25 09:10:33
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.134	15822	100.000	4122	2063	1.187	--
总计		15822	100.000	4122			

图47 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-LW0489批(25mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-2min-片3
供试品溶液-1



JSS-3362


<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 0-34/24-360-2 - cbzj-25mg-LW0489p-rcqx-2-jf50z-pH1.2jz-2min-P4.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20260324-FX273.lcb
样品瓶号: 2-28
进样体积: 50μl
进样时间: 2026/03/24 17:32:45
处理时间 (V2) : 2026/03/25 09:10:35
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.133	15876	100.000	4107	2007	1.189	--
总计		15876	100.000	4107			

图48 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-LW0489批(25mg规格)-pH1.2介质-浆法-50转-2min-片4
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 0-34/24-361-2 - cbzj-25mg-LW0489p-rcqx-2-jf50z-pH1.2jz-2min-P5.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20260324-FX273.lcb
样品瓶号: 2-37
进样体积: 50μl
进样时间: 2026/03/24 17:36:11
处理时间 (V2) : 2026/03/25 09:10:38
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.134	16335	100.000	4228	2018	1.190	--
总计		16335	100.000	4228			

图49 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-LW0489批(25mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-2min-片5
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 0-34/24-362-2 - cbzj-25mg-LW0489p-rcqx-2-jf50z-pH1.2jz-2min-P6.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20260324-FX273.lcb
样品瓶号: 2-46
进样体积: 50μl
进样时间: 2026/03/24 17:39:37
处理时间 (V2) : 2026/03/25 09:10:41
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.133	15905	100.000	4131	2012	1.187	--
总计		15905	100.000	4131			

图50 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-LW0489批(25mg规格)-pH1.2介质-浆法-50转-2min-片6
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 0-34/24-363-2 - cbzj-25mg-LW0489p-rcqx-2-jf50z-pH1.2jz-5min-P1.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20260324-FX273.lcb
样品瓶号: 2-2
进样体积: 50μl
进样时间: 2026/03/24 17:43:03
处理时间 (V2) : 2026/03/25 09:10:43
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.133	18436	100.000	4778	2018	1.194	--
总计		18436	100.000	4778			

图51 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-LW0489批(25mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-5min-片1
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 0-34/24-364-2 - cbzj-25mg-LW0489p-rcqx-2-jf50z-pH1.2jz-5min-P2.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20260324-FX273.lcb
样品瓶号: 2-11
进样体积: 50μl
进样时间: 2026/03/24 17:46:29
处理时间 (V2) : 2026/03/25 09:10:46
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.136	18725	100.000	4884	2034	1.185	--
总计		18725	100.000	4884			

图52 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-LW0489批(25mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-5min-片2
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 0-34/24-365-2 - cbzj-25mg-LW0489p-rcqx-2-jf50z-pH1.2jz-5min-P3.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20260324-FX273.lcb
样品瓶号: 2-20
进样体积: 50μl
进样时间: 2026/03/24 17:49:55
处理时间 (V2) : 2026/03/25 09:10:49
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.138	18608	100.000	4828	1998	1.190	--
总计		18608	100.000	4828			

图53 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-LW0489批(25mg规格)-pH1.2介质-浆法-50转-5min-片3
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 0-34/24-366-2 - cbzj-25mg-LW0489p-rcqx-2-jf50z-pH1.2jz-5min-P4.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20260324-FX273.lcb
样品瓶号: 2-29
进样体积: 50μl
进样时间: 2026/03/24 17:53:20
处理时间 (V2) : 2026/03/25 09:10:52
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.135	18618	100.000	4852	2042	1.192	--
总计		18618	100.000	4852			

图54 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-LW0489批(25mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-5min-片4
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 0-34/24-367-2 - cbzj-25mg-LW0489p-rcqx-2-jf50z-pH1.2jz-5min-P5.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20260324-FX273.lcb
样品瓶号: 2-38
进样体积: 50μl
进样时间: 2026/03/24 17:56:46
处理时间 (V2) : 2026/03/25 09:10:55
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.133	18221	100.000	4723	2019	1.199	--
总计		18221	100.000	4723			

图55 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-LW0489批(25mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-5min-片5
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 0-34/24-368-2 - cbzj-25mg-LW0489p-rcqx-2-jf50z-pH1.2jz-5min-P6.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20260324-FX273.lcb
样品瓶号: 2-47
进样体积: 50μl
进样时间: 2026/03/24 18:00:12
处理时间 (V2) : 2026/03/25 09:10:58
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.133	18354	100.000	4738	2017	1.206	--
总计		18354	100.000	4738			

图56 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-LW0489批(25mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-5min-片6
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 0-34/24-369-2 - cbzj-25mg-LW0489p-rcqx-2-jf50z-pH1.2jz-10min-P1.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20260324-FX273.lcb
样品瓶号: 2-3
进样体积: 50μl
进样时间: 2026/03/24 18:03:38
处理时间 (V2) : 2026/03/25 09:11:01
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.137	18481	100.000	4822	2033	1.208	--
总计		18481	100.000	4822			

图57 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-LW0489批(25mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-10min-片1
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 0-34/24-370-2 - cbzj-25mg-LW0489p-rcqx-2-jf50z-pH1.2jz-10min-P2.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20260324-FX273.lcb
样品瓶号: 2-12
进样体积: 50μl
进样时间: 2026/03/24 18:07:04
处理时间 (V2) : 2026/03/25 09:11:04
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.134	18408	100.000	4757	2027	1.205	--
总计		18408	100.000	4757			

图58 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-LW0489批(25mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-10min-片2
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 0-34/24-371-2 - cbzj-25mg-LW0489p-rcqx-2-jf50z-pH1.2jz-10min-P3.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20260324-FX273.lcb
样品瓶号: 2-21
进样体积: 50μl
进样时间: 2026/03/24 18:10:30
处理时间 (V2) : 2026/03/25 09:11:07
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.135	18748	100.000	4882	2056	1.200	--
总计		18748	100.000	4882			

图59 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-LW0489批(25mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-10min-片3
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 0-34/24-372-2 - cbzj-25mg-LW0489p-rcqx-2-jf50z-pH1.2jz-10min-P4.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20260324-FX273.lcb
样品瓶号: 2-30
进样体积: 50μl
进样时间: 2026/03/24 18:13:56
处理时间 (V2) : 2026/03/25 09:11:09
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.137	18739	100.000	4896	2040	1.194	--
总计		18739	100.000	4896			

图60 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-LW0489批(25mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-10min-片4
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 0-34/24-373-2 - cbzj-25mg-LW0489p-rcqx-2-jf50z-pH1.2jz-10min-P5.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20260324-FX273.lcb
样品瓶号: 2-39
进样体积: 50μl
进样时间: 2026/03/24 18:17:22
处理时间 (V2) : 2026/03/25 09:11:12
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.134	18650	100.000	4837	2028	1.194	--
总计		18650	100.000	4837			

图61 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-LW0489批(25mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-10min-片5
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 0-34/24-374-2 - cbzj-25mg-LW0489p-rcqx-2-jf50z-pH1.2jz-10min-P6.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20260324-FX273.lcb
样品瓶号: 2-48
进样体积: 50μl
进样时间: 2026/03/24 18:20:48
处理时间 (V2) : 2026/03/25 09:11:15
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.135	18735	100.000	4858	2040	1.216	--
总计		18735	100.000	4858			

图62 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-LW0489批(25mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-10min-片6
供试品溶液-1



JSS-3362


<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 0-34/24-375-2 - cbzj-25mg-LW0489p-rcqx-2-jf50z-pH1.2jz-15min-P1.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20260324-FX273.lcb
样品瓶号: 2-4
进样体积: 50μl
进样时间: 2026/03/24 18:24:15
处理时间 (V2) : 2026/03/25 09:11:18
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.132	18719	100.000	4911	2049	1.209	--
总计		18719	100.000	4911			

图63 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-LW0489批(25mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-15min-片1
供试品溶液-1



JSS-3362


<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 0-34/24-376-2 - cbzj-25mg-LW0489p-rcqx-2-jf50z-pH1.2jz-15min-P2.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20260324-FX273.lcb
样品瓶号: 2-13
进样体积: 50μl
进样时间: 2026/03/24 18:27:41
处理时间 (V2) : 2026/03/25 09:11:21
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.136	18424	100.000	4798	2044	1.204	--
总计		18424	100.000	4798			

图64 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-LW0489批(25mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-15min-片2
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 0-34/24-377-2 - cbzj-25mg-LW0489p-rcqx-2-jf50z-pH1.2jz-15min-P3.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20260324-FX273.lcb
样品瓶号: 2-22
进样体积: 50μl
进样时间: 2026/03/24 18:31:07
处理时间 (V2) : 2026/03/25 09:11:24
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.135	18650	100.000	4777	1989	1.204	--
总计		18650	100.000	4777			

图65 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-LW0489批(25mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-15min-片3
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 0-34/24-378-2 - cbzj-25mg-LW0489p-rcqx-2-jf50z-pH1.2jz-15min-P4.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20260324-FX273.lcb
样品瓶号: 2-31
进样体积: 50μl
进样时间: 2026/03/24 18:34:33
处理时间 (V2) : 2026/03/25 09:11:27
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.133	18461	100.000	4761	2000	1.194	--
总计		18461	100.000	4761			

图66 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-LW0489批(25mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-15min-片4
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 0-34/24-379-2 - cbzj-25mg-LW0489p-rcqx-2-jf50z-pH1.2jz-15min-P5.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20260324-FX273.lcb
样品瓶号: 2-40
进样体积: 50μl
进样时间: 2026/03/24 18:37:59
处理时间 (V2) : 2026/03/25 09:11:30
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.133	18506	100.000	4800	2013	1.207	--
总计		18506	100.000	4800			

图67 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-LW0489批(25mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-15min-片5
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 0-34/24-380-2 - cbzj-25mg-LW0489p-rcqx-2-jf50z-pH1.2jz-15min-P6.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20260324-FX273.lcb
样品瓶号: 2-49
进样体积: 50μl
进样时间: 2026/03/24 18:41:25
处理时间 (V2) : 2026/03/25 09:11:33
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.134	18691	100.000	4806	2030	1.205	--
总计		18691	100.000	4806			

图68 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-LW0489批(25mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-15min-片6
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 0-34/24-381-2 - cbzj-25mg-LW0489p-rcqx-2-jf50z-pH1.2jz-30min-P1.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20260324-FX273.lcb
样品瓶号: 2-5
进样体积: 50μl
进样时间: 2026/03/24 18:44:52
处理时间 (V2) : 2026/03/25 09:11:35
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.135	18618	100.000	4739	1968	1.199	--
总计		18618	100.000	4739			

图69 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-LW0489批(25mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-30min-片1
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 0-34/24-382-2 - cbzj-25mg-LW0489p-rcqx-2-jf50z-pH1.2jz-30min-P2.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20260324-FX273.lcb
样品瓶号: 2-14
进样体积: 50μl
进样时间: 2026/03/24 18:48:17
处理时间 (V2) : 2026/03/25 09:11:38
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.135	18345	100.000	4662	1941	1.188	--
总计		18345	100.000	4662			

图70 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-LW0489批(25mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-30min-片2
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 0-34/24-383-2 - cbzj-25mg-LW0489p-rcqx-2-jf50z-pH1.2jz-30min-P3.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20260324-FX273.lcb
样品瓶号: 2-23
进样体积: 50μl
进样时间: 2026/03/24 18:51:43
处理时间 (V2) : 2026/03/25 09:11:41
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.136	18610	100.000	4768	1977	1.192	--
总计		18610	100.000	4768			

图71 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-LW0489批(25mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-30min-片3
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 0-34/24-384-2 - cbzj-25mg-LW0489p-rcqx-2-jf50z-pH1.2jz-30min-P4.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20260324-FX273.lcb
样品瓶号: 2-32
进样体积: 50μl
进样时间: 2026/03/24 18:55:10
处理时间 (V2) : 2026/03/25 09:11:44
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.135	19042	100.000	4849	1973	1.202	--
总计		19042	100.000	4849			

图72 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-LW0489批(25mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-30min-片4
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 0-34/24-385-2 - cbzj-25mg-LW0489p-rcqx-2-jf50z-pH1.2jz-30min-P5.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20260324-FX273.lcb
样品瓶号: 2-41
进样体积: 50μl
进样时间: 2026/03/24 18:58:36
处理时间 (V2) : 2026/03/25 09:11:47
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.134	18599	100.000	4745	1983	1.190	--
总计		18599	100.000	4745			

图73 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-LW0489批(25mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-30min-片5
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 0-34/24-386-2 - cbzj-25mg-LW0489p-rcqx-2-jf50z-pH1.2jz-30min-P6.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20260324-FX273.lcb
样品瓶号: 2-50
进样体积: 50μl
进样时间: 2026/03/24 19:02:02
处理时间 (V2) : 2026/03/25 09:11:51
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.136	18721	100.000	4821	1991	1.180	--
总计		18721	100.000	4821			

图74 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-LW0489批(25mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-30min-片6
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 0-34/24-387-2 - cbzj-25mg-LW0489p-rcqx-2-jf50z-pH1.2jz-dz-2-1.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20260324-FX273.lcb
样品瓶号: 2-27
进样体积: 50μl
进样时间: 2026/03/24 19:05:29
处理时间 (V2) : 2026/03/25 09:11:53
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.103	17251	100.000	3842	1378	1.213	--
总计		17251	100.000	3842			

图75 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-LW0489批(25mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转
对照品溶液-2-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 0-34/24-388-2 - cbzj-25mg-LW0489p-rcqx-2-jf50z-pH1.2jz-dz-2-2.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20260324-FX273.lcb
样品瓶号: 2-27
进样体积: 50μl
进样时间: 2026/03/24 19:08:56
处理时间 (V2) : 2026/03/25 09:11:56
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.104	17388	100.000	3880	1391	1.202	--
总计		17388	100.000	3880			

图76 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-LW0489批(25mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转
对照品溶液-2-2




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 0-35/24-389-3 - cbzj-75mg-LR6707p-rcqx-1-jf50z-pH1.2jz-rj.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20260324-FX273.lcb
样品瓶号: 3-9
进样体积: 50μl
进样时间: 2026/03/24 19:12:21
处理时间 (V3) : 2026/03/25 09:14:57
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图77 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-LR6707批(75mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转
溶剂




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 0-35/24-390-3 - cbzj-75mg-LR6707p-rcqx-1-jf50z-pH1.2jz-dz-1-1.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20260324-FX273.lcb
样品瓶号: 3-18
进样体积: 50μl
进样时间: 2026/03/24 19:15:47
处理时间 (V3) : 2026/03/25 09:15:00
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.104	55725	100.000	12230	1350	1.197	--
总计		55725	100.000	12230			

图78 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-LR6707批(75mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转
对照品溶液-1-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 0-35/24-391-3 - cbzj-75mg-LR6707p-rcqx-1-jf50z-pH1.2jz-dz-1-2.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20260324-FX273.lcb
样品瓶号: 3-18
进样体积: 50μl
进样时间: 2026/03/24 19:19:13
处理时间 (V3) : 2026/03/25 09:15:03
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.104	55618	100.000	12152	1338	1.205	--
总计		55618	100.000	12152			

图79 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-LR6707批(75mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转
对照品溶液-1-2




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 0-35/24-392-3 - cbzj-75mg-LR6707p-rcqx-1-jf50z-pH1.2jz-dz-1-3.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20260324-FX273.lcb
样品瓶号: 3-18
进样体积: 50μl
进样时间: 2026/03/24 19:22:37
处理时间 (V3) : 2026/03/25 09:15:06
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.103	56044	100.000	12178	1326	1.203	--
总计		56044	100.000	12178			

图80 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-LR6707批(75mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转
对照品溶液-1-3




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 0-35/24-393-3 - cbzj-75mg-LR6707p-rcqx-1-jf50z-pH1.2jz-dz-1-4.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20260324-FX273.lcb
样品瓶号: 3-18
进样体积: 50μl
进样时间: 2026/03/24 19:26:03
处理时间 (V3) : 2026/03/25 09:15:09
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.104	55801	100.000	12204	1341	1.205	--
总计		55801	100.000	12204			

图81 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-LR6707批(75mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转
对照品溶液-1-4




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 0-35/24-394-3 - cbzj-75mg-LR6707p-rcqx-1-jf50z-pH1.2jz-dz-1-5.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20260324-FX273.lcb
样品瓶号: 3-18
进样体积: 50μl
进样时间: 2026/03/24 19:29:28
处理时间 (V3) : 2026/03/25 09:15:11
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.104	56011	100.000	12257	1343	1.204	--
总计		56011	100.000	12257			

图82 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-LR6707批(75mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转
对照品溶液-1-5




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 0-35/24-395-3 - cbzj-75mg-LR6707p-rcqx-1-jf50z-pH1.2jz-2min-P1.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20260324-FX273.lcb
样品瓶号: 3-1
进样体积: 50μl
进样时间: 2026/03/24 19:32:53
处理时间 (V3) : 2026/03/25 09:15:14
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.133	47017	100.000	11944	1920	1.190	--
总计		47017	100.000	11944			

图83 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-LR6707批(75mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-2min-片1
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 0-35/24-396-3 - cbzj-75mg-LR6707p-rcqx-1-jf50z-pH1.2jz-2min-P2.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20260324-FX273.lcb
样品瓶号: 3-10
进样体积: 50μl
进样时间: 2026/03/24 19:36:18
处理时间 (V3) : 2026/03/25 09:15:16
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.132	44666	100.000	11390	1938	1.187	--
总计		44666	100.000	11390			

图84 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-LR6707批(75mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-2min-片2
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 0-35/24-397-3 - cbzj-75mg-LR6707p-rcqx-1-jf50z-pH1.2jz-2min-P3.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20260324-FX273.lcb
样品瓶号: 3-19
进样体积: 50μl
进样时间: 2026/03/24 19:39:42
处理时间 (V3) : 2026/03/25 09:15:19
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.132	43598	100.000	11218	1958	1.192	--
总计		43598	100.000	11218			

图85 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-LR6707批(75mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-2min-片3
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 0-35/24-398-3 - cbzj-75mg-LR6707p-rcqx-1-jf50z-pH1.2jz-2min-P4.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20260324-FX273.lcb
样品瓶号: 3-28
进样体积: 50μl
进样时间: 2026/03/24 19:43:07
处理时间 (V3) : 2026/03/25 09:15:22
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.132	42013	100.000	10799	1967	1.198	--
总计		42013	100.000	10799			

图86 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-LR6707批(75mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-2min-片4
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 0-35/24-399-3 - cbzj-75mg-LR6707p-rcqx-1-jf50z-pH1.2jz-2min-P5.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20260324-FX273.lcb
样品瓶号: 3-37
进样体积: 50μl
进样时间: 2026/03/24 19:46:32
处理时间 (V3) : 2026/03/25 09:15:24
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.133	21635	100.000	5610	2008	1.184	--
总计		21635	100.000	5610			

图87 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-LR6707批(75mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-2min-片5
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 0-35/24-400-3 - cbzj-75mg-LR6707p-rcqx-1-jf50z-pH1.2jz-2min-P6.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20260324-FX273.lcb
样品瓶号: 3-46
进样体积: 50μl
进样时间: 2026/03/24 19:49:56
处理时间 (V3) : 2026/03/25 09:15:27
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.132	46692	100.000	12154	2027	1.186	--
总计		46692	100.000	12154			

图88 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-LR6707批(75mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-2min-片6
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 0-35/24-401-3 - cbzj-75mg-LR6707p-rcqx-1-jf50z-pH1.2jz-5min-P1.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20260324-FX273.lcb
样品瓶号: 3-2
进样体积: 50μl
进样时间: 2026/03/24 19:53:22
处理时间 (V3) : 2026/03/25 09:15:30
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.134	56957	100.000	14580	1999	1.189	--
总计		56957	100.000	14580			

图89 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-LR6707批(75mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-5min-片1
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 0-35/24-402-3 - cbzj-75mg-LR6707p-rcqx-1-jf50z-pH1.2jz-5min-P2.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20260324-FX273.lcb
样品瓶号: 3-11
进样体积: 50μl
进样时间: 2026/03/24 19:56:46
处理时间 (V3) : 2026/03/25 09:15:33
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.132	54678	100.000	14319	2045	1.191	--
总计		54678	100.000	14319			

图90 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-LR6707批(75mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-5min-片2
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 0-35/24-403-3 - cbzj-75mg-LR6707p-rcqx-1-jf50z-pH1.2jz-5min-P3.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20260324-FX273.lcb
样品瓶号: 3-20
进样体积: 50μl
进样时间: 2026/03/24 20:00:10
处理时间 (V3) : 2026/03/25 09:15:35
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.132	55001	100.000	14432	2053	1.191	--
总计		55001	100.000	14432			

图91 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-LR6707批(75mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-5min-片3
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 0-35/24-404-3 - cbzj-75mg-LR6707p-rcqx-1-jf50z-pH1.2jz-5min-P4.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20260324-FX273.lcb
样品瓶号: 3-29
进样体积: 50μl
进样时间: 2026/03/24 20:03:35
处理时间 (V3) : 2026/03/25 09:15:38
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.133	55651	100.000	14512	2051	1.190	--
总计		55651	100.000	14512			

图92 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-LR6707批(75mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-5min-片4
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 0-35/24-405-3 - cbzj-75mg-LR6707p-rcqx-1-jf50z-pH1.2jz-5min-P5.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20260324-FX273.lcb
样品瓶号: 3-38
进样体积: 50μl
进样时间: 2026/03/24 20:06:59
处理时间 (V3) : 2026/03/25 09:15:41
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.133	55313	100.000	14482	2072	1.190	--
总计		55313	100.000	14482			

图93 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-LR6707批(75mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-5min-片5
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 0-35/24-406-3 - cbzj-75mg-LR6707p-rcqx-1-jf50z-pH1.2jz-5min-P6.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20260324-FX273.lcb
样品瓶号: 3-47
进样体积: 50μl
进样时间: 2026/03/24 20:10:22
处理时间 (V3) : 2026/03/25 09:15:44
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.132	55897	100.000	14640	2056	1.195	--
总计		55897	100.000	14640			

图94 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-LR6707批(75mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-5min-片6
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 0-35/24-407-3 - cbzj-75mg-LR6707p-rcqx-1-jf50z-pH1.2jz-10min-P1.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20260324-FX273.lcb
样品瓶号: 3-3
进样体积: 50μl
进样时间: 2026/03/24 20:13:47
处理时间 (V3) : 2026/03/25 09:15:46
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.132	57283	100.000	15000	2055	1.192	--
总计		57283	100.000	15000			

图95 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-LR6707批(75mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-10min-片1
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 0-35/24-408-3 - cbzj-75mg-LR6707p-rcqx-1-jf50z-pH1.2jz-10min-P2.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20260324-FX273.lcb
样品瓶号: 3-12
进样体积: 50μl
进样时间: 2026/03/24 20:17:11
处理时间 (V3) : 2026/03/25 09:15:49
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.134	55528	100.000	14454	2073	1.193	--
总计		55528	100.000	14454			

图96 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-LR6707批(75mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-10min-片2
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 0-35/24-409-3 - cbzj-75mg-LR6707p-rcqx-1-jf50z-pH1.2jz-10min-P3.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20260324-FX273.lcb
样品瓶号: 3-21
进样体积: 50μl
进样时间: 2026/03/24 20:20:35
处理时间 (V3) : 2026/03/25 09:15:52
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.132	55243	100.000	14633	2089	1.194	--
总计		55243	100.000	14633			

图97 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-LR6707批(75mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-10min-片3
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 0-35/24-410-3 - cbzj-75mg-LR6707p-rcqx-1-jf50z-pH1.2jz-10min-P4.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20260324-FX273.lcb
样品瓶号: 3-30
进样体积: 50μl
进样时间: 2026/03/24 20:23:59
处理时间 (V3) : 2026/03/25 09:15:54
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.132	56305	100.000	14869	2085	1.191	--
总计		56305	100.000	14869			

图98 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-LR6707批(75mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-10min-片4
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 0-35/24-411-3 - cbzj-75mg-LR6707p-rcqx-1-jf50z-pH1.2jz-10min-P5.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20260324-FX273.lcb
样品瓶号: 3-39
进样体积: 50μl
进样时间: 2026/03/24 20:27:24
处理时间 (V3) : 2026/03/25 09:15:57
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.133	56232	100.000	14742	2089	1.195	--
总计		56232	100.000	14742			

图99 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-LR6707批(75mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-10min-片5
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 0-35/24-412-3 - cbzj-75mg-LR6707p-rcqx-1-jf50z-pH1.2jz-10min-P6.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20260324-FX273.lcb
样品瓶号: 3-48
进样体积: 50μl
进样时间: 2026/03/24 20:30:48
处理时间 (V3) : 2026/03/25 09:16:00
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.132	55946	100.000	14818	2084	1.195	--
总计		55946	100.000	14818			

图100 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-LR6707批(75mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-10min-片6
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 0-35/24-413-3 - cbzj-75mg-LR6707p-rcqx-1-jf50z-pH1.2jz-15min-P1.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20260324-FX273.lcb
样品瓶号: 3-4
进样体积: 50μl
进样时间: 2026/03/24 20:34:12
处理时间 (V3) : 2026/03/25 09:16:02
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.132	57062	100.000	14938	2045	1.195	--
总计		57062	100.000	14938			

图101 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-LR6707批(75mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-15min-片1
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 0-35/24-414-3 - cbzj-75mg-LR6707p-rcqx-1-jf50z-pH1.2jz-15min-P2.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20260324-FX273.lcb
样品瓶号: 3-13
进样体积: 50μl
进样时间: 2026/03/24 20:37:36
处理时间 (V3) : 2026/03/25 09:16:05
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.132	55293	100.000	14533	2063	1.197	--
总计		55293	100.000	14533			

图102 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-LR6707批(75mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-15min-片2
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 0-35/24-415-3 - cbzj-75mg-LR6707p-rcqx-1-jf50z-pH1.2jz-15min-P3.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20260324-FX273.lcb
样品瓶号: 3-22
进样体积: 50μl
进样时间: 2026/03/24 20:41:00
处理时间 (V3) : 2026/03/25 09:16:07
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.132	55277	100.000	14472	2044	1.199	--
总计		55277	100.000	14472			

图103 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-LR6707批(75mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-15min-片3
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 0-35/24-416-3 - cbzj-75mg-LR6707p-rcqx-1-jf50z-pH1.2jz-15min-P4.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20260324-FX273.lcb
样品瓶号: 3-31
进样体积: 50μl
进样时间: 2026/03/24 20:44:24
处理时间 (V3) : 2026/03/25 09:16:10
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.132	56161	100.000	14774	2063	1.195	--
总计		56161	100.000	14774			

图104 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-LR6707批(75mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-15min-片4
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 0-35/24-417-3 - cbzj-75mg-LR6707p-rcqx-1-jf50z-pH1.2jz-15min-P5.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20260324-FX273.lcb
样品瓶号: 3-40
进样体积: 50μl
进样时间: 2026/03/24 20:47:49
处理时间 (V3) : 2026/03/25 09:16:13
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.132	56419	100.000	14759	2048	1.197	--
总计		56419	100.000	14759			

图105 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-LR6707批(75mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-15min-片5
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 0-35/24-418-3 - cbzj-75mg-LR6707p-rcqx-1-jf50z-pH1.2jz-15min-P6.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20260324-FX273.lcb
样品瓶号: 3-49
进样体积: 50μl
进样时间: 2026/03/24 20:51:12
处理时间 (V3) : 2026/03/25 09:16:15
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.132	56468	100.000	14798	2053	1.196	--
总计		56468	100.000	14798			

图106 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-LR6707批(75mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-15min-片6
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 0-35/24-419-3 - cbzj-75mg-LR6707p-rcqx-1-jf50z-pH1.2jz-30min-P1.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20260324-FX273.lcb
样品瓶号: 3-5
进样体积: 50μl
进样时间: 2026/03/24 20:54:37
处理时间 (V3) : 2026/03/25 09:16:18
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.132	56945	100.000	14959	2057	1.196	--
总计		56945	100.000	14959			

图107 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-LR6707批(75mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-30min-片1
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 0-35/24-420-3 - cbzj-75mg-LR6707p-rcqx-1-jf50z-pH1.2jz-30min-P2.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20260324-FX273.lcb
样品瓶号: 3-14
进样体积: 50μl
进样时间: 2026/03/24 20:58:00
处理时间 (V3) : 2026/03/25 09:16:21
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.132	55481	100.000	14532	2041	1.197	--
总计		55481	100.000	14532			

图108 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-LR6707批(75mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-30min-片2
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 0-35/24-421-3 - cbzj-75mg-LR6707p-rcqx-1-jf50z-pH1.2jz-30min-P3.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20260324-FX273.lcb
样品瓶号: 3-23
进样体积: 50μl
进样时间: 2026/03/24 21:01:24
处理时间 (V3) : 2026/03/25 09:16:23
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.133	55609	100.000	14525	2048	1.193	--
总计		55609	100.000	14525			

图109 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-LR6707批(75mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-30min-片3
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 0-35/24-422-3 - cbzj-75mg-LR6707p-rcqx-1-jf50z-pH1.2jz-30min-P4.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20260324-FX273.lcb
样品瓶号: 3-32
进样体积: 50μl
进样时间: 2026/03/24 21:04:47
处理时间 (V3) : 2026/03/25 09:16:26
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.132	56346	100.000	14645	2006	1.194	--
总计		56346	100.000	14645			

图110 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-LR6707批(75mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-30min-片4
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 0-35/24-423-3 - cbzj-75mg-LR6707p-rcqx-1-jf50z-pH1.2jz-30min-P5.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20260324-FX273.lcb
样品瓶号: 3-41
进样体积: 50μl
进样时间: 2026/03/24 21:08:11
处理时间 (V3) : 2026/03/25 09:16:29
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.132	56067	100.000	14652	2026	1.193	--
总计		56067	100.000	14652			

图111 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-LR6707批(75mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-30min-片5
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 0-35/24-424-3 - cbzj-75mg-LR6707p-rcqx-1-jf50z-pH1.2jz-30min-P6.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20260324-FX273.lcb
样品瓶号: 3-50
进样体积: 50μl
进样时间: 2026/03/24 21:11:34
处理时间 (V3) : 2026/03/25 09:16:31
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.131	55839	100.000	14654	2046	1.193	--
总计		55839	100.000	14654			

图112 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-LR6707批(75mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-30min-片6
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 0-35/24-425-3 - cbzj-75mg-LR6707p-rcqx-1-jf50z-pH1.2jz-dz-2-1.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20260324-FX273.lcb
样品瓶号: 3-27
进样体积: 50μl
进样时间: 2026/03/24 21:15:00
处理时间 (V3): 2026/03/25 09:16:34
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.102	55841	100.000	12455	1404	1.215	--
总计		55841	100.000	12455			

图113 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-LR6707批(75mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转
对照品溶液-2-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 0-35/24-426-3 - cbzj-75mg-LR6707p-rcqx-1-jf50z-pH1.2jz-dz-2-2.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20260324-FX273.lcb
样品瓶号: 3-27
进样体积: 50μl
进样时间: 2026/03/24 21:18:24
处理时间 (V3): 2026/03/25 09:16:36
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.103	55780	100.000	12413	1394	1.215	--
总计		55780	100.000	12413			

图114 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-LR6707批(75mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转
对照品溶液-2-2




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 0-35/24-427-3 - cbzj-75mg-LR6707p-rcqx-2-jf50z-pH1.2jz-rj.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20260324-FX273.lcb
样品瓶号: 4-9
进样体积: 50μl
进样时间: 2026/03/24 21:21:52
处理时间 (V3) : 2026/03/25 09:16:39
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图115 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-LR6707批(75mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转
溶剂




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 0-35/24-428-3 - cbzj-75mg-LR6707p-rcqx-2-jf50z-pH1.2jz-dz-1-1.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20260324-FX273.lcb
样品瓶号: 4-18
进样体积: 50μl
进样时间: 2026/03/24 21:25:18
处理时间 (V3) : 2026/03/25 09:16:42
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.101	55500	100.000	12239	1376	1.215	--
总计		55500	100.000	12239			

图116 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-LR6707批(75mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转
对照品溶液-1-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 0-35/24-429-2 - cbzj-75mg-LR6707p-rcqx-2-jf50z-pH1.2jz-dz-1-2.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20260324-FX273.lcb
样品瓶号: 4-18
进样体积: 50μl
进样时间: 2026/03/24 21:28:44
处理时间 (V2) : 2026/03/25 09:16:44
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.102	55523	100.000	12302	1388	1.218	--
总计		55523	100.000	12302			

图117 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-LR6707批(75mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转
对照品溶液-1-2




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 0-35/24-430-2 - cbzj-75mg-LR6707p-rcqx-2-jf50z-pH1.2jz-dz-1-3.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20260324-FX273.lcb
样品瓶号: 4-18
进样体积: 50μl
进样时间: 2026/03/24 21:32:10
处理时间 (V2) : 2026/03/25 09:16:47
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.102	55630	100.000	12333	1392	1.220	--
总计		55630	100.000	12333			

图118 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-LR6707批(75mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转
对照品溶液-1-3




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 0-35/24-431-2 - cbzj-75mg-LR6707p-rcqx-2-jf50z-pH1.2jz-dz-1-4.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20260324-FX273.lcb
样品瓶号: 4-18
进样体积: 50μl
进样时间: 2026/03/24 21:35:36
处理时间 (V2) : 2026/03/25 09:16:50
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.102	55521	100.000	12267	1381	1.223	--
总计		55521	100.000	12267			

图119 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-LR6707批(75mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转
对照品溶液-1-4




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 0-35/24-432-2 - cbzj-75mg-LR6707p-rcqx-2-jf50z-pH1.2jz-dz-1-5.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20260324-FX273.lcb
样品瓶号: 4-18
进样体积: 50μl
进样时间: 2026/03/24 21:39:03
处理时间 (V2) : 2026/03/25 09:16:53
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.102	55569	100.000	12212	1362	1.223	--
总计		55569	100.000	12212			

图120 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-LR6707批(75mg规格)-pH1.2介质-浆法-50转
对照品溶液-1-5




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 0-35/24-433-2 - cbzj-75mg-LR6707p-rcqx-2-jf50z-pH1.2jz-2min-P1.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20260324-FX273.lcb
样品瓶号: 4-1
进样体积: 50μl
进样时间: 2026/03/24 21:42:29
处理时间 (V2) : 2026/03/25 09:16:55
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.131	30010	100.000	7703	1935	1.204	--
总计		30010	100.000	7703			

图121 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-LR6707批(75mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-2min-片1
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 0-35/24-434-2 - cbzj-75mg-LR6707p-rcqx-2-jf50z-pH1.2jz-2min-P2.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20260324-FX273.lcb
样品瓶号: 4-10
进样体积: 50μl
进样时间: 2026/03/24 21:45:54
处理时间 (V2) : 2026/03/25 09:16:58
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.131	43389	100.000	11154	1944	1.205	--
总计		43389	100.000	11154			

图122 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-LR6707批(75mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-2min-片2
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 0-35/24-435-2 - cbzj-75mg-LR6707p-rcqx-2-jf50z-pH1.2jz-2min-P3.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20260324-FX273.lcb
样品瓶号: 4-19
进样体积: 50μl
进样时间: 2026/03/24 21:49:19
处理时间 (V2) : 2026/03/25 09:17:01
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.131	44634	100.000	11482	1956	1.203	--
总计		44634	100.000	11482			

图123 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-LR6707批(75mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-2min-片3
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 0-35/24-436-2 - cbzj-75mg-LR6707p-rcqx-2-jf50z-pH1.2jz-2min-P4.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20260324-FX273.lcb
样品瓶号: 4-28
进样体积: 50μl
进样时间: 2026/03/24 21:52:44
处理时间 (V2) : 2026/03/25 09:17:04
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.132	43432	100.000	11062	1916	1.207	--
总计		43432	100.000	11062			

图124 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-LR6707批(75mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-2min-片4
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 0-35/24-437-2 - cbzj-75mg-LR6707p-rcqx-2-jf50z-pH1.2jz-2min-P5.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20260324-FX273.lcb
样品瓶号: 4-37
进样体积: 50μl
进样时间: 2026/03/24 21:56:09
处理时间 (V2) : 2026/03/25 09:17:06
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.131	42465	100.000	10813	1921	1.208	--
总计		42465	100.000	10813			

图125 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-LR6707批(75mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-2min-片5
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 0-35/24-438-2 - cbzj-75mg-LR6707p-rcqx-2-jf50z-pH1.2jz-2min-P6.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20260324-FX273.lcb
样品瓶号: 4-46
进样体积: 50μl
进样时间: 2026/03/24 21:59:33
处理时间 (V2) : 2026/03/25 09:17:10
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.131	21756	100.000	5585	1940	1.215	--
总计		21756	100.000	5585			

图126 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-LR6707批(75mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-2min-片6
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 0-35/24-439-2 - cbzj-75mg-LR6707p-rcqx-2-jf50z-pH1.2jz-5min-P1.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20260324-FX273.lcb
样品瓶号: 4-2
进样体积: 50μl
进样时间: 2026/03/24 22:02:59
处理时间 (V2) : 2026/03/25 09:17:13
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.132	54901	100.000	14001	1941	1.198	--
总计		54901	100.000	14001			

图127 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-LR6707批(75mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-5min-片1
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 0-35/24-440-2 - cbzj-75mg-LR6707p-rcqx-2-jf50z-pH1.2jz-5min-P2.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20260324-FX273.lcb
样品瓶号: 4-11
进样体积: 50μl
进样时间: 2026/03/24 22:06:26
处理时间 (V2) : 2026/03/25 09:17:16
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.133	56084	100.000	14302	1964	1.202	--
总计		56084	100.000	14302			

图128 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-LR6707批(75mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-5min-片2
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 0-35/24-441-2 - cbzj-75mg-LR6707p-rcqx-2-jf50z-pH1.2jz-5min-P3.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20260324-FX273.lcb
样品瓶号: 4-20
进样体积: 50μl
进样时间: 2026/03/24 22:09:50
处理时间 (V2) : 2026/03/25 09:17:19
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.133	55222	100.000	14159	1977	1.201	--
总计		55222	100.000	14159			

图129 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-LR6707批(75mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-5min-片3
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 0-35/24-442-2 - cbzj-75mg-LR6707p-rcqx-2-jf50z-pH1.2jz-5min-P4.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20260324-FX273.lcb
样品瓶号: 4-29
进样体积: 50μl
进样时间: 2026/03/24 22:13:15
处理时间 (V2) : 2026/03/25 09:17:21
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.132	55170	100.000	14129	1969	1.199	--
总计		55170	100.000	14129			

图130 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-LR6707批(75mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-5min-片4
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 0-35/24-443-2 - cbzj-75mg-LR6707p-rcqx-2-jf50z-pH1.2jz-5min-P5.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20260324-FX273.lcb
样品瓶号: 4-38
进样体积: 50μl
进样时间: 2026/03/24 22:16:40
处理时间 (V2) : 2026/03/25 09:17:24
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.133	55700	100.000	14352	1994	1.197	--
总计		55700	100.000	14352			

图131 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-LR6707批(75mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-5min-片5
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 0-35/24-444-2 - cbzj-75mg-LR6707p-rcqx-2-jf50z-pH1.2jz-5min-P6.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20260324-FX273.lcb
样品瓶号: 4-47
进样体积: 50μl
进样时间: 2026/03/24 22:20:05
处理时间 (V2) : 2026/03/25 09:17:27
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.133	55679	100.000	14460	2032	1.203	--
总计		55679	100.000	14460			

图132 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-LR6707批(75mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-5min-片6
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 0-35/24-445-2 - cbzj-75mg-LR6707p-rcqx-2-jf50z-pH1.2jz-10min-P1.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20260324-FX273.lcb
样品瓶号: 4-3
进样体积: 50μl
进样时间: 2026/03/24 22:23:31
处理时间 (V2) : 2026/03/25 09:17:30
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.132	55468	100.000	14531	2050	1.200	--
总计		55468	100.000	14531			

图133 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-LR6707批(75mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-10min-片1
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 0-35/24-446-2 - cbzj-75mg-LR6707p-rcqx-2-jf50z-pH1.2jz-10min-P2.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20260324-FX273.lcb
样品瓶号: 4-12
进样体积: 50μl
进样时间: 2026/03/24 22:26:57
处理时间 (V2) : 2026/03/25 09:17:32
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.132	56142	100.000	14715	2056	1.198	--
总计		56142	100.000	14715			

图134 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-LR6707批(75mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-10min-片2
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 0-35/24-447-2 - cbzj-75mg-LR6707p-rcqx-2-jf50z-pH1.2jz-10min-P3.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20260324-FX273.lcb
样品瓶号: 4-21
进样体积: 50μl
进样时间: 2026/03/24 22:30:21
处理时间 (V2) : 2026/03/25 09:17:35
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.132	56728	100.000	14870	2060	1.201	--
总计		56728	100.000	14870			

图135 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-LR6707批(75mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-10min-片3
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 0-35/24-448-2 - cbzj-75mg-LR6707p-rcqx-2-jf50z-pH1.2jz-10min-P4.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20260324-FX273.lcb
样品瓶号: 4-30
进样体积: 50μl
进样时间: 2026/03/24 22:33:46
处理时间 (V2) : 2026/03/25 09:17:37
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.132	55291	100.000	14493	2060	1.204	--
总计		55291	100.000	14493			

图136 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-LR6707批(75mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-10min-片4
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 0-35/24-449-2 - cbzj-75mg-LR6707p-rcqx-2-jf50z-pH1.2jz-10min-P5.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20260324-FX273.lcb
样品瓶号: 4-39
进样体积: 50μl
进样时间: 2026/03/24 22:37:12
处理时间 (V2) : 2026/03/25 09:17:40
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.132	55980	100.000	14707	2069	1.198	--
总计		55980	100.000	14707			

图137 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-LR6707批(75mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-10min-片5
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 0-35/24-450-2 - cbzj-75mg-LR6707p-rcqx-2-jf50z-pH1.2jz-10min-P6.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20260324-FX273.lcb
样品瓶号: 4-48
进样体积: 50μl
进样时间: 2026/03/24 22:40:36
处理时间 (V2) : 2026/03/25 09:17:43
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.132	56416	100.000	14843	2081	1.197	--
总计		56416	100.000	14843			

图138 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-LR6707批(75mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-10min-片6
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 0-35/24-451-2 - cbzj-75mg-LR6707p-rcqx-2-jf50z-pH1.2jz-15min-P1.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20260324-FX273.lcb
样品瓶号: 4-4
进样体积: 50μl
进样时间: 2026/03/24 22:44:02
处理时间 (V2) : 2026/03/25 09:17:45
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.132	55507	100.000	14508	2048	1.197	--
总计		55507	100.000	14508			

图139 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-LR6707批(75mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-15min-片1
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 0-35/24-452-2 - cbzj-75mg-LR6707p-rcqx-2-jf50z-pH1.2jz-15min-P2.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20260324-FX273.lcb
样品瓶号: 4-13
进样体积: 50μl
进样时间: 2026/03/24 22:47:28
处理时间 (V2) : 2026/03/25 09:17:48
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.132	56092	100.000	14740	2068	1.200	--
总计		56092	100.000	14740			

图140 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-LR6707批(75mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-15min-片2
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 0-35/24-453-2 - cbzj-75mg-LR6707p-rcqx-2-jf50z-pH1.2jz-15min-P3.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20260324-FX273.lcb
样品瓶号: 4-22
进样体积: 50μl
进样时间: 2026/03/24 22:50:53
处理时间 (V2) : 2026/03/25 09:17:51
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.132	56894	100.000	14934	2066	1.194	--
总计		56894	100.000	14934			

图141 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-LR6707批(75mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-15min-片3
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 0-35/24-454-2 - cbzj-75mg-LR6707p-rcqx-2-jf50z-pH1.2jz-15min-P4.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20260324-FX273.lcb
样品瓶号: 4-31
进样体积: 50μl
进样时间: 2026/03/24 22:54:19
处理时间 (V2) : 2026/03/25 09:17:53
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.131	56132	100.000	14851	2080	1.194	--
总计		56132	100.000	14851			

图142 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-LR6707批(75mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-15min-片4
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 0-35/24-455-2 - cbzj-75mg-LR6707p-rcqx-2-jf50z-pH1.2jz-15min-P5.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20260324-FX273.lcb
样品瓶号: 4-40
进样体积: 50μl
进样时间: 2026/03/24 22:57:44
处理时间 (V2) : 2026/03/25 09:17:56
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.132	54685	100.000	14374	2069	1.194	--
总计		54685	100.000	14374			

图143 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-LR6707批(75mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-15min-片5
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 0-35/24-456-2 - cbzj-75mg-LR6707p-rcqx-2-jf50z-pH1.2jz-15min-P6.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20260324-FX273.lcb
样品瓶号: 4-49
进样体积: 50μl
进样时间: 2026/03/24 23:01:11
处理时间 (V2) : 2026/03/25 09:17:59
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.132	56258	100.000	14734	2055	1.191	--
总计		56258	100.000	14734			

图144 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-LR6707批(75mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-15min-片6
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 0-35/24-457-2 - cbzj-75mg-LR6707p-rcqx-2-jf50z-pH1.2jz-30min-P1.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20260324-FX273.lcb
样品瓶号: 4-5
进样体积: 50μl
进样时间: 2026/03/24 23:04:36
处理时间 (V2) : 2026/03/25 09:18:01
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.132	55312	100.000	14517	2066	1.187	--
总计		55312	100.000	14517			

图145 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-LR6707批(75mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-30min-片1
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 0-35/24-458-2 - cbzj-75mg-LR6707p-rcqx-2-jf50z-pH1.2jz-30min-P2.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20260324-FX273.lcb
样品瓶号: 4-14
进样体积: 50μl
进样时间: 2026/03/24 23:08:02
处理时间 (V2) : 2026/03/25 09:18:04
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.132	55824	100.000	14651	2066	1.188	--
总计		55824	100.000	14651			

图146 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-LR6707批(75mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-30min-片2
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 0-35/24-459-2 - cbzj-75mg-LR6707p-rcqx-2-jf50z-pH1.2jz-30min-P3.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20260324-FX273.lcb
样品瓶号: 4-23
进样体积: 50μl
进样时间: 2026/03/24 23:11:29
处理时间 (V2) : 2026/03/25 09:18:07
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.133	57162	100.000	14980	2069	1.192	--
总计		57162	100.000	14980			

图147 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-LR6707批(75mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-30min-片3
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 0-35/24-460-2 - cbzj-75mg-LR6707p-rcqx-2-jf50z-pH1.2jz-30min-P4.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20260324-FX273.lcb
样品瓶号: 4-32
进样体积: 50μl
进样时间: 2026/03/24 23:14:55
处理时间 (V2) : 2026/03/25 09:18:10
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.132	56348	100.000	14747	2050	1.189	--
总计		56348	100.000	14747			

图148 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-LR6707批(75mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-30min-片4
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 0-35/24-461-2 - cbzj-75mg-LR6707p-rcqx-2-jf50z-pH1.2jz-30min-P5.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20260324-FX273.lcb
样品瓶号: 4-41
进样体积: 50μl
进样时间: 2026/03/24 23:18:20
处理时间 (V2) : 2026/03/25 09:18:12
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.132	55208	100.000	14532	2073	1.188	--
总计		55208	100.000	14532			

图149 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-LR6707批(75mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-30min-片5
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 0-35/24-462-2 - cbzj-75mg-LR6707p-rcqx-2-jf50z-pH1.2jz-30min-P6.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20260324-FX273.lcb
样品瓶号: 4-50
进样体积: 50μl
进样时间: 2026/03/24 23:21:46
处理时间 (V2) : 2026/03/25 09:18:15
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.133	56619	100.000	14786	2069	1.187	--
总计		56619	100.000	14786			

图150 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-LR6707批(75mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-30min-片6
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 0-35/24-463-2 - cbzj-75mg-LR6707p-rcqx-2-jf50z-pH1.2jz-dz-2-1.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20260324-FX273.lcb
样品瓶号: 4-27
进样体积: 50μl
进样时间: 2026/03/24 23:25:11
处理时间 (V2) : 2026/03/25 09:18:17
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.103	55368	100.000	12455	1426	1.213	--
总计		55368	100.000	12455			

图151 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-LR6707批(75mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转
对照品溶液-2-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 0-35/24-464-2 - cbzj-75mg-LR6707p-rcqx-2-jf50z-pH1.2jz-dz-2-2.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20260324-FX273.lcb
样品瓶号: 4-27
进样体积: 50μl
进样时间: 2026/03/24 23:28:37
处理时间 (V2) : 2026/03/25 09:18:20
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.103	55465	100.000	12482	1424	1.214	--
总计		55465	100.000	12482			

图152 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-LR6707批(75mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转
对照品溶液-2-2




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 0-36/11-657-2 - cbzj-150mg-LW0477p-rcqx-1-jf50z-pH1.2jz-rj.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20260324-FX260.lcb
样品瓶号: 3-9
进样体积: 50μl
进样时间: 2026/03/24 19:11:02
处理时间 (V2) : 2026/03/25 09:21:55
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图153 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-LW0477批(150mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转
溶剂




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 0-36/11-658-2 - cbzj-150mg-LW0477p-rcqx-1-jf50z-pH1.2jz-dz-1-1.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20260324-FX260.lcb
样品瓶号: 3-18
进样体积: 50μl
进样时间: 2026/03/24 19:14:28
处理时间 (V2) : 2026/03/25 09:21:57
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.088	105262	100.000	23378	1388	1.271	--
总计		105262	100.000	23378			

图154 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-LW0477批(150mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转
对照品溶液-1-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 0-36/11-659-2 - cbzj-150mg-LW0477p-rcqx-1-jf50z-pH1.2jz-dz-1-2.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20260324-FX260.lcb
样品瓶号: 3-18
进样体积: 50μl
进样时间: 2026/03/24 19:17:53
处理时间 (V2) : 2026/03/25 09:22:00
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.088	105217	100.000	23390	1388	1.270	--
总计		105217	100.000	23390			

图155 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-LW0477批(150mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转
对照品溶液-1-2




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 0-36/11-660-2 - cbzj-150mg-LW0477p-rcqx-1-jf50z-pH1.2jz-dz-1-3.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20260324-FX260.lcb
样品瓶号: 3-18
进样体积: 50μl
进样时间: 2026/03/24 19:21:18
处理时间 (V2) : 2026/03/25 09:22:03
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.089	105595	100.000	23409	1389	1.271	--
总计		105595	100.000	23409			

图156 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-LW0477批(150mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转
对照品溶液-1-3




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 0-36/11-661-2 - cbzj-150mg-LW0477p-rcqx-1-jf50z-pH1.2jz-dz-1-4.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20260324-FX260.lcb
样品瓶号: 3-18
进样体积: 50μl
进样时间: 2026/03/24 19:24:43
处理时间 (V2) : 2026/03/25 09:22:06
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.089	105395	100.000	23413	1390	1.273	--
总计		105395	100.000	23413			

图157 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-LW0477批(150mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转
对照品溶液-1-4




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 0-36/11-662-2 - cbzj-150mg-LW0477p-rcqx-1-jf50z-pH1.2jz-dz-1-5.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20260324-FX260.lcb
样品瓶号: 3-18
进样体积: 50μl
进样时间: 2026/03/24 19:28:09
处理时间 (V2) : 2026/03/25 09:22:08
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.088	105466	100.000	23405	1389	1.273	--
总计		105466	100.000	23405			

图158 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-LW0477批(150mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转
对照品溶液-1-5




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 0-36/11-663-2 - cbzj-150mg-LW0477p-rcqx-1-jf50z-pH1.2jz-2min-P1.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20260324-FX260.lcb
样品瓶号: 3-1
进样体积: 50μl
进样时间: 2026/03/24 19:31:33
处理时间 (V2): 2026/03/25 09:22:11
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.117	68427	100.000	17493	1989	1.264	--
总计		68427	100.000	17493			

图159 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-LW0477批(150mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-2min-片1
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 0-36/11-664-2 - cbzj-150mg-LW0477p-rcqx-1-jf50z-pH1.2jz-2min-P2.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20260324-FX260.lcb
样品瓶号: 3-10
进样体积: 50μl
进样时间: 2026/03/24 19:34:58
处理时间 (V2) : 2026/03/25 09:22:14
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.117	66002	100.000	16917	1990	1.264	--
总计		66002	100.000	16917			

图160 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-LW0477批(150mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-2min-片2
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 0-36/11-665-2 - cbzj-150mg-LW0477p-rcqx-1-jf50z-pH1.2jz-2min-P3.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20260324-FX260.lcb
样品瓶号: 3-19
进样体积: 50μl
进样时间: 2026/03/24 19:38:22
处理时间 (V2) : 2026/03/25 09:22:17
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.118	65012	100.000	16621	1992	1.268	--
总计		65012	100.000	16621			

图161 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-LW0477批(150mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-2min-片3
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 0-36/11-666-2 - cbzj-150mg-LW0477p-rcqx-1-jf50z-pH1.2jz-2min-P4.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20260324-FX260.lcb
样品瓶号: 3-28
进样体积: 50μl
进样时间: 2026/03/24 19:41:47
处理时间 (V2) : 2026/03/25 09:22:20
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.118	66289	100.000	16938	1990	1.263	--
总计		66289	100.000	16938			

图162 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-LW0477批(150mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-2min-片4
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 0-36/11-667-2 - cbzj-150mg-LW0477p-rcqx-1-jf50z-pH1.2jz-2min-P5.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20260324-FX260.lcb
样品瓶号: 3-37
进样体积: 50μl
进样时间: 2026/03/24 19:45:12
处理时间 (V2) : 2026/03/25 09:22:22
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.118	69758	100.000	17850	1993	1.264	--
总计		69758	100.000	17850			

图163 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-LW0477批(150mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-2min-片5
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 0-36/11-668-2 - cbzj-150mg-LW0477p-rcqx-1-jf50z-pH1.2jz-2min-P6.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20260324-FX260.lcb
样品瓶号: 3-46
进样体积: 50μl
进样时间: 2026/03/24 19:48:37
处理时间 (V2) : 2026/03/25 09:22:25
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.117	65517	100.000	16744	1995	1.264	--
总计		65517	100.000	16744			

图164 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-LW0477批(150mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-2min-片6
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 0-36/11-669-2 - cbzj-150mg-LW0477p-rcqx-1-jf50z-pH1.2jz-5min-P1.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20260324-FX260.lcb
样品瓶号: 3-2
进样体积: 50μl
进样时间: 2026/03/24 19:52:02
处理时间 (V2) : 2026/03/25 09:22:28
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.118	101040	100.000	25666	1980	1.259	--
总计		101040	100.000	25666			

图165 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-LW0477批(150mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-5min-片1
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 0-36/11-670-2 - cbzj-150mg-LW0477p-rcqx-1-jf50z-pH1.2jz-5min-P2.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20260324-FX260.lcb
样品瓶号: 3-11
进样体积: 50μl
进样时间: 2026/03/24 19:55:27
处理时间 (V2) : 2026/03/25 09:22:30
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.118	100355	100.000	25561	1983	1.255	--
总计		100355	100.000	25561			

图166 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-LW0477批(150mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-5min-片2
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 0-36/11-671-2 - cbzj-150mg-LW0477p-rcqx-1-jf50z-pH1.2jz-5min-P3.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20260324-FX260.lcb
样品瓶号: 3-20
进样体积: 50μl
进样时间: 2026/03/24 19:58:51
处理时间 (V2) : 2026/03/25 09:22:33
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.119	99679	100.000	25481	1988	1.259	--
总计		99679	100.000	25481			

图167 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-LW0477批(150mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-5min-片3
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 0-36/11-672-2 - cbzj-150mg-LW0477p-rcqx-1-jf50z-pH1.2jz-5min-P4.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20260324-FX260.lcb
样品瓶号: 3-29
进样体积: 50μl
进样时间: 2026/03/24 20:02:16
处理时间 (V2) : 2026/03/25 09:22:36
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.119	100738	100.000	25748	1987	1.253	--
总计		100738	100.000	25748			

图168 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-LW0477批(150mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-5min-片4
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 0-36/11-673-2 - cbzj-150mg-LW0477p-rcqx-1-jf50z-pH1.2jz-5min-P5.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20260324-FX260.lcb
样品瓶号: 3-38
进样体积: 50μl
进样时间: 2026/03/24 20:05:41
处理时间 (V2) : 2026/03/25 09:22:38
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.119	100127	100.000	25613	1986	1.252	--
总计		100127	100.000	25613			

图169 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-LW0477批(150mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-5min-片5
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 0-36/11-674-2 - cbzj-150mg-LW0477p-rcqx-1-jf50z-pH1.2jz-5min-P6.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20260324-FX260.lcb
样品瓶号: 3-47
进样体积: 50μl
进样时间: 2026/03/24 20:09:05
处理时间 (V2) : 2026/03/25 09:22:41
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.119	100685	100.000	25733	1987	1.253	--
总计		100685	100.000	25733			

图170 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-LW0477批(150mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-5min-片6
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 0-36/11-675-2 - cbzj-150mg-LW0477p-rcqx-1-jf50z-pH1.2jz-10min-P1.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20260324-FX260.lcb
样品瓶号: 3-3
进样体积: 50μl
进样时间: 2026/03/24 20:12:30
处理时间 (V2) : 2026/03/25 09:22:44
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.118	102117	100.000	26055	1989	1.249	--
总计		102117	100.000	26055			

图171 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-LW0477批(150mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-10min-片1
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 0-36/11-676-2 - cbzj-150mg-LW0477p-rcqx-1-jf50z-pH1.2jz-10min-P2.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20260324-FX260.lcb
样品瓶号: 3-12
进样体积: 50μl
进样时间: 2026/03/24 20:15:54
处理时间 (V2) : 2026/03/25 09:22:46
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.119	103117	100.000	26252	1980	1.259	--
总计		103117	100.000	26252			

图172 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-LW0477批(150mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-10min-片2
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 0-36/11-677-2 - cbzj-150mg-LW0477p-rcqx-1-jf50z-pH1.2jz-10min-P3.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20260324-FX260.lcb
样品瓶号: 3-21
进样体积: 50μl
进样时间: 2026/03/24 20:19:18
处理时间 (V2) : 2026/03/25 09:22:49
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.118	102303	100.000	26012	1984	1.254	--
总计		102303	100.000	26012			

图173 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-LW0477批(150mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-10min-片3
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 0-36/11-678-2 - cbzj-150mg-LW0477p-rcqx-1-jf50z-pH1.2jz-10min-P4.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20260324-FX260.lcb
样品瓶号: 3-30
进样体积: 50μl
进样时间: 2026/03/24 20:22:43
处理时间 (V2) : 2026/03/25 09:22:51
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.119	102861	100.000	26094	1975	1.266	--
总计		102861	100.000	26094			

图174 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-LW0477批(150mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-10min-片4
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 0-36/11-679-2 - cbzj-150mg-LW0477p-rcqx-1-jf50z-pH1.2jz-10min-P5.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20260324-FX260.lcb
样品瓶号: 3-39
进样体积: 50μl
进样时间: 2026/03/24 20:26:08
处理时间 (V2) : 2026/03/25 09:22:54
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.118	102379	100.000	26005	1985	1.256	--
总计		102379	100.000	26005			

图175 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-LW0477批(150mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-10min-片5
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 0-36/11-680-2 - cbzj-150mg-LW0477p-rcqx-1-jf50z-pH1.2jz-10min-P6.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20260324-FX260.lcb
样品瓶号: 3-48
进样体积: 50μl
进样时间: 2026/03/24 20:29:32
处理时间 (V2) : 2026/03/25 09:22:57
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.118	101818	100.000	25928	1983	1.253	--
总计		101818	100.000	25928			

图176 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-LW0477批(150mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-10min-片6
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 0-36/11-681-2 - cbzj-150mg-LW0477p-rcqx-1-jf50z-pH1.2jz-15min-P1.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20260324-FX260.lcb
样品瓶号: 3-4
进样体积: 50μl
进样时间: 2026/03/24 20:32:56
处理时间 (V2) : 2026/03/25 09:22:59
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.118	102752	100.000	26097	1982	1.254	--
总计		102752	100.000	26097			

图177 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-LW0477批(150mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-15min-片1
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 0-36/11-682-2 - cbzj-150mg-LW0477p-rcqx-1-jf50z-pH1.2jz-15min-P2.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20260324-FX260.lcb
样品瓶号: 3-13
进样体积: 50μl
进样时间: 2026/03/24 20:36:21
处理时间 (V2) : 2026/03/25 09:23:02
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.118	102695	100.000	26152	1991	1.254	--
总计		102695	100.000	26152			

图178 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-LW0477批(150mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-15min-片2
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 0-36/11-683-2 - cbzj-150mg-LW0477p-rcqx-1-jf50z-pH1.2jz-15min-P3.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20260324-FX260.lcb
样品瓶号: 3-22
进样体积: 50μl
进样时间: 2026/03/24 20:39:45
处理时间 (V2) : 2026/03/25 09:23:05
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.118	102271	100.000	26058	1988	1.253	--
总计		102271	100.000	26058			

图179 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-LW0477批(150mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-15min-片3
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 0-36/11-684-2 - cbzj-150mg-LW0477p-rcqx-1-jf50z-pH1.2jz-15min-P4.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20260324-FX260.lcb
样品瓶号: 3-31
进样体积: 50μl
进样时间: 2026/03/24 20:43:09
处理时间 (V2) : 2026/03/25 09:23:08
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.118	102777	100.000	26155	1988	1.257	--
总计		102777	100.000	26155			

图180 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-LW0477批(150mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-15min-片4
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 0-36/11-685-2 - cbzj-150mg-LW0477p-rcqx-1-jf50z-pH1.2jz-15min-P5.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20260324-FX260.lcb
样品瓶号: 3-40
进样体积: 50μl
进样时间: 2026/03/24 20:46:33
处理时间 (V2) : 2026/03/25 09:23:10
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.118	102592	100.000	26097	1987	1.255	--
总计		102592	100.000	26097			

图181 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-LW0477批(150mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-15min-片5
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 0-36/11-686-2 - cbzj-150mg-LW0477p-rcqx-1-jf50z-pH1.2jz-15min-P6.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20260324-FX260.lcb
样品瓶号: 3-49
进样体积: 50μl
进样时间: 2026/03/24 20:49:57
处理时间 (V2) : 2026/03/25 09:23:13
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.119	102412	100.000	26150	1990	1.253	--
总计		102412	100.000	26150			

图182 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-LW0477批(150mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-15min-片6
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 0-36/11-687-2 - cbzj-150mg-LW0477p-rcqx-1-jf50z-pH1.2jz-30min-P1.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20260324-FX260.lcb
样品瓶号: 3-5
进样体积: 50μl
进样时间: 2026/03/24 20:53:22
处理时间 (V2) : 2026/03/25 09:23:16
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.118	102785	100.000	26161	1987	1.255	--
总计		102785	100.000	26161			

图183 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-LW0477批(150mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-30min-片1
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 0-36/11-688-2 - cbzj-150mg-LW0477p-rcqx-1-jf50z-pH1.2jz-30min-P2.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20260324-FX260.lcb
样品瓶号: 3-14
进样体积: 50μl
进样时间: 2026/03/24 20:56:48
处理时间 (V2) : 2026/03/25 09:23:18
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.118	103355	100.000	26299	1990	1.254	--
总计		103355	100.000	26299			

图184 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-LW0477批(150mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-30min-片2
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 0-36/11-689-2 - cbzj-150mg-LW0477p-rcqx-1-jf50z-pH1.2jz-30min-P3.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20260324-FX260.lcb
样品瓶号: 3-23
进样体积: 50μl
进样时间: 2026/03/24 21:00:13
处理时间 (V2): 2026/03/25 09:23:21
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.118	102324	100.000	26086	1990	1.253	--
总计		102324	100.000	26086			

图185 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-LW0477批(150mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-30min-片3
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 0-36/11-690-2 - cbzj-150mg-LW0477p-rcqx-1-jf50z-pH1.2jz-30min-P4.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20260324-FX260.lcb
样品瓶号: 3-32
进样体积: 50μl
进样时间: 2026/03/24 21:03:37
处理时间 (V2) : 2026/03/25 09:23:24
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.118	102603	100.000	26122	1989	1.255	--
总计		102603	100.000	26122			

图186 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-LW0477批(150mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-30min-片4
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 0-36/11-691-2 - cbzj-150mg-LW0477p-rcqx-1-jf50z-pH1.2jz-30min-P5.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20260324-FX260.lcb
样品瓶号: 3-41
进样体积: 50μl
进样时间: 2026/03/24 21:07:01
处理时间 (V2) : 2026/03/25 09:23:26
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.118	100978	100.000	25715	1988	1.252	--
总计		100978	100.000	25715			

图187 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-LW0477批(150mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-30min-片5
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 0-36/11-692-2 - cbzj-150mg-LW0477p-rcqx-1-jf50z-pH1.2jz-30min-P6.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20260324-FX260.lcb
样品瓶号: 3-50
进样体积: 50μl
进样时间: 2026/03/24 21:10:26
处理时间 (V2) : 2026/03/25 09:23:29
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.118	102129	100.000	25985	1990	1.257	--
总计		102129	100.000	25985			

图188 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-LW0477批(150mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-30min-片6
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 0-36/11-693-2 - cbzj-150mg-LW0477p-rcqx-1-jf50z-pH1.2jz-dz-2-1.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20260324-FX260.lcb
样品瓶号: 3-27
进样体积: 50μl
进样时间: 2026/03/24 21:13:50
处理时间 (V2) : 2026/03/25 09:23:32
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.088	105404	100.000	23455	1390	1.272	--
总计		105404	100.000	23455			

图189 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-LW0477批(150mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转
对照品溶液-2-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 0-36/11-694-2 - cbzj-150mg-LW0477p-rcqx-1-jf50z-pH1.2jz-dz-2-2.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20260324-FX260.lcb
样品瓶号: 3-27
进样体积: 50μl
进样时间: 2026/03/24 21:17:14
处理时间 (V2) : 2026/03/25 09:23:34
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.088	105620	100.000	23483	1393	1.271	--
总计		105620	100.000	23483			

图190 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-LW0477批(150mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转
对照品溶液-2-2




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 0-36/11-695-2 - cbzj-150mg-LW0477p-rcqx-2-jf50z-pH1.2jz-rj.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20260324-FX260.lcb
样品瓶号: 4-9
进样体积: 50μl
进样时间: 2026/03/24 21:20:41
处理时间 (V2) : 2026/03/25 09:23:37
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图191 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-LW0477批(150mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转
溶剂




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 0-36/11-696-2 - cbzj-150mg-LW0477p-rcqx-2-jf50z-pH1.2jz-dz-1-1.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20260324-FX260.lcb
样品瓶号: 4-18
进样体积: 50μl
进样时间: 2026/03/24 21:24:07
处理时间 (V2) : 2026/03/25 09:23:40
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.088	105355	100.000	23488	1396	1.271	--
总计		105355	100.000	23488			

图192 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-LW0477批(150mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转
对照品溶液-1-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 0-36/11-697-2 - cbzj-150mg-LW0477p-rcqx-2-jf50z-pH1.2jz-dz-1-2.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20260324-FX260.lcb
样品瓶号: 4-18
进样体积: 50μl
进样时间: 2026/03/24 21:27:33
处理时间 (V2) : 2026/03/25 09:23:42
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.088	105168	100.000	23457	1397	1.266	--
总计		105168	100.000	23457			

图193 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-LW0477批(150mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转
对照品溶液-1-2




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 0-36/11-698-2 - cbzj-150mg-LW0477p-rcqx-2-jf50z-pH1.2jz-dz-1-3.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20260324-FX260.lcb
样品瓶号: 4-18
进样体积: 50μl
进样时间: 2026/03/24 21:31:00
处理时间 (V2) : 2026/03/25 09:23:45
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.088	105230	100.000	23499	1401	1.266	--
总计		105230	100.000	23499			

图194 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-LW0477批(150mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转
对照品溶液-1-3




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 0-36/11-699-2 - cbzj-150mg-LW0477p-rcqx-2-jf50z-pH1.2jz-dz-1-4.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20260324-FX260.lcb
样品瓶号: 4-18
进样体积: 50μl
进样时间: 2026/03/24 21:34:27
处理时间 (V2) : 2026/03/25 09:23:48
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.088	104977	100.000	23451	1398	1.267	--
总计		104977	100.000	23451			

图195 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-LW0477批(150mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转
对照品溶液-1-4




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 0-36/11-700-2 - cbzj-150mg-LW0477p-rcqx-2-jf50z-pH1.2jz-dz-1-5.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20260324-FX260.lcb
样品瓶号: 4-18
进样体积: 50μl
进样时间: 2026/03/24 21:37:53
处理时间 (V2) : 2026/03/25 09:23:50
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.088	105601	100.000	23475	1394	1.272	--
总计		105601	100.000	23475			

图196 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-LW0477批(150mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转
对照品溶液-1-5




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 0-36/11-701-2 - cbzj-150mg-LW0477p-rcqx-2-jf50z-pH1.2jz-2min-P1.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20260324-FX260.lcb
样品瓶号: 4-1
进样体积: 50μl
进样时间: 2026/03/24 21:41:18
处理时间 (V2): 2026/03/25 09:23:53
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.118	68666	100.000	17567	1993	1.269	--
总计		68666	100.000	17567			

图197 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-LW0477批(150mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-2min-片1
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 0-36/11-702-2 - cbzj-150mg-LW0477p-rcqx-2-jf50z-pH1.2jz-2min-P2.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20260324-FX260.lcb
样品瓶号: 4-10
进样体积: 50μl
进样时间: 2026/03/24 21:44:43
处理时间 (V2) : 2026/03/25 09:23:56
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.117	66719	100.000	17078	1999	1.260	--
总计		66719	100.000	17078			

图198 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-LW0477批(150mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-2min-片2
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 0-36/11-703-2 - cbzj-150mg-LW0477p-rcqx-2-jf50z-pH1.2jz-2min-P3.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20260324-FX260.lcb
样品瓶号: 4-19
进样体积: 50μl
进样时间: 2026/03/24 21:48:07
处理时间 (V2) : 2026/03/25 09:23:58
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.117	65100	100.000	16664	1998	1.264	--
总计		65100	100.000	16664			

图199 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-LW0477批(150mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-2min-片3
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 0-36/11-704-2 - cbzj-150mg-LW0477p-rcqx-2-jf50z-pH1.2jz-2min-P4.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20260324-FX260.lcb
样品瓶号: 4-28
进样体积: 50μl
进样时间: 2026/03/24 21:51:32
处理时间 (V2): 2026/03/25 09:24:01
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.118	68211	100.000	17452	1996	1.263	--
总计		68211	100.000	17452			

图200 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-LW0477批(150mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-2min-片4
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 0-36/11-705-2 - cbzj-150mg-LW0477p-rcqx-2-jf50z-pH1.2jz-2min-P5.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20260324-FX260.lcb
样品瓶号: 4-37
进样体积: 50μl
进样时间: 2026/03/24 21:54:56
处理时间 (V2) : 2026/03/25 09:24:04
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.117	66056	100.000	16940	1996	1.265	--
总计		66056	100.000	16940			

图201 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-LW0477批(150mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-2min-片5
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 0-36/11-706-2 - cbzj-150mg-LW0477p-rcqx-2-jf50z-pH1.2jz-2min-P6.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20260324-FX260.lcb
样品瓶号: 4-46
进样体积: 50μl
进样时间: 2026/03/24 21:58:21
处理时间 (V2) : 2026/03/25 09:24:06
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.117	68911	100.000	17684	2000	1.264	--
总计		68911	100.000	17684			

图202 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-LW0477批(150mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-2min-片6
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 0-36/11-707-2 - cbzj-150mg-LW0477p-rcqx-2-jf50z-pH1.2jz-5min-P1.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20260324-FX260.lcb
样品瓶号: 4-2
进样体积: 50μl
进样时间: 2026/03/24 22:01:47
处理时间 (V2) : 2026/03/25 09:24:09
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.118	100865	100.000	25693	1991	1.255	--
总计		100865	100.000	25693			

图203 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-LW0477批(150mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-5min-片1
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱 温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 0-36/11-708-2 - cbzj-150mg-LW0477p-rcqx-2-jf50z-pH1.2jz-5min-P2.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20260324-FX260.lcb
样品瓶号: 4-11
进样体积: 50μl
进样时间: 2026/03/24 22:05:12
处理时间 (V2) : 2026/03/25 09:24:11
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.118	100351	100.000	25578	1994	1.252	--
总计		100351	100.000	25578			

图204 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-LW0477批(150mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-5min-片2
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 0-36/11-709-2 - cbzj-150mg-LW0477p-rcqx-2-jf50z-pH1.2jz-5min-P3.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20260324-FX260.lcb
样品瓶号: 4-20
进样体积: 50μl
进样时间: 2026/03/24 22:08:37
处理时间 (V2) : 2026/03/25 09:24:14
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.118	100699	100.000	25717	1995	1.253	--
总计		100699	100.000	25717			

图205 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-LW0477批(150mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-5min-片3
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 0-36/11-710-2 - cbzj-150mg-LW0477p-rcqx-2-jf50z-pH1.2jz-5min-P4.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20260324-FX260.lcb
样品瓶号: 4-29
进样体积: 50μl
进样时间: 2026/03/24 22:12:02
处理时间 (V2) : 2026/03/25 09:24:17
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.117	100211	100.000	25536	1992	1.255	--
总计		100211	100.000	25536			

图206 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-LW0477批(150mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-5min-片4
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 0-36/11-711-2 - cbzj-150mg-LW0477p-rcqx-2-jf50z-pH1.2jz-5min-P5.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20260324-FX260.lcb
样品瓶号: 4-38
进样体积: 50μl
进样时间: 2026/03/24 22:15:27
处理时间 (V2) : 2026/03/25 09:24:20
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.117	99857	100.000	25451	1992	1.254	--
总计		99857	100.000	25451			

图207 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-LW0477批(150mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-5min-片5
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 0-36/11-712-2 - cbzj-150mg-LW0477p-rcqx-2-jf50z-pH1.2jz-5min-P6.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20260324-FX260.lcb
样品瓶号: 4-47
进样体积: 50μl
进样时间: 2026/03/24 22:18:52
处理时间 (V2) : 2026/03/25 09:24:22
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.117	99556	100.000	25361	1987	1.257	--
总计		99556	100.000	25361			

图208 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-LW0477批(150mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-5min-片6
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 0-36/11-713-2 - cbzj-150mg-LW0477p-rcqx-2-jf50z-pH1.2jz-10min-P1.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20260324-FX260.lcb
样品瓶号: 4-3
进样体积: 50μl
进样时间: 2026/03/24 22:22:17
处理时间 (V2) : 2026/03/25 09:24:25
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.117	102788	100.000	26124	1987	1.255	--
总计		102788	100.000	26124			

图209 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-LW0477批(150mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-10min-片1
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 0-36/11-714-2 - cbzj-150mg-LW0477p-rcqx-2-jf50z-pH1.2jz-10min-P2.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20260324-FX260.lcb
样品瓶号: 4-12
进样体积: 50μl
进样时间: 2026/03/24 22:25:43
处理时间 (V2) : 2026/03/25 09:24:28
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.117	101719	100.000	25938	1992	1.250	--
总计		101719	100.000	25938			

图210 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-LW0477批(150mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-10min-片2
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 0-36/11-715-2 - cbzj-150mg-LW0477p-rcqx-2-jf50z-pH1.2jz-10min-P3.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20260324-FX260.lcb
样品瓶号: 4-21
进样体积: 50μl
进样时间: 2026/03/24 22:29:08
处理时间 (V2) : 2026/03/25 09:24:30
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.117	101083	100.000	25784	1991	1.254	--
总计		101083	100.000	25784			

图211 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-LW0477批(150mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-10min-片3
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 0-36/11-716-2 - cbzj-150mg-LW0477p-rcqx-2-jf50z-pH1.2jz-10min-P4.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20260324-FX260.lcb
样品瓶号: 4-30
进样体积: 50μl
进样时间: 2026/03/24 22:32:33
处理时间 (V2) : 2026/03/25 09:24:33
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.117	102303	100.000	26088	1990	1.257	--
总计		102303	100.000	26088			

图212 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-LW0477批(150mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-10min-片4
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 0-36/11-717-2 - cbzj-150mg-LW0477p-rcqx-2-jf50z-pH1.2jz-10min-P5.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20260324-FX260.lcb
样品瓶号: 4-39
进样体积: 50μl
进样时间: 2026/03/24 22:35:58
处理时间 (V2) : 2026/03/25 09:24:36
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.117	102793	100.000	26199	1991	1.254	--
总计		102793	100.000	26199			

图213 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-LW0477批(150mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-10min-片5
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 0-36/11-718-2 - cbzj-150mg-LW0477p-rcqx-2-jf50z-pH1.2jz-10min-P6.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20260324-FX260.lcb
样品瓶号: 4-48
进样体积: 50μl
进样时间: 2026/03/24 22:39:23
处理时间 (V2) : 2026/03/25 09:24:39
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.117	101004	100.000	25735	1993	1.256	--
总计		101004	100.000	25735			

图214 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-LW0477批(150mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-10min-片6
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 0-36/11-719-2 - cbzj-150mg-LW0477p-rcqx-2-jf50z-pH1.2jz-15min-P1.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20260324-FX260.lcb
样品瓶号: 4-4
进样体积: 50μl
进样时间: 2026/03/24 22:42:49
处理时间 (V2) : 2026/03/25 09:24:41
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.117	102849	100.000	26206	1989	1.252	--
总计		102849	100.000	26206			

图215 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-LW0477批(150mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-15min-片1
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 0-36/11-720-2 - cbzj-150mg-LW0477p-rcqx-2-jf50z-pH1.2jz-15min-P2.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20260324-FX260.lcb
样品瓶号: 4-13
进样体积: 50μl
进样时间: 2026/03/24 22:46:14
处理时间 (V2) : 2026/03/25 09:24:44
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.118	102226	100.000	26163	1996	1.252	--
总计		102226	100.000	26163			

图216 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-LW0477批(150mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-15min-片2
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 0-36/11-721-2 - cbzj-150mg-LW0477p-rcqx-2-jf50z-pH1.2jz-15min-P3.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20260324-FX260.lcb
样品瓶号: 4-22
进样体积: 50μl
进样时间: 2026/03/24 22:49:40
处理时间 (V2) : 2026/03/25 09:24:46
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.118	103257	100.000	26342	1996	1.253	--
总计		103257	100.000	26342			

图217 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-LW0477批(150mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-15min-片3
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 0-36/11-722-2 - cbzj-150mg-LW0477p-rcqx-2-jf50z-pH1.2jz-15min-P4.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20260324-FX260.lcb
样品瓶号: 4-31
进样体积: 50μl
进样时间: 2026/03/24 22:53:06
处理时间 (V2) : 2026/03/25 09:24:49
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.117	101980	100.000	25991	1993	1.254	--
总计		101980	100.000	25991			

图218 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-LW0477批(150mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-15min-片4
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 0-36/11-723-2 - cbzj-150mg-LW0477p-rcqx-2-jf50z-pH1.2jz-15min-P5.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20260324-FX260.lcb
样品瓶号: 4-40
进样体积: 50μl
进样时间: 2026/03/24 22:56:31
处理时间 (V2) : 2026/03/25 09:24:52
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.117	102198	100.000	26050	1993	1.254	--
总计		102198	100.000	26050			

图219 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-LW0477批(150mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-15min-片5
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 0-36/11-724-2 - cbzj-150mg-LW0477p-rcqx-2-jf50z-pH1.2jz-15min-P6.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20260324-FX260.lcb
样品瓶号: 4-49
进样体积: 50μl
进样时间: 2026/03/24 22:59:56
处理时间 (V2) : 2026/03/25 09:24:54
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.117	100868	100.000	25759	1992	1.254	--
总计		100868	100.000	25759			

图220 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-LW0477批(150mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-15min-片6
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 0-36/11-725-2 - cbzj-150mg-LW0477p-rcqx-2-jf50z-pH1.2jz-30min-P1.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20260324-FX260.lcb
样品瓶号: 4-5
进样体积: 50μl
进样时间: 2026/03/24 23:03:22
处理时间 (V2) : 2026/03/25 09:24:57
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.118	102794	100.000	26310	1998	1.252	--
总计		102794	100.000	26310			

图221 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-LW0477批(150mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-30min-片1
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 0-36/11-726-2 - cbzj-150mg-LW0477p-rcqx-2-jf50z-pH1.2jz-30min-P2.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20260324-FX260.lcb
样品瓶号: 4-14
进样体积: 50μl
进样时间: 2026/03/24 23:06:48
处理时间 (V2) : 2026/03/25 09:25:00
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.118	102227	100.000	26085	1998	1.253	--
总计		102227	100.000	26085			

图222 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-LW0477批(150mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-30min-片2
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 0-36/11-727-2 - cbzj-150mg-LW0477p-rcqx-2-jf50z-pH1.2jz-30min-P3.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20260324-FX260.lcb
样品瓶号: 4-23
进样体积: 50μl
进样时间: 2026/03/24 23:10:13
处理时间 (V2) : 2026/03/25 09:25:02
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.118	103687	100.000	26461	1996	1.253	--
总计		103687	100.000	26461			

图223 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-LW0477批(150mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-30min-片3
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 0-36/11-728-2 - cbzj-150mg-LW0477p-rcqx-2-jf50z-pH1.2jz-30min-P4.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20260324-FX260.lcb
样品瓶号: 4-32
进样体积: 50μl
进样时间: 2026/03/24 23:13:39
处理时间 (V2) : 2026/03/25 09:25:05
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.118	102198	100.000	26187	1999	1.247	--
总计		102198	100.000	26187			

图224 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-LW0477批(150mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-30min-片4
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 0-36/11-729-2 - cbzj-150mg-LW0477p-rcqx-2-jf50z-pH1.2jz-30min-P5.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20260324-FX260.lcb
样品瓶号: 4-41
进样体积: 50μl
进样时间: 2026/03/24 23:17:04
处理时间 (V2): 2026/03/25 09:25:08
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.117	101312	100.000	25868	1996	1.254	--
总计		101312	100.000	25868			

图225 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-LW0477批(150mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-30min-片5
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 0-36/11-730-2 - cbzj-150mg-LW0477p-rcqx-2-jf50z-pH1.2jz-30min-P6.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20260324-FX260.lcb
样品瓶号: 4-50
进样体积: 50μl
进样时间: 2026/03/24 23:20:29
处理时间 (V2) : 2026/03/25 09:25:10
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.117	101975	100.000	26027	1996	1.253	--
总计		101975	100.000	26027			

图226 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-LW0477批(150mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-30min-片6
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 0-36/11-731-2 - cbzj-150mg-LW0477p-rcqx-2-jf50z-pH1.2jz-dz-2-1.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20260324-FX260.lcb
样品瓶号: 4-27
进样体积: 50μl
进样时间: 2026/03/24 23:23:55
处理时间 (V2) : 2026/03/25 09:25:13
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.088	104959	100.000	23420	1404	1.271	--
总计		104959	100.000	23420			

图227 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-LW0477批(150mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转
对照品溶液-2-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 0-36/11-732-2 - cbzj-150mg-LW0477p-rcqx-2-jf50z-pH1.2jz-dz-2-2.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20260324-FX260.lcb
样品瓶号: 4-27
进样体积: 50μl
进样时间: 2026/03/24 23:27:20
处理时间 (V2): 2026/03/25 09:25:16
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.087	104900	100.000	23380	1398	1.271	--
总计		104900	100.000	23380			

图228 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-LW0477批(150mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转
对照品溶液-2-2