



非布司他多替诺雷片项目信息

介质体积(ml)	900	取样体积(ml)	1.5	补液体积(ml)	1.5
对照品批号	241101	对照品来源	ZZ	对照品使用方法	直接使用
对照品含量(%)	99.69	对照品水分(%)	0	对照品稀释倍数	5000
标示量(mg)	2	供试品稀释倍数	1	系数	1

对照品溶液

序号	称样量(mg)	A ₁	A ₂	A ₃	A ₄	A ₅	A _{平均}	RSD%
1	9.99	32407	31992	31728	32070	32172	32074	0.78
2	10.00	32271	32067				32169	0.45

单位质量响应值		RSD%	判断
3210.61	3216.90	0.14	数据可信



操作者:

日期: 2026-08-16

复核者:

未审阅版本



供试品溶液-6032401批-多替诺雷-pH5.5

时间 (分钟)	样品	A ₁	A ₂	A _{平均}	溶出量(%)	平均(%)	RSD%	累计溶 出量(%)	平均(%)	RSD%
5min	1	7384	-	7384	20.615	23.70	13.36	20.61	23.70	13.36
	2	9065	-	9065	25.308			25.31		
	3	10002	-	10002	27.923			27.92		
	4	7755	-	7755	21.650			21.65		
	5	7358	-	7358	20.542			20.54		
	6	9363	-	9363	26.139			26.14		
10min	1	18794	-	18794	52.469	53.59	5.03	52.50	53.63	5.04
	2	19825	-	19825	55.347			55.39		
	3	20490	-	20490	57.204			57.25		
	4	18275	-	18275	51.020			51.06		
	5	18057	-	18057	50.411			50.45		
	6	19728	-	19728	55.076			55.12		
15min	1	23515	-	23515	65.649	66.54	1.92	65.77	66.67	1.93
	2	24503	-	24503	68.407			68.54		
	3	23870	-	23870	66.640			66.78		
	4	23682	-	23682	66.115			66.24		
	5	23250	-	23250	64.909			65.03		
	6	24195	-	24195	67.547			67.68		
20min	1	26089	-	26089	72.835	73.81	1.42	73.07	74.05	1.42
	2	27084	-	27084	75.613			75.86		
	3	26150	-	26150	73.005			73.26		
	4	26339	-	26339	73.533			73.76		
	5	26313	-	26313	73.460			73.69		
	6	26659	-	26659	74.426			74.67		
30min	1	28707	-	28707	80.144	81.23	1.47	80.50	81.60	1.47
	2	29594	-	29594	82.620			82.99		
	3	28739	-	28739	80.233			80.61		
	4	29076	-	29076	81.174			81.53		
	5	28816	-	28816	80.448			80.80		
	6	29652	-	29652	82.782			83.15		
45min	1	30533	-	30533	85.242	85.71	1.06	85.73	86.21	1.06
	2	31165	-	31165	87.006			87.52		
	3	30190	-	30190	84.284			84.79		
	4	30765	-	30765	85.889			86.38		
	5	30843	-	30843	86.107			86.59		
	6	30710	-	30710	85.736			86.25		
60min	1	31349	-	31349	87.520	88.27	0.77	88.15	88.91	0.77
	2	31845	-	31845	88.904			89.56		
	3	31499	-	31499	87.938			88.59		
	4	31874	-	31874	88.985			89.62		
	5	31365	-	31365	87.564			88.19		
	6	31778	-	31778	88.717			89.37		
极限	1	31946	-	31946	89.186	90.20	0.95	89.96	90.99	0.95
	2	32803	-	32803	91.579			92.38		
	3	32117	-	32117	89.664			90.46		
	4	32303	-	32303	90.183			90.96		
	5	32506	-	32506	90.750			91.52		
	6	32183	-	32183	89.848			90.65		



操作者:

日期: 2026-08-16

复核者:

未审阅版本



非布司他多替诺雷片项目信息

介质体积(ml)	900	取样体积(ml)	1.5	补液体积(ml)	1.5
对照品批号	C025-22401010	对照品来源	自制	对照品使用方法	直接使用
对照品含量(%)	101.3	对照品水分(%)	0	对照品稀释倍数	250
标示量(mg)	40	供试品稀释倍数	1	系数	1

对照品溶液

序号	称样量(mg)	A ₁	A ₂	A ₃	A ₄	A ₅	A _{平均}	RSD%
1	10.05	246736	245364	245221	246378	245988	245937	0.27
2	10.04	247604	248706				248155	0.32

单位质量响应值		RSD%	判断
24471.34	24716.63	0.71	数据可信



操作者:

日期: 2026-08-16

复核者:

未审阅版本



供试品溶液-6032401批-非布司他-pH5.5

时间 (分钟)	样品	A ₁	A ₂	A _{平均}	溶出量(%)	平均(%)	RSD%	累计溶 出量(%)	平均(%)	RSD%
5min	1	69942	-	69942	25.928	29.62	12.39	25.93	29.62	12.39
	2	84091	-	84091	31.173			31.17		
	3	94618	-	94618	35.076			35.08		
	4	73384	-	73384	27.204			27.20		
	5	71234	-	71234	26.407			26.41		
	6	86116	-	86116	31.924			31.92		
10min	1	156968	-	156968	58.190	58.73	3.39	58.23	58.78	3.40
	2	162734	-	162734	60.327			60.38		
	3	165421	-	165421	61.323			61.38		
	4	153155	-	153155	56.776			56.82		
	5	151925	-	151925	56.320			56.36		
	6	160395	-	160395	59.460			59.51		
15min	1	188271	-	188271	69.794	70.13	1.14	69.93	70.27	1.14
	2	191609	-	191609	71.031			71.18		
	3	191014	-	191014	70.811			70.97		
	4	188058	-	188058	69.715			69.85		
	5	185918	-	185918	68.922			69.06		
	6	190120	-	190120	70.479			70.63		
20min	1	203573	-	203573	75.466	75.89	0.90	75.72	76.15	0.90
	2	207842	-	207842	77.049			77.32		
	3	205476	-	205476	76.172			76.45		
	4	204351	-	204351	75.755			76.01		
	5	202536	-	202536	75.082			75.33		
	6	204466	-	204466	75.798			76.07		
30min	1	219725	-	219725	81.454	82.47	0.85	81.84	82.86	0.86
	2	225032	-	225032	83.422			83.82		
	3	223046	-	223046	82.685			83.09		
	4	221893	-	221893	82.258			82.64		
	5	221311	-	221311	82.042			82.42		
	6	223760	-	223760	82.950			83.35		
45min	1	234477	-	234477	86.923	87.67	0.70	87.44	88.20	0.71
	2	239124	-	239124	88.646			89.18		
	3	237442	-	237442	88.022			88.57		
	4	236212	-	236212	87.566			88.09		
	5	236513	-	236513	87.678			88.19		
	6	235201	-	235201	87.191			87.73		
60min	1	241895	-	241895	89.673	90.74	0.80	90.34	91.41	0.80
	2	247534	-	247534	91.763			92.45		
	3	245289	-	245289	90.931			91.62		
	4	243584	-	243584	90.299			90.96		
	5	245811	-	245811	91.124			91.79		
	6	244512	-	244512	90.643			91.32		
极限	1	248274	-	248274	92.038	93.15	0.89	92.85	93.97	0.89
	2	253598	-	253598	94.011			94.85		
	3	252293	-	252293	93.527			94.37		
	4	249797	-	249797	92.602			93.42		
	5	253644	-	253644	94.028			94.84		
	6	250003	-	250003	92.679			93.51		



操作者:

日期: 2026-08-16

复核者:

未审阅版本



非布司他多替诺雷片项目信息

介质体积(ml)	900	取样体积(ml)	1.5	补液体积(ml)	1.5
对照品批号	241101	对照品来源	ZZ	对照品使用方法	直接使用
对照品含量(%)	99.69	对照品水分(%)	0	对照品稀释倍数	5000
标示量(mg)	2	供试品稀释倍数	1	系数	1

对照品溶液

序号	称样量(mg)	A ₁	A ₂	A ₃	A ₄	A ₅	A _{平均}	RSD%
1	9.99	32151	32245	32648	32238	32810	32418	0.90
2	10.00	32364	32418				32391	0.12
单位质量响应值				RSD%	判断			
3245.05				0.13	数据可信			



操作者:

日期: 2026-08-16

复核者:

未审阅版本



供试品溶液-6032402批-多替诺雷-pH5.5

时间 (分钟)	样品	A ₁	A ₂	A _{平均}	溶出量(%)	平均(%)	RSD%	累计溶 出量(%)	平均(%)	RSD%
5min	1	9261	-	9261	25.629	26.82	6.89	25.63	26.82	6.90
	2	9767	-	9767	27.029			27.03		
	3	9510	-	9510	26.318			26.32		
	4	10622	-	10622	29.395			29.40		
	5	10223	-	10223	28.291			28.29		
	6	8767	-	8767	24.262			24.26		
10min	1	20654	-	20654	57.158	56.00	1.42	57.20	56.04	1.42
	2	20442	-	20442	56.571			56.62		
	3	20015	-	20015	55.389			55.43		
	4	19961	-	19961	55.240			55.29		
	5	20345	-	20345	56.303			56.35		
	6	19994	-	19994	55.331			55.37		
15min	1	24899	-	24899	68.905	67.74	1.01	69.04	67.88	1.01
	2	24643	-	24643	68.197			68.34		
	3	24333	-	24333	67.339			67.48		
	4	24316	-	24316	67.292			67.43		
	5	24256	-	24256	67.126			67.27		
	6	24422	-	24422	67.585			67.72		
20min	1	27049	-	27049	74.855	73.58	1.65	75.11	73.83	1.64
	2	26426	-	26426	73.131			73.38		
	3	26619	-	26619	73.665			73.91		
	4	26308	-	26308	72.805			73.06		
	5	26001	-	26001	71.955			72.21		
	6	27129	-	27129	75.077			75.32		
30min	1	29341	-	29341	81.198	80.01	1.08	81.58	80.38	1.08
	2	28823	-	28823	79.765			80.14		
	3	28988	-	28988	80.221			80.59		
	4	28720	-	28720	79.480			79.85		
	5	28466	-	28466	78.777			79.15		
	6	29137	-	29137	80.634			81.00		
45min	1	30929	-	30929	85.593	84.69	0.90	86.11	85.20	0.90
	2	30515	-	30515	84.447			84.95		
	3	30548	-	30548	84.538			85.04		
	4	30700	-	30700	84.959			85.47		
	5	30137	-	30137	83.401			83.91		
	6	30789	-	30789	85.205			85.71		
60min	1	31377	-	31377	86.833	86.39	0.95	87.49	87.04	0.94
	2	31108	-	31108	86.088			86.74		
	3	31167	-	31167	86.252			86.90		
	4	31157	-	31157	86.224			86.87		
	5	30803	-	30803	85.244			85.89		
	6	31686	-	31686	87.688			88.33		
极限	1	32171	-	32171	89.030	87.86	0.95	89.83	88.66	0.95
	2	31646	-	31646	87.577			88.37		
	3	31693	-	31693	87.707			88.50		
	4	31519	-	31519	87.226			88.02		
	5	31411	-	31411	86.927			87.71		
	6	32055	-	32055	88.709			89.50		



操作者:

日期: 2026-08-16

复核者:

未审阅版本



非布司他多替诺雷片项目信息

介质体积(ml)	900	取样体积(ml)	1.5	补液体积(ml)	1.5
对照品批号	C025-22401010	对照品来源	自制	对照品使用方法	直接使用
对照品含量(%)	101.3	对照品水分(%)	0	对照品稀释倍数	250
标示量(mg)	40	供试品稀释倍数	1	系数	1

对照品溶液

序号	称样量(mg)	A ₁	A ₂	A ₃	A ₄	A ₅	A _{平均}	RSD%
1	10.05	250943	252841	252336	251684	251911	251943	0.29
2	10.04	248342	248616				248479	0.08
单位质量响应值			RSD%		判断			
25068.96			24748.90		0.91 数据可信			



操作者:

日期: 2026-08-16

复核者:

未审阅版本



供试品溶液-6032402批-非布司他-pH5.5

时间 (分钟)	样品	A ₁	A ₂	A _{平均}	溶出量(%)	平均(%)	RSD%	累计溶 出量(%)	平均(%)	RSD%
5min	1	92181	-	92181	33.741	34.31	5.96	33.74	34.31	5.95
	2	94480	-	94480	34.582			34.58		
	3	91318	-	91318	33.425			33.42		
	4	101746	-	101746	37.242			37.24		
	5	97355	-	97355	35.635			35.63		
	6	85391	-	85391	31.256			31.26		
10min	1	172785	-	172785	63.244	62.24	1.03	63.30	62.30	1.03
	2	170680	-	170680	62.474			62.53		
	3	168829	-	168829	61.796			61.85		
	4	169986	-	169986	62.220			62.28		
	5	170275	-	170275	62.325			62.38		
	6	167677	-	167677	61.375			61.43		
15min	1	198178	-	198178	72.539	71.32	0.88	72.70	71.48	0.87
	2	193619	-	193619	70.870			71.03		
	3	194684	-	194684	71.260			71.42		
	4	194835	-	194835	71.315			71.48		
	5	193906	-	193906	70.975			71.14		
	6	193899	-	193899	70.973			71.13		
20min	1	209140	-	209140	76.551	75.89	0.98	76.83	76.17	0.98
	2	206286	-	206286	75.507			75.79		
	3	206459	-	206459	75.570			75.85		
	4	207287	-	207287	75.873			76.16		
	5	204606	-	204606	74.892			75.17		
	6	210161	-	210161	76.925			77.20		
30min	1	223767	-	223767	81.905	80.89	0.73	82.32	81.30	0.73
	2	220356	-	220356	80.657			81.06		
	3	221014	-	221014	80.897			81.30		
	4	220906	-	220906	80.858			81.27		
	5	218838	-	218838	80.101			80.51		
	6	221044	-	221044	80.908			81.31		
45min	1	235744	-	235744	86.289	85.48	0.87	86.84	86.02	0.87
	2	231508	-	231508	84.739			85.28		
	3	233007	-	233007	85.287			85.83		
	4	236171	-	236171	86.445			86.99		
	5	231552	-	231552	84.755			85.29		
	6	233227	-	233227	85.368			85.90		
60min	1	243118	-	243118	88.988	87.83	0.77	89.68	88.51	0.76
	2	239145	-	239145	87.534			88.22		
	3	240862	-	240862	88.162			88.84		
	4	238785	-	238785	87.402			88.09		
	5	237983	-	237983	87.109			87.79		
	6	239828	-	239828	87.784			88.46		
极限	1	247717	-	247717	90.671	89.31	0.84	91.51	90.14	0.84
	2	242043	-	242043	88.595			89.42		
	3	244472	-	244472	89.484			90.31		
	4	242751	-	242751	88.854			89.69		
	5	242873	-	242873	88.898			89.72		
	6	244178	-	244178	89.376			90.20		



操作者:

日期: 2026-08-16

复核者:

未审阅版本




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$QTL-235 - 29-11/29-459-3 - zzp-6032401p-rcqx-pH5.5jz-rj.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260327-FX278.lcb
样品瓶号: 1-9
进样体积: 10 μl
进样时间: 2026/03/27 16:14:20
处理时间(V3): 2026/03/28 16:07:39
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图1 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6032401批-pH5.5介质
溶剂




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$QTL-235 - 29-11/29-460-3 - zzp-6032401p-rcqx-pH5.5jz-dz-1-1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260327-FX278.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 10 μl
进样时间: 2026/03/27 16:19:43
处理时间(V3): 2026/03/28 16:07:42
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.332	32407	11.610	6670	1843	1.327	--
2	3.604	246736	88.390	24838	3285	1.485	12.098
总计		279144	100.000	31508			

图2 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6032401批-pH5.5介质
对照品溶液-1-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$QTL-235 - 29-11/29-461-2 - zzp-6032401p-rcqx-pH5.5jz-dz-1-2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260327-FX278.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 10 μl
进样时间: 2026/03/27 16:25:06
处理时间(V2): 2026/03/28 16:07:45
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.332	31992	11.535	6623	1841	1.320	--
2	3.603	245364	88.465	24711	3268	1.482	12.072
总计		277356	100.000	31334			

图3 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6032401批-pH5.5介质
对照品溶液-1-2




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$QTL-235 - 29-11/29-462-2 - zzp-6032401p-rcqx-pH5.5jz-dz-1-3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260327-FX278.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 10 μl
进样时间: 2026/03/27 16:30:29
处理时间(V2): 2026/03/28 16:07:48
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.333	31728	11.456	6588	1855	1.308	--
2	3.605	245221	88.544	24706	3285	1.484	12.106
总计		276949	100.000	31294			

图4 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6032401批-pH5.5介质
对照品溶液-1-3




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$QTL-235 - 29-11/29-463-2 - zzp-6032401p-rcqx-pH5.5jz-dz-1-4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260327-FX278.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 10 μl
进样时间: 2026/03/27 16:35:52
处理时间(V2): 2026/03/28 16:07:50
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.333	32070	11.517	6628	1848	1.304	--
2	3.605	246378	88.483	24751	3280	1.490	12.094
总计		278448	100.000	31379			

图5 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6032401批-pH5.5介质
对照品溶液-1-4



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$QTL-235 - 29-11/29-464-2 - zzp-6032401p-rcqx-pH5.5jz-dz-1-5.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx278.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260327-FX278.lcb

样品瓶号: 1-18

进样体积: 10 μl

进样时间: 2026/03/27 16:41:16

处理时间(V2): 2026/03/28 16:07:53

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流 速: 1.5ml/min


波 长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.333	32172	11.566	6662	1856	1.326	--
2	3.606	245988	88.434	24798	3284	1.486	12.110
总计		278161	100.000	31460			

图6 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6032401批-pH5.5介质
对照品溶液-1-5




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$QTL-235 - 29-11/29-465-2 - zzp-6032401p-rcqx-pH5.5jz-5min-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260327-FX278.lcb
样品瓶号: 1-1
进样体积: 10 μl
进样时间: 2026/03/27 16:46:39
处理时间(V2): 2026/03/28 16:07:55
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.344	7384	9.549	1648	2240	1.379	--
2	3.625	69942	90.451	6988	3229	1.303	12.371
总计		77326	100.000	8635			

图7 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6032401批-pH5.5介质-5min-片1
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$QTL-235 - 29-11/29-466-2 - zzp-6032401p-rcqx-pH5.5jz-5min-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260327-FX278.lcb
样品瓶号: 1-10
进样体积: 10 μl
进样时间: 2026/03/27 16:52:01
处理时间(V2): 2026/03/28 16:07:57
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.344	9065	9.731	2073	2322	1.346	--
2	3.624	84091	90.269	8485	3247	1.287	12.457
总计		93156	100.000	10559			

图8 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6032401批-pH5.5介质-5min-片2
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$QTL-235 - 29-11/29-467-2 - zzp-6032401p-rcqx-pH5.5jz-5min-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260327-FX278.lcb
样品瓶号: 1-19
进样体积: 10 μl
进样时间: 2026/03/27 16:57:23
处理时间(V2): 2026/03/28 16:08:00
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.345	10002	9.560	2302	2310	1.293	--
2	3.624	94618	90.440	9453	3201	1.307	12.381
总计		104620	100.000	11755			

图9 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6032401批-pH5.5介质-5min-片3
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$QTL-235 - 29-11/29-468-2 - zzp-6032401p-rcqx-pH5.5jz-5min-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260327-FX278.lcb
样品瓶号: 1-28
进样体积: 10 μl
进样时间: 2026/03/27 17:02:45
处理时间(V2): 2026/03/28 16:08:02
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.344	7755	9.558	1743	2286	1.313	--
2	3.628	73384	90.442	7251	3205	1.328	12.382
总计		81139	100.000	8994			

图10 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6032401批-pH5.5介质-5min-片4
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$QTL-235 - 29-11/29-469-2 - zzp-6032401p-rcqx-pH5.5jz-5min-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260327-FX278.lcb
样品瓶号: 1-37
进样体积: 10 μl
进样时间: 2026/03/27 17:08:07
处理时间(V2): 2026/03/28 16:08:05
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.345	7358	9.363	1695	2287	1.263	--
2	3.630	71234	90.637	7171	3226	1.277	12.415
总计		78592	100.000	8866			

图11 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6032401批-pH5.5介质-5min-片5
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$QTL-235 - 29-11/29-470-2 - zzp-6032401p-rcqx-pH5.5jz-5min-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260327-FX278.lcb
样品瓶号: 1-46
进样体积: 10 μl
进样时间: 2026/03/27 17:13:30
处理时间(V2): 2026/03/28 16:08:07
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.345	9363	9.806	2096	2290	1.327	--
2	3.628	86116	90.194	8568	3229	1.313	12.414
总计		95478	100.000	10664			

图12 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6032401批-pH5.5介质-5min-片6
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$QTL-235 - 29-11/29-471-2 - zzp-6032401p-rcqx-pH5.5jz-10min-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260327-FX278.lcb
样品瓶号: 1-2
进样体积: 10 μl
进样时间: 2026/03/27 17:18:53
处理时间(V2): 2026/03/28 16:08:10
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.345	18794	10.693	4236	2259	1.314	--
2	3.615	156968	89.307	15500	3138	1.387	12.231
总计		175762	100.000	19735			

图13 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6032401批-pH5.5介质-10min-片1
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$QTL-235 - 29-11/29-472-2 - zzp-6032401p-rcqx-pH5.5jz-10min-P2.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx278.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260327-FX278.lcb

样品瓶号: 1-11

进样体积: 10 μl

进样时间: 2026/03/27 17:24:15

处理时间(V2): 2026/03/28 16:08:12

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流速: 1.5ml/min


波长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.345	19825	10.860	4462	2269	1.347	--
2	3.616	162734	89.140	16033	3140	1.394	12.240
总计		182559	100.000	20494			

图14 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6032401批-pH5.5介质-10min-片2
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$QTL-235 - 29-11/29-473-2 - zzp-6032401p-rcqx-pH5.5jz-10min-P3.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx278.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260327-FX278.lcb

样品瓶号: 1-20

进样体积: 10 μl

进样时间: 2026/03/27 17:29:37

处理时间(V2): 2026/03/28 16:08:15

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流 速: 1.5ml/min


波 长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.345	20490	11.022	4585	2249	1.344	--
2	3.615	165421	88.978	16252	3122	1.395	12.196
总计		185911	100.000	20836			

图15 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6032401批-pH5.5介质-10min-片3
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$QTL-235 - 29-11/29-474-2 - zzp-6032401p-rcqx-pH5.5jz-10min-P4.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx278.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260327-FX278.lcb

样品瓶号: 1-29

进样体积: 10 μl

进样时间: 2026/03/27 17:34:59

处理时间(V2): 2026/03/28 16:08:17

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流速: 1.5ml/min


波长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.345	18275	10.660	4136	2257	1.303	--
2	3.618	153155	89.340	15127	3142	1.380	12.243
总计		171430	100.000	19264			

图16 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6032401批-pH5.5介质-10min-片4
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$QTL-235 - 29-11/29-475-2 - zzp-6032401p-rcqx-pH5.5jz-10min-P5.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx278.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260327-FX278.lcb

样品瓶号: 1-38

进样体积: 10 μl

进样时间: 2026/03/27 17:40:22

处理时间(V2): 2026/03/28 16:08:20

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流 速: 1.5ml/min


波 长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.345	18057	10.623	4089	2271	1.332	--
2	3.619	151925	89.377	14965	3151	1.382	12.268
总计		169982	100.000	19055			

图17 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6032401批-pH5.5介质-10min-片5
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$QTL-235 - 29-11/29-476-2 - zzp-6032401p-rcqx-pH5.5jz-10min-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260327-FX278.lcb
样品瓶号: 1-47
进样体积: 10 μl
进样时间: 2026/03/27 17:45:43
处理时间(V2): 2026/03/28 16:08:22
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.345	19728	10.952	4428	2242	1.310	--
2	3.619	160395	89.048	15767	3134	1.395	12.219
总计		180122	100.000	20195			

图18 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6032401批-pH5.5介质-10min-片6
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$QTL-235 - 29-11/29-477-2 - zzp-6032401p-rcqx-pH5.5jz-15min-P1.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx278.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260327-FX278.lcb

样品瓶号: 1-3

进样体积: 10 μl

进样时间: 2026/03/27 17:51:05

处理时间(V2): 2026/03/28 16:08:27

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流 速: 1.5ml/min


波 长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.345	23515	11.103	5327	2276	1.314	--
2	3.615	188271	88.897	18454	3111	1.421	12.201
总计		211786	100.000	23781			

图19 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6032401批-pH5.5介质-15min-片1
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$QTL-235 - 29-11/29-478-2 - zzp-6032401p-rcqx-pH5.5jz-15min-P2.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx278.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260327-FX278.lcb

样品瓶号: 1-12

进样体积: 10 μl

进样时间: 2026/03/27 17:56:28

处理时间(V2): 2026/03/28 16:08:29

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流 速: 1.5ml/min


波 长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.345	24503	11.338	5537	2259	1.323	--
2	3.614	191609	88.662	18845	3099	1.421	12.170
总计		216111	100.000	24382			

图20 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6032401批-pH5.5介质-15min-片2
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$QTL-235 - 29-11/29-479-2 - zzp-6032401p-rcqx-pH5.5jz-15min-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260327-FX278.lcb
样品瓶号: 1-21
进样体积: 10 μl
进样时间: 2026/03/27 18:01:50
处理时间(V2): 2026/03/28 16:08:32
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.345	23870	11.108	5416	2291	1.308	--
2	3.616	191014	88.892	18684	3114	1.420	12.220
总计		214883	100.000	24100			

图21 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6032401批-pH5.5介质-15min-片3
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$QTL-235 - 29-11/29-480-2 - zzp-6032401p-rcqx-pH5.5jz-15min-P4.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx278.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260327-FX278.lcb

样品瓶号: 1-30

进样体积: 10 μl

进样时间: 2026/03/27 18:07:12

处理时间(V2): 2026/03/28 16:08:35

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流 速: 1.5ml/min


波 长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.345	23682	11.185	5357	2270	1.329	--
2	3.616	188058	88.815	18423	3107	1.421	12.196
总计		211740	100.000	23780			

图22 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6032401批-pH5.5介质-15min-片4
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$QTL-235 - 29-11/29-481-2 - zzp-6032401p-rcqx-pH5.5jz-15min-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260327-FX278.lcb
样品瓶号: 1-39
进样体积: 10 μl
进样时间: 2026/03/27 18:12:34
处理时间(V2): 2026/03/28 16:08:37
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.345	23250	11.115	5270	2269	1.319	--
2	3.617	185918	88.885	18167	3101	1.420	12.189
总计		209168	100.000	23438			

图23 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6032401批-pH5.5介质-15min-片5
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$QTL-235 - 29-11/29-482-2 - zzp-6032401p-rcqx-pH5.5jz-15min-P6.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx278.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260327-FX278.lcb

样品瓶号: 1-48

进样体积: 10 μl

进样时间: 2026/03/27 18:17:56

处理时间(V2): 2026/03/28 16:08:39

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流 速: 1.5ml/min


波 长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.345	24195	11.289	5464	2259	1.328	--
2	3.617	190120	88.711	18589	3105	1.423	12.186
总计		214315	100.000	24053			

图24 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6032401批-pH5.5介质-15min-片6
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$QTL-235 - 29-11/29-483-2 - zzp-6032401p-rcqx-pH5.5jz-20min-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260327-FX278.lcb
样品瓶号: 1-4
进样体积: 10 μl
进样时间: 2026/03/27 18:23:18
处理时间(V2): 2026/03/28 16:08:42
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.345	26089	11.360	5883	2259	1.317	--
2	3.615	203573	88.640	19860	3081	1.441	12.148
总计		229663	100.000	25742			

图25 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6032401批-pH5.5介质-20min-片1
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$QTL-235 - 29-11/29-484-2 - zzp-6032401p-rcqx-pH5.5jz-20min-P2.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx278.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260327-FX278.lcb

样品瓶号: 1-13

进样体积: 10 μl

进样时间: 2026/03/27 18:28:41

处理时间(V2): 2026/03/28 16:08:44

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流速: 1.5ml/min


波长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.346	27084	11.529	6099	2265	1.327	--
2	3.616	207842	88.471	20269	3087	1.438	12.156
总计		234926	100.000	26368			

图26 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6032401批-pH5.5介质-20min-片2
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$QTL-235 - 29-11/29-485-2 - zzp-6032401p-rcqx-pH5.5jz-20min-P3.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx278.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260327-FX278.lcb

样品瓶号: 1-22

进样体积: 10 μl

进样时间: 2026/03/27 18:34:02

处理时间(V2): 2026/03/28 16:08:47

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流速: 1.5ml/min


波长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.346	26150	11.290	5923	2272	1.322	--
2	3.617	205476	88.710	20012	3086	1.446	12.161
总计		231626	100.000	25935			

图27 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6032401批-pH5.5介质-20min-片3
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$QTL-235 - 29-11/29-486-2 - zzp-6032401p-rcqx-pH5.5jz-20min-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260327-FX278.lcb
样品瓶号: 1-31
进样体积: 10 μl
进样时间: 2026/03/27 18:39:24
处理时间(V2): 2026/03/28 16:08:49
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.345	26339	11.418	5979	2288	1.325	--
2	3.616	204351	88.582	19934	3081	1.441	12.173
总计		230690	100.000	25913			

图28 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6032401批-pH5.5介质-20min-片4
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$QTL-235 - 29-11/29-487-2 - zzp-6032401p-rcqx-pH5.5jz-20min-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260327-FX278.lcb
样品瓶号: 1-40
进样体积: 10 μl
进样时间: 2026/03/27 18:44:47
处理时间(V2): 2026/03/28 16:08:52
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.346	26313	11.498	5904	2257	1.329	--
2	3.617	202536	88.502	19774	3082	1.438	12.150
总计		228849	100.000	25679			

图29 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6032401批-pH5.5介质-20min-片5
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$QTL-235 - 29-11/29-488-2 - zzp-6032401p-rcqx-pH5.5jz-20min-P6.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx278.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260327-FX278.lcb

样品瓶号: 1-49

进样体积: 10 μl

进样时间: 2026/03/27 18:50:09

处理时间(V2): 2026/03/28 16:08:54

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流 速: 1.5ml/min


波 长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.346	26659	11.535	6036	2281	1.329	--
2	3.618	204466	88.465	19927	3087	1.442	12.177
总计		231125	100.000	25963			

图30 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6032401批-pH5.5介质-20min-片6
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$QTL-235 - 29-11/29-489-2 - zzp-6032401p-rcqx-pH5.5jz-30min-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260327-FX278.lcb
样品瓶号: 1-5
进样体积: 10 μl
进样时间: 2026/03/27 18:55:31
处理时间(V2): 2026/03/28 16:08:57
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.345	28707	11.555	6494	2282	1.314	--
2	3.615	219725	88.445	21414	3068	1.458	12.145
总计		248433	100.000	27908			

图31 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6032401批-pH5.5介质-30min-片1
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$QTL-235 - 29-11/29-490-2 - zzp-6032401p-rcqx-pH5.5jz-30min-P2.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx278.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260327-FX278.lcb

样品瓶号: 1-14

进样体积: 10 μl

进样时间: 2026/03/27 19:00:53

处理时间(V2): 2026/03/28 16:08:59

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流 速: 1.5ml/min


波 长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.345	29594	11.622	6685	2295	1.335	--
2	3.614	225032	88.378	21937	3081	1.464	12.172
总计		254626	100.000	28622			

图32 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6032401批-pH5.5介质-30min-片2
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$QTL-235 - 29-11/29-491-2 - zzp-6032401p-rcqx-pH5.5jz-30min-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260327-FX278.lcb
样品瓶号: 1-23
进样体积: 10 μl
进样时间: 2026/03/27 19:06:15
处理时间(V2): 2026/03/28 16:09:02
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.346	28739	11.414	6486	2273	1.316	--
2	3.616	223046	88.586	21679	3060	1.461	12.128
总计		251784	100.000	28165			

图33 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6032401批-pH5.5介质-30min-片3
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$QTL-235 - 29-11/29-492-2 - zzp-6032401p-rcqx-pH5.5jz-30min-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260327-FX278.lcb
样品瓶号: 1-32
进样体积: 10 μl
进样时间: 2026/03/27 19:11:38
处理时间(V2): 2026/03/28 16:09:04
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.345	29076	11.585	6586	2282	1.320	--
2	3.615	221893	88.415	21618	3058	1.458	12.134
总计		250969	100.000	28204			

图34 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6032401批-pH5.5介质-30min-片4
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$QTL-235 - 29-11/29-493-2 - zzp-6032401p-rcqx-pH5.5jz-30min-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260327-FX278.lcb
样品瓶号: 1-41
进样体积: 10 μl
进样时间: 2026/03/27 19:17:00
处理时间(V2): 2026/03/28 16:09:07
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.346	28816	11.521	6526	2277	1.319	--
2	3.615	221311	88.479	21506	3048	1.460	12.111
总计		250127	100.000	28032			

图35 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6032401批-pH5.5介质-30min-片5
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$QTL-235 - 29-11/29-494-2 - zzp-6032401p-rcqx-pH5.5jz-30min-P6.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx278.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260327-FX278.lcb

样品瓶号: 1-50

进样体积: 10 μl

进样时间: 2026/03/27 19:22:22

处理时间(V2): 2026/03/28 16:09:09

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流 速: 1.5ml/min


波 长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.346	29652	11.701	6687	2273	1.326	--
2	3.615	223760	88.299	21754	3052	1.461	12.115
总计		253412	100.000	28440			

图36 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6032401批-pH5.5介质-30min-片6
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$QTL-235 - 29-11/29-495-2 - zzp-6032401p-rcqx-pH5.5jz-45min-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260327-FX278.lcb
样品瓶号: 1-6
进样体积: 10 μl
进样时间: 2026/03/27 19:27:44
处理时间(V2): 2026/03/28 16:09:12
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.345	30533	11.521	6896	2268	1.343	--
2	3.614	234477	88.479	22850	3046	1.472	12.101
总计		265010	100.000	29746			

图37 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6032401批-pH5.5介质-45min-片1
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$QTL-235 - 29-11/29-496-2 - zzp-6032401p-rcqx-pH5.5jz-45min-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260327-FX278.lcb
样品瓶号: 1-15
进样体积: 10 μl
进样时间: 2026/03/27 19:33:06
处理时间(V2): 2026/03/28 16:09:15
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.346	31165	11.530	7030	2265	1.336	--
2	3.614	239124	88.470	23209	3032	1.477	12.076
总计		270289	100.000	30239			

图38 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6032401批-pH5.5介质-45min-片2
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$QTL-235 - 29-11/29-497-2 - zzp-6032401p-rcqx-pH5.5jz-45min-P3.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx278.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260327-FX278.lcb

样品瓶号: 1-24

进样体积: 10 μl

进样时间: 2026/03/27 19:38:28

处理时间(V2): 2026/03/28 16:09:17

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流 速: 1.5ml/min


波 长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.346	30190	11.280	6879	2303	1.316	--
2	3.615	237442	88.720	23002	3025	1.475	12.099
总计		267632	100.000	29881			

图39 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6032401批-pH5.5介质-45min-片3
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$QTL-235 - 29-11/29-498-2 - zzp-6032401p-rcqx-pH5.5jz-45min-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260327-FX278.lcb
样品瓶号: 1-33
进样体积: 10 μl
进样时间: 2026/03/27 19:43:50
处理时间(V2): 2026/03/28 16:09:20
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.346	30765	11.523	6964	2266	1.329	--
2	3.615	236212	88.477	22890	3026	1.480	12.072
总计		266977	100.000	29854			

图40 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6032401批-pH5.5介质-45min-片4
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$QTL-235 - 29-11/29-499-2 - zzp-6032401p-rcqx-pH5.5jz-45min-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260327-FX278.lcb
样品瓶号: 1-42
进样体积: 10 μl
进样时间: 2026/03/27 19:49:11
处理时间(V2): 2026/03/28 16:09:22
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.347	30843	11.536	6959	2261	1.318	--
2	3.616	236513	88.464	22920	3028	1.469	12.068
总计		267355	100.000	29879			

图41 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6032401批-pH5.5介质-45min-片5
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$QTL-235 - 29-11/29-500-2 - zzp-6032401p-rcqx-pH5.5jz-45min-P6.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx278.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260327-FX278.lcb

样品瓶号: 1-51

进样体积: 10 μl

进样时间: 2026/03/27 19:54:33

处理时间(V2): 2026/03/28 16:09:25

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流 速: 1.5ml/min


波 长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.346	30710	11.549	7002	2300	1.339	--
2	3.616	235201	88.451	22884	3083	1.482	12.178
总计		265912	100.000	29886			

图42 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6032401批-pH5.5介质-45min-片6
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$QTL-235 - 29-11/29-501-2 - zzp-6032401p-rcqx-pH5.5jz-60min-P1.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx278.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260327-FX278.lcb

样品瓶号: 1-7

进样体积: 10 μl

进样时间: 2026/03/27 19:59:56

处理时间(V2): 2026/03/28 16:09:27

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流 速: 1.5ml/min


波 长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.346	31349	11.473	7074	2268	1.324	--
2	3.615	241895	88.527	23500	3039	1.474	12.092
总计		273244	100.000	30574			

图43 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6032401批-pH5.5介质-60min-片1
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$QTL-235 - 29-11/29-502-2 - zzp-6032401p-rcqx-pH5.5jz-60min-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260327-FX278.lcb
样品瓶号: 1-16
进样体积: 10 μl
进样时间: 2026/03/27 20:05:18
处理时间(V2): 2026/03/28 16:09:30
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.346	31845	11.399	7241	2287	1.326	--
2	3.613	247534	88.601	23994	3027	1.481	12.084
总计		279380	100.000	31235			

图44 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6032401批-pH5.5介质-60min-片2
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$QTL-235 - 29-11/29-503-2 - zzp-6032401p-rcqx-pH5.5jz-60min-P3.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx278.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260327-FX278.lcb

样品瓶号: 1-25

进样体积: 10 μl

进样时间: 2026/03/27 20:10:40

处理时间(V2): 2026/03/28 16:09:33

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流 速: 1.5ml/min


波 长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.345	31499	11.380	7085	2274	1.334	--
2	3.615	245289	88.620	23835	3049	1.479	12.111
总计		276788	100.000	30920			

图45 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6032401批-pH5.5介质-60min-片3
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$QTL-235 - 29-11/29-504-2 - zzp-6032401p-rcqx-pH5.5jz-60min-P4.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx278.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260327-FX278.lcb

样品瓶号: 1-34

进样体积: 10 μl

进样时间: 2026/03/27 20:16:03

处理时间(V2): 2026/03/28 16:09:35

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流 速: 1.5ml/min


波 长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.345	31874	11.571	7139	2254	1.339	--
2	3.615	243584	88.429	23607	3027	1.492	12.068
总计		275458	100.000	30746			

图46 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6032401批-pH5.5介质-60min-片4
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$QTL-235 - 29-11/29-505-2 - zzp-6032401p-rcqx-pH5.5jz-60min-P5.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx278.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260327-FX278.lcb

样品瓶号: 1-43

进样体积: 10 μl

进样时间: 2026/03/27 20:21:25

处理时间(V2): 2026/03/28 16:09:38

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流 速: 1.5ml/min


波 长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.346	31365	11.316	7134	2287	1.318	--
2	3.615	245811	88.684	23784	3022	1.490	12.078
总计		277176	100.000	30918			

图47 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6032401批-pH5.5介质-60min-片5
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$QTL-235 - 29-11/29-506-2 - zzp-6032401p-rcqx-pH5.5jz-60min-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260327-FX278.lcb
样品瓶号: 1-52
进样体积: 10 μl
进样时间: 2026/03/27 20:26:47
处理时间(V2): 2026/03/28 16:09:40
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.346	31778	11.502	7192	2280	1.338	--
2	3.616	244512	88.498	23685	3032	1.480	12.091
总计		276290	100.000	30877			

图48 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6032401批-pH5.5介质-60min-片6
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$QTL-235 - 29-11/29-507-2 - zzp-6032401p-rcqx-pH5.5jz-JX-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260327-FX278.lcb
样品瓶号: 1-8
进样体积: 10 μl
进样时间: 2026/03/27 20:32:09
处理时间(V2): 2026/03/28 16:09:43
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.345	31946	11.400	7187	2266	1.327	--
2	3.614	248274	88.600	24032	3034	1.489	12.085
总计		280219	100.000	31219			

图49 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6032401批-pH5.5介质-极限转速-片1
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$QTL-235 - 29-11/29-508-2 - zzp-6032401p-rcqx-pH5.5jz-JX-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260327-FX278.lcb
样品瓶号: 1-17
进样体积: 10 μl
进样时间: 2026/03/27 20:37:33
处理时间(V2): 2026/03/28 16:09:45
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.346	32803	11.453	7390	2272	1.340	--
2	3.614	253598	88.547	24540	3016	1.492	12.060
总计		286400	100.000	31929			

图50 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6032401批-pH5.5介质-极限转速-片2
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$QTL-235 - 29-11/29-509-2 - zzp-6032401p-rcqx-pH5.5jz-JX-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260327-FX278.lcb
样品瓶号: 1-26
进样体积: 10 μl
进样时间: 2026/03/27 20:42:55
处理时间(V2): 2026/03/28 16:09:48
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.346	32117	11.293	7228	2280	1.327	--
2	3.614	252293	88.707	24334	3023	1.494	12.072
总计		284411	100.000	31562			

图51 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6032401批-pH5.5介质-极限转速-片3
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$QTL-235 - 29-11/29-510-2 - zzp-6032401p-rcqx-pH5.5jz-JX-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260327-FX278.lcb
样品瓶号: 1-35
进样体积: 10 μl
进样时间: 2026/03/27 20:48:18
处理时间(V2): 2026/03/28 16:09:51
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.346	32303	11.451	7293	2272	1.332	--
2	3.614	249797	88.549	24169	3015	1.493	12.058
总计		282100	100.000	31462			

图52 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6032401批-pH5.5介质-极限转速-片4
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$QTL-235 - 29-11/29-511-2 - zzp-6032401p-rcqx-pH5.5jz-JX-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260327-FX278.lcb
样品瓶号: 1-44
进样体积: 10 μl
进样时间: 2026/03/27 20:53:41
处理时间(V2): 2026/03/28 16:09:53
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.346	32506	11.360	7366	2293	1.340	--
2	3.614	253644	88.640	24558	3027	1.496	12.091
总计		286150	100.000	31924			

图53 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6032401批-pH5.5介质-极限转速-片5
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$QTL-235 - 29-11/29-512-2 - zzp-6032401p-rcqx-pH5.5jz-JX-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260327-FX278.lcb
样品瓶号: 1-53
进样体积: 10 μl
进样时间: 2026/03/27 20:59:02
处理时间(V2): 2026/03/28 16:09:56
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.346	32183	11.405	7288	2283	1.326	--
2	3.614	250003	88.595	24218	3031	1.486	12.092
总计		282186	100.000	31506			

图54 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6032401批-pH5.5介质-极限转速-片6
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$QTL-235 - 29-11/29-513-2 - zzp-6032401p-rcqx-pH5.5jz-dz-2-1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260327-FX278.lcb
样品瓶号: 1-27
进样体积: 10 μl
进样时间: 2026/03/27 21:04:25
处理时间(V2): 2026/03/28 16:09:58
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.333	32271	11.531	6659	1853	1.306	--
2	3.626	247604	88.469	24625	3268	1.511	12.145
总计		279875	100.000	31284			

图55 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6032401批-pH5.5介质
对照品溶液-2-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$QTL-235 - 29-11/29-514-2 - zzp-6032401p-rcqx-pH5.5jz-dz-2-2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260327-FX278.lcb
样品瓶号: 1-27
进样体积: 10 μl
进样时间: 2026/03/27 21:09:49
处理时间(V2): 2026/03/28 16:10:01
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.334	32067	11.421	6670	1877	1.304	--
2	3.623	248706	88.579	24745	3271	1.515	12.161
总计		280773	100.000	31415			

图56 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6032401批-pH5.5介质
对照品溶液-2-2




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$QTL-235 - 29-11/29-515-2 - zzp-6032402p-rcqx-pH5.5jz-rj.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260327-FX278.lcb
样品瓶号: 2-9
进样体积: 10 μl
进样时间: 2026/03/27 21:15:12
处理时间(V2): 2026/03/28 16:10:03
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图57 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6032402批-pH5.5介质
溶剂




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$QTL-235 - 29-11/29-516-2 - zzp-6032402p-rcqx-pH5.5jz-dz-1-1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260327-FX278.lcb
样品瓶号: 2-18
进样体积: 10 μl
进样时间: 2026/03/27 21:20:38
处理时间(V2): 2026/03/28 16:10:06
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.333	32151	11.357	6683	1868	1.327	--
2	3.626	250943	88.643	24991	3258	1.511	12.147
总计		283093	100.000	31675			

图58 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6032402批-pH5.5介质
对照品溶液-1-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$QTL-235 - 29-11/29-517-2 - zzp-6032402p-rcqx-pH5.5jz-dz-1-2.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx278.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260327-FX278.lcb

样品瓶号: 2-18

进样体积: 10 μl

进样时间: 2026/03/27 21:26:01

处理时间(V2): 2026/03/28 16:10:08

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流 速: 1.5ml/min


波 长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.333	32245	11.311	6770	1886	1.307	--
2	3.621	252841	88.689	25234	3268	1.516	12.168
总计		285086	100.000	32004			

图59 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6032402批-pH5.5介质
对照品溶液-1-2




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$QTL-235 - 29-11/29-518-2 - zzp-6032402p-rcqx-pH5.5jz-dz-1-3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260327-FX278.lcb
样品瓶号: 2-18
进样体积: 10 μl
进样时间: 2026/03/27 21:31:25
处理时间(V2): 2026/03/28 16:10:11
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.333	32648	11.456	6802	1870	1.314	--
2	3.621	252336	88.544	25220	3274	1.513	12.158
总计		284984	100.000	32022			

图60 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6032402批-pH5.5介质
对照品溶液-1-3




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$QTL-235 - 29-11/29-519-2 - zzp-6032402p-rcqx-pH5.5jz-dz-1-4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260327-FX278.lcb
样品瓶号: 2-18
进样体积: 10 μl
进样时间: 2026/03/27 21:36:50
处理时间(V2): 2026/03/28 16:10:13
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.333	32238	11.355	6698	1871	1.324	--
2	3.622	251684	88.645	25123	3264	1.511	12.147
总计		283922	100.000	31821			

图61 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6032402批-pH5.5介质
对照品溶液-1-4



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$QTL-235 - 29-11/29-520-2 - zzp-6032402p-rcqx-pH5.5jz-dz-1-5.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx278.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260327-FX278.lcb

样品瓶号: 2-18

进样体积: 10 μl

进样时间: 2026/03/27 21:42:14

处理时间(V2): 2026/03/28 16:10:16

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流速: 1.5ml/min


波长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.333	32810	11.524	6811	1881	1.310	--
2	3.621	251911	88.476	25184	3272	1.516	12.168
总计		284721	100.000	31995			

图62 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6032402批-pH5.5介质
对照品溶液-1-5



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$QTL-235 - 29-11/29-521-2 - zzp-6032402p-rcqx-pH5.5jz-5min-P1.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx278.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260327-FX278.lcb

样品瓶号: 2-1

进样体积: 10 μl

进样时间: 2026/03/27 21:47:37

处理时间(V2): 2026/03/28 16:10:19

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流 速: 1.5ml/min


波 长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.346	9261	9.130	2150	2287	1.237	--
2	3.644	92181	90.870	9135	3217	1.319	12.436
总计		101442	100.000	11285			

图63 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6032402批-pH5.5介质-5min-片1
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$QTL-235 - 29-11/29-522-2 - zzp-6032402p-rcqx-pH5.5jz-5min-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260327-FX278.lcb
样品瓶号: 2-10
进样体积: 10 μl
进样时间: 2026/03/27 21:53:00
处理时间(V2): 2026/03/28 16:10:22
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.345	9767	9.369	2216	2308	1.330	--
2	3.642	94480	90.631	9332	3224	1.329	12.463
总计		104248	100.000	11548			

图64 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6032402批-pH5.5介质-5min-片2
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$QTL-235 - 29-11/29-523-2 - zzp-6032402p-rcqx-pH5.5jz-5min-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260327-FX278.lcb
样品瓶号: 2-19
进样体积: 10 μl
进样时间: 2026/03/27 21:58:23
处理时间(V2): 2026/03/28 16:10:24
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.346	9510	9.432	2132	2282	1.330	--
2	3.642	91318	90.568	9057	3246	1.336	12.467
总计		100828	100.000	11189			

图65 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6032402批-pH5.5介质-5min-片3
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$QTL-235 - 29-11/29-524-2 - zzp-6032402p-rcqx-pH5.5jz-5min-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260327-FX278.lcb
样品瓶号: 2-28
进样体积: 10 μl
进样时间: 2026/03/27 22:03:44
处理时间(V2): 2026/03/28 16:10:27
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.346	10622	9.453	2385	2269	1.315	--
2	3.642	101746	90.547	10062	3207	1.339	12.402
总计		112368	100.000	12447			

图66 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6032402批-pH5.5介质-5min-片4
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$QTL-235 - 29-11/29-525-2 - zzp-6032402p-rcqx-pH5.5jz-5min-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260327-FX278.lcb
样品瓶号: 2-37
进样体积: 10 μl
进样时间: 2026/03/27 22:09:07
处理时间(V2): 2026/03/28 16:10:30
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.345	10223	9.503	2298	2246	1.334	--
2	3.642	97355	90.497	9669	3226	1.326	12.415
总计		107578	100.000	11967			

图67 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6032402批-pH5.5介质-5min-片5
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$QTL-235 - 29-11/29-526-2 - zzp-6032402p-rcqx-pH5.5jz-5min-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260327-FX278.lcb
样品瓶号: 2-46
进样体积: 10 μl
进样时间: 2026/03/27 22:14:31
处理时间(V2): 2026/03/28 16:10:32
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.346	8767	9.311	1992	2290	1.343	--
2	3.645	85391	90.689	8420	3203	1.327	12.423
总计		94157	100.000	10412			

图68 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6032402批-pH5.5介质-5min-片6
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$QTL-235 - 29-11/29-527-2 - zzp-6032402p-rcqx-pH5.5jz-10min-P1.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx278.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260327-FX278.lcb

样品瓶号: 2-2

进样体积: 10 μl

进样时间: 2026/03/27 22:19:54

处理时间(V2): 2026/03/28 16:10:35

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流 速: 1.5ml/min


波 长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.347	20654	10.677	4689	2273	1.319	--
2	3.630	172785	89.323	16931	3130	1.408	12.259
总计		193439	100.000	21620			

图69 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6032402批-pH5.5介质-10min-片1
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$QTL-235 - 29-11/29-528-2 - zzp-6032402p-rcqx-pH5.5jz-10min-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260327-FX278.lcb
样品瓶号: 2-11
进样体积: 10 μl
进样时间: 2026/03/27 22:25:17
处理时间(V2): 2026/03/28 16:10:37
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.346	20442	10.696	4630	2285	1.317	--
2	3.630	170680	89.304	16680	3122	1.414	12.260
总计		191122	100.000	21310			

图70 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6032402批-pH5.5介质-10min-片2
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$QTL-235 - 29-11/29-529-2 - zzp-6032402p-rcqx-pH5.5jz-10min-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260327-FX278.lcb
样品瓶号: 2-20
进样体积: 10 μl
进样时间: 2026/03/27 22:30:42
处理时间(V2): 2026/03/28 16:10:40
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.346	20015	10.599	4539	2268	1.307	--
2	3.630	168829	89.401	16564	3139	1.408	12.272
总计		188844	100.000	21103			

图71 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6032402批-pH5.5介质-10min-片3
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$QTL-235 - 29-11/29-530-2 - zzp-6032402p-rcqx-pH5.5jz-10min-P4.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx278.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260327-FX278.lcb

样品瓶号: 2-29

进样体积: 10 μl

进样时间: 2026/03/27 22:36:05

处理时间(V2): 2026/03/28 16:10:43

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流 速: 1.5ml/min


波 长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.347	19961	10.509	4516	2272	1.321	--
2	3.631	169986	89.491	16601	3129	1.424	12.261
总计		189947	100.000	21117			

图72 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6032402批-pH5.5介质-10min-片4
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$QTL-235 - 29-11/29-531-2 - zzp-6032402p-rcqx-pH5.5jz-10min-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260327-FX278.lcb
样品瓶号: 2-38
进样体积: 10 μl
进样时间: 2026/03/27 22:41:27
处理时间(V2): 2026/03/28 16:10:45
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.347	20345	10.673	4593	2273	1.331	--
2	3.631	170275	89.327	16696	3135	1.413	12.270
总计		190620	100.000	21289			

图73 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6032402批-pH5.5介质-10min-片5
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$QTL-235 - 29-11/29-532-2 - zzp-6032402p-rcqx-pH5.5jz-10min-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260327-FX278.lcb
样品瓶号: 2-47
进样体积: 10 μl
进样时间: 2026/03/27 22:46:51
处理时间(V2): 2026/03/28 16:10:48
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.346	19994	10.654	4521	2271	1.312	--
2	3.632	167677	89.346	16367	3133	1.410	12.268
总计		187671	100.000	20887			

图74 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6032402批-pH5.5介质-10min-片6
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$QTL-235 - 29-11/29-533-2 - zzp-6032402p-rcqx-pH5.5jz-15min-P1.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx278.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260327-FX278.lcb

样品瓶号: 2-3

进样体积: 10 μl

进样时间: 2026/03/27 22:52:14

处理时间(V2): 2026/03/28 16:10:50

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流 速: 1.5ml/min


波 长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.347	24899	11.162	5650	2267	1.316	--
2	3.626	198178	88.838	19316	3090	1.443	12.187
总计		223078	100.000	24966			

图75 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6032402批-pH5.5介质-15min-片1
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$QTL-235 - 29-11/29-534-2 - zzp-6032402p-rcqx-pH5.5jz-15min-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260327-FX278.lcb
样品瓶号: 2-12
进样体积: 10 μl
进样时间: 2026/03/27 22:57:38
处理时间(V2): 2026/03/28 16:10:52
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.347	24643	11.290	5536	2263	1.331	--
2	3.628	193619	88.710	18857	3094	1.433	12.195
总计		218261	100.000	24393			

图76 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6032402批-pH5.5介质-15min-片2
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$QTL-235 - 29-11/29-535-2 - zzp-6032402p-rcqx-pH5.5jz-15min-P3.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx278.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260327-FX278.lcb

样品瓶号: 2-21

进样体积: 10 μl

进样时间: 2026/03/27 23:03:02

处理时间(V2): 2026/03/28 16:10:55

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流 速: 1.5ml/min


波 长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.346	24333	11.110	5528	2303	1.325	--
2	3.626	194684	88.890	19007	3108	1.441	12.248
总计		219017	100.000	24536			

图77 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6032402批-pH5.5介质-15min-片3
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$QTL-235 - 29-11/29-536-2 - zzp-6032402p-rcqx-pH5.5jz-15min-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260327-FX278.lcb
样品瓶号: 2-30
进样体积: 10 μl
进样时间: 2026/03/27 23:08:25
处理时间(V2): 2026/03/28 16:10:58
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.347	24316	11.095	5492	2283	1.333	--
2	3.628	194835	88.905	19019	3105	1.437	12.225
总计		219150	100.000	24511			

图78 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6032402批-pH5.5介质-15min-片4
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$QTL-235 - 29-11/29-537-2 - zzp-6032402p-rcqx-pH5.5jz-15min-P5.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx278.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260327-FX278.lcb

样品瓶号: 2-39

进样体积: 10 μl

进样时间: 2026/03/27 23:13:48

处理时间(V2): 2026/03/28 16:11:00

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流 速: 1.5ml/min


波 长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.346	24256	11.118	5477	2283	1.335	--
2	3.628	193906	88.882	18878	3107	1.441	12.231
总计		218162	100.000	24354			

图79 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6032402批-pH5.5介质-15min-片5
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$QTL-235 - 29-11/29-538-2 - zzp-6032402p-rcqx-pH5.5jz-15min-P6.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx278.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260327-FX278.lcb

样品瓶号: 2-48

进样体积: 10 μl

进样时间: 2026/03/27 23:19:11

处理时间(V2): 2026/03/28 16:11:03

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流速: 1.5ml/min


波长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.346	24422	11.186	5526	2271	1.333	--
2	3.628	193899	88.814	18848	3101	1.437	12.214
总计		218321	100.000	24373			

图80 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6032402批-pH5.5介质-15min-片6
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$QTL-235 - 29-11/29-539-2 - zzp-6032402p-rcqx-pH5.5jz-20min-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260327-FX278.lcb
样品瓶号: 2-4
进样体积: 10 μl
进样时间: 2026/03/27 23:24:35
处理时间(V2): 2026/03/28 16:11:05
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.346	27049	11.452	6147	2288	1.322	--
2	3.625	209140	88.548	20368	3101	1.462	12.220
总计		236189	100.000	26515			

图81 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6032402批-pH5.5介质-20min-片1
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$QTL-235 - 29-11/29-540-2 - zzp-6032402p-rcqx-pH5.5jz-20min-P2.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx278.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260327-FX278.lcb

样品瓶号: 2-13

进样体积: 10 μl

进样时间: 2026/03/27 23:29:58

处理时间(V2): 2026/03/28 16:11:08

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流 速: 1.5ml/min


波 长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.347	26426	11.356	5984	2273	1.309	--
2	3.626	206286	88.644	19992	3070	1.449	12.165
总计		232713	100.000	25976			

图82 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6032402批-pH5.5介质-20min-片2
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$QTL-235 - 29-11/29-541-2 - zzp-6032402p-rcqx-pH5.5jz-20min-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260327-FX278.lcb
样品瓶号: 2-22
进样体积: 10 μl
进样时间: 2026/03/27 23:35:22
处理时间(V2): 2026/03/28 16:11:11
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.347	26619	11.421	6001	2272	1.332	--
2	3.626	206459	88.579	20046	3084	1.453	12.181
总计		233079	100.000	26047			

图83 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6032402批-pH5.5介质-20min-片3
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$QTL-235 - 29-11/29-542-2 - zzp-6032402p-rcqx-pH5.5jz-20min-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260327-FX278.lcb
样品瓶号: 2-31
进样体积: 10 μl
进样时间: 2026/03/27 23:40:46
处理时间(V2): 2026/03/28 16:11:13
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.346	26308	11.262	5966	2284	1.339	--
2	3.625	207287	88.738	20150	3090	1.463	12.205
总计		233595	100.000	26116			

图84 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6032402批-pH5.5介质-20min-片4
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$QTL-235 - 29-11/29-543-2 - zzp-6032402p-rcqx-pH5.5jz-20min-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260327-FX278.lcb
样品瓶号: 2-40
进样体积: 10 μl
进样时间: 2026/03/27 23:46:08
处理时间(V2): 2026/03/28 16:11:16
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.346	26001	11.275	5900	2266	1.317	--
2	3.626	204606	88.725	19909	3073	1.451	12.168
总计		230608	100.000	25809			

图85 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6032402批-pH5.5介质-20min-片5
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$QTL-235 - 29-11/29-544-2 - zzp-6032402p-rcqx-pH5.5jz-20min-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260327-FX278.lcb
样品瓶号: 2-49
进样体积: 10 μl
进样时间: 2026/03/27 23:51:32
处理时间(V2): 2026/03/28 16:11:18
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.346	27129	11.433	6138	2264	1.312	--
2	3.625	210161	88.567	20369	3069	1.454	12.158
总计		237290	100.000	26508			

图86 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6032402批-pH5.5介质-20min-片6
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$QTL-235 - 29-11/29-545-2 - zzp-6032402p-rcqx-pH5.5jz-30min-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260327-FX278.lcb
样品瓶号: 2-5
进样体积: 10 μl
进样时间: 2026/03/27 23:56:56
处理时间(V2): 2026/03/28 16:11:21
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.346	29341	11.592	6617	2276	1.343	--
2	3.621	223767	88.408	21747	3054	1.453	12.136
总计		253108	100.000	28363			

图87 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6032402批-pH5.5介质-30min-片1
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$QTL-235 - 29-11/29-546-2 - zzp-6032402p-rcqx-pH5.5jz-30min-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260327-FX278.lcb
样品瓶号: 2-14
进样体积: 10 μl
进样时间: 2026/03/28 00:02:20
处理时间(V2): 2026/03/28 16:11:23
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.346	28823	11.567	6490	2271	1.333	--
2	3.624	220356	88.433	21332	3052	1.473	12.136
总计		249179	100.000	27822			

图88 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6032402批-pH5.5介质-30min-片2
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$QTL-235 - 29-11/29-547-2 - zzp-6032402p-rcqx-pH5.5jz-30min-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260327-FX278.lcb
样品瓶号: 2-23
进样体积: 10 μl
进样时间: 2026/03/28 00:07:42
处理时间(V2): 2026/03/28 16:11:26
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.346	28988	11.595	6523	2277	1.328	--
2	3.622	221014	88.405	21453	3052	1.464	12.141
总计		250002	100.000	27976			

图89 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6032402批-pH5.5介质-30min-片3
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$QTL-235 - 29-11/29-548-2 - zzp-6032402p-rcqx-pH5.5jz-30min-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260327-FX278.lcb
样品瓶号: 2-32
进样体积: 10 μl
进样时间: 2026/03/28 00:13:07
处理时间(V2): 2026/03/28 16:11:29
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.346	28720	11.505	6477	2275	1.323	--
2	3.624	220906	88.495	21413	3062	1.466	12.153
总计		249626	100.000	27890			

图90 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6032402批-pH5.5介质-30min-片4
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$QTL-235 - 29-11/29-549-2 - zzp-6032402p-rcqx-pH5.5jz-30min-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260327-FX278.lcb
样品瓶号: 2-41
进样体积: 10 μl
进样时间: 2026/03/28 00:18:30
处理时间(V2): 2026/03/28 16:11:32
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.346	28466	11.510	6436	2267	1.329	--
2	3.624	218838	88.490	21241	3056	1.466	12.140
总计		247303	100.000	27677			

图91 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6032402批-pH5.5介质-30min-片5
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$QTL-235 - 29-11/29-550-2 - zzp-6032402p-rcqx-pH5.5jz-30min-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260327-FX278.lcb
样品瓶号: 2-50
进样体积: 10 μl
进样时间: 2026/03/28 00:23:53
处理时间(V2): 2026/03/28 16:11:35
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.345	29137	11.646	6572	2272	1.339	--
2	3.623	221044	88.354	21457	3059	1.459	12.149
总计		250181	100.000	28029			

图92 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6032402批-pH5.5介质-30min-片6
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$QTL-235 - 29-11/29-551-2 - zzp-6032402p-rcqx-pH5.5jz-45min-P1.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx278.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260327-FX278.lcb

样品瓶号: 2-6

进样体积: 10 μl

进样时间: 2026/03/28 00:29:17

处理时间(V2): 2026/03/28 16:11:37

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流 速: 1.5ml/min


波 长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.346	30929	11.598	6977	2272	1.321	--
2	3.621	235744	88.402	22842	3049	1.480	12.127
总计		266673	100.000	29819			

图93 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6032402批-pH5.5介质-45min-片1
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$QTL-235 - 29-11/29-552-2 - zzp-6032402p-rcqx-pH5.5jz-45min-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260327-FX278.lcb
样品瓶号: 2-15
进样体积: 10 μl
进样时间: 2026/03/28 00:34:41
处理时间(V2): 2026/03/28 16:11:40
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.346	30515	11.646	6856	2258	1.333	--
2	3.623	231508	88.354	22391	3036	1.486	12.099
总计		262023	100.000	29247			

图94 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6032402批-pH5.5介质-45min-片2
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$QTL-235 - 29-11/29-553-2 - zzp-6032402p-rcqx-pH5.5jz-45min-P3.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx278.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260327-FX278.lcb

样品瓶号: 2-24

进样体积: 10 μl

进样时间: 2026/03/28 00:40:05

处理时间(V2): 2026/03/28 16:11:42

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流速: 1.5ml/min


波长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.347	30548	11.591	6903	2273	1.324	--
2	3.622	233007	88.409	22569	3049	1.480	12.123
总计		263555	100.000	29472			

图95 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6032402批-pH5.5介质-45min-片3
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$QTL-235 - 29-11/29-554-2 - zzp-6032402p-rcqx-pH5.5jz-45min-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260327-FX278.lcb
样品瓶号: 2-33
进样体积: 10 μl
进样时间: 2026/03/28 00:45:28
处理时间(V2): 2026/03/28 16:11:45
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.347	30700	11.504	6969	2281	1.319	--
2	3.622	236171	88.496	22793	3034	1.480	12.107
总计		266870	100.000	29762			

图96 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6032402批-pH5.5介质-45min-片4
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$QTL-235 - 29-11/29-555-2 - zzp-6032402p-rcqx-pH5.5jz-45min-P5.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx278.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260327-FX278.lcb

样品瓶号: 2-42

进样体积: 10 μl

进样时间: 2026/03/28 00:50:51

处理时间(V2): 2026/03/28 16:11:48

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流 速: 1.5ml/min


波 长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.347	30137	11.517	6796	2267	1.341	--
2	3.624	231552	88.483	22350	3030	1.483	12.096
总计		261690	100.000	29146			

图97 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6032402批-pH5.5介质-45min-片5
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$QTL-235 - 29-11/29-556-2 - zzp-6032402p-rcqx-pH5.5jz-45min-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260327-FX278.lcb
样品瓶号: 2-51
进样体积: 10 μl
进样时间: 2026/03/28 00:56:15
处理时间(V2): 2026/03/28 16:11:50
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.347	30789	11.662	6971	2282	1.321	--
2	3.624	233227	88.338	22509	3039	1.477	12.121
总计		264017	100.000	29480			

图98 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6032402批-pH5.5介质-45min-片6
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$QTL-235 - 29-11/29-557-2 - zzp-6032402p-rcqx-pH5.5jz-60min-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260327-FX278.lcb
样品瓶号: 2-7
进样体积: 10 μl
进样时间: 2026/03/28 01:01:38
处理时间(V2): 2026/03/28 16:11:53
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.346	31377	11.431	7139	2302	1.322	--
2	3.621	243118	88.569	23540	3032	1.498	12.127
总计		274495	100.000	30680			

图99 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6032402批-pH5.5介质-60min-片1
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$QTL-235 - 29-11/29-558-2 - zzp-6032402p-rcqx-pH5.5jz-60min-P2.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx278.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260327-FX278.lcb

样品瓶号: 2-16

进样体积: 10 μl

进样时间: 2026/03/28 01:07:02

处理时间(V2): 2026/03/28 16:11:56

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流 速: 1.5ml/min


波 长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.346	31108	11.511	7045	2292	1.340	--
2	3.622	239145	88.489	23101	3046	1.488	12.140
总计		270253	100.000	30146			

图100 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6032402批-pH5.5介质-60min-片2
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$QTL-235 - 29-11/29-559-2 - zzp-6032402p-rcqx-pH5.5jz-60min-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260327-FX278.lcb
样品瓶号: 2-25
进样体积: 10 μl
进样时间: 2026/03/28 01:12:26
处理时间(V2): 2026/03/28 16:11:59
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.346	31167	11.457	7040	2281	1.333	--
2	3.622	240862	88.543	23226	3012	1.496	12.081
总计		272029	100.000	30265			

图101 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6032402批-pH5.5介质-60min-片3
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$QTL-235 - 29-11/29-560-2 - zzp-6032402p-rcqx-pH5.5jz-60min-P4.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx278.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260327-FX278.lcb

样品瓶号: 2-34

进样体积: 10 μl

进样时间: 2026/03/28 01:17:50

处理时间(V2): 2026/03/28 16:12:03

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流 速: 1.5ml/min


波 长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.346	31157	11.542	7050	2276	1.327	--
2	3.622	238785	88.458	23145	3044	1.484	12.125
总计		269941	100.000	30194			

图102 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6032402批-pH5.5介质-60min-片4
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$QTL-235 - 29-11/29-561-2 - zzp-6032402p-rcqx-pH5.5jz-60min-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260327-FX278.lcb
样品瓶号: 2-43
进样体积: 10 μl
进样时间: 2026/03/28 01:23:14
处理时间(V2): 2026/03/28 16:12:06
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.346	30803	11.460	6960	2288	1.313	--
2	3.622	237983	88.540	23059	3044	1.484	12.135
总计		268786	100.000	30019			

图103 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6032402批-pH5.5介质-60min-片5
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$QTL-235 - 29-11/29-562-2 - zzp-6032402p-rcqx-pH5.5jz-60min-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260327-FX278.lcb
样品瓶号: 2-52
进样体积: 10 μl
进样时间: 2026/03/28 01:28:38
处理时间(V2): 2026/03/28 16:12:08
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.347	31686	11.670	7148	2261	1.331	--
2	3.623	239828	88.330	23188	3040	1.489	12.102
总计		271514	100.000	30336			

图104 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6032402批-pH5.5介质-60min-片6
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$QTL-235 - 29-11/29-563-2 - zzp-6032402p-rcqx-pH5.5jz-JX-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260327-FX278.lcb
样品瓶号: 2-8
进样体积: 10 μl
进样时间: 2026/03/28 01:34:02
处理时间(V2): 2026/03/28 16:12:11
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.346	32171	11.494	7245	2264	1.326	--
2	3.620	247717	88.506	23893	3018	1.494	12.070
总计		279887	100.000	31138			

图105 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6032402批-pH5.5介质-极限转速-片1
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$QTL-235 - 29-11/29-564-2 - zzp-6032402p-rcqx-pH5.5jz-JX-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260327-FX278.lcb
样品瓶号: 2-17
进样体积: 10 μl
进样时间: 2026/03/28 01:39:26
处理时间(V2): 2026/03/28 16:12:14
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.346	31646	11.563	7158	2281	1.337	--
2	3.622	242043	88.437	23495	3051	1.486	12.138
总计		273689	100.000	30653			

图106 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6032402批-pH5.5介质-极限转速-片2
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$QTL-235 - 29-11/29-565-2 - zzp-6032402p-rcqx-pH5.5jz-JX-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260327-FX278.lcb
样品瓶号: 2-26
进样体积: 10 μl
进样时间: 2026/03/28 01:44:50
处理时间(V2): 2026/03/28 16:12:17
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.347	31693	11.476	7166	2274	1.331	--
2	3.623	244472	88.524	23592	3025	1.494	12.092
总计		276165	100.000	30758			

图107 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6032402批-pH5.5介质-极限转速-片3
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$QTL-235 - 29-11/29-566-2 - zzp-6032402p-rcqx-pH5.5jz-JX-P4.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx278.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260327-FX278.lcb

样品瓶号: 2-35

进样体积: 10 μl

进样时间: 2026/03/28 01:50:14

处理时间(V2): 2026/03/28 16:12:20

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流速: 1.5ml/min


波长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.346	31519	11.492	7129	2283	1.336	--
2	3.621	242751	88.508	23497	3052	1.491	12.135
总计		274270	100.000	30626			

图108 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6032402批-pH5.5介质-极限转速-片4
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$QTL-235 - 29-11/29-567-2 - zzp-6032402p-rcqx-pH5.5jz-JX-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260327-FX278.lcb
样品瓶号: 2-44
进样体积: 10 μl
进样时间: 2026/03/28 01:55:38
处理时间(V2): 2026/03/28 16:12:23
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.346	31411	11.452	7083	2282	1.340	--
2	3.622	242873	88.548	23482	3036	1.486	12.117
总计		274285	100.000	30565			

图109 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6032402批-pH5.5介质-极限转速-片5
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$QTL-235 - 29-11/29-568-2 - zzp-6032402p-rcqx-pH5.5jz-JX-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260327-FX278.lcb
样品瓶号: 2-53
进样体积: 10 μl
进样时间: 2026/03/28 02:01:02
处理时间(V2): 2026/03/28 16:12:27
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.346	32055	11.604	7268	2275	1.316	--
2	3.622	244178	88.396	23567	3019	1.492	12.087
总计		276233	100.000	30835			

图110 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6032402批-pH5.5介质-极限转速-片6
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$QTL-235 - 29-11/29-569-2 - zzp-6032402p-rcqx-pH5.5jz-dz-2-1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260327-FX278.lcb
样品瓶号: 2-27
进样体积: 10 μl
进样时间: 2026/03/28 02:06:27
处理时间(V2): 2026/03/28 16:12:30
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.334	32364	11.529	6677	1874	1.319	--
2	3.632	248342	88.471	24707	3282	1.515	12.194
总计		280706	100.000	31384			

图111 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6032402批-pH5.5介质
对照品溶液-2-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$QTL-235 - 29-11/29-570-2 - zzp-6032402p-rcqx-pH5.5jz-dz-2-2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260327-FX278.lcb
样品瓶号: 2-27
进样体积: 10 μl
进样时间: 2026/03/28 02:11:52
处理时间(V2): 2026/03/28 16:12:33
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.334	32418	11.535	6717	1883	1.303	--
2	3.629	248616	88.465	24745	3270	1.521	12.185
总计		281034	100.000	31461			

图112 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6032402批-pH5.5介质
对照品溶液-2-2