



熊去氧胆酸口服混悬液项目信息

介质体积(ml)	900	取样体积(ml)	5	补液体积(ml)	5
对照品批号	110755-202306	对照品来源	原料	对照品使用方法	直接使用
对照品含量(%)	99.6	对照品水分(%)	0	对照品稀释倍数	50
标示量(mg)	250	供试品稀释倍数	1	系数	1

对照品溶液

序号	称样量(mg)	A ₁	A ₂	A ₃	A ₄	A ₅	A _{平均}	RSD%
1	14.00	55232	55301	55397	55058	55280	55254	0.23
2	14.02	55584	55650				55617	0.09

单位质量响应值		RSD%	判断
3946.71	3966.98	0.37	数据可信



操作者:
日期: 2026-07-30

复核者:
未审阅版本



供试品溶液-2025121551批-pH6.8

时间 (分钟)	样品	A ₁	A ₂	A _{平均}	溶出量(%)	平均(%)	RSD%	累计溶 出量(%)	平均(%)	RSD%
5min	1	19259	-	19259	34.904	38.51	9.16	34.90	38.50	9.16
	2	19264	-	19264	34.913			34.91		
	3	21071	-	21071	38.188			38.19		
	4	20893	-	20893	37.866			37.87		
	5	22884	-	22884	41.474			41.47		
	6	24109	-	24109	43.694			43.69		
10min	1	21605	-	21605	39.156	42.55	8.15	39.35	42.76	8.15
	2	21361	-	21361	38.714			38.91		
	3	23312	-	23312	42.250			42.46		
	4	23523	-	23523	42.632			42.84		
	5	24583	-	24583	44.553			44.78		
	6	26485	-	26485	48.000			48.24		
15min	1	23672	-	23672	42.902	46.42	7.21	43.31	46.87	7.22
	2	23717	-	23717	42.984			43.39		
	3	25276	-	25276	45.809			46.26		
	4	25816	-	25816	46.788			47.24		
	5	26690	-	26690	48.372			48.85		
	6	28501	-	28501	51.654			52.16		
20min	1	25634	-	25634	46.458	49.59	6.36	47.11	50.30	6.38
	2	25614	-	25614	46.422			47.07		
	3	27034	-	27034	48.995			49.70		
	4	27380	-	27380	49.623			50.33		
	5	28306	-	28306	51.301			52.05		
	6	30200	-	30200	54.733			55.53		
30min	1	27777	-	27777	50.342	53.42	5.54	51.25	54.40	5.57
	2	27911	-	27911	50.585			51.49		
	3	29374	-	29374	53.236			54.21		
	4	29424	-	29424	53.327			54.31		
	5	30135	-	30135	54.616			55.65		
	6	32215	-	32215	58.385			59.49		
45min	1	30874	-	30874	55.955	57.64	3.59	57.14	58.92	3.67
	2	30779	-	30779	55.783			56.97		
	3	31325	-	31325	56.772			58.04		
	4	31596	-	31596	57.263			58.54		
	5	32493	-	32493	58.889			60.22		
	6	33766	-	33766	61.196			62.62		
60min	1	32963	-	32963	59.741	61.23	2.68	61.24	62.83	2.77
	2	32868	-	32868	59.569			61.07		
	3	33605	-	33605	60.905			62.49		
	4	33799	-	33799	61.256			62.85		
	5	34134	-	34134	61.863			63.53		
	6	35336	-	35336	64.042			65.81		
极限	1	35629	-	35629	64.573	65.47	1.49	66.40	67.41	1.60
	2	35633	-	35633	64.580			66.41		
	3	36126	-	36126	65.473			67.40		
	4	35983	-	35983	65.214			67.15		
	5	36298	-	36298	65.785			67.79		
	6	37070	-	37070	67.184			69.30		



操作者:

日期: 2026-07-30

复核者:

未审阅版本



熊去氧胆酸口服混悬液项目信息

介质体积(ml)	900	取样体积(ml)	5	补液体积(ml)	5
对照品批号	110755-202306	对照品来源	原料	对照品使用方法	直接使用
对照品含量(%)	99.6	对照品水分(%)	0	对照品稀释倍数	50
标示量(mg)	250	供试品稀释倍数	1	系数	1

对照品溶液

序号	称样量(mg)	A ₁	A ₂	A ₃	A ₄	A ₅	A _{平均}	RSD%
1	14.00	55533	55546	55578	55580	55512	55550	0.06
2	14.02	55447	55508				55478	0.08
单位质量响应值			RSD%	判断				
3967.86			0.20	数据可信				



操作者:

日期: 2026-07-30

复核者:

未审阅版本



供试品溶液-2025121551批-pH6.8

时间 (分钟)	样品	A ₁	A ₂	A _{平均}	溶出量(%)	平均(%)	RSD%	累计溶 出量(%)	平均(%)	RSD%
5min	1	25270	-	25270	45.733	51.39	13.08	45.73	51.39	13.08
	2	25365	-	25365	45.905			45.91		
	3	26370	-	26370	47.724			47.72		
	4	29158	-	29158	52.770			52.77		
	5	29127	-	29127	52.714			52.71		
	6	35083	-	35083	63.493			63.49		
10min	1	27781	-	27781	50.278	56.34	10.26	50.53	56.63	10.28
	2	28335	-	28335	51.280			51.54		
	3	29836	-	29836	53.997			54.26		
	4	31794	-	31794	57.540			57.83		
	5	32673	-	32673	59.131			59.42		
	6	36373	-	36373	65.827			66.18		
15min	1	29645	-	29645	53.651	59.13	8.03	54.18	59.72	8.07
	2	30290	-	30290	54.818			55.36		
	3	31915	-	31915	57.759			58.32		
	4	33488	-	33488	60.606			61.22		
	5	33926	-	33926	61.399			62.02		
	6	36760	-	36760	66.528			67.25		
20min	1	30810	-	30810	55.760	61.04	7.04	56.59	61.97	7.09
	2	31390	-	31390	56.809			57.65		
	3	33126	-	33126	59.951			60.84		
	4	35082	-	35082	63.491			64.44		
	5	35024	-	35024	63.386			64.35		
	6	36940	-	36940	66.854			67.94		
30min	1	33232	-	33232	60.143	63.85	5.10	61.28	65.11	5.18
	2	33342	-	33342	60.342			61.50		
	3	34664	-	34664	62.735			63.95		
	4	36544	-	36544	66.137			67.44		
	5	36371	-	36371	65.824			67.14		
	6	37522	-	37522	67.907			69.37		
45min	1	34767	-	34767	62.921	66.12	4.19	64.40	67.74	4.28
	2	34809	-	34809	62.997			64.49		
	3	36232	-	36232	65.572			67.14		
	4	37515	-	37515	67.894			69.56		
	5	37425	-	37425	67.731			69.41		
	6	38471	-	38471	69.624			71.46		
60min	1	35463	-	35463	64.181	67.51	3.25	66.01	69.50	3.36
	2	36516	-	36516	66.086			67.93		
	3	36933	-	36933	66.841			68.77		
	4	38037	-	38037	68.839			70.89		
	5	38218	-	38218	69.166			71.22		
	6	38649	-	38649	69.947			72.17		
极限	1	37415	-	37415	67.713	68.94	1.44	69.89	71.31	1.60
	2	37470	-	37470	67.813			70.03		
	3	38100	-	38100	68.953			71.26		
	4	38651	-	38651	69.950			72.38		
	5	38305	-	38305	69.324			71.76		
	6	38627	-	38627	69.907			72.52		



操作者:

日期: 2026-07-30

复核者:

未审阅版本



熊去氧胆酸口服混悬液项目信息

介质体积(ml)	900	取样体积(ml)	5	补液体积(ml)	5
对照品批号	110755-202306	对照品来源	原料	对照品使用方法	直接使用
对照品含量(%)	99.6	对照品水分(%)	0	对照品稀释倍数	50
标示量(mg)	250	供试品稀释倍数	1	系数	1

对照品溶液

序号	称样量(mg)	A ₁	A ₂	A ₃	A ₄	A ₅	A _{平均}	RSD%
1	14.00	55686	55702	55676	55575	55622	55652	0.10
2	14.02	55719	55859				55789	0.18
单位质量响应值			RSD%		判断			
3975.14			3979.24		0.08 数据可信			



操作者:

日期: 2026-07-30

复核者:

未审阅版本



供试品溶液-2025121651批-pH6.8

时间 (分钟)	样品	A ₁	A ₂	A _{平均}	溶出量(%)	平均(%)	RSD%	累计溶 出量(%)	平均(%)	RSD%
5min	1	19237	-	19237	34.686	39.32	10.55	34.69	39.32	10.54
	2	19742	-	19742	35.596			35.60		
	3	20890	-	20890	37.666			37.67		
	4	22803	-	22803	41.116			41.12		
	5	22796	-	22796	41.103			41.10		
	6	25377	-	25377	45.757			45.76		
10min	1	21938	-	21938	39.556	44.24	9.79	39.75	44.46	9.79
	2	22201	-	22201	40.030			40.23		
	3	23418	-	23418	42.225			42.43		
	4	25709	-	25709	46.355			46.58		
	5	25933	-	25933	46.759			46.99		
	6	28005	-	28005	50.495			50.75		
15min	1	23970	-	23970	43.220	47.67	8.90	43.63	48.14	8.91
	2	24211	-	24211	43.654			44.07		
	3	25156	-	25156	45.358			45.80		
	4	27789	-	27789	50.106			50.59		
	5	27676	-	27676	49.902			50.39		
	6	29840	-	29840	53.804			54.34		
20min	1	25623	-	25623	46.200	50.48	8.17	46.85	51.21	8.19
	2	25726	-	25726	46.386			47.05		
	3	26753	-	26753	48.238			48.93		
	4	29708	-	29708	53.566			54.33		
	5	29063	-	29063	52.403			53.17		
	6	31114	-	31114	56.101			56.93		
30min	1	27749	-	27749	50.034	53.56	6.86	50.94	54.56	6.91
	2	27566	-	27566	49.704			50.62		
	3	28628	-	28628	51.619			52.58		
	4	31452	-	31452	56.711			57.77		
	5	30327	-	30327	54.682			55.74		
	6	32490	-	32490	58.582			59.73		
45min	1	30033	-	30033	54.152	57.13	5.52	55.34	58.43	5.58
	2	29807	-	29807	53.744			54.94		
	3	30714	-	30714	55.380			56.63		
	4	33244	-	33244	59.942			61.32		
	5	32335	-	32335	58.303			59.66		
	6	33965	-	33965	61.242			62.71		
60min	1	31998	-	31998	57.695	59.64	4.07	59.18	61.27	4.17
	2	31424	-	31424	56.660			58.16		
	3	32403	-	32403	58.425			59.98		
	4	34378	-	34378	61.986			63.70		
	5	33521	-	33521	60.441			62.13		
	6	34753	-	34753	62.662			64.47		
极限	1	35145	-	35145	63.369	64.38	1.75	65.18	66.34	1.90
	2	35332	-	35332	63.706			65.52		
	3	35099	-	35099	63.286			65.17		
	4	36175	-	36175	65.226			67.28		
	5	35837	-	35837	64.617			66.64		
	6	36641	-	36641	66.067			68.23		



操作者:

日期: 2026-07-30

复核者:

未审阅版本



熊去氧胆酸口服混悬液项目信息

介质体积(ml)	900	取样体积(ml)	5	补液体积(ml)	5
对照品批号	110755-202306	对照品来源	原料	对照品使用方法	直接使用
对照品含量(%)	99.6	对照品水分(%)	0	对照品稀释倍数	50
标示量(mg)	250	供试品稀释倍数	1	系数	1

对照品溶液

序号	称样量(mg)	A ₁	A ₂	A ₃	A ₄	A ₅	A _{平均}	RSD%
1	14.00	55788	55678	55851	55872	55881	55814	0.16
2	14.02	55662	55784				55723	0.16
单位质量响应值				RSD%	判断			
3986.71				0.22	数据可信			



操作者:

日期: 2026-07-30

复核者:

未审阅版本



供试品溶液-2025121651批-pH6.8

时间 (分钟)	样品	A ₁	A ₂	A _{平均}	溶出量(%)	平均(%)	RSD%	累计溶 出量(%)	平均(%)	RSD%
5min	1	26613	-	26613	47.944	50.63	6.10	47.94	50.62	6.10
	2	26252	-	26252	47.294			47.29		
	3	27183	-	27183	48.971			48.97		
	4	28684	-	28684	51.675			51.68		
	5	29188	-	29188	52.583			52.58		
	6	30687	-	30687	55.284			55.28		
10min	1	29384	-	29384	52.936	56.10	5.63	53.20	56.38	5.63
	2	29284	-	29284	52.756			53.02		
	3	30189	-	30189	54.386			54.66		
	4	31993	-	31993	57.636			57.92		
	5	32587	-	32587	58.706			59.00		
	6	33398	-	33398	60.168			60.47		
15min	1	31126	-	31126	56.074	59.04	4.97	56.63	59.63	4.97
	2	31223	-	31223	56.249			56.81		
	3	31600	-	31600	56.928			57.50		
	4	33727	-	33727	60.760			61.37		
	5	34317	-	34317	61.823			62.44		
	6	34624	-	34624	62.376			63.02		
20min	1	32594	-	32594	58.719	61.34	4.60	59.59	62.26	4.61
	2	32303	-	32303	58.195			59.06		
	3	33060	-	33060	59.559			60.45		
	4	35297	-	35297	63.589			64.53		
	5	35202	-	35202	63.417			64.38		
	6	35843	-	35843	64.572			65.56		
30min	1	33919	-	33919	61.106	63.41	3.42	62.30	64.67	3.44
	2	34035	-	34035	61.315			62.51		
	3	34413	-	34413	61.996			63.22		
	4	36133	-	36133	65.095			66.39		
	5	36551	-	36551	65.848			67.16		
	6	36144	-	36144	65.115			66.46		
45min	1	35360	-	35360	63.702	65.79	3.25	65.24	67.40	3.29
	2	35425	-	35425	63.819			65.35		
	3	35562	-	35562	64.066			65.63		
	4	37312	-	37312	67.219			68.88		
	5	37806	-	37806	68.109			69.79		
	6	37644	-	37644	67.817			69.53		
60min	1	36162	-	36162	65.147	66.99	2.46	67.04	68.97	2.51
	2	36247	-	36247	65.300			67.19		
	3	36778	-	36778	66.257			68.18		
	4	37685	-	37685	67.891			69.92		
	5	38319	-	38319	69.033			71.09		
	6	37910	-	37910	68.296			70.38		
极限	1	37519	-	37519	67.592	68.58	1.15	69.85	70.93	1.23
	2	37587	-	37587	67.714			69.96		
	3	38103	-	38103	68.644			70.93		
	4	38364	-	38364	69.114			71.52		
	5	38612	-	38612	69.561			72.00		
	6	38234	-	38234	68.880			71.34		



操作者:

日期: 2026-07-30

复核者:

未审阅版本



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 0-40/9-2-2 - zzp-2025121551p-rcqx-pH6.8jz-1-jf50z-rj.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rcqx-FX258.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260305-FX258.lcb

样品瓶号 : 1-9

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/03/05 19:40:03

处理时间 (V2) : 2026/03/06 16:54:02

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX258)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:wangdan

处理者:wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图1 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025121551批-pH6.8介质-桨法-50转
溶剂



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30℃

数据文件名: RC\$QTL-392 - 0-40/9-3-2 - zzp-2025121551p-rcqx-pH6.8jz-1-jf50z-dz1-1.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rcqx-FX258.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260305-FX258.lcb

样品瓶号 : 1-18

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/03/05 19:43:26

处理时间 (V2) : 2026/03/06 16:54:10

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX258)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:wangdan

处理者:wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.986	55232	100.000	8765	2482	1.269	--
总计		55232	100.000	8765			

图2 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025121551批-pH6.8介质-桨法-50转
对照品溶液-1-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30℃

数据文件名: RC\$QTL-392 - 0-40/9-4-2 - zzp-2025121551p-rcqx-pH6.8jz-1-jf50z-dz1-2.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rcqx-FX258.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260305-FX258.lcb

样品瓶号 : 1-18

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/03/05 19:46:49

处理时间 (V2) : 2026/03/06 16:54:18

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX258)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:wangdan

处理者:wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.986	55301	100.000	8752	2471	1.273	--
总计		55301	100.000	8752			

图3 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025121551批-pH6.8介质-桨法-50转
对照品溶液-1-2



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30℃

数据文件名: RC\$QTL-392 - 0-40/9-5-2 - zzp-2025121551p-rcqx-pH6.8jz-1-jf50z-dz1-3.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rcqx-FX258.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260305-FX258.lcb

样品瓶号 : 1-18

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/03/05 19:50:12

处理时间 (V2) : 2026/03/06 16:54:25

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX258)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:wangdan

处理者:wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.987	55397	100.000	8769	2467	1.273	--
总计		55397	100.000	8769			

图4 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025121551批-pH6.8介质-桨法-50转
对照品溶液-1-3



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30℃

数据文件名: RC\$QTL-392 - 0-40/9-6-2 - zzp-2025121551p-rcqx-pH6.8jz-1-jf50z-dz1-4.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rcqx-FX258.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260305-FX258.lcb

样品瓶号 : 1-18

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/03/05 19:53:36

处理时间 (V2) : 2026/03/06 16:54:33

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX258)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:wangdan

处理者:wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.986	55058	100.000	8733	2474	1.269	--
总计		55058	100.000	8733			

图5 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025121551批-pH6.8介质-桨法-50转
对照品溶液-1-4



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 0-40/9-7-2 - zzp-2025121551p-rcqx-pH6.8jz-1-jf50z-dz1-5.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rcqx-FX258.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260305-FX258.lcb

样品瓶号 : 1-18

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/03/05 19:57:00

处理时间 (V2) : 2026/03/06 16:54:40

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX258)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:wangdan

处理者:wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.986	55280	100.000	8747	2472	1.273	--
总计		55280	100.000	8747			

图6 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025121551批-pH6.8介质-桨法-50转
对照品溶液-1-5



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30℃

数据文件名: RC\$QTL-392 - 0-40/9-8-2 - zzp-2025121551p-rcqx-pH6.8jz-1-jf50z-p1-5min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rcqx-FX258.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260305-FX258.lcb

样品瓶号 : 1-1

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/03/05 20:00:23

处理时间 (V2) : 2026/03/06 16:54:48

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX258)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:wangdan

处理者:wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.010	19259	100.000	3341	3120	1.369	--
总计		19259	100.000	3341			

图7 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025121551批-pH6.8介质-浆法-50转-5min-片1
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 0-40/9-9-2 - zzp-2025121551p-rcqx-pH6.8jz-1-jf50z-p2-5min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rcqx-FX258.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260305-FX258.lcb

样品瓶号 : 1-10

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/03/05 20:03:46

处理时间 (V2) : 2026/03/06 16:54:55

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX258)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:wangdan

处理者:wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.011	19264	100.000	3349	3128	1.370	--
总计		19264	100.000	3349			

图8 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025121551批-pH6.8介质-桨法-50转-5min-片2
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 0-40/9-10-2 - zzp-2025121551p-rcqx-pH6.8jz-1-jf50z-p3-5min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rcqx-FX258.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260305-FX258.lcb

样品瓶号 : 1-19

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/03/05 20:07:08

处理时间 (V2) : 2026/03/06 16:55:03

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX258)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:wangdan

处理者:wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.010	21071	100.000	3657	3129	1.372	--
总计		21071	100.000	3657			

图9 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025121551批-pH6.8介质-浆法-50转-5min-片3
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 0-40/9-11-2 - zzp-2025121551p-rcqx-pH6.8jz-1-jf50z-p4-5min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rcqx-FX258.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260305-FX258.lcb

样品瓶号 : 1-28

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/03/05 20:10:32

处理时间 (V2) : 2026/03/06 16:55:10

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX258)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:wangdan

处理者:wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.012	20893	100.000	3644	3135	1.368	--
总计		20893	100.000	3644			

图10 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025121551批-pH6.8介质-浆法-50转-5min-片4
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 0-40/9-12-2 - zzp-2025121551p-rcqx-pH6.8jz-1-jf50z-p5-5min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rcqx-FX258.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260305-FX258.lcb

样品瓶号 : 1-37

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/03/05 20:13:55

处理时间 (V2) : 2026/03/06 16:55:18

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX258)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:wangdan

处理者:wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.013	22884	100.000	3974	3139	1.395	--
总计		22884	100.000	3974			

图11 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025121551批-pH6.8介质-浆法-50转-5min-片5
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 0-40/9-13-2 - zzp-2025121551p-rcqx-pH6.8jz-1-jf50z-p6-5min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rcqx-FX258.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260305-FX258.lcb

样品瓶号 : 1-46

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/03/05 20:17:18

处理时间 (V2) : 2026/03/06 16:55:25

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX258)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:wangdan

处理者:wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.011	24109	100.000	4192	3139	1.370	--
总计		24109	100.000	4192			

图12 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025121551批-pH6.8介质-浆法-50转-5min-片6
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 0-40/9-14-2 - zzp-2025121551p-rcqx-pH6.8jz-1-jf50z-p1-10min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rcqx-FX258.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260305-FX258.lcb

样品瓶号 : 1-2

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/03/05 20:20:40

处理时间 (V2) : 2026/03/06 16:55:33

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX258)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:wangdan

处理者:wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.011	21605	100.000	3762	3129	1.370	--
总计		21605	100.000	3762			

图13 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025121551批-pH6.8介质-浆法-50转-10min-片1
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 0-40/9-15-2 - zzp-2025121551p-rcqx-pH6.8jz-1-jf50z-p2-10min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rcqx-FX258.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260305-FX258.lcb

样品瓶号 : 1-11

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/03/05 20:24:02

处理时间 (V2) : 2026/03/06 16:55:40

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX258)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:wangdan

处理者:wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.012	21361	100.000	3723	3136	1.368	--
总计		21361	100.000	3723			

图14 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025121551批-pH6.8介质-浆法-50转-10min-片2
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 0-40/9-16-2 - zzp-2025121551p-rcqx-pH6.8jz-1-jf50z-p3-10min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rcqx-FX258.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260305-FX258.lcb

样品瓶号 : 1-20

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/03/05 20:27:24

处理时间 (V2) : 2026/03/06 16:55:48

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX258)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:wangdan

处理者:wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.011	23312	100.000	4048	3135	1.375	--
总计		23312	100.000	4048			

图15 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025121551批-pH6.8介质-浆法-50转-10min-片3
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 0-40/9-17-2 - zzp-2025121551p-rcqx-pH6.8jz-1-jf50z-p4-10min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rcqx-FX258.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260305-FX258.lcb

样品瓶号 : 1-29

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/03/05 20:30:46

处理时间 (V2) : 2026/03/06 16:55:56

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX258)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:wangdan

处理者:wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.012	23523	100.000	4099	3141	1.363	--
总计		23523	100.000	4099			

图16 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025121551批-pH6.8介质-浆法-50转-10min-片4
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 0-40/9-18-2 - zzp-2025121551p-rcqx-pH6.8jz-1-jf50z-p5-10min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rcqx-FX258.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260305-FX258.lcb

样品瓶号 : 1-38

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/03/05 20:34:08

处理时间 (V2) : 2026/03/06 16:56:03

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX258)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:wangdan

处理者:wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.013	24583	100.000	4304	3152	1.357	--
总计		24583	100.000	4304			

图17 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025121551批-pH6.8介质-浆法-50转-10min-片5
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 0-40/9-19-2 - zzp-2025121551p-rcqx-pH6.8jz-1-jf50z-p6-10min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rcqx-FX258.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260305-FX258.lcb

样品瓶号 : 1-47

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/03/05 20:37:30

处理时间 (V2) : 2026/03/06 16:56:11

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX258)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:wangdan

处理者:wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.012	26485	100.000	4634	3154	1.359	--
总计		26485	100.000	4634			

图18 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025121551批-pH6.8介质-浆法-50转-10min-片6
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 0-40/9-20-2 - zzp-2025121551p-rcqx-pH6.8jz-1-jf50z-p1-15min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rcqx-FX258.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260305-FX258.lcb

样品瓶号 : 1-3

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/03/05 20:40:53

处理时间 (V2) : 2026/03/06 16:56:18

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX258)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:wangdan

处理者:wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.012	23672	100.000	4134	3150	1.368	--
总计		23672	100.000	4134			

图19 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025121551批-pH6.8介质-浆法-50转-15min-片1
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 0-40/9-21-2 - zzp-2025121551p-rcqx-pH6.8jz-1-jf50z-p2-15min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rcqx-FX258.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260305-FX258.lcb

样品瓶号 : 1-12

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/03/05 20:44:16

处理时间 (V2) : 2026/03/06 16:56:26

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX258)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:wangdan

处理者:wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.013	23717	100.000	4146	3157	1.367	--
总计		23717	100.000	4146			

图20 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025121551批-pH6.8介质-浆法-50转-15min-片2
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 0-40/9-22-2 - zzp-2025121551p-rcqx-pH6.8jz-1-jf50z-p3-15min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rcqx-FX258.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260305-FX258.lcb

样品瓶号 : 1-21

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/03/05 20:47:38

处理时间 (V2) : 2026/03/06 16:56:33

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX258)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:wangdan

处理者:wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.012	25276	100.000	4417	3163	1.366	--
总计		25276	100.000	4417			

图21 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025121551批-pH6.8介质-浆法-50转-15min-片3
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 0-40/9-23-2 - zzp-2025121551p-rcqx-pH6.8jz-1-jf50z-p4-15min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rcqx-FX258.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260305-FX258.lcb

样品瓶号 : 1-30

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/03/05 20:51:00

处理时间 (V2) : 2026/03/06 16:56:41

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX258)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:wangdan

处理者:wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.013	25816	100.000	4506	3155	1.372	--
总计		25816	100.000	4506			

图22 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025121551批-pH6.8介质-浆法-50转-15min-片4
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 0-40/9-24-2 - zzp-2025121551p-rcqx-pH6.8jz-1-jf50z-p5-15min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rcqx-FX258.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260305-FX258.lcb

样品瓶号 : 1-39

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/03/05 20:54:23

处理时间 (V2) : 2026/03/06 16:56:49

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX258)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:wangdan

处理者:wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.014	26690	100.000	4670	3168	1.363	--
总计		26690	100.000	4670			

图23 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025121551批-pH6.8介质-浆法-50转-15min-片5
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 0-40/9-25-2 - zzp-2025121551p-rcqx-pH6.8jz-1-jf50z-p6-15min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rcqx-FX258.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260305-FX258.lcb

样品瓶号 : 1-48

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/03/05 20:57:46

处理时间 (V2) : 2026/03/06 16:56:57

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX258)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:wangdan

处理者:wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.015	28501	100.000	4992	3175	1.354	--
总计		28501	100.000	4992			

图24 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025121551批-pH6.8介质-浆法-50转-15min-片6
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 0-40/9-26-2 - zzp-2025121551p-rcqx-pH6.8jz-1-jf50z-p1-20min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rcqx-FX258.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260305-FX258.lcb

样品瓶号 : 1-4

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/03/05 21:01:09

处理时间 (V2) : 2026/03/06 16:57:04

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX258)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:wangdan

处理者:wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.015	25634	100.000	4476	3168	1.361	--
总计		25634	100.000	4476			

图25 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025121551批-pH6.8介质-浆法-50转-20min-片1
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 0-40/9-27-2 - zzp-2025121551p-rcqx-pH6.8jz-1-jf50z-p2-20min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rcqx-FX258.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260305-FX258.lcb

样品瓶号 : 1-13

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/03/05 21:04:32

处理时间 (V2) : 2026/03/06 16:57:12

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX258)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:wangdan

处理者:wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.014	25614	100.000	4485	3165	1.364	--
总计		25614	100.000	4485			

图26 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025121551批-pH6.8介质-浆法-50转-20min-片2
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 0-40/9-28-2 - zzp-2025121551p-rcqx-pH6.8jz-1-jf50z-p3-20min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rcqx-FX258.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260305-FX258.lcb

样品瓶号 : 1-22

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/03/05 21:07:54

处理时间 (V2) : 2026/03/06 16:57:20

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX258)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:wangdan

处理者:wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.014	27034	100.000	4728	3174	1.370	--
总计		27034	100.000	4728			

图27 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025121551批-pH6.8介质-浆法-50转-20min-片3
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 0-40/9-29-2 - zzp-2025121551p-rcqx-pH6.8jz-1-jf50z-p4-20min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rcqx-FX258.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260305-FX258.lcb

样品瓶号 : 1-31

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/03/05 21:11:16

处理时间 (V2) : 2026/03/06 16:57:27

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX258)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:wangdan

处理者:wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.014	27380	100.000	4789	3173	1.365	--
总计		27380	100.000	4789			

图28 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025121551批-pH6.8介质-浆法-50转-20min-片4
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 0-40/9-30-2 - zzp-2025121551p-rcqx-pH6.8jz-1-jf50z-p5-20min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rcqx-FX258.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260305-FX258.lcb

样品瓶号 : 1-40

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/03/05 21:14:38

处理时间 (V2) : 2026/03/06 16:57:35

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX258)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:wangdan

处理者:wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.015	28306	100.000	4955	3176	1.353	--
总计		28306	100.000	4955			

图29 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025121551批-pH6.8介质-浆法-50转-20min-片5
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 0-40/9-31-2 - zzp-2025121551p-rcqx-pH6.8jz-1-jf50z-p6-20min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rcqx-FX258.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260305-FX258.lcb

样品瓶号 : 1-49

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/03/05 21:18:00

处理时间 (V2) : 2026/03/06 16:57:42

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX258)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:wangdan

处理者:wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.013	30200	100.000	5298	3181	1.355	--
总计		30200	100.000	5298			

图30 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025121551批-pH6.8介质-浆法-50转-20min-片6
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 0-40/9-32-2 - zzp-2025121551p-rcqx-pH6.8jz-1-jf50z-p1-30min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rcqx-FX258.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260305-FX258.lcb

样品瓶号 : 1-5

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/03/05 21:21:23

处理时间 (V2) : 2026/03/06 16:57:50

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX258)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:wangdan

处理者:wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.013	27777	100.000	4880	3188	1.357	--
总计		27777	100.000	4880			

图31 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025121551批-pH6.8介质-浆法-50转-30min-片1
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 0-40/9-33-2 - zzp-2025121551p-rcqx-pH6.8jz-1-jf50z-p2-30min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rcqx-FX258.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260305-FX258.lcb

样品瓶号 : 1-14

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/03/05 21:24:45

处理时间 (V2) : 2026/03/06 16:57:57

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX258)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:wangdan

处理者:wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.014	27911	100.000	4900	3189	1.353	--
总计		27911	100.000	4900			

图32 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025121551批-pH6.8介质-浆法-50转-30min-片2
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 0-40/9-34-2 - zzp-2025121551p-rcqx-pH6.8jz-1-jf50z-p3-30min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rcqx-FX258.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260305-FX258.lcb

样品瓶号 : 1-23

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/03/05 21:28:07

处理时间 (V2) : 2026/03/06 16:58:05

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX258)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:wangdan

处理者:wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.013	29374	100.000	5154	3180	1.354	--
总计		29374	100.000	5154			

图33 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025121551批-pH6.8介质-浆法-50转-30min-片3
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 0-40/9-35-2 - zzp-2025121551p-rcqx-pH6.8jz-1-jf50z-p4-30min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rcqx-FX258.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260305-FX258.lcb

样品瓶号 : 1-32

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/03/05 21:31:29

处理时间 (V2) : 2026/03/06 16:58:12

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX258)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:wangdan

处理者:wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.014	29424	100.000	5151	3180	1.360	--
总计		29424	100.000	5151			

图34 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025121551批-pH6.8介质-浆法-50转-30min-片4
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 0-40/9-36-2 - zzp-2025121551p-rcqx-pH6.8jz-1-jf50z-p5-30min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rcqx-FX258.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260305-FX258.lcb

样品瓶号 : 1-41

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/03/05 21:34:51

处理时间 (V2) : 2026/03/06 16:58:20

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX258)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:wangdan

处理者:wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.014	30135	100.000	5298	3199	1.349	--
总计		30135	100.000	5298			

图35 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025121551批-pH6.8介质-浆法-50转-30min-片5
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 0-40/9-37-2 - zzp-2025121551p-rcqx-pH6.8jz-1-jf50z-p6-30min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rcqx-FX258.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260305-FX258.lcb

样品瓶号 : 1-50

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/03/05 21:38:13

处理时间 (V2) : 2026/03/06 16:58:27

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX258)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:wangdan

处理者:wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.014	32215	100.000	5638	3189	1.364	--
总计		32215	100.000	5638			

图36 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025121551批-pH6.8介质-浆法-50转-30min-片6
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 0-40/9-38-2 - zzp-2025121551p-rcqx-pH6.8jz-1-jf50z-p1-45min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rcqx-FX258.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260305-FX258.lcb

样品瓶号 : 1-6

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/03/05 21:41:35

处理时间 (V2) : 2026/03/06 16:58:35

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX258)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:wangdan

处理者:wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.013	30874	100.000	5423	3186	1.352	--
总计		30874	100.000	5423			

图37 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025121551批-pH6.8介质-浆法-50转-45min-片1
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 0-40/9-39-2 - zzp-2025121551p-rcqx-pH6.8jz-1-jf50z-p2-45min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rcqx-FX258.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260305-FX258.lcb

样品瓶号 : 1-15

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/03/05 21:44:57

处理时间 (V2) : 2026/03/06 16:58:42

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX258)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:wangdan

处理者:wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.014	30779	100.000	5403	3198	1.359	--
总计		30779	100.000	5403			

图38 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025121551批-pH6.8介质-浆法-50转-45min-片2
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 0-40/9-40-2 - zzp-2025121551p-rcqx-pH6.8jz-1-jf50z-p3-45min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rcqx-FX258.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260305-FX258.lcb

样品瓶号 : 1-24

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/03/05 21:48:18

处理时间 (V2) : 2026/03/06 16:58:50

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX258)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:wangdan

处理者:wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.014	31325	100.000	5524	3199	1.348	--
总计		31325	100.000	5524			

图39 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025121551批-pH6.8介质-浆法-50转-45min-片3
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 0-40/9-41-2 - zzp-2025121551p-rcqx-pH6.8jz-1-jf50z-p4-45min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rcqx-FX258.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260305-FX258.lcb

样品瓶号 : 1-33

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/03/05 21:51:40

处理时间 (V2) : 2026/03/06 16:58:58

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX258)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:wangdan

处理者:wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.013	31596	100.000	5574	3207	1.343	--
总计		31596	100.000	5574			

图40 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025121551批-pH6.8介质-浆法-50转-45min-片4
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 0-40/9-42-2 - zzp-2025121551p-rcqx-pH6.8jz-1-jf50z-p5-45min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rcqx-FX258.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260305-FX258.lcb

样品瓶号 : 1-42

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/03/05 21:55:02

处理时间 (V2) : 2026/03/06 16:59:06

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX258)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:wangdan

处理者:wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.014	32493	100.000	5715	3201	1.352	--
总计		32493	100.000	5715			

图41 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025121551批-pH6.8介质-浆法-50转-45min-片5
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 0-40/9-43-2 - zzp-2025121551p-rcqx-pH6.8jz-1-jf50z-p6-45min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rcqx-FX258.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260305-FX258.lcb

样品瓶号 : 1-51

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/03/05 21:58:24

处理时间 (V2) : 2026/03/06 16:59:13

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX258)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:wangdan

处理者:wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.015	33766	100.000	5951	3217	1.345	--
总计		33766	100.000	5951			

图42 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025121551批-pH6.8介质-浆法-50转-45min-片6
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 0-40/9-44-2 - zzp-2025121551p-rcqx-pH6.8jz-1-jf50z-p1-60min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rcqx-FX258.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260305-FX258.lcb

样品瓶号 : 1-7

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/03/05 22:01:46

处理时间 (V2) : 2026/03/06 16:59:21

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX258)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:wangdan

处理者:wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.014	32963	100.000	5819	3212	1.343	--
总计		32963	100.000	5819			

图43 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025121551批-pH6.8介质-浆法-50转-60min-片1
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 0-40/9-45-2 - zzp-2025121551p-rcqx-pH6.8jz-1-jf50z-p2-60min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rcqx-FX258.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260305-FX258.lcb

样品瓶号 : 1-16

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/03/05 22:05:08

处理时间 (V2) : 2026/03/06 16:59:28

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX258)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:wangdan

处理者:wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.014	32868	100.000	5788	3217	1.349	--
总计		32868	100.000	5788			

图44 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025121551批-pH6.8介质-浆法-50转-60min-片2
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 0-40/9-46-2 - zzp-2025121551p-rcqx-pH6.8jz-1-jf50z-p3-60min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rcqx-FX258.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260305-FX258.lcb

样品瓶号 : 1-25

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/03/05 22:08:31

处理时间 (V2) : 2026/03/06 16:59:36

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX258)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:wangdan

处理者:wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.016	33605	100.000	5903	3216	1.349	--
总计		33605	100.000	5903			

图45 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025121551批-pH6.8介质-浆法-50转-60min-片3
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 0-40/9-47-2 - zzp-2025121551p-rcqx-pH6.8jz-1-jf50z-p4-60min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rcqx-FX258.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260305-FX258.lcb

样品瓶号 : 1-34

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/03/05 22:11:54

处理时间 (V2) : 2026/03/06 16:59:44

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX258)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:wangdan

处理者:wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.016	33799	100.000	5933	3214	1.348	--
总计		33799	100.000	5933			

图46 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025121551批-pH6.8介质-浆法-50转-60min-片4
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 0-40/9-48-2 - zzp-2025121551p-rcqx-pH6.8jz-1-jf50z-p5-60min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rcqx-FX258.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260305-FX258.lcb

样品瓶号 : 1-43

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/03/05 22:15:16

处理时间 (V2) : 2026/03/06 16:59:51

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX258)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:wangdan

处理者:wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.015	34134	100.000	6008	3214	1.346	--
总计		34134	100.000	6008			

图47 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025121551批-pH6.8介质-浆法-50转-60min-片5
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 0-40/9-49-2 - zzp-2025121551p-rcqx-pH6.8jz-1-jf50z-p6-60min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rcqx-FX258.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260305-FX258.lcb

样品瓶号 : 1-52

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/03/05 22:18:38

处理时间 (V2) : 2026/03/06 16:59:59

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX258)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:wangdan

处理者:wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.015	35336	100.000	6226	3216	1.345	--
总计		35336	100.000	6226			

图48 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025121551批-pH6.8介质-浆法-50转-60min-片6
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 0-40/9-50-2 - zzp-2025121551p-rcqx-pH6.8jz-1-jf50z-p1-jx.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rcqx-FX258.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260305-FX258.lcb

样品瓶号 : 1-8

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/03/05 22:22:01

处理时间 (V2) : 2026/03/06 17:00:06

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX258)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:wangdan

处理者:wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.016	35629	100.000	6262	3229	1.341	--
总计		35629	100.000	6262			

图49 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025121551批-pH6.8介质-桨法-50转-极限转速-片1
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 0-40/9-51-2 - zzp-2025121551p-rcqx-pH6.8jz-1-jf50z-p2-jx.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rcqx-FX258.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260305-FX258.lcb

样品瓶号 : 1-17

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/03/05 22:25:24

处理时间 (V2) : 2026/03/06 17:00:14

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX258)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:wangdan

处理者:wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.015	35633	100.000	6269	3220	1.342	--
总计		35633	100.000	6269			

图50 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025121551批-pH6.8介质-桨法-50转-极限转速-片2
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 0-40/9-52-2 - zzp-2025121551p-rcqx-pH6.8jz-1-jf50z-p3-jx.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rcqx-FX258.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260305-FX258.lcb

样品瓶号 : 1-26

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/03/05 22:28:47

处理时间 (V2) : 2026/03/06 17:00:21

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX258)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:wangdan

处理者:wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.016	36126	100.000	6344	3222	1.348	--
总计		36126	100.000	6344			

图51 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025121551批-pH6.8介质-桨法-50转-极限转速-片3
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 0-40/9-53-2 - zzp-2025121551p-rcqx-pH6.8jz-1-jf50z-p4-jx.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rcqx-FX258.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260305-FX258.lcb

样品瓶号 : 1-35

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/03/05 22:32:10

处理时间 (V2) : 2026/03/06 17:00:29

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX258)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:wangdan

处理者:wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.016	35983	100.000	6327	3229	1.346	--
总计		35983	100.000	6327			

图52 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025121551批-pH6.8介质-桨法-50转-极限转速-片4
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 0-40/9-54-2 - zzp-2025121551p-rcqx-pH6.8jz-1-jf50z-p5-jx.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rcqx-FX258.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260305-FX258.lcb

样品瓶号 : 1-44

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/03/05 22:35:33

处理时间 (V2) : 2026/03/06 17:00:37

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX258)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:wangdan

处理者:wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.016	36298	100.000	6364	3226	1.350	--
总计		36298	100.000	6364			

图53 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025121551批-pH6.8介质-桨法-50转-极限转速-片5
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 0-40/9-55-2 - zzp-2025121551p-rcqx-pH6.8jz-1-jf50z-p6-jx.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rcqx-FX258.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260305-FX258.lcb

样品瓶号 : 1-53

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/03/05 22:38:55

处理时间 (V2) : 2026/03/06 17:00:44

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX258)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:wangdan

处理者:wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.015	37070	100.000	6518	3226	1.339	--
总计		37070	100.000	6518			

图54 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025121551批-pH6.8介质-桨法-50转-极限转速-片6
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 0-40/9-56-2 - zzp-2025121551p-rcqx-pH6.8jz-1-jf50z-dz2-1.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rcqx-FX258.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260305-FX258.lcb

样品瓶号 : 1-27

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/03/05 22:42:18

处理时间 (V2) : 2026/03/06 17:00:52

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX258)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:wangdan

处理者:wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.988	55584	100.000	8978	2566	1.251	--
总计		55584	100.000	8978			

图55 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025121551批-pH6.8介质-桨法-50转
对照品溶液-2-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 0-40/9-57-2 - zzp-2025121551p-rcqx-pH6.8jz-1-jf50z-dz2-2.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rcqx-FX258.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260305-FX258.lcb

样品瓶号 : 1-27

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/03/05 22:45:40

处理时间 (V2) : 2026/03/06 17:00:59

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX258)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:wangdan

处理者:wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.988	55650	100.000	8971	2563	1.252	--
总计		55650	100.000	8971			

图56 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025121551批-pH6.8介质-桨法-50转
对照品溶液-2-2



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 0-40/9-58-2 - zzp-2025121551p-rcqx-pH6.8jz-2-jf50z-rj.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rcqx-FX258.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260305-FX258.lcb

样品瓶号 : 2-9

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/03/05 22:49:04

处理时间 (V2) : 2026/03/06 17:01:07

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX258)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:wangdan

处理者:wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图57 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025121551批-pH6.8介质-桨法-50转
溶剂



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 0-40/9-59-2 - zzp-2025121551p-rcqx-pH6.8jz-2-jf50z-dz1-1.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rcqx-FX258.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260305-FX258.lcb

样品瓶号 : 2-18

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/03/05 22:52:28

处理时间 (V2) : 2026/03/06 17:01:15

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX258)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:wangdan

处理者:wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.988	55533	100.000	8969	2566	1.248	--
总计		55533	100.000	8969			

图58 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025121551批-pH6.8介质-桨法-50转
对照品溶液-1-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 0-40/9-60-2 - zzp-2025121551p-rcqx-pH6.8jz-2-jf50z-dz1-2.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rcqx-FX258.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260305-FX258.lcb

样品瓶号 : 2-18

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/03/05 22:55:52

处理时间 (V2) : 2026/03/06 17:01:23

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX258)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:wangdan

处理者:wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.987	55546	100.000	8941	2557	1.253	--
总计		55546	100.000	8941			

图59 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025121551批-pH6.8介质-桨法-50转
对照品溶液-1-2



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 0-40/9-61-2 - zzp-2025121551p-rcqx-pH6.8jz-2-jf50z-dz1-3.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rcqx-FX258.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260305-FX258.lcb

样品瓶号 : 2-18

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/03/05 22:59:16

处理时间 (V2) : 2026/03/06 17:01:31

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX258)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:wangdan

处理者:wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.988	55578	100.000	8950	2561	1.253	--
总计		55578	100.000	8950			

图60 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025121551批-pH6.8介质-桨法-50转
对照品溶液-1-3



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 0-40/9-62-2 - zzp-2025121551p-rcqx-pH6.8jz-2-jf50z-dz1-4.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rcqx-FX258.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260305-FX258.lcb

样品瓶号 : 2-18

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/03/05 23:02:40

处理时间 (V2) : 2026/03/06 17:01:38

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX258)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:wangdan

处理者:wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.988	55580	100.000	8944	2556	1.253	--
总计		55580	100.000	8944			

图61 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025121551批-pH6.8介质-桨法-50转
对照品溶液-1-4



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 0-40/9-63-2 - zzp-2025121551p-rcqx-pH6.8jz-2-jf50z-dz1-5.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rcqx-FX258.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260305-FX258.lcb

样品瓶号 : 2-18

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/03/05 23:06:04

处理时间 (V2) : 2026/03/06 17:01:46

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX258)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:wangdan

处理者:wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.988	55512	100.000	8938	2560	1.255	--
总计		55512	100.000	8938			

图62 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025121551批-pH6.8介质-桨法-50转
对照品溶液-1-5



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 0-40/9-64-2 - zzp-2025121551p-rcqx-pH6.8jz-2-jf50z-p1-5min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rcqx-FX258.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260305-FX258.lcb

样品瓶号 : 2-1

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/03/05 23:09:27

处理时间 (V2) : 2026/03/06 17:01:54

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX258)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:wangdan

处理者:wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.014	25270	100.000	4466	3226	1.356	--
总计		25270	100.000	4466			

图63 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025121551批-pH6.8介质-浆法-50转-5min-片1
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 0-40/9-65-2 - zzp-2025121551p-rcqx-pH6.8jz-2-jf50z-p2-5min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rcqx-FX258.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260305-FX258.lcb

样品瓶号 : 2-10

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/03/05 23:12:51

处理时间 (V2) : 2026/03/06 17:02:01

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX258)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:wangdan

处理者:wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.015	25365	100.000	4475	3223	1.358	--
总计		25365	100.000	4475			

图64 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025121551批-pH6.8介质-桨法-50转-5min-片2
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 0-40/9-66-2 - zzp-2025121551p-rcqx-pH6.8jz-2-jf50z-p3-5min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rcqx-FX258.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260305-FX258.lcb

样品瓶号 : 2-19

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/03/05 23:16:14

处理时间 (V2) : 2026/03/06 17:02:09

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX258)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:wangdan

处理者:wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.014	26370	100.000	4666	3241	1.355	--
总计		26370	100.000	4666			

图65 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025121551批-pH6.8介质-浆法-50转-5min-片3
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 0-40/9-67-2 - zzp-2025121551p-rcqx-pH6.8jz-2-jf50z-p4-5min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rcqx-FX258.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260305-FX258.lcb

样品瓶号 : 2-28

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/03/05 23:19:37

处理时间 (V2) : 2026/03/06 17:02:17

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX258)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:wangdan

处理者:wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.013	29158	100.000	5145	3223	1.349	--
总计		29158	100.000	5145			

图66 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025121551批-pH6.8介质-浆法-50转-5min-片4
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 0-40/9-68-2 - zzp-2025121551p-rcqx-pH6.8jz-2-jf50z-p5-5min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rcqx-FX258.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260305-FX258.lcb

样品瓶号 : 2-37

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/03/05 23:23:00

处理时间 (V2) : 2026/03/06 17:02:25

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX258)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:wangdan

处理者:wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.015	29127	100.000	5114	3222	1.358	--
总计		29127	100.000	5114			

图67 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025121551批-pH6.8介质-桨法-50转-5min-片5
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 0-40/9-69-2 - zzp-2025121551p-rcqx-pH6.8jz-2-jf50z-p6-5min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rcqx-FX258.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260305-FX258.lcb

样品瓶号 : 2-46

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/03/05 23:26:23

处理时间 (V2) : 2026/03/06 17:02:33

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX258)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:wangdan

处理者:wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.016	35083	100.000	6158	3229	1.352	--
总计		35083	100.000	6158			

图68 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025121551批-pH6.8介质-桨法-50转-5min-片6
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 0-40/9-70-2 - zzp-2025121551p-rcqx-pH6.8jz-2-jf50z-p1-10min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rcqx-FX258.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260305-FX258.lcb

样品瓶号 : 2-2

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/03/05 23:29:46

处理时间 (V2) : 2026/03/06 17:02:40

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX258)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:wangdan

处理者:wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.014	27781	100.000	4893	3228	1.354	--
总计		27781	100.000	4893			

图69 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025121551批-pH6.8介质-浆法-50转-10min-片1
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 0-40/9-71-2 - zzp-2025121551p-rcqx-pH6.8jz-2-jf50z-p2-10min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rcqx-FX258.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260305-FX258.lcb

样品瓶号 : 2-11

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/03/05 23:33:09

处理时间 (V2) : 2026/03/06 17:02:48

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX258)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:wangdan

处理者:wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.015	28335	100.000	4988	3230	1.357	--
总计		28335	100.000	4988			

图70 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025121551批-pH6.8介质-浆法-50转-10min-片2
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 0-40/9-72-2 - zzp-2025121551p-rcqx-pH6.8jz-2-jf50z-p3-10min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rcqx-FX258.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260305-FX258.lcb

样品瓶号 : 2-20

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/03/05 23:36:32

处理时间 (V2) : 2026/03/06 17:02:56

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX258)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:wangdan

处理者:wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.015	29836	100.000	5240	3223	1.359	--
总计		29836	100.000	5240			

图71 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025121551批-pH6.8介质-浆法-50转-10min-片3
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 0-40/9-73-2 - zzp-2025121551p-rcqx-pH6.8jz-2-jf50z-p4-10min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rcqx-FX258.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260305-FX258.lcb

样品瓶号 : 2-29

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/03/05 23:39:55

处理时间 (V2) : 2026/03/06 17:03:03

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX258)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:wangdan

处理者:wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.016	31794	100.000	5614	3239	1.343	--
总计		31794	100.000	5614			

图72 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025121551批-pH6.8介质-浆法-50转-10min-片4
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 0-40/9-74-2 - zzp-2025121551p-rcqx-pH6.8jz-2-jf50z-p5-10min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rcqx-FX258.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260305-FX258.lcb

样品瓶号 : 2-38

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/03/05 23:43:18

处理时间 (V2) : 2026/03/06 17:03:12

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX258)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:wangdan

处理者:wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.014	32673	100.000	5745	3225	1.348	--
总计		32673	100.000	5745			

图73 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025121551批-pH6.8介质-浆法-50转-10min-片5
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 0-40/9-75-2 - zzp-2025121551p-rcqx-pH6.8jz-2-jf50z-p6-10min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rcqx-FX258.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260305-FX258.lcb

样品瓶号 : 2-47

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/03/05 23:46:42

处理时间 (V2) : 2026/03/06 17:03:20

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX258)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:wangdan

处理者:wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.015	36373	100.000	6385	3226	1.347	--
总计		36373	100.000	6385			

图74 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025121551批-pH6.8介质-浆法-50转-10min-片6
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 0-40/9-76-2 - zzp-2025121551p-rcqx-pH6.8jz-2-jf50z-p1-15min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rcqx-FX258.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260305-FX258.lcb

样品瓶号 : 2-3

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/03/05 23:50:06

处理时间 (V2) : 2026/03/06 17:03:27

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX258)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:wangdan

处理者:wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.013	29645	100.000	5245	3228	1.346	--
总计		29645	100.000	5245			

图75 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025121551批-pH6.8介质-浆法-50转-15min-片1
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 0-40/9-77-2 - zzp-2025121551p-rcqx-pH6.8jz-2-jf50z-p2-15min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rcqx-FX258.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260305-FX258.lcb

样品瓶号 : 2-12

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/03/05 23:53:30

处理时间 (V2) : 2026/03/06 17:03:35

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX258)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:wangdan

处理者:wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.014	30290	100.000	5332	3229	1.354	--
总计		30290	100.000	5332			

图76 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025121551批-pH6.8介质-浆法-50转-15min-片2
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 0-40/9-78-2 - zzp-2025121551p-rcqx-pH6.8jz-2-jf50z-p3-15min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rcqx-FX258.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260305-FX258.lcb

样品瓶号 : 2-21

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/03/05 23:56:53

处理时间 (V2) : 2026/03/06 17:03:42

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX258)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:wangdan

处理者:wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.014	31915	100.000	5617	3227	1.349	--
总计		31915	100.000	5617			

图77 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025121551批-pH6.8介质-浆法-50转-15min-片3
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 0-40/9-79-2 - zzp-2025121551p-rcqx-pH6.8jz-2-jf50z-p4-15min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rcqx-FX258.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260305-FX258.lcb

样品瓶号 : 2-30

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/03/06 00:00:16

处理时间 (V2) : 2026/03/06 17:03:50

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX258)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:wangdan

处理者:wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.014	33488	100.000	5910	3233	1.344	--
总计		33488	100.000	5910			

图78 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025121551批-pH6.8介质-浆法-50转-15min-片4
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 0-40/9-80-2 - zzp-2025121551p-rcqx-pH6.8jz-2-jf50z-p5-15min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rcqx-FX258.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260305-FX258.lcb

样品瓶号 : 2-39

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/03/06 00:03:39

处理时间 (V2) : 2026/03/06 17:03:58

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX258)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:wangdan

处理者:wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.015	33926	100.000	5991	3233	1.342	--
总计		33926	100.000	5991			

图79 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025121551批-pH6.8介质-浆法-50转-15min-片5
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 0-40/9-81-2 - zzp-2025121551p-rcqx-pH6.8jz-2-jf50z-p6-15min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rcqx-FX258.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260305-FX258.lcb

样品瓶号 : 2-48

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/03/06 00:07:02

处理时间 (V2) : 2026/03/06 17:04:05

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX258)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:wangdan

处理者:wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.015	36760	100.000	6495	3239	1.332	--
总计		36760	100.000	6495			

图80 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025121551批-pH6.8介质-浆法-50转-15min-片6
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 0-40/9-82-2 - zzp-2025121551p-rcqx-pH6.8jz-2-jf50z-p1-20min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rcqx-FX258.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260305-FX258.lcb

样品瓶号 : 2-4

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/03/06 00:10:26

处理时间 (V2) : 2026/03/06 17:04:13

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX258)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:wangdan

处理者:wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.015	30810	100.000	5440	3228	1.347	--
总计		30810	100.000	5440			

图81 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025121551批-pH6.8介质-浆法-50转-20min-片1
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 0-40/9-83-2 - zzp-2025121551p-rcqx-pH6.8jz-2-jf50z-p2-20min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rcqx-FX258.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260305-FX258.lcb

样品瓶号 : 2-13

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/03/06 00:13:50

处理时间 (V2) : 2026/03/06 17:04:21

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX258)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:wangdan

处理者:wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.014	31390	100.000	5541	3234	1.346	--
总计		31390	100.000	5541			

图82 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025121551批-pH6.8介质-浆法-50转-20min-片2
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 0-40/9-84-2 - zzp-2025121551p-rcqx-pH6.8jz-2-jf50z-p3-20min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rcqx-FX258.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260305-FX258.lcb

样品瓶号 : 2-22

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/03/06 00:17:13

处理时间 (V2) : 2026/03/06 17:04:29

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX258)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:wangdan

处理者:wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.014	33126	100.000	5823	3228	1.365	--
总计		33126	100.000	5823			

图83 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025121551批-pH6.8介质-浆法-50转-20min-片3
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 0-40/9-85-2 - zzp-2025121551p-rcqx-pH6.8jz-2-jf50z-p4-20min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rcqx-FX258.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260305-FX258.lcb

样品瓶号 : 2-31

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/03/06 00:20:37

处理时间 (V2) : 2026/03/06 17:04:36

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX258)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:wangdan

处理者:wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.015	35082	100.000	6172	3222	1.346	--
总计		35082	100.000	6172			

图84 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025121551批-pH6.8介质-浆法-50转-20min-片4
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 0-40/9-86-2 - zzp-2025121551p-rcqx-pH6.8jz-2-jf50z-p5-20min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rcqx-FX258.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260305-FX258.lcb

样品瓶号 : 2-40

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/03/06 00:24:00

处理时间 (V2) : 2026/03/06 17:04:44

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX258)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:wangdan

处理者:wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.015	35024	100.000	6177	3231	1.342	--
总计		35024	100.000	6177			

图85 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025121551批-pH6.8介质-浆法-50转-20min-片5
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 0-40/9-87-2 - zzp-2025121551p-rcqx-pH6.8jz-2-jf50z-p6-20min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rcqx-FX258.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260305-FX258.lcb

样品瓶号 : 2-49

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/03/06 00:27:24

处理时间 (V2) : 2026/03/06 17:04:52

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX258)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:wangdan

处理者:wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.016	36940	100.000	6517	3235	1.337	--
总计		36940	100.000	6517			

图86 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025121551批-pH6.8介质-浆法-50转-20min-片6
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 0-40/9-88-2 - zzp-2025121551p-rcqx-pH6.8jz-2-jf50z-p1-30min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rcqx-FX258.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260305-FX258.lcb

样品瓶号 : 2-5

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/03/06 00:30:47

处理时间 (V2) : 2026/03/06 17:04:59

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX258)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:wangdan

处理者:wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.015	33232	100.000	5824	3213	1.356	--
总计		33232	100.000	5824			

图87 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025121551批-pH6.8介质-浆法-50转-30min-片1
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 0-40/9-89-2 - zzp-2025121551p-rcqx-pH6.8jz-2-jf50z-p2-30min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rcqx-FX258.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260305-FX258.lcb

样品瓶号 : 2-14

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/03/06 00:34:11

处理时间 (V2) : 2026/03/06 17:05:07

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX258)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:wangdan

处理者:wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.015	33342	100.000	5871	3224	1.342	--
总计		33342	100.000	5871			

图88 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025121551批-pH6.8介质-浆法-50转-30min-片2
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 0-40/9-90-2 - zzp-2025121551p-rcqx-pH6.8jz-2-jf50z-p3-30min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rcqx-FX258.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260305-FX258.lcb

样品瓶号 : 2-23

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/03/06 00:37:35

处理时间 (V2) : 2026/03/06 17:05:15

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX258)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:wangdan

处理者:wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.016	34664	100.000	6102	3232	1.341	--
总计		34664	100.000	6102			

图89 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025121551批-pH6.8介质-浆法-50转-30min-片3
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 0-40/9-91-2 - zzp-2025121551p-rcqx-pH6.8jz-2-jf50z-p4-30min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rcqx-FX258.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260305-FX258.lcb

样品瓶号 : 2-32

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/03/06 00:40:58

处理时间 (V2) : 2026/03/06 17:05:22

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX258)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:wangdan

处理者:wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.015	36544	100.000	6476	3241	1.327	--
总计		36544	100.000	6476			

图90 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025121551批-pH6.8介质-浆法-50转-30min-片4
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 0-40/9-92-2 - zzp-2025121551p-rcqx-pH6.8jz-2-jf50z-p5-30min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rcqx-FX258.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260305-FX258.lcb

样品瓶号 : 2-41

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/03/06 00:44:22

处理时间 (V2) : 2026/03/06 17:05:30

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX258)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:wangdan

处理者:wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.015	36371	100.000	6397	3232	1.345	--
总计		36371	100.000	6397			

图91 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025121551批-pH6.8介质-浆法-50转-30min-片5
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 0-40/9-93-2 - zzp-2025121551p-rcqx-pH6.8jz-2-jf50z-p6-30min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rcqx-FX258.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260305-FX258.lcb

样品瓶号 : 2-50

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/03/06 00:47:45

处理时间 (V2) : 2026/03/06 17:05:38

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX258)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:wangdan

处理者:wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.016	37522	100.000	6598	3231	1.342	--
总计		37522	100.000	6598			

图92 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025121551批-pH6.8介质-浆法-50转-30min-片6
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 0-40/9-94-2 - zzp-2025121551p-rcqx-pH6.8jz-2-jf50z-p1-45min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rcqx-FX258.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260305-FX258.lcb

样品瓶号 : 2-6

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/03/06 00:51:09

处理时间 (V2) : 2026/03/06 17:05:46

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX258)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:wangdan

处理者:wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.016	34767	100.000	6103	3225	1.336	--
总计		34767	100.000	6103			

图93 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025121551批-pH6.8介质-浆法-50转-45min-片1
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 0-40/9-95-2 - zzp-2025121551p-rcqx-pH6.8jz-2-jf50z-p2-45min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rcqx-FX258.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260305-FX258.lcb

样品瓶号 : 2-15

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/03/06 00:54:32

处理时间 (V2) : 2026/03/06 17:05:53

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX258)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:wangdan

处理者:wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.015	34809	100.000	6137	3222	1.338	--
总计		34809	100.000	6137			

图94 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025121551批-pH6.8介质-浆法-50转-45min-片2
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 0-40/9-96-2 - zzp-2025121551p-rcqx-pH6.8jz-2-jf50z-p3-45min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rcqx-FX258.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260305-FX258.lcb

样品瓶号 : 2-24

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/03/06 00:57:56

处理时间 (V2) : 2026/03/06 17:06:01

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX258)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:wangdan

处理者:wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.016	36232	100.000	6348	3227	1.345	--
总计		36232	100.000	6348			

图95 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025121551批-pH6.8介质-浆法-50转-45min-片3
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 0-40/9-97-2 - zzp-2025121551p-rcqx-pH6.8jz-2-jf50z-p4-45min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rcqx-FX258.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260305-FX258.lcb

样品瓶号 : 2-33

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/03/06 01:01:21

处理时间 (V2) : 2026/03/06 17:06:09

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX258)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:wangdan

处理者:wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.016	37515	100.000	6569	3219	1.338	--
总计		37515	100.000	6569			

图96 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025121551批-pH6.8介质-浆法-50转-45min-片4
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 0-40/9-98-2 - zzp-2025121551p-rcqx-pH6.8jz-2-jf50z-p5-45min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rcqx-FX258.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260305-FX258.lcb

样品瓶号 : 2-42

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/03/06 01:04:45

处理时间 (V2) : 2026/03/06 17:06:17

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX258)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:wangdan

处理者:wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.016	37425	100.000	6586	3229	1.333	--
总计		37425	100.000	6586			

图97 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025121551批-pH6.8介质-浆法-50转-45min-片5
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 0-40/9-99-2 - zzp-2025121551p-rcqx-pH6.8jz-2-jf50z-p6-45min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rcqx-FX258.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260305-FX258.lcb

样品瓶号 : 2-51

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/03/06 01:08:08

处理时间 (V2) : 2026/03/06 17:06:26

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX258)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:wangdan

处理者:wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.017	38471	100.000	6715	3223	1.342	--
总计		38471	100.000	6715			

图98 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025121551批-pH6.8介质-浆法-50转-45min-片6
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 0-40/9-100-2 - zzp-2025121551p-rcqx-pH6.8jz-2-jf50z-p1-60min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rcqx-FX258.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260305-FX258.lcb

样品瓶号 : 2-7

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/03/06 01:11:32

处理时间 (V2) : 2026/03/06 17:06:34

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX258)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:wangdan

处理者:wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.016	35463	100.000	6242	3229	1.337	--
总计		35463	100.000	6242			

图99 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025121551批-pH6.8介质-浆法-50转-60min-片1
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 0-40/9-101-2 - zzp-2025121551p-rcqx-pH6.8jz-2-jf50z-p2-60min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rcqx-FX258.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260305-FX258.lcb

样品瓶号 : 2-16

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/03/06 01:14:57

处理时间 (V2) : 2026/03/06 17:06:42

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX258)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:wangdan

处理者:wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.015	36516	100.000	6371	3202	1.349	--
总计		36516	100.000	6371			

图100 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025121551批-pH6.8介质-浆法-50转-60min-片2
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 0-40/9-102-2 - zzp-2025121551p-rcqx-pH6.8jz-2-jf50z-p3-60min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rcqx-FX258.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260305-FX258.lcb

样品瓶号 : 2-25

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/03/06 01:18:20

处理时间 (V2) : 2026/03/06 17:06:50

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX258)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:wangdan

处理者:wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.015	36933	100.000	6488	3215	1.336	--
总计		36933	100.000	6488			

图101 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025121551批-pH6.8介质-浆法-50转-60min-片3
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 0-40/9-103-2 - zzp-2025121551p-rcqx-pH6.8jz-2-jf50z-p4-60min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rcqx-FX258.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260305-FX258.lcb

样品瓶号 : 2-34

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/03/06 01:21:44

处理时间 (V2) : 2026/03/06 17:06:59

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX258)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:wangdan

处理者:wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.016	38037	100.000	6680	3222	1.335	--
总计		38037	100.000	6680			

图102 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025121551批-pH6.8介质-浆法-50转-60min-片4
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 0-40/9-104-2 - zzp-2025121551p-rcqx-pH6.8jz-2-jf50z-p5-60min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rcqx-FX258.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260305-FX258.lcb

样品瓶号 : 2-43

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/03/06 01:25:08

处理时间 (V2) : 2026/03/06 17:07:07

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX258)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:wangdan

处理者:wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.016	38218	100.000	6692	3214	1.336	--
总计		38218	100.000	6692			

图103 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025121551批-pH6.8介质-浆法-50转-60min-片5
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 0-40/9-105-2 - zzp-2025121551p-rcqx-pH6.8jz-2-jf50z-p6-60min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rcqx-FX258.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260305-FX258.lcb

样品瓶号 : 2-52

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/03/06 01:28:32

处理时间 (V2) : 2026/03/06 17:07:16

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX258)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:wangdan

处理者:wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.016	38649	100.000	6762	3215	1.349	--
总计		38649	100.000	6762			

图104 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025121551批-pH6.8介质-浆法-50转-60min-片6
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 0-40/9-106-2 - zzp-2025121551p-rcqx-pH6.8jz-2-jf50z-p1-jx.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rcqx-FX258.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260305-FX258.lcb

样品瓶号 : 2-8

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/03/06 01:31:56

处理时间 (V2) : 2026/03/06 17:07:23

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX258)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:wangdan

处理者:wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.015	37415	100.000	6536	3200	1.342	--
总计		37415	100.000	6536			

图105 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025121551批-pH6.8介质-桨法-50转-极限转速-片1
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 0-40/9-107-2 - zzp-2025121551p-rcqx-pH6.8jz-2-jf50z-p2-jx.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rcqx-FX258.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260305-FX258.lcb

样品瓶号 : 2-17

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/03/06 01:35:20

处理时间 (V2) : 2026/03/06 17:07:31

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX258)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:wangdan

处理者:wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.016	37470	100.000	6570	3216	1.338	--
总计		37470	100.000	6570			

图106 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025121551批-pH6.8介质-桨法-50转-极限转速-片2
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 0-40/9-108-2 - zzp-2025121551p-rcqx-pH6.8jz-2-jf50z-p3-jx.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rcqx-FX258.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260305-FX258.lcb

样品瓶号 : 2-26

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/03/06 01:38:44

处理时间 (V2) : 2026/03/06 17:07:39

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX258)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:wangdan

处理者:wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.016	38100	100.000	6670	3207	1.336	--
总计		38100	100.000	6670			

图107 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025121551批-pH6.8介质-桨法-50转-极限转速-片3
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 0-40/9-109-2 - zzp-2025121551p-rcqx-pH6.8jz-2-jf50z-p4-jx.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rcqx-FX258.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260305-FX258.lcb

样品瓶号 : 2-35

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/03/06 01:42:09

处理时间 (V2) : 2026/03/06 17:07:46

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX258)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:wangdan

处理者:wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.017	38651	100.000	6770	3212	1.327	--
总计		38651	100.000	6770			

图108 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025121551批-pH6.8介质-桨法-50转-极限转速-片4
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 0-40/9-110-2 - zzp-2025121551p-rcqx-pH6.8jz-2-jf50z-p5-jx.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rcqx-FX258.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260305-FX258.lcb

样品瓶号 : 2-44

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/03/06 01:45:32

处理时间 (V2) : 2026/03/06 17:07:54

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX258)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:wangdan

处理者:wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.016	38305	100.000	6702	3206	1.339	--
总计		38305	100.000	6702			

图109 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025121551批-pH6.8介质-桨法-50转-极限转速-片5
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 0-40/9-111-2 - zzp-2025121551p-rcqx-pH6.8jz-2-jf50z-p6-jx.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rcqx-FX258.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260305-FX258.lcb

样品瓶号 : 2-53

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/03/06 01:48:56

处理时间 (V2) : 2026/03/06 17:08:01

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX258)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:wangdan

处理者:wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.016	38627	100.000	6762	3206	1.336	--
总计		38627	100.000	6762			

图110 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025121551批-pH6.8介质-桨法-50转-极限转速-片6
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 0-40/9-112-2 - zzp-2025121551p-rcqx-pH6.8jz-2-jf50z-dz2-1.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rcqx-FX258.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260305-FX258.lcb

样品瓶号 : 2-27

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/03/06 01:52:20

处理时间 (V2) : 2026/03/06 17:08:09

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX258)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:wangdan

处理者:wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.988	55447	100.000	8933	2558	1.239	--
总计		55447	100.000	8933			

图111 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025121551批-pH6.8介质-桨法-50转
对照品溶液-2-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 0-40/9-113-2 - zzp-2025121551p-rcqx-pH6.8jz-2-jf50z-dz2-2.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rcqx-FX258.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260305-FX258.lcb

样品瓶号 : 2-27

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/03/06 01:55:44

处理时间 (V2) : 2026/03/06 17:08:16

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX258)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:wangdan

处理者:wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.989	55508	100.000	8934	2560	1.243	--
总计		55508	100.000	8934			

图112 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025121551批-pH6.8介质-桨法-50转
对照品溶液-2-2



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 0-40/9-114-2 - zzp-2025121651p-rcqx-pH6.8jz-1-jf50z-rj.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rcqx-FX258.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260305-FX258.lcb

样品瓶号 : 3-9

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/03/06 01:59:07

处理时间 (V2) : 2026/03/06 17:08:24

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX258)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:wangdan

处理者:wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图113 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025121651批-pH6.8介质-桨法-50转
溶剂



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 0-40/9-115-2 - zzp-2025121651p-rcqx-pH6.8jz-1-jf50z-dz1-1.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rcqx-FX258.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260305-FX258.lcb

样品瓶号 : 3-18

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/03/06 02:02:30

处理时间 (V2) : 2026/03/06 17:08:32

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX258)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:wangdan

处理者:wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.989	55686	100.000	8964	2562	1.243	--
总计		55686	100.000	8964			

图114 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025121651批-pH6.8介质-桨法-50转
对照品溶液-1-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 0-40/9-116-2 - zzp-2025121651p-rcqx-pH6.8jz-1-jf50z-dz1-2.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rcqx-FX258.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260305-FX258.lcb

样品瓶号 : 3-18

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/03/06 02:05:53

处理时间 (V2) : 2026/03/06 17:08:39

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX258)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:wangdan

处理者:wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.989	55702	100.000	8968	2561	1.244	--
总计		55702	100.000	8968			

图115 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025121651批-pH6.8介质-桨法-50转
对照品溶液-1-2



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 0-40/9-117-2 - zzp-2025121651p-rcqx-pH6.8jz-1-jf50z-dz1-3.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rcqx-FX258.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260305-FX258.lcb

样品瓶号 : 3-18

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/03/06 02:09:15

处理时间 (V2) : 2026/03/06 17:08:47

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX258)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:wangdan

处理者:wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.989	55676	100.000	8959	2564	1.244	--
总计		55676	100.000	8959			

图116 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025121651批-pH6.8介质-桨法-50转
对照品溶液-1-3



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 0-40/9-118-2 - zzp-2025121651p-rcqx-pH6.8jz-1-jf50z-dz1-4.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rcqx-FX258.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260305-FX258.lcb

样品瓶号 : 3-18

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/03/06 02:12:37

处理时间 (V2) : 2026/03/06 17:08:54

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX258)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:wangdan

处理者:wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.989	55575	100.000	8963	2563	1.237	--
总计		55575	100.000	8963			

图117 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025121651批-pH6.8介质-桨法-50转
对照品溶液-1-4



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 0-40/9-119-2 - zzp-2025121651p-rcqx-pH6.8jz-1-jf50z-dz1-5.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rcqx-FX258.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260305-FX258.lcb

样品瓶号 : 3-18

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/03/06 02:16:00

处理时间 (V2) : 2026/03/06 17:09:02

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX258)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:wangdan

处理者:wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.990	55622	100.000	8963	2564	1.241	--
总计		55622	100.000	8963			

图118 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025121651批-pH6.8介质-桨法-50转
对照品溶液-1-5



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 0-40/9-120-2 - zzp-2025121651p-rcqx-pH6.8jz-1-jf50z-p1-5min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rcqx-FX258.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260305-FX258.lcb

样品瓶号 : 3-1

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/03/06 02:19:21

处理时间 (V2) : 2026/03/06 17:09:10

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX258)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:wangdan

处理者:wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.013	19237	100.000	3371	3196	1.353	--
总计		19237	100.000	3371			

图119 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025121651批-pH6.8介质-浆法-50转-5min-片1
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 0-40/9-121-2 - zzp-2025121651p-rcqx-pH6.8jz-1-jf50z-p2-5min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rcqx-FX258.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260305-FX258.lcb

样品瓶号 : 3-10

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/03/06 02:22:43

处理时间 (V2) : 2026/03/06 17:09:18

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX258)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:wangdan

处理者:wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.013	19742	100.000	3473	3198	1.354	--
总计		19742	100.000	3473			

图120 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025121651批-pH6.8介质-浆法-50转-5min-片2
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 0-40/9-122-2 - zzp-2025121651p-rcqx-pH6.8jz-1-jf50z-p3-5min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rcqx-FX258.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260305-FX258.lcb

样品瓶号 : 3-19

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/03/06 02:26:05

处理时间 (V2) : 2026/03/06 17:09:26

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX258)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:wangdan

处理者:wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.013	20890	100.000	3660	3199	1.369	--
总计		20890	100.000	3660			

图121 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025121651批-pH6.8介质-浆法-50转-5min-片3
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 0-40/9-123-2 - zzp-2025121651p-rcqx-pH6.8jz-1-jf50z-p4-5min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rcqx-FX258.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260305-FX258.lcb

样品瓶号 : 3-28

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/03/06 02:29:27

处理时间 (V2) : 2026/03/06 17:09:34

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX258)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:wangdan

处理者:wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.014	22803	100.000	3996	3193	1.361	--
总计		22803	100.000	3996			

图122 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025121651批-pH6.8介质-浆法-50转-5min-片4
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 0-40/9-124-2 - zzp-2025121651p-rcqx-pH6.8jz-1-jf50z-p5-5min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rcqx-FX258.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260305-FX258.lcb

样品瓶号 : 3-37

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/03/06 02:32:48

处理时间 (V2) : 2026/03/06 17:09:43

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX258)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:wangdan

处理者:wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.014	22796	100.000	3991	3193	1.356	--
总计		22796	100.000	3991			

图123 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025121651批-pH6.8介质-浆法-50转-5min-片5
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 0-40/9-125-2 - zzp-2025121651p-rcqx-pH6.8jz-1-jf50z-p6-5min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rcqx-FX258.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260305-FX258.lcb

样品瓶号 : 3-46

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/03/06 02:36:10

处理时间 (V2) : 2026/03/06 17:09:51

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX258)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:wangdan

处理者:wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.015	25377	100.000	4433	3185	1.352	--
总计		25377	100.000	4433			

图124 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025121651批-pH6.8介质-浆法-50转-5min-片6
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 0-40/9-126-2 - zzp-2025121651p-rcqx-pH6.8jz-1-jf50z-p1-10min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rcqx-FX258.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260305-FX258.lcb

样品瓶号 : 3-2

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/03/06 02:39:31

处理时间 (V2) : 2026/03/06 17:10:00

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX258)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:wangdan

处理者:wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.014	21938	100.000	3828	3179	1.363	--
总计		21938	100.000	3828			

图125 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025121651批-pH6.8介质-浆法-50转-10min-片1
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 0-40/9-127-2 - zzp-2025121651p-rcqx-pH6.8jz-1-jf50z-p2-10min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rcqx-FX258.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260305-FX258.lcb

样品瓶号 : 3-11

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/03/06 02:42:54

处理时间 (V2) : 2026/03/06 17:10:09

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX258)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:wangdan

处理者:wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.013	22201	100.000	3881	3180	1.357	--
总计		22201	100.000	3881			

图126 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025121651批-pH6.8介质-浆法-50转-10min-片2
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 0-40/9-128-2 - zzp-2025121651p-rcqx-pH6.8jz-1-jf50z-p3-10min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rcqx-FX258.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260305-FX258.lcb

样品瓶号 : 3-20

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/03/06 02:46:15

处理时间 (V2) : 2026/03/06 17:10:17

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX258)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:wangdan

处理者:wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.013	23418	100.000	4085	3171	1.358	--
总计		23418	100.000	4085			

图127 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025121651批-pH6.8介质-浆法-50转-10min-片3
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 0-40/9-129-2 - zzp-2025121651p-rcqx-pH6.8jz-1-jf50z-p4-10min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rcqx-FX258.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260305-FX258.lcb

样品瓶号 : 3-29

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/03/06 02:49:37

处理时间 (V2) : 2026/03/06 17:10:26

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX258)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:wangdan

处理者:wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.014	25709	100.000	4499	3183	1.356	--
总计		25709	100.000	4499			

图128 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025121651批-pH6.8介质-浆法-50转-10min-片4
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 0-40/9-130-2 - zzp-2025121651p-rcqx-pH6.8jz-1-jf50z-p5-10min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rcqx-FX258.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260305-FX258.lcb

样品瓶号 : 3-38

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/03/06 02:52:59

处理时间 (V2) : 2026/03/06 17:10:35

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX258)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:wangdan

处理者:wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.015	25933	100.000	4525	3181	1.354	--
总计		25933	100.000	4525			

图129 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025121651批-pH6.8介质-浆法-50转-10min-片5
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 0-40/9-131-2 - zzp-2025121651p-rcqx-pH6.8jz-1-jf50z-p6-10min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rcqx-FX258.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260305-FX258.lcb

样品瓶号 : 3-47

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/03/06 02:56:21

处理时间 (V2) : 2026/03/06 17:10:42

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX258)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:wangdan

处理者:wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.015	28005	100.000	4891	3173	1.349	--
总计		28005	100.000	4891			

图130 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025121651批-pH6.8介质-浆法-50转-10min-片6
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 0-40/9-132-2 - zzp-2025121651p-rcqx-pH6.8jz-1-jf50z-p1-15min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rcqx-FX258.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260305-FX258.lcb

样品瓶号 : 3-3

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/03/06 02:59:43

处理时间 (V2) : 2026/03/06 17:10:51

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX258)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:wangdan

处理者:wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.013	23970	100.000	4183	3167	1.352	--
总计		23970	100.000	4183			

图131 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025121651批-pH6.8介质-浆法-50转-15min-片1
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 0-40/9-133-2 - zzp-2025121651p-rcqx-pH6.8jz-1-jf50z-p2-15min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rcqx-FX258.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260305-FX258.lcb

样品瓶号 : 3-12

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/03/06 03:03:05

处理时间 (V2) : 2026/03/06 17:10:59

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX258)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:wangdan

处理者:wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.014	24211	100.000	4227	3168	1.352	--
总计		24211	100.000	4227			

图132 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025121651批-pH6.8介质-浆法-50转-15min-片2
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 0-40/9-134-2 - zzp-2025121651p-rcqx-pH6.8jz-1-jf50z-p3-15min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rcqx-FX258.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260305-FX258.lcb

样品瓶号 : 3-21

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/03/06 03:06:26

处理时间 (V2) : 2026/03/06 17:11:08

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX258)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:wangdan

处理者:wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.014	25156	100.000	4402	3173	1.347	--
总计		25156	100.000	4402			

图133 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025121651批-pH6.8介质-浆法-50转-15min-片3
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 0-40/9-135-2 - zzp-2025121651p-rcqx-pH6.8jz-1-jf50z-p4-15min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rcqx-FX258.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260305-FX258.lcb

样品瓶号 : 3-30

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/03/06 03:09:48

处理时间 (V2) : 2026/03/06 17:11:16

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX258)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:wangdan

处理者:wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.013	27789	100.000	4869	3175	1.338	--
总计		27789	100.000	4869			

图134 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025121651批-pH6.8介质-浆法-50转-15min-片4
供试品溶液-1




QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温 : 30°C
数据文件名: RC\$QTL-392 - 0-40/9-136-2 - zzp-2025121651p-rcqx-pH6.8jz-1-jf50z-p5-15min.lcd
方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rcqx-FX258.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260305-FX258.lcb
样品瓶号 : 3-39
进样体积 : 20μl
进样时间 : 2026/03/06 03:13:09
处理时间 (V2) : 2026/03/06 17:11:24
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX258)

流速: 1.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者:wangdan
处理者:wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.014	27676	100.000	4842	3169	1.345	--
总计		27676	100.000	4842			

图135 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025121651批-pH6.8介质-浆法-50转-15min-片5
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 0-40/9-137-2 - zzp-2025121651p-rcqx-pH6.8jz-1-jf50z-p6-15min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rcqx-FX258.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260305-FX258.lcb

样品瓶号 : 3-48

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/03/06 03:16:31

处理时间 (V2) : 2026/03/06 17:11:33

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX258)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:wangdan

处理者:wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.014	29840	100.000	5195	3159	1.352	--
总计		29840	100.000	5195			

图136 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025121651批-pH6.8介质-浆法-50转-15min-片6
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 0-40/9-138-2 - zzp-2025121651p-rcqx-pH6.8jz-1-jf50z-p1-20min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rcqx-FX258.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260305-FX258.lcb

样品瓶号 : 3-4

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/03/06 03:19:53

处理时间 (V2) : 2026/03/06 17:11:41

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX258)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:wangdan

处理者:wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.014	25623	100.000	4463	3162	1.356	--
总计		25623	100.000	4463			

图137 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025121651批-pH6.8介质-浆法-50转-20min-片1
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 0-40/9-139-2 - zzp-2025121651p-rcqx-pH6.8jz-1-jf50z-p2-20min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rcqx-FX258.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260305-FX258.lcb

样品瓶号 : 3-13

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/03/06 03:23:14

处理时间 (V2) : 2026/03/06 17:11:49

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX258)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:wangdan

处理者:wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.014	25726	100.000	4483	3157	1.346	--
总计		25726	100.000	4483			

图138 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025121651批-pH6.8介质-浆法-50转-20min-片2
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 0-40/9-140-2 - zzp-2025121651p-rcqx-pH6.8jz-1-jf50z-p3-20min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rcqx-FX258.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260305-FX258.lcb

样品瓶号 : 3-22

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/03/06 03:26:35

处理时间 (V2) : 2026/03/06 17:11:58

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX258)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:wangdan

处理者:wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.013	26753	100.000	4670	3160	1.343	--
总计		26753	100.000	4670			

图139 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025121651批-pH6.8介质-浆法-50转-20min-片3
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 0-40/9-141-2 - zzp-2025121651p-rcqx-pH6.8jz-1-jf50z-p4-20min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rcqx-FX258.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260305-FX258.lcb

样品瓶号 : 3-31

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/03/06 03:29:56

处理时间 (V2) : 2026/03/06 17:12:06

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX258)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:wangdan

处理者:wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.014	29708	100.000	5147	3151	1.359	--
总计		29708	100.000	5147			

图140 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025121651批-pH6.8介质-浆法-50转-20min-片4
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 0-40/9-142-2 - zzp-2025121651p-rcqx-pH6.8jz-1-jf50z-p5-20min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rcqx-FX258.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260305-FX258.lcb

样品瓶号 : 3-40

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/03/06 03:33:18

处理时间 (V2) : 2026/03/06 17:12:15

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX258)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:wangdan

处理者:wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.014	29063	100.000	5065	3158	1.341	--
总计		29063	100.000	5065			

图141 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025121651批-pH6.8介质-浆法-50转-20min-片5
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 0-40/9-143-2 - zzp-2025121651p-rcqx-pH6.8jz-1-jf50z-p6-20min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rcqx-FX258.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260305-FX258.lcb

样品瓶号 : 3-49

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/03/06 03:36:40

处理时间 (V2) : 2026/03/06 17:12:23

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX258)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:wangdan

处理者:wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.015	31114	100.000	5398	3148	1.355	--
总计		31114	100.000	5398			

图142 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025121651批-pH6.8介质-浆法-50转-20min-片6
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 0-40/9-144-2 - zzp-2025121651p-rcqx-pH6.8jz-1-jf50z-p1-30min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rcqx-FX258.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260305-FX258.lcb

样品瓶号 : 3-5

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/03/06 03:40:02

处理时间 (V2) : 2026/03/06 17:12:32

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX258)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:wangdan

处理者:wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.014	27749	100.000	4827	3148	1.354	--
总计		27749	100.000	4827			

图143 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025121651批-pH6.8介质-浆法-50转-30min-片1
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 0-40/9-145-2 - zzp-2025121651p-rcqx-pH6.8jz-1-jf50z-p2-30min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rcqx-FX258.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260305-FX258.lcb

样品瓶号 : 3-14

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/03/06 03:43:24

处理时间 (V2) : 2026/03/06 17:12:41

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX258)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:wangdan

处理者:wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.014	27566	100.000	4792	3142	1.348	--
总计		27566	100.000	4792			

图144 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025121651批-pH6.8介质-浆法-50转-30min-片2
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 0-40/9-146-2 - zzp-2025121651p-rcqx-pH6.8jz-1-jf50z-p3-30min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rcqx-FX258.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260305-FX258.lcb

样品瓶号 : 3-23

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/03/06 03:46:46

处理时间 (V2) : 2026/03/06 17:12:49

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX258)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:wangdan

处理者:wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.014	28628	100.000	4984	3145	1.339	--
总计		28628	100.000	4984			

图145 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025121651批-pH6.8介质-浆法-50转-30min-片3
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 0-40/9-147-2 - zzp-2025121651p-rcqx-pH6.8jz-1-jf50z-p4-30min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rcqx-FX258.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260305-FX258.lcb

样品瓶号 : 3-32

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/03/06 03:50:08

处理时间 (V2) : 2026/03/06 17:12:58

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX258)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:wangdan

处理者:wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.015	31452	100.000	5456	3141	1.347	--
总计		31452	100.000	5456			

图146 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025121651批-pH6.8介质-浆法-50转-30min-片4
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 0-40/9-148-2 - zzp-2025121651p-rcqx-pH6.8jz-1-jf50z-p5-30min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rcqx-FX258.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260305-FX258.lcb

样品瓶号 : 3-41

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/03/06 03:53:29

处理时间 (V2) : 2026/03/06 17:13:06

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX258)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:wangdan

处理者:wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.014	30327	100.000	5264	3132	1.339	--
总计		30327	100.000	5264			

图147 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025121651批-pH6.8介质-浆法-50转-30min-片5
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 0-40/9-149-2 - zzp-2025121651p-rcqx-pH6.8jz-1-jf50z-p6-30min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rcqx-FX258.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260305-FX258.lcb

样品瓶号 : 3-50

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/03/06 03:56:50

处理时间 (V2) : 2026/03/06 17:13:15

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX258)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:wangdan

处理者:wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.016	32490	100.000	5614	3138	1.343	--
总计		32490	100.000	5614			

图148 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025121651批-pH6.8介质-浆法-50转-30min-片6
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 0-40/9-150-2 - zzp-2025121651p-rcqx-pH6.8jz-1-jf50z-p1-45min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rcqx-FX258.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260305-FX258.lcb

样品瓶号 : 3-6

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/03/06 04:00:12

处理时间 (V2) : 2026/03/06 17:13:23

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX258)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:wangdan

处理者:wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.014	30033	100.000	5183	3125	1.349	--
总计		30033	100.000	5183			

图149 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025121651批-pH6.8介质-浆法-50转-45min-片1
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 0-40/9-151-2 - zzp-2025121651p-rcqx-pH6.8jz-1-jf50z-p2-45min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rcqx-FX258.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260305-FX258.lcb

样品瓶号 : 3-15

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/03/06 04:03:34

处理时间 (V2) : 2026/03/06 17:13:31

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX258)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:wangdan

处理者:wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.015	29807	100.000	5158	3128	1.344	--
总计		29807	100.000	5158			

图150 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025121651批-pH6.8介质-浆法-50转-45min-片2
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 0-40/9-152-2 - zzp-2025121651p-rcqx-pH6.8jz-1-jf50z-p3-45min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rcqx-FX258.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260305-FX258.lcb

样品瓶号 : 3-24

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/03/06 04:06:55

处理时间 (V2) : 2026/03/06 17:13:39

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX258)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:wangdan

处理者:wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.016	30714	100.000	5301	3126	1.343	--
总计		30714	100.000	5301			

图151 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025121651批-pH6.8介质-浆法-50转-45min-片3
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 0-40/9-153-2 - zzp-2025121651p-rcqx-pH6.8jz-1-jf50z-p4-45min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rcqx-FX258.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260305-FX258.lcb

样品瓶号 : 3-33

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/03/06 04:10:16

处理时间 (V2) : 2026/03/06 17:13:46

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX258)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:wangdan

处理者:wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.015	33244	100.000	5737	3129	1.339	--
总计		33244	100.000	5737			

图152 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025121651批-pH6.8介质-浆法-50转-45min-片4
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 0-40/9-154-2 - zzp-2025121651p-rcqx-pH6.8jz-1-jf50z-p5-45min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rcqx-FX258.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260305-FX258.lcb

样品瓶号 : 3-42

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/03/06 04:13:37

处理时间 (V2) : 2026/03/06 17:13:54

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX258)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:wangdan

处理者:wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.015	32335	100.000	5581	3124	1.344	--
总计		32335	100.000	5581			

图153 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025121651批-pH6.8介质-浆法-50转-45min-片5
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 0-40/9-155-2 - zzp-2025121651p-rcqx-pH6.8jz-1-jf50z-p6-45min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rcqx-FX258.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260305-FX258.lcb

样品瓶号 : 3-51

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/03/06 04:16:57

处理时间 (V2) : 2026/03/06 17:14:02

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX258)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:wangdan

处理者:wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.016	33965	100.000	5857	3121	1.335	--
总计		33965	100.000	5857			

图154 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025121651批-pH6.8介质-浆法-50转-45min-片6
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 0-40/9-156-2 - zzp-2025121651p-rcqx-pH6.8jz-1-jf50z-p1-60min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rcqx-FX258.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260305-FX258.lcb

样品瓶号 : 3-7

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/03/06 04:20:18

处理时间 (V2) : 2026/03/06 17:14:10

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX258)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:wangdan

处理者:wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.016	31998	100.000	5535	3118	1.334	--
总计		31998	100.000	5535			

图155 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025121651批-pH6.8介质-浆法-50转-60min-片1
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 0-40/9-157-2 - zzp-2025121651p-rcqx-pH6.8jz-1-jf50z-p2-60min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rcqx-FX258.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260305-FX258.lcb

样品瓶号 : 3-16

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/03/06 04:23:40

处理时间 (V2) : 2026/03/06 17:14:18

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX258)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:wangdan

处理者:wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.016	31424	100.000	5426	3118	1.340	--
总计		31424	100.000	5426			

图156 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025121651批-pH6.8介质-浆法-50转-60min-片2
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 0-40/9-158-2 - zzp-2025121651p-rcqx-pH6.8jz-1-jf50z-p3-60min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rcqx-FX258.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260305-FX258.lcb

样品瓶号 : 3-25

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/03/06 04:27:02

处理时间 (V2) : 2026/03/06 17:14:25

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX258)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:wangdan

处理者:wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.015	32403	100.000	5590	3116	1.339	--
总计		32403	100.000	5590			

图157 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025121651批-pH6.8介质-浆法-50转-60min-片3
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 0-40/9-159-2 - zzp-2025121651p-rcqx-pH6.8jz-1-jf50z-p4-60min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rcqx-FX258.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260305-FX258.lcb

样品瓶号 : 3-34

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/03/06 04:30:24

处理时间 (V2) : 2026/03/06 17:14:33

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX258)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:wangdan

处理者:wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.016	34378	100.000	5915	3116	1.366	--
总计		34378	100.000	5915			

图158 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025121651批-pH6.8介质-浆法-50转-60min-片4
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 0-40/9-160-2 - zzp-2025121651p-rcqx-pH6.8jz-1-jf50z-p5-60min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rcqx-FX258.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260305-FX258.lcb

样品瓶号 : 3-43

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/03/06 04:33:45

处理时间 (V2) : 2026/03/06 17:14:41

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX258)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:wangdan

处理者:wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.016	33521	100.000	5743	3095	1.353	--
总计		33521	100.000	5743			

图159 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025121651批-pH6.8介质-浆法-50转-60min-片5
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 0-40/9-161-2 - zzp-2025121651p-rcqx-pH6.8jz-1-jf50z-p6-60min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rcqx-FX258.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260305-FX258.lcb

样品瓶号 : 3-52

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/03/06 04:37:06

处理时间 (V2) : 2026/03/06 17:14:49

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX258)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:wangdan

处理者:wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.017	34753	100.000	5973	3106	1.337	--
总计		34753	100.000	5973			

图160 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025121651批-pH6.8介质-浆法-50转-60min-片6
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30℃

数据文件名: RC\$QTL-392 - 0-40/9-162-2 - zzp-2025121651p-rcqx-pH6.8jz-1-jf50z-p1-jx.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rcqx-FX258.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260305-FX258.lcb

样品瓶号 : 3-8

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/03/06 04:40:28

处理时间 (V2) : 2026/03/06 17:14:56

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX258)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:wangdan

处理者:wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.015	35145	100.000	6030	3093	1.337	--
总计		35145	100.000	6030			

图161 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025121651批-pH6.8介质-桨法-50转-极限转速-片1
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 0-40/9-163-2 - zzp-2025121651p-rcqx-pH6.8jz-1-jf50z-p2-jx.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rcqx-FX258.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260305-FX258.lcb

样品瓶号 : 3-17

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/03/06 04:43:50

处理时间 (V2) : 2026/03/06 17:15:04

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX258)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:wangdan

处理者:wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.015	35332	100.000	6058	3085	1.337	--
总计		35332	100.000	6058			

图162 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025121651批-pH6.8介质-桨法-50转-极限转速-片2
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 0-40/9-164-2 - zzp-2025121651p-rcqx-pH6.8jz-1-jf50z-p3-jx.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rcqx-FX258.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260305-FX258.lcb

样品瓶号 : 3-26

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/03/06 04:47:12

处理时间 (V2) : 2026/03/06 17:15:12

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX258)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:wangdan

处理者:wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.015	35099	100.000	6062	3098	1.326	--
总计		35099	100.000	6062			

图163 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025121651批-pH6.8介质-桨法-50转-极限转速-片3
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 0-40/9-165-2 - zzp-2025121651p-rcqx-pH6.8jz-1-jf50z-p4-jx.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rcqx-FX258.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260305-FX258.lcb

样品瓶号 : 3-35

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/03/06 04:50:34

处理时间 (V2) : 2026/03/06 17:15:20

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX258)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:wangdan

处理者:wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.016	36175	100.000	6193	3086	1.335	--
总计		36175	100.000	6193			

图164 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025121651批-pH6.8介质-桨法-50转-极限转速-片4
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 0-40/9-166-2 - zzp-2025121651p-rcqx-pH6.8jz-1-jf50z-p5-jx.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rcqx-FX258.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260305-FX258.lcb

样品瓶号 : 3-44

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/03/06 04:53:56

处理时间 (V2) : 2026/03/06 17:15:27

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX258)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:wangdan

处理者:wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.017	35837	100.000	6119	3087	1.338	--
总计		35837	100.000	6119			

图165 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025121651批-pH6.8介质-桨法-50转-极限转速-片5
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 0-40/9-167-2 - zzp-2025121651p-rcqx-pH6.8jz-1-jf50z-p6-jx.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rcqx-FX258.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260305-FX258.lcb

样品瓶号 : 3-53

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/03/06 04:57:17

处理时间 (V2) : 2026/03/06 17:15:35

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX258)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:wangdan

处理者:wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.016	36641	100.000	6278	3079	1.333	--
总计		36641	100.000	6278			

图166 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025121651批-pH6.8介质-桨法-50转-极限转速-片6
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 0-40/9-168-2 - zzp-2025121651p-rcqx-pH6.8jz-1-jf50z-dz2-1.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rcqx-FX258.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260305-FX258.lcb

样品瓶号 : 3-27

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/03/06 05:00:40

处理时间 (V2) : 2026/03/06 17:15:42

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX258)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:wangdan

处理者:wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.988	55719	100.000	8815	2482	1.235	--
总计		55719	100.000	8815			

图167 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025121651批-pH6.8介质-桨法-50转
对照品溶液-2-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 0-40/9-169-2 - zzp-2025121651p-rcqx-pH6.8jz-1-jf50z-dz2-2.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rcqx-FX258.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260305-FX258.lcb

样品瓶号 : 3-27

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/03/06 05:04:03

处理时间 (V2) : 2026/03/06 17:15:50

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX258)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:wangdan

处理者:wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.989	55859	100.000	8829	2479	1.235	--
总计		55859	100.000	8829			

图168 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025121651批-pH6.8介质-桨法-50转
对照品溶液-2-2



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 0-40/9-170-2 - zzp-2025121651p-rcqx-pH6.8jz-2-jf50z-rj.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rcqx-FX258.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260305-FX258.lcb

样品瓶号 : 4-9

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/03/06 05:07:28

处理时间 (V2) : 2026/03/06 17:15:58

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX258)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:wangdan

处理者:wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图169 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025121651批-pH6.8介质-桨法-50转
溶剂



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 0-40/9-171-2 - zzp-2025121651p-rcqx-pH6.8jz-2-jf50z-dz1-1.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rcqx-FX258.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260305-FX258.lcb

样品瓶号 : 4-18

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/03/06 05:10:51

处理时间 (V2) : 2026/03/06 17:16:05

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX258)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:wangdan

处理者:wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.989	55788	100.000	8836	2484	1.232	--
总计		55788	100.000	8836			

图170 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025121651批-pH6.8介质-桨法-50转
对照品溶液-1-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 0-40/9-172-2 - zzp-2025121651p-rcqx-pH6.8jz-2-jf50z-dz1-2.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rcqx-FX258.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260305-FX258.lcb

样品瓶号 : 4-18

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/03/06 05:14:15

处理时间 (V2) : 2026/03/06 17:16:13

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX258)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:wangdan

处理者:wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.989	55678	100.000	8822	2486	1.231	--
总计		55678	100.000	8822			

图171 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025121651批-pH6.8介质-桨法-50转
对照品溶液-1-2



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 0-40/9-173-2 - zzp-2025121651p-rcqx-pH6.8jz-2-jf50z-dz1-3.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rcqx-FX258.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260305-FX258.lcb

样品瓶号 : 4-18

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/03/06 05:17:39

处理时间 (V2) : 2026/03/06 17:16:21

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX258)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:wangdan

处理者:wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.989	55851	100.000	8827	2482	1.237	--
总计		55851	100.000	8827			

图172 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025121651批-pH6.8介质-桨法-50转
对照品溶液-1-3



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 0-40/9-174-2 - zzp-2025121651p-rcqx-pH6.8jz-2-jf50z-dz1-4.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rcqx-FX258.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260305-FX258.lcb

样品瓶号 : 4-18

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/03/06 05:21:04

处理时间 (V2) : 2026/03/06 17:16:29

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX258)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:wangdan

处理者:wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.989	55872	100.000	8827	2483	1.235	--
总计		55872	100.000	8827			

图173 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025121651批-pH6.8介质-桨法-50转
对照品溶液-1-4



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 0-40/9-175-2 - zzp-2025121651p-rcqx-pH6.8jz-2-jf50z-dz1-5.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rcqx-FX258.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260305-FX258.lcb

样品瓶号 : 4-18

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/03/06 05:24:28

处理时间 (V2) : 2026/03/06 17:16:36

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX258)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:wangdan

处理者:wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.989	55881	100.000	8833	2481	1.236	--
总计		55881	100.000	8833			

图174 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025121651批-pH6.8介质-桨法-50转
对照品溶液-1-5



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 0-40/9-176-2 - zzp-2025121651p-rcqx-pH6.8jz-2-jf50z-p1-5min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rcqx-FX258.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260305-FX258.lcb

样品瓶号 : 4-1

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/03/06 05:27:51

处理时间 (V2) : 2026/03/06 17:16:44

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX258)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:wangdan

处理者:wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.015	26613	100.000	4572	3074	1.335	--
总计		26613	100.000	4572			

图175 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025121651批-pH6.8介质-浆法-50转-5min-片1
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 0-40/9-177-2 - zzp-2025121651p-rcqx-pH6.8jz-2-jf50z-p2-5min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rcqx-FX258.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260305-FX258.lcb

样品瓶号 : 4-10

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/03/06 05:31:13

处理时间 (V2) : 2026/03/06 17:16:52

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX258)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:wangdan

处理者:wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.014	26252	100.000	4523	3079	1.342	--
总计		26252	100.000	4523			

图176 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025121651批-pH6.8介质-浆法-50转-5min-片2
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 0-40/9-178-2 - zzp-2025121651p-rcqx-pH6.8jz-2-jf50z-p3-5min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rcqx-FX258.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260305-FX258.lcb

样品瓶号 : 4-19

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/03/06 05:34:35

处理时间 (V2) : 2026/03/06 17:16:59

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX258)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:wangdan

处理者:wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.015	27183	100.000	4658	3072	1.339	--
总计		27183	100.000	4658			

图177 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025121651批-pH6.8介质-浆法-50转-5min-片3
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 0-40/9-179-2 - zzp-2025121651p-rcqx-pH6.8jz-2-jf50z-p4-5min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rcqx-FX258.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260305-FX258.lcb

样品瓶号 : 4-28

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/03/06 05:37:57

处理时间 (V2) : 2026/03/06 17:17:07

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX258)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:wangdan

处理者:wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.015	28684	100.000	4916	3069	1.339	--
总计		28684	100.000	4916			

图178 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025121651批-pH6.8介质-浆法-50转-5min-片4
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 0-40/9-180-2 - zzp-2025121651p-rcqx-pH6.8jz-2-jf50z-p5-5min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rcqx-FX258.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260305-FX258.lcb

样品瓶号 : 4-37

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/03/06 05:41:19

处理时间 (V2) : 2026/03/06 17:17:15

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX258)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:wangdan

处理者:wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.015	29188	100.000	4998	3064	1.333	--
总计		29188	100.000	4998			

图179 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025121651批-pH6.8介质-浆法-50转-5min-片5
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 0-40/9-181-2 - zzp-2025121651p-rcqx-pH6.8jz-2-jf50z-p6-5min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rcqx-FX258.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260305-FX258.lcb

样品瓶号 : 4-46

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/03/06 05:44:42

处理时间 (V2) : 2026/03/06 17:17:23

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX258)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:wangdan

处理者:wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.016	30687	100.000	5237	3056	1.339	--
总计		30687	100.000	5237			

图180 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025121651批-pH6.8介质-浆法-50转-5min-片6
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 0-40/9-182-2 - zzp-2025121651p-rcqx-pH6.8jz-2-jf50z-p1-10min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rcqx-FX258.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260305-FX258.lcb

样品瓶号 : 4-2

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/03/06 05:48:05

处理时间 (V2) : 2026/03/06 17:17:30

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX258)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:wangdan

处理者:wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.015	29384	100.000	5034	3054	1.330	--
总计		29384	100.000	5034			

图181 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025121651批-pH6.8介质-浆法-50转-10min-片1
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 0-40/9-183-2 - zzp-2025121651p-rcqx-pH6.8jz-2-jf50z-p2-10min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rcqx-FX258.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260305-FX258.lcb

样品瓶号 : 4-11

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/03/06 05:51:27

处理时间 (V2) : 2026/03/06 17:17:38

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX258)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:wangdan

处理者:wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.015	29284	100.000	5009	3051	1.331	--
总计		29284	100.000	5009			

图182 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025121651批-pH6.8介质-浆法-50转-10min-片2
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 0-40/9-184-2 - zzp-2025121651p-rcqx-pH6.8jz-2-jf50z-p3-10min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rcqx-FX258.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260305-FX258.lcb

样品瓶号 : 4-20

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/03/06 05:54:50

处理时间 (V2) : 2026/03/06 17:17:46

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX258)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:wangdan

处理者:wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.016	30189	100.000	5126	3039	1.336	--
总计		30189	100.000	5126			

图183 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025121651批-pH6.8介质-浆法-50转-10min-片3
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 0-40/9-185-2 - zzp-2025121651p-rcqx-pH6.8jz-2-jf50z-p4-10min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rcqx-FX258.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260305-FX258.lcb

样品瓶号 : 4-29

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/03/06 05:58:13

处理时间 (V2) : 2026/03/06 17:17:53

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX258)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:wangdan

处理者:wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.016	31993	100.000	5449	3041	1.324	--
总计		31993	100.000	5449			

图184 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025121651批-pH6.8介质-浆法-50转-10min-片4
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 0-40/9-186-2 - zzp-2025121651p-rcqx-pH6.8jz-2-jf50z-p5-10min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rcqx-FX258.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260305-FX258.lcb

样品瓶号 : 4-38

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/03/06 06:01:35

处理时间 (V2) : 2026/03/06 17:18:01

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX258)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:wangdan

处理者:wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.016	32587	100.000	5538	3030	1.326	--
总计		32587	100.000	5538			

图185 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025121651批-pH6.8介质-浆法-50转-10min-片5
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 0-40/9-187-2 - zzp-2025121651p-rcqx-pH6.8jz-2-jf50z-p6-10min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rcqx-FX258.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260305-FX258.lcb

样品瓶号 : 4-47

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/03/06 06:04:56

处理时间 (V2) : 2026/03/06 17:18:09

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX258)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:wangdan

处理者:wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.017	33398	100.000	5670	3033	1.325	--
总计		33398	100.000	5670			

图186 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025121651批-pH6.8介质-浆法-50转-10min-片6
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 0-40/9-188-2 - zzp-2025121651p-rcqx-pH6.8jz-2-jf50z-p1-15min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rcqx-FX258.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260305-FX258.lcb

样品瓶号 : 4-3

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/03/06 06:08:19

处理时间 (V2) : 2026/03/06 17:18:17

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX258)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:wangdan

处理者:wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.015	31126	100.000	5313	3027	1.321	--
总计		31126	100.000	5313			

图187 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025121651批-pH6.8介质-浆法-50转-15min-片1
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 0-40/9-189-2 - zzp-2025121651p-rcqx-pH6.8jz-2-jf50z-p2-15min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rcqx-FX258.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260305-FX258.lcb

样品瓶号 : 4-12

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/03/06 06:11:42

处理时间 (V2) : 2026/03/06 17:18:24

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX258)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:wangdan

处理者:wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.015	31223	100.000	5303	3021	1.330	--
总计		31223	100.000	5303			

图188 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025121651批-pH6.8介质-浆法-50转-15min-片2
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 0-40/9-190-2 - zzp-2025121651p-rcqx-pH6.8jz-2-jf50z-p3-15min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rcqx-FX258.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260305-FX258.lcb

样品瓶号 : 4-21

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/03/06 06:15:06

处理时间 (V2) : 2026/03/06 17:18:32

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX258)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:wangdan

处理者:wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.015	31600	100.000	5398	3023	1.313	--
总计		31600	100.000	5398			

图189 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025121651批-pH6.8介质-浆法-50转-15min-片3
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 0-40/9-191-2 - zzp-2025121651p-rcqx-pH6.8jz-2-jf50z-p4-15min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rcqx-FX258.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260305-FX258.lcb

样品瓶号 : 4-30

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/03/06 06:18:29

处理时间 (V2) : 2026/03/06 17:18:40

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX258)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:wangdan

处理者:wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.016	33727	100.000	5729	3013	1.310	--
总计		33727	100.000	5729			

图190 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025121651批-pH6.8介质-浆法-50转-15min-片4
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 0-40/9-192-2 - zzp-2025121651p-rcqx-pH6.8jz-2-jf50z-p5-15min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rcqx-FX258.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260305-FX258.lcb

样品瓶号 : 4-39

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/03/06 06:21:52

处理时间 (V2) : 2026/03/06 17:18:48

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX258)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:wangdan

处理者:wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.015	34317	100.000	5798	2994	1.324	--
总计		34317	100.000	5798			

图191 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025121651批-pH6.8介质-浆法-50转-15min-片5
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 0-40/9-193-2 - zzp-2025121651p-rcqx-pH6.8jz-2-jf50z-p6-15min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rcqx-FX258.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260305-FX258.lcb

样品瓶号 : 4-48

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/03/06 06:25:15

处理时间 (V2) : 2026/03/06 17:18:55

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX258)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:wangdan

处理者:wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.016	34624	100.000	5883	3004	1.312	--
总计		34624	100.000	5883			

图192 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025121651批-pH6.8介质-浆法-50转-15min-片6
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 0-40/9-194-2 - zzp-2025121651p-rcqx-pH6.8jz-2-jf50z-p1-20min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rcqx-FX258.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260305-FX258.lcb

样品瓶号 : 4-4

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/03/06 06:28:39

处理时间 (V2) : 2026/03/06 17:19:03

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX258)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:wangdan

处理者:wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.016	32594	100.000	5506	2992	1.329	--
总计		32594	100.000	5506			

图193 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025121651批-pH6.8介质-浆法-50转-20min-片1
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 0-40/9-195-2 - zzp-2025121651p-rcqx-pH6.8jz-2-jf50z-p2-20min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rcqx-FX258.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260305-FX258.lcb

样品瓶号 : 4-13

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/03/06 06:32:02

处理时间 (V2) : 2026/03/06 17:19:11

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX258)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:wangdan

处理者:wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.015	32303	100.000	5468	2993	1.318	--
总计		32303	100.000	5468			

图194 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025121651批-pH6.8介质-浆法-50转-20min-片2
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 0-40/9-196-2 - zzp-2025121651p-rcqx-pH6.8jz-2-jf50z-p3-20min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rcqx-FX258.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260305-FX258.lcb

样品瓶号 : 4-22

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/03/06 06:35:25

处理时间 (V2) : 2026/03/06 17:19:18

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX258)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:wangdan

处理者:wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.016	33060	100.000	5582	2976	1.313	--
总计		33060	100.000	5582			

图195 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025121651批-pH6.8介质-浆法-50转-20min-片3
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 0-40/9-197-2 - zzp-2025121651p-rcqx-pH6.8jz-2-jf50z-p4-20min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rcqx-FX258.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260305-FX258.lcb

样品瓶号 : 4-31

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/03/06 06:38:48

处理时间 (V2) : 2026/03/06 17:19:26

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX258)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:wangdan

处理者:wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.015	35297	100.000	5939	2967	1.315	--
总计		35297	100.000	5939			

图196 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025121651批-pH6.8介质-浆法-50转-20min-片4
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 0-40/9-198-2 - zzp-2025121651p-rcqx-pH6.8jz-2-jf50z-p5-20min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rcqx-FX258.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260305-FX258.lcb

样品瓶号 : 4-40

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/03/06 06:42:12

处理时间 (V2) : 2026/03/06 17:19:34

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX258)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:wangdan

处理者:wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.016	35202	100.000	5985	2980	1.295	--
总计		35202	100.000	5985			

图197 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025121651批-pH6.8介质-浆法-50转-20min-片5
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 0-40/9-199-2 - zzp-2025121651p-rcqx-pH6.8jz-2-jf50z-p6-20min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rcqx-FX258.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260305-FX258.lcb

样品瓶号 : 4-49

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/03/06 06:45:36

处理时间 (V2) : 2026/03/06 17:19:41

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX258)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:wangdan

处理者:wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.016	35843	100.000	6029	2964	1.311	--
总计		35843	100.000	6029			

图198 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025121651批-pH6.8介质-浆法-50转-20min-片6
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 0-40/9-200-2 - zzp-2025121651p-rcqx-pH6.8jz-2-jf50z-p1-30min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rcqx-FX258.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260305-FX258.lcb

样品瓶号 : 4-5

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/03/06 06:49:00

处理时间 (V2) : 2026/03/06 17:19:49

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX258)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:wangdan

处理者:wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.017	33919	100.000	5691	2959	1.318	--
总计		33919	100.000	5691			

图199 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025121651批-pH6.8介质-浆法-50转-30min-片1
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 0-40/9-201-2 - zzp-2025121651p-rcqx-pH6.8jz-2-jf50z-p2-30min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rcqx-FX258.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260305-FX258.lcb

样品瓶号 : 4-14

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/03/06 06:52:24

处理时间 (V2) : 2026/03/06 17:19:57

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX258)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:wangdan

处理者:wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.017	34035	100.000	5699	2948	1.315	--
总计		34035	100.000	5699			

图200 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025121651批-pH6.8介质-浆法-50转-30min-片2
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 0-40/9-202-2 - zzp-2025121651p-rcqx-pH6.8jz-2-jf50z-p3-30min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rcqx-FX258.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260305-FX258.lcb

样品瓶号 : 4-23

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/03/06 06:55:47

处理时间 (V2) : 2026/03/06 17:20:04

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX258)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:wangdan

处理者:wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.017	34413	100.000	5761	2946	1.306	--
总计		34413	100.000	5761			

图201 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025121651批-pH6.8介质-浆法-50转-30min-片3
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 0-40/9-203-2 - zzp-2025121651p-rcqx-pH6.8jz-2-jf50z-p4-30min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rcqx-FX258.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260305-FX258.lcb

样品瓶号 : 4-32

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/03/06 06:59:10

处理时间 (V2) : 2026/03/06 17:20:12

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX258)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:wangdan

处理者:wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.016	36133	100.000	6079	2948	1.296	--
总计		36133	100.000	6079			

图202 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025121651批-pH6.8介质-浆法-50转-30min-片4
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 0-40/9-204-2 - zzp-2025121651p-rcqx-pH6.8jz-2-jf50z-p5-30min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rcqx-FX258.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260305-FX258.lcb

样品瓶号 : 4-41

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/03/06 07:02:34

处理时间 (V2) : 2026/03/06 17:20:20

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX258)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:wangdan

处理者:wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.017	36551	100.000	6100	2939	1.303	--
总计		36551	100.000	6100			

图203 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025121651批-pH6.8介质-浆法-50转-30min-片5
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 0-40/9-205-2 - zzp-2025121651p-rcqx-pH6.8jz-2-jf50z-p6-30min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rcqx-FX258.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260305-FX258.lcb

样品瓶号 : 4-50

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/03/06 07:05:57

处理时间 (V2) : 2026/03/06 17:20:27

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX258)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:wangdan

处理者:wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.018	36144	100.000	6060	2942	1.299	--
总计		36144	100.000	6060			

图204 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025121651批-pH6.8介质-浆法-50转-30min-片6
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 0-40/9-206-2 - zzp-2025121651p-rcqx-pH6.8jz-2-jf50z-p1-45min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rcqx-FX258.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260305-FX258.lcb

样品瓶号 : 4-6

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/03/06 07:09:21

处理时间 (V2) : 2026/03/06 17:20:35

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX258)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:wangdan

处理者:wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.017	35360	100.000	5910	2921	1.300	--
总计		35360	100.000	5910			

图205 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025121651批-pH6.8介质-浆法-50转-45min-片1
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 0-40/9-207-2 - zzp-2025121651p-rcqx-pH6.8jz-2-jf50z-p2-45min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rcqx-FX258.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260305-FX258.lcb

样品瓶号 : 4-15

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/03/06 07:12:45

处理时间 (V2) : 2026/03/06 17:20:43

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX258)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:wangdan

处理者:wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.017	35425	100.000	5899	2921	1.298	--
总计		35425	100.000	5899			

图206 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025121651批-pH6.8介质-浆法-50转-45min-片2
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 0-40/9-208-2 - zzp-2025121651p-rcqx-pH6.8jz-2-jf50z-p3-45min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rcqx-FX258.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260305-FX258.lcb

样品瓶号 : 4-24

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/03/06 07:16:09

处理时间 (V2) : 2026/03/06 17:20:51

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX258)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:wangdan

处理者:wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.017	35562	100.000	5929	2916	1.295	--
总计		35562	100.000	5929			

图207 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025121651批-pH6.8介质-浆法-50转-45min-片3
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 0-40/9-209-2 - zzp-2025121651p-rcqx-pH6.8jz-2-jf50z-p4-45min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rcqx-FX258.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260305-FX258.lcb

样品瓶号 : 4-33

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/03/06 07:19:32

处理时间 (V2) : 2026/03/06 17:20:58

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX258)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:wangdan

处理者:wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.018	37312	100.000	6200	2902	1.299	--
总计		37312	100.000	6200			

图208 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025121651批-pH6.8介质-浆法-50转-45min-片4
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 0-40/9-210-2 - zzp-2025121651p-rcqx-pH6.8jz-2-jf50z-p5-45min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rcqx-FX258.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260305-FX258.lcb

样品瓶号 : 4-42

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/03/06 07:22:56

处理时间 (V2) : 2026/03/06 17:21:06

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX258)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:wangdan

处理者:wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.018	37806	100.000	6262	2897	1.301	--
总计		37806	100.000	6262			

图209 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025121651批-pH6.8介质-浆法-50转-45min-片5
供试品溶液-1




QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温 : 30°C
数据文件名: RC\$QTL-392 - 0-40/9-211-2 - zzp-2025121651p-rcqx-pH6.8jz-2-jf50z-p6-45min.lcd
方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rcqx-FX258.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260305-FX258.lcb
样品瓶号 : 4-51
进样体积 : 20μl
进样时间 : 2026/03/06 07:26:18
处理时间 (V2) : 2026/03/06 17:21:14
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX258)

流速: 1.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者:wangdan
处理者:wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.017	37644	100.000	6270	2903	1.287	--
总计		37644	100.000	6270			

图210 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025121651批-pH6.8介质-浆法-50转-45min-片6
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 0-40/9-212-2 - zzp-2025121651p-rcqx-pH6.8jz-2-jf50z-p1-60min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rcqx-FX258.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260305-FX258.lcb

样品瓶号 : 4-7

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/03/06 07:29:43

处理时间 (V2) : 2026/03/06 17:21:21

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX258)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:wangdan

处理者:wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.017	36162	100.000	5982	2885	1.300	--
总计		36162	100.000	5982			

图211 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025121651批-pH6.8介质-浆法-50转-60min-片1
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 0-40/9-213-2 - zzp-2025121651p-rcqx-pH6.8jz-2-jf50z-p2-60min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rcqx-FX258.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260305-FX258.lcb

样品瓶号 : 4-16

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/03/06 07:33:06

处理时间 (V2) : 2026/03/06 17:21:29

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX258)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:wangdan

处理者:wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.018	36247	100.000	6013	2884	1.290	--
总计		36247	100.000	6013			

图212 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025121651批-pH6.8介质-浆法-50转-60min-片2
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 0-40/9-214-2 - zzp-2025121651p-rcqx-pH6.8jz-2-jf50z-p3-60min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rcqx-FX258.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260305-FX258.lcb

样品瓶号 : 4-25

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/03/06 07:36:29

处理时间 (V2) : 2026/03/06 17:21:37

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX258)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:wangdan

处理者:wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.018	36778	100.000	6075	2873	1.292	--
总计		36778	100.000	6075			

图213 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025121651批-pH6.8介质-浆法-50转-60min-片3
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 0-40/9-215-2 - zzp-2025121651p-rcqx-pH6.8jz-2-jf50z-p4-60min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rcqx-FX258.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260305-FX258.lcb

样品瓶号 : 4-34

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/03/06 07:39:52

处理时间 (V2) : 2026/03/06 17:21:44

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX258)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:wangdan

处理者:wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.018	37685	100.000	6229	2869	1.284	--
总计		37685	100.000	6229			

图214 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025121651批-pH6.8介质-浆法-50转-60min-片4
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 0-40/9-216-2 - zzp-2025121651p-rcqx-pH6.8jz-2-jf50z-p5-60min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rcqx-FX258.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260305-FX258.lcb

样品瓶号 : 4-43

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/03/06 07:43:14

处理时间 (V2) : 2026/03/06 17:21:52

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX258)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:wangdan

处理者:wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.018	38319	100.000	6313	2858	1.281	--
总计		38319	100.000	6313			

图215 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025121651批-pH6.8介质-浆法-50转-60min-片5
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 0-40/9-217-2 - zzp-2025121651p-rcqx-pH6.8jz-2-jf50z-p6-60min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rcqx-FX258.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260305-FX258.lcb

样品瓶号 : 4-52

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/03/06 07:46:37

处理时间 (V2) : 2026/03/06 17:22:00

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX258)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:wangdan

处理者:wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.018	37910	100.000	6265	2861	1.279	--
总计		37910	100.000	6265			

图216 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025121651批-pH6.8介质-浆法-50转-60min-片6
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 0-40/9-218-2 - zzp-2025121651p-rcqx-pH6.8jz-2-jf50z-p1-jx.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rcqx-FX258.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260305-FX258.lcb

样品瓶号 : 4-8

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/03/06 07:50:02

处理时间 (V2) : 2026/03/06 17:22:08

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX258)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:wangdan

处理者:wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.018	37519	100.000	6199	2853	1.271	--
总计		37519	100.000	6199			

图217 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025121651批-pH6.8介质-桨法-50转-极限转速-片1
供试品溶液-1




QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温 : 30°C
数据文件名: RC\$QTL-392 - 0-40/9-219-2 - zzp-2025121651p-rcqx-pH6.8jz-2-jf50z-p2-jx.lcd
方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rcqx-FX258.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260305-FX258.lcb
样品瓶号 : 4-17
进样体积 : 20μl
进样时间 : 2026/03/06 07:53:26
处理时间 (V2) : 2026/03/06 17:22:15
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX258)

流速: 1.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者:wangdan
处理者:wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.018	37587	100.000	6168	2836	1.275	--
总计		37587	100.000	6168			

图218 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025121651批-pH6.8介质-桨法-50转-极限转速-片2
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30℃

数据文件名: RC\$QTL-392 - 0-40/9-220-2 - zzp-2025121651p-rcqx-pH6.8jz-2-jf50z-p3-jx.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rcqx-FX258.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260305-FX258.lcb

样品瓶号 : 4-26

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/03/06 07:56:50

处理时间 (V2) : 2026/03/06 17:22:23

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX258)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:wangdan

处理者:wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.018	38103	100.000	6228	2822	1.276	--
总计		38103	100.000	6228			

图219 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025121651批-pH6.8介质-桨法-50转-极限转速-片3
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 0-40/9-221-2 - zzp-2025121651p-rcqx-pH6.8jz-2-jf50z-p4-jx.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rcqx-FX258.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260305-FX258.lcb

样品瓶号 : 4-35

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/03/06 08:00:14

处理时间 (V2) : 2026/03/06 17:22:31

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX258)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:wangdan

处理者:wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.019	38364	100.000	6339	2833	1.265	--
总计		38364	100.000	6339			

图220 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025121651批-pH6.8介质-桨法-50转-极限转速-片4
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 0-40/9-222-2 - zzp-2025121651p-rcqx-pH6.8jz-2-jf50z-p5-jx.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rcqx-FX258.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260305-FX258.lcb

样品瓶号 : 4-44

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/03/06 08:03:37

处理时间 (V2) : 2026/03/06 17:22:38

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX258)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:wangdan

处理者:wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.017	38612	100.000	6320	2814	1.266	--
总计		38612	100.000	6320			

图221 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025121651批-pH6.8介质-桨法-50转-极限转速-片5
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 0-40/9-223-2 - zzp-2025121651p-rcqx-pH6.8jz-2-jf50z-p6-jx.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rcqx-FX258.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260305-FX258.lcb

样品瓶号 : 4-53

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/03/06 08:07:00

处理时间 (V2) : 2026/03/06 17:22:46

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX258)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:wangdan

处理者:wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.017	38234	100.000	6319	2819	1.249	--
总计		38234	100.000	6319			

图222 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025121651批-pH6.8介质-桨法-50转-极限转速-片6
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 0-40/9-224-2 - zzp-2025121651p-rcqx-pH6.8jz-2-jf50z-dz2-1.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rcqx-FX258.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260305-FX258.lcb

样品瓶号 : 4-27

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/03/06 08:10:25

处理时间 (V2) : 2026/03/06 17:22:54

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX258)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:wangdan

处理者:wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.989	55662	100.000	8530	2309	1.175	--
总计		55662	100.000	8530			

图223 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025121651批-pH6.8介质-桨法-50转
对照品溶液-2-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 0-40/9-225-2 - zzp-2025121651p-rcqx-pH6.8jz-2-jf50z-dz2-2.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rcqx-FX258.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260305-FX258.lcb

样品瓶号 : 4-27

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/03/06 08:13:48

处理时间 (V2) : 2026/03/06 17:23:02

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX258)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:wangdan

处理者:wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.989	55784	100.000	8540	2308	1.181	--
总计		55784	100.000	8540			

图224 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025121651批-pH6.8介质-桨法-50转
对照品溶液-2-2