



熊去氧胆酸口服混悬液项目信息

介质体积(ml)	900	取样体积(ml)	5	补液体积(ml)	5
对照品批号	110755-202306	对照品来源	原料	对照品使用方法	直接使用
对照品含量(%)	99.6	对照品水分(%)	0	对照品稀释倍数	50
标示量(mg)	250	供试品稀释倍数	1	系数	1

对照品溶液

序号	称样量(mg)	A ₁	A ₂	A ₃	A ₄	A ₅	A _{平均}	RSD%
1	14.00	55625	55817	55822	55744	55807	55763	0.15
2	14.02	55824	56168				55996	0.44

单位质量响应值		RSD%	判断
3983.07	3994.01	0.20	数据可信



操作者:

日期: 2026-07-30

复核者:

未审阅版本



供试品溶液-2025121851批-pH6.8

时间 (分钟)	样品	A ₁	A ₂	A _{平均}	溶出量(%)	平均(%)	RSD%	累计溶 出量(%)	平均(%)	RSD%
5min	1	13626	-	13626	24.499	30.68	13.52	24.50	30.68	13.51
	2	14831	-	14831	26.665			26.67		
	3	17542	-	17542	31.540			31.54		
	4	19374	-	19374	34.834			34.83		
	5	18379	-	18379	33.045			33.04		
	6	18639	-	18639	33.512			33.51		
10min	1	15433	-	15433	27.748	33.18	11.24	27.88	33.35	11.25
	2	16301	-	16301	29.308			29.46		
	3	18927	-	18927	34.030			34.21		
	4	19986	-	19986	35.934			36.13		
	5	20309	-	20309	36.515			36.70		
	6	19762	-	19762	35.531			35.72		
15min	1	17537	-	17537	31.531	36.43	10.13	31.82	36.78	10.15
	2	17864	-	17864	32.119			32.43		
	3	20838	-	20838	37.466			37.83		
	4	21162	-	21162	38.048			38.44		
	5	22271	-	22271	40.042			40.43		
	6	21900	-	21900	39.375			39.76		
20min	1	19515	-	19515	35.087	39.50	9.09	35.55	40.05	9.12
	2	19400	-	19400	34.880			35.37		
	3	22449	-	22449	40.362			40.93		
	4	23342	-	23342	41.968			42.57		
	5	23844	-	23844	42.870			43.48		
	6	23254	-	23254	41.810			42.41		
30min	1	22122	-	22122	39.774	43.24	7.74	40.43	44.02	7.79
	2	21359	-	21359	38.403			39.09		
	3	24485	-	24485	44.023			44.82		
	4	25428	-	25428	45.718			46.56		
	5	25879	-	25879	46.529			47.38		
	6	25012	-	25012	44.970			45.81		
45min	1	24961	-	24961	44.879	47.68	6.51	45.76	48.70	6.57
	2	23864	-	23864	42.906			43.80		
	3	27234	-	27234	48.965			50.01		
	4	27548	-	27548	49.530			50.62		
	5	28369	-	28369	51.006			52.11		
	6	27148	-	27148	48.811			49.90		
60min	1	28067	-	28067	50.463	52.53	5.19	51.59	53.81	5.27
	2	26811	-	26811	48.205			49.34		
	3	30006	-	30006	53.949			55.26		
	4	30049	-	30049	54.027			55.39		
	5	30954	-	30954	55.654			57.04		
	6	29423	-	29423	52.901			54.26		
极限	1	33507	-	33507	60.244	61.60	1.78	61.66	63.18	1.89
	2	33983	-	33983	61.100			62.50		
	3	34408	-	34408	61.864			63.48		
	4	33915	-	33915	60.978			62.64		
	5	35268	-	35268	63.410			65.11		
	6	34489	-	34489	62.010			63.66		



操作者:

日期: 2026-07-30

复核者:

未审阅版本



熊去氧胆酸口服混悬液项目信息

介质体积(ml)	900	取样体积(ml)	5	补液体积(ml)	5
对照品批号	110755-202306	对照品来源	原料	对照品使用方法	直接使用
对照品含量(%)	99.6	对照品水分(%)	0	对照品稀释倍数	50
标示量(mg)	250	供试品稀释倍数	1	系数	1

对照品溶液

序号	称样量(mg)	A ₁	A ₂	A ₃	A ₄	A ₅	A _{平均}	RSD%
1	14.00	55814	55873	56043	55831	56060	55924	0.22
2	14.02	56245	56152				56198	0.12
单位质量响应值				RSD%	判断			
3994.57		4008.42		0.25	数据可信			



操作者:

日期: 2026-07-30

复核者:

未审阅版本



供试品溶液-2025121851批-pH6.8

时间 (分钟)	样品	A ₁	A ₂	A _{平均}	溶出量(%)	平均(%)	RSD%	累计溶 出量(%)	平均(%)	RSD%
5min	1	21167	-	21167	37.934	42.39	8.43	37.93	42.38	8.43
	2	21592	-	21592	38.696			38.70		
	3	23290	-	23290	41.739			41.74		
	4	24532	-	24532	43.965			43.96		
	5	25178	-	25178	45.122			45.12		
	6	26145	-	26145	46.855			46.86		
10min	1	22328	-	22328	40.015	45.20	9.28	40.23	45.44	9.27
	2	22797	-	22797	40.855			41.07		
	3	24697	-	24697	44.260			44.49		
	4	26250	-	26250	47.044			47.29		
	5	27341	-	27341	48.999			49.25		
	6	27923	-	27923	50.042			50.30		
15min	1	24379	-	24379	43.690	48.43	8.17	44.12	48.91	8.18
	2	24883	-	24883	44.594			45.04		
	3	26251	-	26251	47.045			47.52		
	4	27775	-	27775	49.777			50.28		
	5	29204	-	29204	52.338			52.86		
	6	29642	-	29642	53.122			53.66		
20min	1	25775	-	25775	46.192	50.35	8.00	46.87	51.11	8.01
	2	25538	-	25538	45.768			46.46		
	3	27093	-	27093	48.554			49.29		
	4	29443	-	29443	52.766			53.55		
	5	30051	-	30051	53.855			54.67		
	6	30675	-	30675	54.974			55.81		
30min	1	27138	-	27138	48.635	53.83	8.43	49.57	54.87	8.43
	2	27380	-	27380	49.069			50.01		
	3	29023	-	29023	52.013			53.02		
	4	31447	-	31447	56.357			57.43		
	5	32304	-	32304	57.893			59.01		
	6	32940	-	32940	59.033			60.17		
45min	1	29415	-	29415	52.716	56.86	7.43	53.92	58.20	7.45
	2	28937	-	28937	51.859			53.08		
	3	30656	-	30656	54.940			56.24		
	4	33120	-	33120	59.356			60.74		
	5	33973	-	33973	60.884			62.32		
	6	34273	-	34273	61.422			62.89		
60min	1	32002	-	32002	57.352	60.21	5.49	58.85	61.86	5.56
	2	31375	-	31375	56.228			57.73		
	3	32494	-	32494	58.234			59.84		
	4	34831	-	34831	62.422			64.14		
	5	35405	-	35405	63.451			65.22		
	6	35462	-	35462	63.553			65.36		
极限	1	35374	-	35374	63.395	65.27	2.22	65.21	67.25	2.38
	2	35643	-	35643	63.877			65.69		
	3	36237	-	36237	64.942			66.87		
	4	36785	-	36785	65.924			67.99		
	5	37060	-	37060	66.417			68.54		
	6	37408	-	37408	67.040			69.20		



操作者:

日期: 2026-07-30

复核者:

未审阅版本



熊去氧胆酸口服混悬液项目信息

介质体积(ml)	900	取样体积(ml)	5	补液体积(ml)	5
对照品批号	110755-202306	对照品来源	原料	对照品使用方法	直接使用
对照品含量(%)	99.6	对照品水分(%)	0	对照品稀释倍数	50
标示量(mg)	250	供试品稀释倍数	1	系数	1

对照品溶液

序号	称样量(mg)	A ₁	A ₂	A ₃	A ₄	A ₅	A _{平均}	RSD%
1	14.00	56778	56336	56191	56198	56255	56352	0.44
2	14.02	56311	56051				56181	0.33
单位质量响应值				RSD%	判断			
4025.14				0.32	数据可信			



操作者:

日期: 2026-07-30

复核者:

未审阅版本



供试品溶液-00637A批-pH6.8

时间 (分钟)	样品	A ₁	A ₂	A _{平均}	溶出量(%)	平均(%)	RSD%	累计溶 出量(%)	平均(%)	RSD%
5min	1	27790	-	27790	49.622	51.78	3.75	49.62	51.78	3.75
	2	28137	-	28137	50.241			50.24		
	3	28216	-	28216	50.382			50.38		
	4	29605	-	29605	52.862			52.86		
	5	29794	-	29794	53.200			53.20		
	6	30445	-	30445	54.362			54.36		
10min	1	29439	-	29439	52.566	54.51	3.18	52.84	54.80	3.19
	2	29658	-	29658	52.957			53.24		
	3	29915	-	29915	53.416			53.70		
	4	31033	-	31033	55.412			55.71		
	5	31539	-	31539	56.316			56.61		
	6	31584	-	31584	56.396			56.70		
15min	1	30442	-	30442	54.357	56.06	2.91	54.92	56.64	2.91
	2	30597	-	30597	54.634			55.21		
	3	30923	-	30923	55.216			55.79		
	4	32845	-	32845	58.648			59.25		
	5	31807	-	31807	56.794			57.40		
	6	31746	-	31746	56.685			57.30		
20min	1	31032	-	31032	55.410	56.92	2.22	56.28	57.82	2.24
	2	31263	-	31263	55.823			56.70		
	3	31484	-	31484	56.217			57.10		
	4	32236	-	32236	57.560			58.49		
	5	32536	-	32536	58.096			59.02		
	6	32704	-	32704	58.396			59.33		
30min	1	31696	-	31696	56.596	58.08	2.06	57.77	59.30	2.08
	2	32085	-	32085	57.291			58.48		
	3	32059	-	32059	57.244			58.44		
	4	32930	-	32930	58.799			60.05		
	5	33010	-	33010	58.942			60.19		
	6	33379	-	33379	59.601			60.86		
45min	1	32618	-	32618	58.242	59.04	1.26	59.73	60.58	1.29
	2	32697	-	32697	58.383			59.89		
	3	32758	-	32758	58.492			60.01		
	4	33324	-	33324	59.503			61.08		
	5	33494	-	33494	59.807			61.38		
	6	33482	-	33482	59.785			61.37		
60min	1	32665	-	32665	58.326	59.41	1.30	60.14	61.27	1.32
	2	33047	-	33047	59.008			60.84		
	3	33095	-	33095	59.094			60.93		
	4	33897	-	33897	60.526			62.43		
	5	33537	-	33537	59.883			61.79		
	6	33376	-	33376	59.596			61.51		
极限	1	33353	-	33353	59.555	60.20	0.69	61.69	62.40	0.71
	2	33949	-	33949	60.619			62.78		
	3	33621	-	33621	60.033			62.20		
	4	33603	-	33603	60.001			62.24		
	5	33837	-	33837	60.419			62.66		
	6	33926	-	33926	60.578			62.83		



操作者:

日期: 2026-07-30

复核者:

未审阅版本



熊去氧胆酸口服混悬液项目信息

介质体积(ml)	900	取样体积(ml)	5	补液体积(ml)	5
对照品批号	110755-202306	对照品来源	原料	对照品使用方法	直接使用
对照品含量(%)	99.6	对照品水分(%)	0	对照品稀释倍数	50
标示量(mg)	250	供试品稀释倍数	1	系数	1

对照品溶液

序号	称样量(mg)	A ₁	A ₂	A ₃	A ₄	A ₅	A _{平均}	RSD%
1	14.00	56268	56141	56141	55857	56187	56119	0.28
2	14.02	55610	56085				55848	0.61
单位质量响应值			RSD%		判断			
4008.50			3983.45		0.45 数据可信			



操作者:

日期: 2026-07-30

复核者:

未审阅版本



供试品溶液-00637A批-pH6.8

时间 (分钟)	样品	A ₁	A ₂	A _{平均}	溶出量(%)	平均(%)	RSD%	累计溶 出量(%)	平均(%)	RSD%
5min	1	30693	-	30693	55.082	56.44	2.07	55.08	56.44	2.07
	2	30756	-	30756	55.195			55.20		
	3	31526	-	31526	56.577			56.58		
	4	31779	-	31779	57.031			57.03		
	5	32420	-	32420	58.182			58.18		
	6	31516	-	31516	56.559			56.56		
10min	1	32416	-	32416	58.174	58.52	1.83	58.48	58.84	1.83
	2	31895	-	31895	57.239			57.55		
	3	32511	-	32511	58.345			58.66		
	4	32927	-	32927	59.092			59.41		
	5	33613	-	33613	60.323			60.65		
	6	32288	-	32288	57.945			58.26		
15min	1	32282	-	32282	57.934	59.26	1.63	58.56	59.90	1.63
	2	32752	-	32752	58.777			59.40		
	3	32900	-	32900	59.043			59.68		
	4	33321	-	33321	59.799			60.44		
	5	33864	-	33864	60.773			61.43		
	6	33018	-	33018	59.255			59.89		
20min	1	32701	-	32701	58.686	59.58	1.62	59.64	60.55	1.62
	2	32953	-	32953	59.138			60.09		
	3	33113	-	33113	59.425			60.39		
	4	33479	-	33479	60.082			61.06		
	5	34142	-	34142	61.272			62.27		
	6	32807	-	32807	58.876			59.84		
30min	1	33324	-	33324	59.804	59.69	2.44	61.08	60.99	2.40
	2	33236	-	33236	59.646			60.93		
	3	33582	-	33582	60.267			61.56		
	4	31845	-	31845	57.150			58.46		
	5	34343	-	34343	61.633			62.97		
	6	33248	-	33248	59.668			60.96		
45min	1	33599	-	33599	60.298	60.05	3.94	61.91	61.68	3.85
	2	33918	-	33918	60.870			62.48		
	3	33848	-	33848	60.744			62.38		
	4	30893	-	30893	55.441			57.07		
	5	34720	-	34720	62.309			63.99		
	6	33788	-	33788	60.637			62.26		
60min	1	33711	-	33711	60.499	59.70	4.74	62.44	61.66	4.62
	2	33873	-	33873	60.789			62.74		
	3	33595	-	33595	60.290			62.26		
	4	30211	-	30211	54.217			56.15		
	5	34800	-	34800	62.453			64.48		
	6	33398	-	33398	59.937			61.90		
极限	1	33739	-	33739	60.549	60.98	0.86	62.83	63.28	0.88
	2	34101	-	34101	61.198			63.49		
	3	33984	-	33984	60.988			63.29		
	4	33867	-	33867	60.778			63.02		
	5	34488	-	34488	61.893			64.26		
	6	33705	-	33705	60.488			62.78		



操作者:

日期: 2026-07-30

复核者:

未审阅版本



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 0-39/18-401-2 - zzp-2025121851p-rcqx-pH6.8jz-1-jf50z-rj.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rcqx-FX267.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260305-FX267.lcb

样品瓶号 : 1-9

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/03/05 19:53:17

处理时间 (V2) : 2026/03/06 16:23:05

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:wangdan

处理者:wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图1 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025121851批-pH6.8介质-桨法-50转
溶剂



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30℃

数据文件名: RC\$QTL-392 - 0-39/18-402-2 - zzp-2025121851p-rcqx-pH6.8jz-1-jf50z-dz1-1.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rcqx-FX267.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260305-FX267.lcb

样品瓶号 : 1-18

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/03/05 19:56:42

处理时间 (V2) : 2026/03/06 16:23:14

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:wangdan

处理者:wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.003	55625	100.000	9036	2473	1.113	--
总计		55625	100.000	9036			

图2 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025121851批-pH6.8介质-桨法-50转
对照品溶液-1-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30℃

数据文件名: RC\$QTL-392 - 0-39/18-403-2 - zzp-2025121851p-rcqx-pH6.8jz-1-jf50z-dz1-2.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rcqx-FX267.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260305-FX267.lcb

样品瓶号 : 1-18

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/03/05 20:00:05

处理时间 (V2) : 2026/03/06 16:23:22

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:wangdan

处理者:wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.003	55817	100.000	9066	2469	1.111	--
总计		55817	100.000	9066			

图3 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025121851批-pH6.8介质-桨法-50转
对照品溶液-1-2



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 0-39/18-404-2 - zzp-2025121851p-rcqx-pH6.8jz-1-jf50z-dz1-3.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rcqx-FX267.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260305-FX267.lcb

样品瓶号 : 1-18

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/03/05 20:03:29

处理时间 (V2) : 2026/03/06 16:23:30

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:wangdan

处理者:wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.005	55822	100.000	9078	2475	1.107	--
总计		55822	100.000	9078			

图4 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025121851批-pH6.8介质-桨法-50转
对照品溶液-1-3



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30℃

数据文件名: RC\$QTL-392 - 0-39/18-405-2 - zzp-2025121851p-rcqx-pH6.8jz-1-jf50z-dz1-4.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rcqx-FX267.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260305-FX267.lcb

样品瓶号 : 1-18

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/03/05 20:06:53

处理时间 (V2) : 2026/03/06 16:23:37

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:wangdan

处理者:wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.003	55744	100.000	9046	2469	1.113	--
总计		55744	100.000	9046			

图5 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025121851批-pH6.8介质-桨法-50转
对照品溶液-1-4



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30℃

数据文件名: RC\$QTL-392 - 0-39/18-406-2 - zzp-2025121851p-rcqx-pH6.8jz-1-jf50z-dz1-5.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rcqx-FX267.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260305-FX267.lcb

样品瓶号 : 1-18

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/03/05 20:10:17

处理时间 (V2) : 2026/03/06 16:23:45

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:wangdan

处理者:wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.003	55807	100.000	9056	2476	1.110	--
总计		55807	100.000	9056			

图6 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025121851批-pH6.8介质-桨法-50转
对照品溶液-1-5



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30℃

数据文件名: RC\$QTL-392 - 0-39/18-407-2 - zzp-2025121851p-rcqx-pH6.8jz-1-jf50z-p1-5min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rcqx-FX267.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260305-FX267.lcb

样品瓶号 : 1-1

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/03/05 20:13:40

处理时间 (V2) : 2026/03/06 16:23:53

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:wangdan

处理者:wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.032	13626	100.000	2491	3239	1.146	--
总计		13626	100.000	2491			

图7 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025121851批-pH6.8介质-桨法-50转-5min-片1
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30℃

数据文件名: RC\$QTL-392 - 0-39/18-408-2 - zzp-2025121851p-rcqx-pH6.8jz-1-jf50z-p2-5min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rcqx-FX267.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260305-FX267.lcb

样品瓶号 : 1-10

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/03/05 20:17:03

处理时间 (V2) : 2026/03/06 16:24:01

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:wangdan

处理者:wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.030	14831	100.000	2740	3279	1.154	--
总计		14831	100.000	2740			

图8 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025121851批-pH6.8介质-桨法-50转-5min-片2
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 0-39/18-409-2 - zzp-2025121851p-rcqx-pH6.8jz-1-jf50z-p3-5min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rcqx-FX267.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260305-FX267.lcb

样品瓶号 : 1-19

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/03/05 20:20:26

处理时间 (V2) : 2026/03/06 16:24:09

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:wangdan

处理者:wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.030	17542	100.000	3229	3259	1.143	--
总计		17542	100.000	3229			

图9 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025121851批-pH6.8介质-桨法-50转-5min-片3
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 0-39/18-410-2 - zzp-2025121851p-rcqx-pH6.8jz-1-jf50z-p4-5min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rcqx-FX267.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260305-FX267.lcb

样品瓶号 : 1-28

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/03/05 20:23:49

处理时间 (V2) : 2026/03/06 16:24:16

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:wangdan

处理者:wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.032	19374	100.000	3567	3252	1.140	--
总计		19374	100.000	3567			

图10 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025121851批-pH6.8介质-浆法-50转-5min-片4
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 0-39/18-411-2 - zzp-2025121851p-rcqx-pH6.8jz-1-jf50z-p5-5min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rcqx-FX267.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260305-FX267.lcb

样品瓶号 : 1-37

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/03/05 20:27:13

处理时间 (V2) : 2026/03/06 16:24:24

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:wangdan

处理者:wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.030	18379	100.000	3379	3231	1.140	--
总计		18379	100.000	3379			

图11 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025121851批-pH6.8介质-桨法-50转-5min-片5
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 0-39/18-412-2 - zzp-2025121851p-rcqx-pH6.8jz-1-jf50z-p6-5min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rcqx-FX267.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260305-FX267.lcb

样品瓶号 : 1-46

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/03/05 20:30:36

处理时间 (V2) : 2026/03/06 16:24:31

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:wangdan

处理者:wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.031	18639	100.000	3429	3248	1.151	--
总计		18639	100.000	3429			

图12 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025121851批-pH6.8介质-桨法-50转-5min-片6
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30℃

数据文件名: RC\$QTL-392 - 0-39/18-413-2 - zzp-2025121851p-rcqx-pH6.8jz-1-jf50z-p1-10min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rcqx-FX267.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260305-FX267.lcb

样品瓶号 : 1-2

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/03/05 20:33:59

处理时间 (V2) : 2026/03/06 16:24:39

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:wangdan

处理者:wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.032	15433	100.000	2820	3218	1.156	--
总计		15433	100.000	2820			

图13 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025121851批-pH6.8介质-浆法-50转-10min-片1
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 0-39/18-414-2 - zzp-2025121851p-rcqx-pH6.8jz-1-jf50z-p2-10min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rcqx-FX267.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260305-FX267.lcb

样品瓶号 : 1-11

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/03/05 20:37:22

处理时间 (V2) : 2026/03/06 16:24:47

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:wangdan

处理者:wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.031	16301	100.000	2984	3201	1.143	--
总计		16301	100.000	2984			

图14 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025121851批-pH6.8介质-浆法-50转-10min-片2
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 0-39/18-415-2 - zzp-2025121851p-rcqx-pH6.8jz-1-jf50z-p3-10min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rcqx-FX267.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260305-FX267.lcb

样品瓶号 : 1-20

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/03/05 20:40:45

处理时间 (V2) : 2026/03/06 16:24:55

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:wangdan

处理者:wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.031	18927	100.000	3462	3225	1.146	--
总计		18927	100.000	3462			

图15 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025121851批-pH6.8介质-浆法-50转-10min-片3
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 0-39/18-416-2 - zzp-2025121851p-rcqx-pH6.8jz-1-jf50z-p4-10min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rcqx-FX267.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260305-FX267.lcb

样品瓶号 : 1-29

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/03/05 20:44:08

处理时间 (V2) : 2026/03/06 16:25:02

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:wangdan

处理者:wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.032	19986	100.000	3658	3237	1.152	--
总计		19986	100.000	3658			

图16 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025121851批-pH6.8介质-浆法-50转-10min-片4
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 0-39/18-417-2 - zzp-2025121851p-rcqx-pH6.8jz-1-jf50z-p5-10min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rcqx-FX267.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260305-FX267.lcb

样品瓶号 : 1-38

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/03/05 20:47:32

处理时间 (V2) : 2026/03/06 16:25:10

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:wangdan

处理者:wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.032	20309	100.000	3707	3210	1.141	--
总计		20309	100.000	3707			

图17 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025121851批-pH6.8介质-浆法-50转-10min-片5
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 0-39/18-418-2 - zzp-2025121851p-rcqx-pH6.8jz-1-jf50z-p6-10min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rcqx-FX267.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260305-FX267.lcb

样品瓶号 : 1-47

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/03/05 20:50:54

处理时间 (V2) : 2026/03/06 16:25:17

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:wangdan

处理者:wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.031	19762	100.000	3613	3226	1.132	--
总计		19762	100.000	3613			

图18 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025121851批-pH6.8介质-浆法-50转-10min-片6
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 0-39/18-419-2 - zzp-2025121851p-rcqx-pH6.8jz-1-jf50z-p1-15min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rcqx-FX267.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260305-FX267.lcb

样品瓶号 : 1-3

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/03/05 20:54:17

处理时间 (V2) : 2026/03/06 16:25:25

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:wangdan

处理者:wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.032	17537	100.000	3202	3200	1.160	--
总计		17537	100.000	3202			

图19 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025121851批-pH6.8介质-浆法-50转-15min-片1
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 0-39/18-420-2 - zzp-2025121851p-rcqx-pH6.8jz-1-jf50z-p2-15min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rcqx-FX267.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260305-FX267.lcb

样品瓶号 : 1-12

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/03/05 20:57:40

处理时间 (V2) : 2026/03/06 16:25:33

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:wangdan

处理者:wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.032	17864	100.000	3251	3188	1.155	--
总计		17864	100.000	3251			

图20 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025121851批-pH6.8介质-浆法-50转-15min-片2
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 0-39/18-421-2 - zzp-2025121851p-rcqx-pH6.8jz-1-jf50z-p3-15min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rcqx-FX267.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260305-FX267.lcb

样品瓶号 : 1-21

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/03/05 21:01:04

处理时间 (V2) : 2026/03/06 16:25:40

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:wangdan

处理者:wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.034	20838	100.000	3781	3193	1.145	--
总计		20838	100.000	3781			

图21 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025121851批-pH6.8介质-浆法-50转-15min-片3
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 0-39/18-422-2 - zzp-2025121851p-rcqx-pH6.8jz-1-jf50z-p4-15min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rcqx-FX267.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260305-FX267.lcb

样品瓶号 : 1-30

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/03/05 21:04:27

处理时间 (V2) : 2026/03/06 16:25:48

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:wangdan

处理者:wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.033	21162	100.000	3843	3206	1.157	--
总计		21162	100.000	3843			

图22 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025121851批-pH6.8介质-浆法-50转-15min-片4
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 0-39/18-423-2 - zzp-2025121851p-rcqx-pH6.8jz-1-jf50z-p5-15min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rcqx-FX267.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260305-FX267.lcb

样品瓶号 : 1-39

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/03/05 21:07:50

处理时间 (V2) : 2026/03/06 16:25:56

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:wangdan

处理者:wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.032	22271	100.000	4049	3184	1.144	--
总计		22271	100.000	4049			

图23 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025121851批-pH6.8介质-浆法-50转-15min-片5
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 0-39/18-424-2 - zzp-2025121851p-rcqx-pH6.8jz-1-jf50z-p6-15min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rcqx-FX267.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260305-FX267.lcb

样品瓶号 : 1-48

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/03/05 21:11:12

处理时间 (V2) : 2026/03/06 16:26:03

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:wangdan

处理者:wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.033	21900	100.000	3961	3166	1.151	--
总计		21900	100.000	3961			

图24 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025121851批-pH6.8介质-浆法-50转-15min-片6
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 0-39/18-425-2 - zzp-2025121851p-rcqx-pH6.8jz-1-jf50z-p1-20min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rcqx-FX267.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260305-FX267.lcb

样品瓶号 : 1-4

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/03/05 21:14:35

处理时间 (V2) : 2026/03/06 16:26:11

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:wangdan

处理者:wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.031	19515	100.000	3536	3178	1.157	--
总计		19515	100.000	3536			

图25 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025121851批-pH6.8介质-浆法-50转-20min-片1
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 0-39/18-426-2 - zzp-2025121851p-rcqx-pH6.8jz-1-jf50z-p2-20min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rcqx-FX267.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260305-FX267.lcb

样品瓶号 : 1-13

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/03/05 21:17:58

处理时间 (V2) : 2026/03/06 16:26:18

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:wangdan

处理者:wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.030	19400	100.000	3508	3161	1.147	--
总计		19400	100.000	3508			

图26 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025121851批-pH6.8介质-浆法-50转-20min-片2
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 0-39/18-427-2 - zzp-2025121851p-rcqx-pH6.8jz-1-jf50z-p3-20min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rcqx-FX267.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260305-FX267.lcb

样品瓶号 : 1-22

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/03/05 21:21:21

处理时间 (V2) : 2026/03/06 16:26:26

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:wangdan

处理者:wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.032	22449	100.000	4053	3162	1.150	--
总计		22449	100.000	4053			

图27 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025121851批-pH6.8介质-浆法-50转-20min-片3
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 0-39/18-428-2 - zzp-2025121851p-rcqx-pH6.8jz-1-jf50z-p4-20min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rcqx-FX267.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260305-FX267.lcb

样品瓶号 : 1-31

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/03/05 21:24:44

处理时间 (V2) : 2026/03/06 16:26:34

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:wangdan

处理者:wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.034	23342	100.000	4196	3160	1.157	--
总计		23342	100.000	4196			

图28 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025121851批-pH6.8介质-浆法-50转-20min-片4
供试品溶液-1




QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温 : 30°C
数据文件名: RC\$QTL-392 - 0-39/18-429-2 - zzp-2025121851p-rcqx-pH6.8jz-1-jf50z-p5-20min.lcd
方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260305-FX267.lcb
样品瓶号 : 1-40
进样体积 : 20μl
进样时间 : 2026/03/05 21:28:07
处理时间 (V2) : 2026/03/06 16:26:41
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 1.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者:wangdan
处理者:wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.032	23844	100.000	4320	3156	1.146	--
总计		23844	100.000	4320			

图29 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025121851批-pH6.8介质-浆法-50转-20min-片5
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 0-39/18-430-2 - zzp-2025121851p-rcqx-pH6.8jz-1-jf50z-p6-20min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rcqx-FX267.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260305-FX267.lcb

样品瓶号 : 1-49

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/03/05 21:31:30

处理时间 (V2) : 2026/03/06 16:26:49

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:wangdan

处理者:wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.032	23254	100.000	4188	3149	1.160	--
总计		23254	100.000	4188			

图30 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025121851批-pH6.8介质-浆法-50转-20min-片6
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 0-39/18-431-2 - zzp-2025121851p-rcqx-pH6.8jz-1-jf50z-p1-30min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rcqx-FX267.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260305-FX267.lcb

样品瓶号 : 1-5

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/03/05 21:34:53

处理时间 (V2) : 2026/03/06 16:26:57

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:wangdan

处理者:wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.033	22122	100.000	3988	3155	1.154	--
总计		22122	100.000	3988			

图31 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025121851批-pH6.8介质-浆法-50转-30min-片1
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 0-39/18-432-2 - zzp-2025121851p-rcqx-pH6.8jz-1-jf50z-p2-30min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rcqx-FX267.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260305-FX267.lcb

样品瓶号 : 1-14

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/03/05 21:38:16

处理时间 (V2) : 2026/03/06 16:27:04

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:wangdan

处理者:wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.031	21359	100.000	3854	3134	1.160	--
总计		21359	100.000	3854			

图32 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025121851批-pH6.8介质-浆法-50转-30min-片2
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 0-39/18-433-2 - zzp-2025121851p-rcqx-pH6.8jz-1-jf50z-p3-30min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rcqx-FX267.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260305-FX267.lcb

样品瓶号 : 1-23

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/03/05 21:41:39

处理时间 (V2) : 2026/03/06 16:27:12

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:wangdan

处理者:wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.031	24485	100.000	4408	3136	1.152	--
总计		24485	100.000	4408			

图33 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025121851批-pH6.8介质-浆法-50转-30min-片3
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 0-39/18-434-2 - zzp-2025121851p-rcqx-pH6.8jz-1-jf50z-p4-30min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rcqx-FX267.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260305-FX267.lcb

样品瓶号 : 1-32

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/03/05 21:45:02

处理时间 (V2) : 2026/03/06 16:27:19

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:wangdan

处理者:wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.033	25428	100.000	4548	3122	1.160	--
总计		25428	100.000	4548			

图34 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025121851批-pH6.8介质-浆法-50转-30min-片4
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 0-39/18-435-2 - zzp-2025121851p-rcqx-pH6.8jz-1-jf50z-p5-30min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rcqx-FX267.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260305-FX267.lcb

样品瓶号 : 1-41

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/03/05 21:48:24

处理时间 (V2) : 2026/03/06 16:27:27

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:wangdan

处理者:wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.033	25879	100.000	4630	3112	1.157	--
总计		25879	100.000	4630			

图35 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025121851批-pH6.8介质-浆法-50转-30min-片5
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 0-39/18-436-2 - zzp-2025121851p-rcqx-pH6.8jz-1-jf50z-p6-30min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rcqx-FX267.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260305-FX267.lcb

样品瓶号 : 1-50

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/03/05 21:51:46

处理时间 (V2) : 2026/03/06 16:27:35

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:wangdan

处理者:wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.032	25012	100.000	4488	3124	1.161	--
总计		25012	100.000	4488			

图36 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025121851批-pH6.8介质-浆法-50转-30min-片6
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 0-39/18-437-2 - zzp-2025121851p-rcqx-pH6.8jz-1-jf50z-p1-45min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rcqx-FX267.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260305-FX267.lcb

样品瓶号 : 1-6

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/03/05 21:55:09

处理时间 (V2) : 2026/03/06 16:27:42

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:wangdan

处理者:wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.033	24961	100.000	4464	3104	1.159	--
总计		24961	100.000	4464			

图37 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025121851批-pH6.8介质-浆法-50转-45min-片1
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 0-39/18-438-2 - zzp-2025121851p-rcqx-pH6.8jz-1-jf50z-p2-45min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rcqx-FX267.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260305-FX267.lcb

样品瓶号 : 1-15

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/03/05 21:58:32

处理时间 (V2) : 2026/03/06 16:27:50

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:wangdan

处理者:wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.033	23864	100.000	4286	3117	1.148	--
总计		23864	100.000	4286			

图38 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025121851批-pH6.8介质-浆法-50转-45min-片2
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 0-39/18-439-2 - zzp-2025121851p-rcqx-pH6.8jz-1-jf50z-p3-45min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rcqx-FX267.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260305-FX267.lcb

样品瓶号 : 1-24

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/03/05 22:01:55

处理时间 (V2) : 2026/03/06 16:27:57

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:wangdan

处理者:wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.032	27234	100.000	4885	3110	1.159	--
总计		27234	100.000	4885			

图39 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025121851批-pH6.8介质-浆法-50转-45min-片3
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 0-39/18-440-2 - zzp-2025121851p-rcqx-pH6.8jz-1-jf50z-p4-45min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rcqx-FX267.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260305-FX267.lcb

样品瓶号 : 1-33

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/03/05 22:05:18

处理时间 (V2) : 2026/03/06 16:28:05

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:wangdan

处理者:wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.032	27548	100.000	4947	3114	1.157	--
总计		27548	100.000	4947			

图40 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025121851批-pH6.8介质-浆法-50转-45min-片4
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 0-39/18-441-2 - zzp-2025121851p-rcqx-pH6.8jz-1-jf50z-p5-45min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rcqx-FX267.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260305-FX267.lcb

样品瓶号 : 1-42

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/03/05 22:08:40

处理时间 (V2) : 2026/03/06 16:28:13

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:wangdan

处理者:wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.033	28369	100.000	5059	3096	1.153	--
总计		28369	100.000	5059			

图41 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025121851批-pH6.8介质-浆法-50转-45min-片5
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 0-39/18-442-2 - zzp-2025121851p-rcqx-pH6.8jz-1-jf50z-p6-45min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rcqx-FX267.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260305-FX267.lcb

样品瓶号 : 1-51

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/03/05 22:12:03

处理时间 (V2) : 2026/03/06 16:28:20

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:wangdan

处理者:wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.032	27148	100.000	4853	3094	1.156	--
总计		27148	100.000	4853			

图42 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025121851批-pH6.8介质-浆法-50转-45min-片6
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 0-39/18-443-2 - zzp-2025121851p-rcqx-pH6.8jz-1-jf50z-p1-60min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rcqx-FX267.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260305-FX267.lcb

样品瓶号 : 1-7

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/03/05 22:15:26

处理时间 (V2) : 2026/03/06 16:28:28

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:wangdan

处理者:wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.032	28067	100.000	5011	3103	1.160	--
总计		28067	100.000	5011			

图43 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025121851批-pH6.8介质-浆法-50转-60min-片1
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 0-39/18-444-2 - zzp-2025121851p-rcqx-pH6.8jz-1-jf50z-p2-60min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rcqx-FX267.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260305-FX267.lcb

样品瓶号 : 1-16

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/03/05 22:18:49

处理时间 (V2) : 2026/03/06 16:28:36

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:wangdan

处理者:wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.032	26811	100.000	4771	3077	1.166	--
总计		26811	100.000	4771			

图44 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025121851批-pH6.8介质-浆法-50转-60min-片2
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 0-39/18-445-2 - zzp-2025121851p-rcqx-pH6.8jz-1-jf50z-p3-60min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rcqx-FX267.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260305-FX267.lcb

样品瓶号 : 1-25

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/03/05 22:22:11

处理时间 (V2) : 2026/03/06 16:28:43

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:wangdan

处理者:wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.033	30006	100.000	5343	3077	1.159	--
总计		30006	100.000	5343			

图45 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025121851批-pH6.8介质-浆法-50转-60min-片3
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 0-39/18-446-2 - zzp-2025121851p-rcqx-pH6.8jz-1-jf50z-p4-60min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rcqx-FX267.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260305-FX267.lcb

样品瓶号 : 1-34

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/03/05 22:25:34

处理时间 (V2) : 2026/03/06 16:28:51

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:wangdan

处理者:wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.031	30049	100.000	5343	3064	1.163	--
总计		30049	100.000	5343			

图46 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025121851批-pH6.8介质-浆法-50转-60min-片4
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 0-39/18-447-2 - zzp-2025121851p-rcqx-pH6.8jz-1-jf50z-p5-60min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rcqx-FX267.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260305-FX267.lcb

样品瓶号 : 1-43

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/03/05 22:28:57

处理时间 (V2) : 2026/03/06 16:28:59

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:wangdan

处理者:wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.032	30954	100.000	5496	3059	1.167	--
总计		30954	100.000	5496			

图47 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025121851批-pH6.8介质-浆法-50转-60min-片5
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 0-39/18-448-2 - zzp-2025121851p-rcqx-pH6.8jz-1-jf50z-p6-60min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rcqx-FX267.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260305-FX267.lcb

样品瓶号 : 1-52

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/03/05 22:32:20

处理时间 (V2) : 2026/03/06 16:29:06

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:wangdan

处理者:wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.033	29423	100.000	5214	3050	1.157	--
总计		29423	100.000	5214			

图48 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025121851批-pH6.8介质-浆法-50转-60min-片6
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 0-39/18-449-2 - zzp-2025121851p-rcqx-pH6.8jz-1-jf50z-p1-jx.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rcqx-FX267.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260305-FX267.lcb

样品瓶号 : 1-8

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/03/05 22:35:43

处理时间 (V2) : 2026/03/06 16:29:14

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:wangdan

处理者:wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.032	33507	100.000	5928	3045	1.162	--
总计		33507	100.000	5928			

图49 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025121851批-pH6.8介质-桨法-50转-极限转速-片1
供试品溶液-1




QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温 : 30°C
数据文件名: RC\$QTL-392 - 0-39/18-450-2 - zzp-2025121851p-rcqx-pH6.8jz-1-jf50z-p2-jx.lcd
方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260305-FX267.lcb
样品瓶号 : 1-17
进样体积 : 20μl
进样时间 : 2026/03/05 22:39:07
处理时间 (V2) : 2026/03/06 16:29:22
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 1.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者:wangdan
处理者:wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.032	33983	100.000	5988	3013	1.162	--
总计		33983	100.000	5988			

图50 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025121851批-pH6.8介质-桨法-50转-极限转速-片2
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 0-39/18-451-2 - zzp-2025121851p-rcqx-pH6.8jz-1-jf50z-p3-jx.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rcqx-FX267.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260305-FX267.lcb

样品瓶号 : 1-26

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/03/05 22:42:31

处理时间 (V2) : 2026/03/06 16:29:29

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:wangdan

处理者:wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.032	34408	100.000	6071	3032	1.163	--
总计		34408	100.000	6071			

图51 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025121851批-pH6.8介质-桨法-50转-极限转速-片3
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30℃

数据文件名: RC\$QTL-392 - 0-39/18-452-2 - zzp-2025121851p-rcqx-pH6.8jz-1-jf50z-p4-jx.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rcqx-FX267.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260305-FX267.lcb

样品瓶号 : 1-35

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/03/05 22:45:55

处理时间 (V2) : 2026/03/06 16:29:37

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:wangdan

处理者:wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.033	33915	100.000	5992	3033	1.162	--
总计		33915	100.000	5992			

图52 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025121851批-pH6.8介质-桨法-50转-极限转速-片4
供试品溶液-1




QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温 : 30°C
数据文件名: RC\$QTL-392 - 0-39/18-453-2 - zzp-2025121851p-rcqx-pH6.8jz-1-jf50z-p5-jx.lcd
方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260305-FX267.lcb
样品瓶号 : 1-44
进样体积 : 20μl
进样时间 : 2026/03/05 22:49:19
处理时间 (V2) : 2026/03/06 16:29:45
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 1.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者:wangdan
处理者:wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.033	35268	100.000	6189	3008	1.165	--
总计		35268	100.000	6189			

图53 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025121851批-pH6.8介质-桨法-50转-极限转速-片5
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 0-39/18-454-2 - zzp-2025121851p-rcqx-pH6.8jz-1-jf50z-p6-jx.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rcqx-FX267.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260305-FX267.lcb

样品瓶号 : 1-53

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/03/05 22:52:42

处理时间 (V2) : 2026/03/06 16:29:53

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:wangdan

处理者:wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.033	34489	100.000	6059	3008	1.162	--
总计		34489	100.000	6059			

图54 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025121851批-pH6.8介质-桨法-50转-极限转速-片6
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 0-39/18-455-2 - zzp-2025121851p-rcqx-pH6.8jz-1-jf50z-dz2-1.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rcqx-FX267.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260305-FX267.lcb

样品瓶号 : 1-27

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/03/05 22:56:06

处理时间 (V2) : 2026/03/06 16:30:00

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:wangdan

处理者:wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.001	55824	100.000	8853	2367	1.132	--
总计		55824	100.000	8853			

图55 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025121851批-pH6.8介质-桨法-50转
对照品溶液-2-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30℃

数据文件名: RC\$QTL-392 - 0-39/18-456-2 - zzp-2025121851p-rcqx-pH6.8jz-1-jf50z-dz2-2.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rcqx-FX267.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260305-FX267.lcb

样品瓶号 : 1-27

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/03/05 22:59:29

处理时间 (V2) : 2026/03/06 16:30:09

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:wangdan

处理者:wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.001	56168	100.000	8893	2360	1.127	--
总计		56168	100.000	8893			

图56 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025121851批-pH6.8介质-桨法-50转
对照品溶液-2-2



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 0-39/18-457-2 - zzp-2025121851p-rcqx-pH6.8jz-2-jf50z-rj.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rcqx-FX267.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260305-FX267.lcb

样品瓶号 : 2-9

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/03/05 23:02:54

处理时间 (V2) : 2026/03/06 16:30:16

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:wangdan

处理者:wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图57 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025121851批-pH6.8介质-桨法-50转
溶剂



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 0-39/18-458-2 - zzp-2025121851p-rcqx-pH6.8jz-2-jf50z-dz1-1.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rcqx-FX267.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260305-FX267.lcb

样品瓶号 : 2-18

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/03/05 23:06:20

处理时间 (V2) : 2026/03/06 16:30:24

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:wangdan

处理者:wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.003	55814	100.000	8882	2372	1.130	--
总计		55814	100.000	8882			

图58 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025121851批-pH6.8介质-桨法-50转
对照品溶液-1-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30℃

数据文件名: RC\$QTL-392 - 0-39/18-459-2 - zzp-2025121851p-rcqx-pH6.8jz-2-jf50z-dz1-2.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rcqx-FX267.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260305-FX267.lcb

样品瓶号 : 2-18

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/03/05 23:09:45

处理时间 (V2) : 2026/03/06 16:30:32

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:wangdan

处理者:wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.002	55873	100.000	8884	2372	1.127	--
总计		55873	100.000	8884			

图59 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025121851批-pH6.8介质-桨法-50转
对照品溶液-1-2



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30℃

数据文件名: RC\$QTL-392 - 0-39/18-460-2 - zzp-2025121851p-rcqx-pH6.8jz-2-jf50z-dz1-3.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rcqx-FX267.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260305-FX267.lcb

样品瓶号 : 2-18

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/03/05 23:13:08

处理时间 (V2) : 2026/03/06 16:30:39

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:wangdan

处理者:wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.003	56043	100.000	8904	2376	1.130	--
总计		56043	100.000	8904			

图60 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025121851批-pH6.8介质-桨法-50转
对照品溶液-1-3



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30℃

数据文件名: RC\$QTL-392 - 0-39/18-461-2 - zzp-2025121851p-rcqx-pH6.8jz-2-jf50z-dz1-4.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rcqx-FX267.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260305-FX267.lcb

样品瓶号 : 2-18

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/03/05 23:16:33

处理时间 (V2) : 2026/03/06 16:30:47

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:wangdan

处理者:wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.003	55831	100.000	8881	2369	1.128	--
总计		55831	100.000	8881			

图61 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025121851批-pH6.8介质-桨法-50转
对照品溶液-1-4



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30℃

数据文件名: RC\$QTL-392 - 0-39/18-462-2 - zzp-2025121851p-rcqx-pH6.8jz-2-jf50z-dz1-5.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rcqx-FX267.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260305-FX267.lcb

样品瓶号 : 2-18

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/03/05 23:19:58

处理时间 (V2) : 2026/03/06 16:30:55

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:wangdan

处理者:wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.001	56060	100.000	8864	2369	1.125	--
总计		56060	100.000	8864			

图62 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025121851批-pH6.8介质-桨法-50转
对照品溶液-1-5



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 0-39/18-463-2 - zzp-2025121851p-rcqx-pH6.8jz-2-jf50z-p1-5min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rcqx-FX267.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260305-FX267.lcb

样品瓶号 : 2-1

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/03/05 23:23:23

处理时间 (V2) : 2026/03/06 16:31:02

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:wangdan

处理者:wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.030	21167	100.000	3722	2996	1.175	--
总计		21167	100.000	3722			

图63 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025121851批-pH6.8介质-浆法-50转-5min-片1
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 0-39/18-464-2 - zzp-2025121851p-rcqx-pH6.8jz-2-jf50z-p2-5min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rcqx-FX267.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260305-FX267.lcb

样品瓶号 : 2-10

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/03/05 23:26:47

处理时间 (V2) : 2026/03/06 16:31:10

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:wangdan

处理者:wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.030	21592	100.000	3802	3001	1.181	--
总计		21592	100.000	3802			

图64 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025121851批-pH6.8介质-浆法-50转-5min-片2
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 0-39/18-465-2 - zzp-2025121851p-rcqx-pH6.8jz-2-jf50z-p3-5min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rcqx-FX267.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260305-FX267.lcb

样品瓶号 : 2-19

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/03/05 23:30:11

处理时间 (V2) : 2026/03/06 16:31:18

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:wangdan

处理者:wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.031	23290	100.000	4085	2979	1.177	--
总计		23290	100.000	4085			

图65 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025121851批-pH6.8介质-浆法-50转-5min-片3
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 0-39/18-466-2 - zzp-2025121851p-rcqx-pH6.8jz-2-jf50z-p4-5min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rcqx-FX267.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260305-FX267.lcb

样品瓶号 : 2-28

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/03/05 23:33:36

处理时间 (V2) : 2026/03/06 16:31:26

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:wangdan

处理者:wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.032	24532	100.000	4299	2989	1.174	--
总计		24532	100.000	4299			

图66 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025121851批-pH6.8介质-浆法-50转-5min-片4
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 0-39/18-467-2 - zzp-2025121851p-rcqx-pH6.8jz-2-jf50z-p5-5min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rcqx-FX267.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260305-FX267.lcb

样品瓶号 : 2-37

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/03/05 23:36:59

处理时间 (V2) : 2026/03/06 16:31:33

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:wangdan

处理者:wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.032	25178	100.000	4449	3003	1.171	--
总计		25178	100.000	4449			

图67 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025121851批-pH6.8介质-浆法-50转-5min-片5
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 0-39/18-468-2 - zzp-2025121851p-rcqx-pH6.8jz-2-jf50z-p6-5min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rcqx-FX267.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260305-FX267.lcb

样品瓶号 : 2-46

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/03/05 23:40:22

处理时间 (V2) : 2026/03/06 16:31:41

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:wangdan

处理者:wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.032	26145	100.000	4569	2960	1.174	--
总计		26145	100.000	4569			

图68 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025121851批-pH6.8介质-桨法-50转-5min-片6
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 0-39/18-469-2 - zzp-2025121851p-rcqx-pH6.8jz-2-jf50z-p1-10min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rcqx-FX267.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260305-FX267.lcb

样品瓶号 : 2-2

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/03/05 23:43:46

处理时间 (V2) : 2026/03/06 16:31:49

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:wangdan

处理者:wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.031	22328	100.000	3924	2969	1.178	--
总计		22328	100.000	3924			

图69 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025121851批-pH6.8介质-浆法-50转-10min-片1
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 0-39/18-470-2 - zzp-2025121851p-rcqx-pH6.8jz-2-jf50z-p2-10min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rcqx-FX267.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260305-FX267.lcb

样品瓶号 : 2-11

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/03/05 23:47:10

处理时间 (V2) : 2026/03/06 16:31:56

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:wangdan

处理者:wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.030	22797	100.000	3983	2969	1.185	--
总计		22797	100.000	3983			

图70 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025121851批-pH6.8介质-浆法-50转-10min-片2
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 0-39/18-471-2 - zzp-2025121851p-rcqx-pH6.8jz-2-jf50z-p3-10min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rcqx-FX267.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260305-FX267.lcb

样品瓶号 : 2-20

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/03/05 23:50:34

处理时间 (V2) : 2026/03/06 16:32:04

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:wangdan

处理者:wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.031	24697	100.000	4302	2953	1.194	--
总计		24697	100.000	4302			

图71 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025121851批-pH6.8介质-浆法-50转-10min-片3
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 0-39/18-472-2 - zzp-2025121851p-rcqx-pH6.8jz-2-jf50z-p4-10min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rcqx-FX267.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260305-FX267.lcb

样品瓶号 : 2-29

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/03/05 23:53:58

处理时间 (V2) : 2026/03/06 16:32:12

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:wangdan

处理者:wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.032	26250	100.000	4571	2947	1.185	--
总计		26250	100.000	4571			

图72 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025121851批-pH6.8介质-浆法-50转-10min-片4
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 0-39/18-473-2 - zzp-2025121851p-rcqx-pH6.8jz-2-jf50z-p5-10min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rcqx-FX267.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260305-FX267.lcb

样品瓶号 : 2-38

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/03/05 23:57:22

处理时间 (V2) : 2026/03/06 16:32:19

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:wangdan

处理者:wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.031	27341	100.000	4745	2939	1.190	--
总计		27341	100.000	4745			

图73 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025121851批-pH6.8介质-浆法-50转-10min-片5
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 0-39/18-474-2 - zzp-2025121851p-rcqx-pH6.8jz-2-jf50z-p6-10min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rcqx-FX267.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260305-FX267.lcb

样品瓶号 : 2-47

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/03/06 00:00:45

处理时间 (V2) : 2026/03/06 16:32:27

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:wangdan

处理者:wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.030	27923	100.000	4866	2934	1.182	--
总计		27923	100.000	4866			

图74 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025121851批-pH6.8介质-浆法-50转-10min-片6
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 0-39/18-475-2 - zzp-2025121851p-rcqx-pH6.8jz-2-jf50z-p1-15min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rcqx-FX267.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260305-FX267.lcb

样品瓶号 : 2-3

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/03/06 00:04:09

处理时间 (V2) : 2026/03/06 16:32:34

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:wangdan

处理者:wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.031	24379	100.000	4235	2941	1.182	--
总计		24379	100.000	4235			

图75 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025121851批-pH6.8介质-浆法-50转-15min-片1
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 0-39/18-476-2 - zzp-2025121851p-rcqx-pH6.8jz-2-jf50z-p2-15min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rcqx-FX267.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260305-FX267.lcb

样品瓶号 : 2-12

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/03/06 00:07:33

处理时间 (V2) : 2026/03/06 16:32:42

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:wangdan

处理者:wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.031	24883	100.000	4307	2910	1.193	--
总计		24883	100.000	4307			

图76 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025121851批-pH6.8介质-浆法-50转-15min-片2
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30℃

数据文件名: RC\$QTL-392 - 0-39/18-477-2 - zzp-2025121851p-rcqx-pH6.8jz-2-jf50z-p3-15min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rcqx-FX267.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260305-FX267.lcb

样品瓶号 : 2-21

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/03/06 00:10:57

处理时间 (V2) : 2026/03/06 16:32:49

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:wangdan

处理者:wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.031	26251	100.000	4551	2907	1.186	--
总计		26251	100.000	4551			

图77 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025121851批-pH6.8介质-浆法-50转-15min-片3
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 0-39/18-478-2 - zzp-2025121851p-rcqx-pH6.8jz-2-jf50z-p4-15min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rcqx-FX267.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260305-FX267.lcb

样品瓶号 : 2-30

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/03/06 00:14:21

处理时间 (V2) : 2026/03/06 16:32:57

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:wangdan

处理者:wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.030	27775	100.000	4837	2925	1.182	--
总计		27775	100.000	4837			

图78 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025121851批-pH6.8介质-浆法-50转-15min-片4
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 0-39/18-479-2 - zzp-2025121851p-rcqx-pH6.8jz-2-jf50z-p5-15min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rcqx-FX267.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260305-FX267.lcb

样品瓶号 : 2-39

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/03/06 00:17:45

处理时间 (V2) : 2026/03/06 16:33:05

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:wangdan

处理者:wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.030	29204	100.000	5033	2897	1.186	--
总计		29204	100.000	5033			

图79 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025121851批-pH6.8介质-浆法-50转-15min-片5
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 0-39/18-480-2 - zzp-2025121851p-rcqx-pH6.8jz-2-jf50z-p6-15min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rcqx-FX267.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260305-FX267.lcb

样品瓶号 : 2-48

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/03/06 00:21:08

处理时间 (V2) : 2026/03/06 16:33:12

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:wangdan

处理者:wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.031	29642	100.000	5140	2915	1.193	--
总计		29642	100.000	5140			

图80 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025121851批-pH6.8介质-浆法-50转-15min-片6
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 0-39/18-481-2 - zzp-2025121851p-rcqx-pH6.8jz-2-jf50z-p1-20min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rcqx-FX267.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260305-FX267.lcb

样品瓶号 : 2-4

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/03/06 00:24:33

处理时间 (V2) : 2026/03/06 16:33:20

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:wangdan

处理者:wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.029	25775	100.000	4414	2836	1.183	--
总计		25775	100.000	4414			

图81 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025121851批-pH6.8介质-浆法-50转-20min-片1
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 0-39/18-482-2 - zzp-2025121851p-rcqx-pH6.8jz-2-jf50z-p2-20min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rcqx-FX267.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260305-FX267.lcb

样品瓶号 : 2-13

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/03/06 00:27:57

处理时间 (V2) : 2026/03/06 16:33:28

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:wangdan

处理者:wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.030	25538	100.000	4415	2897	1.193	--
总计		25538	100.000	4415			

图82 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025121851批-pH6.8介质-浆法-50转-20min-片2
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 0-39/18-483-2 - zzp-2025121851p-rcqx-pH6.8jz-2-jf50z-p3-20min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rcqx-FX267.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260305-FX267.lcb

样品瓶号 : 2-22

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/03/06 00:31:21

处理时间 (V2) : 2026/03/06 16:33:35

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:wangdan

处理者:wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.031	27093	100.000	4694	2905	1.191	--
总计		27093	100.000	4694			

图83 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025121851批-pH6.8介质-浆法-50转-20min-片3
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30℃

数据文件名: RC\$QTL-392 - 0-39/18-484-2 - zzp-2025121851p-rcqx-pH6.8jz-2-jf50z-p4-20min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rcqx-FX267.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260305-FX267.lcb

样品瓶号 : 2-31

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/03/06 00:34:45

处理时间 (V2) : 2026/03/06 16:33:43

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:wangdan

处理者:wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.032	29443	100.000	5058	2893	1.198	--
总计		29443	100.000	5058			

图84 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025121851批-pH6.8介质-浆法-50转-20min-片4
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 0-39/18-485-2 - zzp-2025121851p-rcqx-pH6.8jz-2-jf50z-p5-20min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rcqx-FX267.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260305-FX267.lcb

样品瓶号 : 2-40

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/03/06 00:38:09

处理时间 (V2) : 2026/03/06 16:33:50

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:wangdan

处理者:wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.031	30051	100.000	5187	2897	1.193	--
总计		30051	100.000	5187			

图85 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025121851批-pH6.8介质-浆法-50转-20min-片5
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30℃

数据文件名: RC\$QTL-392 - 0-39/18-486-2 - zzp-2025121851p-rcqx-pH6.8jz-2-jf50z-p6-20min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rcqx-FX267.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260305-FX267.lcb

样品瓶号 : 2-49

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/03/06 00:41:33

处理时间 (V2) : 2026/03/06 16:33:58

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:wangdan

处理者:wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.030	30675	100.000	5297	2883	1.197	--
总计		30675	100.000	5297			

图86 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025121851批-pH6.8介质-浆法-50转-20min-片6
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 0-39/18-487-2 - zzp-2025121851p-rcqx-pH6.8jz-2-jf50z-p1-30min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rcqx-FX267.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260305-FX267.lcb

样品瓶号 : 2-5

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/03/06 00:44:57

处理时间 (V2) : 2026/03/06 16:34:06

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:wangdan

处理者:wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.030	27138	100.000	4676	2887	1.195	--
总计		27138	100.000	4676			

图87 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025121851批-pH6.8介质-浆法-50转-30min-片1
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 0-39/18-488-2 - zzp-2025121851p-rcqx-pH6.8jz-2-jf50z-p2-30min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rcqx-FX267.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260305-FX267.lcb

样品瓶号 : 2-14

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/03/06 00:48:22

处理时间 (V2) : 2026/03/06 16:34:13

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:wangdan

处理者:wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.031	27380	100.000	4691	2864	1.202	--
总计		27380	100.000	4691			

图88 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025121851批-pH6.8介质-浆法-50转-30min-片2
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30℃

数据文件名: RC\$QTL-392 - 0-39/18-489-2 - zzp-2025121851p-rcqx-pH6.8jz-2-jf50z-p3-30min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rcqx-FX267.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260305-FX267.lcb

样品瓶号 : 2-23

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/03/06 00:51:46

处理时间 (V2) : 2026/03/06 16:34:21

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:wangdan

处理者:wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.030	29023	100.000	4953	2840	1.207	--
总计		29023	100.000	4953			

图89 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025121851批-pH6.8介质-浆法-50转-30min-片3
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30℃

数据文件名: RC\$QTL-392 - 0-39/18-490-2 - zzp-2025121851p-rcqx-pH6.8jz-2-jf50z-p4-30min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rcqx-FX267.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260305-FX267.lcb

样品瓶号 : 2-32

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/03/06 00:55:10

处理时间 (V2) : 2026/03/06 16:34:29

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:wangdan

处理者:wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.030	31447	100.000	5385	2856	1.201	--
总计		31447	100.000	5385			

图90 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025121851批-pH6.8介质-浆法-50转-30min-片4
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 0-39/18-491-2 - zzp-2025121851p-rcqx-pH6.8jz-2-jf50z-p5-30min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rcqx-FX267.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260305-FX267.lcb

样品瓶号 : 2-41

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/03/06 00:58:35

处理时间 (V2) : 2026/03/06 16:34:37

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:wangdan

处理者:wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.031	32304	100.000	5536	2853	1.206	--
总计		32304	100.000	5536			

图91 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025121851批-pH6.8介质-浆法-50转-30min-片5
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30℃

数据文件名: RC\$QTL-392 - 0-39/18-492-2 - zzp-2025121851p-rcqx-pH6.8jz-2-jf50z-p6-30min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rcqx-FX267.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260305-FX267.lcb

样品瓶号 : 2-50

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/03/06 01:01:59

处理时间 (V2) : 2026/03/06 16:34:44

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:wangdan

处理者:wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.031	32940	100.000	5610	2838	1.205	--
总计		32940	100.000	5610			

图92 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025121851批-pH6.8介质-浆法-50转-30min-片6
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30℃

数据文件名: RC\$QTL-392 - 0-39/18-493-2 - zzp-2025121851p-rcqx-pH6.8jz-2-jf50z-p1-45min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rcqx-FX267.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260305-FX267.lcb

样品瓶号 : 2-6

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/03/06 01:05:24

处理时间 (V2) : 2026/03/06 16:34:52

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:wangdan

处理者:wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.031	29415	100.000	5036	2840	1.210	--
总计		29415	100.000	5036			

图93 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025121851批-pH6.8介质-浆法-50转-45min-片1
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30℃

数据文件名: RC\$QTL-392 - 0-39/18-494-2 - zzp-2025121851p-rcqx-pH6.8jz-2-jf50z-p2-45min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rcqx-FX267.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260305-FX267.lcb

样品瓶号 : 2-15

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/03/06 01:08:49

处理时间 (V2) : 2026/03/06 16:35:00

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:wangdan

处理者:wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.031	28937	100.000	4934	2841	1.216	--
总计		28937	100.000	4934			

图94 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025121851批-pH6.8介质-浆法-50转-45min-片2
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 0-39/18-495-2 - zzp-2025121851p-rcqx-pH6.8jz-2-jf50z-p3-45min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rcqx-FX267.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260305-FX267.lcb

样品瓶号 : 2-24

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/03/06 01:12:13

处理时间 (V2) : 2026/03/06 16:35:07

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:wangdan

处理者:wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.030	30656	100.000	5207	2821	1.213	--
总计		30656	100.000	5207			

图95 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025121851批-pH6.8介质-浆法-50转-45min-片3
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30℃

数据文件名: RC\$QTL-392 - 0-39/18-496-2 - zzp-2025121851p-rcqx-pH6.8jz-2-jf50z-p4-45min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rcqx-FX267.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260305-FX267.lcb

样品瓶号 : 2-33

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/03/06 01:15:37

处理时间 (V2) : 2026/03/06 16:35:15

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:wangdan

处理者:wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.030	33120	100.000	5620	2788	1.211	--
总计		33120	100.000	5620			

图96 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025121851批-pH6.8介质-浆法-50转-45min-片4
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 0-39/18-497-2 - zzp-2025121851p-rcqx-pH6.8jz-2-jf50z-p5-45min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rcqx-FX267.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260305-FX267.lcb

样品瓶号 : 2-42

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/03/06 01:19:02

处理时间 (V2) : 2026/03/06 16:35:23

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:wangdan

处理者:wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.031	33973	100.000	5754	2804	1.211	--
总计		33973	100.000	5754			

图97 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025121851批-pH6.8介质-浆法-50转-45min-片5
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 0-39/18-498-2 - zzp-2025121851p-rcqx-pH6.8jz-2-jf50z-p6-45min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rcqx-FX267.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260305-FX267.lcb

样品瓶号 : 2-51

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/03/06 01:22:26

处理时间 (V2) : 2026/03/06 16:35:30

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:wangdan

处理者:wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.031	34273	100.000	5803	2807	1.214	--
总计		34273	100.000	5803			

图98 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025121851批-pH6.8介质-浆法-50转-45min-片6
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 0-39/18-499-2 - zzp-2025121851p-rcqx-pH6.8jz-2-jf50z-p1-60min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rcqx-FX267.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260305-FX267.lcb

样品瓶号 : 2-7

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/03/06 01:25:51

处理时间 (V2) : 2026/03/06 16:35:38

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:wangdan

处理者:wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.031	32002	100.000	5390	2786	1.215	--
总计		32002	100.000	5390			

图99 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025121851批-pH6.8介质-浆法-50转-60min-片1
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 0-39/18-500-2 - zzp-2025121851p-rcqx-pH6.8jz-2-jf50z-p2-60min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rcqx-FX267.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260305-FX267.lcb

样品瓶号 : 2-16

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/03/06 01:29:15

处理时间 (V2) : 2026/03/06 16:35:45

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:wangdan

处理者:wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.029	31375	100.000	5303	2789	1.218	--
总计		31375	100.000	5303			

图100 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025121851批-pH6.8介质-浆法-50转-60min-片2
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 0-39/18-501-2 - zzp-2025121851p-rcqx-pH6.8jz-2-jf50z-p3-60min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rcqx-FX267.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260305-FX267.lcb

样品瓶号 : 2-25

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/03/06 01:32:40

处理时间 (V2) : 2026/03/06 16:35:53

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:wangdan

处理者:wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.029	32494	100.000	5464	2769	1.214	--
总计		32494	100.000	5464			

图101 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025121851批-pH6.8介质-浆法-50转-60min-片3
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30℃

数据文件名: RC\$QTL-392 - 0-39/18-502-2 - zzp-2025121851p-rcqx-pH6.8jz-2-jf50z-p4-60min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rcqx-FX267.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260305-FX267.lcb

样品瓶号 : 2-34

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/03/06 01:36:05

处理时间 (V2) : 2026/03/06 16:36:01

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:wangdan

处理者:wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.030	34831	100.000	5851	2768	1.227	--
总计		34831	100.000	5851			

图102 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025121851批-pH6.8介质-浆法-50转-60min-片4
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 0-39/18-503-2 - zzp-2025121851p-rcqx-pH6.8jz-2-jf50z-p5-60min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rcqx-FX267.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260305-FX267.lcb

样品瓶号 : 2-43

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/03/06 01:39:29

处理时间 (V2) : 2026/03/06 16:36:09

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:wangdan

处理者:wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.031	35405	100.000	5933	2764	1.219	--
总计		35405	100.000	5933			

图103 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025121851批-pH6.8介质-浆法-50转-60min-片5
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 0-39/18-504-2 - zzp-2025121851p-rcqx-pH6.8jz-2-jf50z-p6-60min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rcqx-FX267.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260305-FX267.lcb

样品瓶号 : 2-52

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/03/06 01:42:53

处理时间 (V2) : 2026/03/06 16:36:16

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:wangdan

处理者:wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.032	35462	100.000	5934	2756	1.227	--
总计		35462	100.000	5934			

图104 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025121851批-pH6.8介质-浆法-50转-60min-片6
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 0-39/18-505-2 - zzp-2025121851p-rcqx-pH6.8jz-2-jf50z-p1-jx.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rcqx-FX267.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260305-FX267.lcb

样品瓶号 : 2-8

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/03/06 01:46:17

处理时间 (V2) : 2026/03/06 16:36:24

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:wangdan

处理者:wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.029	35374	100.000	5956	2751	1.217	--
总计		35374	100.000	5956			

图105 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025121851批-pH6.8介质-桨法-50转-极限转速-片1
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30℃

数据文件名: RC\$QTL-392 - 0-39/18-506-2 - zzp-2025121851p-rcqx-pH6.8jz-2-jf50z-p2-jx.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rcqx-FX267.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260305-FX267.lcb

样品瓶号 : 2-17

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/03/06 01:49:41

处理时间 (V2) : 2026/03/06 16:36:31

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:wangdan

处理者:wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.031	35643	100.000	5962	2753	1.223	--
总计		35643	100.000	5962			

图106 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025121851批-pH6.8介质-桨法-50转-极限转速-片2
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 0-39/18-507-2 - zzp-2025121851p-rcqx-pH6.8jz-2-jf50z-p3-jx.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rcqx-FX267.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260305-FX267.lcb

样品瓶号 : 2-26

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/03/06 01:53:06

处理时间 (V2) : 2026/03/06 16:36:39

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:wangdan

处理者:wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.031	36237	100.000	6056	2747	1.231	--
总计		36237	100.000	6056			

图107 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025121851批-pH6.8介质-桨法-50转-极限转速-片3
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 0-39/18-508-2 - zzp-2025121851p-rcqx-pH6.8jz-2-jf50z-p4-jx.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rcqx-FX267.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260305-FX267.lcb

样品瓶号 : 2-35

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/03/06 01:56:31

处理时间 (V2) : 2026/03/06 16:36:47

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:wangdan

处理者:wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.031	36785	100.000	6145	2731	1.222	--
总计		36785	100.000	6145			

图108 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025121851批-pH6.8介质-桨法-50转-极限转速-片4
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 0-39/18-509-2 - zzp-2025121851p-rcqx-pH6.8jz-2-jf50z-p5-jx.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rcqx-FX267.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260305-FX267.lcb

样品瓶号 : 2-44

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/03/06 01:59:55

处理时间 (V2) : 2026/03/06 16:36:54

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:wangdan

处理者:wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.030	37060	100.000	6186	2735	1.226	--
总计		37060	100.000	6186			

图109 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025121851批-pH6.8介质-桨法-50转-极限转速-片5
供试品溶液-1




QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温 : 30°C
数据文件名: RC\$QTL-392 - 0-39/18-510-2 - zzp-2025121851p-rcqx-pH6.8jz-2-jf50z-p6-jx.lcd
方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260305-FX267.lcb
样品瓶号 : 2-53
进样体积 : 20μl
进样时间 : 2026/03/06 02:03:20
处理时间 (V2) : 2026/03/06 16:37:02
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 1.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者:wangdan
处理者:wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.031	37408	100.000	6240	2728	1.227	--
总计		37408	100.000	6240			

图110 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025121851批-pH6.8介质-桨法-50转-极限转速-片6
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30℃

数据文件名: RC\$QTL-392 - 0-39/18-511-2 - zzp-2025121851p-rcqx-pH6.8jz-2-jf50z-dz2-1.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rcqx-FX267.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260305-FX267.lcb

样品瓶号 : 2-27

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/03/06 02:06:45

处理时间 (V2) : 2026/03/06 16:37:09

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:wangdan

处理者:wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.000	56245	100.000	8608	2211	1.168	--
总计		56245	100.000	8608			

图111 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025121851批-pH6.8介质-桨法-50转
对照品溶液-2-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30℃

数据文件名: RC\$QTL-392 - 0-39/18-512-2 - zzp-2025121851p-rcqx-pH6.8jz-2-jf50z-dz2-2.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rcqx-FX267.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260305-FX267.lcb

样品瓶号 : 2-27

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/03/06 02:10:09

处理时间 (V2) : 2026/03/06 16:37:17

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:wangdan

处理者:wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.000	56152	100.000	8618	2224	1.171	--
总计		56152	100.000	8618			

图112 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025121851批-pH6.8介质-桨法-50转
对照品溶液-2-2



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 0-39/18-513-2 - cbzj-00637Ap-rcqx-pH6.8jz-1-jf50z-rj.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rcqx-FX267.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260305-FX267.lcb

样品瓶号 : 3-9

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/03/06 02:13:32

处理时间 (V2) : 2026/03/06 16:37:25

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:wangdan

处理者:wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图113 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-00637A批-pH6.8介质-桨法-50转
溶剂



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30℃

数据文件名: RC\$QTL-392 - 0-39/18-514-2 - cbzj-00637Ap-rcqx-pH6.8jz-1-jf50z-dz1-1.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rcqx-FX267.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260305-FX267.lcb

样品瓶号 : 3-18

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/03/06 02:16:55

处理时间 (V2) : 2026/03/06 16:37:32

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:wangdan

处理者:wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.999	56778	100.000	8616	2204	1.191	--
总计		56778	100.000	8616			

图114 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-00637A批-pH6.8介质-桨法-50转
对照品溶液-1-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30℃

数据文件名: RC\$QTL-392 - 0-39/18-515-2 - cbzj-00637Ap-rcqx-pH6.8jz-1-jf50z-dz1-2.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rcqx-FX267.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260305-FX267.lcb

样品瓶号 : 3-18

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/03/06 02:20:18

处理时间 (V2) : 2026/03/06 16:37:40

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 1.0ml/min

波长:210nm


版本号:6.115

实验者:wangdan

处理者:wangdan

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.998	56336	100.000	8633	2202	1.171	--
总计		56336	100.000	8633			

图115 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-00637A批-pH6.8介质-桨法-50转
对照品溶液-1-2



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30℃

数据文件名: RC\$QTL-392 - 0-39/18-516-2 - cbzj-00637Ap-rcqx-pH6.8jz-1-jf50z-dz1-3.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rcqx-FX267.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260305-FX267.lcb

样品瓶号 : 3-18

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/03/06 02:23:41

处理时间 (V2) : 2026/03/06 16:37:47

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:wangdan

处理者:wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.998	56191	100.000	8617	2213	1.170	--
总计		56191	100.000	8617			

图116 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-00637A批-pH6.8介质-桨法-50转
对照品溶液-1-3



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30℃

数据文件名: RC\$QTL-392 - 0-39/18-517-2 - cbzj-00637Ap-rcqx-pH6.8jz-1-jf50z-dz1-4.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rcqx-FX267.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260305-FX267.lcb

样品瓶号 : 3-18

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/03/06 02:27:04

处理时间 (V2) : 2026/03/06 16:37:55

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:wangdan

处理者:wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.999	56198	100.000	8608	2209	1.172	--
总计		56198	100.000	8608			

图117 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-00637A批-pH6.8介质-桨法-50转
对照品溶液-1-4



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30℃

数据文件名: RC\$QTL-392 - 0-39/18-518-2 - cbzj-00637Ap-rcqx-pH6.8jz-1-jf50z-dz1-5.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rcqx-FX267.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260305-FX267.lcb

样品瓶号 : 3-18

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/03/06 02:30:27

处理时间 (V2) : 2026/03/06 16:38:02

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:wangdan

处理者:wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.999	56255	100.000	8629	2210	1.168	--
总计		56255	100.000	8629			

图118 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-00637A批-pH6.8介质-桨法-50转
对照品溶液-1-5



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30℃

数据文件名: RC\$QTL-392 - 0-39/18-519-2 - cbzj-00637Ap-rcqx-pH6.8jz-1-jf50z-p1-5min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rcqx-FX267.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260305-FX267.lcb

样品瓶号 : 3-1

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/03/06 02:33:50

处理时间 (V2) : 2026/03/06 16:38:10

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:wangdan

处理者:wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.028	27790	100.000	4597	2704	1.245	--
总计		27790	100.000	4597			

图119 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-00637A批-pH6.8介质-桨法-50转-5min-片1
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 0-39/18-520-2 - cbzj-00637Ap-rcqx-pH6.8jz-1-jf50z-p2-5min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rcqx-FX267.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260305-FX267.lcb

样品瓶号 : 3-10

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/03/06 02:37:12

处理时间 (V2) : 2026/03/06 16:38:18

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:wangdan

处理者:wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.028	28137	100.000	4658	2695	1.241	--
总计		28137	100.000	4658			

图120 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-00637A批-pH6.8介质-桨法-50转-5min-片2
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 0-39/18-521-2 - cbzj-00637Ap-rcqx-pH6.8jz-1-jf50z-p3-5min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rcqx-FX267.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260305-FX267.lcb

样品瓶号 : 3-19

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/03/06 02:40:35

处理时间 (V2) : 2026/03/06 16:38:26

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:wangdan

处理者:wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.029	28216	100.000	4669	2688	1.252	--
总计		28216	100.000	4669			

图121 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-00637A批-pH6.8介质-桨法-50转-5min-片3
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30℃

数据文件名: RC\$QTL-392 - 0-39/18-522-2 - cbzj-00637Ap-rcqx-pH6.8jz-1-jf50z-p4-5min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rcqx-FX267.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260305-FX267.lcb

样品瓶号 : 3-28

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/03/06 02:43:58

处理时间 (V2) : 2026/03/06 16:38:33

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:wangdan

处理者:wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.028	29605	100.000	4884	2672	1.254	--
总计		29605	100.000	4884			

图122 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-00637A批-pH6.8介质-桨法-50转-5min-片4
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 0-39/18-523-2 - cbzj-00637Ap-rcqx-pH6.8jz-1-jf50z-p5-5min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rcqx-FX267.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260305-FX267.lcb

样品瓶号 : 3-37

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/03/06 02:47:21

处理时间 (V2) : 2026/03/06 16:38:41

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:wangdan

处理者:wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.028	29794	100.000	4933	2695	1.246	--
总计		29794	100.000	4933			

图123 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-00637A批-pH6.8介质-桨法-50转-5min-片5
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 0-39/18-524-2 - cbzj-00637Ap-rcqx-pH6.8jz-1-jf50z-p6-5min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rcqx-FX267.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260305-FX267.lcb

样品瓶号 : 3-46

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/03/06 02:50:43

处理时间 (V2) : 2026/03/06 16:38:49

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:wangdan

处理者:wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.028	30445	100.000	5024	2696	1.254	--
总计		30445	100.000	5024			

图124 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-00637A批-pH6.8介质-桨法-50转-5min-片6
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 0-39/18-525-2 - cbzj-00637Ap-rcqx-pH6.8jz-1-jf50z-p1-10min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rcqx-FX267.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260305-FX267.lcb

样品瓶号 : 3-2

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/03/06 02:54:06

处理时间 (V2) : 2026/03/06 16:38:57

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:wangdan

处理者:wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.028	29439	100.000	4822	2658	1.257	--
总计		29439	100.000	4822			

图125 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-00637A批-pH6.8介质-浆法-50转-10min-片1
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30℃

数据文件名: RC\$QTL-392 - 0-39/18-526-2 - cbzj-00637Ap-rcqx-pH6.8jz-1-jf50z-p2-10min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rcqx-FX267.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260305-FX267.lcb

样品瓶号 : 3-11

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/03/06 02:57:28

处理时间 (V2) : 2026/03/06 16:39:05

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:wangdan

处理者:wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.028	29658	100.000	4876	2666	1.254	--
总计		29658	100.000	4876			

图126 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-00637A批-pH6.8介质-浆法-50转-10min-片2
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 0-39/18-527-2 - cbzj-00637Ap-rcqx-pH6.8jz-1-jf50z-p3-10min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rcqx-FX267.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260305-FX267.lcb

样品瓶号 : 3-20

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/03/06 03:00:50

处理时间 (V2) : 2026/03/06 16:39:12

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:wangdan

处理者:wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.029	29915	100.000	4921	2671	1.264	--
总计		29915	100.000	4921			

图127 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-00637A批-pH6.8介质-浆法-50转-10min-片3
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 0-39/18-528-2 - cbzj-00637Ap-rcqx-pH6.8jz-1-jf50z-p4-10min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rcqx-FX267.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260305-FX267.lcb

样品瓶号 : 3-29

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/03/06 03:04:13

处理时间 (V2) : 2026/03/06 16:39:20

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:wangdan

处理者:wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.030	31033	100.000	5089	2666	1.261	--
总计		31033	100.000	5089			

图128 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-00637A批-pH6.8介质-浆法-50转-10min-片4
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 0-39/18-529-2 - cbzj-00637Ap-rcqx-pH6.8jz-1-jf50z-p5-10min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rcqx-FX267.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260305-FX267.lcb

样品瓶号 : 3-38

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/03/06 03:07:35

处理时间 (V2) : 2026/03/06 16:39:28

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:wangdan

处理者:wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.030	31539	100.000	5170	2645	1.264	--
总计		31539	100.000	5170			

图129 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-00637A批-pH6.8介质-浆法-50转-10min-片5
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 0-39/18-530-2 - cbzj-00637Ap-rcqx-pH6.8jz-1-jf50z-p6-10min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rcqx-FX267.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260305-FX267.lcb

样品瓶号 : 3-47

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/03/06 03:10:57

处理时间 (V2) : 2026/03/06 16:39:36

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:wangdan

处理者:wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.029	31584	100.000	5189	2666	1.264	--
总计		31584	100.000	5189			

图130 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-00637A批-pH6.8介质-浆法-50转-10min-片6
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 0-39/18-531-2 - cbzj-00637Ap-rcqx-pH6.8jz-1-jf50z-p1-15min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rcqx-FX267.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260305-FX267.lcb

样品瓶号 : 3-3

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/03/06 03:14:20

处理时间 (V2) : 2026/03/06 16:39:43

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:wangdan

处理者:wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.029	30442	100.000	4983	2668	1.266	--
总计		30442	100.000	4983			

图131 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-00637A批-pH6.8介质-浆法-50转-15min-片1
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 0-39/18-532-2 - cbzj-00637Ap-rcqx-pH6.8jz-1-jf50z-p2-15min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rcqx-FX267.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260305-FX267.lcb

样品瓶号 : 3-12

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/03/06 03:17:42

处理时间 (V2) : 2026/03/06 16:39:51

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:wangdan

处理者:wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.029	30597	100.000	4992	2634	1.268	--
总计		30597	100.000	4992			

图132 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-00637A批-pH6.8介质-浆法-50转-15min-片2
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30℃

数据文件名: RC\$QTL-392 - 0-39/18-533-2 - cbzj-00637Ap-rcqx-pH6.8jz-1-jf50z-p3-15min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rcqx-FX267.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260305-FX267.lcb

样品瓶号 : 3-21

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/03/06 03:21:05

处理时间 (V2) : 2026/03/06 16:39:59

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:wangdan

处理者:wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.030	30923	100.000	5067	2641	1.261	--
总计		30923	100.000	5067			

图133 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-00637A批-pH6.8介质-浆法-50转-15min-片3
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 0-39/18-534-2 - cbzj-00637Ap-rcqx-pH6.8jz-1-jf50z-p4-15min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rcqx-FX267.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260305-FX267.lcb

样品瓶号 : 3-30

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/03/06 03:24:27

处理时间 (V2) : 2026/03/06 16:40:06

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:wangdan

处理者:wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.029	32845	100.000	5177	2649	1.515	--
总计		32845	100.000	5177			

图134 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-00637A批-pH6.8介质-浆法-50转-15min-片4
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 0-39/18-535-2 - cbzj-00637Ap-rcqx-pH6.8jz-1-jf50z-p5-15min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rcqx-FX267.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260305-FX267.lcb

样品瓶号 : 3-39

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/03/06 03:27:49

处理时间 (V2) : 2026/03/06 16:40:14

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:wangdan

处理者:wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.029	31807	100.000	5224	2639	1.260	--
总计		31807	100.000	5224			

图135 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-00637A批-pH6.8介质-浆法-50转-15min-片5
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 0-39/18-536-2 - cbzj-00637Ap-rcqx-pH6.8jz-1-jf50z-p6-15min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rcqx-FX267.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260305-FX267.lcb

样品瓶号 : 3-48

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/03/06 03:31:12

处理时间 (V2) : 2026/03/06 16:40:22

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:wangdan

处理者:wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.030	31746	100.000	5194	2640	1.261	--
总计		31746	100.000	5194			

图136 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-00637A批-pH6.8介质-浆法-50转-15min-片6
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 0-39/18-537-2 - cbzj-00637Ap-rcqx-pH6.8jz-1-jf50z-p1-20min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rcqx-FX267.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260305-FX267.lcb

样品瓶号 : 3-4

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/03/06 03:34:34

处理时间 (V2) : 2026/03/06 16:40:29

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:wangdan

处理者:wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.029	31032	100.000	5064	2622	1.269	--
总计		31032	100.000	5064			

图137 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-00637A批-pH6.8介质-浆法-50转-20min-片1
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 0-39/18-538-2 - cbzj-00637Ap-rcqx-pH6.8jz-1-jf50z-p2-20min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rcqx-FX267.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260305-FX267.lcb

样品瓶号 : 3-13

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/03/06 03:37:56

处理时间 (V2) : 2026/03/06 16:40:37

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:wangdan

处理者:wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.029	31263	100.000	5091	2640	1.278	--
总计		31263	100.000	5091			

图138 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-00637A批-pH6.8介质-浆法-50转-20min-片2
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 0-39/18-539-2 - cbzj-00637Ap-rcqx-pH6.8jz-1-jf50z-p3-20min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rcqx-FX267.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260305-FX267.lcb

样品瓶号 : 3-22

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/03/06 03:41:18

处理时间 (V2) : 2026/03/06 16:40:44

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:wangdan

处理者:wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.030	31484	100.000	5120	2610	1.271	--
总计		31484	100.000	5120			

图139 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-00637A批-pH6.8介质-浆法-50转-20min-片3
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 0-39/18-540-2 - cbzj-00637Ap-rcqx-pH6.8jz-1-jf50z-p4-20min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rcqx-FX267.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260305-FX267.lcb

样品瓶号 : 3-31

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/03/06 03:44:41

处理时间 (V2) : 2026/03/06 16:40:52

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:wangdan

处理者:wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.029	32236	100.000	5235	2617	1.274	--
总计		32236	100.000	5235			

图140 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-00637A批-pH6.8介质-浆法-50转-20min-片4
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 0-39/18-541-2 - cbzj-00637Ap-rcqx-pH6.8jz-1-jf50z-p5-20min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rcqx-FX267.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260305-FX267.lcb

样品瓶号 : 3-40

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/03/06 03:48:04

处理时间 (V2) : 2026/03/06 16:40:59

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:wangdan

处理者:wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.029	32536	100.000	5296	2624	1.271	--
总计		32536	100.000	5296			

图141 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-00637A批-pH6.8介质-浆法-50转-20min-片5
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 0-39/18-542-2 - cbzj-00637Ap-rcqx-pH6.8jz-1-jf50z-p6-20min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rcqx-FX267.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260305-FX267.lcb

样品瓶号 : 3-49

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/03/06 03:51:26

处理时间 (V2) : 2026/03/06 16:41:07

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:wangdan

处理者:wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.029	32704	100.000	5323	2616	1.268	--
总计		32704	100.000	5323			

图142 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-00637A批-pH6.8介质-浆法-50转-20min-片6
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 0-39/18-543-2 - cbzj-00637Ap-rcqx-pH6.8jz-1-jf50z-p1-30min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rcqx-FX267.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260305-FX267.lcb

样品瓶号 : 3-5

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/03/06 03:54:49

处理时间 (V2) : 2026/03/06 16:41:15

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:wangdan

处理者:wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.030	31696	100.000	5148	2622	1.277	--
总计		31696	100.000	5148			

图143 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-00637A批-pH6.8介质-浆法-50转-30min-片1
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 0-39/18-544-2 - cbzj-00637Ap-rcqx-pH6.8jz-1-jf50z-p2-30min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rcqx-FX267.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260305-FX267.lcb

样品瓶号 : 3-14

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/03/06 03:58:11

处理时间 (V2) : 2026/03/06 16:41:22

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:wangdan

处理者:wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.029	32085	100.000	5205	2613	1.271	--
总计		32085	100.000	5205			

图144 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-00637A批-pH6.8介质-浆法-50转-30min-片2
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 0-39/18-545-2 - cbzj-00637Ap-rcqx-pH6.8jz-1-jf50z-p3-30min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rcqx-FX267.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260305-FX267.lcb

样品瓶号 : 3-23

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/03/06 04:01:33

处理时间 (V2) : 2026/03/06 16:41:30

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:wangdan

处理者:wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.028	32059	100.000	5201	2617	1.273	--
总计		32059	100.000	5201			

图145 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-00637A批-pH6.8介质-浆法-50转-30min-片3
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 0-39/18-546-2 - cbzj-00637Ap-rcqx-pH6.8jz-1-jf50z-p4-30min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rcqx-FX267.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260305-FX267.lcb

样品瓶号 : 3-32

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/03/06 04:04:55

处理时间 (V2) : 2026/03/06 16:41:38

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:wangdan

处理者:wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.029	32930	100.000	5331	2610	1.274	--
总计		32930	100.000	5331			

图146 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-00637A批-pH6.8介质-浆法-50转-30min-片4
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 0-39/18-547-2 - cbzj-00637Ap-rcqx-pH6.8jz-1-jf50z-p5-30min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rcqx-FX267.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260305-FX267.lcb

样品瓶号 : 3-41

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/03/06 04:08:17

处理时间 (V2) : 2026/03/06 16:41:46

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:wangdan

处理者:wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.030	33010	100.000	5357	2602	1.277	--
总计		33010	100.000	5357			

图147 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-00637A批-pH6.8介质-浆法-50转-30min-片5
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 0-39/18-548-2 - cbzj-00637Ap-rcqx-pH6.8jz-1-jf50z-p6-30min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rcqx-FX267.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260305-FX267.lcb

样品瓶号 : 3-50

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/03/06 04:11:39

处理时间 (V2) : 2026/03/06 16:41:53

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:wangdan

处理者:wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.028	33379	100.000	5400	2600	1.276	--
总计		33379	100.000	5400			

图148 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-00637A批-pH6.8介质-浆法-50转-30min-片6
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 0-39/18-549-2 - cbzj-00637Ap-rcqx-pH6.8jz-1-jf50z-p1-45min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rcqx-FX267.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260305-FX267.lcb

样品瓶号 : 3-6

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/03/06 04:15:02

处理时间 (V2) : 2026/03/06 16:42:01

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:wangdan

处理者:wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.028	32618	100.000	5285	2612	1.278	--
总计		32618	100.000	5285			

图149 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-00637A批-pH6.8介质-浆法-50转-45min-片1
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 0-39/18-550-2 - cbzj-00637Ap-rcqx-pH6.8jz-1-jf50z-p2-45min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rcqx-FX267.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260305-FX267.lcb

样品瓶号 : 3-15

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/03/06 04:18:24

处理时间 (V2) : 2026/03/06 16:42:09

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:wangdan

处理者:wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.029	32697	100.000	5285	2592	1.279	--
总计		32697	100.000	5285			

图150 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-00637A批-pH6.8介质-浆法-50转-45min-片2
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 0-39/18-551-2 - cbzj-00637Ap-rcqx-pH6.8jz-1-jf50z-p3-45min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rcqx-FX267.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260305-FX267.lcb

样品瓶号 : 3-24

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/03/06 04:21:46

处理时间 (V2) : 2026/03/06 16:42:16

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:wangdan

处理者:wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.029	32758	100.000	5299	2605	1.276	--
总计		32758	100.000	5299			

图151 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-00637A批-pH6.8介质-浆法-50转-45min-片3
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 0-39/18-552-2 - cbzj-00637Ap-rcqx-pH6.8jz-1-jf50z-p4-45min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rcqx-FX267.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260305-FX267.lcb

样品瓶号 : 3-33

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/03/06 04:25:08

处理时间 (V2) : 2026/03/06 16:42:24

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:wangdan

处理者:wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.028	33324	100.000	5392	2596	1.273	--
总计		33324	100.000	5392			

图152 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-00637A批-pH6.8介质-浆法-50转-45min-片4
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 0-39/18-553-2 - cbzj-00637Ap-rcqx-pH6.8jz-1-jf50z-p5-45min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rcqx-FX267.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260305-FX267.lcb

样品瓶号 : 3-42

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/03/06 04:28:30

处理时间 (V2) : 2026/03/06 16:42:32

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:wangdan

处理者:wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.027	33494	100.000	5386	2588	1.278	--
总计		33494	100.000	5386			

图153 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-00637A批-pH6.8介质-浆法-50转-45min-片5
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 0-39/18-554-2 - cbzj-00637Ap-rcqx-pH6.8jz-1-jf50z-p6-45min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rcqx-FX267.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260305-FX267.lcb

样品瓶号 : 3-51

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/03/06 04:31:52

处理时间 (V2) : 2026/03/06 16:42:40

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:wangdan

处理者:wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.028	33482	100.000	5410	2585	1.279	--
总计		33482	100.000	5410			

图154 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-00637A批-pH6.8介质-浆法-50转-45min-片6
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 0-39/18-555-2 - cbzj-00637Ap-rcqx-pH6.8jz-1-jf50z-p1-60min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rcqx-FX267.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260305-FX267.lcb

样品瓶号 : 3-7

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/03/06 04:35:15

处理时间 (V2) : 2026/03/06 16:42:47

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:wangdan

处理者:wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.028	32665	100.000	5280	2581	1.275	--
总计		32665	100.000	5280			

图155 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-00637A批-pH6.8介质-浆法-50转-60min-片1
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 0-39/18-556-2 - cbzj-00637Ap-rcqx-pH6.8jz-1-jf50z-p2-60min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rcqx-FX267.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260305-FX267.lcb

样品瓶号 : 3-16

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/03/06 04:38:37

处理时间 (V2) : 2026/03/06 16:42:55

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:wangdan

处理者:wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.028	33047	100.000	5315	2564	1.287	--
总计		33047	100.000	5315			

图156 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-00637A批-pH6.8介质-浆法-50转-60min-片2
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30℃

数据文件名: RC\$QTL-392 - 0-39/18-557-2 - cbzj-00637Ap-rcqx-pH6.8jz-1-jf50z-p3-60min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rcqx-FX267.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260305-FX267.lcb

样品瓶号 : 3-25

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/03/06 04:41:59

处理时间 (V2) : 2026/03/06 16:43:03

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:wangdan

处理者:wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.027	33095	100.000	5315	2571	1.277	--
总计		33095	100.000	5315			

图157 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-00637A批-pH6.8介质-浆法-50转-60min-片3
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 0-39/18-558-2 - cbzj-00637Ap-rcqx-pH6.8jz-1-jf50z-p4-60min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rcqx-FX267.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260305-FX267.lcb

样品瓶号 : 3-34

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/03/06 04:45:21

处理时间 (V2) : 2026/03/06 16:43:10

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:wangdan

处理者:wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.027	33897	100.000	5407	2577	1.294	--
总计		33897	100.000	5407			

图158 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-00637A批-pH6.8介质-浆法-50转-60min-片4
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 0-39/18-559-2 - cbzj-00637Ap-rcqx-pH6.8jz-1-jf50z-p5-60min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rcqx-FX267.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260305-FX267.lcb

样品瓶号 : 3-43

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/03/06 04:48:43

处理时间 (V2) : 2026/03/06 16:43:18

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:wangdan

处理者:wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.028	33537	100.000	5380	2570	1.287	--
总计		33537	100.000	5380			

图159 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-00637A批-pH6.8介质-浆法-50转-60min-片5
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30℃

数据文件名: RC\$QTL-392 - 0-39/18-560-2 - cbzj-00637Ap-rcqx-pH6.8jz-1-jf50z-p6-60min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rcqx-FX267.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260305-FX267.lcb

样品瓶号 : 3-52

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/03/06 04:52:05

处理时间 (V2) : 2026/03/06 16:43:27

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:wangdan

处理者:wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.029	33376	100.000	5367	2572	1.282	--
总计		33376	100.000	5367			

图160 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-00637A批-pH6.8介质-浆法-50转-60min-片6
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 0-39/18-561-2 - cbzj-00637Ap-rcqx-pH6.8jz-1-jf50z-p1-jx.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rcqx-FX267.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260305-FX267.lcb

样品瓶号 : 3-8

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/03/06 04:55:29

处理时间 (V2) : 2026/03/06 16:43:35

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:wangdan

处理者:wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.027	33353	100.000	5365	2575	1.283	--
总计		33353	100.000	5365			

图161 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-00637A批-pH6.8介质-桨法-50转-极限转速-片1
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 0-39/18-562-2 - cbzj-00637Ap-rcqx-pH6.8jz-1-jf50z-p2-jx.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rcqx-FX267.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260305-FX267.lcb

样品瓶号 : 3-17

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/03/06 04:58:52

处理时间 (V2) : 2026/03/06 16:43:43

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:wangdan

处理者:wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.027	33949	100.000	5424	2550	1.290	--
总计		33949	100.000	5424			

图162 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-00637A批-pH6.8介质-桨法-50转-极限转速-片2
供试品溶液-1




QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温 : 30°C
数据文件名: RC\$QTL-392 - 0-39/18-563-2 - cbzj-00637Ap-rcqx-pH6.8jz-1-jf50z-p3-jx.lcd
方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260305-FX267.lcb
样品瓶号 : 3-26
进样体积 : 20μl
进样时间 : 2026/03/06 05:02:15
处理时间 (V2) : 2026/03/06 16:43:50
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 1.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者:wangdan
处理者:wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.028	33621	100.000	5390	2554	1.288	--
总计		33621	100.000	5390			

图163 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-00637A批-pH6.8介质-桨法-50转-极限转速-片3
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 0-39/18-564-2 - cbzj-00637Ap-rcqx-pH6.8jz-1-jf50z-p4-jx.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rcqx-FX267.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260305-FX267.lcb

样品瓶号 : 3-35

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/03/06 05:05:38

处理时间 (V2) : 2026/03/06 16:43:58

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:wangdan

处理者:wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.028	33603	100.000	5406	2564	1.279	--
总计		33603	100.000	5406			

图164 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-00637A批-pH6.8介质-桨法-50转-极限转速-片4
供试品溶液-1




QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温 : 30°C
数据文件名: RC\$QTL-392 - 0-39/18-565-2 - cbzj-00637Ap-rcqx-pH6.8jz-1-jf50z-p5-jx.lcd
方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260305-FX267.lcb
样品瓶号 : 3-44
进样体积 : 20μl
进样时间 : 2026/03/06 05:09:00
处理时间 (V2) : 2026/03/06 16:44:06
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 1.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者:wangdan
处理者:wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.030	33837	100.000	5414	2561	1.298	--
总计		33837	100.000	5414			

图165 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-00637A批-pH6.8介质-桨法-50转-极限转速-片5
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 0-39/18-566-2 - cbzj-00637Ap-rcqx-pH6.8jz-1-jf50z-p6-jx.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rcqx-FX267.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260305-FX267.lcb

样品瓶号 : 3-53

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/03/06 05:12:22

处理时间 (V2) : 2026/03/06 16:44:13

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:wangdan

处理者:wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.028	33926	100.000	5424	2560	1.293	--
总计		33926	100.000	5424			

图166 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-00637A批-pH6.8介质-桨法-50转-极限转速-片6
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30℃

数据文件名: RC\$QTL-392 - 0-39/18-567-2 - cbzj-00637Ap-rcqx-pH6.8jz-1-jf50z-dz2-1.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rcqx-FX267.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260305-FX267.lcb

样品瓶号 : 3-27

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/03/06 05:15:45

处理时间 (V2) : 2026/03/06 16:44:21

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:wangdan

处理者:wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.996	56311	100.000	8385	2097	1.203	--
总计		56311	100.000	8385			

图167 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-00637A批-pH6.8介质-桨法-50转
对照品溶液-2-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30℃

数据文件名: RC\$QTL-392 - 0-39/18-568-2 - cbzj-00637Ap-rcqx-pH6.8jz-1-jf50z-dz2-2.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rcqx-FX267.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260305-FX267.lcb

样品瓶号 : 3-27

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/03/06 05:19:08

处理时间 (V2) : 2026/03/06 16:44:28

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:wangdan

处理者:wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.997	56051	100.000	8381	2112	1.198	--
总计		56051	100.000	8381			

图168 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-00637A批-pH6.8介质-桨法-50转
对照品溶液-2-2



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 0-39/18-569-2 - cbzj-00637Ap-rcqx-pH6.8jz-2-jf50z-rj.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rcqx-FX267.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260305-FX267.lcb

样品瓶号 : 4-9

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/03/06 05:22:33

处理时间 (V2) : 2026/03/06 16:44:36

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:wangdan

处理者:wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图169 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-00637A批-pH6.8介质-桨法-50转
溶剂



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30℃

数据文件名: RC\$QTL-392 - 0-39/18-570-2 - cbzj-00637Ap-rcqx-pH6.8jz-2-jf50z-dz1-1.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rcqx-FX267.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260305-FX267.lcb

样品瓶号 : 4-18

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/03/06 05:25:57

处理时间 (V2) : 2026/03/06 16:44:44

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:wangdan

处理者:wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.999	56268	100.000	8396	2113	1.201	--
总计		56268	100.000	8396			

图170 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-00637A批-pH6.8介质-桨法-50转
对照品溶液-1-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30℃

数据文件名: RC\$QTL-392 - 0-39/18-571-2 - cbzj-00637Ap-rcqx-pH6.8jz-2-jf50z-dz1-2.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rcqx-FX267.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260305-FX267.lcb

样品瓶号 : 4-18

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/03/06 05:29:21

处理时间 (V2) : 2026/03/06 16:44:51

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:wangdan

处理者:wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.998	56141	100.000	8399	2108	1.196	--
总计		56141	100.000	8399			

图171 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-00637A批-pH6.8介质-桨法-50转
对照品溶液-1-2



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30℃

数据文件名: RC\$QTL-392 - 0-39/18-572-2 - cbzj-00637Ap-rcqx-pH6.8jz-2-jf50z-dz1-3.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rcqx-FX267.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260305-FX267.lcb

样品瓶号 : 4-18

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/03/06 05:32:45

处理时间 (V2) : 2026/03/06 16:44:59

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:wangdan

处理者:wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.996	56141	100.000	8390	2111	1.205	--
总计		56141	100.000	8390			

图172 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-00637A批-pH6.8介质-桨法-50转
对照品溶液-1-3



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30℃

数据文件名: RC\$QTL-392 - 0-39/18-573-2 - cbzj-00637Ap-rcqx-pH6.8jz-2-jf50z-dz1-4.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rcqx-FX267.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260305-FX267.lcb

样品瓶号 : 4-18

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/03/06 05:36:10

处理时间 (V2) : 2026/03/06 16:45:06

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:wangdan

处理者:wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.996	55857	100.000	8383	2119	1.200	--
总计		55857	100.000	8383			

图173 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-00637A批-pH6.8介质-桨法-50转
对照品溶液-1-4



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30℃

数据文件名: RC\$QTL-392 - 0-39/18-574-2 - cbzj-00637Ap-rcqx-pH6.8jz-2-jf50z-dz1-5.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rcqx-FX267.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260305-FX267.lcb

样品瓶号 : 4-18

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/03/06 05:39:35

处理时间 (V2) : 2026/03/06 16:45:14

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:wangdan

处理者:wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.997	56187	100.000	8404	2119	1.200	--
总计		56187	100.000	8404			

图174 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-00637A批-pH6.8介质-桨法-50转
对照品溶液-1-5



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 0-39/18-575-2 - cbzj-00637Ap-rcqx-pH6.8jz-2-jf50z-p1-5min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rcqx-FX267.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260305-FX267.lcb

样品瓶号 : 4-1

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/03/06 05:42:59

处理时间 (V2) : 2026/03/06 16:45:22

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:wangdan

处理者:wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.027	30693	100.000	4898	2544	1.301	--
总计		30693	100.000	4898			

图175 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-00637A批-pH6.8介质-桨法-50转-5min-片1
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 0-39/18-576-2 - cbzj-00637Ap-rcqx-pH6.8jz-2-jf50z-p2-5min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rcqx-FX267.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260305-FX267.lcb

样品瓶号 : 4-10

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/03/06 05:46:22

处理时间 (V2) : 2026/03/06 16:45:30

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:wangdan

处理者:wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.027	30756	100.000	4883	2519	1.304	--
总计		30756	100.000	4883			

图176 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-00637A批-pH6.8介质-桨法-50转-5min-片2
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 0-39/18-577-2 - cbzj-00637Ap-rcqx-pH6.8jz-2-jf50z-p3-5min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rcqx-FX267.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260305-FX267.lcb

样品瓶号 : 4-19

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/03/06 05:49:45

处理时间 (V2) : 2026/03/06 16:45:37

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:wangdan

处理者:wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.028	31526	100.000	4995	2526	1.307	--
总计		31526	100.000	4995			

图177 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-00637A批-pH6.8介质-桨法-50转-5min-片3
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30℃

数据文件名: RC\$QTL-392 - 0-39/18-578-2 - cbzj-00637Ap-rcqx-pH6.8jz-2-jf50z-p4-5min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rcqx-FX267.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260305-FX267.lcb

样品瓶号 : 4-28

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/03/06 05:53:09

处理时间 (V2) : 2026/03/06 16:45:45

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:wangdan

处理者:wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.028	31779	100.000	5028	2516	1.317	--
总计		31779	100.000	5028			

图178 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-00637A批-pH6.8介质-桨法-50转-5min-片4
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30℃

数据文件名: RC\$QTL-392 - 0-39/18-579-2 - cbzj-00637Ap-rcqx-pH6.8jz-2-jf50z-p5-5min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rcqx-FX267.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260305-FX267.lcb

样品瓶号 : 4-37

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/03/06 05:56:32

处理时间 (V2) : 2026/03/06 16:45:53

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:wangdan

处理者:wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.029	32420	100.000	5133	2519	1.304	--
总计		32420	100.000	5133			

图179 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-00637A批-pH6.8介质-桨法-50转-5min-片5
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 0-39/18-580-2 - cbzj-00637Ap-rcqx-pH6.8jz-2-jf50z-p6-5min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rcqx-FX267.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260305-FX267.lcb

样品瓶号 : 4-46

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/03/06 05:59:54

处理时间 (V2) : 2026/03/06 16:46:00

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:wangdan

处理者:wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.027	31516	100.000	5010	2529	1.298	--
总计		31516	100.000	5010			

图180 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-00637A批-pH6.8介质-桨法-50转-5min-片6
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 0-39/18-581-2 - cbzj-00637Ap-rcqx-pH6.8jz-2-jf50z-p1-10min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rcqx-FX267.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260305-FX267.lcb

样品瓶号 : 4-2

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/03/06 06:03:17

处理时间 (V2) : 2026/03/06 16:46:08

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:wangdan

处理者:wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.026	32416	100.000	5016	2517	1.436	--
总计		32416	100.000	5016			

图181 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-00637A批-pH6.8介质-浆法-50转-10min-片1
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 0-39/18-582-2 - cbzj-00637Ap-rcqx-pH6.8jz-2-jf50z-p2-10min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rcqx-FX267.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260305-FX267.lcb

样品瓶号 : 4-11

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/03/06 06:06:40

处理时间 (V2) : 2026/03/06 16:46:16

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:wangdan

处理者:wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.029	31895	100.000	5106	2544	1.299	--
总计		31895	100.000	5106			

图182 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-00637A批-pH6.8介质-浆法-50转-10min-片2
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 0-39/18-583-2 - cbzj-00637Ap-rcqx-pH6.8jz-2-jf50z-p3-10min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rcqx-FX267.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260305-FX267.lcb

样品瓶号 : 4-20

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/03/06 06:10:04

处理时间 (V2) : 2026/03/06 16:46:24

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:wangdan

处理者:wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.027	32511	100.000	5133	2515	1.299	--
总计		32511	100.000	5133			

图183 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-00637A批-pH6.8介质-浆法-50转-10min-片3
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 0-39/18-584-2 - cbzj-00637Ap-rcqx-pH6.8jz-2-jf50z-p4-10min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rcqx-FX267.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260305-FX267.lcb

样品瓶号 : 4-29

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/03/06 06:13:26

处理时间 (V2) : 2026/03/06 16:46:32

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:wangdan

处理者:wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.027	32927	100.000	5207	2518	1.305	--
总计		32927	100.000	5207			

图184 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-00637A批-pH6.8介质-浆法-50转-10min-片4
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30℃

数据文件名: RC\$QTL-392 - 0-39/18-585-2 - cbzj-00637Ap-rcqx-pH6.8jz-2-jf50z-p5-10min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rcqx-FX267.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260305-FX267.lcb

样品瓶号 : 4-38

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/03/06 06:16:49

处理时间 (V2) : 2026/03/06 16:46:39

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:wangdan

处理者:wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.028	33613	100.000	5282	2524	1.362	--
总计		33613	100.000	5282			

图185 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-00637A批-pH6.8介质-浆法-50转-10min-片5
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 0-39/18-586-2 - cbzj-00637Ap-rcqx-pH6.8jz-2-jf50z-p6-10min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rcqx-FX267.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260305-FX267.lcb

样品瓶号 : 4-47

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/03/06 06:20:12

处理时间 (V2) : 2026/03/06 16:46:47

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:wangdan

处理者:wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.026	32288	100.000	5119	2519	1.310	--
总计		32288	100.000	5119			

图186 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-00637A批-pH6.8介质-浆法-50转-10min-片6
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 0-39/18-587-2 - cbzj-00637Ap-rcqx-pH6.8jz-2-jf50z-p1-15min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rcqx-FX267.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260305-FX267.lcb

样品瓶号 : 4-3

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/03/06 06:23:35

处理时间 (V2) : 2026/03/06 16:46:55

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:wangdan

处理者:wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.027	32282	100.000	5103	2504	1.307	--
总计		32282	100.000	5103			

图187 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-00637A批-pH6.8介质-浆法-50转-15min-片1
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 0-39/18-588-2 - cbzj-00637Ap-rcqx-pH6.8jz-2-jf50z-p2-15min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rcqx-FX267.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260305-FX267.lcb

样品瓶号 : 4-12

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/03/06 06:26:59

处理时间 (V2) : 2026/03/06 16:47:03

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:wangdan

处理者:wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.027	32752	100.000	5178	2504	1.313	--
总计		32752	100.000	5178			

图188 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-00637A批-pH6.8介质-浆法-50转-15min-片2
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 0-39/18-589-2 - cbzj-00637Ap-rcqx-pH6.8jz-2-jf50z-p3-15min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rcqx-FX267.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260305-FX267.lcb

样品瓶号 : 4-21

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/03/06 06:30:22

处理时间 (V2) : 2026/03/06 16:47:11

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:wangdan

处理者:wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.027	32900	100.000	5195	2498	1.305	--
总计		32900	100.000	5195			

图189 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-00637A批-pH6.8介质-浆法-50转-15min-片3
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 0-39/18-590-2 - cbzj-00637Ap-rcqx-pH6.8jz-2-jf50z-p4-15min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rcqx-FX267.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260305-FX267.lcb

样品瓶号 : 4-30

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/03/06 06:33:45

处理时间 (V2) : 2026/03/06 16:47:18

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:wangdan

处理者:wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.029	33321	100.000	5262	2502	1.315	--
总计		33321	100.000	5262			

图190 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-00637A批-pH6.8介质-浆法-50转-15min-片4
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 0-39/18-591-2 - cbzj-00637Ap-rcqx-pH6.8jz-2-jf50z-p5-15min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rcqx-FX267.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260305-FX267.lcb

样品瓶号 : 4-39

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/03/06 06:37:08

处理时间 (V2) : 2026/03/06 16:47:26

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:wangdan

处理者:wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.027	33864	100.000	5356	2506	1.307	--
总计		33864	100.000	5356			

图191 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-00637A批-pH6.8介质-浆法-50转-15min-片5
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 0-39/18-592-2 - cbzj-00637Ap-rcqx-pH6.8jz-2-jf50z-p6-15min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rcqx-FX267.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260305-FX267.lcb

样品瓶号 : 4-48

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/03/06 06:40:31

处理时间 (V2) : 2026/03/06 16:47:34

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:wangdan

处理者:wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.026	33018	100.000	5153	2480	1.317	--
总计		33018	100.000	5153			

图192 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-00637A批-pH6.8介质-浆法-50转-15min-片6
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 0-39/18-593-2 - cbzj-00637Ap-rcqx-pH6.8jz-2-jf50z-p1-20min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rcqx-FX267.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260305-FX267.lcb

样品瓶号 : 4-4

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/03/06 06:43:55

处理时间 (V2) : 2026/03/06 16:47:42

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:wangdan

处理者:wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.027	32701	100.000	5131	2493	1.309	--
总计		32701	100.000	5131			

图193 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-00637A批-pH6.8介质-浆法-50转-20min-片1
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30℃

数据文件名: RC\$QTL-392 - 0-39/18-594-2 - cbzj-00637Ap-rcqx-pH6.8jz-2-jf50z-p2-20min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rcqx-FX267.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260305-FX267.lcb

样品瓶号 : 4-13

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/03/06 06:47:19

处理时间 (V2) : 2026/03/06 16:47:50

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:wangdan

处理者:wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.027	32953	100.000	5180	2489	1.321	--
总计		32953	100.000	5180			

图194 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-00637A批-pH6.8介质-浆法-50转-20min-片2
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30℃

数据文件名: RC\$QTL-392 - 0-39/18-595-2 - cbzj-00637Ap-rcqx-pH6.8jz-2-jf50z-p3-20min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rcqx-FX267.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260305-FX267.lcb

样品瓶号 : 4-22

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/03/06 06:50:42

处理时间 (V2) : 2026/03/06 16:47:57

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:wangdan

处理者:wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.028	33113	100.000	5230	2485	1.307	--
总计		33113	100.000	5230			

图195 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-00637A批-pH6.8介质-浆法-50转-20min-片3
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 0-39/18-596-2 - cbzj-00637Ap-rcqx-pH6.8jz-2-jf50z-p4-20min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rcqx-FX267.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260305-FX267.lcb

样品瓶号 : 4-31

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/03/06 06:54:06

处理时间 (V2) : 2026/03/06 16:48:05

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:wangdan

处理者:wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.027	33479	100.000	5263	2485	1.313	--
总计		33479	100.000	5263			

图196 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-00637A批-pH6.8介质-浆法-50转-20min-片4
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 0-39/18-597-2 - cbzj-00637Ap-rcqx-pH6.8jz-2-jf50z-p5-20min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rcqx-FX267.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260305-FX267.lcb

样品瓶号 : 4-40

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/03/06 06:57:30

处理时间 (V2) : 2026/03/06 16:48:13

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:wangdan

处理者:wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.027	34142	100.000	5367	2492	1.319	--
总计		34142	100.000	5367			

图197 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-00637A批-pH6.8介质-浆法-50转-20min-片5
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 0-39/18-598-2 - cbzj-00637Ap-rcqx-pH6.8jz-2-jf50z-p6-20min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rcqx-FX267.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260305-FX267.lcb

样品瓶号 : 4-49

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/03/06 07:00:53

处理时间 (V2) : 2026/03/06 16:48:21

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:wangdan

处理者:wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.027	32807	100.000	5163	2490	1.308	--
总计		32807	100.000	5163			

图198 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-00637A批-pH6.8介质-浆法-50转-20min-片6
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 0-39/18-599-2 - cbzj-00637Ap-rcqx-pH6.8jz-2-jf50z-p1-30min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rcqx-FX267.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260305-FX267.lcb

样品瓶号 : 4-5

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/03/06 07:04:17

处理时间 (V2) : 2026/03/06 16:48:28

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:wangdan

处理者:wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.028	33324	100.000	5227	2484	1.317	--
总计		33324	100.000	5227			

图199 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-00637A批-pH6.8介质-浆法-50转-30min-片1
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 0-39/18-600-2 - cbzj-00637Ap-rcqx-pH6.8jz-2-jf50z-p2-30min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rcqx-FX267.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260305-FX267.lcb

样品瓶号 : 4-14

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/03/06 07:07:41

处理时间 (V2) : 2026/03/06 16:48:36

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:wangdan

处理者:wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.026	33236	100.000	5226	2490	1.316	--
总计		33236	100.000	5226			

图200 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-00637A批-pH6.8介质-浆法-50转-30min-片2
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 0-39/18-601-2 - cbzj-00637Ap-rcqx-pH6.8jz-2-jf50z-p3-30min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rcqx-FX267.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260305-FX267.lcb

样品瓶号 : 4-23

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/03/06 07:11:05

处理时间 (V2) : 2026/03/06 16:48:44

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:wangdan

处理者:wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.026	33582	100.000	5257	2473	1.315	--
总计		33582	100.000	5257			

图201 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-00637A批-pH6.8介质-浆法-50转-30min-片3
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30℃

数据文件名: RC\$QTL-392 - 0-39/18-602-2 - cbzj-00637Ap-rcqx-pH6.8jz-2-jf50z-p4-30min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rcqx-FX267.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260305-FX267.lcb

样品瓶号 : 4-32

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/03/06 07:14:29

处理时间 (V2) : 2026/03/06 16:48:51

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:wangdan

处理者:wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.026	31845	100.000	5009	2476	1.318	--
总计		31845	100.000	5009			

图202 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-00637A批-pH6.8介质-浆法-50转-30min-片4
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 0-39/18-603-2 - cbzj-00637Ap-rcqx-pH6.8jz-2-jf50z-p5-30min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rcqx-FX267.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260305-FX267.lcb

样品瓶号 : 4-41

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/03/06 07:17:52

处理时间 (V2) : 2026/03/06 16:48:59

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:wangdan

处理者:wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.027	34343	100.000	5389	2484	1.317	--
总计		34343	100.000	5389			

图203 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-00637A批-pH6.8介质-浆法-50转-30min-片5
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 0-39/18-604-2 - cbzj-00637Ap-rcqx-pH6.8jz-2-jf50z-p6-30min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rcqx-FX267.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260305-FX267.lcb

样品瓶号 : 4-50

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/03/06 07:21:16

处理时间 (V2) : 2026/03/06 16:49:07

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:wangdan

处理者:wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.028	33248	100.000	5215	2471	1.305	--
总计		33248	100.000	5215			

图204 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-00637A批-pH6.8介质-浆法-50转-30min-片6
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 0-39/18-605-2 - cbzj-00637Ap-rcqx-pH6.8jz-2-jf50z-p1-45min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rcqx-FX267.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260305-FX267.lcb

样品瓶号 : 4-6

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/03/06 07:24:41

处理时间 (V2) : 2026/03/06 16:49:15

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:wangdan

处理者:wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.026	33599	100.000	5237	2468	1.323	--
总计		33599	100.000	5237			

图205 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-00637A批-pH6.8介质-桨法-50转-45min-片1
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 0-39/18-606-2 - cbzj-00637Ap-rcqx-pH6.8jz-2-jf50z-p2-45min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rcqx-FX267.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260305-FX267.lcb

样品瓶号 : 4-15

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/03/06 07:28:05

处理时间 (V2) : 2026/03/06 16:49:22

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:wangdan

处理者:wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.026	33918	100.000	5281	2468	1.333	--
总计		33918	100.000	5281			

图206 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-00637A批-pH6.8介质-浆法-50转-45min-片2
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 0-39/18-607-2 - cbzj-00637Ap-rcqx-pH6.8jz-2-jf50z-p3-45min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rcqx-FX267.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260305-FX267.lcb

样品瓶号 : 4-24

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/03/06 07:31:30

处理时间 (V2) : 2026/03/06 16:49:30

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:wangdan

处理者:wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.026	33848	100.000	5292	2466	1.321	--
总计		33848	100.000	5292			

图207 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-00637A批-pH6.8介质-浆法-50转-45min-片3
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 0-39/18-608-2 - cbzj-00637Ap-rcqx-pH6.8jz-2-jf50z-p4-45min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rcqx-FX267.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260305-FX267.lcb

样品瓶号 : 4-33

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/03/06 07:34:54

处理时间 (V2) : 2026/03/06 16:49:38

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:wangdan

处理者:wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.026	30893	100.000	4817	2455	1.329	--
总计		30893	100.000	4817			

图208 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-00637A批-pH6.8介质-浆法-50转-45min-片4
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 0-39/18-609-2 - cbzj-00637Ap-rcqx-pH6.8jz-2-jf50z-p5-45min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rcqx-FX267.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260305-FX267.lcb

样品瓶号 : 4-42

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/03/06 07:38:18

处理时间 (V2) : 2026/03/06 16:49:45

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:wangdan

处理者:wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.027	34720	100.000	5417	2465	1.331	--
总计		34720	100.000	5417			

图209 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-00637A批-pH6.8介质-浆法-50转-45min-片5
供试品溶液-1




QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温 : 30°C
数据文件名: RC\$QTL-392 - 0-39/18-610-2 - cbzj-00637Ap-rcqx-pH6.8jz-2-jf50z-p6-45min.lcd
方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260305-FX267.lcb
样品瓶号 : 4-51
进样体积 : 20μl
进样时间 : 2026/03/06 07:41:42
处理时间 (V2) : 2026/03/06 16:49:53
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 1.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者:wangdan
处理者:wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.025	33788	100.000	5247	2446	1.331	--
总计		33788	100.000	5247			

图210 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-00637A批-pH6.8介质-浆法-50转-45min-片6
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 0-39/18-611-2 - cbzj-00637Ap-rcqx-pH6.8jz-2-jf50z-p1-60min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rcqx-FX267.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260305-FX267.lcb

样品瓶号 : 4-7

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/03/06 07:45:07

处理时间 (V2) : 2026/03/06 16:50:01

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:wangdan

处理者:wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.026	33711	100.000	5231	2454	1.324	--
总计		33711	100.000	5231			

图211 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-00637A批-pH6.8介质-浆法-50转-60min-片1
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 0-39/18-612-2 - cbzj-00637Ap-rcqx-pH6.8jz-2-jf50z-p2-60min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rcqx-FX267.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260305-FX267.lcb

样品瓶号 : 4-16

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/03/06 07:48:31

处理时间 (V2) : 2026/03/06 16:50:09

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:wangdan

处理者:wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.027	33873	100.000	5275	2459	1.320	--
总计		33873	100.000	5275			

图212 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-00637A批-pH6.8介质-浆法-50转-60min-片2
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 0-39/18-613-2 - cbzj-00637Ap-rcqx-pH6.8jz-2-jf50z-p3-60min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rcqx-FX267.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260305-FX267.lcb

样品瓶号 : 4-25

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/03/06 07:51:55

处理时间 (V2) : 2026/03/06 16:50:16

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:wangdan

处理者:wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.025	33595	100.000	5269	2464	1.306	--
总计		33595	100.000	5269			

图213 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-00637A批-pH6.8介质-浆法-50转-60min-片3
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 0-39/18-614-2 - cbzj-00637Ap-rcqx-pH6.8jz-2-jf50z-p4-60min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rcqx-FX267.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260305-FX267.lcb

样品瓶号 : 4-34

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/03/06 07:55:19

处理时间 (V2) : 2026/03/06 16:50:24

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:wangdan

处理者:wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.026	30211	100.000	4684	2435	1.328	--
总计		30211	100.000	4684			

图214 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-00637A批-pH6.8介质-浆法-50转-60min-片4
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 0-39/18-615-2 - cbzj-00637Ap-rcqx-pH6.8jz-2-jf50z-p5-60min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rcqx-FX267.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260305-FX267.lcb

样品瓶号 : 4-43

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/03/06 07:58:43

处理时间 (V2) : 2026/03/06 16:50:32

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:wangdan

处理者:wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.026	34800	100.000	5414	2445	1.322	--
总计		34800	100.000	5414			

图215 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-00637A批-pH6.8介质-浆法-50转-60min-片5
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 0-39/18-616-2 - cbzj-00637Ap-rcqx-pH6.8jz-2-jf50z-p6-60min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rcqx-FX267.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260305-FX267.lcb

样品瓶号 : 4-52

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/03/06 08:02:07

处理时间 (V2) : 2026/03/06 16:50:39

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:wangdan

处理者:wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.026	33398	100.000	5215	2439	1.317	--
总计		33398	100.000	5215			

图216 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-00637A批-pH6.8介质-浆法-50转-60min-片6
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 0-39/18-617-2 - cbzj-00637Ap-rcqx-pH6.8jz-2-jf50z-p1-jx.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rcqx-FX267.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260305-FX267.lcb

样品瓶号 : 4-8

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/03/06 08:05:31

处理时间 (V2) : 2026/03/06 16:50:47

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:wangdan

处理者:wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.025	33739	100.000	5243	2445	1.333	--
总计		33739	100.000	5243			

图217 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-00637A批-pH6.8介质-桨法-50转-极限转速-片1
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 0-39/18-618-2 - cbzj-00637Ap-rcqx-pH6.8jz-2-jf50z-p2-jx.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rcqx-FX267.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260305-FX267.lcb

样品瓶号 : 4-17

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/03/06 08:08:56

处理时间 (V2) : 2026/03/06 16:50:55

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:wangdan

处理者:wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.026	34101	100.000	5287	2435	1.331	--
总计		34101	100.000	5287			

图218 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-00637A批-pH6.8介质-桨法-50转-极限转速-片2
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 0-39/18-619-2 - cbzj-00637Ap-rcqx-pH6.8jz-2-jf50z-p3-jx.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rcqx-FX267.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260305-FX267.lcb

样品瓶号 : 4-26

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/03/06 08:12:21

处理时间 (V2) : 2026/03/06 16:51:02

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:wangdan

处理者:wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.026	33984	100.000	5273	2451	1.336	--
总计		33984	100.000	5273			

图219 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-00637A批-pH6.8介质-桨法-50转-极限转速-片3
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 0-39/18-620-2 - cbzj-00637Ap-rcqx-pH6.8jz-2-jf50z-p4-jx.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rcqx-FX267.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260305-FX267.lcb

样品瓶号 : 4-35

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/03/06 08:15:45

处理时间 (V2) : 2026/03/06 16:51:10

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:wangdan

处理者:wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.026	33867	100.000	5285	2457	1.320	--
总计		33867	100.000	5285			

图220 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-00637A批-pH6.8介质-桨法-50转-极限转速-片4
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 0-39/18-621-2 - cbzj-00637Ap-rcqx-pH6.8jz-2-jf50z-p5-jx.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rcqx-FX267.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260305-FX267.lcb

样品瓶号 : 4-44

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/03/06 08:19:10

处理时间 (V2) : 2026/03/06 16:51:17

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:wangdan

处理者:wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.026	34488	100.000	5345	2444	1.330	--
总计		34488	100.000	5345			

图221 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-00637A批-pH6.8介质-桨法-50转-极限转速-片5
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 0-39/18-622-2 - cbzj-00637Ap-rcqx-pH6.8jz-2-jf50z-p6-jx.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rcqx-FX267.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260305-FX267.lcb

样品瓶号 : 4-53

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/03/06 08:22:34

处理时间 (V2) : 2026/03/06 16:51:25

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:wangdan

处理者:wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.026	33705	100.000	5212	2444	1.336	--
总计		33705	100.000	5212			

图222 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-00637A批-pH6.8介质-桨法-50转-极限转速-片6
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30℃

数据文件名: RC\$QTL-392 - 0-39/18-623-2 - cbzj-00637Ap-rcqx-pH6.8jz-2-jf50z-dz2-1.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rcqx-FX267.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260305-FX267.lcb

样品瓶号 : 4-27

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/03/06 08:25:58

处理时间 (V2) : 2026/03/06 16:51:33

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 1.0ml/min

波长:210nm


版本号:6.115

实验者:wangdan

处理者:wangdan

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.995	55610	100.000	8214	2058	1.222	--
总计		55610	100.000	8214			

图223 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-00637A批-pH6.8介质-桨法-50转
对照品溶液-2-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 0-39/18-624-2 - cbzj-00637Ap-rcqx-pH6.8jz-2-jf50z-dz2-2.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rcqx-FX267.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260305-FX267.lcb

样品瓶号 : 4-27

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/03/06 08:29:23

处理时间 (V2) : 2026/03/06 16:51:40

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:wangdan

处理者:wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.995	56085	100.000	8217	2047	1.227	--
总计		56085	100.000	8217			

图224 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-00637A批-pH6.8介质-桨法-50转
对照品溶液-2-2