



替米沙坦氨氯地平片项目信息

介质体积(ml)	900	取样体积(ml)	5	补液体积(ml)	5
对照品批号	100629-202204	对照品来源	中检院	对照品使用方法	直接使用
对照品含量(%)	100	对照品水分(%)	0	对照品稀释倍数	1250
标示量(mg)	80	供试品稀释倍数	10	系数	1

对照品溶液

序号	称样量(mg)	A ₁	A ₂	A ₃	A ₄	A ₅	A _{平均}	RSD%
1	10.81	729080	728833	728574	729553	729210	729050	0.06
2	10.75	729578	726823				728200	0.27

单位质量响应值		RSD%	判断
67442.18	67739.53	0.32	数据可信



操作者:

日期: 2026-07-30

复核者:

未审阅版本



供试品溶液-2026031621批-pH4.5

时间 (分钟)	样品	A ₁	A ₂	A _{平均}	溶出量(%)	平均(%)	RSD%	累计溶 出量(%)	平均(%)	RSD%
5min	1	59673	-	59673	7.946	6.35	16.60	7.95	6.34	16.63
	2	47240	-	47240	6.290			6.29		
	3	36665	-	36665	4.882			4.88		
	4	41846	-	41846	5.572			5.57		
	5	50502	-	50502	6.725			6.72		
	6	49985	-	49985	6.656			6.66		
10min	1	114870	-	114870	15.295	14.12	8.09	15.34	14.16	8.10
	2	107877	-	107877	14.364			14.40		
	3	90807	-	90807	12.091			12.12		
	4	102200	-	102200	13.608			13.64		
	5	111572	-	111572	14.856			14.89		
	6	109095	-	109095	14.527			14.56		
15min	1	150118	-	150118	19.989	18.99	7.35	20.12	19.11	7.36
	2	150850	-	150850	20.086			20.20		
	3	126768	-	126768	16.880			16.97		
	4	134439	-	134439	17.901			18.01		
	5	140855	-	140855	18.756			18.88		
	6	152770	-	152770	20.342			20.46		
20min	1	163029	-	163029	21.708	21.79	4.23	21.95	22.02	4.24
	2	172890	-	172890	23.021			23.25		
	3	157468	-	157468	20.968			21.16		
	4	156372	-	156372	20.822			21.03		
	5	161124	-	161124	21.454			21.68		
	6	171115	-	171115	22.785			23.02		
30min	1	176463	-	176463	23.497	24.36	4.44	23.86	24.70	4.42
	2	183680	-	183680	24.458			24.81		
	3	178242	-	178242	23.734			24.04		
	4	174102	-	174102	23.183			23.50		
	5	192321	-	192321	25.608			25.95		
	6	192888	-	192888	25.684			26.04		
45min	1	188699	-	188699	25.126	25.06	3.88	25.62	25.54	3.88
	2	192146	-	192146	25.585			26.08		
	3	186357	-	186357	24.814			25.25		
	4	174594	-	174594	23.248			23.70		
	5	192766	-	192766	25.668			26.15		
	6	194610	-	194610	25.913			26.41		
60min	1	191183	-	191183	25.457	25.40	2.05	26.09	26.01	2.05
	2	193079	-	193079	25.709			26.34		
	3	193612	-	193612	25.780			26.35		
	4	183131	-	183131	24.385			24.96		
	5	192780	-	192780	25.670			26.30		
	6	190522	-	190522	25.369			26.01		
极限	1	192699	-	192699	25.659	25.60	1.78	26.43	26.36	1.63
	2	193181	-	193181	25.723			26.50		
	3	196798	-	196798	26.205			26.92		
	4	194344	-	194344	25.878			26.59		
	5	188112	-	188112	25.048			25.82		
	6	188397	-	188397	25.086			25.87		



操作者:

日期: 2026-07-30

复核者:

未审阅版本



替米沙坦氨氯地平片项目信息

介质体积(ml)	900	取样体积(ml)	5	补液体积(ml)	5
对照品批号	100629-202204	对照品来源	中检院	对照品使用方法	直接使用
对照品含量(%)	100	对照品水分(%)	0	对照品稀释倍数	1250
标示量(mg)	80	供试品稀释倍数	10	系数	1

对照品溶液

序号	称样量(mg)	A ₁	A ₂	A ₃	A ₄	A ₅	A _{平均}	RSD%
1	10.81	735299	733887	733888	733273	732680	733805	0.14
2	10.75	730117	730022				730070	0.01
单位质量响应值				RSD%	判断			
67882.05				0.04	数据可信			



操作者:

日期: 2026-07-30

复核者:

未审阅版本



供试品溶液-2026031621批-pH4.5

时间 (分钟)	样品	A ₁	A ₂	A _{平均}	溶出量(%)	平均(%)	RSD%	累计溶 出量(%)	平均(%)	RSD%
5min	1	35074	-	35074	4.649	5.79	16.92	4.65	5.79	16.88
	2	52468	-	52468	6.955			6.95		
	3	39357	-	39357	5.217			5.22		
	4	42960	-	42960	5.694			5.69		
	5	52822	-	52822	7.002			7.00		
	6	39353	-	39353	5.216			5.22		
10min	1	89364	-	89364	11.845	13.29	12.79	11.87	13.32	12.80
	2	123342	-	123342	16.349			16.39		
	3	93214	-	93214	12.356			12.38		
	4	90614	-	90614	12.011			12.04		
	5	99599	-	99599	13.202			13.24		
	6	105418	-	105418	13.973			14.00		
15min	1	133943	-	133943	17.754	18.37	8.40	17.85	18.48	8.38
	2	150125	-	150125	19.899			20.03		
	3	139476	-	139476	18.488			18.59		
	4	121073	-	121073	16.048			16.15		
	5	134472	-	134472	17.825			17.94		
	6	152645	-	152645	20.233			20.34		
20min	1	160248	-	160248	21.241	21.79	5.04	21.43	22.00	5.06
	2	171980	-	171980	22.796			23.04		
	3	161748	-	161748	21.440			21.64		
	4	157107	-	157107	20.825			21.01		
	5	157854	-	157854	20.924			21.14		
	6	177258	-	177258	23.496			23.71		
30min	1	176618	-	176618	23.411	24.07	3.20	23.72	24.40	3.21
	2	179554	-	179554	23.800			24.17		
	3	181232	-	181232	24.023			24.34		
	4	176464	-	176464	23.391			23.69		
	5	183711	-	183711	24.351			24.68		
	6	192006	-	192006	25.451			25.80		
45min	1	188692	-	188692	25.012	25.04	1.23	25.45	25.50	1.27
	2	188308	-	188308	24.961			25.46		
	3	185699	-	185699	24.615			25.07		
	4	187674	-	187674	24.877			25.31		
	5	190600	-	190600	25.264			25.73		
	6	192356	-	192356	25.497			25.99		
60min	1	190067	-	190067	25.194	25.18	1.41	25.77	25.78	1.40
	2	190725	-	190725	25.281			25.92		
	3	192773	-	192773	25.552			26.14		
	4	189174	-	189174	25.075			25.65		
	5	185117	-	185117	24.538			25.14		
	6	191755	-	191755	25.418			26.05		
极限	1	190364	-	190364	25.233	25.69	1.60	25.95	26.43	1.55
	2	197170	-	197170	26.135			26.91		
	3	195845	-	195845	25.960			26.69		
	4	196279	-	196279	26.017			26.73		
	5	193127	-	193127	25.599			26.34		
	6	190100	-	190100	25.198			25.97		



操作者:

日期: 2026-07-30

复核者:

未审阅版本



替米沙坦氨氯地平片项目信息

介质体积(ml)	900	取样体积(ml)	5	补液体积(ml)	5
对照品批号	100629-202204	对照品来源	中检院	对照品使用方法	直接使用
对照品含量(%)	100	对照品水分(%)	0	对照品稀释倍数	1250
标示量(mg)	80	供试品稀释倍数	10	系数	1

对照品溶液

序号	称样量(mg)	A ₁	A ₂	A ₃	A ₄	A ₅	A _{平均}	RSD%
1	10.81	730273	724676	726129	727613	725976	726933	0.30
2	10.75	725200	726006				725603	0.08
单位质量响应值				RSD%	判断			
67246.35				0.27	数据可信			



操作者:

日期: 2026-07-30

复核者:

未审阅版本



供试品溶液-2026031821批-pH4.5

时间 (分钟)	样品	A ₁	A ₂	A _{平均}	溶出量(%)	平均(%)	RSD%	累计溶 出量(%)	平均(%)	RSD%
5min	1	95406	-	95406	12.745	12.52	5.87	12.74	12.52	5.88
	2	103511	-	103511	13.828			13.83		
	3	94667	-	94667	12.646			12.65		
	4	89743	-	89743	11.988			11.99		
	5	89997	-	89997	12.022			12.02		
	6	89032	-	89032	11.894			11.89		
10min	1	135028	-	135028	18.038	16.98	9.79	18.11	17.05	9.77
	2	143648	-	143648	19.189			19.27		
	3	123685	-	123685	16.523			16.59		
	4	132176	-	132176	17.657			17.72		
	5	108722	-	108722	14.524			14.59		
	6	119291	-	119291	15.936			16.00		
15min	1	165437	-	165437	22.100	20.83	7.06	22.27	21.00	7.03
	2	158747	-	158747	21.207			21.39		
	3	158366	-	158366	21.156			21.32		
	4	159607	-	159607	21.321			21.49		
	5	134131	-	134131	17.918			18.07		
	6	159430	-	159430	21.298			21.45		
20min	1	186057	-	186057	24.855	23.55	6.51	25.15	23.83	6.49
	2	181100	-	181100	24.193			24.49		
	3	175390	-	175390	23.430			23.71		
	4	176504	-	176504	23.579			23.86		
	5	154524	-	154524	20.642			20.89		
	6	184308	-	184308	24.621			24.89		
30min	1	195449	-	195449	26.109	25.32	2.72	26.54	25.73	2.75
	2	195876	-	195876	26.166			26.60		
	3	183917	-	183917	24.569			24.98		
	4	189701	-	189701	25.342			25.76		
	5	185047	-	185047	24.720			25.08		
	6	187237	-	187237	25.012			25.42		
45min	1	192528	-	192528	25.719	25.78	0.48	26.30	26.34	0.56
	2	194603	-	194603	25.996			26.58		
	3	193203	-	193203	25.809			26.36		
	4	193237	-	193237	25.814			26.37		
	5	191939	-	191939	25.641			26.14		
	6	192524	-	192524	25.719			26.27		
60min	1	185010	-	185010	24.715	25.74	2.12	25.43	26.44	2.00
	2	194261	-	194261	25.951			26.68		
	3	193126	-	193126	25.799			26.49		
	4	192434	-	192434	25.707			26.40		
	5	196918	-	196918	26.306			26.95		
	6	194462	-	194462	25.978			26.67		
极限	1	188250	-	188250	25.148	26.30	2.16	26.00	27.13	2.06
	2	197885	-	197885	26.435			27.30		
	3	199038	-	199038	26.589			27.42		
	4	198552	-	198552	26.524			27.37		
	5	199339	-	199339	26.629			27.42		
	6	197976	-	197976	26.447			27.28		



操作者:

日期: 2026-07-30

复核者:

未审阅版本



替米沙坦氨氯地平片项目信息

介质体积(ml)	900	取样体积(ml)	5	补液体积(ml)	5
对照品批号	100629-202204	对照品来源	中检院	对照品使用方法	直接使用
对照品含量(%)	100	对照品水分(%)	0	对照品稀释倍数	1250
标示量(mg)	80	供试品稀释倍数	10	系数	1

对照品溶液

序号	称样量(mg)	A ₁	A ₂	A ₃	A ₄	A ₅	A _{平均}	RSD%
1	10.81	729655	729436	729393	728966	728746	729239	0.06
2	10.75	722274	722058				722166	0.03
单位质量响应值				RSD%	判断			
67459.67				0.30	数据可信			



操作者:

日期: 2026-07-30

复核者:

未审阅版本



供试品溶液-2026031821批-pH4.5

时间 (分钟)	样品	A ₁	A ₂	A _{平均}	溶出量(%)	平均(%)	RSD%	累计溶 出量(%)	平均(%)	RSD%
5min	1	88003	-	88003	11.765	12.28	9.53	11.77	12.28	9.54
	2	103136	-	103136	13.789			13.79		
	3	87186	-	87186	11.656			11.66		
	4	82229	-	82229	10.993			10.99		
	5	88144	-	88144	11.784			11.78		
	6	102439	-	102439	13.695			13.70		
10min	1	117194	-	117194	15.668	16.34	10.32	15.73	16.41	10.32
	2	139013	-	139013	18.585			18.66		
	3	112987	-	112987	15.106			15.17		
	4	118089	-	118089	15.788			15.85		
	5	109268	-	109268	14.608			14.67		
	6	136967	-	136967	18.311			18.39		
15min	1	153834	-	153834	20.566	20.77	7.64	20.72	20.93	7.65
	2	167528	-	167528	22.397			22.58		
	3	148478	-	148478	19.850			20.00		
	4	156448	-	156448	20.916			21.06		
	5	137276	-	137276	18.353			18.50		
	6	168698	-	168698	22.554			22.73		
20min	1	177729	-	177729	23.761	22.77	6.13	24.03	23.04	6.12
	2	167395	-	167395	22.379			22.68		
	3	168145	-	168145	22.480			22.74		
	4	172809	-	172809	23.103			23.37		
	5	152769	-	152769	20.424			20.67		
	6	183019	-	183019	24.468			24.77		
30min	1	201936	-	201936	26.997	25.70	3.46	27.40	26.10	3.47
	2	192490	-	192490	25.734			26.16		
	3	188959	-	188959	25.262			25.65		
	4	193179	-	193179	25.827			26.22		
	5	181910	-	181910	24.320			24.68		
	6	195011	-	195011	26.072			26.51		
45min	1	189093	-	189093	25.280	25.66	1.13	25.83	26.20	1.15
	2	192554	-	192554	25.743			26.31		
	3	189736	-	189736	25.366			25.89		
	4	194646	-	194646	26.023			26.56		
	5	191894	-	191894	25.655			26.15		
	6	193602	-	193602	25.883			26.47		
60min	1	191134	-	191134	25.553	25.74	0.94	26.24	26.43	0.91
	2	190993	-	190993	25.534			26.25		
	3	191035	-	191035	25.540			26.21		
	4	192801	-	192801	25.776			26.46		
	5	194917	-	194917	26.059			26.70		
	6	194532	-	194532	26.007			26.74		
极限	1	192160	-	192160	25.690	25.76	1.13	26.52	26.58	1.16
	2	191000	-	191000	25.535			26.39		
	3	190964	-	190964	25.530			26.34		
	4	191926	-	191926	25.659			26.48		
	5	193083	-	193083	25.814			26.60		
	6	196774	-	196774	26.307			27.18		



操作者:

日期: 2026-07-30

复核者:

未审阅版本



替米沙坦氨氯地平片项目信息

介质体积(ml)	900	取样体积(ml)	5	补液体积(ml)	5
对照品批号	100629-202204	对照品来源	中检院	对照品使用方法	直接使用
对照品含量(%)	100	对照品水分(%)	0	对照品稀释倍数	1250
标示量(mg)	80	供试品稀释倍数	10	系数	1

对照品溶液

序号	称样量(mg)	A ₁	A ₂	A ₃	A ₄	A ₅	A _{平均}	RSD%
1	10.81	732713	742200	731136	735641	738831	736104	0.62
2	10.75	738466	728486				733476	0.97
单位质量响应值				RSD%	判断			
68094.73				0.15	数据可信			



操作者:

日期: 2026-07-30

复核者:

未审阅版本



供试品溶液-2026031721批-pH4.5

时间 (分钟)	样品	A ₁	A ₂	A _{平均}	溶出量(%)	平均(%)	RSD%	累计溶 出量(%)	平均(%)	RSD%
5min	1	46342	-	46342	6.119	7.22	13.99	6.12	7.22	14.01
	2	66813	-	66813	8.822			8.82		
	3	53039	-	53039	7.003			7.00		
	4	53186	-	53186	7.023			7.02		
	5	60335	-	60335	7.966			7.97		
	6	48430	-	48430	6.395			6.39		
10min	1	99581	-	99581	13.148	15.03	10.02	13.18	15.07	10.04
	2	128973	-	128973	17.029			17.08		
	3	109456	-	109456	14.452			14.49		
	4	105191	-	105191	13.889			13.93		
	5	124917	-	124917	16.494			16.54		
	6	115020	-	115020	15.187			15.22		
15min	1	123564	-	123564	16.315	19.81	9.08	16.42	19.93	9.06
	2	149777	-	149777	19.776			19.92		
	3	154319	-	154319	20.376			20.50		
	4	152671	-	152671	20.158			20.27		
	5	158311	-	158311	20.903			21.04		
	6	161549	-	161549	21.331			21.45		
20min	1	163926	-	163926	21.644	23.38	5.15	21.84	23.62	5.15
	2	176064	-	176064	23.247			23.50		
	3	181836	-	181836	24.009			24.24		
	4	177303	-	177303	23.411			23.64		
	5	172303	-	172303	22.750			23.00		
	6	191082	-	191082	25.230			25.47		
30min	1	179250	-	179250	23.668	24.83	3.05	23.99	25.19	3.07
	2	183874	-	183874	24.278			24.66		
	3	191998	-	191998	25.351			25.72		
	4	188825	-	188825	24.932			25.29		
	5	189041	-	189041	24.960			25.34		
	6	195247	-	195247	25.780			26.16		
45min	1	194747	-	194747	25.714	25.60	1.36	26.16	26.10	1.35
	2	191491	-	191491	25.284			25.80		
	3	192677	-	192677	25.441			25.95		
	4	191862	-	191862	25.333			25.83		
	5	194006	-	194006	25.616			26.13		
	6	198650	-	198650	26.229			26.75		
60min	1	192435	-	192435	25.409	25.43	1.61	26.00	26.08	1.59
	2	189364	-	189364	25.003			25.66		
	3	189841	-	189841	25.066			25.71		
	4	193084	-	193084	25.494			26.13		
	5	193004	-	193004	25.484			26.14		
	6	198020	-	198020	26.146			26.81		
极限	1	199215	-	199215	26.304	25.97	0.98	27.04	26.76	0.88
	2	197103	-	197103	26.025			26.82		
	3	195625	-	195625	25.830			26.62		
	4	197029	-	197029	26.015			26.79		
	5	197613	-	197613	26.092			26.89		
	6	193586	-	193586	25.561			26.37		



操作者:

日期: 2026-07-30

复核者:

未审阅版本



替米沙坦氨氯地平片项目信息

介质体积(ml)	900	取样体积(ml)	5	补液体积(ml)	5
对照品批号	100629-202204	对照品来源	中检院	对照品使用方法	直接使用
对照品含量(%)	100	对照品水分(%)	0	对照品稀释倍数	1250
标示量(mg)	80	供试品稀释倍数	10	系数	1

对照品溶液

序号	称样量(mg)	A ₁	A ₂	A ₃	A ₄	A ₅	A _{平均}	RSD%
1	10.81	726636	723074	723475	732969	729967	727224	0.59
2	10.75	732029	734004				733016	0.20
单位质量响应值				RSD%	判断			
67273.27				0.96	数据可信			



操作者:

日期: 2026-07-30

复核者:

未审阅版本



供试品溶液-2026031721批-pH4.5

时间 (分钟)	样品	A ₁	A ₂	A _{平均}	溶出量(%)	平均(%)	RSD%	累计溶 出量(%)	平均(%)	RSD%
5min	1	63791	-	63791	8.477	6.35	23.02	8.48	6.35	23.03
	2	38231	-	38231	5.080			5.08		
	3	53542	-	53542	7.115			7.11		
	4	34156	-	34156	4.539			4.54		
	5	44132	-	44132	5.865			5.86		
	6	52723	-	52723	7.006			7.01		
10min	1	121481	-	121481	16.143	13.71	16.40	16.19	13.74	16.41
	2	95970	-	95970	12.753			12.78		
	3	120707	-	120707	16.040			16.08		
	4	80524	-	80524	10.700			10.73		
	5	89989	-	89989	11.958			11.99		
	6	110160	-	110160	14.639			14.68		
15min	1	145430	-	145430	19.326	18.01	10.12	19.46	18.12	10.16
	2	131599	-	131599	17.488			17.59		
	3	151469	-	151469	20.128			20.26		
	4	118606	-	118606	15.761			15.85		
	5	121257	-	121257	16.113			16.21		
	6	144595	-	144595	19.215			19.33		
20min	1	170786	-	170786	22.695	21.44	8.61	22.94	21.66	8.65
	2	162928	-	162928	21.651			21.85		
	3	178046	-	178046	23.660			23.90		
	4	147351	-	147351	19.581			19.75		
	5	142208	-	142208	18.897			19.09		
	6	166912	-	166912	22.180			22.41		
30min	1	178816	-	178816	23.762	23.70	4.63	24.13	24.03	4.64
	2	186288	-	186288	24.755			25.07		
	3	179064	-	179064	23.795			24.17		
	4	174596	-	174596	23.201			23.48		
	5	164527	-	164527	21.863			22.16		
	6	186790	-	186790	24.822			25.17		
45min	1	194790	-	194790	25.885	25.40	1.61	26.39	25.86	1.62
	2	191082	-	191082	25.392			25.85		
	3	187046	-	187046	24.856			25.36		
	4	187934	-	187934	24.974			25.38		
	5	193139	-	193139	25.665			26.08		
	6	192771	-	192771	25.617			26.10		
60min	1	183712	-	183712	24.413	25.20	1.92	25.06	25.81	1.86
	2	193165	-	193165	25.669			26.26		
	3	193811	-	193811	25.755			26.40		
	4	189090	-	189090	25.127			25.68		
	5	189334	-	189334	25.160			25.72		
	6	188770	-	188770	25.085			25.72		
极限	1	195716	-	195716	26.008	25.70	1.38	26.79	26.45	1.36
	2	190595	-	190595	25.327			26.07		
	3	191835	-	191835	25.492			26.28		
	4	196655	-	196655	26.133			26.82		
	5	190791	-	190791	25.353			26.05		
	6	194966	-	194966	25.908			26.68		



操作者:

日期: 2026-07-30

复核者:

未审阅版本



PCH-962

＜样品信息＞

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$PCH-962 - 30-4/31-501-3 - zzp-2026031621p-rcqx-1-pH4.5jz-jf50z-rj.lcd

方法文件名: RC\$PCH-962 - PCH-962-rcqx-tm-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$PCH-962 - 20260417-rcqx-FX280.lcb

样品瓶号: 1-9

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/04/17 11:39:42

处理时间(V3): 2026/04/18 15:41:25

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX280)

流 速:1.5ml/min


波 长: 230nm

版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 230nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图1 替米沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026031621批-pH4.5介质-桨法-50转
溶剂




PCH-962

＜样品信息＞

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-962 - 30-3/31-502-2 - zzp-2026031621p-rcqx-1-pH4.5jz-jf50z-dz1-1.lcd
方法文件名: RC\$PCH-962 - PCH-962-rcqx-tm-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-962 - 20260417-rcqx-FX280.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/04/17 11:44:06
处理时间(V2): 2026/04/18 15:29:56
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX280)

流 速:1.5ml/min
波 长: 230nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 230nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.632	729080	100.000	77528	1870	1.147	--
总计		729080	100.000	77528			

图2 替米沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026031621批-pH4.5介质-桨法-50转
对照品溶液-1-1



PCH-962

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$PCH-962 - 30-3/31-503-2 - zzp-2026031621p-rcqx-1-pH4.5jz-jf50z-dz1-2.lcd

方法文件名: RC\$PCH-962 - PCH-962-rcqx-tm-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$PCH-962 - 20260417-rcqx-FX280.lcb

样品瓶号: 1-18

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/04/17 11:48:30

处理时间(V2): 2026/04/18 15:30:01

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX280)

流 速:1.5ml/min


波 长: 230nm

版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 230nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.633	728833	100.000	77504	1874	1.146	--
总计		728833	100.000	77504			

图3 替米沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026031621批-pH4.5介质-桨法-50转
对照品溶液-1-2



PCH-962

＜样品信息＞

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$PCH-962 - 30-3/31-504-2 - zzp-2026031621p-rcqx-1-pH4.5jz-jf50z-dz1-3.lcd

方法文件名: RC\$PCH-962 - PCH-962-rcqx-tm-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$PCH-962 - 20260417-rcqx-FX280.lcb

样品瓶号: 1-18

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/04/17 11:52:54

处理时间(V2): 2026/04/18 15:30:04

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX280)

流速:1.5ml/min


波长: 230nm

版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 230nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.633	728574	100.000	77501	1877	1.145	--
总计		728574	100.000	77501			

图4 替米沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026031621批-pH4.5介质-浆法-50转
对照品溶液-1-3



PCH-962

＜样品信息＞

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$PCH-962 - 30-3/31-505-2 - zzp-2026031621p-rcqx-1-pH4.5jz-jf50z-dz1-4.lcd

方法文件名: RC\$PCH-962 - PCH-962-rcqx-tm-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$PCH-962 - 20260417-rcqx-FX280.lcb

样品瓶号: 1-18

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/04/17 11:57:17

处理时间(V2): 2026/04/18 15:30:07

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX280)

流速:1.5ml/min


波长: 230nm

版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 230nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.632	729553	100.000	77622	1873	1.142	--
总计		729553	100.000	77622			

图5 替米沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026031621批-pH4.5介质-桨法-50转
对照品溶液-1-4




PCH-962

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-962 - 30-3/31-506-2 - zzp-2026031621p-rcqx-1-pH4.5jz-jf50z-dz1-5.lcd
方法文件名: RC\$PCH-962 - PCH-962-rcqx-tm-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-962 - 20260417-rcqx-FX280.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/04/17 12:01:40
处理时间(V2): 2026/04/18 15:30:10
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX280)

流 速:1.5ml/min
波 长: 230nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 230nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.632	729210	100.000	77652	1874	1.140	--
总计		729210	100.000	77652			

图6 替米沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026031621批-pH4.5介质-桨法-50转
对照品溶液-1-5



PCH-962

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$PCH-962 - 30-3/31-507-2 - zzp-2026031621p-rcqx-1-pH4.5jz-jf50z-p1-5min.lcd

方法文件名: RC\$PCH-962 - PCH-962-rcqx-tm-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$PCH-962 - 20260417-rcqx-FX280.lcb

样品瓶号: 1-1

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/04/17 12:06:03

处理时间(V2): 2026/04/18 15:30:13

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX280)

流 速:1.5ml/min


波 长: 230nm

版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 230nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.643	59673	100.000	6517	1978	1.132	--
总计		59673	100.000	6517			

图7 替米沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026031621批-pH4.5介质-桨法-50转-5min-片1
供试品溶液-1



PCH-962

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$PCH-962 - 30-3/31-508-2 - zzp-2026031621p-rcqx-1-pH4.5jz-jf50z-p2-5min.lcd

方法文件名: RC\$PCH-962 - PCH-962-rcqx-tm-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$PCH-962 - 20260417-rcqx-FX280.lcb

样品瓶号: 1-10

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/04/17 12:10:26

处理时间(V2): 2026/04/18 15:30:16

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX280)

流 速:1.5ml/min


波 长: 230nm

版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 230nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.642	47240	100.000	5185	1972	1.120	--
总计		47240	100.000	5185			

图8 替米沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026031621批-pH4.5介质-桨法-50转-5min-片2
供试品溶液-1



PCH-962

＜样品信息＞

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$PCH-962 - 30-3/31-509-2 - zzp-2026031621p-rcqx-1-pH4.5jz-jf50z-p3-5min.lcd

方法文件名: RC\$PCH-962 - PCH-962-rcqx-tm-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$PCH-962 - 20260417-rcqx-FX280.lcb

样品瓶号: 1-19

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/04/17 12:14:49

处理时间(V2): 2026/04/18 15:30:19

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX280)

流 速:1.5ml/min


波 长: 230nm

版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 230nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.643	36665	100.000	4027	2016	1.104	--
总计		36665	100.000	4027			

图9 替米沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026031621批-pH4.5介质-桨法-50转-5min-片3
供试品溶液-1



PCH-962

＜样品信息＞

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$PCH-962 - 30-3/31-510-2 - zzp-2026031621p-rcqx-1-pH4.5jz-jf50z-p4-5min.lcd

方法文件名: RC\$PCH-962 - PCH-962-rcqx-tm-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$PCH-962 - 20260417-rcqx-FX280.lcb

样品瓶号: 1-28

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/04/17 12:19:12

处理时间(V2): 2026/04/18 15:30:22

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX280)

流 速:1.5ml/min


波 长: 230nm

版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 230nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.643	41846	100.000	4599	2004	1.120	--
总计		41846	100.000	4599			

图10 替米沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026031621批-pH4.5介质-桨法-50转-5min-片4
供试品溶液-1



PCH-962

＜样品信息＞

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$PCH-962 - 30-3/31-511-2 - zzp-2026031621p-rcqx-1-pH4.5jz-jf50z-p5-5min.lcd

方法文件名: RC\$PCH-962 - PCH-962-rcqx-tm-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$PCH-962 - 20260417-rcqx-FX280.lcb

样品瓶号: 1-37

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/04/17 12:23:35

处理时间(V2): 2026/04/18 15:30:25

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX280)

流 速:1.5ml/min


波 长: 230nm

版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 230nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.643	50502	100.000	5582	1993	1.097	--
总计		50502	100.000	5582			

图11 替米沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026031621批-pH4.5介质-浆法-50转-5min-片5
供试品溶液-1



PCH-962

＜样品信息＞

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$PCH-962 - 30-3/31-512-2 - zzp-2026031621p-rcqx-1-pH4.5jz-jf50z-p6-5min.lcd

方法文件名: RC\$PCH-962 - PCH-962-rcqx-tm-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$PCH-962 - 20260417-rcqx-FX280.lcb

样品瓶号: 1-46

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/04/17 12:27:57

处理时间(V2): 2026/04/18 15:30:27

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX280)

流速:1.5ml/min


波长: 230nm

版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 230nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.643	49985	100.000	5468	2000	1.116	--
总计		49985	100.000	5468			

图12 替米沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026031621批-pH4.5介质-桨法-50转-5min-片6
供试品溶液-1



PCH-962

＜样品信息＞

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$PCH-962 - 30-3/31-513-2 - zzp-2026031621p-rcqx-1-pH4.5jz-jf50z-p1-10min.lcd

方法文件名: RC\$PCH-962 - PCH-962-rcqx-tm-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$PCH-962 - 20260417-rcqx-FX280.lcb

样品瓶号: 1-2

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/04/17 12:32:20

处理时间(V2): 2026/04/18 15:30:30

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX280)

流 速:1.5ml/min


波 长: 230nm

版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 230nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.643	114870	100.000	12541	1975	1.115	--
总计		114870	100.000	12541			

图13 替米沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026031621批-pH4.5介质-浆法-50转-10min-片1
供试品溶液-1



PCH-962

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$PCH-962 - 30-3/31-514-2 - zzp-2026031621p-rcqx-1-pH4.5jz-jf50z-p2-10min.lcd

方法文件名: RC\$PCH-962 - PCH-962-rcqx-tm-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$PCH-962 - 20260417-rcqx-FX280.lcb

样品瓶号: 1-11

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/04/17 12:36:43

处理时间(V2): 2026/04/18 15:30:33

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX280)

流 速:1.5ml/min


波 长: 230nm

版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 230nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.644	107877	100.000	11787	1981	1.116	--
总计		107877	100.000	11787			

图14 替米沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026031621批-pH4.5介质-浆法-50转-10min-片2
供试品溶液-1



PCH-962

＜样品信息＞

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$PCH-962 - 30-3/31-515-2 - zzp-2026031621p-rcqx-1-pH4.5jz-jf50z-p3-10min.lcd

方法文件名: RC\$PCH-962 - PCH-962-rcqx-tm-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$PCH-962 - 20260417-rcqx-FX280.lcb

样品瓶号: 1-20

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/04/17 12:41:06

处理时间(V2): 2026/04/18 15:30:36

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX280)

流 速:1.5ml/min


波 长: 230nm

版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 230nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.644	90807	100.000	9947	1983	1.116	--
总计		90807	100.000	9947			

图15 替米沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026031621批-pH4.5介质-浆法-50转-10min-片3
供试品溶液-1



PCH-962

＜样品信息＞

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$PCH-962 - 30-3/31-516-2 - zzp-2026031621p-rcqx-1-pH4.5jz-jf50z-p4-10min.lcd

方法文件名: RC\$PCH-962 - PCH-962-rcqx-tm-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$PCH-962 - 20260417-rcqx-FX280.lcb

样品瓶号: 1-29

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/04/17 12:45:29

处理时间(V2): 2026/04/18 15:30:38

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX280)

流速:1.5ml/min


波长: 230nm

版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 230nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.642	102200	100.000	11141	1977	1.114	--
总计		102200	100.000	11141			

图16 替米沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026031621批-pH4.5介质-浆法-50转-10min-片4
供试品溶液-1



PCH-962

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$PCH-962 - 30-3/31-517-2 - zzp-2026031621p-rcqx-1-pH4.5jz-jf50z-p5-10min.lcd

方法文件名: RC\$PCH-962 - PCH-962-rcqx-tm-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$PCH-962 - 20260417-rcqx-FX280.lcb

样品瓶号: 1-38

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/04/17 12:49:52

处理时间(V2): 2026/04/18 15:30:41

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX280)

流速:1.5ml/min


波长: 230nm

版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 230nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.642	111572	100.000	12198	1980	1.112	--
总计		111572	100.000	12198			

图17 替米沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026031621批-pH4.5介质-浆法-50转-10min-片5
供试品溶液-1




PCH-962

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-962 - 30-3/31-518-2 - zzp-2026031621p-rcqx-1-pH4.5jz-jf50z-p6-10min.lcd
方法文件名: RC\$PCH-962 - PCH-962-rcqx-tm-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-962 - 20260417-rcqx-FX280.lcb
样品瓶号: 1-47
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/04/17 12:54:14
处理时间(V2): 2026/04/18 15:30:44
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX280)

流 速:1.5ml/min
波 长: 230nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 230nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.642	109095	100.000	11936	1979	1.114	--
总计		109095	100.000	11936			

图18 替米沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026031621批-pH4.5介质-浆法-50转-10min-片6
供试品溶液-1



PCH-962

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$PCH-962 - 30-3/31-519-2 - zzp-2026031621p-rcqx-1-pH4.5jz-jf50z-p1-15min.lcd

方法文件名: RC\$PCH-962 - PCH-962-rcqx-tm-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$PCH-962 - 20260417-rcqx-FX280.lcb

样品瓶号: 1-3

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/04/17 12:58:37

处理时间(V2): 2026/04/18 15:30:47

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX280)

流速:1.5ml/min


波长: 230nm

版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 230nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.643	150118	100.000	16397	1984	1.114	--
总计		150118	100.000	16397			

图19 替米沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026031621批-pH4.5介质-浆法-50转-15min-片1
供试品溶液-1



PCH-962

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$PCH-962 - 30-3/31-520-2 - zzp-2026031621p-rcqx-1-pH4.5jz-jf50z-p2-15min.lcd

方法文件名: RC\$PCH-962 - PCH-962-rcqx-tm-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$PCH-962 - 20260417-rcqx-FX280.lcb

样品瓶号: 1-12

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/04/17 13:03:00

处理时间(V2): 2026/04/18 15:30:49

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX280)

流速:1.5ml/min


波长: 230nm

版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 230nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.643	150850	100.000	16449	1987	1.111	--
总计		150850	100.000	16449			

图20 替米沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026031621批-pH4.5介质-浆法-50转-15min-片2
供试品溶液-1



PCH-962

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$PCH-962 - 30-3/31-521-2 - zzp-2026031621p-rcqx-1-pH4.5jz-jf50z-p3-15min.lcd

方法文件名: RC\$PCH-962 - PCH-962-rcqx-tm-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$PCH-962 - 20260417-rcqx-FX280.lcb

样品瓶号: 1-21

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/04/17 13:07:23

处理时间(V2): 2026/04/18 15:30:53

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX280)

流速:1.5ml/min


波长: 230nm

版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 230nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.644	126768	100.000	13904	1986	1.110	--
总计		126768	100.000	13904			

图21 替米沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026031621批-pH4.5介质-浆法-50转-15min-片3
供试品溶液-1



PCH-962

＜样品信息＞

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$PCH-962 - 30-3/31-522-2 - zzp-2026031621p-rcqx-1-pH4.5jz-jf50z-p4-15min.lcd

方法文件名: RC\$PCH-962 - PCH-962-rcqx-tm-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$PCH-962 - 20260417-rcqx-FX280.lcb

样品瓶号: 1-30

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/04/17 13:11:46

处理时间(V2): 2026/04/18 15:30:56

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX280)

流速:1.5ml/min


波长: 230nm

版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 230nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.643	134439	100.000	14707	1986	1.110	--
总计		134439	100.000	14707			

图22 替米沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026031621批-pH4.5介质-浆法-50转-15min-片4
供试品溶液-1




PCH-962

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-962 - 30-3/31-523-2 - zzp-2026031621p-rcqx-1-pH4.5jz-jf50z-p5-15min.lcd
方法文件名: RC\$PCH-962 - PCH-962-rcqx-tm-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-962 - 20260417-rcqx-FX280.lcb
样品瓶号: 1-39
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/04/17 13:16:09
处理时间(V2): 2026/04/18 15:30:59
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX280)

流 速:1.5ml/min
波 长: 230nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 230nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.639	140855	100.000	15396	1972	1.115	--
总计		140855	100.000	15396			

图23 替米沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026031621批-pH4.5介质-浆法-50转-15min-片5
供试品溶液-1



PCH-962

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$PCH-962 - 30-3/31-524-2 - zzp-2026031621p-rcqx-1-pH4.5jz-jf50z-p6-15min.lcd

方法文件名: RC\$PCH-962 - PCH-962-rcqx-tm-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$PCH-962 - 20260417-rcqx-FX280.lcb

样品瓶号: 1-48

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/04/17 13:20:31

处理时间(V2): 2026/04/18 15:31:02

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX280)

流 速:1.5ml/min


波 长: 230nm

版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 230nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.642	152770	100.000	16679	1976	1.114	--
总计		152770	100.000	16679			

图24 替米沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026031621批-pH4.5介质-浆法-50转-15min-片6
供试品溶液-1




PCH-962

＜样品信息＞

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-962 - 30-3/31-525-2 - zzp-2026031621p-rcqx-1-pH4.5jz-jf50z-p1-20min.lcd
方法文件名: RC\$PCH-962 - PCH-962-rcqx-tm-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-962 - 20260417-rcqx-FX280.lcb
样品瓶号: 1-4
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/04/17 13:24:54
处理时间(V2): 2026/04/18 15:31:05
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX280)

流 速:1.5ml/min
波 长: 230nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 230nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.642	163029	100.000	17817	1979	1.111	--
总计		163029	100.000	17817			

图25 替米沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026031621批-pH4.5介质-浆法-50转-20min-片1
供试品溶液-1



PCH-962

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$PCH-962 - 30-3/31-526-2 - zzp-2026031621p-rcqx-1-pH4.5jz-jf50z-p2-20min.lcd

方法文件名: RC\$PCH-962 - PCH-962-rcqx-tm-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$PCH-962 - 20260417-rcqx-FX280.lcb

样品瓶号: 1-13

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/04/17 13:29:17

处理时间(V2): 2026/04/18 15:31:07

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX280)

流速:1.5ml/min


波长: 230nm

版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 230nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.642	172890	100.000	18850	1979	1.109	--
总计		172890	100.000	18850			

图26 替米沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026031621批-pH4.5介质-浆法-50转-20min-片2
供试品溶液-1



PCH-962

＜样品信息＞

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$PCH-962 - 30-3/31-527-2 - zzp-2026031621p-rcqx-1-pH4.5jz-jf50z-p3-20min.lcd

方法文件名: RC\$PCH-962 - PCH-962-rcqx-tm-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$PCH-962 - 20260417-rcqx-FX280.lcb

样品瓶号: 1-22

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/04/17 13:33:39

处理时间(V2): 2026/04/18 15:31:10

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX280)

流 速:1.5ml/min


波 长: 230nm

版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 230nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.643	157468	100.000	17220	1982	1.112	--
总计		157468	100.000	17220			

图27 替米沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026031621批-pH4.5介质-浆法-50转-20min-片3
供试品溶液-1



PCH-962

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$PCH-962 - 30-3/31-528-2 - zzp-2026031621p-rcqx-1-pH4.5jz-jf50z-p4-20min.lcd

方法文件名: RC\$PCH-962 - PCH-962-rcqx-tm-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$PCH-962 - 20260417-rcqx-FX280.lcb

样品瓶号: 1-31

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/04/17 13:38:02

处理时间(V2): 2026/04/18 15:31:13

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX280)

流速:1.5ml/min


波长: 230nm

版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 230nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.643	156372	100.000	17065	1973	1.109	--
总计		156372	100.000	17065			

图28 替米沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026031621批-pH4.5介质-浆法-50转-20min-片4
供试品溶液-1



PCH-962

＜样品信息＞

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$PCH-962 - 30-3/31-529-2 - zzp-2026031621p-rcqx-1-pH4.5jz-jf50z-p5-20min.lcd

方法文件名: RC\$PCH-962 - PCH-962-rcqx-tm-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$PCH-962 - 20260417-rcqx-FX280.lcb

样品瓶号: 1-40

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/04/17 13:42:25

处理时间(V2): 2026/04/18 15:31:16

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX280)

流 速:1.5ml/min


波 长: 230nm

版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 230nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.643	161124	100.000	17590	1976	1.107	--
总计		161124	100.000	17590			

图29 替米沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026031621批-pH4.5介质-浆法-50转-20min-片5
供试品溶液-1



PCH-962

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$PCH-962 - 30-3/31-530-2 - zzp-2026031621p-rcqx-1-pH4.5jz-jf50z-p6-20min.lcd

方法文件名: RC\$PCH-962 - PCH-962-rcqx-tm-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$PCH-962 - 20260417-rcqx-FX280.lcb

样品瓶号: 1-49

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/04/17 13:46:47

处理时间(V2): 2026/04/18 15:31:19

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX280)

流速:1.5ml/min


波长: 230nm

版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 230nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.643	171115	100.000	18680	1976	1.109	--
总计		171115	100.000	18680			

图30 替米沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026031621批-pH4.5介质-浆法-50转-20min-片6
供试品溶液-1



PCH-962

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$PCH-962 - 30-3/31-531-2 - zzp-2026031621p-rcqx-1-pH4.5jz-jf50z-p1-30min.lcd

方法文件名: RC\$PCH-962 - PCH-962-rcqx-tm-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$PCH-962 - 20260417-rcqx-FX280.lcb

样品瓶号: 1-5

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/04/17 13:51:10

处理时间(V2): 2026/04/18 15:31:21

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX280)

流 速:1.5ml/min


波 长: 230nm

版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 230nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.643	176463	100.000	19205	1975	1.110	--
总计		176463	100.000	19205			

图31 替米沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026031621批-pH4.5介质-浆法-50转-30min-片1
供试品溶液-1



PCH-962

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$PCH-962 - 30-3/31-532-2 - zzp-2026031621p-rcqx-1-pH4.5jz-jf50z-p2-30min.lcd

方法文件名: RC\$PCH-962 - PCH-962-rcqx-tm-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$PCH-962 - 20260417-rcqx-FX280.lcb

样品瓶号: 1-14

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/04/17 13:55:33

处理时间(V2): 2026/04/18 15:31:24

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX280)

流速:1.5ml/min


波长: 230nm

版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 230nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.644	183680	100.000	20012	1968	1.108	--
总计		183680	100.000	20012			

图32 替米沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026031621批-pH4.5介质-浆法-50转-30min-片2
供试品溶液-1



PCH-962

＜样品信息＞

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$PCH-962 - 30-3/31-533-2 - zzp-2026031621p-rcqx-1-pH4.5jz-jf50z-p3-30min.lcd

方法文件名: RC\$PCH-962 - PCH-962-rcqx-tm-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$PCH-962 - 20260417-rcqx-FX280.lcb

样品瓶号: 1-23

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/04/17 13:59:56

处理时间(V2): 2026/04/18 15:31:27

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX280)

流 速:1.5ml/min


波 长: 230nm

版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 230nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.643	178242	100.000	19447	1976	1.107	--
总计		178242	100.000	19447			

图33 替米沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026031621批-pH4.5介质-浆法-50转-30min-片3
供试品溶液-1



PCH-962

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$PCH-962 - 30-3/31-534-2 - zzp-2026031621p-rcqx-1-pH4.5jz-jf50z-p4-30min.lcd

方法文件名: RC\$PCH-962 - PCH-962-rcqx-tm-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$PCH-962 - 20260417-rcqx-FX280.lcb

样品瓶号: 1-32

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/04/17 14:04:20

处理时间(V2): 2026/04/18 15:31:30

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX280)

流速:1.5ml/min


波长: 230nm

版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 230nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.644	174102	100.000	19011	1974	1.106	--
总计		174102	100.000	19011			

图34 替米沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026031621批-pH4.5介质-浆法-50转-30min-片4
供试品溶液-1



PCH-962

＜样品信息＞

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$PCH-962 - 30-3/31-535-2 - zzp-2026031621p-rcqx-1-pH4.5jz-jf50z-p5-30min.lcd

方法文件名: RC\$PCH-962 - PCH-962-rcqx-tm-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$PCH-962 - 20260417-rcqx-FX280.lcb

样品瓶号: 1-41

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/04/17 14:08:43

处理时间(V2): 2026/04/18 15:31:32

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX280)

流 速:1.5ml/min


波 长: 230nm

版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 230nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.643	192321	100.000	20961	1972	1.107	--
总计		192321	100.000	20961			

图35 替米沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026031621批-pH4.5介质-浆法-50转-30min-片5
供试品溶液-1



PCH-962

＜样品信息＞

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$PCH-962 - 30-3/31-536-2 - zzp-2026031621p-rcqx-1-pH4.5jz-jf50z-p6-30min.lcd

方法文件名: RC\$PCH-962 - PCH-962-rcqx-tm-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$PCH-962 - 20260417-rcqx-FX280.lcb

样品瓶号: 1-50

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/04/17 14:13:06

处理时间(V2): 2026/04/18 15:31:35

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX280)

流 速:1.5ml/min


波 长: 230nm

版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 230nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.642	192888	100.000	21007	1970	1.107	--
总计		192888	100.000	21007			

图36 替米沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026031621批-pH4.5介质-浆法-50转-30min-片6
供试品溶液-1



PCH-962

＜样品信息＞

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$PCH-962 - 30-3/31-537-2 - zzp-2026031621p-rcqx-1-pH4.5jz-jf50z-p1-45min.lcd

方法文件名: RC\$PCH-962 - PCH-962-rcqx-tm-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$PCH-962 - 20260417-rcqx-FX280.lcb

样品瓶号: 1-6

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/04/17 14:17:29

处理时间(V2): 2026/04/18 15:31:38

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX280)

流 速:1.5ml/min


波 长: 230nm

版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 230nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.643	188699	100.000	20586	1973	1.108	--
总计		188699	100.000	20586			

图37 替米沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026031621批-pH4.5介质-浆法-50转-45min-片1
供试品溶液-1



PCH-962

＜样品信息＞

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$PCH-962 - 30-3/31-538-2 - zzp-2026031621p-rcqx-1-pH4.5jz-jf50z-p2-45min.lcd

方法文件名: RC\$PCH-962 - PCH-962-rcqx-tm-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$PCH-962 - 20260417-rcqx-FX280.lcb

样品瓶号: 1-15

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/04/17 14:21:52

处理时间(V2): 2026/04/18 15:31:41

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX280)

流 速:1.5ml/min


波 长: 230nm

版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 230nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.642	192146	100.000	20951	1972	1.103	--
总计		192146	100.000	20951			

图38 替米沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026031621批-pH4.5介质-浆法-50转-45min-片2
供试品溶液-1




PCH-962

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-962 - 30-3/31-539-2 - zzp-2026031621p-rcqx-1-pH4.5jz-jf50z-p3-45min.lcd
方法文件名: RC\$PCH-962 - PCH-962-rcqx-tm-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-962 - 20260417-rcqx-FX280.lcb
样品瓶号: 1-24
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/04/17 14:26:15
处理时间(V2): 2026/04/18 15:31:43
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX280)

流 速:1.5ml/min
波 长: 230nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 230nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.642	186357	100.000	20293	1971	1.106	--
总计		186357	100.000	20293			

图39 替米沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026031621批-pH4.5介质-浆法-50转-45min-片3
供试品溶液-1



PCH-962

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$PCH-962 - 30-3/31-540-2 - zzp-2026031621p-rcqx-1-pH4.5jz-jf50z-p4-45min.lcd

方法文件名: RC\$PCH-962 - PCH-962-rcqx-tm-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$PCH-962 - 20260417-rcqx-FX280.lcb

样品瓶号: 1-33

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/04/17 14:30:38

处理时间(V2): 2026/04/18 15:31:46

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX280)

流速:1.5ml/min


波长: 230nm

版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 230nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.643	174594	100.000	18954	1967	1.108	--
总计		174594	100.000	18954			

图40 替米沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026031621批-pH4.5介质-浆法-50转-45min-片4
供试品溶液-1




PCH-962

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-962 - 30-3/31-541-2 - zzp-2026031621p-rcqx-1-pH4.5jz-jf50z-p5-45min.lcd
方法文件名: RC\$PCH-962 - PCH-962-rcqx-tm-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-962 - 20260417-rcqx-FX280.lcb
样品瓶号: 1-42
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/04/17 14:35:01
处理时间(V2): 2026/04/18 15:31:49
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX280)

流 速:1.5ml/min
波 长: 230nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 230nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.643	192766	100.000	20989	1967	1.106	--
总计		192766	100.000	20989			

图41 替米沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026031621批-pH4.5介质-浆法-50转-45min-片5
供试品溶液-1



PCH-962

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$PCH-962 - 30-3/31-542-2 - zzp-2026031621p-rcqx-1-pH4.5jz-jf50z-p6-45min.lcd

方法文件名: RC\$PCH-962 - PCH-962-rcqx-tm-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$PCH-962 - 20260417-rcqx-FX280.lcb

样品瓶号: 1-51

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/04/17 14:39:23

处理时间(V2): 2026/04/18 15:31:52

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX280)

流速:1.5ml/min


波长: 230nm

版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 230nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.644	194610	100.000	21210	1968	1.104	--
总计		194610	100.000	21210			

图42 替米沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026031621批-pH4.5介质-浆法-50转-45min-片6
供试品溶液-1



PCH-962

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$PCH-962 - 30-3/31-543-2 - zzp-2026031621p-rcqx-1-pH4.5jz-jf50z-p1-60min.lcd

方法文件名: RC\$PCH-962 - PCH-962-rcqx-tm-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$PCH-962 - 20260417-rcqx-FX280.lcb

样品瓶号: 1-7

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/04/17 14:43:46

处理时间(V2): 2026/04/18 15:31:55

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX280)

流速:1.5ml/min


波长: 230nm

版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 230nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.644	191183	100.000	20853	1971	1.103	--
总计		191183	100.000	20853			

图43 替米沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026031621批-pH4.5介质-浆法-50转-60min-片1
供试品溶液-1



PCH-962

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$PCH-962 - 30-3/31-544-2 - zzp-2026031621p-rcqx-1-pH4.5jz-jf50z-p2-60min.lcd

方法文件名: RC\$PCH-962 - PCH-962-rcqx-tm-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$PCH-962 - 20260417-rcqx-FX280.lcb

样品瓶号: 1-16

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/04/17 14:48:09

处理时间(V2): 2026/04/18 15:31:57

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX280)

流速:1.5ml/min


波长: 230nm

版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 230nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.645	193079	100.000	21032	1968	1.105	--
总计		193079	100.000	21032			

图44 替米沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026031621批-pH4.5介质-浆法-50转-60min-片2
供试品溶液-1



PCH-962

＜样品信息＞

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$PCH-962 - 30-3/31-545-2 - zzp-2026031621p-rcqx-1-pH4.5jz-jf50z-p3-60min.lcd

方法文件名: RC\$PCH-962 - PCH-962-rcqx-tm-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$PCH-962 - 20260417-rcqx-FX280.lcb

样品瓶号: 1-25

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/04/17 14:52:31

处理时间(V2): 2026/04/18 15:32:00

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX280)

流 速:1.5ml/min


波 长: 230nm

版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 230nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.645	193612	100.000	21107	1969	1.106	--
总计		193612	100.000	21107			

图45 替米沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026031621批-pH4.5介质-浆法-50转-60min-片3
供试品溶液-1



PCH-962

＜样品信息＞

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$PCH-962 - 30-3/31-546-2 - zzp-2026031621p-rcqx-1-pH4.5jz-jf50z-p4-60min.lcd

方法文件名: RC\$PCH-962 - PCH-962-rcqx-tm-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$PCH-962 - 20260417-rcqx-FX280.lcb

样品瓶号: 1-34

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/04/17 14:56:54

处理时间(V2): 2026/04/18 15:32:03

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX280)

流 速:1.5ml/min


波 长: 230nm

版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 230nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.646	183131	100.000	19990	1970	1.102	--
总计		183131	100.000	19990			

图46 替米沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026031621批-pH4.5介质-浆法-50转-60min-片4
供试品溶液-1



PCH-962

＜样品信息＞

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$PCH-962 - 30-3/31-547-2 - zzp-2026031621p-rcqx-1-pH4.5jz-jf50z-p5-60min.lcd

方法文件名: RC\$PCH-962 - PCH-962-rcqx-tm-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$PCH-962 - 20260417-rcqx-FX280.lcb

样品瓶号: 1-43

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/04/17 15:01:17

处理时间(V2): 2026/04/18 15:32:06

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX280)

流 速:1.5ml/min


波 长: 230nm

版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 230nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.646	192780	100.000	21050	1972	1.100	--
总计		192780	100.000	21050			

图47 替米沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026031621批-pH4.5介质-浆法-50转-60min-片5
供试品溶液-1



PCH-962

＜样品信息＞

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$PCH-962 - 30-3/31-548-2 - zzp-2026031621p-rcqx-1-pH4.5jz-jf50z-p6-60min.lcd

方法文件名: RC\$PCH-962 - PCH-962-rcqx-tm-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$PCH-962 - 20260417-rcqx-FX280.lcb

样品瓶号: 1-52

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/04/17 15:05:39

处理时间(V2): 2026/04/18 15:32:09

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX280)

流 速:1.5ml/min


波 长: 230nm

版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 230nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.645	190522	100.000	20752	1968	1.104	--
总计		190522	100.000	20752			

图48 替米沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026031621批-pH4.5介质-浆法-50转-60min-片6
供试品溶液-1



PCH-962

＜样品信息＞

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$PCH-962 - 30-3/31-549-2 - zzp-2026031621p-rcqx-1-pH4.5jz-jf50z-p1-jx.lcd

方法文件名: RC\$PCH-962 - PCH-962-rcqx-tm-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$PCH-962 - 20260417-rcqx-FX280.lcb

样品瓶号: 1-8

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/04/17 15:10:03

处理时间(V2): 2026/04/18 15:32:12

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX280)

流 速:1.5ml/min


波 长: 230nm

版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 230nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.646	192699	100.000	21006	1968	1.105	--
总计		192699	100.000	21006			

图49 替米沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026031621批-pH4.5介质-桨法-50转-极限转速-片1
供试品溶液-1



PCH-962

＜样品信息＞

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$PCH-962 - 30-3/31-550-2 - zzp-2026031621p-rcqx-1-pH4.5jz-jf50z-p2-jx.lcd

方法文件名: RC\$PCH-962 - PCH-962-rcqx-tm-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$PCH-962 - 20260417-rcqx-FX280.lcb

样品瓶号: 1-17

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/04/17 15:14:27

处理时间(V2): 2026/04/18 15:32:14

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX280)

流 速:1.5ml/min


波 长: 230nm

版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 230nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.645	193181	100.000	21090	1970	1.102	--
总计		193181	100.000	21090			

图50 替米沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026031621批-pH4.5介质-桨法-50转-极限转速-片2
供试品溶液-1



PCH-962

＜样品信息＞

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$PCH-962 - 30-3/31-551-2 - zzp-2026031621p-rcqx-1-pH4.5jz-jf50z-p3-jx.lcd

方法文件名: RC\$PCH-962 - PCH-962-rcqx-tm-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$PCH-962 - 20260417-rcqx-FX280.lcb

样品瓶号: 1-26

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/04/17 15:18:50

处理时间(V2): 2026/04/18 15:32:17

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX280)

流 速:1.5ml/min


波 长: 230nm

版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 230nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.646	196798	100.000	21427	1961	1.103	--
总计		196798	100.000	21427			

图51 替米沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026031621批-pH4.5介质-桨法-50转-极限转速-片3
供试品溶液-1



PCH-962

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$PCH-962 - 30-3/31-552-2 - zzp-2026031621p-rcqx-1-pH4.5jz-jf50z-p4-jx.lcd

方法文件名: RC\$PCH-962 - PCH-962-rcqx-tm-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$PCH-962 - 20260417-rcqx-FX280.lcb

样品瓶号: 1-35

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/04/17 15:23:14

处理时间(V2): 2026/04/18 15:32:20

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX280)

流速:1.5ml/min


波长: 230nm

版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 230nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.645	194344	100.000	21156	1966	1.101	--
总计		194344	100.000	21156			

图52 替米沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026031621批-pH4.5介质-桨法-50转-极限转速-片4
供试品溶液-1




PCH-962

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-962 - 30-3/31-553-2 - zzp-2026031621p-rcqx-1-pH4.5jz-jf50z-p5-jx.lcd
方法文件名: RC\$PCH-962 - PCH-962-rcqx-tm-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-962 - 20260417-rcqx-FX280.lcb
样品瓶号: 1-44
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/04/17 15:27:37
处理时间(V2): 2026/04/18 15:32:23
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX280)

流 速:1.5ml/min
波 长: 230nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 230nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.646	188112	100.000	20478	1968	1.103	--
总计		188112	100.000	20478			

图53 替米沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026031621批-pH4.5介质-桨法-50转-极限转速-片5
供试品溶液-1



PCH-962

＜样品信息＞

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$PCH-962 - 30-3/31-554-2 - zzp-2026031621p-rcqx-1-pH4.5jz-jf50z-p6-jx.lcd

方法文件名: RC\$PCH-962 - PCH-962-rcqx-tm-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$PCH-962 - 20260417-rcqx-FX280.lcb

样品瓶号: 1-53

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/04/17 15:32:00

处理时间(V2): 2026/04/18 15:32:26

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX280)

流 速:1.5ml/min


波 长: 230nm

版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 230nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.645	188397	100.000	20463	1960	1.103	--
总计		188397	100.000	20463			

图54 替米沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026031621批-pH4.5介质-桨法-50转-极限转速-片6
供试品溶液-1



PCH-962

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$PCH-962 - 30-3/31-555-2 - zzp-2026031621p-rcqx-1-pH4.5jz-jf50z-dz2-1.lcd

方法文件名: RC\$PCH-962 - PCH-962-rcqx-tm-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$PCH-962 - 20260417-rcqx-FX280.lcb

样品瓶号: 1-27

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/04/17 15:36:24

处理时间(V2): 2026/04/18 15:32:29

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX280)

流速:1.5ml/min


波长: 230nm

版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 230nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.636	729578	100.000	77684	1873	1.111	--
总计		729578	100.000	77684			

图55 替米沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026031621批-pH4.5介质-桨法-50转
对照品溶液-2-1



PCH-962

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$PCH-962 - 30-3/31-556-2 - zzp-2026031621p-rcqx-1-pH4.5jz-jf50z-dz2-2.lcd

方法文件名: RC\$PCH-962 - PCH-962-rcqx-tm-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$PCH-962 - 20260417-rcqx-FX280.lcb

样品瓶号: 1-27

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/04/17 15:40:48

处理时间(V2): 2026/04/18 15:32:32

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX280)

流 速:1.5ml/min


波 长: 230nm

版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 230nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.636	726823	100.000	77074	1860	1.116	--
总计		726823	100.000	77074			

图56 替米沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026031621批-pH4.5介质-桨法-50转
对照品溶液-2-2




PCH-962

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-962 - 30-3/31-557-2 - zzp-2026031621p-rcqx-2-pH4.5jz-jf50z-rj.lcd
方法文件名: RC\$PCH-962 - PCH-962-rcqx-tm-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-962 - 20260417-rcqx-FX280.lcb
样品瓶号: 2-9
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/04/17 15:45:13
处理时间(V2): 2026/04/18 15:32:35
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX280)

流 速:1.5ml/min
波 长: 230nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 230nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图57 替米沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026031621批-pH4.5介质-桨法-50转
溶剂



PCH-962

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$PCH-962 - 30-3/31-558-2 - zzp-2026031621p-rcqx-2-pH4.5jz-jf50z-dz1-1.lcd

方法文件名: RC\$PCH-962 - PCH-962-rcqx-tm-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$PCH-962 - 20260417-rcqx-FX280.lcb

样品瓶号: 2-18

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/04/17 15:49:38

处理时间(V2): 2026/04/18 15:32:38

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX280)

流速:1.5ml/min


波长: 230nm

版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 230nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.636	735299	100.000	78230	1866	1.110	--
总计		735299	100.000	78230			

图58 替米沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026031621批-pH4.5介质-桨法-50转
对照品溶液-1-1



PCH-962

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$PCH-962 - 30-3/31-559-2 - zzp-2026031621p-rcqx-2-pH4.5jz-jf50z-dz1-2.lcd

方法文件名: RC\$PCH-962 - PCH-962-rcqx-tm-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$PCH-962 - 20260417-rcqx-FX280.lcb

样品瓶号: 2-18

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/04/17 15:54:04

处理时间(V2): 2026/04/18 15:32:41

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX280)

流速:1.5ml/min


波长: 230nm

版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 230nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.637	733887	100.000	78156	1868	1.110	--
总计		733887	100.000	78156			

图59 替米沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026031621批-pH4.5介质-桨法-50转
对照品溶液-1-2




PCH-962

＜样品信息＞

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-962 - 30-3/31-560-2 - zzp-2026031621p-rcqx-2-pH4.5jz-jf50z-dz1-3.lcd
方法文件名: RC\$PCH-962 - PCH-962-rcqx-tm-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-962 - 20260417-rcqx-FX280.lcb
样品瓶号: 2-18
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/04/17 15:58:28
处理时间(V2): 2026/04/18 15:32:43
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX280)

流 速:1.5ml/min
波 长: 230nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 230nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.635	733888	100.000	78030	1865	1.110	--
总计		733888	100.000	78030			

图60 替米沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026031621批-pH4.5介质-桨法-50转
对照品溶液-1-3



PCH-962

＜样品信息＞

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$PCH-962 - 30-3/31-561-2 - zzp-2026031621p-rcqx-2-pH4.5jz-jf50z-dz1-4.lcd

方法文件名: RC\$PCH-962 - PCH-962-rcqx-tm-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$PCH-962 - 20260417-rcqx-FX280.lcb

样品瓶号: 2-18

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/04/17 16:02:53

处理时间(V2): 2026/04/18 15:32:46

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX280)

流速:1.5ml/min


波长: 230nm

版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 230nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.636	733273	100.000	77961	1866	1.109	--
总计		733273	100.000	77961			

图61 替米沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026031621批-pH4.5介质-桨法-50转
对照品溶液-1-4



PCH-962

＜样品信息＞

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$PCH-962 - 30-3/31-562-2 - zzp-2026031621p-rcqx-2-pH4.5jz-jf50z-dz1-5.lcd

方法文件名: RC\$PCH-962 - PCH-962-rcqx-tm-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$PCH-962 - 20260417-rcqx-FX280.lcb

样品瓶号: 2-18

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/04/17 16:07:18

处理时间(V2): 2026/04/18 15:32:49

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX280)

流速:1.5ml/min


波长: 230nm

版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 230nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.637	732680	100.000	77916	1865	1.109	--
总计		732680	100.000	77916			

图62 替米沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026031621批-pH4.5介质-桨法-50转
对照品溶液-1-5



PCH-962

＜样品信息＞

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$PCH-962 - 30-3/31-563-2 - zzp-2026031621p-rcqx-2-pH4.5jz-jf50z-p1-5min.lcd

方法文件名: RC\$PCH-962 - PCH-962-rcqx-tm-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$PCH-962 - 20260417-rcqx-FX280.lcb

样品瓶号: 2-1

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/04/17 16:11:42

处理时间(V2): 2026/04/18 15:32:52

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX280)

流 速:1.5ml/min


波 长: 230nm

版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 230nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.645	35074	100.000	3825	1951	1.105	--
总计		35074	100.000	3825			

图63 替米沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026031621批-pH4.5介质-桨法-50转-5min-片1
供试品溶液-1



PCH-962

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$PCH-962 - 30-3/31-564-2 - zzp-2026031621p-rcqx-2-pH4.5jz-jf50z-p2-5min.lcd

方法文件名: RC\$PCH-962 - PCH-962-rcqx-tm-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$PCH-962 - 20260417-rcqx-FX280.lcb

样品瓶号: 2-10

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/04/17 16:16:06

处理时间(V2): 2026/04/18 15:32:54

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX280)

流 速:1.5ml/min


波 长: 230nm

版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 230nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.645	52468	100.000	5724	1957	1.091	--
总计		52468	100.000	5724			

图64 替米沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026031621批-pH4.5介质-桨法-50转-5min-片2
供试品溶液-1



PCH-962

＜样品信息＞

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$PCH-962 - 30-3/31-565-2 - zzp-2026031621p-rcqx-2-pH4.5jz-jf50z-p3-5min.lcd

方法文件名: RC\$PCH-962 - PCH-962-rcqx-tm-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$PCH-962 - 20260417-rcqx-FX280.lcb

样品瓶号: 2-19

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/04/17 16:20:30

处理时间(V2): 2026/04/18 15:32:58

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX280)

流 速:1.5ml/min


波 长: 230nm

版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 230nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.645	39357	100.000	4312	1953	1.089	--
总计		39357	100.000	4312			

图65 替米沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026031621批-pH4.5介质-桨法-50转-5min-片3
供试品溶液-1



PCH-962

＜样品信息＞

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$PCH-962 - 30-3/31-566-2 - zzp-2026031621p-rcqx-2-pH4.5jz-jf50z-p4-5min.lcd

方法文件名: RC\$PCH-962 - PCH-962-rcqx-tm-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$PCH-962 - 20260417-rcqx-FX280.lcb

样品瓶号: 2-28

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/04/17 16:24:54

处理时间(V2): 2026/04/18 15:33:02

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX280)

流 速:1.5ml/min


波 长: 230nm

版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 230nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.645	42960	100.000	4706	1975	1.099	--
总计		42960	100.000	4706			

图66 替米沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026031621批-pH4.5介质-桨法-50转-5min-片4
供试品溶液-1



PCH-962

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$PCH-962 - 30-3/31-567-2 - zzp-2026031621p-rcqx-2-pH4.5jz-jf50z-p5-5min.lcd

方法文件名: RC\$PCH-962 - PCH-962-rcqx-tm-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$PCH-962 - 20260417-rcqx-FX280.lcb

样品瓶号: 2-37

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/04/17 16:29:18

处理时间(V2): 2026/04/18 15:33:05

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX280)

流速:1.5ml/min


波长: 230nm

版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 230nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.646	52822	100.000	5749	1969	1.103	--
总计		52822	100.000	5749			

图67 替米沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026031621批-pH4.5介质-桨法-50转-5min-片5
供试品溶液-1



PCH-962

＜样品信息＞

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$PCH-962 - 30-3/31-568-2 - zzp-2026031621p-rcqx-2-pH4.5jz-jf50z-p6-5min.lcd

方法文件名: RC\$PCH-962 - PCH-962-rcqx-tm-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$PCH-962 - 20260417-rcqx-FX280.lcb

样品瓶号: 2-46

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/04/17 16:33:41

处理时间(V2): 2026/04/18 15:33:07

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX280)

流 速:1.5ml/min


波 长: 230nm

版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 230nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.646	39353	100.000	4342	1970	1.085	--
总计		39353	100.000	4342			

图68 替米沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026031621批-pH4.5介质-桨法-50转-5min-片6
供试品溶液-1




PCH-962

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-962 - 30-3/31-569-2 - zzp-2026031621p-rcqx-2-pH4.5jz-jf50z-p1-10min.lcd
方法文件名: RC\$PCH-962 - PCH-962-rcqx-tm-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-962 - 20260417-rcqx-FX280.lcb
样品瓶号: 2-2
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/04/17 16:38:06
处理时间(V2): 2026/04/18 15:33:10
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX280)

流 速:1.5ml/min
波 长: 230nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 230nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.647	89364	100.000	9746	1965	1.094	--
总计		89364	100.000	9746			

图69 替米沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026031621批-pH4.5介质-浆法-50转-10min-片1
供试品溶液-1



PCH-962

＜样品信息＞

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$PCH-962 - 30-3/31-570-2 - zzp-2026031621p-rcqx-2-pH4.5jz-jf50z-p2-10min.lcd

方法文件名: RC\$PCH-962 - PCH-962-rcqx-tm-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$PCH-962 - 20260417-rcqx-FX280.lcb

样品瓶号: 2-11

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/04/17 16:42:29

处理时间(V2): 2026/04/18 15:33:13

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX280)

流 速:1.5ml/min


波 长: 230nm

版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 230nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.646	123342	100.000	13365	1954	1.098	--
总计		123342	100.000	13365			

图70 替米沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026031621批-pH4.5介质-浆法-50转-10min-片2
供试品溶液-1



PCH-962

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$PCH-962 - 30-3/31-571-2 - zzp-2026031621p-rcqx-2-pH4.5jz-jf50z-p3-10min.lcd

方法文件名: RC\$PCH-962 - PCH-962-rcqx-tm-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$PCH-962 - 20260417-rcqx-FX280.lcb

样品瓶号: 2-20

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/04/17 16:46:53

处理时间(V2): 2026/04/18 15:33:16

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX280)

流速:1.5ml/min


波长: 230nm

版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 230nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.645	93214	100.000	10153	1953	1.095	--
总计		93214	100.000	10153			

图71 替米沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026031621批-pH4.5介质-浆法-50转-10min-片3
供试品溶液-1



PCH-962

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$PCH-962 - 30-3/31-572-2 - zzp-2026031621p-rcqx-2-pH4.5jz-jf50z-p4-10min.lcd

方法文件名: RC\$PCH-962 - PCH-962-rcqx-tm-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$PCH-962 - 20260417-rcqx-FX280.lcb

样品瓶号: 2-29

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/04/17 16:51:15

处理时间(V2): 2026/04/18 15:33:19

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX280)

流速:1.5ml/min


波长: 230nm

版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 230nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.646	90614	100.000	9906	1961	1.093	--
总计		90614	100.000	9906			

图72 替米沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026031621批-pH4.5介质-浆法-50转-10min-片4
供试品溶液-1



PCH-962

＜样品信息＞

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$PCH-962 - 30-3/31-573-2 - zzp-2026031621p-rcqx-2-pH4.5jz-jf50z-p5-10min.lcd

方法文件名: RC\$PCH-962 - PCH-962-rcqx-tm-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$PCH-962 - 20260417-rcqx-FX280.lcb

样品瓶号: 2-38

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/04/17 16:55:39

处理时间(V2): 2026/04/18 15:33:22

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX280)

流 速:1.5ml/min


波 长: 230nm

版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 230nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.647	99599	100.000	10807	1950	1.096	--
总计		99599	100.000	10807			

图73 替米沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026031621批-pH4.5介质-浆法-50转-10min-片5
供试品溶液-1



PCH-962

＜样品信息＞

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$PCH-962 - 30-3/31-574-2 - zzp-2026031621p-rcqx-2-pH4.5jz-jf50z-p6-10min.lcd

方法文件名: RC\$PCH-962 - PCH-962-rcqx-tm-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$PCH-962 - 20260417-rcqx-FX280.lcb

样品瓶号: 2-47

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/04/17 17:00:03

处理时间(V2): 2026/04/18 15:33:25

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX280)

流 速:1.5ml/min


波 长: 230nm

版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 230nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.647	105418	100.000	11447	1947	1.095	--
总计		105418	100.000	11447			

图74 替米沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026031621批-pH4.5介质-浆法-50转-10min-片6
供试品溶液-1



PCH-962

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$PCH-962 - 30-3/31-575-2 - zzp-2026031621p-rcqx-2-pH4.5jz-jf50z-p1-15min.lcd

方法文件名: RC\$PCH-962 - PCH-962-rcqx-tm-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$PCH-962 - 20260417-rcqx-FX280.lcb

样品瓶号: 2-3

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/04/17 17:04:27

处理时间(V2): 2026/04/18 15:33:27

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX280)

流速:1.5ml/min


波长: 230nm

版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 230nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.647	133943	100.000	14581	1959	1.094	--
总计		133943	100.000	14581			

图75 替米沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026031621批-pH4.5介质-浆法-50转-15min-片1
供试品溶液-1



PCH-962

＜样品信息＞

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$PCH-962 - 30-3/31-576-2 - zzp-2026031621p-rcqx-2-pH4.5jz-jf50z-p2-15min.lcd

方法文件名: RC\$PCH-962 - PCH-962-rcqx-tm-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$PCH-962 - 20260417-rcqx-FX280.lcb

样品瓶号: 2-12

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/04/17 17:08:51

处理时间(V2): 2026/04/18 15:33:30

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX280)

流 速:1.5ml/min


波 长: 230nm

版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 230nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.647	150125	100.000	16303	1951	1.097	--
总计		150125	100.000	16303			

图76 替米沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026031621批-pH4.5介质-浆法-50转-15min-片2
供试品溶液-1



PCH-962

＜样品信息＞

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$PCH-962 - 30-3/31-577-2 - zzp-2026031621p-rcqx-2-pH4.5jz-jf50z-p3-15min.lcd

方法文件名: RC\$PCH-962 - PCH-962-rcqx-tm-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$PCH-962 - 20260417-rcqx-FX280.lcb

样品瓶号: 2-21

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/04/17 17:13:17

处理时间(V2): 2026/04/18 15:33:33

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX280)

流 速:1.5ml/min


波 长: 230nm

版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 230nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.647	139476	100.000	15127	1949	1.094	--
总计		139476	100.000	15127			

图77 替米沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026031621批-pH4.5介质-浆法-50转-15min-片3
供试品溶液-1



PCH-962

＜样品信息＞

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$PCH-962 - 30-3/31-578-2 - zzp-2026031621p-rcqx-2-pH4.5jz-jf50z-p4-15min.lcd

方法文件名: RC\$PCH-962 - PCH-962-rcqx-tm-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$PCH-962 - 20260417-rcqx-FX280.lcb

样品瓶号: 2-30

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/04/17 17:17:40

处理时间(V2): 2026/04/18 15:33:36

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX280)

流速:1.5ml/min


波长: 230nm

版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 230nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.646	121073	100.000	13140	1946	1.091	--
总计		121073	100.000	13140			

图78 替米沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026031621批-pH4.5介质-浆法-50转-15min-片4
供试品溶液-1



PCH-962

＜样品信息＞

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$PCH-962 - 30-3/31-579-2 - zzp-2026031621p-rcqx-2-pH4.5jz-jf50z-p5-15min.lcd

方法文件名: RC\$PCH-962 - PCH-962-rcqx-tm-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$PCH-962 - 20260417-rcqx-FX280.lcb

样品瓶号: 2-39

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/04/17 17:22:04

处理时间(V2): 2026/04/18 15:33:38

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX280)

流 速:1.5ml/min


波 长: 230nm

版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 230nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.647	134472	100.000	14601	1949	1.099	--
总计		134472	100.000	14601			

图79 替米沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026031621批-pH4.5介质-浆法-50转-15min-片5
供试品溶液-1



PCH-962

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$PCH-962 - 30-3/31-580-2 - zzp-2026031621p-rcqx-2-pH4.5jz-jf50z-p6-15min.lcd

方法文件名: RC\$PCH-962 - PCH-962-rcqx-tm-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$PCH-962 - 20260417-rcqx-FX280.lcb

样品瓶号: 2-48

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/04/17 17:26:28

处理时间(V2): 2026/04/18 15:33:41

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX280)

流速:1.5ml/min


波长: 230nm

版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 230nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.647	152645	100.000	16559	1951	1.095	--
总计		152645	100.000	16559			

图80 替米沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026031621批-pH4.5介质-浆法-50转-15min-片6
供试品溶液-1



PCH-962

＜样品信息＞

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$PCH-962 - 30-3/31-581-2 - zzp-2026031621p-rcqx-2-pH4.5jz-jf50z-p1-20min.lcd

方法文件名: RC\$PCH-962 - PCH-962-rcqx-tm-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$PCH-962 - 20260417-rcqx-FX280.lcb

样品瓶号: 2-4

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/04/17 17:30:52

处理时间(V2): 2026/04/18 15:33:44

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX280)

流速:1.5ml/min


波长: 230nm

版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 230nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.648	160248	100.000	17373	1947	1.095	--
总计		160248	100.000	17373			

图81 替米沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026031621批-pH4.5介质-浆法-50转-20min-片1
供试品溶液-1



PCH-962

＜样品信息＞

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$PCH-962 - 30-3/31-582-2 - zzp-2026031621p-rcqx-2-pH4.5jz-jf50z-p2-20min.lcd

方法文件名: RC\$PCH-962 - PCH-962-rcqx-tm-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$PCH-962 - 20260417-rcqx-FX280.lcb

样品瓶号: 2-13

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/04/17 17:35:17

处理时间(V2): 2026/04/18 15:33:46

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX280)

流 速:1.5ml/min


波 长: 230nm

版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 230nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.647	171980	100.000	18656	1949	1.097	--
总计		171980	100.000	18656			

图82 替米沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026031621批-pH4.5介质-浆法-50转-20min-片2
供试品溶液-1



PCH-962

＜样品信息＞

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$PCH-962 - 30-3/31-583-2 - zzp-2026031621p-rcqx-2-pH4.5jz-jf50z-p3-20min.lcd

方法文件名: RC\$PCH-962 - PCH-962-rcqx-tm-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$PCH-962 - 20260417-rcqx-FX280.lcb

样品瓶号: 2-22

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/04/17 17:39:41

处理时间(V2): 2026/04/18 15:33:49

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX280)

流 速:1.5ml/min


波 长: 230nm

版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 230nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.647	161748	100.000	17523	1943	1.094	--
总计		161748	100.000	17523			

图83 替米沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026031621批-pH4.5介质-浆法-50转-20min-片3
供试品溶液-1



PCH-962

＜样品信息＞

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$PCH-962 - 30-3/31-584-2 - zzp-2026031621p-rcqx-2-pH4.5jz-jf50z-p4-20min.lcd

方法文件名: RC\$PCH-962 - PCH-962-rcqx-tm-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$PCH-962 - 20260417-rcqx-FX280.lcb

样品瓶号: 2-31

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/04/17 17:44:05

处理时间(V2): 2026/04/18 15:33:52

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX280)

流 速:1.5ml/min


波 长: 230nm

版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 230nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.648	157107	100.000	17063	1944	1.093	--
总计		157107	100.000	17063			

图84 替米沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026031621批-pH4.5介质-浆法-50转-20min-片4
供试品溶液-1



PCH-962

＜样品信息＞

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$PCH-962 - 30-3/31-585-2 - zzp-2026031621p-rcqx-2-pH4.5jz-jf50z-p5-20min.lcd

方法文件名: RC\$PCH-962 - PCH-962-rcqx-tm-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$PCH-962 - 20260417-rcqx-FX280.lcb

样品瓶号: 2-40

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/04/17 17:48:29

处理时间(V2): 2026/04/18 15:33:54

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX280)

流 速:1.5ml/min


波 长: 230nm

版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 230nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.648	157854	100.000	17039	1934	1.100	--
总计		157854	100.000	17039			

图85 替米沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026031621批-pH4.5介质-浆法-50转-20min-片5
供试品溶液-1



PCH-962

＜样品信息＞

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$PCH-962 - 30-3/31-586-2 - zzp-2026031621p-rcqx-2-pH4.5jz-jf50z-p6-20min.lcd

方法文件名: RC\$PCH-962 - PCH-962-rcqx-tm-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$PCH-962 - 20260417-rcqx-FX280.lcb

样品瓶号: 2-49

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/04/17 17:52:53

处理时间(V2): 2026/04/18 15:33:57

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX280)

流 速:1.5ml/min


波 长: 230nm

版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 230nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.648	177258	100.000	19179	1942	1.093	--
总计		177258	100.000	19179			

图86 替米沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026031621批-pH4.5介质-浆法-50转-20min-片6
供试品溶液-1



PCH-962

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$PCH-962 - 30-3/31-587-2 - zzp-2026031621p-rcqx-2-pH4.5jz-jf50z-p1-30min.lcd

方法文件名: RC\$PCH-962 - PCH-962-rcqx-tm-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$PCH-962 - 20260417-rcqx-FX280.lcb

样品瓶号: 2-5

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/04/17 17:57:18

处理时间(V2): 2026/04/18 15:34:00

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX280)

流速:1.5ml/min


波长: 230nm

版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 230nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.648	176618	100.000	19067	1939	1.096	--
总计		176618	100.000	19067			

图87 替米沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026031621批-pH4.5介质-浆法-50转-30min-片1
供试品溶液-1



PCH-962

＜样品信息＞

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$PCH-962 - 30-3/31-588-2 - zzp-2026031621p-rcqx-2-pH4.5jz-jf50z-p2-30min.lcd

方法文件名: RC\$PCH-962 - PCH-962-rcqx-tm-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$PCH-962 - 20260417-rcqx-FX280.lcb

样品瓶号: 2-14

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/04/17 18:01:42

处理时间(V2): 2026/04/18 15:34:03

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX280)

流 速:1.5ml/min


波 长: 230nm

版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 230nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.648	179554	100.000	19438	1942	1.096	--
总计		179554	100.000	19438			

图88 替米沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026031621批-pH4.5介质-浆法-50转-30min-片2
供试品溶液-1



PCH-962

＜样品信息＞

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$PCH-962 - 30-3/31-589-2 - zzp-2026031621p-rcqx-2-pH4.5jz-jf50z-p3-30min.lcd

方法文件名: RC\$PCH-962 - PCH-962-rcqx-tm-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$PCH-962 - 20260417-rcqx-FX280.lcb

样品瓶号: 2-23

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/04/17 18:06:06

处理时间(V2): 2026/04/18 15:34:06

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX280)

流 速:1.5ml/min


波 长: 230nm

版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 230nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.647	181232	100.000	19590	1937	1.096	--
总计		181232	100.000	19590			

图89 替米沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026031621批-pH4.5介质-浆法-50转-30min-片3
供试品溶液-1



PCH-962

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$PCH-962 - 30-3/31-590-2 - zzp-2026031621p-rcqx-2-pH4.5jz-jf50z-p4-30min.lcd

方法文件名: RC\$PCH-962 - PCH-962-rcqx-tm-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$PCH-962 - 20260417-rcqx-FX280.lcb

样品瓶号: 2-32

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/04/17 18:10:31

处理时间(V2): 2026/04/18 15:34:09

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX280)

流速:1.5ml/min


波长: 230nm

版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 230nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.647	176464	100.000	19080	1937	1.094	--
总计		176464	100.000	19080			

图90 替米沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026031621批-pH4.5介质-浆法-50转-30min-片4
供试品溶液-1



PCH-962

＜样品信息＞

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$PCH-962 - 30-3/31-591-2 - zzp-2026031621p-rcqx-2-pH4.5jz-jf50z-p5-30min.lcd

方法文件名: RC\$PCH-962 - PCH-962-rcqx-tm-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$PCH-962 - 20260417-rcqx-FX280.lcb

样品瓶号: 2-41

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/04/17 18:14:56

处理时间(V2): 2026/04/18 15:34:11

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX280)

流速:1.5ml/min


波长: 230nm

版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 230nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.647	183711	100.000	19887	1938	1.096	--
总计		183711	100.000	19887			

图91 替米沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026031621批-pH4.5介质-浆法-50转-30min-片5
供试品溶液-1




PCH-962

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-962 - 30-3/31-592-2 - zzp-2026031621p-rcqx-2-pH4.5jz-jf50z-p6-30min.lcd
方法文件名: RC\$PCH-962 - PCH-962-rcqx-tm-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-962 - 20260417-rcqx-FX280.lcb
样品瓶号: 2-50
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/04/17 18:19:20
处理时间(V2): 2026/04/18 15:34:14
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX280)

流 速:1.5ml/min
波 长: 230nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 230nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.647	192006	100.000	20766	1937	1.094	--
总计		192006	100.000	20766			

图92 替米沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026031621批-pH4.5介质-浆法-50转-30min-片6
供试品溶液-1



PCH-962

＜样品信息＞

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$PCH-962 - 30-3/31-593-2 - zzp-2026031621p-rcqx-2-pH4.5jz-jf50z-p1-45min.lcd

方法文件名: RC\$PCH-962 - PCH-962-rcqx-tm-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$PCH-962 - 20260417-rcqx-FX280.lcb

样品瓶号: 2-6

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/04/17 18:23:44

处理时间(V2): 2026/04/18 15:34:17

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX280)

流速:1.5ml/min


波长: 230nm

版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 230nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.648	188692	100.000	20375	1934	1.095	--
总计		188692	100.000	20375			

图93 替米沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026031621批-pH4.5介质-浆法-50转-45min-片1
供试品溶液-1




PCH-962

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-962 - 30-3/31-594-2 - zzp-2026031621p-rcqx-2-pH4.5jz-jf50z-p2-45min.lcd
方法文件名: RC\$PCH-962 - PCH-962-rcqx-tm-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-962 - 20260417-rcqx-FX280.lcb
样品瓶号: 2-15
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/04/17 18:28:09
处理时间(V2): 2026/04/18 15:34:19
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX280)

流 速:1.5ml/min
波 长: 230nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 230nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.647	188308	100.000	20331	1936	1.093	--
总计		188308	100.000	20331			

图94 替米沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026031621批-pH4.5介质-浆法-50转-45min-片2
供试品溶液-1



PCH-962

＜样品信息＞

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$PCH-962 - 30-3/31-595-2 - zzp-2026031621p-rcqx-2-pH4.5jz-jf50z-p3-45min.lcd

方法文件名: RC\$PCH-962 - PCH-962-rcqx-tm-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$PCH-962 - 20260417-rcqx-FX280.lcb

样品瓶号: 2-24

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/04/17 18:32:33

处理时间(V2): 2026/04/18 15:34:22

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX280)

流 速:1.5ml/min


波 长: 230nm

版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 230nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.648	185699	100.000	20079	1933	1.093	--
总计		185699	100.000	20079			

图95 替米沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026031621批-pH4.5介质-浆法-50转-45min-片3
供试品溶液-1



PCH-962

＜样品信息＞

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$PCH-962 - 30-3/31-596-2 - zzp-2026031621p-rcqx-2-pH4.5jz-jf50z-p4-45min.lcd

方法文件名: RC\$PCH-962 - PCH-962-rcqx-tm-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$PCH-962 - 20260417-rcqx-FX280.lcb

样品瓶号: 2-33

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/04/17 18:36:58

处理时间(V2): 2026/04/18 15:34:25

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX280)

流速:1.5ml/min


波长: 230nm

版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 230nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.648	187674	100.000	20187	1924	1.102	--
总计		187674	100.000	20187			

图96 替米沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026031621批-pH4.5介质-浆法-50转-45min-片4
供试品溶液-1



PCH-962

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$PCH-962 - 30-3/31-597-2 - zzp-2026031621p-rcqx-2-pH4.5jz-jf50z-p5-45min.lcd

方法文件名: RC\$PCH-962 - PCH-962-rcqx-tm-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$PCH-962 - 20260417-rcqx-FX280.lcb

样品瓶号: 2-42

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/04/17 18:41:23

处理时间(V2): 2026/04/18 15:34:28

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX280)

流 速:1.5ml/min


波 长: 230nm

版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 230nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.648	190600	100.000	20572	1931	1.093	--
总计		190600	100.000	20572			

图97 替米沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026031621批-pH4.5介质-浆法-50转-45min-片5
供试品溶液-1



PCH-962

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$PCH-962 - 30-3/31-598-2 - zzp-2026031621p-rcqx-2-pH4.5jz-jf50z-p6-45min.lcd

方法文件名: RC\$PCH-962 - PCH-962-rcqx-tm-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$PCH-962 - 20260417-rcqx-FX280.lcb

样品瓶号: 2-51

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/04/17 18:45:47

处理时间(V2): 2026/04/18 15:34:30

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX280)

流 速:1.5ml/min


波 长: 230nm

版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 230nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.647	192356	100.000	20766	1931	1.092	--
总计		192356	100.000	20766			

图98 替米沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026031621批-pH4.5介质-浆法-50转-45min-片6
供试品溶液-1



PCH-962

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$PCH-962 - 30-3/31-599-2 - zzp-2026031621p-rcqx-2-pH4.5jz-jf50z-p1-60min.lcd

方法文件名: RC\$PCH-962 - PCH-962-rcqx-tm-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$PCH-962 - 20260417-rcqx-FX280.lcb

样品瓶号: 2-7

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/04/17 18:50:12

处理时间(V2): 2026/04/18 15:34:33

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX280)

流速:1.5ml/min


波长: 230nm

版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 230nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.648	190067	100.000	20512	1931	1.092	--
总计		190067	100.000	20512			

图99 替米沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026031621批-pH4.5介质-浆法-50转-60min-片1
供试品溶液-1



PCH-962

＜样品信息＞

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$PCH-962 - 30-3/31-600-2 - zzp-2026031621p-rcqx-2-pH4.5jz-jf50z-p2-60min.lcd

方法文件名: RC\$PCH-962 - PCH-962-rcqx-tm-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$PCH-962 - 20260417-rcqx-FX280.lcb

样品瓶号: 2-16

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/04/17 18:54:37

处理时间(V2): 2026/04/18 15:34:36

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX280)

流速:1.5ml/min


波长: 230nm

版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 230nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.648	190725	100.000	20586	1928	1.090	--
总计		190725	100.000	20586			

图100 替米沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026031621批-pH4.5介质-浆法-50转-60min-片2
供试品溶液-1



PCH-962

＜样品信息＞

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$PCH-962 - 30-3/31-601-2 - zzp-2026031621p-rcqx-2-pH4.5jz-jf50z-p3-60min.lcd

方法文件名: RC\$PCH-962 - PCH-962-rcqx-tm-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$PCH-962 - 20260417-rcqx-FX280.lcb

样品瓶号: 2-25

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/04/17 18:59:01

处理时间(V2): 2026/04/18 15:34:38

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX280)

流速:1.5ml/min


波长: 230nm

版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 230nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.649	192773	100.000	20787	1932	1.093	--
总计		192773	100.000	20787			

图101 替米沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026031621批-pH4.5介质-浆法-50转-60min-片3
供试品溶液-1



PCH-962

＜样品信息＞

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$PCH-962 - 30-3/31-602-2 - zzp-2026031621p-rcqx-2-pH4.5jz-jf50z-p4-60min.lcd

方法文件名: RC\$PCH-962 - PCH-962-rcqx-tm-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$PCH-962 - 20260417-rcqx-FX280.lcb

样品瓶号: 2-34

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/04/17 19:03:26

处理时间(V2): 2026/04/18 15:34:41

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX280)

流速:1.5ml/min


波长: 230nm

版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 230nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.649	189174	100.000	20401	1931	1.095	--
总计		189174	100.000	20401			

图102 替米沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026031621批-pH4.5介质-浆法-50转-60min-片4
供试品溶液-1



PCH-962

＜样品信息＞

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$PCH-962 - 30-3/31-603-2 - zzp-2026031621p-rcqx-2-pH4.5jz-jf50z-p5-60min.lcd

方法文件名: RC\$PCH-962 - PCH-962-rcqx-tm-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$PCH-962 - 20260417-rcqx-FX280.lcb

样品瓶号: 2-43

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/04/17 19:07:50

处理时间(V2): 2026/04/18 15:34:44

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX280)

流 速:1.5ml/min


波 长: 230nm

版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 230nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.650	185117	100.000	19975	1934	1.091	--
总计		185117	100.000	19975			

图103 替米沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026031621批-pH4.5介质-浆法-50转-60min-片5
供试品溶液-1



PCH-962

＜样品信息＞

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$PCH-962 - 30-3/31-604-2 - zzp-2026031621p-rcqx-2-pH4.5jz-jf50z-p6-60min.lcd

方法文件名: RC\$PCH-962 - PCH-962-rcqx-tm-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$PCH-962 - 20260417-rcqx-FX280.lcb

样品瓶号: 2-52

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/04/17 19:12:15

处理时间(V2): 2026/04/18 15:34:47

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX280)

流 速:1.5ml/min


波 长: 230nm

版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 230nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.648	191755	100.000	20667	1927	1.095	--
总计		191755	100.000	20667			

图104 替米沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026031621批-pH4.5介质-浆法-50转-60min-片6
供试品溶液-1



PCH-962

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$PCH-962 - 30-3/31-605-2 - zzp-2026031621p-rcqx-2-pH4.5jz-jf50z-p1-jx.lcd

方法文件名: RC\$PCH-962 - PCH-962-rcqx-tm-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$PCH-962 - 20260417-rcqx-FX280.lcb

样品瓶号: 2-8

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/04/17 19:16:40

处理时间(V2): 2026/04/18 15:34:49

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX280)

流 速:1.5ml/min


波 长: 230nm

版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 230nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.649	190364	100.000	20496	1928	1.091	--
总计		190364	100.000	20496			

图105 替米沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026031621批-pH4.5介质-桨法-50转-极限转速-片1
供试品溶液-1




PCH-962

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-962 - 30-3/31-606-2 - zzp-2026031621p-rcqx-2-pH4.5jz-jf50z-p2-jx.lcd
方法文件名: RC\$PCH-962 - PCH-962-rcqx-tm-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-962 - 20260417-rcqx-FX280.lcb
样品瓶号: 2-17
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/04/17 19:21:03
处理时间(V2): 2026/04/18 15:34:52
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX280)

流 速:1.5ml/min
波 长: 230nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 230nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.649	197170	100.000	21241	1929	1.092	--
总计		197170	100.000	21241			

图106 替米沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026031621批-pH4.5介质-桨法-50转-极限转速-片2
供试品溶液-1



PCH-962

＜样品信息＞

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$PCH-962 - 30-3/31-607-2 - zzp-2026031621p-rcqx-2-pH4.5jz-jf50z-p3-jx.lcd

方法文件名: RC\$PCH-962 - PCH-962-rcqx-tm-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$PCH-962 - 20260417-rcqx-FX280.lcb

样品瓶号: 2-26

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/04/17 19:25:28

处理时间(V2): 2026/04/18 15:34:55

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX280)

流速:1.5ml/min


波长: 230nm

版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 230nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.650	195845	100.000	21049	1926	1.092	--
总计		195845	100.000	21049			

图107 替米沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026031621批-pH4.5介质-桨法-50转-极限转速-片3
供试品溶液-1



PCH-962

＜样品信息＞

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$PCH-962 - 30-3/31-608-2 - zzp-2026031621p-rcqx-2-pH4.5jz-jf50z-p4-jx.lcd

方法文件名: RC\$PCH-962 - PCH-962-rcqx-tm-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$PCH-962 - 20260417-rcqx-FX280.lcb

样品瓶号: 2-35

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/04/17 19:29:54

处理时间(V2): 2026/04/18 15:34:57

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX280)

流速:1.5ml/min


波长: 230nm

版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 230nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.650	196279	100.000	21117	1923	1.094	--
总计		196279	100.000	21117			

图108 替米沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026031621批-pH4.5介质-桨法-50转-极限转速-片4
供试品溶液-1



PCH-962

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$PCH-962 - 30-3/31-609-2 - zzp-2026031621p-rcqx-2-pH4.5jz-jf50z-p5-jx.lcd

方法文件名: RC\$PCH-962 - PCH-962-rcqx-tm-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$PCH-962 - 20260417-rcqx-FX280.lcb

样品瓶号: 2-44

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/04/17 19:34:19

处理时间(V2): 2026/04/18 15:35:00

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX280)

流速:1.5ml/min


波长: 230nm

版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 230nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.649	193127	100.000	20786	1927	1.093	--
总计		193127	100.000	20786			

图109 替米沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026031621批-pH4.5介质-桨法-50转-极限转速-片5
供试品溶液-1



PCH-962

＜样品信息＞

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$PCH-962 - 30-3/31-610-2 - zzp-2026031621p-rcqx-2-pH4.5jz-jf50z-p6-jx.lcd

方法文件名: RC\$PCH-962 - PCH-962-rcqx-tm-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$PCH-962 - 20260417-rcqx-FX280.lcb

样品瓶号: 2-53

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/04/17 19:38:44

处理时间(V2): 2026/04/18 15:35:03

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX280)

流速:1.5ml/min


波长: 230nm

版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 230nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.649	190100	100.000	20372	1914	1.097	--
总计		190100	100.000	20372			

图110 替米沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026031621批-pH4.5介质-桨法-50转-极限转速-片6
供试品溶液-1




PCH-962

＜样品信息＞

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-962 - 30-3/31-611-2 - zzp-2026031621p-rcqx-2-pH4.5jz-jf50z-dz2-1.lcd
方法文件名: RC\$PCH-962 - PCH-962-rcqx-tm-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-962 - 20260417-rcqx-FX280.lcb
样品瓶号: 2-27
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/04/17 19:43:09
处理时间(V2): 2026/04/18 15:35:06
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX280)

流 速:1.5ml/min
波 长: 230nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 230nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.640	730117	100.000	76976	1835	1.099	--
总计		730117	100.000	76976			

图111 替米沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026031621批-pH4.5介质-桨法-50转
对照品溶液-2-1



PCH-962

＜样品信息＞

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$PCH-962 - 30-3/31-612-2 - zzp-2026031621p-rcqx-2-pH4.5jz-jf50z-dz2-2.lcd

方法文件名: RC\$PCH-962 - PCH-962-rcqx-tm-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$PCH-962 - 20260417-rcqx-FX280.lcb

样品瓶号: 2-27

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/04/17 19:47:33

处理时间(V2): 2026/04/18 15:35:09

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX280)

流速:1.5ml/min


波长: 230nm

版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 230nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.639	730022	100.000	76970	1834	1.099	--
总计		730022	100.000	76970			

图112 替米沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026031621批-pH4.5介质-桨法-50转
对照品溶液-2-2



PCH-962

＜样品信息＞

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$PCH-962 - 30-3/31-613-2 - zzp-2026031821p-rcqx-1-pH4.5jz-jf50z-rj.lcd

方法文件名: RC\$PCH-962 - PCH-962-rcqx-tm-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$PCH-962 - 20260417-rcqx-FX280.lcb

样品瓶号: 3-9

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/04/17 19:51:56

处理时间(V2): 2026/04/18 15:35:13

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX280)

流 速:1.5ml/min


波 长: 230nm

版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 230nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图113 替米沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026031821批-pH4.5介质-桨法-50转
溶剂



PCH-962

＜样品信息＞

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$PCH-962 - 30-3/31-614-2 - zzp-2026031821p-rcqx-1-pH4.5jz-jf50z-dz1-1.lcd

方法文件名: RC\$PCH-962 - PCH-962-rcqx-tm-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$PCH-962 - 20260417-rcqx-FX280.lcb

样品瓶号: 3-18

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/04/17 19:56:19

处理时间(V2): 2026/04/18 15:35:15

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX280)

流 速:1.5ml/min


波 长: 230nm

版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 230nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.640	730273	100.000	76902	1830	1.098	--
总计		730273	100.000	76902			

图114 替米沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026031821批-pH4.5介质-桨法-50转
对照品溶液-1-1



PCH-962

＜样品信息＞

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$PCH-962 - 30-3/31-615-2 - zzp-2026031821p-rcqx-1-pH4.5jz-jf50z-dz1-2.lcd

方法文件名: RC\$PCH-962 - PCH-962-rcqx-tm-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$PCH-962 - 20260417-rcqx-FX280.lcb

样品瓶号: 3-18

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/04/17 20:00:43

处理时间(V2): 2026/04/18 15:35:18

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX280)

流速:1.5ml/min


波长: 230nm

版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 230nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.640	724676	100.000	76322	1833	1.098	--
总计		724676	100.000	76322			

图115 替米沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026031821批-pH4.5介质-桨法-50转
对照品溶液-1-2



PCH-962

＜样品信息＞

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$PCH-962 - 30-3/31-616-2 - zzp-2026031821p-rcqx-1-pH4.5jz-jf50z-dz1-3.lcd

方法文件名: RC\$PCH-962 - PCH-962-rcqx-tm-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$PCH-962 - 20260417-rcqx-FX280.lcb

样品瓶号: 3-18

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/04/17 20:05:07

处理时间(V2): 2026/04/18 15:35:21

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX280)

流 速:1.5ml/min


波 长: 230nm

版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 230nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.640	726129	100.000	76428	1829	1.098	--
总计		726129	100.000	76428			

图116 替米沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026031821批-pH4.5介质-桨法-50转
对照品溶液-1-3



PCH-962

＜样品信息＞

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$PCH-962 - 30-3/31-617-2 - zzp-2026031821p-rcqx-1-pH4.5jz-jf50z-dz1-4.lcd

方法文件名: RC\$PCH-962 - PCH-962-rcqx-tm-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$PCH-962 - 20260417-rcqx-FX280.lcb

样品瓶号: 3-18

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/04/17 20:09:30

处理时间(V2): 2026/04/18 15:35:24

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX280)

流速:1.5ml/min


波长: 230nm

版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 230nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.639	727613	100.000	76628	1829	1.098	--
总计		727613	100.000	76628			

图117 替米沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026031821批-pH4.5介质-桨法-50转
对照品溶液-1-4



PCH-962

＜样品信息＞

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$PCH-962 - 30-3/31-618-2 - zzp-2026031821p-rcqx-1-pH4.5jz-jf50z-dz1-5.lcd

方法文件名: RC\$PCH-962 - PCH-962-rcqx-tm-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$PCH-962 - 20260417-rcqx-FX280.lcb

样品瓶号: 3-18

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/04/17 20:13:53

处理时间(V2): 2026/04/18 15:35:27

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX280)

流速:1.5ml/min


波长: 230nm

版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 230nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.638	725976	100.000	76436	1824	1.097	--
总计		725976	100.000	76436			

图118 替米沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026031821批-pH4.5介质-桨法-50转
对照品溶液-1-5



PCH-962

＜样品信息＞

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$PCH-962 - 30-3/31-619-2 - zzp-2026031821p-rcqx-1-pH4.5jz-jf50z-p1-5min.lcd

方法文件名: RC\$PCH-962 - PCH-962-rcqx-tm-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$PCH-962 - 20260417-rcqx-FX280.lcb

样品瓶号: 3-1

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/04/17 20:18:16

处理时间(V2): 2026/04/18 15:35:30

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX280)

流 速:1.5ml/min


波 长: 230nm

版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 230nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.650	95406	100.000	10275	1926	1.089	--
总计		95406	100.000	10275			

图119 替米沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026031821批-pH4.5介质-桨法-50转-5min-片1
供试品溶液-1



PCH-962

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$PCH-962 - 30-3/31-620-2 - zzp-2026031821p-rcqx-1-pH4.5jz-jf50z-p2-5min.lcd

方法文件名: RC\$PCH-962 - PCH-962-rcqx-tm-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$PCH-962 - 20260417-rcqx-FX280.lcb

样品瓶号: 3-10

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/04/17 20:22:39

处理时间(V2): 2026/04/18 15:35:32

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX280)

流速:1.5ml/min


波长: 230nm

版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 230nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.651	103511	100.000	11115	1926	1.090	--
总计		103511	100.000	11115			

图120 替米沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026031821批-pH4.5介质-桨法-50转-5min-片2
供试品溶液-1



PCH-962

＜样品信息＞

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$PCH-962 - 30-3/31-621-2 - zzp-2026031821p-rcqx-1-pH4.5jz-jf50z-p3-5min.lcd

方法文件名: RC\$PCH-962 - PCH-962-rcqx-tm-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$PCH-962 - 20260417-rcqx-FX280.lcb

样品瓶号: 3-19

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/04/17 20:27:02

处理时间(V2): 2026/04/18 15:35:35

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX280)

流 速:1.5ml/min


波 长: 230nm

版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 230nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.650	94667	100.000	10194	1927	1.090	--
总计		94667	100.000	10194			

图121 替米沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026031821批-pH4.5介质-桨法-50转-5min-片3
供试品溶液-1



PCH-962

＜样品信息＞

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$PCH-962 - 30-3/31-622-2 - zzp-2026031821p-rcqx-1-pH4.5jz-jf50z-p4-5min.lcd

方法文件名: RC\$PCH-962 - PCH-962-rcqx-tm-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$PCH-962 - 20260417-rcqx-FX280.lcb

样品瓶号: 3-28

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/04/17 20:31:24

处理时间(V2): 2026/04/18 15:35:38

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX280)

流 速:1.5ml/min


波 长: 230nm

版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 230nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.651	89743	100.000	9635	1917	1.089	--
总计		89743	100.000	9635			

图122 替米沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026031821批-pH4.5介质-桨法-50转-5min-片4
供试品溶液-1



PCH-962

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$PCH-962 - 30-3/31-623-2 - zzp-2026031821p-rcqx-1-pH4.5jz-jf50z-p5-5min.lcd

方法文件名: RC\$PCH-962 - PCH-962-rcqx-tm-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$PCH-962 - 20260417-rcqx-FX280.lcb

样品瓶号: 3-37

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/04/17 20:35:47

处理时间(V2): 2026/04/18 15:35:41

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX280)

流速:1.5ml/min


波长: 230nm

版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 230nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.651	89997	100.000	9674	1927	1.090	--
总计		89997	100.000	9674			

图123 替米沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026031821批-pH4.5介质-桨法-50转-5min-片5
供试品溶液-1



PCH-962

＜样品信息＞

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$PCH-962 - 30-3/31-624-2 - zzp-2026031821p-rcqx-1-pH4.5jz-jf50z-p6-5min.lcd

方法文件名: RC\$PCH-962 - PCH-962-rcqx-tm-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$PCH-962 - 20260417-rcqx-FX280.lcb

样品瓶号: 3-46

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/04/17 20:40:10

处理时间(V2): 2026/04/18 15:35:43

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX280)

流 速:1.5ml/min


波 长: 230nm

版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 230nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.651	89032	100.000	9561	1919	1.088	--
总计		89032	100.000	9561			

图124 替米沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026031821批-pH4.5介质-桨法-50转-5min-片6
供试品溶液-1



PCH-962

＜样品信息＞

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$PCH-962 - 30-3/31-625-2 - zzp-2026031821p-rcqx-1-pH4.5jz-jf50z-p1-10min.lcd

方法文件名: RC\$PCH-962 - PCH-962-rcqx-tm-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$PCH-962 - 20260417-rcqx-FX280.lcb

样品瓶号: 3-2

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/04/17 20:44:32

处理时间(V2): 2026/04/18 15:35:46

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX280)

流 速:1.5ml/min


波 长: 230nm

版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 230nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.650	135028	100.000	14483	1913	1.087	--
总计		135028	100.000	14483			

图125 替米沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026031821批-pH4.5介质-浆法-50转-10min-片1
供试品溶液-1



PCH-962

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$PCH-962 - 30-3/31-626-2 - zzp-2026031821p-rcqx-1-pH4.5jz-jf50z-p2-10min.lcd

方法文件名: RC\$PCH-962 - PCH-962-rcqx-tm-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$PCH-962 - 20260417-rcqx-FX280.lcb

样品瓶号: 3-11

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/04/17 20:48:54

处理时间(V2): 2026/04/18 15:35:49

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX280)

流 速:1.5ml/min


波 长: 230nm

版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 230nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.651	143648	100.000	15402	1915	1.086	--
总计		143648	100.000	15402			

图126 替米沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026031821批-pH4.5介质-浆法-50转-10min-片2
供试品溶液-1



PCH-962

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$PCH-962 - 30-3/31-627-2 - zzp-2026031821p-rcqx-1-pH4.5jz-jf50z-p3-10min.lcd

方法文件名: RC\$PCH-962 - PCH-962-rcqx-tm-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$PCH-962 - 20260417-rcqx-FX280.lcb

样品瓶号: 3-20

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/04/17 20:53:17

处理时间(V2): 2026/04/18 15:35:52

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX280)

流 速:1.5ml/min


波 长: 230nm

版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 230nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.650	123685	100.000	13311	1921	1.084	--
总计		123685	100.000	13311			

图127 替米沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026031821批-pH4.5介质-浆法-50转-10min-片3
供试品溶液-1




PCH-962

＜样品信息＞

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-962 - 30-3/31-628-2 - zzp-2026031821p-rcqx-1-pH4.5jz-jf50z-p4-10min.lcd
方法文件名: RC\$PCH-962 - PCH-962-rcqx-tm-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-962 - 20260417-rcqx-FX280.lcb
样品瓶号: 3-29
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/04/17 20:57:40
处理时间(V2): 2026/04/18 15:35:55
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX280)

流 速:1.5ml/min
波 长: 230nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 230nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.650	132176	100.000	14163	1910	1.090	--
总计		132176	100.000	14163			

图128 替米沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026031821批-pH4.5介质-浆法-50转-10min-片4
供试品溶液-1



PCH-962

＜样品信息＞

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$PCH-962 - 30-3/31-629-2 - zzp-2026031821p-rcqx-1-pH4.5jz-jf50z-p5-10min.lcd

方法文件名: RC\$PCH-962 - PCH-962-rcqx-tm-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$PCH-962 - 20260417-rcqx-FX280.lcb

样品瓶号: 3-38

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/04/17 21:02:03

处理时间(V2): 2026/04/18 15:35:58

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX280)

流速:1.5ml/min


波长: 230nm

版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 230nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.651	108722	100.000	11685	1914	1.083	--
总计		108722	100.000	11685			

图129 替米沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026031821批-pH4.5介质-浆法-50转-10min-片5
供试品溶液-1



PCH-962

＜样品信息＞

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$PCH-962 - 30-3/31-630-2 - zzp-2026031821p-rcqx-1-pH4.5jz-jf50z-p6-10min.lcd

方法文件名: RC\$PCH-962 - PCH-962-rcqx-tm-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$PCH-962 - 20260417-rcqx-FX280.lcb

样品瓶号: 3-47

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/04/17 21:06:26

处理时间(V2): 2026/04/18 15:36:01

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX280)

流 速:1.5ml/min


波 长: 230nm

版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 230nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.652	119291	100.000	12787	1908	1.088	--
总计		119291	100.000	12787			

图130 替米沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026031821批-pH4.5介质-浆法-50转-10min-片6
供试品溶液-1



PCH-962

＜样品信息＞

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$PCH-962 - 30-3/31-631-2 - zzp-2026031821p-rcqx-1-pH4.5jz-jf50z-p1-15min.lcd

方法文件名: RC\$PCH-962 - PCH-962-rcqx-tm-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$PCH-962 - 20260417-rcqx-FX280.lcb

样品瓶号: 3-3

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/04/17 21:10:49

处理时间(V2): 2026/04/18 15:36:03

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX280)

流 速:1.5ml/min


波 长: 230nm

版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 230nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.652	165437	100.000	17772	1910	1.087	--
总计		165437	100.000	17772			

图131 替米沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026031821批-pH4.5介质-浆法-50转-15min-片1
供试品溶液-1



PCH-962

＜样品信息＞

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$PCH-962 - 30-3/31-632-2 - zzp-2026031821p-rcqx-1-pH4.5jz-jf50z-p2-15min.lcd

方法文件名: RC\$PCH-962 - PCH-962-rcqx-tm-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$PCH-962 - 20260417-rcqx-FX280.lcb

样品瓶号: 3-12

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/04/17 21:15:11

处理时间(V2): 2026/04/18 15:36:06

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX280)

流速:1.5ml/min


波长: 230nm

版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 230nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.652	158747	100.000	16976	1908	1.090	--
总计		158747	100.000	16976			

图132 替米沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026031821批-pH4.5介质-浆法-50转-15min-片2
供试品溶液-1



PCH-962

＜样品信息＞

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$PCH-962 - 30-3/31-633-2 - zzp-2026031821p-rcqx-1-pH4.5jz-jf50z-p3-15min.lcd

方法文件名: RC\$PCH-962 - PCH-962-rcqx-tm-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$PCH-962 - 20260417-rcqx-FX280.lcb

样品瓶号: 3-21

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/04/17 21:19:35

处理时间(V2): 2026/04/18 15:36:09

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX280)

流速:1.5ml/min


波长: 230nm

版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 230nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.652	158366	100.000	16994	1919	1.083	--
总计		158366	100.000	16994			

图133 替米沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026031821批-pH4.5介质-浆法-50转-15min-片3
供试品溶液-1



PCH-962

＜样品信息＞

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$PCH-962 - 30-3/31-634-2 - zzp-2026031821p-rcqx-1-pH4.5jz-jf50z-p4-15min.lcd

方法文件名: RC\$PCH-962 - PCH-962-rcqx-tm-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$PCH-962 - 20260417-rcqx-FX280.lcb

样品瓶号: 3-30

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/04/17 21:23:57

处理时间(V2): 2026/04/18 15:36:12

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX280)

流 速:1.5ml/min


波 长: 230nm

版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 230nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.650	159607	100.000	17098	1906	1.086	--
总计		159607	100.000	17098			

图134 替米沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026031821批-pH4.5介质-浆法-50转-15min-片4
供试品溶液-1



PCH-962

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$PCH-962 - 30-3/31-635-2 - zzp-2026031821p-rcqx-1-pH4.5jz-jf50z-p5-15min.lcd

方法文件名: RC\$PCH-962 - PCH-962-rcqx-tm-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$PCH-962 - 20260417-rcqx-FX280.lcb

样品瓶号: 3-39

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/04/17 21:28:19

处理时间(V2): 2026/04/18 15:36:15

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX280)

流速:1.5ml/min


波长: 230nm

版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 230nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.652	134131	100.000	14396	1911	1.080	--
总计		134131	100.000	14396			

图135 替米沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026031821批-pH4.5介质-浆法-50转-15min-片5
供试品溶液-1



PCH-962

＜样品信息＞

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$PCH-962 - 30-3/31-636-2 - zzp-2026031821p-rcqx-1-pH4.5jz-jf50z-p6-15min.lcd

方法文件名: RC\$PCH-962 - PCH-962-rcqx-tm-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$PCH-962 - 20260417-rcqx-FX280.lcb

样品瓶号: 3-48

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/04/17 21:32:41

处理时间(V2): 2026/04/18 15:36:18

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX280)

流 速:1.5ml/min


波 长: 230nm

版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 230nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.652	159430	100.000	17133	1913	1.083	--
总计		159430	100.000	17133			

图136 替米沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026031821批-pH4.5介质-浆法-50转-15min-片6
供试品溶液-1



PCH-962

＜样品信息＞

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$PCH-962 - 30-3/31-637-2 - zzp-2026031821p-rcqx-1-pH4.5jz-jf50z-p1-20min.lcd

方法文件名: RC\$PCH-962 - PCH-962-rcqx-tm-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$PCH-962 - 20260417-rcqx-FX280.lcb

样品瓶号: 3-4

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/04/17 21:37:04

处理时间(V2): 2026/04/18 15:36:21

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX280)

流 速:1.5ml/min


波 长: 230nm

版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 230nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.652	186057	100.000	19914	1911	1.082	--
总计		186057	100.000	19914			

图137 替米沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026031821批-pH4.5介质-浆法-50转-20min-片1
供试品溶液-1




PCH-962

＜样品信息＞

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-962 - 30-3/31-638-2 - zzp-2026031821p-rcqx-1-pH4.5jz-jf50z-p2-20min.lcd
方法文件名: RC\$PCH-962 - PCH-962-rcqx-tm-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-962 - 20260417-rcqx-FX280.lcb
样品瓶号: 3-13
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/04/17 21:41:26
处理时间(V2): 2026/04/18 15:36:23
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX280)

流 速:1.5ml/min
波 长: 230nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 230nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.651	181100	100.000	19387	1909	1.085	--
总计		181100	100.000	19387			

图138 替米沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026031821批-pH4.5介质-浆法-50转-20min-片2
供试品溶液-1




PCH-962

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-962 - 30-3/31-639-2 - zzp-2026031821p-rcqx-1-pH4.5jz-jf50z-p3-20min.lcd
方法文件名: RC\$PCH-962 - PCH-962-rcqx-tm-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-962 - 20260417-rcqx-FX280.lcb
样品瓶号: 3-22
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/04/17 21:45:49
处理时间(V2): 2026/04/18 15:36:26
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX280)

流 速:1.5ml/min
波 长: 230nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 230nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.652	175390	100.000	18732	1909	1.086	--
总计		175390	100.000	18732			

图139 替米沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026031821批-pH4.5介质-浆法-50转-20min-片3
供试品溶液-1




PCH-962

＜样品信息＞

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-962 - 30-3/31-640-2 - zzp-2026031821p-rcqx-1-pH4.5jz-jf50z-p4-20min.lcd
方法文件名: RC\$PCH-962 - PCH-962-rcqx-tm-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-962 - 20260417-rcqx-FX280.lcb
样品瓶号: 3-31
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/04/17 21:50:11
处理时间(V2): 2026/04/18 15:36:29
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX280)

流 速:1.5ml/min
波 长: 230nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 230nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.651	176504	100.000	18892	1911	1.086	--
总计		176504	100.000	18892			

图140 替米沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026031821批-pH4.5介质-浆法-50转-20min-片4
供试品溶液-1



PCH-962

＜样品信息＞

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$PCH-962 - 30-3/31-641-2 - zzp-2026031821p-rcqx-1-pH4.5jz-jf50z-p5-20min.lcd

方法文件名: RC\$PCH-962 - PCH-962-rcqx-tm-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$PCH-962 - 20260417-rcqx-FX280.lcb

样品瓶号: 3-40

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/04/17 21:54:33

处理时间(V2): 2026/04/18 15:36:32

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX280)

流 速:1.5ml/min


波 长: 230nm

版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 230nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.653	154524	100.000	16561	1903	1.085	--
总计		154524	100.000	16561			

图141 替米沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026031821批-pH4.5介质-浆法-50转-20min-片5
供试品溶液-1



PCH-962

＜样品信息＞

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$PCH-962 - 30-3/31-642-2 - zzp-2026031821p-rcqx-1-pH4.5jz-jf50z-p6-20min.lcd

方法文件名: RC\$PCH-962 - PCH-962-rcqx-tm-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$PCH-962 - 20260417-rcqx-FX280.lcb

样品瓶号: 3-49

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/04/17 21:58:57

处理时间(V2): 2026/04/18 15:36:35

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX280)

流速:1.5ml/min


波长: 230nm

版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 230nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.652	184308	100.000	19631	1898	1.092	--
总计		184308	100.000	19631			

图142 替米沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026031821批-pH4.5介质-浆法-50转-20min-片6
供试品溶液-1



PCH-962

＜样品信息＞

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$PCH-962 - 30-3/31-643-2 - zzp-2026031821p-rcqx-1-pH4.5jz-jf50z-p1-30min.lcd

方法文件名: RC\$PCH-962 - PCH-962-rcqx-tm-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$PCH-962 - 20260417-rcqx-FX280.lcb

样品瓶号: 3-5

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/04/17 22:03:19

处理时间(V2): 2026/04/18 15:36:38

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX280)

流 速:1.5ml/min


波 长: 230nm

版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 230nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.652	195449	100.000	20847	1900	1.088	--
总计		195449	100.000	20847			

图143 替米沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026031821批-pH4.5介质-浆法-50转-30min-片1
供试品溶液-1



PCH-962

＜样品信息＞

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$PCH-962 - 30-3/31-644-2 - zzp-2026031821p-rcqx-1-pH4.5jz-jf50z-p2-30min.lcd

方法文件名: RC\$PCH-962 - PCH-962-rcqx-tm-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$PCH-962 - 20260417-rcqx-FX280.lcb

样品瓶号: 3-14

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/04/17 22:07:42

处理时间(V2): 2026/04/18 15:36:41

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX280)

流速:1.5ml/min


波长: 230nm

版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 230nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.651	195876	100.000	20902	1901	1.086	--
总计		195876	100.000	20902			

图144 替米沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026031821批-pH4.5介质-浆法-50转-30min-片2
供试品溶液-1



PCH-962

＜样品信息＞

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$PCH-962 - 30-3/31-645-2 - zzp-2026031821p-rcqx-1-pH4.5jz-jf50z-p3-30min.lcd

方法文件名: RC\$PCH-962 - PCH-962-rcqx-tm-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$PCH-962 - 20260417-rcqx-FX280.lcb

样品瓶号: 3-23

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/04/17 22:12:05

处理时间(V2): 2026/04/18 15:36:44

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX280)

流 速:1.5ml/min


波 长: 230nm

版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 230nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.652	183917	100.000	19640	1900	1.087	--
总计		183917	100.000	19640			

图145 替米沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026031821批-pH4.5介质-浆法-50转-30min-片3
供试品溶液-1



PCH-962

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$PCH-962 - 30-3/31-646-2 - zzp-2026031821p-rcqx-1-pH4.5jz-jf50z-p4-30min.lcd

方法文件名: RC\$PCH-962 - PCH-962-rcqx-tm-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$PCH-962 - 20260417-rcqx-FX280.lcb

样品瓶号: 3-32

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/04/17 22:16:27

处理时间(V2): 2026/04/18 15:36:47

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX280)

流速:1.5ml/min


波长: 230nm

版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 230nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.652	189701	100.000	20239	1902	1.082	--
总计		189701	100.000	20239			

图146 替米沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026031821批-pH4.5介质-浆法-50转-30min-片4
供试品溶液-1



PCH-962

＜样品信息＞

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$PCH-962 - 30-3/31-647-2 - zzp-2026031821p-rcqx-1-pH4.5jz-jf50z-p5-30min.lcd

方法文件名: RC\$PCH-962 - PCH-962-rcqx-tm-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$PCH-962 - 20260417-rcqx-FX280.lcb

样品瓶号: 3-41

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/04/17 22:20:49

处理时间(V2): 2026/04/18 15:36:50

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX280)

流速:1.5ml/min


波长: 230nm

版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 230nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.652	185047	100.000	19775	1896	1.084	--
总计		185047	100.000	19775			

图147 替米沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026031821批-pH4.5介质-浆法-50转-30min-片5
供试品溶液-1



PCH-962

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$PCH-962 - 30-3/31-648-2 - zzp-2026031821p-rcqx-1-pH4.5jz-jf50z-p6-30min.lcd

方法文件名: RC\$PCH-962 - PCH-962-rcqx-tm-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$PCH-962 - 20260417-rcqx-FX280.lcb

样品瓶号: 3-50

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/04/17 22:25:11

处理时间(V2): 2026/04/18 15:36:53

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX280)

流速:1.5ml/min


波长: 230nm

版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 230nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.653	187237	100.000	19993	1897	1.084	--
总计		187237	100.000	19993			

图148 替米沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026031821批-pH4.5介质-浆法-50转-30min-片6
供试品溶液-1



PCH-962

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$PCH-962 - 30-3/31-649-2 - zzp-2026031821p-rcqx-1-pH4.5jz-jf50z-p1-45min.lcd

方法文件名: RC\$PCH-962 - PCH-962-rcqx-tm-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$PCH-962 - 20260417-rcqx-FX280.lcb

样品瓶号: 3-6

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/04/17 22:29:33

处理时间(V2): 2026/04/18 15:36:56

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX280)

流速:1.5ml/min


波长: 230nm

版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 230nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.652	192528	100.000	20493	1890	1.087	--
总计		192528	100.000	20493			

图149 替米沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026031821批-pH4.5介质-浆法-50转-45min-片1
供试品溶液-1



PCH-962

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$PCH-962 - 30-3/31-650-2 - zzp-2026031821p-rcqx-1-pH4.5jz-jf50z-p2-45min.lcd

方法文件名: RC\$PCH-962 - PCH-962-rcqx-tm-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$PCH-962 - 20260417-rcqx-FX280.lcb

样品瓶号: 3-15

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/04/17 22:33:56

处理时间(V2): 2026/04/18 15:36:59

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX280)

流速:1.5ml/min


波长: 230nm

版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 230nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.652	194603	100.000	20690	1887	1.086	--
总计		194603	100.000	20690			

图150 替米沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026031821批-pH4.5介质-浆法-50转-45min-片2
供试品溶液-1



PCH-962

＜样品信息＞

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$PCH-962 - 30-3/31-651-2 - zzp-2026031821p-rcqx-1-pH4.5jz-jf50z-p3-45min.lcd

方法文件名: RC\$PCH-962 - PCH-962-rcqx-tm-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$PCH-962 - 20260417-rcqx-FX280.lcb

样品瓶号: 3-24

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/04/17 22:38:18

处理时间(V2): 2026/04/18 15:37:02

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX280)

流速:1.5ml/min


波长: 230nm

版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 230nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.653	193203	100.000	20531	1885	1.090	--
总计		193203	100.000	20531			

图151 替米沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026031821批-pH4.5介质-浆法-50转-45min-片3
供试品溶液-1



PCH-962

＜样品信息＞

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$PCH-962 - 30-3/31-652-2 - zzp-2026031821p-rcqx-1-pH4.5jz-jf50z-p4-45min.lcd

方法文件名: RC\$PCH-962 - PCH-962-rcqx-tm-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$PCH-962 - 20260417-rcqx-FX280.lcb

样品瓶号: 3-33

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/04/17 22:42:39

处理时间(V2): 2026/04/18 15:37:05

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX280)

流 速:1.5ml/min


波 长: 230nm

版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 230nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.653	193237	100.000	20585	1890	1.084	--
总计		193237	100.000	20585			

图152 替米沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026031821批-pH4.5介质-浆法-50转-45min-片4
供试品溶液-1



PCH-962

＜样品信息＞

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$PCH-962 - 30-3/31-653-2 - zzp-2026031821p-rcqx-1-pH4.5jz-jf50z-p5-45min.lcd

方法文件名: RC\$PCH-962 - PCH-962-rcqx-tm-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$PCH-962 - 20260417-rcqx-FX280.lcb

样品瓶号: 3-42

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/04/17 22:47:01

处理时间(V2): 2026/04/18 15:37:08

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX280)

流 速:1.5ml/min


波 长: 230nm

版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 230nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.654	191939	100.000	20476	1897	1.083	--
总计		191939	100.000	20476			

图153 替米沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026031821批-pH4.5介质-浆法-50转-45min-片5
供试品溶液-1



PCH-962

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$PCH-962 - 30-3/31-654-2 - zzp-2026031821p-rcqx-1-pH4.5jz-jf50z-p6-45min.lcd

方法文件名: RC\$PCH-962 - PCH-962-rcqx-tm-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$PCH-962 - 20260417-rcqx-FX280.lcb

样品瓶号: 3-51

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/04/17 22:51:23

处理时间(V2): 2026/04/18 15:37:11

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX280)

流 速:1.5ml/min


波 长: 230nm

版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 230nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.654	192524	100.000	20571	1901	1.082	--
总计		192524	100.000	20571			

图154 替米沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026031821批-pH4.5介质-浆法-50转-45min-片6
供试品溶液-1



PCH-962

＜样品信息＞

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$PCH-962 - 30-3/31-655-2 - zzp-2026031821p-rcqx-1-pH4.5jz-jf50z-p1-60min.lcd

方法文件名: RC\$PCH-962 - PCH-962-rcqx-tm-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$PCH-962 - 20260417-rcqx-FX280.lcb

样品瓶号: 3-7

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/04/17 22:55:45

处理时间(V2): 2026/04/18 15:37:14

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX280)

流 速:1.5ml/min


波 长: 230nm

版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 230nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.653	185010	100.000	19716	1883	1.082	--
总计		185010	100.000	19716			

图155 替米沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026031821批-pH4.5介质-浆法-50转-60min-片1
供试品溶液-1



PCH-962

＜样品信息＞

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$PCH-962 - 30-3/31-656-2 - zzp-2026031821p-rcqx-1-pH4.5jz-jf50z-p2-60min.lcd

方法文件名: RC\$PCH-962 - PCH-962-rcqx-tm-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$PCH-962 - 20260417-rcqx-FX280.lcb

样品瓶号: 3-16

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/04/17 23:00:07

处理时间(V2): 2026/04/18 15:37:17

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX280)

流 速:1.5ml/min


波 长: 230nm

版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 230nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.654	194261	100.000	20663	1888	1.083	--
总计		194261	100.000	20663			

图156 替米沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026031821批-pH4.5介质-浆法-50转-60min-片2
供试品溶液-1



PCH-962

＜样品信息＞

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$PCH-962 - 30-3/31-657-2 - zzp-2026031821p-rcqx-1-pH4.5jz-jf50z-p3-60min.lcd

方法文件名: RC\$PCH-962 - PCH-962-rcqx-tm-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$PCH-962 - 20260417-rcqx-FX280.lcb

样品瓶号: 3-25

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/04/17 23:04:29

处理时间(V2): 2026/04/18 15:37:20

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX280)

流 速:1.5ml/min


波 长: 230nm

版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 230nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.653	193126	100.000	20565	1886	1.081	--
总计		193126	100.000	20565			

图157 替米沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026031821批-pH4.5介质-浆法-50转-60min-片3
供试品溶液-1



PCH-962

＜样品信息＞

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$PCH-962 - 30-3/31-658-2 - zzp-2026031821p-rcqx-1-pH4.5jz-jf50z-p4-60min.lcd

方法文件名: RC\$PCH-962 - PCH-962-rcqx-tm-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$PCH-962 - 20260417-rcqx-FX280.lcb

样品瓶号: 3-34

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/04/17 23:08:52

处理时间(V2): 2026/04/18 15:37:24

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX280)

流 速:1.5ml/min


波 长: 230nm

版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 230nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.654	192434	100.000	20495	1887	1.083	--
总计		192434	100.000	20495			

图158 替米沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026031821批-pH4.5介质-浆法-50转-60min-片4
供试品溶液-1



PCH-962

＜样品信息＞

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$PCH-962 - 30-3/31-659-2 - zzp-2026031821p-rcqx-1-pH4.5jz-jf50z-p5-60min.lcd

方法文件名: RC\$PCH-962 - PCH-962-rcqx-tm-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$PCH-962 - 20260417-rcqx-FX280.lcb

样品瓶号: 3-43

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/04/17 23:13:14

处理时间(V2): 2026/04/18 15:37:26

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX280)

流 速:1.5ml/min


波 长: 230nm

版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 230nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.654	196918	100.000	20978	1881	1.083	--
总计		196918	100.000	20978			

图159 替米沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026031821批-pH4.5介质-浆法-50转-60min-片5
供试品溶液-1



PCH-962

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$PCH-962 - 30-3/31-660-2 - zzp-2026031821p-rcqx-1-pH4.5jz-jf50z-p6-60min.lcd

方法文件名: RC\$PCH-962 - PCH-962-rcqx-tm-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$PCH-962 - 20260417-rcqx-FX280.lcb

样品瓶号: 3-52

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/04/17 23:17:36

处理时间(V2): 2026/04/18 15:37:30

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX280)

流 速:1.5ml/min


波 长: 230nm

版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 230nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.654	194462	100.000	20695	1884	1.084	--
总计		194462	100.000	20695			

图160 替米沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026031821批-pH4.5介质-浆法-50转-60min-片6
供试品溶液-1



PCH-962

＜样品信息＞

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$PCH-962 - 30-3/31-661-2 - zzp-2026031821p-rcqx-1-pH4.5jz-jf50z-p1-jx.lcd

方法文件名: RC\$PCH-962 - PCH-962-rcqx-tm-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$PCH-962 - 20260417-rcqx-FX280.lcb

样品瓶号: 3-8

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/04/17 23:21:59

处理时间(V2): 2026/04/18 15:37:33

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX280)

流速:1.5ml/min


波长: 230nm

版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 230nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.654	188250	100.000	20045	1881	1.081	--
总计		188250	100.000	20045			

图161 替米沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026031821批-pH4.5介质-桨法-50转-极限转速-片1
供试品溶液-1



PCH-962

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$PCH-962 - 30-3/31-662-2 - zzp-2026031821p-rcqx-1-pH4.5jz-jf50z-p2-jx.lcd

方法文件名: RC\$PCH-962 - PCH-962-rcqx-tm-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$PCH-962 - 20260417-rcqx-FX280.lcb

样品瓶号: 3-17

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/04/17 23:26:22

处理时间(V2): 2026/04/18 15:37:36

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX280)

流速:1.5ml/min


波长: 230nm

版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 230nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.654	197885	100.000	21005	1877	1.083	--
总计		197885	100.000	21005			

图162 替米沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026031821批-pH4.5介质-桨法-50转-极限转速-片2
供试品溶液-1



PCH-962

＜样品信息＞

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$PCH-962 - 30-3/31-663-2 - zzp-2026031821p-rcqx-1-pH4.5jz-jf50z-p3-jx.lcd

方法文件名: RC\$PCH-962 - PCH-962-rcqx-tm-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$PCH-962 - 20260417-rcqx-FX280.lcb

样品瓶号: 3-26

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/04/17 23:30:44

处理时间(V2): 2026/04/18 15:37:39

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX280)

流 速:1.5ml/min


波 长: 230nm

版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 230nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.654	199038	100.000	21094	1876	1.085	--
总计		199038	100.000	21094			

图163 替米沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026031821批-pH4.5介质-桨法-50转-极限转速-片3
供试品溶液-1



PCH-962

＜样品信息＞

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$PCH-962 - 30-3/31-664-2 - zzp-2026031821p-rcqx-1-pH4.5jz-jf50z-p4-jx.lcd

方法文件名: RC\$PCH-962 - PCH-962-rcqx-tm-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$PCH-962 - 20260417-rcqx-FX280.lcb

样品瓶号: 3-35

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/04/17 23:35:07

处理时间(V2): 2026/04/18 15:37:42

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX280)

流 速:1.5ml/min


波 长: 230nm

版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 230nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.654	198552	100.000	21093	1881	1.081	--
总计		198552	100.000	21093			

图164 替米沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026031821批-pH4.5介质-桨法-50转-极限转速-片4
供试品溶液-1



PCH-962

＜样品信息＞

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$PCH-962 - 30-3/31-665-2 - zzp-2026031821p-rcqx-1-pH4.5jz-jf50z-p5-jx.lcd

方法文件名: RC\$PCH-962 - PCH-962-rcqx-tm-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$PCH-962 - 20260417-rcqx-FX280.lcb

样品瓶号: 3-44

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/04/17 23:39:30

处理时间(V2): 2026/04/18 15:37:45

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX280)

流 速:1.5ml/min


波 长: 230nm

版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 230nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.655	199339	100.000	21197	1884	1.086	--
总计		199339	100.000	21197			

图165 替米沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026031821批-pH4.5介质-桨法-50转-极限转速-片5
供试品溶液-1



PCH-962

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$PCH-962 - 30-3/31-666-2 - zzp-2026031821p-rcqx-1-pH4.5jz-jf50z-p6-jx.lcd

方法文件名: RC\$PCH-962 - PCH-962-rcqx-tm-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$PCH-962 - 20260417-rcqx-FX280.lcb

样品瓶号: 3-53

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/04/17 23:43:53

处理时间(V2): 2026/04/18 15:37:48

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX280)

流速:1.5ml/min


波长: 230nm

版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 230nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.655	197976	100.000	21042	1881	1.080	--
总计		197976	100.000	21042			

图166 替米沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026031821批-pH4.5介质-桨法-50转-极限转速-片6
供试品溶液-1



PCH-962

＜样品信息＞

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$PCH-962 - 30-3/31-667-2 - zzp-2026031821p-rcqx-1-pH4.5jz-jf50z-dz2-1.lcd

方法文件名: RC\$PCH-962 - PCH-962-rcqx-tm-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$PCH-962 - 20260417-rcqx-FX280.lcb

样品瓶号: 3-27

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/04/17 23:48:17

处理时间(V2): 2026/04/18 15:37:51

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX280)

流速:1.5ml/min


波长: 230nm

版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 230nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.646	725200	100.000	75550	1797	1.090	--
总计		725200	100.000	75550			

图167 替米沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026031821批-pH4.5介质-桨法-50转
对照品溶液-2-1



PCH-962

＜样品信息＞

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$PCH-962 - 30-3/31-668-2 - zzp-2026031821p-rcqx-1-pH4.5jz-jf50z-dz2-2.lcd

方法文件名: RC\$PCH-962 - PCH-962-rcqx-tm-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$PCH-962 - 20260417-rcqx-FX280.lcb

样品瓶号: 3-27

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/04/17 23:52:41

处理时间(V2): 2026/04/18 15:37:54

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX280)

流速:1.5ml/min


波长: 230nm

版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 230nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.646	726006	100.000	75580	1795	1.090	--
总计		726006	100.000	75580			

图168 替米沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026031821批-pH4.5介质-桨法-50转
对照品溶液-2-2



PCH-962

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$PCH-962 - 30-3/31-669-2 - zzp-2026031821p-rcqx-2-pH4.5jz-jf50z-rj.lcd

方法文件名: RC\$PCH-962 - PCH-962-rcqx-tm-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$PCH-962 - 20260417-rcqx-FX280.lcb

样品瓶号: 4-9

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/04/17 23:57:06

处理时间(V2): 2026/04/18 15:37:57

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX280)

流 速:1.5ml/min


波 长: 230nm

版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 230nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图169 替米沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026031821批-pH4.5介质-桨法-50转
溶剂



PCH-962

＜样品信息＞

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$PCH-962 - 30-3/31-670-2 - zzp-2026031821p-rcqx-2-pH4.5jz-jf50z-dz1-1.lcd

方法文件名: RC\$PCH-962 - PCH-962-rcqx-tm-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$PCH-962 - 20260417-rcqx-FX280.lcb

样品瓶号: 4-18

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/04/18 00:01:31

处理时间(V2): 2026/04/18 15:37:59

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX280)

流速:1.5ml/min


波长: 230nm

版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 230nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.646	729655	100.000	75962	1794	1.089	--
总计		729655	100.000	75962			

图170 替米沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026031821批-pH4.5介质-桨法-50转
对照品溶液-1-1



PCH-962

＜样品信息＞

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$PCH-962 - 30-3/31-671-2 - zzp-2026031821p-rcqx-2-pH4.5jz-jf50z-dz1-2.lcd

方法文件名: RC\$PCH-962 - PCH-962-rcqx-tm-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$PCH-962 - 20260417-rcqx-FX280.lcb

样品瓶号: 4-18

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/04/18 00:05:55

处理时间(V2): 2026/04/18 15:38:02

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX280)

流速:1.5ml/min


波长: 230nm

版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 230nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.646	729436	100.000	75922	1792	1.089	--
总计		729436	100.000	75922			

图171 替米沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026031821批-pH4.5介质-桨法-50转
对照品溶液-1-2



PCH-962

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$PCH-962 - 30-3/31-672-2 - zzp-2026031821p-rcqx-2-pH4.5jz-jf50z-dz1-3.lcd

方法文件名: RC\$PCH-962 - PCH-962-rcqx-tm-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$PCH-962 - 20260417-rcqx-FX280.lcb

样品瓶号: 4-18

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/04/18 00:10:20

处理时间(V2): 2026/04/18 15:38:05

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX280)

流速:1.5ml/min


波长: 230nm

版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 230nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.646	729393	100.000	75881	1794	1.088	--
总计		729393	100.000	75881			

图172 替米沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026031821批-pH4.5介质-桨法-50转
对照品溶液-1-3



PCH-962

＜样品信息＞

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$PCH-962 - 30-3/31-673-2 - zzp-2026031821p-rcqx-2-pH4.5jz-jf50z-dz1-4.lcd

方法文件名: RC\$PCH-962 - PCH-962-rcqx-tm-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$PCH-962 - 20260417-rcqx-FX280.lcb

样品瓶号: 4-18

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/04/18 00:14:45

处理时间(V2): 2026/04/18 15:38:08

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX280)

流 速:1.5ml/min


波 长: 230nm

版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 230nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.646	728966	100.000	75830	1793	1.089	--
总计		728966	100.000	75830			

图173 替米沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026031821批-pH4.5介质-桨法-50转
对照品溶液-1-4




PCH-962

＜样品信息＞

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-962 - 30-3/31-674-2 - zzp-2026031821p-rcqx-2-pH4.5jz-jf50z-dz1-5.lcd
方法文件名: RC\$PCH-962 - PCH-962-rcqx-tm-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-962 - 20260417-rcqx-FX280.lcb
样品瓶号: 4-18
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/04/18 00:19:09
处理时间(V2): 2026/04/18 15:38:11
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX280)

流 速:1.5ml/min
波 长: 230nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 230nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.646	728746	100.000	75751	1790	1.088	--
总计		728746	100.000	75751			

图174 替米沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026031821批-pH4.5介质-桨法-50转
对照品溶液-1-5



PCH-962

＜样品信息＞

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$PCH-962 - 30-3/31-675-2 - zzp-2026031821p-rcqx-2-pH4.5jz-jf50z-p1-5min.lcd

方法文件名: RC\$PCH-962 - PCH-962-rcqx-tm-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$PCH-962 - 20260417-rcqx-FX280.lcb

样品瓶号: 4-1

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/04/18 00:23:33

处理时间(V2): 2026/04/18 15:38:14

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX280)

流 速:1.5ml/min


波 长: 230nm

版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 230nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.655	88003	100.000	9338	1865	1.082	--
总计		88003	100.000	9338			

图175 替米沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026031821批-pH4.5介质-桨法-50转-5min-片1
供试品溶液-1



PCH-962

＜样品信息＞

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$PCH-962 - 30-3/31-676-2 - zzp-2026031821p-rcqx-2-pH4.5jz-jf50z-p2-5min.lcd

方法文件名: RC\$PCH-962 - PCH-962-rcqx-tm-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$PCH-962 - 20260417-rcqx-FX280.lcb

样品瓶号: 4-10

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/04/18 00:27:56

处理时间(V2): 2026/04/18 15:38:17

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX280)

流 速:1.5ml/min


波 长: 230nm

版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 230nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.657	103136	100.000	10963	1883	1.076	--
总计		103136	100.000	10963			

图176 替米沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026031821批-pH4.5介质-桨法-50转-5min-片2
供试品溶液-1



PCH-962

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$PCH-962 - 30-3/31-677-2 - zzp-2026031821p-rcqx-2-pH4.5jz-jf50z-p3-5min.lcd

方法文件名: RC\$PCH-962 - PCH-962-rcqx-tm-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$PCH-962 - 20260417-rcqx-FX280.lcb

样品瓶号: 4-19

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/04/18 00:32:19

处理时间(V2): 2026/04/18 15:38:20

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX280)

流 速:1.5ml/min


波 长: 230nm

版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 230nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.657	87186	100.000	9238	1878	1.080	--
总计		87186	100.000	9238			

图177 替米沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026031821批-pH4.5介质-桨法-50转-5min-片3
供试品溶液-1



PCH-962

＜样品信息＞

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$PCH-962 - 30-3/31-678-2 - zzp-2026031821p-rcqx-2-pH4.5jz-jf50z-p4-5min.lcd

方法文件名: RC\$PCH-962 - PCH-962-rcqx-tm-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$PCH-962 - 20260417-rcqx-FX280.lcb

样品瓶号: 4-28

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/04/18 00:36:42

处理时间(V2): 2026/04/18 15:38:23

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX280)

流 速:1.5ml/min


波 长: 230nm

版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 230nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.656	82229	100.000	8713	1876	1.079	--
总计		82229	100.000	8713			

图178 替米沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026031821批-pH4.5介质-桨法-50转-5min-片4
供试品溶液-1



PCH-962

＜样品信息＞

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$PCH-962 - 30-3/31-679-2 - zzp-2026031821p-rcqx-2-pH4.5jz-jf50z-p5-5min.lcd

方法文件名: RC\$PCH-962 - PCH-962-rcqx-tm-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$PCH-962 - 20260417-rcqx-FX280.lcb

样品瓶号: 4-37

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/04/18 00:41:05

处理时间(V2): 2026/04/18 15:38:26

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX280)

流 速:1.5ml/min


波 长: 230nm

版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 230nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.657	88144	100.000	9385	1876	1.078	--
总计		88144	100.000	9385			

图179 替米沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026031821批-pH4.5介质-桨法-50转-5min-片5
供试品溶液-1



PCH-962

＜样品信息＞

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$PCH-962 - 30-3/31-680-2 - zzp-2026031821p-rcqx-2-pH4.5jz-jf50z-p6-5min.lcd

方法文件名: RC\$PCH-962 - PCH-962-rcqx-tm-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$PCH-962 - 20260417-rcqx-FX280.lcb

样品瓶号: 4-46

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/04/18 00:45:28

处理时间(V2): 2026/04/18 15:38:28

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX280)

流速:1.5ml/min


波长: 230nm

版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 230nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.656	102439	100.000	10885	1873	1.077	--
总计		102439	100.000	10885			

图180 替米沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026031821批-pH4.5介质-桨法-50转-5min-片6
供试品溶液-1



PCH-962

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$PCH-962 - 30-3/31-681-2 - zzp-2026031821p-rcqx-2-pH4.5jz-jf50z-p1-10min.lcd

方法文件名: RC\$PCH-962 - PCH-962-rcqx-tm-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$PCH-962 - 20260417-rcqx-FX280.lcb

样品瓶号: 4-2

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/04/18 00:49:52

处理时间(V2): 2026/04/18 15:38:31

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX280)

流速:1.5ml/min


波长: 230nm

版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 230nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.656	117194	100.000	12478	1876	1.081	--
总计		117194	100.000	12478			

图181 替米沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026031821批-pH4.5介质-浆法-50转-10min-片1
供试品溶液-1



PCH-962

＜样品信息＞

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$PCH-962 - 30-3/31-682-2 - zzp-2026031821p-rcqx-2-pH4.5jz-jf50z-p2-10min.lcd

方法文件名: RC\$PCH-962 - PCH-962-rcqx-tm-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$PCH-962 - 20260417-rcqx-FX280.lcb

样品瓶号: 4-11

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/04/18 00:54:15

处理时间(V2): 2026/04/18 15:38:34

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX280)

流速:1.5ml/min


波长: 230nm

版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 230nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.655	139013	100.000	14771	1870	1.074	--
总计		139013	100.000	14771			

图182 替米沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026031821批-pH4.5介质-浆法-50转-10min-片2
供试品溶液-1



PCH-962

＜样品信息＞

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$PCH-962 - 30-3/31-683-2 - zzp-2026031821p-rcqx-2-pH4.5jz-jf50z-p3-10min.lcd

方法文件名: RC\$PCH-962 - PCH-962-rcqx-tm-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$PCH-962 - 20260417-rcqx-FX280.lcb

样品瓶号: 4-20

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/04/18 00:58:38

处理时间(V2): 2026/04/18 15:38:37

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX280)

流速:1.5ml/min


波长: 230nm

版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 230nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.655	112987	100.000	12012	1869	1.075	--
总计		112987	100.000	12012			

图183 替米沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026031821批-pH4.5介质-浆法-50转-10min-片3
供试品溶液-1



PCH-962

＜样品信息＞

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$PCH-962 - 30-3/31-684-2 - zzp-2026031821p-rcqx-2-pH4.5jz-jf50z-p4-10min.lcd

方法文件名: RC\$PCH-962 - PCH-962-rcqx-tm-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$PCH-962 - 20260417-rcqx-FX280.lcb

样品瓶号: 4-29

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/04/18 01:03:01

处理时间(V2): 2026/04/18 15:38:40

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX280)

流 速:1.5ml/min


波 长: 230nm

版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 230nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.657	118089	100.000	12509	1872	1.074	--
总计		118089	100.000	12509			

图184 替米沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026031821批-pH4.5介质-浆法-50转-10min-片4
供试品溶液-1



PCH-962

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$PCH-962 - 30-3/31-685-2 - zzp-2026031821p-rcqx-2-pH4.5jz-jf50z-p5-10min.lcd

方法文件名: RC\$PCH-962 - PCH-962-rcqx-tm-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$PCH-962 - 20260417-rcqx-FX280.lcb

样品瓶号: 4-38

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/04/18 01:07:25

处理时间(V2): 2026/04/18 15:38:43

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX280)

流速:1.5ml/min


波长: 230nm

版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 230nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.656	109268	100.000	11570	1866	1.077	--
总计		109268	100.000	11570			

图185 替米沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026031821批-pH4.5介质-浆法-50转-10min-片5
供试品溶液-1



PCH-962

＜样品信息＞

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$PCH-962 - 30-3/31-686-2 - zzp-2026031821p-rcqx-2-pH4.5jz-jf50z-p6-10min.lcd

方法文件名: RC\$PCH-962 - PCH-962-rcqx-tm-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$PCH-962 - 20260417-rcqx-FX280.lcb

样品瓶号: 4-47

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/04/18 01:11:48

处理时间(V2): 2026/04/18 15:38:46

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX280)

流 速:1.5ml/min


波 长: 230nm

版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 230nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.657	136967	100.000	14499	1864	1.076	--
总计		136967	100.000	14499			

图186 替米沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026031821批-pH4.5介质-浆法-50转-10min-片6
供试品溶液-1



PCH-962

＜样品信息＞

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$PCH-962 - 30-3/31-687-2 - zzp-2026031821p-rcqx-2-pH4.5jz-jf50z-p1-15min.lcd

方法文件名: RC\$PCH-962 - PCH-962-rcqx-tm-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$PCH-962 - 20260417-rcqx-FX280.lcb

样品瓶号: 4-3

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/04/18 01:16:12

处理时间(V2): 2026/04/18 15:38:49

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX280)

流 速:1.5ml/min


波 长: 230nm

版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 230nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.656	153834	100.000	16304	1868	1.078	--
总计		153834	100.000	16304			

图187 替米沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026031821批-pH4.5介质-浆法-50转-15min-片1
供试品溶液-1



PCH-962

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$PCH-962 - 30-3/31-688-2 - zzp-2026031821p-rcqx-2-pH4.5jz-jf50z-p2-15min.lcd

方法文件名: RC\$PCH-962 - PCH-962-rcqx-tm-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$PCH-962 - 20260417-rcqx-FX280.lcb

样品瓶号: 4-12

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/04/18 01:20:35

处理时间(V2): 2026/04/18 15:38:52

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX280)

流 速:1.5ml/min


波 长: 230nm

版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 230nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.656	167528	100.000	17695	1859	1.078	--
总计		167528	100.000	17695			

图188 替米沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026031821批-pH4.5介质-浆法-50转-15min-片2
供试品溶液-1



PCH-962

＜样品信息＞

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$PCH-962 - 30-3/31-689-2 - zzp-2026031821p-rcqx-2-pH4.5jz-jf50z-p3-15min.lcd

方法文件名: RC\$PCH-962 - PCH-962-rcqx-tm-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$PCH-962 - 20260417-rcqx-FX280.lcb

样品瓶号: 4-21

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/04/18 01:24:59

处理时间(V2): 2026/04/18 15:38:55

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX280)

流 速:1.5ml/min


波 长: 230nm

版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 230nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.656	148478	100.000	15713	1869	1.074	--
总计		148478	100.000	15713			

图189 替米沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026031821批-pH4.5介质-浆法-50转-15min-片3
供试品溶液-1



PCH-962

＜样品信息＞

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$PCH-962 - 30-3/31-690-2 - zzp-2026031821p-rcqx-2-pH4.5jz-jf50z-p4-15min.lcd

方法文件名: RC\$PCH-962 - PCH-962-rcqx-tm-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$PCH-962 - 20260417-rcqx-FX280.lcb

样品瓶号: 4-30

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/04/18 01:29:22

处理时间(V2): 2026/04/18 15:38:57

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX280)

流速:1.5ml/min


波长: 230nm

版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 230nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.655	156448	100.000	16523	1850	1.087	--
总计		156448	100.000	16523			

图190 替米沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026031821批-pH4.5介质-浆法-50转-15min-片4
供试品溶液-1



PCH-962

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$PCH-962 - 30-3/31-691-2 - zzp-2026031821p-rcqx-2-pH4.5jz-jf50z-p5-15min.lcd

方法文件名: RC\$PCH-962 - PCH-962-rcqx-tm-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$PCH-962 - 20260417-rcqx-FX280.lcb

样品瓶号: 4-39

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/04/18 01:33:45

处理时间(V2): 2026/04/18 15:39:00

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX280)

流速:1.5ml/min


波长: 230nm

版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 230nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.657	137276	100.000	14529	1866	1.079	--
总计		137276	100.000	14529			

图191 替米沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026031821批-pH4.5介质-浆法-50转-15min-片5
供试品溶液-1



PCH-962

＜样品信息＞

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$PCH-962 - 30-3/31-692-2 - zzp-2026031821p-rcqx-2-pH4.5jz-jf50z-p6-15min.lcd

方法文件名: RC\$PCH-962 - PCH-962-rcqx-tm-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$PCH-962 - 20260417-rcqx-FX280.lcb

样品瓶号: 4-48

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/04/18 01:38:08

处理时间(V2): 2026/04/18 15:39:03

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX280)

流速:1.5ml/min


波长: 230nm

版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 230nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.657	168698	100.000	17834	1860	1.076	--
总计		168698	100.000	17834			

图192 替米沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026031821批-pH4.5介质-浆法-50转-15min-片6
供试品溶液-1



PCH-962

＜样品信息＞

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$PCH-962 - 30-3/31-693-2 - zzp-2026031821p-rcqx-2-pH4.5jz-jf50z-p1-20min.lcd

方法文件名: RC\$PCH-962 - PCH-962-rcqx-tm-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$PCH-962 - 20260417-rcqx-FX280.lcb

样品瓶号: 4-4

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/04/18 01:42:32

处理时间(V2): 2026/04/18 15:39:06

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX280)

流速:1.5ml/min


波长: 230nm

版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 230nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.657	177729	100.000	18762	1853	1.075	--
总计		177729	100.000	18762			

图193 替米沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026031821批-pH4.5介质-浆法-50转-20min-片1
供试品溶液-1



PCH-962

＜样品信息＞

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$PCH-962 - 30-3/31-694-2 - zzp-2026031821p-rcqx-2-pH4.5jz-jf50z-p2-20min.lcd

方法文件名: RC\$PCH-962 - PCH-962-rcqx-tm-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$PCH-962 - 20260417-rcqx-FX280.lcb

样品瓶号: 4-13

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/04/18 01:46:56

处理时间(V2): 2026/04/18 15:39:09

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX280)

流速:1.5ml/min


波长: 230nm

版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 230nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.658	167395	100.000	17692	1857	1.072	--
总计		167395	100.000	17692			

图194 替米沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026031821批-pH4.5介质-浆法-50转-20min-片2
供试品溶液-1



PCH-962

＜样品信息＞

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$PCH-962 - 30-3/31-695-2 - zzp-2026031821p-rcqx-2-pH4.5jz-jf50z-p3-20min.lcd

方法文件名: RC\$PCH-962 - PCH-962-rcqx-tm-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$PCH-962 - 20260417-rcqx-FX280.lcb

样品瓶号: 4-22

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/04/18 01:51:20

处理时间(V2): 2026/04/18 15:39:12

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX280)

流 速:1.5ml/min


波 长: 230nm

版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 230nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.658	168145	100.000	17718	1852	1.079	--
总计		168145	100.000	17718			

图195 替米沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026031821批-pH4.5介质-浆法-50转-20min-片3
供试品溶液-1



PCH-962

＜样品信息＞

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$PCH-962 - 30-3/31-696-2 - zzp-2026031821p-rcqx-2-pH4.5jz-jf50z-p4-20min.lcd

方法文件名: RC\$PCH-962 - PCH-962-rcqx-tm-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$PCH-962 - 20260417-rcqx-FX280.lcb

样品瓶号: 4-31

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/04/18 01:55:44

处理时间(V2): 2026/04/18 15:39:15

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX280)

流 速:1.5ml/min


波 长: 230nm

版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 230nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.656	172809	100.000	18243	1855	1.078	--
总计		172809	100.000	18243			

图196 替米沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026031821批-pH4.5介质-浆法-50转-20min-片4
供试品溶液-1



PCH-962

＜样品信息＞

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$PCH-962 - 30-3/31-697-2 - zzp-2026031821p-rcqx-2-pH4.5jz-jf50z-p5-20min.lcd

方法文件名: RC\$PCH-962 - PCH-962-rcqx-tm-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$PCH-962 - 20260417-rcqx-FX280.lcb

样品瓶号: 4-40

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/04/18 02:00:07

处理时间(V2): 2026/04/18 15:39:18

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX280)

流速:1.5ml/min


波长: 230nm

版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 230nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.657	152769	100.000	16113	1855	1.075	--
总计		152769	100.000	16113			

图197 替米沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026031821批-pH4.5介质-浆法-50转-20min-片5
供试品溶液-1



PCH-962

＜样品信息＞

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$PCH-962 - 30-3/31-698-2 - zzp-2026031821p-rcqx-2-pH4.5jz-jf50z-p6-20min.lcd

方法文件名: RC\$PCH-962 - PCH-962-rcqx-tm-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$PCH-962 - 20260417-rcqx-FX280.lcb

样品瓶号: 4-49

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/04/18 02:04:31

处理时间(V2): 2026/04/18 15:39:22

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX280)

流 速:1.5ml/min


波 长: 230nm

版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 230nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.657	183019	100.000	19337	1859	1.074	--
总计		183019	100.000	19337			

图198 替米沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026031821批-pH4.5介质-浆法-50转-20min-片6
供试品溶液-1



PCH-962

＜样品信息＞

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$PCH-962 - 30-3/31-699-2 - zzp-2026031821p-rcqx-2-pH4.5jz-jf50z-p1-30min.lcd

方法文件名: RC\$PCH-962 - PCH-962-rcqx-tm-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$PCH-962 - 20260417-rcqx-FX280.lcb

样品瓶号: 4-5

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/04/18 02:08:55

处理时间(V2): 2026/04/18 15:39:25

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX280)

流速:1.5ml/min


波长: 230nm

版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 230nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.657	201936	100.000	21277	1849	1.075	--
总计		201936	100.000	21277			

图199 替米沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026031821批-pH4.5介质-浆法-50转-30min-片1
供试品溶液-1



PCH-962

＜样品信息＞

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$PCH-962 - 30-3/31-700-2 - zzp-2026031821p-rcqx-2-pH4.5jz-jf50z-p2-30min.lcd

方法文件名: RC\$PCH-962 - PCH-962-rcqx-tm-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$PCH-962 - 20260417-rcqx-FX280.lcb

样品瓶号: 4-14

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/04/18 02:13:20

处理时间(V2): 2026/04/18 15:39:28

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX280)

流 速:1.5ml/min


波 长: 230nm

版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 230nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.657	192490	100.000	20225	1846	1.083	--
总计		192490	100.000	20225			

图200 替米沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026031821批-pH4.5介质-浆法-50转-30min-片2
供试品溶液-1



PCH-962

＜样品信息＞

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$PCH-962 - 30-3/31-701-2 - zzp-2026031821p-rcqx-2-pH4.5jz-jf50z-p3-30min.lcd

方法文件名: RC\$PCH-962 - PCH-962-rcqx-tm-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$PCH-962 - 20260417-rcqx-FX280.lcb

样品瓶号: 4-23

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/04/18 02:17:43

处理时间(V2): 2026/04/18 15:39:31

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX280)

流速:1.5ml/min


波长: 230nm

版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 230nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.654	188959	100.000	19908	1844	1.076	--
总计		188959	100.000	19908			

图201 替米沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026031821批-pH4.5介质-浆法-50转-30min-片3
供试品溶液-1



PCH-962

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$PCH-962 - 30-3/31-702-2 - zzp-2026031821p-rcqx-2-pH4.5jz-jf50z-p4-30min.lcd

方法文件名: RC\$PCH-962 - PCH-962-rcqx-tm-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$PCH-962 - 20260417-rcqx-FX280.lcb

样品瓶号: 4-32

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/04/18 02:22:07

处理时间(V2): 2026/04/18 15:39:34

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX280)

流 速:1.5ml/min


波 长: 230nm

版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 230nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.657	193179	100.000	20373	1851	1.075	--
总计		193179	100.000	20373			

图202 替米沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026031821批-pH4.5介质-浆法-50转-30min-片4
供试品溶液-1



PCH-962

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$PCH-962 - 30-3/31-703-2 - zzp-2026031821p-rcqx-2-pH4.5jz-jf50z-p5-30min.lcd

方法文件名: RC\$PCH-962 - PCH-962-rcqx-tm-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$PCH-962 - 20260417-rcqx-FX280.lcb

样品瓶号: 4-41

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/04/18 02:26:31

处理时间(V2): 2026/04/18 15:39:37

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX280)

流 速:1.5ml/min


波 长: 230nm

版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 230nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.658	181910	100.000	19090	1839	1.080	--
总计		181910	100.000	19090			

图203 替米沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026031821批-pH4.5介质-浆法-50转-30min-片5
供试品溶液-1




PCH-962

样品信息

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-962 - 30-3/31-704-2 - zzp-2026031821p-rcqx-2-pH4.5jz-jf50z-p6-30min.lcd
方法文件名: RC\$PCH-962 - PCH-962-rcqx-tm-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-962 - 20260417-rcqx-FX280.lcb
样品瓶号: 4-50
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/04/18 02:30:54
处理时间(V2): 2026/04/18 15:39:40
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX280)

流速:1.5ml/min
波长: 230nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

色谱图



峰表

检测器A Ch1 230nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.658	195011	100.000	20532	1849	1.075	--
总计		195011	100.000	20532			

图204 替米沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026031821批-pH4.5介质-浆法-50转-30min-片6
供试品溶液-1



PCH-962

＜样品信息＞

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$PCH-962 - 30-3/31-705-2 - zzp-2026031821p-rcqx-2-pH4.5jz-jf50z-p1-45min.lcd

方法文件名: RC\$PCH-962 - PCH-962-rcqx-tm-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$PCH-962 - 20260417-rcqx-FX280.lcb

样品瓶号: 4-6

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/04/18 02:35:18

处理时间(V2): 2026/04/18 15:39:43

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX280)

流 速:1.5ml/min


波 长: 230nm

版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 230nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.655	189093	100.000	19933	1842	1.074	--
总计		189093	100.000	19933			

图205 替米沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026031821批-pH4.5介质-浆法-50转-45min-片1
供试品溶液-1



PCH-962

＜样品信息＞

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$PCH-962 - 30-3/31-706-2 - zzp-2026031821p-rcqx-2-pH4.5jz-jf50z-p2-45min.lcd

方法文件名: RC\$PCH-962 - PCH-962-rcqx-tm-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$PCH-962 - 20260417-rcqx-FX280.lcb

样品瓶号: 4-15

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/04/18 02:39:42

处理时间(V2): 2026/04/18 15:39:46

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX280)

流 速:1.5ml/min


波 长: 230nm

版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 230nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.658	192554	100.000	20259	1850	1.074	--
总计		192554	100.000	20259			

图206 替米沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026031821批-pH4.5介质-浆法-50转-45min-片2
供试品溶液-1



PCH-962

＜样品信息＞

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$PCH-962 - 30-3/31-707-2 - zzp-2026031821p-rcqx-2-pH4.5jz-jf50z-p3-45min.lcd

方法文件名: RC\$PCH-962 - PCH-962-rcqx-tm-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$PCH-962 - 20260417-rcqx-FX280.lcb

样品瓶号: 4-24

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/04/18 02:44:06

处理时间(V2): 2026/04/18 15:39:49

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX280)

流速:1.5ml/min


波长: 230nm

版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 230nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.658	189736	100.000	19903	1835	1.081	--
总计		189736	100.000	19903			

图207 替米沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026031821批-pH4.5介质-浆法-50转-45min-片3
供试品溶液-1



PCH-962

＜样品信息＞

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$PCH-962 - 30-3/31-708-2 - zzp-2026031821p-rcqx-2-pH4.5jz-jf50z-p4-45min.lcd

方法文件名: RC\$PCH-962 - PCH-962-rcqx-tm-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$PCH-962 - 20260417-rcqx-FX280.lcb

样品瓶号: 4-33

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/04/18 02:48:30

处理时间(V2): 2026/04/18 15:39:52

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX280)

流 速:1.5ml/min


波 长: 230nm

版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 230nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.657	194646	100.000	20442	1841	1.078	--
总计		194646	100.000	20442			

图208 替米沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026031821批-pH4.5介质-浆法-50转-45min-片4
供试品溶液-1



PCH-962

＜样品信息＞

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$PCH-962 - 30-3/31-709-2 - zzp-2026031821p-rcqx-2-pH4.5jz-jf50z-p5-45min.lcd

方法文件名: RC\$PCH-962 - PCH-962-rcqx-tm-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$PCH-962 - 20260417-rcqx-FX280.lcb

样品瓶号: 4-42

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/04/18 02:52:54

处理时间(V2): 2026/04/18 15:39:54

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX280)

流 速:1.5ml/min


波 长: 230nm

版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 230nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.658	191894	100.000	20186	1846	1.074	--
总计		191894	100.000	20186			

图209 替米沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026031821批-pH4.5介质-浆法-50转-45min-片5
供试品溶液-1



PCH-962

＜样品信息＞

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$PCH-962 - 30-3/31-710-2 - zzp-2026031821p-rcqx-2-pH4.5jz-jf50z-p6-45min.lcd

方法文件名: RC\$PCH-962 - PCH-962-rcqx-tm-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$PCH-962 - 20260417-rcqx-FX280.lcb

样品瓶号: 4-51

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/04/18 02:57:16

处理时间(V2): 2026/04/18 15:39:57

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX280)

流 速:1.5ml/min


波 长: 230nm

版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 230nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.658	193602	100.000	20360	1844	1.073	--
总计		193602	100.000	20360			

图210 替米沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026031821批-pH4.5介质-浆法-50转-45min-片6
供试品溶液-1



PCH-962

＜样品信息＞

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$PCH-962 - 30-3/31-711-2 - zzp-2026031821p-rcqx-2-pH4.5jz-jf50z-p1-60min.lcd

方法文件名: RC\$PCH-962 - PCH-962-rcqx-tm-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$PCH-962 - 20260417-rcqx-FX280.lcb

样品瓶号: 4-7

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/04/18 03:01:40

处理时间(V2): 2026/04/18 15:40:00

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX280)

流 速:1.5ml/min


波 长: 230nm

版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 230nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.657	191134	100.000	20085	1837	1.073	--
总计		191134	100.000	20085			

图211 替米沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026031821批-pH4.5介质-浆法-50转-60min-片1
供试品溶液-1



PCH-962

＜样品信息＞

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$PCH-962 - 30-3/31-712-2 - zzp-2026031821p-rcqx-2-pH4.5jz-jf50z-p2-60min.lcd

方法文件名: RC\$PCH-962 - PCH-962-rcqx-tm-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$PCH-962 - 20260417-rcqx-FX280.lcb

样品瓶号: 4-16

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/04/18 03:06:05

处理时间(V2): 2026/04/18 15:40:03

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX280)

流 速:1.5ml/min


波 长: 230nm

版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 230nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.658	190993	100.000	20057	1838	1.075	--
总计		190993	100.000	20057			

图212 替米沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026031821批-pH4.5介质-浆法-50转-60min-片2
供试品溶液-1



PCH-962

＜样品信息＞

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$PCH-962 - 30-3/31-713-2 - zzp-2026031821p-rcqx-2-pH4.5jz-jf50z-p3-60min.lcd

方法文件名: RC\$PCH-962 - PCH-962-rcqx-tm-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$PCH-962 - 20260417-rcqx-FX280.lcb

样品瓶号: 4-25

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/04/18 03:10:29

处理时间(V2): 2026/04/18 15:40:06

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX280)

流速:1.5ml/min


波长: 230nm

版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 230nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.656	191035	100.000	20078	1837	1.077	--
总计		191035	100.000	20078			

图213 替米沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026031821批-pH4.5介质-浆法-50转-60min-片3
供试品溶液-1



PCH-962

＜样品信息＞

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$PCH-962 - 30-3/31-714-2 - zzp-2026031821p-rcqx-2-pH4.5jz-jf50z-p4-60min.lcd

方法文件名: RC\$PCH-962 - PCH-962-rcqx-tm-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$PCH-962 - 20260417-rcqx-FX280.lcb

样品瓶号: 4-34

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/04/18 03:14:51

处理时间(V2): 2026/04/18 15:40:09

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX280)

流 速:1.5ml/min


波 长: 230nm

版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 230nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.656	192801	100.000	20165	1823	1.081	--
总计		192801	100.000	20165			

图214 替米沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026031821批-pH4.5介质-浆法-50转-60min-片4
供试品溶液-1



PCH-962

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$PCH-962 - 30-3/31-715-2 - zzp-2026031821p-rcqx-2-pH4.5jz-jf50z-p5-60min.lcd

方法文件名: RC\$PCH-962 - PCH-962-rcqx-tm-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$PCH-962 - 20260417-rcqx-FX280.lcb

样品瓶号: 4-43

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/04/18 03:19:14

处理时间(V2): 2026/04/18 15:40:12

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX280)

流 速:1.5ml/min


波 长: 230nm

版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 230nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.657	194917	100.000	20469	1837	1.075	--
总计		194917	100.000	20469			

图215 替米沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026031821批-pH4.5介质-浆法-50转-60min-片5
供试品溶液-1



PCH-962

＜样品信息＞

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$PCH-962 - 30-3/31-716-2 - zzp-2026031821p-rcqx-2-pH4.5jz-jf50z-p6-60min.lcd

方法文件名: RC\$PCH-962 - PCH-962-rcqx-tm-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$PCH-962 - 20260417-rcqx-FX280.lcb

样品瓶号: 4-52

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/04/18 03:23:38

处理时间(V2): 2026/04/18 15:40:15

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX280)

流 速:1.5ml/min


波 长: 230nm

版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 230nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.657	194532	100.000	20409	1836	1.074	--
总计		194532	100.000	20409			

图216 替米沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026031821批-pH4.5介质-浆法-50转-60min-片6
供试品溶液-1



PCH-962

＜样品信息＞

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$PCH-962 - 30-3/31-717-2 - zzp-2026031821p-rcqx-2-pH4.5jz-jf50z-p1-jx.lcd

方法文件名: RC\$PCH-962 - PCH-962-rcqx-tm-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$PCH-962 - 20260417-rcqx-FX280.lcb

样品瓶号: 4-8

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/04/18 03:28:03

处理时间(V2): 2026/04/18 15:40:18

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX280)

流 速:1.5ml/min


波 长: 230nm

版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 230nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.657	192160	100.000	20181	1833	1.074	--
总计		192160	100.000	20181			

图217 替米沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026031821批-pH4.5介质-桨法-50转-极限转速-片1
供试品溶液-1



PCH-962

＜样品信息＞

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$PCH-962 - 30-3/31-718-2 - zzp-2026031821p-rcqx-2-pH4.5jz-jf50z-p2-jx.lcd

方法文件名: RC\$PCH-962 - PCH-962-rcqx-tm-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$PCH-962 - 20260417-rcqx-FX280.lcb

样品瓶号: 4-17

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/04/18 03:32:27

处理时间(V2): 2026/04/18 15:40:21

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX280)

流速:1.5ml/min


波长: 230nm

版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 230nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.657	191000	100.000	20052	1834	1.074	--
总计		191000	100.000	20052			

图218 替米沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026031821批-pH4.5介质-桨法-50转-极限转速-片2
供试品溶液-1



PCH-962

＜样品信息＞

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$PCH-962 - 30-3/31-719-2 - zzp-2026031821p-rcqx-2-pH4.5jz-jf50z-p3-jx.lcd

方法文件名: RC\$PCH-962 - PCH-962-rcqx-tm-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$PCH-962 - 20260417-rcqx-FX280.lcb

样品瓶号: 4-26

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/04/18 03:36:52

处理时间(V2): 2026/04/18 15:40:24

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX280)

流 速:1.5ml/min


波 长: 230nm

版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 230nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.657	190964	100.000	20053	1832	1.074	--
总计		190964	100.000	20053			

图219 替米沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026031821批-pH4.5介质-桨法-50转-极限转速-片3
供试品溶液-1



PCH-962

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$PCH-962 - 30-3/31-720-2 - zzp-2026031821p-rcqx-2-pH4.5jz-jf50z-p4-jx.lcd

方法文件名: RC\$PCH-962 - PCH-962-rcqx-tm-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$PCH-962 - 20260417-rcqx-FX280.lcb

样品瓶号: 4-35

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/04/18 03:41:16

处理时间(V2): 2026/04/18 15:40:27

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX280)

流 速:1.5ml/min


波 长: 230nm

版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 230nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.658	191926	100.000	20072	1828	1.073	--
总计		191926	100.000	20072			

图220 替米沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026031821批-pH4.5介质-桨法-50转-极限转速-片4
供试品溶液-1



PCH-962

＜样品信息＞

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$PCH-962 - 30-3/31-721-2 - zzp-2026031821p-rcqx-2-pH4.5jz-jf50z-p5-jx.lcd

方法文件名: RC\$PCH-962 - PCH-962-rcqx-tm-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$PCH-962 - 20260417-rcqx-FX280.lcb

样品瓶号: 4-44

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/04/18 03:45:40

处理时间(V2): 2026/04/18 15:40:30

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX280)

流 速:1.5ml/min


波 长: 230nm

版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 230nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.658	193083	100.000	20140	1822	1.070	--
总计		193083	100.000	20140			

图221 替米沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026031821批-pH4.5介质-桨法-50转-极限转速-片5
供试品溶液-1



PCH-962

＜样品信息＞

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$PCH-962 - 30-3/31-722-2 - zzp-2026031821p-rcqx-2-pH4.5jz-jf50z-p6-jx.lcd

方法文件名: RC\$PCH-962 - PCH-962-rcqx-tm-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$PCH-962 - 20260417-rcqx-FX280.lcb

样品瓶号: 4-53

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/04/18 03:50:04

处理时间(V2): 2026/04/18 15:40:33

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX280)

流 速:1.5ml/min


波 长: 230nm

版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 230nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.658	196774	100.000	20601	1830	1.073	--
总计		196774	100.000	20601			

图222 替米沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026031821批-pH4.5介质-桨法-50转-极限转速-片6
供试品溶液-1




PCH-962

＜样品信息＞

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-962 - 30-3/31-723-2 - zzp-2026031821p-rcqx-2-pH4.5jz-jf50z-dz2-1.lcd
方法文件名: RC\$PCH-962 - PCH-962-rcqx-tm-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-962 - 20260417-rcqx-FX280.lcb
样品瓶号: 4-27
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/04/18 03:54:29
处理时间(V2): 2026/04/18 15:40:35
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX280)

流 速:1.5ml/min
波 长: 230nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 230nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.648	722274	100.000	74188	1749	1.081	--
总计		722274	100.000	74188			

图223 替米沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026031821批-pH4.5介质-桨法-50转
对照品溶液-2-1



PCH-962

＜样品信息＞

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$PCH-962 - 30-3/31-724-2 - zzp-2026031821p-rcqx-2-pH4.5jz-jf50z-dz2-2.lcd

方法文件名: RC\$PCH-962 - PCH-962-rcqx-tm-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$PCH-962 - 20260417-rcqx-FX280.lcb

样品瓶号: 4-27

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/04/18 03:58:53

处理时间(V2): 2026/04/18 15:40:38

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX280)

流 速:1.5ml/min


波 长: 230nm

版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 230nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.649	722058	100.000	74119	1748	1.081	--
总计		722058	100.000	74119			

图224 替米沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026031821批-pH4.5介质-桨法-50转
对照品溶液-2-2



PCH-962

＜样品信息＞

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$PCH-962 - 30-5/28-1-2 - zzp-2026031721p-rcqx-1-pH4.5jz-jf50z-rj.lcd

方法文件名: RC\$PCH-962 - PCH-962-rcqx-tm-FX277.lcm

批处理文件名: RC\$PCH-962 - 20260417-rcqx-FX277.lcb

样品瓶号: 1-9

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/04/17 11:39:53

处理时间(V2): 2026/04/18 15:42:34

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX277)

流 速:1.5ml/min


波 长: 230nm

版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 230nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图225 替米沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026031721批-pH4.5介质-桨法-50转
溶剂



PCH-962

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$PCH-962 - 30-5/28-2-2 - zzp-2026031721p-rcqx-1-pH4.5jz-jf50z-dz1-1.lcd

方法文件名: RC\$PCH-962 - PCH-962-rcqx-tm-FX277.lcm

批处理文件名: RC\$PCH-962 - 20260417-rcqx-FX277.lcb

样品瓶号: 1-18

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/04/17 11:44:17

处理时间(V2): 2026/04/18 15:42:37

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX277)

流速:1.5ml/min


波长: 230nm

版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 230nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.748	732713	100.000	63976	1310	0.974	--
总计		732713	100.000	63976			

图226 替米沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026031721批-pH4.5介质-桨法-50转
对照品溶液-1-1



PCH-962

＜样品信息＞

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$PCH-962 - 30-5/28-3-2 - zzp-2026031721p-rcqx-1-pH4.5jz-jf50z-dz1-2.lcd

方法文件名: RC\$PCH-962 - PCH-962-rcqx-tm-FX277.lcm

批处理文件名: RC\$PCH-962 - 20260417-rcqx-FX277.lcb

样品瓶号: 1-18

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/04/17 11:48:42

处理时间(V2): 2026/04/18 15:42:40

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX277)

流速:1.5ml/min


波长: 230nm

版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 230nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.758	742200	100.000	63758	1281	0.977	--
总计		742200	100.000	63758			

图227 替米沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026031721批-pH4.5介质-桨法-50转
对照品溶液-1-2



PCH-962

＜样品信息＞

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$PCH-962 - 30-5/28-4-2 - zzp-2026031721p-rcqx-1-pH4.5jz-jf50z-dz1-3.lcd

方法文件名: RC\$PCH-962 - PCH-962-rcqx-tm-FX277.lcm

批处理文件名: RC\$PCH-962 - 20260417-rcqx-FX277.lcb

样品瓶号: 1-18

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/04/17 11:53:05

处理时间(V2): 2026/04/18 15:42:45

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX277)

流速:1.5ml/min


波长: 230nm

版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 230nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.740	731136	100.000	63451	1289	0.978	--
总计		731136	100.000	63451			

图228 替米沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026031721批-pH4.5介质-桨法-50转
对照品溶液-1-3



PCH-962

＜样品信息＞

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$PCH-962 - 30-5/28-5-2 - zzp-2026031721p-rcqx-1-pH4.5jz-jf50z-dz1-4.lcd

方法文件名: RC\$PCH-962 - PCH-962-rcqx-tm-FX277.lcm

批处理文件名: RC\$PCH-962 - 20260417-rcqx-FX277.lcb

样品瓶号: 1-18

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/04/17 11:57:28

处理时间(V2): 2026/04/18 15:42:48

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX277)

流 速:1.5ml/min


波 长: 230nm

版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 230nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.740	735641	100.000	63292	1266	0.974	--
总计		735641	100.000	63292			

图229 替米沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026031721批-pH4.5介质-桨法-50转
对照品溶液-1-4



PCH-962

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$PCH-962 - 30-5/28-6-2 - zzp-2026031721p-rcqx-1-pH4.5jz-jf50z-dz1-5.lcd

方法文件名: RC\$PCH-962 - PCH-962-rcqx-tm-FX277.lcm

批处理文件名: RC\$PCH-962 - 20260417-rcqx-FX277.lcb

样品瓶号: 1-18

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/04/17 12:01:52

处理时间(V2): 2026/04/18 15:42:50

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX277)

流 速:1.5ml/min


波 长: 230nm

版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 230nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.751	738831	100.000	63061	1255	0.973	--
总计		738831	100.000	63061			

图230 替米沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026031721批-pH4.5介质-桨法-50转
对照品溶液-1-5



PCH-962

＜样品信息＞

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$PCH-962 - 30-5/28-7-2 - zzp-2026031721p-rcqx-1-pH4.5jz-jf50z-p1-5min.lcd

方法文件名: RC\$PCH-962 - PCH-962-rcqx-tm-FX277.lcm

批处理文件名: RC\$PCH-962 - 20260417-rcqx-FX277.lcb

样品瓶号: 1-1

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/04/17 12:06:16

处理时间(V2): 2026/04/18 15:42:53

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX277)

流 速:1.5ml/min


波 长: 230nm

版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 230nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.758	46342	100.000	4032	1326	0.983	--
总计		46342	100.000	4032			

图231 替米沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026031721批-pH4.5介质-桨法-50转-5min-片1
供试品溶液-1



PCH-962

＜样品信息＞

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$PCH-962 - 30-5/28-8-2 - zzp-2026031721p-rcqx-1-pH4.5jz-jf50z-p2-5min.lcd

方法文件名: RC\$PCH-962 - PCH-962-rcqx-tm-FX277.lcm

批处理文件名: RC\$PCH-962 - 20260417-rcqx-FX277.lcb

样品瓶号: 1-10

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/04/17 12:10:40

处理时间(V2): 2026/04/18 15:42:56

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX277)

流 速:1.5ml/min


波 长: 230nm

版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 230nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.762	66813	100.000	5764	1295	0.970	--
总计		66813	100.000	5764			

图232 替米沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026031721批-pH4.5介质-桨法-50转-5min-片2
供试品溶液-1



PCH-962

＜样品信息＞

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$PCH-962 - 30-5/28-9-2 - zzp-2026031721p-rcqx-1-pH4.5jz-jf50z-p3-5min.lcd

方法文件名: RC\$PCH-962 - PCH-962-rcqx-tm-FX277.lcm

批处理文件名: RC\$PCH-962 - 20260417-rcqx-FX277.lcb

样品瓶号: 1-19

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/04/17 12:15:02

处理时间(V2): 2026/04/18 15:42:59

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX277)

流 速:1.5ml/min


波 长: 230nm

版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 230nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.757	53039	100.000	4627	1277	0.965	--
总计		53039	100.000	4627			

图233 替米沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026031721批-pH4.5介质-桨法-50转-5min-片3
供试品溶液-1



PCH-962

＜样品信息＞

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$PCH-962 - 30-5/28-10-2 - zzp-2026031721p-rcqx-1-pH4.5jz-jf50z-p4-5min.lcd

方法文件名: RC\$PCH-962 - PCH-962-rcqx-tm-FX277.lcm

批处理文件名: RC\$PCH-962 - 20260417-rcqx-FX277.lcb

样品瓶号: 1-28

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/04/17 12:19:25

处理时间(V2): 2026/04/18 15:43:02

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX277)

流 速:1.5ml/min


波 长: 230nm

版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 230nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.751	53186	100.000	4507	1233	0.947	--
总计		53186	100.000	4507			

图234 替米沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026031721批-pH4.5介质-桨法-50转-5min-片4
供试品溶液-1



PCH-962

＜样品信息＞

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$PCH-962 - 30-5/28-11-2 - zzp-2026031721p-rcqx-1-pH4.5jz-jf50z-p5-5min.lcd

方法文件名: RC\$PCH-962 - PCH-962-rcqx-tm-FX277.lcm

批处理文件名: RC\$PCH-962 - 20260417-rcqx-FX277.lcb

样品瓶号: 1-37

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/04/17 12:23:48

处理时间(V2): 2026/04/18 15:43:05

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX277)

流 速:1.5ml/min


波 长: 230nm

版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 230nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.751	60335	100.000	5216	1287	0.960	--
总计		60335	100.000	5216			

图235 替米沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026031721批-pH4.5介质-桨法-50转-5min-片5
供试品溶液-1



PCH-962

＜样品信息＞

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$PCH-962 - 30-5/28-12-2 - zzp-2026031721p-rcqx-1-pH4.5jz-jf50z-p6-5min.lcd

方法文件名: RC\$PCH-962 - PCH-962-rcqx-tm-FX277.lcm

批处理文件名: RC\$PCH-962 - 20260417-rcqx-FX277.lcb

样品瓶号: 1-46

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/04/17 12:28:11

处理时间(V2): 2026/04/18 15:43:08

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX277)

流 速:1.5ml/min


波 长: 230nm

版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 230nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.746	48430	100.000	4254	1309	0.968	--
总计		48430	100.000	4254			

图236 替米沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026031721批-pH4.5介质-浆法-50转-5min-片6
供试品溶液-1




PCH-962

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-962 - 30-5/28-13-2 - zzp-2026031721p-rcqx-1-pH4.5jz-jf50z-p1-10min.lcd
方法文件名: RC\$PCH-962 - PCH-962-rcqx-tm-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-962 - 20260417-rcqx-FX277.lcb
样品瓶号: 1-2
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/04/17 12:32:34
处理时间(V2): 2026/04/18 15:43:10
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX277)

流 速:1.5ml/min
波 长: 230nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 230nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.751	99581	100.000	8479	1252	0.959	--
总计		99581	100.000	8479			

图237 替米沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026031721批-pH4.5介质-浆法-50转-10min-片1
供试品溶液-1



PCH-962

＜样品信息＞

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$PCH-962 - 30-5/28-14-2 - zzp-2026031721p-rcqx-1-pH4.5jz-jf50z-p2-10min.lcd

方法文件名: RC\$PCH-962 - PCH-962-rcqx-tm-FX277.lcm

批处理文件名: RC\$PCH-962 - 20260417-rcqx-FX277.lcb

样品瓶号: 1-11

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/04/17 12:36:58

处理时间(V2): 2026/04/18 15:43:13

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX277)

流 速:1.5ml/min


波 长: 230nm

版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 230nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.751	128973	100.000	11055	1255	0.968	--
总计		128973	100.000	11055			

图238 替米沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026031721批-pH4.5介质-浆法-50转-10min-片2
供试品溶液-1




PCH-962

＜样品信息＞

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-962 - 30-5/28-15-2 - zzp-2026031721p-rcqx-1-pH4.5jz-jf50z-p3-10min.lcd
方法文件名: RC\$PCH-962 - PCH-962-rcqx-tm-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-962 - 20260417-rcqx-FX277.lcb
样品瓶号: 1-20
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/04/17 12:41:20
处理时间(V2): 2026/04/18 15:43:16
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX277)

流 速:1.5ml/min
波 长: 230nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 230nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.756	109456	100.000	9385	1260	0.978	--
总计		109456	100.000	9385			

图239 替米沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026031721批-pH4.5介质-浆法-50转-10min-片3
供试品溶液-1



PCH-962

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$PCH-962 - 30-5/28-16-2 - zzp-2026031721p-rcqx-1-pH4.5jz-jf50z-p4-10min.lcd

方法文件名: RC\$PCH-962 - PCH-962-rcqx-tm-FX277.lcm

批处理文件名: RC\$PCH-962 - 20260417-rcqx-FX277.lcb

样品瓶号: 1-29

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/04/17 12:45:43

处理时间(V2): 2026/04/18 15:43:19

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX277)

流 速:1.5ml/min


波 长: 230nm

版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 230nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.754	105191	100.000	9083	1276	0.959	--
总计		105191	100.000	9083			

图240 替米沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026031721批-pH4.5介质-浆法-50转-10min-片4
供试品溶液-1



PCH-962

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$PCH-962 - 30-5/28-17-2 - zzp-2026031721p-rcqx-1-pH4.5jz-jf50z-p5-10min.lcd

方法文件名: RC\$PCH-962 - PCH-962-rcqx-tm-FX277.lcm

批处理文件名: RC\$PCH-962 - 20260417-rcqx-FX277.lcb

样品瓶号: 1-38

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/04/17 12:50:05

处理时间(V2): 2026/04/18 15:43:22

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX277)

流 速:1.5ml/min


波 长: 230nm

版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 230nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.752	124917	100.000	10723	1251	0.966	--
总计		124917	100.000	10723			

图241 替米沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026031721批-pH4.5介质-浆法-50转-10min-片5
供试品溶液-1



PCH-962

＜样品信息＞

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$PCH-962 - 30-5/28-18-2 - zzp-2026031721p-rcqx-1-pH4.5jz-jf50z-p6-10min.lcd

方法文件名: RC\$PCH-962 - PCH-962-rcqx-tm-FX277.lcm

批处理文件名: RC\$PCH-962 - 20260417-rcqx-FX277.lcb

样品瓶号: 1-47

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/04/17 12:54:28

处理时间(V2): 2026/04/18 15:43:25

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX277)

流 速:1.5ml/min


波 长: 230nm

版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 230nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.747	115020	100.000	9913	1261	0.960	--
总计		115020	100.000	9913			

图242 替米沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026031721批-pH4.5介质-浆法-50转-10min-片6
供试品溶液-1



PCH-962

＜样品信息＞

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$PCH-962 - 30-5/28-19-2 - zzp-2026031721p-rcqx-1-pH4.5jz-jf50z-p1-15min.lcd

方法文件名: RC\$PCH-962 - PCH-962-rcqx-tm-FX277.lcm

批处理文件名: RC\$PCH-962 - 20260417-rcqx-FX277.lcb

样品瓶号: 1-3

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/04/17 12:58:51

处理时间(V2): 2026/04/18 15:43:28

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX277)

流 速:1.5ml/min


波 长: 230nm

版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 230nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.757	123564	100.000	10658	1277	0.955	--
总计		123564	100.000	10658			

图243 替米沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026031721批-pH4.5介质-浆法-50转-15min-片1
供试品溶液-1



PCH-962

＜样品信息＞

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$PCH-962 - 30-5/28-20-2 - zzp-2026031721p-rcqx-1-pH4.5jz-jf50z-p2-15min.lcd

方法文件名: RC\$PCH-962 - PCH-962-rcqx-tm-FX277.lcm

批处理文件名: RC\$PCH-962 - 20260417-rcqx-FX277.lcb

样品瓶号: 1-12

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/04/17 13:03:14

处理时间(V2): 2026/04/18 15:43:31

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX277)

流 速:1.5ml/min


波 长: 230nm

版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 230nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.752	149777	100.000	12591	1227	1.002	--
总计		149777	100.000	12591			

图244 替米沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026031721批-pH4.5介质-浆法-50转-15min-片2
供试品溶液-1



PCH-962

＜样品信息＞

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$PCH-962 - 30-5/28-21-2 - zzp-2026031721p-rcqx-1-pH4.5jz-jf50z-p3-15min.lcd

方法文件名: RC\$PCH-962 - PCH-962-rcqx-tm-FX277.lcm

批处理文件名: RC\$PCH-962 - 20260417-rcqx-FX277.lcb

样品瓶号: 1-21

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/04/17 13:07:37

处理时间(V2): 2026/04/18 15:43:34

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX277)

流 速:1.5ml/min


波 长: 230nm

版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 230nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.751	154319	100.000	13036	1230	0.960	--
总计		154319	100.000	13036			

图245 替米沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026031721批-pH4.5介质-浆法-50转-15min-片3
供试品溶液-1



PCH-962

＜样品信息＞

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$PCH-962 - 30-5/28-22-2 - zzp-2026031721p-rcqx-1-pH4.5jz-jf50z-p4-15min.lcd

方法文件名: RC\$PCH-962 - PCH-962-rcqx-tm-FX277.lcm

批处理文件名: RC\$PCH-962 - 20260417-rcqx-FX277.lcb

样品瓶号: 1-30

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/04/17 13:11:59

处理时间(V2): 2026/04/18 15:43:37

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX277)

流 速:1.5ml/min


波 长: 230nm

版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 230nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.752	152671	100.000	12939	1231	0.964	--
总计		152671	100.000	12939			

图246 替米沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026031721批-pH4.5介质-浆法-50转-15min-片4
供试品溶液-1



PCH-962

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$PCH-962 - 30-5/28-23-2 - zzp-2026031721p-rcqx-1-pH4.5jz-jf50z-p5-15min.lcd

方法文件名: RC\$PCH-962 - PCH-962-rcqx-tm-FX277.lcm

批处理文件名: RC\$PCH-962 - 20260417-rcqx-FX277.lcb

样品瓶号: 1-39

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/04/17 13:16:22

处理时间(V2): 2026/04/18 15:43:40

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX277)

流 速:1.5ml/min


波 长: 230nm

版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 230nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.747	158311	100.000	13470	1231	0.965	--
总计		158311	100.000	13470			

图247 替米沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026031721批-pH4.5介质-浆法-50转-15min-片5
供试品溶液-1



PCH-962

＜样品信息＞

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$PCH-962 - 30-5/28-24-2 - zzp-2026031721p-rcqx-1-pH4.5jz-jf50z-p6-15min.lcd

方法文件名: RC\$PCH-962 - PCH-962-rcqx-tm-FX277.lcm

批处理文件名: RC\$PCH-962 - 20260417-rcqx-FX277.lcb

样品瓶号: 1-48

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/04/17 13:20:45

处理时间(V2): 2026/04/18 15:43:43

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX277)

流 速:1.5ml/min


波 长: 230nm

版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 230nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.752	161549	100.000	13767	1243	0.962	--
总计		161549	100.000	13767			

图248 替米沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026031721批-pH4.5介质-浆法-50转-15min-片6
供试品溶液-1




PCH-962

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-962 - 30-5/28-25-2 - zzp-2026031721p-rcqx-1-pH4.5jz-jf50z-p1-20min.lcd
方法文件名: RC\$PCH-962 - PCH-962-rcqx-tm-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-962 - 20260417-rcqx-FX277.lcb
样品瓶号: 1-4
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/04/17 13:25:08
处理时间(V2): 2026/04/18 15:43:46
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX277)

流 速:1.5ml/min
波 长: 230nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 230nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.753	163926	100.000	13979	1233	0.960	--
总计		163926	100.000	13979			

图249 替米沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026031721批-pH4.5介质-浆法-50转-20min-片1
供试品溶液-1



PCH-962

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$PCH-962 - 30-5/28-26-2 - zzp-2026031721p-rcqx-1-pH4.5jz-jf50z-p2-20min.lcd

方法文件名: RC\$PCH-962 - PCH-962-rcqx-tm-FX277.lcm

批处理文件名: RC\$PCH-962 - 20260417-rcqx-FX277.lcb

样品瓶号: 1-13

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/04/17 13:29:31

处理时间(V2): 2026/04/18 15:43:49

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX277)

流 速:1.5ml/min


波 长: 230nm

版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 230nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.748	176064	100.000	14937	1234	0.962	--
总计		176064	100.000	14937			

图250 替米沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026031721批-pH4.5介质-浆法-50转-20min-片2
供试品溶液-1



PCH-962

＜样品信息＞

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$PCH-962 - 30-5/28-27-2 - zzp-2026031721p-rcqx-1-pH4.5jz-jf50z-p3-20min.lcd

方法文件名: RC\$PCH-962 - PCH-962-rcqx-tm-FX277.lcm

批处理文件名: RC\$PCH-962 - 20260417-rcqx-FX277.lcb

样品瓶号: 1-22

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/04/17 13:33:53

处理时间(V2): 2026/04/18 15:43:52

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX277)

流 速:1.5ml/min


波 长: 230nm

版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 230nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.751	181836	100.000	15438	1235	0.967	--
总计		181836	100.000	15438			

图251 替米沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026031721批-pH4.5介质-浆法-50转-20min-片3
供试品溶液-1



PCH-962

＜样品信息＞

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$PCH-962 - 30-5/28-28-2 - zzp-2026031721p-rcqx-1-pH4.5jz-jf50z-p4-20min.lcd

方法文件名: RC\$PCH-962 - PCH-962-rcqx-tm-FX277.lcm

批处理文件名: RC\$PCH-962 - 20260417-rcqx-FX277.lcb

样品瓶号: 1-31

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/04/17 13:38:16

处理时间(V2): 2026/04/18 15:43:54

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX277)

流 速:1.5ml/min


波 长: 230nm

版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 230nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.743	177303	100.000	14959	1214	0.968	--
总计		177303	100.000	14959			

图252 替米沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026031721批-pH4.5介质-浆法-50转-20min-片4
供试品溶液-1



PCH-962

＜样品信息＞

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$PCH-962 - 30-5/28-29-2 - zzp-2026031721p-rcqx-1-pH4.5jz-jf50z-p5-20min.lcd

方法文件名: RC\$PCH-962 - PCH-962-rcqx-tm-FX277.lcm

批处理文件名: RC\$PCH-962 - 20260417-rcqx-FX277.lcb

样品瓶号: 1-40

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/04/17 13:42:39

处理时间(V2): 2026/04/18 15:43:57

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX277)

流 速:1.5ml/min


波 长: 230nm

版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 230nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.742	172303	100.000	14635	1212	0.970	--
总计		172303	100.000	14635			

图253 替米沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026031721批-pH4.5介质-浆法-50转-20min-片5
供试品溶液-1



PCH-962

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$PCH-962 - 30-5/28-30-2 - zzp-2026031721p-rcqx-1-pH4.5jz-jf50z-p6-20min.lcd

方法文件名: RC\$PCH-962 - PCH-962-rcqx-tm-FX277.lcm

批处理文件名: RC\$PCH-962 - 20260417-rcqx-FX277.lcb

样品瓶号: 1-49

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/04/17 13:47:02

处理时间(V2): 2026/04/18 15:44:00

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX277)

流速:1.5ml/min


波长: 230nm

版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 230nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.743	191082	100.000	16132	1208	0.968	--
总计		191082	100.000	16132			

图254 替米沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026031721批-pH4.5介质-浆法-50转-20min-片6
供试品溶液-1



PCH-962

＜样品信息＞

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$PCH-962 - 30-5/28-31-2 - zzp-2026031721p-rcqx-1-pH4.5jz-jf50z-p1-30min.lcd

方法文件名: RC\$PCH-962 - PCH-962-rcqx-tm-FX277.lcm

批处理文件名: RC\$PCH-962 - 20260417-rcqx-FX277.lcb

样品瓶号: 1-5

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/04/17 13:51:24

处理时间(V2): 2026/04/18 15:44:03

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX277)

流 速:1.5ml/min


波 长: 230nm

版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 230nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.744	179250	100.000	15133	1210	0.964	--
总计		179250	100.000	15133			

图255 替米沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026031721批-pH4.5介质-浆法-50转-30min-片1
供试品溶液-1



PCH-962

＜样品信息＞

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$PCH-962 - 30-5/28-32-2 - zzp-2026031721p-rcqx-1-pH4.5jz-jf50z-p2-30min.lcd

方法文件名: RC\$PCH-962 - PCH-962-rcqx-tm-FX277.lcm

批处理文件名: RC\$PCH-962 - 20260417-rcqx-FX277.lcb

样品瓶号: 1-14

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/04/17 13:55:47

处理时间(V2): 2026/04/18 15:44:06

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX277)

流 速:1.5ml/min


波 长: 230nm

版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 230nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.747	183874	100.000	15569	1211	0.962	--
总计		183874	100.000	15569			

图256 替米沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026031721批-pH4.5介质-浆法-50转-30min-片2
供试品溶液-1




PCH-962

＜样品信息＞

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-962 - 30-5/28-33-2 - zzp-2026031721p-rcqx-1-pH4.5jz-jf50z-p3-30min.lcd
方法文件名: RC\$PCH-962 - PCH-962-rcqx-tm-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-962 - 20260417-rcqx-FX277.lcb
样品瓶号: 1-23
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/04/17 14:00:10
处理时间(V2): 2026/04/18 15:44:09
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX277)

流 速:1.5ml/min
波 长: 230nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 230nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.744	191998	100.000	16073	1195	0.965	--
总计		191998	100.000	16073			

图257 替米沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026031721批-pH4.5介质-浆法-50转-30min-片3
供试品溶液-1



PCH-962

＜样品信息＞

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$PCH-962 - 30-5/28-34-2 - zzp-2026031721p-rcqx-1-pH4.5jz-jf50z-p4-30min.lcd

方法文件名: RC\$PCH-962 - PCH-962-rcqx-tm-FX277.lcm

批处理文件名: RC\$PCH-962 - 20260417-rcqx-FX277.lcb

样品瓶号: 1-32

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/04/17 14:04:34

处理时间(V2): 2026/04/18 15:44:12

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX277)

流 速:1.5ml/min


波 长: 230nm

版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 230nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.748	188825	100.000	15830	1197	0.961	--
总计		188825	100.000	15830			

图258 替米沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026031721批-pH4.5介质-浆法-50转-30min-片4
供试品溶液-1



PCH-962

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$PCH-962 - 30-5/28-35-2 - zzp-2026031721p-rcqx-1-pH4.5jz-jf50z-p5-30min.lcd

方法文件名: RC\$PCH-962 - PCH-962-rcqx-tm-FX277.lcm

批处理文件名: RC\$PCH-962 - 20260417-rcqx-FX277.lcb

样品瓶号: 1-41

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/04/17 14:08:57

处理时间(V2): 2026/04/18 15:44:15

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX277)

流 速:1.5ml/min


波 长: 230nm

版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 230nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.745	189041	100.000	15891	1193	0.964	--
总计		189041	100.000	15891			

图259 替米沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026031721批-pH4.5介质-浆法-50转-30min-片5
供试品溶液-1



PCH-962

＜样品信息＞

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$PCH-962 - 30-5/28-36-2 - zzp-2026031721p-rcqx-1-pH4.5jz-jf50z-p6-30min.lcd

方法文件名: RC\$PCH-962 - PCH-962-rcqx-tm-FX277.lcm

批处理文件名: RC\$PCH-962 - 20260417-rcqx-FX277.lcb

样品瓶号: 1-50

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/04/17 14:13:20

处理时间(V2): 2026/04/18 15:44:17

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX277)

流 速:1.5ml/min


波 长: 230nm

版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 230nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.750	195247	100.000	16278	1193	0.967	--
总计		195247	100.000	16278			

图260 替米沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026031721批-pH4.5介质-浆法-50转-30min-片6
供试品溶液-1



PCH-962

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$PCH-962 - 30-5/28-37-2 - zzp-2026031721p-rcqx-1-pH4.5jz-jf50z-p1-45min.lcd

方法文件名: RC\$PCH-962 - PCH-962-rcqx-tm-FX277.lcm

批处理文件名: RC\$PCH-962 - 20260417-rcqx-FX277.lcb

样品瓶号: 1-6

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/04/17 14:17:43

处理时间(V2): 2026/04/18 15:44:21

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX277)

流 速:1.5ml/min


波 长: 230nm

版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 230nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.742	194747	100.000	16351	1191	0.965	--
总计		194747	100.000	16351			

图261 替米沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026031721批-pH4.5介质-浆法-50转-45min-片1
供试品溶液-1



PCH-962

＜样品信息＞

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$PCH-962 - 30-5/28-38-2 - zzp-2026031721p-rcqx-1-pH4.5jz-jf50z-p2-45min.lcd

方法文件名: RC\$PCH-962 - PCH-962-rcqx-tm-FX277.lcm

批处理文件名: RC\$PCH-962 - 20260417-rcqx-FX277.lcb

样品瓶号: 1-15

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/04/17 14:22:08

处理时间(V2): 2026/04/18 15:44:24

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX277)

流 速:1.5ml/min


波 长: 230nm

版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 230nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.743	191491	100.000	16071	1187	0.962	--
总计		191491	100.000	16071			

图262 替米沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026031721批-pH4.5介质-浆法-50转-45min-片2
供试品溶液-1



PCH-962

＜样品信息＞

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$PCH-962 - 30-5/28-39-2 - zzp-2026031721p-rcqx-1-pH4.5jz-jf50z-p3-45min.lcd

方法文件名: RC\$PCH-962 - PCH-962-rcqx-tm-FX277.lcm

批处理文件名: RC\$PCH-962 - 20260417-rcqx-FX277.lcb

样品瓶号: 1-24

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/04/17 14:32:18

处理时间(V2): 2026/04/18 15:44:27

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX277)

流 速:1.5ml/min


波 长: 230nm

版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 230nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.679	192677	100.000	18368	1520	0.943	--
总计		192677	100.000	18368			

图263 替米沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026031721批-pH4.5介质-浆法-50转-45min-片3
供试品溶液-1



PCH-962

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$PCH-962 - 30-5/28-40-2 - zzp-2026031721p-rcqx-1-pH4.5jz-jf50z-p4-45min.lcd

方法文件名: RC\$PCH-962 - PCH-962-rcqx-tm-FX277.lcm

批处理文件名: RC\$PCH-962 - 20260417-rcqx-FX277.lcb

样品瓶号: 1-33

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/04/17 14:36:40

处理时间(V2): 2026/04/18 15:44:30

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX277)

流 速:1.5ml/min


波 长: 230nm

版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 230nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.672	191862	100.000	18352	1518	0.955	--
总计		191862	100.000	18352			

图264 替米沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026031721批-pH4.5介质-浆法-50转-45min-片4
供试品溶液-1



PCH-962

＜样品信息＞

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$PCH-962 - 30-5/28-41-2 - zzp-2026031721p-rcqx-1-pH4.5jz-jf50z-p5-45min.lcd

方法文件名: RC\$PCH-962 - PCH-962-rcqx-tm-FX277.lcm

批处理文件名: RC\$PCH-962 - 20260417-rcqx-FX277.lcb

样品瓶号: 1-42

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/04/17 14:41:03

处理时间(V2): 2026/04/18 15:44:33

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX277)

流 速:1.5ml/min


波 长: 230nm

版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 230nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.663	194006	100.000	18554	1501	0.955	--
总计		194006	100.000	18554			

图265 替米沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026031721批-pH4.5介质-浆法-50转-45min-片5
供试品溶液-1




PCH-962

＜样品信息＞

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-962 - 30-5/28-42-2 - zzp-2026031721p-rcqx-1-pH4.5jz-jf50z-p6-45min.lcd
方法文件名: RC\$PCH-962 - PCH-962-rcqx-tm-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-962 - 20260417-rcqx-FX277.lcb
样品瓶号: 1-51
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/04/17 14:45:26
处理时间(V2): 2026/04/18 15:44:36
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX277)

流 速:1.5ml/min
波 长: 230nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 230nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.658	198650	100.000	18831	1479	0.944	--
总计		198650	100.000	18831			

图266 替米沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026031721批-pH4.5介质-浆法-50转-45min-片6
供试品溶液-1




PCH-962

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-962 - 30-5/28-43-2 - zzp-2026031721p-rcqx-1-pH4.5jz-jf50z-p1-60min.lcd
方法文件名: RC\$PCH-962 - PCH-962-rcqx-tm-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-962 - 20260417-rcqx-FX277.lcb
样品瓶号: 1-7
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/04/17 14:49:49
处理时间(V2): 2026/04/18 15:44:39
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX277)

流 速:1.5ml/min
波 长: 230nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 230nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.660	192435	100.000	18119	1467	0.942	--
总计		192435	100.000	18119			

图267 替米沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026031721批-pH4.5介质-浆法-50转-60min-片1
供试品溶液-1



PCH-962

＜样品信息＞

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$PCH-962 - 30-5/28-44-2 - zzp-2026031721p-rcqx-1-pH4.5jz-jf50z-p2-60min.lcd

方法文件名: RC\$PCH-962 - PCH-962-rcqx-tm-FX277.lcm

批处理文件名: RC\$PCH-962 - 20260417-rcqx-FX277.lcb

样品瓶号: 1-16

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/04/17 14:54:11

处理时间(V2): 2026/04/18 15:44:42

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX277)

流 速:1.5ml/min


波 长: 230nm

版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 230nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.662	189364	100.000	17994	1478	0.949	--
总计		189364	100.000	17994			

图268 替米沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026031721批-pH4.5介质-浆法-50转-60min-片2
供试品溶液-1



PCH-962

＜样品信息＞

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$PCH-962 - 30-5/28-45-2 - zzp-2026031721p-rcqx-1-pH4.5jz-jf50z-p3-60min.lcd

方法文件名: RC\$PCH-962 - PCH-962-rcqx-tm-FX277.lcm

批处理文件名: RC\$PCH-962 - 20260417-rcqx-FX277.lcb

样品瓶号: 1-25

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/04/17 14:58:34

处理时间(V2): 2026/04/18 15:44:45

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX277)

流 速:1.5ml/min


波 长: 230nm

版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 230nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.662	189841	100.000	18004	1478	0.949	--
总计		189841	100.000	18004			

图269 替米沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026031721批-pH4.5介质-浆法-50转-60min-片3
供试品溶液-1



PCH-962

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$PCH-962 - 30-5/28-46-2 - zzp-2026031721p-rcqx-1-pH4.5jz-jf50z-p4-60min.lcd

方法文件名: RC\$PCH-962 - PCH-962-rcqx-tm-FX277.lcm

批处理文件名: RC\$PCH-962 - 20260417-rcqx-FX277.lcb

样品瓶号: 1-34

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/04/17 15:02:57

处理时间(V2): 2026/04/18 15:44:48

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX277)

流 速:1.5ml/min


波 长: 230nm

版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 230nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.659	193084	100.000	18399	1491	0.954	--
总计		193084	100.000	18399			

图270 替米沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026031721批-pH4.5介质-浆法-50转-60min-片4
供试品溶液-1



PCH-962

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$PCH-962 - 30-5/28-47-2 - zzp-2026031721p-rcqx-1-pH4.5jz-jf50z-p5-60min.lcd

方法文件名: RC\$PCH-962 - PCH-962-rcqx-tm-FX277.lcm

批处理文件名: RC\$PCH-962 - 20260417-rcqx-FX277.lcb

样品瓶号: 1-43

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/04/17 15:07:20

处理时间(V2): 2026/04/18 15:44:51

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX277)

流速:1.5ml/min


波长: 230nm

版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 230nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.661	193004	100.000	18397	1482	0.949	--
总计		193004	100.000	18397			

图271 替米沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026031721批-pH4.5介质-浆法-50转-60min-片5
供试品溶液-1



PCH-962

＜样品信息＞

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$PCH-962 - 30-5/28-48-2 - zzp-2026031721p-rcqx-1-pH4.5jz-jf50z-p6-60min.lcd

方法文件名: RC\$PCH-962 - PCH-962-rcqx-tm-FX277.lcm

批处理文件名: RC\$PCH-962 - 20260417-rcqx-FX277.lcb

样品瓶号: 1-52

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/04/17 15:11:42

处理时间(V2): 2026/04/18 15:44:54

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX277)

流 速:1.5ml/min


波 长: 230nm

版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 230nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.660	198020	100.000	18753	1467	0.953	--
总计		198020	100.000	18753			

图272 替米沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026031721批-pH4.5介质-浆法-50转-60min-片6
供试品溶液-1



PCH-962

＜样品信息＞

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$PCH-962 - 30-5/28-49-2 - zzp-2026031721p-rcqx-1-pH4.5jz-jf50z-p1-jx.lcd

方法文件名: RC\$PCH-962 - PCH-962-rcqx-tm-FX277.lcm

批处理文件名: RC\$PCH-962 - 20260417-rcqx-FX277.lcb

样品瓶号: 1-8

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/04/17 15:16:06

处理时间(V2): 2026/04/18 15:44:56

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX277)

流 速:1.5ml/min


波 长: 230nm

版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 230nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.668	199215	100.000	18872	1472	0.953	--
总计		199215	100.000	18872			

图273 替米沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026031721批-pH4.5介质-桨法-50转-极限转速-片1
供试品溶液-1




PCH-962

＜样品信息＞

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-962 - 30-5/28-50-2 - zzp-2026031721p-rcqx-1-pH4.5jz-jf50z-p2-jx.lcd
方法文件名: RC\$PCH-962 - PCH-962-rcqx-tm-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-962 - 20260417-rcqx-FX277.lcb
样品瓶号: 1-17
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/04/17 15:20:30
处理时间(V2): 2026/04/18 15:44:59
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX277)

流 速:1.5ml/min
波 长: 230nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 230nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.665	197103	100.000	18666	1479	0.950	--
总计		197103	100.000	18666			

图274 替米沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026031721批-pH4.5介质-桨法-50转-极限转速-片2
供试品溶液-1



PCH-962

＜样品信息＞

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$PCH-962 - 30-5/28-51-2 - zzp-2026031721p-rcqx-1-pH4.5jz-jf50z-p3-jx.lcd

方法文件名: RC\$PCH-962 - PCH-962-rcqx-tm-FX277.lcm

批处理文件名: RC\$PCH-962 - 20260417-rcqx-FX277.lcb

样品瓶号: 1-26

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/04/17 15:24:52

处理时间(V2): 2026/04/18 15:45:02

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX277)

流 速:1.5ml/min


波 长: 230nm

版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 230nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.672	195625	100.000	18716	1507	0.953	--
总计		195625	100.000	18716			

图275 替米沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026031721批-pH4.5介质-桨法-50转-极限转速-片3
供试品溶液-1



PCH-962

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$PCH-962 - 30-5/28-52-2 - zzp-2026031721p-rcqx-1-pH4.5jz-jf50z-p4-jx.lcd

方法文件名: RC\$PCH-962 - PCH-962-rcqx-tm-FX277.lcm

批处理文件名: RC\$PCH-962 - 20260417-rcqx-FX277.lcb

样品瓶号: 1-35

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/04/17 15:29:16

处理时间(V2): 2026/04/18 15:45:05

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX277)

流 速:1.5ml/min


波 长: 230nm

版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 230nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.668	197029	100.000	18736	1487	0.953	--
总计		197029	100.000	18736			

图276 替米沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026031721批-pH4.5介质-桨法-50转-极限转速-片4
供试品溶液-1



PCH-962

＜样品信息＞

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$PCH-962 - 30-5/28-53-2 - zzp-2026031721p-rcqx-1-pH4.5jz-jf50z-p5-jx.lcd

方法文件名: RC\$PCH-962 - PCH-962-rcqx-tm-FX277.lcm

批处理文件名: RC\$PCH-962 - 20260417-rcqx-FX277.lcb

样品瓶号: 1-44

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/04/17 15:33:41

处理时间(V2): 2026/04/18 15:45:08

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX277)

流 速:1.5ml/min


波 长: 230nm

版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 230nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.665	197613	100.000	18626	1452	0.948	--
总计		197613	100.000	18626			

图277 替米沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026031721批-pH4.5介质-桨法-50转-极限转速-片5
供试品溶液-1



PCH-962


＜样品信息＞

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-962 - 30-5/28-54-2 - zzp-2026031721p-rcqx-1-pH4.5jz-jf50z-p6-jx.lcd
方法文件名: RC\$PCH-962 - PCH-962-rcqx-tm-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-962 - 20260417-rcqx-FX277.lcb
样品瓶号: 1-53
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/04/17 15:38:05
处理时间(V2): 2026/04/18 15:45:11
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX277)

流 速:1.5ml/min
波 长: 230nm

版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 230nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.667	193586	100.000	18258	1462	0.952	--
总计		193586	100.000	18258			

图278 替米沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026031721批-pH4.5介质-桨法-50转-极限转速-片6
供试品溶液-1



PCH-962

＜样品信息＞

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$PCH-962 - 30-5/28-55-2 - zzp-2026031721p-rcqx-1-pH4.5jz-jf50z-dz2-1.lcd

方法文件名: RC\$PCH-962 - PCH-962-rcqx-tm-FX277.lcm

批处理文件名: RC\$PCH-962 - 20260417-rcqx-FX277.lcb

样品瓶号: 1-27

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/04/17 15:42:28

处理时间(V2): 2026/04/18 15:45:14

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX277)

流 速:1.5ml/min


波 长: 230nm

版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 230nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.655	738466	100.000	68345	1395	0.959	--
总计		738466	100.000	68345			

图279 替米沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026031721批-pH4.5介质-桨法-50转
对照品溶液-2-1



PCH-962

＜样品信息＞

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$PCH-962 - 30-5/28-56-2 - zzp-2026031721p-rcqx-1-pH4.5jz-jf50z-dz2-2.lcd

方法文件名: RC\$PCH-962 - PCH-962-rcqx-tm-FX277.lcm

批处理文件名: RC\$PCH-962 - 20260417-rcqx-FX277.lcb

样品瓶号: 1-27

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/04/17 15:46:50

处理时间(V2): 2026/04/18 15:45:17

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX277)

流速:1.5ml/min


波长: 230nm

版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 230nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.647	728486	100.000	68282	1427	0.958	--
总计		728486	100.000	68282			

图280 替米沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026031721批-pH4.5介质-桨法-50转
对照品溶液-2-2



PCH-962

＜样品信息＞

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$PCH-962 - 30-5/28-66-2 - zzp-2026031721p-rcqx-2-pH4.5jz-jf50z-rj.lcd

方法文件名: RC\$PCH-962 - PCH-962-rcqx-tm-FX277.lcm

批处理文件名: RC\$PCH-962 - 20260417-rcqx-FX277.lcb

样品瓶号: 2-9

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/04/17 16:35:04

处理时间(V2): 2026/04/18 15:45:20

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX277)

流 速:1.5ml/min


波 长: 230nm

版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 230nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图281 替米沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026031721批-pH4.5介质-桨法-50转
溶剂




PCH-962

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-962 - 30-5/28-67-2 - zzp-2026031721p-rcqx-2-pH4.5jz-jf50z-dz1-1.lcd
方法文件名: RC\$PCH-962 - PCH-962-rcqx-tm-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-962 - 20260417-rcqx-FX277.lcb
样品瓶号: 2-18
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/04/17 16:39:30
处理时间(V2): 2026/04/18 15:45:23
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX277)

流 速:1.5ml/min
波 长: 230nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 230nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.597	726636	100.000	63820	1238	1.245	--
总计		726636	100.000	63820			

图282 替米沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026031721批-pH4.5介质-桨法-50转
对照品溶液-1-1




PCH-962

＜样品信息＞

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-962 - 30-5/28-68-2 - zzp-2026031721p-rcqx-2-pH4.5jz-jf50z-dz1-2.lcd
方法文件名: RC\$PCH-962 - PCH-962-rcqx-tm-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-962 - 20260417-rcqx-FX277.lcb
样品瓶号: 2-18
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/04/17 16:43:55
处理时间(V2): 2026/04/18 15:45:26
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX277)

流 速:1.5ml/min
波 长: 230nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 230nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.612	723074	100.000	63641	1259	1.238	--
总计		723074	100.000	63641			

图283 替米沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026031721批-pH4.5介质-桨法-50转
对照品溶液-1-2




PCH-962

＜样品信息＞

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-962 - 30-5/28-69-2 - zzp-2026031721p-rcqx-2-pH4.5jz-jf50z-dz1-3.lcd
方法文件名: RC\$PCH-962 - PCH-962-rcqx-tm-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-962 - 20260417-rcqx-FX277.lcb
样品瓶号: 2-18
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/04/17 16:48:20
处理时间(V2): 2026/04/18 15:45:29
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX277)

流 速:1.5ml/min
波 长: 230nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 230nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.599	723475	100.000	63073	1225	1.250	--
总计		723475	100.000	63073			

图284 替米沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026031721批-pH4.5介质-桨法-50转
对照品溶液-1-3



PCH-962

＜样品信息＞

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$PCH-962 - 30-5/28-70-2 - zzp-2026031721p-rcqx-2-pH4.5jz-jf50z-dz1-4.lcd

方法文件名: RC\$PCH-962 - PCH-962-rcqx-tm-FX277.lcm

批处理文件名: RC\$PCH-962 - 20260417-rcqx-FX277.lcb

样品瓶号: 2-18

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/04/17 16:52:44

处理时间(V2): 2026/04/18 15:45:32

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX277)

流 速:1.5ml/min


波 长: 230nm

版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 230nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.599	732969	100.000	63114	1204	1.253	--
总计		732969	100.000	63114			

图285 替米沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026031721批-pH4.5介质-桨法-50转
对照品溶液-1-4




PCH-962

＜样品信息＞

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-962 - 30-5/28-71-2 - zzp-2026031721p-rcqx-2-pH4.5jz-jf50z-dz1-5.lcd
方法文件名: RC\$PCH-962 - PCH-962-rcqx-tm-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-962 - 20260417-rcqx-FX277.lcb
样品瓶号: 2-18
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/04/17 16:57:09
处理时间(V2): 2026/04/18 15:45:35
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX277)

流 速:1.5ml/min
波 长: 230nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 230nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.591	729967	100.000	62794	1191	1.264	--
总计		729967	100.000	62794			

图286 替米沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026031721批-pH4.5介质-桨法-50转
对照品溶液-1-5



PCH-962

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$PCH-962 - 30-5/28-72-2 - zzp-2026031721p-rcqx-2-pH4.5jz-jf50z-p1-5min.lcd

方法文件名: RC\$PCH-962 - PCH-962-rcqx-tm-FX277.lcm

批处理文件名: RC\$PCH-962 - 20260417-rcqx-FX277.lcb

样品瓶号: 2-1

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/04/17 17:01:34

处理时间(V2): 2026/04/18 15:45:38

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX277)

流 速:1.5ml/min


波 长: 230nm

版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 230nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.602	63791	100.000	5636	1234	1.274	--
总计		63791	100.000	5636			

图287 替米沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026031721批-pH4.5介质-桨法-50转-5min-片1
供试品溶液-1




PCH-962

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-962 - 30-5/28-73-2 - zzp-2026031721p-rcqx-2-pH4.5jz-jf50z-p2-5min.lcd
方法文件名: RC\$PCH-962 - PCH-962-rcqx-tm-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-962 - 20260417-rcqx-FX277.lcb
样品瓶号: 2-10
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/04/17 17:05:58
处理时间(V2): 2026/04/18 15:45:42
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX277)

流 速:1.5ml/min
波 长: 230nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 230nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.602	38231	100.000	3355	1269	1.359	--
总计		38231	100.000	3355			

图288 替米沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026031721批-pH4.5介质-桨法-50转-5min-片2
供试品溶液-1



PCH-962

＜样品信息＞

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$PCH-962 - 30-5/28-74-2 - zzp-2026031721p-rcqx-2-pH4.5jz-jf50z-p3-5min.lcd

方法文件名: RC\$PCH-962 - PCH-962-rcqx-tm-FX277.lcm

批处理文件名: RC\$PCH-962 - 20260417-rcqx-FX277.lcb

样品瓶号: 2-19

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/04/17 17:10:23

处理时间(V2): 2026/04/18 15:45:45

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX277)

流 速:1.5ml/min


波 长: 230nm

版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 230nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.601	53542	100.000	4727	1251	1.243	--
总计		53542	100.000	4727			

图289 替米沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026031721批-pH4.5介质-桨法-50转-5min-片3
供试品溶液-1



PCH-962

＜样品信息＞

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$PCH-962 - 30-5/28-75-2 - zzp-2026031721p-rcqx-2-pH4.5jz-jf50z-p4-5min.lcd

方法文件名: RC\$PCH-962 - PCH-962-rcqx-tm-FX277.lcm

批处理文件名: RC\$PCH-962 - 20260417-rcqx-FX277.lcb

样品瓶号: 2-28

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/04/17 17:14:48

处理时间(V2): 2026/04/18 15:45:48

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX277)

流速:1.5ml/min


波长: 230nm

版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 230nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.607	34156	100.000	3045	1283	1.221	--
总计		34156	100.000	3045			

图290 替米沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026031721批-pH4.5介质-桨法-50转-5min-片4
供试品溶液-1



PCH-962

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$PCH-962 - 30-5/28-76-2 - zzp-2026031721p-rcqx-2-pH4.5jz-jf50z-p5-5min.lcd

方法文件名: RC\$PCH-962 - PCH-962-rcqx-tm-FX277.lcm

批处理文件名: RC\$PCH-962 - 20260417-rcqx-FX277.lcb

样品瓶号: 2-37

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/04/17 17:19:11

处理时间(V2): 2026/04/18 15:45:51

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX277)

流速:1.5ml/min


波长: 230nm

版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 230nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.613	44132	100.000	3686	1179	1.376	--
总计		44132	100.000	3686			

图291 替米沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026031721批-pH4.5介质-桨法-50转-5min-片5
供试品溶液-1



PCH-962

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$PCH-962 - 30-5/28-77-2 - zzp-2026031721p-rcqx-2-pH4.5jz-jf50z-p6-5min.lcd

方法文件名: RC\$PCH-962 - PCH-962-rcqx-tm-FX277.lcm

批处理文件名: RC\$PCH-962 - 20260417-rcqx-FX277.lcb

样品瓶号: 2-46

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/04/17 17:23:35

处理时间(V2): 2026/04/18 15:45:54

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX277)

流速:1.5ml/min


波长: 230nm

版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 230nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.597	52723	100.000	4614	1210	1.292	--
总计		52723	100.000	4614			

图292 替米沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026031721批-pH4.5介质-桨法-50转-5min-片6
供试品溶液-1




PCH-962

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-962 - 30-5/28-78-2 - zzp-2026031721p-rcqx-2-pH4.5jz-jf50z-p1-10min.lcd
方法文件名: RC\$PCH-962 - PCH-962-rcqx-tm-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-962 - 20260417-rcqx-FX277.lcb
样品瓶号: 2-2
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/04/17 17:28:01
处理时间(V2): 2026/04/18 15:45:57
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX277)

流 速:1.5ml/min
波 长: 230nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 230nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.599	121481	100.000	10514	1209	1.280	--
总计		121481	100.000	10514			

图293 替米沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026031721批-pH4.5介质-浆法-50转-10min-片1
供试品溶液-1



PCH-962

＜样品信息＞

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$PCH-962 - 30-5/28-79-2 - zzp-2026031721p-rcqx-2-pH4.5jz-jf50z-p2-10min.lcd

方法文件名: RC\$PCH-962 - PCH-962-rcqx-tm-FX277.lcm

批处理文件名: RC\$PCH-962 - 20260417-rcqx-FX277.lcb

样品瓶号: 2-11

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/04/17 17:32:24

处理时间(V2): 2026/04/18 15:46:00

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX277)

流 速:1.5ml/min


波 长: 230nm

版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 230nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.599	95970	100.000	8429	1219	1.276	--
总计		95970	100.000	8429			

图294 替米沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026031721批-pH4.5介质-浆法-50转-10min-片2
供试品溶液-1



PCH-962

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$PCH-962 - 30-5/28-80-2 - zzp-2026031721p-rcqx-2-pH4.5jz-jf50z-p3-10min.lcd

方法文件名: RC\$PCH-962 - PCH-962-rcqx-tm-FX277.lcm

批处理文件名: RC\$PCH-962 - 20260417-rcqx-FX277.lcb

样品瓶号: 2-20

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/04/17 17:36:49

处理时间(V2): 2026/04/18 15:46:03

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX277)

流速:1.5ml/min


波长: 230nm

版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 230nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.592	120707	100.000	10449	1188	1.296	--
总计		120707	100.000	10449			

图295 替米沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026031721批-pH4.5介质-浆法-50转-10min-片3
供试品溶液-1




PCH-962

＜样品信息＞

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-962 - 30-5/28-81-2 - zzp-2026031721p-rcqx-2-pH4.5jz-jf50z-p4-10min.lcd
方法文件名: RC\$PCH-962 - PCH-962-rcqx-tm-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-962 - 20260417-rcqx-FX277.lcb
样品瓶号: 2-29
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/04/17 17:41:12
处理时间(V2): 2026/04/18 15:46:06
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX277)

流 速:1.5ml/min
波 长: 230nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 230nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.604	80524	100.000	6859	1176	1.283	--
总计		80524	100.000	6859			

图296 替米沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026031721批-pH4.5介质-浆法-50转-10min-片4
供试品溶液-1



PCH-962

＜样品信息＞

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$PCH-962 - 30-5/28-82-2 - zzp-2026031721p-rcqx-2-pH4.5jz-jf50z-p5-10min.lcd

方法文件名: RC\$PCH-962 - PCH-962-rcqx-tm-FX277.lcm

批处理文件名: RC\$PCH-962 - 20260417-rcqx-FX277.lcb

样品瓶号: 2-38

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/04/17 17:45:36

处理时间(V2): 2026/04/18 15:46:09

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX277)

流 速:1.5ml/min


波 长: 230nm

版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 230nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.600	89989	100.000	7663	1177	1.311	--
总计		89989	100.000	7663			

图297 替米沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026031721批-pH4.5介质-浆法-50转-10min-片5
供试品溶液-1



PCH-962

＜样品信息＞

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$PCH-962 - 30-5/28-83-2 - zzp-2026031721p-rcqx-2-pH4.5jz-jf50z-p6-10min.lcd

方法文件名: RC\$PCH-962 - PCH-962-rcqx-tm-FX277.lcm

批处理文件名: RC\$PCH-962 - 20260417-rcqx-FX277.lcb

样品瓶号: 2-47

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/04/17 17:50:01

处理时间(V2): 2026/04/18 15:46:12

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX277)

流 速:1.5ml/min


波 长: 230nm

版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 230nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.591	110160	100.000	9408	1178	1.329	--
总计		110160	100.000	9408			

图298 替米沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026031721批-pH4.5介质-浆法-50转-10min-片6
供试品溶液-1



PCH-962

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$PCH-962 - 30-5/28-84-2 - zzp-2026031721p-rcqx-2-pH4.5jz-jf50z-p1-15min.lcd

方法文件名: RC\$PCH-962 - PCH-962-rcqx-tm-FX277.lcm

批处理文件名: RC\$PCH-962 - 20260417-rcqx-FX277.lcb

样品瓶号: 2-3

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/04/17 17:54:26

处理时间(V2): 2026/04/18 15:46:15

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX277)

流速:1.5ml/min


波长: 230nm

版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 230nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.599	145430	100.000	12354	1170	1.338	--
总计		145430	100.000	12354			

图299 替米沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026031721批-pH4.5介质-浆法-50转-15min-片1
供试品溶液-1



PCH-962

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$PCH-962 - 30-5/28-85-2 - zzp-2026031721p-rcqx-2-pH4.5jz-jf50z-p2-15min.lcd

方法文件名: RC\$PCH-962 - PCH-962-rcqx-tm-FX277.lcm

批处理文件名: RC\$PCH-962 - 20260417-rcqx-FX277.lcb

样品瓶号: 2-12

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/04/17 17:58:50

处理时间(V2): 2026/04/18 15:46:18

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX277)

流速:1.5ml/min


波长: 230nm

版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 230nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.605	131599	100.000	11263	1209	1.295	--
总计		131599	100.000	11263			

图300 替米沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026031721批-pH4.5介质-浆法-50转-15min-片2
供试品溶液-1



PCH-962

＜样品信息＞

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$PCH-962 - 30-5/28-86-2 - zzp-2026031721p-rcqx-2-pH4.5jz-jf50z-p3-15min.lcd

方法文件名: RC\$PCH-962 - PCH-962-rcqx-tm-FX277.lcm

批处理文件名: RC\$PCH-962 - 20260417-rcqx-FX277.lcb

样品瓶号: 2-21

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/04/17 18:03:14

处理时间(V2): 2026/04/18 15:46:21

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX277)

流 速:1.5ml/min


波 长: 230nm

版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 230nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.595	151469	100.000	13083	1187	1.305	--
总计		151469	100.000	13083			

图301 替米沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026031721批-pH4.5介质-浆法-50转-15min-片3
供试品溶液-1



PCH-962

＜样品信息＞

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$PCH-962 - 30-5/28-87-2 - zzp-2026031721p-rcqx-2-pH4.5jz-jf50z-p4-15min.lcd

方法文件名: RC\$PCH-962 - PCH-962-rcqx-tm-FX277.lcm

批处理文件名: RC\$PCH-962 - 20260417-rcqx-FX277.lcb

样品瓶号: 2-30

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/04/17 18:07:38

处理时间(V2): 2026/04/18 15:46:27

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX277)

流速:1.5ml/min


波长: 230nm

版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 230nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.601	118606	100.000	10209	1186	1.303	--
总计		118606	100.000	10209			

图302 替米沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026031721批-pH4.5介质-浆法-50转-15min-片4
供试品溶液-1



PCH-962

＜样品信息＞

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$PCH-962 - 30-5/28-88-2 - zzp-2026031721p-rcqx-2-pH4.5jz-jf50z-p5-15min.lcd

方法文件名: RC\$PCH-962 - PCH-962-rcqx-tm-FX277.lcm

批处理文件名: RC\$PCH-962 - 20260417-rcqx-FX277.lcb

样品瓶号: 2-39

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/04/17 18:12:02

处理时间(V2): 2026/04/18 15:46:31

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX277)

流 速:1.5ml/min


波 长: 230nm

版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 230nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.608	121257	100.000	10367	1190	1.303	--
总计		121257	100.000	10367			

图303 替米沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026031721批-pH4.5介质-浆法-50转-15min-片5
供试品溶液-1



PCH-962

＜样品信息＞

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$PCH-962 - 30-5/28-89-2 - zzp-2026031721p-rcqx-2-pH4.5jz-jf50z-p6-15min.lcd

方法文件名: RC\$PCH-962 - PCH-962-rcqx-tm-FX277.lcm

批处理文件名: RC\$PCH-962 - 20260417-rcqx-FX277.lcb

样品瓶号: 2-48

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/04/17 18:16:28

处理时间(V2): 2026/04/18 15:46:34

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX277)

流速:1.5ml/min


波长: 230nm

版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 230nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.594	144595	100.000	12116	1158	1.339	--
总计		144595	100.000	12116			

图304 替米沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026031721批-pH4.5介质-浆法-50转-15min-片6
供试品溶液-1



PCH-962

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$PCH-962 - 30-5/28-90-2 - zzp-2026031721p-rcqx-2-pH4.5jz-jf50z-p1-20min.lcd

方法文件名: RC\$PCH-962 - PCH-962-rcqx-tm-FX277.lcm

批处理文件名: RC\$PCH-962 - 20260417-rcqx-FX277.lcb

样品瓶号: 2-4

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/04/17 18:20:52

处理时间(V2): 2026/04/18 15:46:38

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX277)

流 速:1.5ml/min


波 长: 230nm

版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 230nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.599	170786	100.000	14150	1162	1.369	--
总计		170786	100.000	14150			

图305 替米沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026031721批-pH4.5介质-浆法-50转-20min-片1
供试品溶液-1



PCH-962

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$PCH-962 - 30-5/28-91-2 - zzp-2026031721p-rcqx-2-pH4.5jz-jf50z-p2-20min.lcd

方法文件名: RC\$PCH-962 - PCH-962-rcqx-tm-FX277.lcm

批处理文件名: RC\$PCH-962 - 20260417-rcqx-FX277.lcb

样品瓶号: 2-13

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/04/17 18:25:18

处理时间(V2): 2026/04/18 15:46:42

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX277)

流速:1.5ml/min


波长: 230nm

版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 230nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.597	162928	100.000	13792	1148	1.353	--
总计		162928	100.000	13792			

图306 替米沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026031721批-pH4.5介质-浆法-50转-20min-片2
供试品溶液-1



PCH-962

＜样品信息＞

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$PCH-962 - 30-5/28-92-2 - zzp-2026031721p-rcqx-2-pH4.5jz-jf50z-p3-20min.lcd

方法文件名: RC\$PCH-962 - PCH-962-rcqx-tm-FX277.lcm

批处理文件名: RC\$PCH-962 - 20260417-rcqx-FX277.lcb

样品瓶号: 2-22

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/04/17 18:29:42

处理时间(V2): 2026/04/18 15:46:45

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX277)

流速:1.5ml/min


波长: 230nm

版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 230nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.587	178046	100.000	15133	1172	1.326	--
总计		178046	100.000	15133			

图307 替米沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026031721批-pH4.5介质-浆法-50转-20min-片3
供试品溶液-1



PCH-962

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$PCH-962 - 30-5/28-93-2 - zzp-2026031721p-rcqx-2-pH4.5jz-jf50z-p4-20min.lcd

方法文件名: RC\$PCH-962 - PCH-962-rcqx-tm-FX277.lcm

批处理文件名: RC\$PCH-962 - 20260417-rcqx-FX277.lcb

样品瓶号: 2-31

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/04/17 18:34:07

处理时间(V2): 2026/04/18 15:46:48

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX277)

流 速:1.5ml/min


波 长: 230nm

版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 230nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.605	147351	100.000	12479	1159	1.351	--
总计		147351	100.000	12479			

图308 替米沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026031721批-pH4.5介质-浆法-50转-20min-片4
供试品溶液-1



PCH-962

＜样品信息＞

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$PCH-962 - 30-5/28-94-2 - zzp-2026031721p-rcqx-2-pH4.5jz-jf50z-p5-20min.lcd

方法文件名: RC\$PCH-962 - PCH-962-rcqx-tm-FX277.lcm

批处理文件名: RC\$PCH-962 - 20260417-rcqx-FX277.lcb

样品瓶号: 2-40

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/04/17 18:38:31

处理时间(V2): 2026/04/18 15:46:51

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX277)

流 速:1.5ml/min


波 长: 230nm

版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 230nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.599	142208	100.000	11901	1154	1.344	--
总计		142208	100.000	11901			

图309 替米沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026031721批-pH4.5介质-浆法-50转-20min-片5
供试品溶液-1



PCH-962

＜样品信息＞

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$PCH-962 - 30-5/28-95-2 - zzp-2026031721p-rcqx-2-pH4.5jz-jf50z-p6-20min.lcd

方法文件名: RC\$PCH-962 - PCH-962-rcqx-tm-FX277.lcm

批处理文件名: RC\$PCH-962 - 20260417-rcqx-FX277.lcb

样品瓶号: 2-49

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/04/17 18:42:55

处理时间(V2): 2026/04/18 15:46:54

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX277)

流 速:1.5ml/min


波 长: 230nm

版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 230nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.611	166912	100.000	14080	1184	1.358	--
总计		166912	100.000	14080			

图310 替米沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026031721批-pH4.5介质-浆法-50转-20min-片6
供试品溶液-1



PCH-962

＜样品信息＞

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$PCH-962 - 30-5/28-96-2 - zzp-2026031721p-rcqx-2-pH4.5jz-jf50z-p1-30min.lcd

方法文件名: RC\$PCH-962 - PCH-962-rcqx-tm-FX277.lcm

批处理文件名: RC\$PCH-962 - 20260417-rcqx-FX277.lcb

样品瓶号: 2-5

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/04/17 18:47:21

处理时间(V2): 2026/04/18 15:46:57

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX277)

流 速:1.5ml/min


波 长: 230nm

版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 230nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.611	178816	100.000	15020	1171	1.360	--
总计		178816	100.000	15020			

图311 替米沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026031721批-pH4.5介质-浆法-50转-30min-片1
供试品溶液-1



PCH-962

＜样品信息＞

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$PCH-962 - 30-5/28-97-2 - zzp-2026031721p-rcqx-2-pH4.5jz-jf50z-p2-30min.lcd

方法文件名: RC\$PCH-962 - PCH-962-rcqx-tm-FX277.lcm

批处理文件名: RC\$PCH-962 - 20260417-rcqx-FX277.lcb

样品瓶号: 2-14

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/04/17 18:51:45

处理时间(V2): 2026/04/18 15:47:00

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX277)

流 速:1.5ml/min


波 长: 230nm

版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 230nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.610	186288	100.000	15520	1162	1.363	--
总计		186288	100.000	15520			

图312 替米沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026031721批-pH4.5介质-浆法-50转-30min-片2
供试品溶液-1




PCH-962

＜样品信息＞

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-962 - 30-5/28-98-2 - zzp-2026031721p-rcqx-2-pH4.5jz-jf50z-p3-30min.lcd
方法文件名: RC\$PCH-962 - PCH-962-rcqx-tm-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-962 - 20260417-rcqx-FX277.lcb
样品瓶号: 2-23
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/04/17 18:56:10
处理时间(V2): 2026/04/18 15:47:03
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX277)

流 速:1.5ml/min
波 长: 230nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 230nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.597	179064	100.000	14942	1146	1.373	--
总计		179064	100.000	14942			

图313 替米沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026031721批-pH4.5介质-浆法-50转-30min-片3
供试品溶液-1



PCH-962

＜样品信息＞

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$PCH-962 - 30-5/28-99-2 - zzp-2026031721p-rcqx-2-pH4.5jz-jf50z-p4-30min.lcd

方法文件名: RC\$PCH-962 - PCH-962-rcqx-tm-FX277.lcm

批处理文件名: RC\$PCH-962 - 20260417-rcqx-FX277.lcb

样品瓶号: 2-32

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/04/17 19:00:34

处理时间(V2): 2026/04/18 15:47:06

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX277)

流 速:1.5ml/min


波 长: 230nm

版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 230nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.596	174596	100.000	14615	1159	1.375	--
总计		174596	100.000	14615			

图314 替米沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026031721批-pH4.5介质-浆法-50转-30min-片4
供试品溶液-1



PCH-962

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$PCH-962 - 30-5/28-100-2 - zzp-2026031721p-rcqx-2-pH4.5jz-jf50z-p5-30min.lcd

方法文件名: RC\$PCH-962 - PCH-962-rcqx-tm-FX277.lcm

批处理文件名: RC\$PCH-962 - 20260417-rcqx-FX277.lcb

样品瓶号: 2-41

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/04/17 19:04:58

处理时间(V2): 2026/04/18 15:47:09

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX277)

流 速:1.5ml/min


波 长: 230nm

版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 230nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.602	164527	100.000	13752	1171	1.386	--
总计		164527	100.000	13752			

图315 替米沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026031721批-pH4.5介质-浆法-50转-30min-片5
供试品溶液-1



PCH-962

＜样品信息＞

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$PCH-962 - 30-5/28-101-2 - zzp-2026031721p-rcqx-2-pH4.5jz-jf50z-p6-30min.lcd

方法文件名: RC\$PCH-962 - PCH-962-rcqx-tm-FX277.lcm

批处理文件名: RC\$PCH-962 - 20260417-rcqx-FX277.lcb

样品瓶号: 2-50

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/04/17 19:09:23

处理时间(V2): 2026/04/18 15:47:12

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX277)

流 速:1.5ml/min


波 长: 230nm

版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 230nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.601	186790	100.000	15577	1164	1.390	--
总计		186790	100.000	15577			

图316 替米沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026031721批-pH4.5介质-浆法-50转-30min-片6
供试品溶液-1



PCH-962

＜样品信息＞

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$PCH-962 - 30-5/28-102-2 - zzp-2026031721p-rcqx-2-pH4.5jz-jf50z-p1-45min.lcd

方法文件名: RC\$PCH-962 - PCH-962-rcqx-tm-FX277.lcm

批处理文件名: RC\$PCH-962 - 20260417-rcqx-FX277.lcb

样品瓶号: 2-6

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/04/17 19:13:48

处理时间(V2): 2026/04/18 15:47:15

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX277)

流 速:1.5ml/min


波 长: 230nm

版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 230nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.594	194790	100.000	16240	1154	1.371	--
总计		194790	100.000	16240			

图317 替米沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026031721批-pH4.5介质-浆法-50转-45min-片1
供试品溶液-1



PCH-962

＜样品信息＞

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$PCH-962 - 30-5/28-103-2 - zzp-2026031721p-rcqx-2-pH4.5jz-jf50z-p2-45min.lcd

方法文件名: RC\$PCH-962 - PCH-962-rcqx-tm-FX277.lcm

批处理文件名: RC\$PCH-962 - 20260417-rcqx-FX277.lcb

样品瓶号: 2-15

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/04/17 19:18:13

处理时间(V2): 2026/04/18 15:47:18

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX277)

流 速:1.5ml/min


波 长: 230nm

版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 230nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.592	191082	100.000	16068	1164	1.383	--
总计		191082	100.000	16068			

图318 替米沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026031721批-pH4.5介质-浆法-50转-45min-片2
供试品溶液-1



PCH-962

＜样品信息＞

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$PCH-962 - 30-5/28-104-2 - zzp-2026031721p-rcqx-2-pH4.5jz-jf50z-p3-45min.lcd

方法文件名: RC\$PCH-962 - PCH-962-rcqx-tm-FX277.lcm

批处理文件名: RC\$PCH-962 - 20260417-rcqx-FX277.lcb

样品瓶号: 2-24

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/04/17 19:22:38

处理时间(V2): 2026/04/18 15:47:21

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX277)

流 速:1.5ml/min


波 长: 230nm

版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 230nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.578	187046	100.000	15681	1158	1.384	--
总计		187046	100.000	15681			

图319 替米沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026031721批-pH4.5介质-浆法-50转-45min-片3
供试品溶液-1



PCH-962

＜样品信息＞

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$PCH-962 - 30-5/28-105-2 - zzp-2026031721p-rcqx-2-pH4.5jz-jf50z-p4-45min.lcd

方法文件名: RC\$PCH-962 - PCH-962-rcqx-tm-FX277.lcm

批处理文件名: RC\$PCH-962 - 20260417-rcqx-FX277.lcb

样品瓶号: 2-33

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/04/17 19:27:02

处理时间(V2): 2026/04/18 15:47:24

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX277)

流 速:1.5ml/min


波 长: 230nm

版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 230nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.595	187934	100.000	15818	1174	1.385	--
总计		187934	100.000	15818			

图320 替米沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026031721批-pH4.5介质-浆法-50转-45min-片4
供试品溶液-1



PCH-962

＜样品信息＞

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$PCH-962 - 30-5/28-106-2 - zzp-2026031721p-rcqx-2-pH4.5jz-jf50z-p5-45min.lcd

方法文件名: RC\$PCH-962 - PCH-962-rcqx-tm-FX277.lcm

批处理文件名: RC\$PCH-962 - 20260417-rcqx-FX277.lcb

样品瓶号: 2-42

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/04/17 19:31:26

处理时间(V2): 2026/04/18 15:47:27

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX277)

流速:1.5ml/min


波长: 230nm

版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 230nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.581	193139	100.000	15947	1138	1.411	--
总计		193139	100.000	15947			

图321 替米沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026031721批-pH4.5介质-浆法-50转-45min-片5
供试品溶液-1



PCH-962

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$PCH-962 - 30-5/28-107-2 - zzp-2026031721p-rcqx-2-pH4.5jz-jf50z-p6-45min.lcd

方法文件名: RC\$PCH-962 - PCH-962-rcqx-tm-FX277.lcm

批处理文件名: RC\$PCH-962 - 20260417-rcqx-FX277.lcb

样品瓶号: 2-51

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/04/17 19:35:51

处理时间(V2): 2026/04/18 15:47:30

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX277)

流速:1.5ml/min


波长: 230nm

版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 230nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.586	192771	100.000	16117	1165	1.397	--
总计		192771	100.000	16117			

图322 替米沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026031721批-pH4.5介质-浆法-50转-45min-片6
供试品溶液-1



PCH-962

＜样品信息＞

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$PCH-962 - 30-5/28-108-2 - zzp-2026031721p-rcqx-2-pH4.5jz-jf50z-p1-60min.lcd

方法文件名: RC\$PCH-962 - PCH-962-rcqx-tm-FX277.lcm

批处理文件名: RC\$PCH-962 - 20260417-rcqx-FX277.lcb

样品瓶号: 2-7

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/04/17 19:40:15

处理时间(V2): 2026/04/18 15:47:33

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX277)

流 速:1.5ml/min


波 长: 230nm

版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 230nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.586	183712	100.000	15310	1166	1.392	--
总计		183712	100.000	15310			

图323 替米沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026031721批-pH4.5介质-浆法-50转-60min-片1
供试品溶液-1



PCH-962

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$PCH-962 - 30-5/28-109-2 - zzp-2026031721p-rcqx-2-pH4.5jz-jf50z-p2-60min.lcd

方法文件名: RC\$PCH-962 - PCH-962-rcqx-tm-FX277.lcm

批处理文件名: RC\$PCH-962 - 20260417-rcqx-FX277.lcb

样品瓶号: 2-16

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/04/17 19:44:41

处理时间(V2): 2026/04/18 15:47:36

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX277)

流速:1.5ml/min


波长: 230nm

版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 230nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.580	193165	100.000	16099	1170	1.399	--
总计		193165	100.000	16099			

图324 替米沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026031721批-pH4.5介质-浆法-50转-60min-片2
供试品溶液-1



PCH-962

＜样品信息＞

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$PCH-962 - 30-5/28-110-2 - zzp-2026031721p-rcqx-2-pH4.5jz-jf50z-p3-60min.lcd

方法文件名: RC\$PCH-962 - PCH-962-rcqx-tm-FX277.lcm

批处理文件名: RC\$PCH-962 - 20260417-rcqx-FX277.lcb

样品瓶号: 2-25

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/04/17 19:49:05

处理时间(V2): 2026/04/18 15:47:38

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX277)

流 速:1.5ml/min


波 长: 230nm

版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 230nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.583	193811	100.000	16255	1175	1.421	--
总计		193811	100.000	16255			

图325 替米沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026031721批-pH4.5介质-浆法-50转-60min-片3
供试品溶液-1



PCH-962

＜样品信息＞

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$PCH-962 - 30-5/28-111-2 - zzp-2026031721p-rcqx-2-pH4.5jz-jf50z-p4-60min.lcd

方法文件名: RC\$PCH-962 - PCH-962-rcqx-tm-FX277.lcm

批处理文件名: RC\$PCH-962 - 20260417-rcqx-FX277.lcb

样品瓶号: 2-34

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/04/17 19:53:31

处理时间(V2): 2026/04/18 15:47:41

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX277)

流速:1.5ml/min


波长: 230nm

版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 230nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.584	189090	100.000	15798	1173	1.414	--
总计		189090	100.000	15798			

图326 替米沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026031721批-pH4.5介质-浆法-50转-60min-片4
供试品溶液-1



PCH-962

＜样品信息＞

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$PCH-962 - 30-5/28-112-2 - zzp-2026031721p-rcqx-2-pH4.5jz-jf50z-p5-60min.lcd

方法文件名: RC\$PCH-962 - PCH-962-rcqx-tm-FX277.lcm

批处理文件名: RC\$PCH-962 - 20260417-rcqx-FX277.lcb

样品瓶号: 2-43

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/04/17 19:57:54

处理时间(V2): 2026/04/18 15:47:44

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX277)

流 速:1.5ml/min


波 长: 230nm

版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 230nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.590	189334	100.000	15834	1194	1.421	--
总计		189334	100.000	15834			

图327 替米沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026031721批-pH4.5介质-浆法-50转-60min-片5
供试品溶液-1



PCH-962

＜样品信息＞

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$PCH-962 - 30-5/28-113-2 - zzp-2026031721p-rcqx-2-pH4.5jz-jf50z-p6-60min.lcd

方法文件名: RC\$PCH-962 - PCH-962-rcqx-tm-FX277.lcm

批处理文件名: RC\$PCH-962 - 20260417-rcqx-FX277.lcb

样品瓶号: 2-52

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/04/17 20:02:19

处理时间(V2): 2026/04/18 15:47:47

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX277)

流速:1.5ml/min


波长: 230nm

版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 230nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.585	188770	100.000	15842	1194	1.412	--
总计		188770	100.000	15842			

图328 替米沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026031721批-pH4.5介质-浆法-50转-60min-片6
供试品溶液-1




PCH-962

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-962 - 30-5/28-114-2 - zzp-2026031721p-rcqx-2-pH4.5jz-jf50z-p1-jx.lcd
方法文件名: RC\$PCH-962 - PCH-962-rcqx-tm-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-962 - 20260417-rcqx-FX277.lcb
样品瓶号: 2-8
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/04/17 20:06:44
处理时间(V2): 2026/04/18 15:47:50
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX277)

流 速:1.5ml/min
波 长: 230nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 230nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.591	195716	100.000	16614	1207	1.401	--
总计		195716	100.000	16614			

图329 替米沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026031721批-pH4.5介质-桨法-50转-极限转速-片1
供试品溶液-1



PCH-962

＜样品信息＞

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$PCH-962 - 30-5/28-115-2 - zzp-2026031721p-rcqx-2-pH4.5jz-jf50z-p2-jx.lcd

方法文件名: RC\$PCH-962 - PCH-962-rcqx-tm-FX277.lcm

批处理文件名: RC\$PCH-962 - 20260417-rcqx-FX277.lcb

样品瓶号: 2-17

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/04/17 20:11:08

处理时间(V2): 2026/04/18 15:47:53

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX277)

流速:1.5ml/min


波长: 230nm

版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 230nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.582	190595	100.000	15995	1201	1.427	--
总计		190595	100.000	15995			

图330 替米沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026031721批-pH4.5介质-桨法-50转-极限转速-片2
供试品溶液-1



PCH-962

＜样品信息＞

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$PCH-962 - 30-5/28-116-2 - zzp-2026031721p-rcqx-2-pH4.5jz-jf50z-p3-jx.lcd

方法文件名: RC\$PCH-962 - PCH-962-rcqx-tm-FX277.lcm

批处理文件名: RC\$PCH-962 - 20260417-rcqx-FX277.lcb

样品瓶号: 2-26

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/04/17 20:15:34

处理时间(V2): 2026/04/18 15:47:56

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX277)

流 速:1.5ml/min


波 长: 230nm

版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 230nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.590	191835	100.000	16101	1200	1.420	--
总计		191835	100.000	16101			

图331 替米沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026031721批-pH4.5介质-桨法-50转-极限转速-片3
供试品溶液-1



PCH-962

＜样品信息＞

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$PCH-962 - 30-5/28-117-2 - zzp-2026031721p-rcqx-2-pH4.5jz-jf50z-p4-jx.lcd

方法文件名: RC\$PCH-962 - PCH-962-rcqx-tm-FX277.lcm

批处理文件名: RC\$PCH-962 - 20260417-rcqx-FX277.lcb

样品瓶号: 2-35

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/04/17 20:19:59

处理时间(V2): 2026/04/18 15:47:59

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX277)

流速:1.5ml/min


波长: 230nm

版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 230nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.579	196655	100.000	16490	1193	1.420	--
总计		196655	100.000	16490			

图332 替米沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026031721批-pH4.5介质-桨法-50转-极限转速-片4
供试品溶液-1



PCH-962

＜样品信息＞

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$PCH-962 - 30-5/28-118-2 - zzp-2026031721p-rcqx-2-pH4.5jz-jf50z-p5-jx.lcd

方法文件名: RC\$PCH-962 - PCH-962-rcqx-tm-FX277.lcm

批处理文件名: RC\$PCH-962 - 20260417-rcqx-FX277.lcb

样品瓶号: 2-44

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/04/17 20:24:24

处理时间(V2): 2026/04/18 15:48:02

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX277)

流速:1.5ml/min


波长: 230nm

版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 230nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.588	190791	100.000	15967	1197	1.415	--
总计		190791	100.000	15967			

图333 替米沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026031721批-pH4.5介质-桨法-50转-极限转速-片5
供试品溶液-1



PCH-962

＜样品信息＞

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$PCH-962 - 30-5/28-119-2 - zzp-2026031721p-rcqx-2-pH4.5jz-jf50z-p6-jx.lcd

方法文件名: RC\$PCH-962 - PCH-962-rcqx-tm-FX277.lcm

批处理文件名: RC\$PCH-962 - 20260417-rcqx-FX277.lcb

样品瓶号: 2-53

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/04/17 20:28:49

处理时间(V2): 2026/04/18 15:48:05

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX277)

流 速:1.5ml/min


波 长: 230nm

版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 230nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.589	194966	100.000	16402	1205	1.413	--
总计		194966	100.000	16402			

图334 替米沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026031721批-pH4.5介质-桨法-50转-极限转速-片6
供试品溶液-1



PCH-962

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$PCH-962 - 30-5/28-120-2 - zzp-2026031721p-rcqx-2-pH4.5jz-jf50z-dz2-1.lcd

方法文件名: RC\$PCH-962 - PCH-962-rcqx-tm-FX277.lcm

批处理文件名: RC\$PCH-962 - 20260417-rcqx-FX277.lcb

样品瓶号: 2-27

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/04/17 20:33:14

处理时间(V2): 2026/04/18 15:48:08

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX277)

流速:1.5ml/min


波长: 230nm

版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 230nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.586	732029	100.000	59369	1119	1.427	--
总计		732029	100.000	59369			

图335 替米沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026031721批-pH4.5介质-桨法-50转
对照品溶液-2-1



PCH-962

＜样品信息＞

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$PCH-962 - 30-5/28-121-2 - zzp-2026031721p-rcqx-2-pH4.5jz-jf50z-dz2-2.lcd

方法文件名: RC\$PCH-962 - PCH-962-rcqx-tm-FX277.lcm

批处理文件名: RC\$PCH-962 - 20260417-rcqx-FX277.lcb

样品瓶号: 2-27

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/04/17 20:37:38

处理时间(V2): 2026/04/18 15:48:11

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX277)

流速:1.5ml/min


波长: 230nm

版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 230nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.585	734004	100.000	59461	1127	1.431	--
总计		734004	100.000	59461			

图336 替米沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026031721批-pH4.5介质-桨法-50转
对照品溶液-2-2