



非布司他多替诺雷片项目信息

介质体积(ml)	900	取样体积(ml)	1.5	补液体积(ml)	1.5
对照品批号	241101	对照品来源	ZZ	对照品使用方法	直接使用
对照品含量(%)	99.69	对照品水分(%)	0	对照品稀释倍数	5000
标示量(mg)	2	供试品稀释倍数	1	系数	1

对照品溶液

序号	称样量(mg)	A ₁	A ₂	A ₃	A ₄	A ₅	A _{平均}	RSD%
1	11.24	36536	36622	36585	36613	36685	36608	0.15
2	11.37	36891	36965				36928	0.15

单位质量响应值		RSD%	判断
3256.94	3247.85	0.20	数据可信



操作者:

日期: 2026-08-09

复核者:

未审阅版本



供试品溶液-6042701批-多替诺雷-pH5.5

时间 (分钟)	样品	A ₁	A ₂	A _{平均}	溶出量(%)	平均(%)	RSD%	累计溶 出量(%)	平均(%)	RSD%
5min	1	10692	-	10692	29.495	31.84	8.62	29.50	31.84	8.62
	2	11898	-	11898	32.822			32.82		
	3	12433	-	12433	34.298			34.30		
	4	10012	-	10012	27.619			27.62		
	5	12505	-	12505	34.497			34.50		
	6	11710	-	11710	32.303			32.30		
10min	1	20503	-	20503	56.560	57.42	1.63	56.61	57.48	1.63
	2	21083	-	21083	58.160			58.21		
	3	21288	-	21288	58.726			58.78		
	4	20413	-	20413	56.312			56.36		
	5	20887	-	20887	57.619			57.68		
	6	20718	-	20718	57.153			57.21		
15min	1	24421	-	24421	67.368	67.43	1.24	67.51	67.58	1.24
	2	24529	-	24529	67.666			67.82		
	3	24911	-	24911	68.720			68.88		
	4	24567	-	24567	67.771			67.91		
	5	24135	-	24135	66.579			66.73		
	6	24103	-	24103	66.491			66.64		
20min	1	26588	-	26588	73.346	73.09	1.29	73.60	73.35	1.29
	2	26570	-	26570	73.297			73.56		
	3	26882	-	26882	74.157			74.43		
	4	26765	-	26765	73.834			74.09		
	5	26062	-	26062	71.895			72.16		
	6	26099	-	26099	71.997			72.26		
30min	1	28853	-	28853	79.594	79.12	1.61	79.97	79.50	1.60
	2	28675	-	28675	79.103			79.49		
	3	29139	-	29139	80.383			80.78		
	4	29147	-	29147	80.406			80.78		
	5	28100	-	28100	77.517			77.90		
	6	28170	-	28170	77.710			78.09		
45min	1	30552	-	30552	84.281	83.54	1.62	84.79	84.05	1.61
	2	30296	-	30296	83.575			84.09		
	3	30665	-	30665	84.593			85.12		
	4	30796	-	30796	84.954			85.46		
	5	29598	-	29598	81.650			82.16		
	6	29793	-	29793	82.188			82.70		
60min	1	30994	-	30994	85.501	85.59	1.59	86.15	86.24	1.58
	2	31130	-	31130	85.876			86.53		
	3	31475	-	31475	86.828			87.50		
	4	31587	-	31587	87.137			87.79		
	5	30270	-	30270	83.503			84.15		
	6	30697	-	30697	84.681			85.33		
极限	1	31710	-	31710	87.476	87.57	1.61	88.27	88.36	1.60
	2	31890	-	31890	87.972			88.77		
	3	32268	-	32268	89.015			89.83		
	4	32236	-	32236	88.927			89.72		
	5	30933	-	30933	85.332			86.12		
	6	31427	-	31427	86.695			87.48		



操作者:

日期: 2026-08-09

复核者:

未审阅版本



非布司他多替诺雷片项目信息

介质体积(ml)	900	取样体积(ml)	1.5	补液体积(ml)	1.5
对照品批号	101278-202405	对照品来源	中检所	对照品使用方法	直接使用
对照品含量(%)	99.9	对照品水分(%)	0	对照品稀释倍数	250
标示量(mg)	40	供试品稀释倍数	1	系数	1

对照品溶液

序号	称样量(mg)	A ₁	A ₂	A ₃	A ₄	A ₅	A _{平均}	RSD%
1	11.34	266517	266618	266410	266543	266372	266492	0.04
2	11.39	268445	268893				268669	0.12

单位质量响应值	RSD%	判断
23500.18	0.27	数据可信



操作者:

日期: 2026-08-09

复核者:

未审阅版本



供试品溶液-6042701批-非布司他-pH5.5

时间 (分钟)	样品	A ₁	A ₂	A _{平均}	溶出量(%)	平均(%)	RSD%	累计溶 出量(%)	平均(%)	RSD%
5min	1	92015	-	92015	35.139	38.34	8.67	35.14	38.34	8.67
	2	102787	-	102787	39.252			39.25		
	3	107858	-	107858	41.189			41.19		
	4	87805	-	87805	33.531			33.53		
	5	109625	-	109625	41.864			41.86		
	6	102223	-	102223	39.037			39.04		
10min	1	162930	-	162930	62.220	62.79	1.30	62.28	62.85	1.31
	2	166292	-	166292	63.503			63.57		
	3	167333	-	167333	63.901			63.97		
	4	161627	-	161627	61.722			61.78		
	5	164713	-	164713	62.901			62.97		
	6	163616	-	163616	62.482			62.55		
15min	1	187305	-	187305	71.528	71.62	1.21	71.69	71.79	1.21
	2	189034	-	189034	72.188			72.36		
	3	190901	-	190901	72.901			73.08		
	4	187727	-	187727	71.689			71.85		
	5	184559	-	184559	70.479			70.65		
	6	185830	-	185830	70.965			71.13		
20min	1	201481	-	201481	76.941	77.00	1.39	77.22	77.29	1.38
	2	203197	-	203197	77.597			77.89		
	3	204818	-	204818	78.216			78.51		
	4	203323	-	203323	77.645			77.92		
	5	197148	-	197148	75.287			75.58		
	6	199838	-	199838	76.314			76.60		
30min	1	219434	-	219434	83.797	83.46	1.74	84.21	83.88	1.73
	2	220155	-	220155	84.073			84.49		
	3	222036	-	222036	84.791			85.22		
	4	221473	-	221473	84.576			84.98		
	5	212011	-	212011	80.963			81.38		
	6	216272	-	216272	82.590			83.00		
45min	1	233244	-	233244	89.071	88.73	1.93	89.62	89.28	1.92
	2	234222	-	234222	89.445			90.01		
	3	236489	-	236489	90.310			90.88		
	4	235229	-	235229	89.829			90.38		
	5	224117	-	224117	85.586			86.14		
	6	230773	-	230773	88.127			88.68		
60min	1	239586	-	239586	91.493	91.65	2.08	92.19	92.35	2.07
	2	242112	-	242112	92.458			93.17		
	3	244303	-	244303	93.294			94.01		
	4	244174	-	244174	93.245			93.94		
	5	230911	-	230911	88.180			88.88		
	6	238910	-	238910	91.235			91.93		
极限	1	245365	-	245365	93.700	93.54	2.13	94.55	94.39	2.12
	2	246880	-	246880	94.278			95.14		
	3	250171	-	250171	95.535			96.41		
	4	248213	-	248213	94.787			95.64		
	5	235335	-	235335	89.870			90.71		
	6	243658	-	243658	93.048			93.90		



操作者:

日期: 2026-08-09

复核者:

未审阅版本



非布司他多替诺雷片项目信息

介质体积(ml)	900	取样体积(ml)	1.5	补液体积(ml)	1.5
对照品批号	241101	对照品来源	ZZ	对照品使用方法	直接使用
对照品含量(%)	99.69	对照品水分(%)	0	对照品稀释倍数	5000
标示量(mg)	2	供试品稀释倍数	1	系数	1

对照品溶液

序号	称样量(mg)	A ₁	A ₂	A ₃	A ₄	A ₅	A _{平均}	RSD%
1	11.24	36869	36915	36830	36852	36859	36865	0.09
2	11.37	37678	37785				37732	0.21
单位质量响应值				RSD%	判断			
3279.80				0.84	数据可信			



操作者:

日期: 2026-08-09

复核者:

未审阅版本



供试品溶液-6042702批-多替诺雷-pH5.5

时间 (分钟)	样品	A ₁	A ₂	A _{平均}	溶出量(%)	平均(%)	RSD%	累计溶 出量(%)	平均(%)	RSD%
5min	1	7020	-	7020	19.092	22.26	26.59	19.09	22.26	26.59
	2	10085	-	10085	27.427			27.43		
	3	4791	-	4791	13.030			13.03		
	4	7732	-	7732	21.028			21.03		
	5	8697	-	8697	23.652			23.65		
	6	10775	-	10775	29.304			29.30		
10min	1	17137	-	17137	46.606	50.50	8.10	46.64	50.53	8.12
	2	20019	-	20019	54.443			54.49		
	3	16536	-	16536	44.971			44.99		
	4	18417	-	18417	50.087			50.12		
	5	19073	-	19073	51.871			51.91		
	6	20223	-	20223	54.998			55.05		
15min	1	22062	-	22062	60.000	63.01	4.18	60.11	63.13	4.20
	2	24389	-	24389	66.328			66.46		
	3	22179	-	22179	60.318			60.41		
	4	22790	-	22790	61.979			62.10		
	5	23645	-	23645	64.305			64.43		
	6	23956	-	23956	65.150			65.29		
20min	1	24831	-	24831	67.530	69.77	2.75	67.74	70.00	2.76
	2	26751	-	26751	72.752			73.00		
	3	25177	-	25177	68.471			68.67		
	4	25246	-	25246	68.659			68.88		
	5	26037	-	26037	70.810			71.04		
	6	25888	-	25888	70.405			70.65		
30min	1	27817	-	27817	75.651	77.03	1.79	75.97	77.37	1.81
	2	29217	-	29217	79.458			79.83		
	3	28181	-	28181	76.641			76.95		
	4	27967	-	27967	76.059			76.39		
	5	28574	-	28574	77.709			78.06		
	6	28194	-	28194	76.676			77.04		
45min	1	29739	-	29739	80.878	82.02	1.13	81.33	82.49	1.14
	2	30621	-	30621	83.276			83.78		
	3	30182	-	30182	82.083			82.52		
	4	30041	-	30041	81.699			82.16		
	5	30473	-	30473	82.874			83.35		
	6	29893	-	29893	81.297			81.79		
60min	1	30806	-	30806	83.780	84.41	0.90	84.36	85.02	0.90
	2	31465	-	31465	85.572			86.21		
	3	31148	-	31148	84.710			85.29		
	4	30763	-	30763	83.663			84.26		
	5	31194	-	31194	84.835			85.45		
	6	30849	-	30849	83.897			84.53		
极限	1	31368	-	31368	85.308	86.43	0.91	86.03	87.18	0.92
	2	32171	-	32171	87.492			88.27		
	3	31805	-	31805	86.496			87.21		
	4	31801	-	31801	86.486			87.22		
	5	31984	-	31984	86.983			87.74		
	6	31560	-	31560	85.830			86.60		



操作者:

日期: 2026-08-09

复核者:

未审阅版本



非布司他多替诺雷片项目信息

介质体积(ml)	900	取样体积(ml)	1.5	补液体积(ml)	1.5
对照品批号	101278-202405	对照品来源	中检所	对照品使用方法	直接使用
对照品含量(%)	99.9	对照品水分(%)	0	对照品稀释倍数	250
标示量(mg)	40	供试品稀释倍数	1	系数	1

对照品溶液

序号	称样量(mg)	A ₁	A ₂	A ₃	A ₄	A ₅	A _{平均}	RSD%
1	11.34	269222	269667	269907	269322	269736	269571	0.11
2	11.39	274578	273901				274240	0.18
单位质量响应值				RSD%	判断			
23771.69				0.91	数据可信			



操作者:

日期: 2026-08-09

复核者:

未审阅版本



供试品溶液-6042702批-非布司他-pH5.5

时间 (分钟)	样品	A ₁	A ₂	A _{平均}	溶出量(%)	平均(%)	RSD%	累计溶 出量(%)	平均(%)	RSD%
5min	1	62688	-	62688	23.560	27.43	26.42	23.56	27.43	26.42
	2	91138	-	91138	34.252			34.25		
	3	42929	-	42929	16.134			16.13		
	4	69460	-	69460	26.105			26.10		
	5	76437	-	76437	28.727			28.73		
	6	95234	-	95234	35.791			35.79		
10min	1	139411	-	139411	52.394	56.46	7.54	52.43	56.51	7.55
	2	163447	-	163447	61.427			61.48		
	3	135974	-	135974	51.102			51.13		
	4	148680	-	148680	55.877			55.92		
	5	151833	-	151833	57.062			57.11		
	6	162104	-	162104	60.922			60.98		
15min	1	173154	-	173154	65.075	68.01	3.67	65.20	68.15	3.69
	2	190004	-	190004	71.408			71.57		
	3	175180	-	175180	65.837			65.95		
	4	178283	-	178283	67.003			67.14		
	5	182281	-	182281	68.505			68.65		
	6	186860	-	186860	70.226			70.39		
20min	1	191802	-	191802	72.084	74.31	2.34	72.32	74.56	2.35
	2	205033	-	205033	77.056			77.33		
	3	195427	-	195427	73.446			73.67		
	4	195377	-	195377	73.427			73.68		
	5	198394	-	198394	74.561			74.82		
	6	200270	-	200270	75.266			75.54		
30min	1	213699	-	213699	80.313	81.90	1.55	80.67	82.28	1.56
	2	223571	-	223571	84.023			84.43		
	3	217752	-	217752	81.836			82.18		
	4	215571	-	215571	81.017			81.39		
	5	217879	-	217879	81.884			82.27		
	6	219052	-	219052	82.325			82.73		
45min	1	229161	-	229161	86.124	87.80	1.17	86.61	88.32	1.19
	2	237563	-	237563	89.282			89.83		
	3	234365	-	234365	88.080			88.56		
	4	232695	-	232695	87.452			87.96		
	5	233709	-	233709	87.833			88.35		
	6	234271	-	234271	88.044			88.59		
60min	1	236590	-	236590	88.916	90.67	1.55	89.55	91.34	1.56
	2	246109	-	246109	92.493			93.19		
	3	243341	-	243341	91.453			92.08		
	4	237089	-	237089	89.103			89.75		
	5	241593	-	241593	90.796			91.46		
	6	242901	-	242901	91.288			91.98		
极限	1	242306	-	242306	91.064	92.95	1.25	91.84	93.76	1.26
	2	251383	-	251383	94.475			95.33		
	3	249041	-	249041	93.595			94.38		
	4	245923	-	245923	92.423			93.22		
	5	247256	-	247256	92.924			93.74		
	6	248089	-	248089	93.238			94.08		



操作者:

日期: 2026-08-09

复核者:

未审阅版本



非布司他多替诺雷片项目信息

介质体积(ml)	900	取样体积(ml)	1.5	补液体积(ml)	1.5
对照品批号	241101	对照品来源	ZZ	对照品使用方法	直接使用
对照品含量(%)	99.69	对照品水分(%)	0	对照品稀释倍数	5000
标示量(mg)	2	供试品稀释倍数	1	系数	1

对照品溶液

序号	称样量(mg)	A ₁	A ₂	A ₃	A ₄	A ₅	A _{平均}	RSD%
1	11.24	37102	37146	37170	36966	37182	37113	0.24
2	11.37	37842	37883				37862	0.08
单位质量响应值				RSD%	判断			
3301.87				0.60	数据可信			



操作者:

日期: 2026-08-09

复核者:

未审阅版本



供试品溶液-6042703批-多替诺雷-pH5.5

时间 (分钟)	样品	A ₁	A ₂	A _{平均}	溶出量(%)	平均(%)	RSD%	累计溶 出量(%)	平均(%)	RSD%
5min	1	7507	-	7507	20.312	27.29	13.51	20.31	27.29	13.51
	2	10998	-	10998	29.758			29.76		
	3	11321	-	11321	30.632			30.63		
	4	10531	-	10531	28.495			28.49		
	5	10271	-	10271	27.791			27.79		
	6	9890	-	9890	26.760			26.76		
10min	1	18186	-	18186	49.208	53.24	4.42	49.24	53.28	4.43
	2	20535	-	20535	55.564			55.61		
	3	20349	-	20349	55.060			55.11		
	4	20039	-	20039	54.222			54.27		
	5	19749	-	19749	53.437			53.48		
	6	19198	-	19198	51.946			51.99		
15min	1	22908	-	22908	61.985	64.18	2.07	62.10	64.32	2.08
	2	24240	-	24240	65.589			65.73		
	3	24110	-	24110	65.237			65.38		
	4	23892	-	23892	64.647			64.78		
	5	23754	-	23754	64.274			64.41		
	6	23421	-	23421	63.373			63.50		
20min	1	25344	-	25344	68.576	69.93	1.19	68.80	70.18	1.20
	2	26232	-	26232	70.979			71.23		
	3	26014	-	26014	70.389			70.64		
	4	25902	-	25902	70.086			70.33		
	5	25912	-	25912	70.113			70.36		
	6	25669	-	25669	69.455			69.69		
30min	1	27693	-	27693	74.932	76.15	1.11	75.27	76.51	1.12
	2	28504	-	28504	77.126			77.50		
	3	28396	-	28396	76.834			77.20		
	4	28160	-	28160	76.195			76.56		
	5	28245	-	28245	76.425			76.78		
	6	27864	-	27864	75.395			75.75		
45min	1	29437	-	29437	79.651	80.74	0.85	80.11	81.22	0.86
	2	30159	-	30159	81.604			82.10		
	3	29942	-	29942	81.017			81.51		
	4	29844	-	29844	80.752			81.24		
	5	29978	-	29978	81.115			81.60		
	6	29678	-	29678	80.303			80.78		
60min	1	30342	-	30342	82.100	83.14	0.86	82.69	83.76	0.87
	2	31022	-	31022	83.940			84.57		
	3	30772	-	30772	83.263			83.89		
	4	30886	-	30886	83.572			84.20		
	5	30866	-	30866	83.517			84.14		
	6	30471	-	30471	82.449			83.06		
极限	1	31030	-	31030	83.961	84.73	0.69	84.69	85.49	0.71
	2	31437	-	31437	85.062			85.84		
	3	31543	-	31543	85.349			86.12		
	4	31375	-	31375	84.895			85.66		
	5	31443	-	31443	85.079			85.84		
	6	31060	-	31060	84.042			84.79		



操作者:

日期: 2026-08-09

复核者:

未审阅版本



非布司他多替诺雷片项目信息

介质体积(ml)	900	取样体积(ml)	1.5	补液体积(ml)	1.5
对照品批号	101278-202405	对照品来源	中检所	对照品使用方法	直接使用
对照品含量(%)	99.9	对照品水分(%)	0	对照品稀释倍数	250
标示量(mg)	40	供试品稀释倍数	1	系数	1

对照品溶液

序号	称样量(mg)	A ₁	A ₂	A ₃	A ₄	A ₅	A _{平均}	RSD%
1	11.34	272651	272758	273342	271482	272241	272495	0.26
2	11.39	277997	277842				277920	0.04
单位质量响应值				RSD%	判断			
24029.54				1.09	数据可信			



操作者:

日期: 2026-08-09

复核者:

未审阅版本



供试品溶液-6042703批-非布司他-pH5.5

时间 (分钟)	样品	A ₁	A ₂	A _{平均}	溶出量(%)	平均(%)	RSD%	累计溶 出量(%)	平均(%)	RSD%
5min	1	64146	-	64146	23.819	32.38	13.86	23.82	32.38	13.86
	2	94182	-	94182	34.972			34.97		
	3	98453	-	98453	36.558			36.56		
	4	91624	-	91624	34.022			34.02		
	5	88639	-	88639	32.914			32.91		
	6	86103	-	86103	31.972			31.97		
10min	1	146916	-	146916	54.553	58.18	3.54	54.59	58.24	3.56
	2	160626	-	160626	59.644			59.70		
	3	161654	-	161654	60.026			60.09		
	4	160373	-	160373	59.550			59.61		
	5	155810	-	155810	57.856			57.91		
	6	154745	-	154745	57.460			57.51		
15min	1	178816	-	178816	66.398	68.14	1.58	66.53	68.29	1.59
	2	186276	-	186276	69.168			69.33		
	3	186435	-	186435	69.227			69.39		
	4	184581	-	184581	68.539			68.69		
	5	182692	-	182692	67.837			67.99		
	6	182269	-	182269	67.680			67.83		
20min	1	195088	-	195088	72.440	73.51	1.08	72.68	73.78	1.09
	2	199954	-	199954	74.247			74.52		
	3	200268	-	200268	74.364			74.64		
	4	199123	-	199123	73.939			74.21		
	5	196195	-	196195	72.851			73.12		
	6	197186	-	197186	73.219			73.48		
30min	1	212899	-	212899	79.054	79.97	1.03	79.42	80.36	1.05
	2	218007	-	218007	80.951			81.35		
	3	217594	-	217594	80.797			81.20		
	4	216268	-	216268	80.305			80.70		
	5	214228	-	214228	79.547			79.93		
	6	213261	-	213261	79.188			79.57		
45min	1	227990	-	227990	84.658	85.16	0.72	85.15	85.68	0.73
	2	231858	-	231858	86.094			86.63		
	3	230727	-	230727	85.674			86.21		
	4	229223	-	229223	85.115			85.64		
	5	227673	-	227673	84.540			85.06		
	6	228581	-	228581	84.877			85.39		
60min	1	235892	-	235892	87.592	87.89	0.73	88.23	88.55	0.74
	2	239362	-	239362	88.880			89.56		
	3	238083	-	238083	88.405			89.08		
	4	236559	-	236559	87.839			88.51		
	5	235060	-	235060	87.283			87.94		
	6	235146	-	235146	87.315			87.97		
极限	1	241418	-	241418	89.644	89.46	1.13	90.42	90.27	1.13
	2	243668	-	243668	90.479			91.30		
	3	243713	-	243713	90.496			91.32		
	4	240960	-	240960	89.474			90.29		
	5	239112	-	239112	88.787			89.59		
	6	236694	-	236694	87.890			88.69		



操作者:

日期: 2026-08-09

复核者:

未审阅版本




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 29-15/27-174-2 - zzp-6042701p-rcqx-pH5.5jz-jyx1-rj.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260507-FX276.lcb
样品瓶号: 1-9
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/07 14:31:10
处理时间(V2): 2026/05/08 14:37:28
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图1 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042701批-均一性1-pH5.5介质
溶剂




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 29-15/27-175-2 - zzp-6042701p-rcqx-pH5.5jz-jyx1-dz-1-1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260507-FX276.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/07 14:36:34
处理时间(V2): 2026/05/08 14:37:33
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.313	36536	12.056	6885	1427	1.243	--
2	3.283	266517	87.944	26932	2610	1.169	9.951
总计		303053	100.000	33816			

图2 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042701批-均一性1-pH5.5介质
对照品溶液-1-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 29-15/27-176-2 - zzp-6042701p-rcqx-pH5.5jz-jyx1-dz-1-2.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260507-FX276.lcb

样品瓶号: 1-18

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/07 14:47:00

处理时间(V2): 2026/05/08 14:37:36

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min


波 长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.313	36622	12.077	6895	1432	1.249	--
2	3.300	266618	87.923	26723	2592	1.158	9.982
总计		303240	100.000	33618			

图3 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042701批-均一性1-pH5.5介质
对照品溶液-1-2




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 29-15/27-177-2 - zzp-6042701p-rcqx-pH5.5jz-jyx1-dz-1-3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260507-FX276.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/07 14:52:24
处理时间(V2): 2026/05/08 14:37:38
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.313	36585	12.075	6903	1434	1.246	--
2	3.308	266410	87.925	26565	2580	1.148	9.990
总计		302995	100.000	33467			

图4 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042701批-均一性1-pH5.5介质
对照品溶液-1-3




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 29-15/27-178-2 - zzp-6042701p-rcqx-pH5.5jz-jyx1-dz-1-4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260507-FX276.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/07 14:57:48
处理时间(V2): 2026/05/08 14:37:41
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.314	36613	12.077	6918	1442	1.246	--
2	3.314	266543	87.923	26324	2550	1.139	9.978
总计		303155	100.000	33241			

图5 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042701批-均一性1-pH5.5介质
对照品溶液-1-4



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 29-15/27-179-2 - zzp-6042701p-rcqx-pH5.5jz-jyx1-dz-1-5.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260507-FX276.lcb

样品瓶号: 1-18

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/07 15:03:12

处理时间(V2): 2026/05/08 14:37:44

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min


波 长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.315	36685	12.105	6924	1443	1.248	--
2	3.321	266372	87.895	25970	2503	1.133	9.933
总计		303057	100.000	32894			

图6 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042701批-均一性1-pH5.5介质
对照品溶液-1-5




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 29-15/27-180-2 - zzp-6042701p-rcqx-pH5.5jz-jyx1-5min-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260507-FX276.lcb
样品瓶号: 1-1
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/07 15:08:35
处理时间(V2): 2026/05/08 14:37:47
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.346	10692	10.410	2457	2242	1.234	--
2	3.309	92015	89.590	10268	3236	1.146	11.339
总计		102707	100.000	12725			

图7 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042701批-均一性1-pH5.5介质-5min-片1
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 29-15/27-181-2 - zzp-6042701p-rcqx-pH5.5jz-jyx1-5min-P2.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260507-FX276.lcb

样品瓶号: 1-10

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/07 15:13:58

处理时间(V2): 2026/05/08 14:37:50

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流速: 1.5ml/min


波长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.345	11898	10.374	2727	2236	1.234	--
2	3.319	102787	89.626	11419	3177	1.142	11.298
总计		114685	100.000	14146			

图8 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042701批-均一性1-pH5.5介质-5min-片2
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 29-15/27-182-2 - zzp-6042701p-rcqx-pH5.5jz-jyx1-5min-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260507-FX276.lcb
样品瓶号: 1-19
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/07 15:19:21
处理时间(V2): 2026/05/08 14:37:53
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.345	12433	10.336	2849	2228	1.235	--
2	3.327	107858	89.664	11876	3142	1.149	11.282
总计		120291	100.000	14725			

图9 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042701批-均一性1-pH5.5介质-5min-片3
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 29-15/27-183-2 - zzp-6042701p-rcqx-pH5.5jz-jyx1-5min-P4.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260507-FX276.lcb

样品瓶号: 1-28

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/07 15:24:44

处理时间(V2): 2026/05/08 14:37:55

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min


波 长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.344	10012	10.235	2291	2230	1.228	--
2	3.334	87805	89.765	9637	3141	1.149	11.313
总计		97817	100.000	11928			

图10 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042701批-均一性1-pH5.5介质-5min-片4
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 29-15/27-184-2 - zzp-6042701p-rcqx-pH5.5jz-jyx1-5min-P5.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260507-FX276.lcb

样品瓶号: 1-37

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/07 15:30:06

处理时间(V2): 2026/05/08 14:37:58

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流速: 1.5ml/min


波长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.345	12505	10.239	2870	2238	1.231	--
2	3.341	109625	89.761	11877	3071	1.161	11.246
总计		122130	100.000	14746			

图11 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042701批-均一性1-pH5.5介质-5min-片5
供试品溶液-1




QTL-235

＜样品信息＞

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$QTL-235 - 29-15/27-185-2 - zzp-6042701p-rcqx-pH5.5jz-jyx1-5min-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260507-FX276.lcb
样品瓶号: 1-46
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/07 15:35:29
处理时间(V2): 2026/05/08 14:38:00
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.344	11710	10.278	2676	2228	1.232	--
2	3.347	102223	89.722	11035	3056	1.163	11.251
总计		113933	100.000	13710			

图12 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042701批-均一性1-pH5.5介质-5min-片6
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 29-15/27-186-2 - zzp-6042701p-rcqx-pH5.5jz-jyx1-10min-P1.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260507-FX276.lcb

样品瓶号: 1-2

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/07 15:40:53

处理时间(V2): 2026/05/08 14:38:03

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min


波 长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.344	20503	11.177	4678	2227	1.232	--
2	3.345	162930	88.823	17220	2919	1.195	11.068
总计		183433	100.000	21898			

图13 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042701批-均一性1-pH5.5介质-10min-片1
供试品溶液-1



QTL-235

＜样品信息＞

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$QTL-235 - 29-15/27-187-2 - zzp-6042701p-rcqx-pH5.5jz-jyx1-10min-P2.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260507-FX276.lcb

样品瓶号: 1-11

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/07 15:46:16

处理时间(V2): 2026/05/08 14:38:05

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min


波 长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.345	21083	11.252	4824	2225	1.232	--
2	3.351	166292	88.748	17465	2899	1.203	11.051
总计		187375	100.000	22289			

图14 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042701批-均一性1-pH5.5介质-10min-片2
供试品溶液-1




QTL-235

＜样品信息＞

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 29-15/27-188-2 - zzp-6042701p-rcqx-pH5.5jz-jyx1-10min-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260507-FX276.lcb
样品瓶号: 1-20
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/07 15:51:39
处理时间(V2): 2026/05/08 14:38:08
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.346	21288	11.286	4881	2231	1.230	--
2	3.355	167333	88.714	17557	2892	1.207	11.052
总计		188621	100.000	22438			

图15 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042701批-均一性1-pH5.5介质-10min-片3
供试品溶液-1




QTL-235

＜样品信息＞

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$QTL-235 - 29-15/27-189-2 - zzp-6042701p-rcqx-pH5.5jz-jyx1-10min-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260507-FX276.lcb
样品瓶号: 1-29
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/07 15:57:02
处理时间(V2): 2026/05/08 14:38:11
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.346	20413	11.214	4680	2234	1.232	--
2	3.359	161627	88.786	16904	2894	1.210	11.069
总计		182040	100.000	21584			

图16 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042701批-均一性1-pH5.5介质-10min-片4
供试品溶液-1




QTL-235

＜样品信息＞

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$QTL-235 - 29-15/27-190-2 - zzp-6042701p-rcqx-pH5.5jz-jyx1-10min-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260507-FX276.lcb
样品瓶号: 1-38
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/07 16:02:24
处理时间(V2): 2026/05/08 14:38:13
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.345	20887	11.254	4785	2227	1.229	--
2	3.361	164713	88.746	17192	2875	1.213	11.057
总计		185600	100.000	21976			

图17 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042701批-均一性1-pH5.5介质-10min-片5
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 29-15/27-191-2 - zzp-6042701p-rcqx-pH5.5jz-jyx1-10min-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260507-FX276.lcb
样品瓶号: 1-47
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/07 16:07:47
处理时间(V2): 2026/05/08 14:38:16
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.345	20718	11.239	4753	2230	1.231	--
2	3.367	163616	88.761	17025	2878	1.216	11.076
总计		184334	100.000	21778			

图18 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042701批-均一性1-pH5.5介质-10min-片6
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 29-15/27-192-2 - zzp-6042701p-rcqx-pH5.5jz-jyx1-15min-P1.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260507-FX276.lcb

样品瓶号: 1-3

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/07 16:13:10

处理时间(V2): 2026/05/08 14:38:18

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min


波 长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.346	24421	11.534	5602	2237	1.229	--
2	3.366	187305	88.466	19419	2849	1.232	11.040
总计		211726	100.000	25021			

图19 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042701批-均一性1-pH5.5介质-15min-片1
供试品溶液-1



QTL-235

＜样品信息＞

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$QTL-235 - 29-15/27-193-2 - zzp-6042701p-rcqx-pH5.5jz-jyx1-15min-P2.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260507-FX276.lcb

样品瓶号: 1-12

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/07 16:18:34

处理时间(V2): 2026/05/08 14:38:21

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min


波 长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.346	24529	11.485	5622	2229	1.230	--
2	3.368	189034	88.515	19540	2845	1.235	11.034
总计		213563	100.000	25161			

图20 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042701批-均一性1-pH5.5介质-15min-片2
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 29-15/27-194-2 - zzp-6042701p-rcqx-pH5.5jz-jyx1-15min-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260507-FX276.lcb
样品瓶号: 1-21
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/07 16:23:57
处理时间(V2): 2026/05/08 14:38:23
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.347	24911	11.543	5719	2238	1.231	--
2	3.372	190901	88.457	19720	2837	1.238	11.036
总计		215812	100.000	25438			

图21 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042701批-均一性1-pH5.5介质-15min-片3
供试品溶液-1




QTL-235

＜样品信息＞

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$QTL-235 - 29-15/27-195-2 - zzp-6042701p-rcqx-pH5.5jz-jyx1-15min-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260507-FX276.lcb
样品瓶号: 1-30
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/07 16:29:19
处理时间(V2): 2026/05/08 14:38:26
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.345	24567	11.572	5631	2231	1.229	--
2	3.369	187727	88.428	19353	2823	1.230	11.010
总计		212294	100.000	24984			

图22 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042701批-均一性1-pH5.5介质-15min-片4
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 29-15/27-196-2 - zzp-6042701p-rcqx-pH5.5jz-jyx1-15min-P5.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260507-FX276.lcb

样品瓶号: 1-39

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/07 16:34:42

处理时间(V2): 2026/05/08 14:38:28

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min


波 长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.346	24135	11.565	5542	2237	1.230	--
2	3.371	184559	88.435	19060	2836	1.235	11.039
总计		208693	100.000	24603			

图23 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042701批-均一性1-pH5.5介质-15min-片5
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 29-15/27-197-2 - zzp-6042701p-rcqx-pH5.5jz-jyx1-15min-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260507-FX276.lcb
样品瓶号: 1-48
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/07 16:40:05
处理时间(V2): 2026/05/08 14:38:31
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.346	24103	11.481	5539	2242	1.231	--
2	3.376	185830	88.519	19149	2846	1.241	11.067
总计		209933	100.000	24687			

图24 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042701批-均一性1-pH5.5介质-15min-片6
供试品溶液-1



QTL-235

＜样品信息＞

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$QTL-235 - 29-15/27-198-2 - zzp-6042701p-rcqx-pH5.5jz-jyx1-20min-P1.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260507-FX276.lcb

样品瓶号: 1-4

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/07 16:45:29

处理时间(V2): 2026/05/08 14:38:33

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min


波 长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.346	26588	11.658	6093	2235	1.232	--
2	3.376	201481	88.342	20731	2832	1.249	11.042
总计		228069	100.000	26824			

图25 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042701批-均一性1-pH5.5介质-20min-片1
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 29-15/27-199-2 - zzp-6042701p-rcqx-pH5.5jz-jyx1-20min-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260507-FX276.lcb
样品瓶号: 1-13
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/07 16:50:53
处理时间(V2): 2026/05/08 14:38:36
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.346	26570	11.564	6103	2238	1.231	--
2	3.379	203197	88.436	20882	2828	1.254	11.049
总计		229767	100.000	26984			

图26 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042701批-均一性1-pH5.5介质-20min-片2
供试品溶液-1




QTL-235

＜样品信息＞

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 29-15/27-200-2 - zzp-6042701p-rcqx-pH5.5jz-jyx1-20min-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260507-FX276.lcb
样品瓶号: 1-22
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/07 16:56:16
处理时间(V2): 2026/05/08 14:38:38
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.346	26882	11.602	6165	2234	1.231	--
2	3.381	204818	88.398	21034	2824	1.256	11.045
总计		231699	100.000	27198			

图27 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042701批-均一性1-pH5.5介质-20min-片3
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 29-15/27-201-2 - zzp-6042701p-rcqx-pH5.5jz-jyx1-20min-P4.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260507-FX276.lcb

样品瓶号: 1-31

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/07 17:01:39

处理时间(V2): 2026/05/08 14:38:41

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min


波 长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.346	26765	11.632	6151	2246	1.233	--
2	3.382	203323	88.368	20869	2829	1.257	11.069
总计		230088	100.000	27020			

图28 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042701批-均一性1-pH5.5介质-20min-片4
供试品溶液-1




QTL-235

＜样品信息＞

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$QTL-235 - 29-15/27-202-2 - zzp-6042701p-rcqx-pH5.5jz-jyx1-20min-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260507-FX276.lcb
样品瓶号: 1-40
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/07 17:07:02
处理时间(V2): 2026/05/08 14:38:43
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.347	26062	11.676	5988	2240	1.231	--
2	3.387	197148	88.324	20224	2834	1.253	11.077
总计		223209	100.000	26212			

图29 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042701批-均一性1-pH5.5介质-20min-片5
供试品溶液-1




QTL-235

＜样品信息＞

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 29-15/27-203-2 - zzp-6042701p-rcqx-pH5.5jz-jyx1-20min-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260507-FX276.lcb
样品瓶号: 1-49
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/07 17:12:25
处理时间(V2): 2026/05/08 14:38:46
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.346	26099	11.551	5994	2238	1.232	--
2	3.387	199838	88.449	20461	2823	1.255	11.067
总计		225936	100.000	26455			

图30 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042701批-均一性1-pH5.5介质-20min-片6
供试品溶液-1




QTL-235

＜样品信息＞

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$QTL-235 - 29-15/27-204-2 - zzp-6042701p-rcqx-pH5.5jz-jyx1-30min-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260507-FX276.lcb
样品瓶号: 1-5
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/07 17:17:49
处理时间(V2): 2026/05/08 14:38:48
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.347	28853	11.621	6626	2245	1.233	--
2	3.387	219434	88.379	22420	2810	1.266	11.044
总计		248287	100.000	29045			

图31 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042701批-均一性1-pH5.5介质-30min-片1
供试品溶液-1



QTL-235

＜样品信息＞

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$QTL-235 - 29-15/27-205-2 - zzp-6042701p-rcqx-pH5.5jz-jyx1-30min-P2.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260507-FX276.lcb

样品瓶号: 1-14

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/07 17:23:13

处理时间(V2): 2026/05/08 14:38:51

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min


波 长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.347	28675	11.524	6583	2240	1.233	--
2	3.386	220155	88.476	22445	2799	1.267	11.028
总计		248829	100.000	29028			

图32 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042701批-均一性1-pH5.5介质-30min-片2
供试品溶液-1



QTL-235

＜样品信息＞

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$QTL-235 - 29-15/27-206-2 - zzp-6042701p-rcqx-pH5.5jz-jyx1-30min-P3.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260507-FX276.lcb

样品瓶号: 1-23

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/07 17:28:36

处理时间(V2): 2026/05/08 14:38:54

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min


波 长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.348	29139	11.601	6678	2241	1.233	--
2	3.390	222036	88.399	22618	2801	1.271	11.036
总计		251175	100.000	29296			

图33 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042701批-均一性1-pH5.5介质-30min-片3
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 29-15/27-207-2 - zzp-6042701p-rcqx-pH5.5jz-jyx1-30min-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260507-FX276.lcb
样品瓶号: 1-32
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/07 17:33:59
处理时间(V2): 2026/05/08 14:38:57
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.348	29147	11.630	6679	2246	1.232	--
2	3.392	221473	88.370	22531	2805	1.270	11.051
总计		250620	100.000	29210			

图34 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042701批-均一性1-pH5.5介质-30min-片4
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 29-15/27-208-2 - zzp-6042701p-rcqx-pH5.5jz-jyx1-30min-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260507-FX276.lcb
样品瓶号: 1-41
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/07 17:39:23
处理时间(V2): 2026/05/08 14:38:59
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.347	28100	11.703	6450	2237	1.231	--
2	3.394	212011	88.297	21587	2807	1.263	11.060
总计		240111	100.000	28036			

图35 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042701批-均一性1-pH5.5介质-30min-片5
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 29-15/27-209-2 - zzp-6042701p-rcqx-pH5.5jz-jyx1-30min-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260507-FX276.lcb
样品瓶号: 1-50
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/07 17:44:46
处理时间(V2): 2026/05/08 14:39:02
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.348	28170	11.524	6474	2250	1.234	--
2	3.394	216272	88.476	22005	2804	1.267	11.059
总计		244442	100.000	28479			

图36 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042701批-均一性1-pH5.5介质-30min-片6
供试品溶液-1




QTL-235

＜样品信息＞

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$QTL-235 - 29-15/27-210-2 - zzp-6042701p-rcqx-pH5.5jz-jyx1-45min-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260507-FX276.lcb
样品瓶号: 1-6
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/07 17:50:09
处理时间(V2): 2026/05/08 14:39:04
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.348	30552	11.582	7006	2244	1.234	--
2	3.395	233244	88.418	23650	2784	1.278	11.027
总计		263796	100.000	30655			

图37 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042701批-均一性1-pH5.5介质-45min-片1
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 29-15/27-211-2 - zzp-6042701p-rcqx-pH5.5jz-jyx1-45min-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260507-FX276.lcb
样品瓶号: 1-15
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/07 17:55:33
处理时间(V2): 2026/05/08 14:39:07
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.347	30296	11.453	6962	2241	1.232	--
2	3.393	234222	88.547	23726	2783	1.280	11.029
总计		264519	100.000	30688			

图38 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042701批-均一性1-pH5.5介质-45min-片2
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 29-15/27-212-2 - zzp-6042701p-rcqx-pH5.5jz-jyx1-45min-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260507-FX276.lcb
样品瓶号: 1-24
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/07 18:00:56
处理时间(V2): 2026/05/08 14:39:10
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.349	30665	11.478	7018	2243	1.234	--
2	3.398	236489	88.522	23971	2787	1.281	11.036
总计		267154	100.000	30988			

图39 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042701批-均一性1-pH5.5介质-45min-片3
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 29-15/27-213-2 - zzp-6042701p-rcqx-pH5.5jz-jyx1-45min-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260507-FX276.lcb
样品瓶号: 1-33
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/07 18:06:20
处理时间(V2): 2026/05/08 14:39:12
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.349	30796	11.577	7043	2242	1.237	--
2	3.398	235229	88.423	23828	2780	1.280	11.025
总计		266025	100.000	30871			

图40 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042701批-均一性1-pH5.5介质-45min-片4
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 29-15/27-214-2 - zzp-6042701p-rcqx-pH5.5jz-jyx1-45min-P5.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260507-FX276.lcb

样品瓶号: 1-42

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/07 18:11:43

处理时间(V2): 2026/05/08 14:39:15

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min


波 长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.347	29598	11.666	6800	2241	1.232	--
2	3.398	224117	88.334	22740	2795	1.274	11.059
总计		253715	100.000	29540			

图41 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042701批-均一性1-pH5.5介质-45min-片5
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 29-15/27-215-2 - zzp-6042701p-rcqx-pH5.5jz-jyx1-45min-P6.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260507-FX276.lcb

样品瓶号: 1-51

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/07 18:17:06

处理时间(V2): 2026/05/08 14:39:17

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min


波 长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.348	29793	11.434	6825	2243	1.235	--
2	3.401	230773	88.566	23286	2780	1.278	11.041
总计		260567	100.000	30112			

图42 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042701批-均一性1-pH5.5介质-45min-片6
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 29-15/27-216-2 - zzp-6042701p-rcqx-pH5.5jz-jyx1-60min-P1.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260507-FX276.lcb

样品瓶号: 1-7

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/07 18:22:28

处理时间(V2): 2026/05/08 14:39:20

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min


波 长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.347	30994	11.455	7106	2236	1.234	--
2	3.399	239586	88.545	24193	2768	1.284	11.022
总计		270580	100.000	31299			

图43 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042701批-均一性1-pH5.5介质-60min-片1
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 29-15/27-217-2 - zzp-6042701p-rcqx-pH5.5jz-jyx1-60min-P2.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260507-FX276.lcb

样品瓶号: 1-16

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/07 18:27:51

处理时间(V2): 2026/05/08 14:39:23

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min


波 长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.348	31130	11.393	7136	2241	1.233	--
2	3.401	242112	88.607	24398	2767	1.285	11.022
总计		273242	100.000	31535			

图44 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042701批-均一性1-pH5.5介质-60min-片2
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 29-15/27-218-2 - zzp-6042701p-rcqx-pH5.5jz-jyx1-60min-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260507-FX276.lcb
样品瓶号: 1-25
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/07 18:33:14
处理时间(V2): 2026/05/08 14:39:26
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.347	31475	11.413	7227	2242	1.235	--
2	3.399	244303	88.587	24644	2757	1.285	11.008
总计		275778	100.000	31870			

图45 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042701批-均一性1-pH5.5介质-60min-片3
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 29-15/27-219-2 - zzp-6042701p-rcqx-pH5.5jz-jyx1-60min-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260507-FX276.lcb
样品瓶号: 1-34
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/07 18:38:37
处理时间(V2): 2026/05/08 14:39:29
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.347	31587	11.455	7257	2241	1.232	--
2	3.399	244174	88.545	24574	2753	1.286	11.010
总计		275761	100.000	31831			

图46 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042701批-均一性1-pH5.5介质-60min-片4
供试品溶液-1



QTL-235

＜样品信息＞

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$QTL-235 - 29-15/27-220-2 - zzp-6042701p-rcqx-pH5.5jz-jyx1-60min-P5.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260507-FX276.lcb

样品瓶号: 1-43

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/07 18:44:00

处理时间(V2): 2026/05/08 14:39:32

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min


波 长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.348	30270	11.590	6943	2241	1.235	--
2	3.404	230911	88.410	23266	2766	1.278	11.034
总计		261181	100.000	30210			

图47 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042701批-均一性1-pH5.5介质-60min-片5
供试品溶液-1




QTL-235

＜样品信息＞

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 29-15/27-221-2 - zzp-6042701p-rcqx-pH5.5jz-jyx1-60min-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260507-FX276.lcb
样品瓶号: 1-52
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/07 18:49:22
处理时间(V2): 2026/05/08 14:39:34
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.347	30697	11.386	7045	2243	1.236	--
2	3.403	238910	88.614	24019	2755	1.283	11.019
总计		269608	100.000	31064			

图48 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042701批-均一性1-pH5.5介质-60min-片6
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 29-15/27-222-2 - zzp-6042701p-rcqx-pH5.5jz-jyx1-JX-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260507-FX276.lcb
样品瓶号: 1-8
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/07 18:54:46
处理时间(V2): 2026/05/08 14:39:36
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.348	31710	11.444	7273	2245	1.234	--
2	3.405	245365	88.556	24680	2755	1.288	11.021
总计		277074	100.000	31953			

图49 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042701批-均一性1-pH5.5介质-极限转速-片1
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 29-15/27-223-2 - zzp-6042701p-rcqx-pH5.5jz-jyx1-JX-P2.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260507-FX276.lcb

样品瓶号: 1-17

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/07 19:00:09

处理时间(V2): 2026/05/08 14:39:39

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min


波 长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.348	31890	11.440	7303	2241	1.235	--
2	3.405	246880	88.560	24825	2747	1.288	11.002
总计		278770	100.000	32129			

图50 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042701批-均一性1-pH5.5介质-极限转速-片2
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 29-15/27-224-2 - zzp-6042701p-rcqx-pH5.5jz-jyx1-JX-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260507-FX276.lcb
样品瓶号: 1-26
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/07 19:05:33
处理时间(V2): 2026/05/08 14:39:42
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.347	32268	11.425	7415	2246	1.234	--
2	3.405	250171	88.575	25124	2742	1.290	11.008
总计		282439	100.000	32540			

图51 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042701批-均一性1-pH5.5介质-极限转速-片3
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 29-15/27-225-2 - zzp-6042701p-rcqx-pH5.5jz-jyx1-JX-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260507-FX276.lcb
样品瓶号: 1-35
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/07 19:10:57
处理时间(V2): 2026/05/08 14:39:44
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.348	32236	11.494	7394	2243	1.233	--
2	3.405	248213	88.506	24899	2735	1.290	10.994
总计		280450	100.000	32293			

图52 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042701批-均一性1-pH5.5介质-极限转速-片4
供试品溶液-1




QTL-235

＜样品信息＞

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$QTL-235 - 29-15/27-226-2 - zzp-6042701p-rcqx-pH5.5jz-jyx1-JX-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260507-FX276.lcb
样品瓶号: 1-44
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/07 19:16:21
处理时间(V2): 2026/05/08 14:39:47
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.348	30933	11.617	7097	2248	1.234	--
2	3.407	235335	88.383	23643	2754	1.282	11.027
总计		266268	100.000	30741			

图53 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042701批-均一性1-pH5.5介质-极限转速-片5
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 29-15/27-227-2 - zzp-6042701p-rcqx-pH5.5jz-jyx1-JX-P6.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260507-FX276.lcb

样品瓶号: 1-53

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/07 19:21:44

处理时间(V2): 2026/05/08 14:39:49

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min


波 长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.348	31427	11.425	7202	2244	1.233	--
2	3.410	243658	88.575	24428	2751	1.288	11.027
总计		275085	100.000	31629			

图54 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042701批-均一性1-pH5.5介质-极限转速-片6
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 29-15/27-228-2 - zzp-6042701p-rcqx-pH5.5jz-jyx1-dz-2-1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260507-FX276.lcb
样品瓶号: 1-27
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/07 19:27:08
处理时间(V2): 2026/05/08 14:39:52
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.320	36891	12.082	6960	1459	1.240	--
2	3.378	268445	87.918	22442	1827	1.308	9.062
总计		305336	100.000	29402			

图55 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042701批-均一性1-pH5.5介质
对照品溶液-2-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 29-15/27-229-2 - zzp-6042701p-rcqx-pH5.5jz-jyx1-dz-2-2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260507-FX276.lcb
样品瓶号: 1-27
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/07 19:32:34
处理时间(V2): 2026/05/08 14:39:54
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.320	36965	12.086	6984	1460	1.242	--
2	3.381	268893	87.914	22497	1835	1.310	9.081
总计		305858	100.000	29481			

图56 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042701批-均一性1-pH5.5介质
对照品溶液-2-2




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 29-15/27-230-2 - zzp-6042702p-rcqx-pH5.5jz-jyx1-rj.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260507-FX276.lcb
样品瓶号: 2-9
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/07 19:37:58
处理时间(V2): 2026/05/08 14:39:57
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图57 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042702批-均一性1-pH5.5介质
溶剂




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 29-15/27-231-2 - zzp-6042702p-rcqx-pH5.5jz-jyx1-dz-1-1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260507-FX276.lcb
样品瓶号: 2-18
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/07 19:43:24
处理时间(V2): 2026/05/08 14:39:59
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.321	36869	12.045	6964	1455	1.242	--
2	3.380	269222	87.955	23125	1986	1.364	9.319
总计		306091	100.000	30089			

图58 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042702批-均一性1-pH5.5介质
对照品溶液-1-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 29-15/27-232-2 - zzp-6042702p-rcqx-pH5.5jz-jyx1-dz-1-2.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260507-FX276.lcb

样品瓶号: 2-18

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/07 19:48:48

处理时间(V2): 2026/05/08 14:40:02

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min


波 长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.321	36915	12.041	6979	1458	1.245	--
2	3.382	269667	87.959	23161	1991	1.366	9.333
总计		306583	100.000	30140			

图59 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042702批-均一性1-pH5.5介质
对照品溶液-1-2



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 29-15/27-233-2 - zzp-6042702p-rcqx-pH5.5jz-jyx1-dz-1-3.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260507-FX276.lcb

样品瓶号: 2-18

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/07 19:54:13

处理时间(V2): 2026/05/08 14:40:04

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min


波 长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.321	36830	12.007	6969	1460	1.243	--
2	3.380	269907	87.993	23254	1995	1.374	9.340
总计		306736	100.000	30223			

图60 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042702批-均一性1-pH5.5介质
对照品溶液-1-3




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 29-15/27-234-2 - zzp-6042702p-rcqx-pH5.5jz-jyx1-dz-1-4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260507-FX276.lcb
样品瓶号: 2-18
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/07 19:59:39
处理时间(V2): 2026/05/08 14:40:07
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.320	36852	12.036	6961	1457	1.245	--
2	3.379	269322	87.964	23365	2010	1.381	9.363
总计		306174	100.000	30327			

图61 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042702批-均一性1-pH5.5介质
对照品溶液-1-4



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 29-15/27-235-2 - zzp-6042702p-rcqx-pH5.5jz-jyx1-dz-1-5.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260507-FX276.lcb

样品瓶号: 2-18

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/07 20:05:05

处理时间(V2): 2026/05/08 14:40:09

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min


波 长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.320	36859	12.022	6969	1459	1.244	--
2	3.380	269736	87.978	23574	2023	1.386	9.386
总计		306595	100.000	30542			

图62 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042702批-均一性1-pH5.5介质
对照品溶液-1-5



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 29-15/27-236-2 - zzp-6042702p-rcqx-pH5.5jz-jyx1-5min-P1.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260507-FX276.lcb

样品瓶号: 2-1

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/07 20:10:29

处理时间(V2): 2026/05/08 14:40:12

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min


波 长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.348	7020	10.071	1614	2247	1.223	--
2	3.441	62688	89.929	6375	2875	1.160	11.298
总计		69708	100.000	7989			

图63 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042702批-均一性1-pH5.5介质-5min-片1
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 29-15/27-237-2 - zzp-6042702p-rcqx-pH5.5jz-jyx1-5min-P2.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260507-FX276.lcb

样品瓶号: 2-10

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/07 20:15:53

处理时间(V2): 2026/05/08 14:40:15

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min


波 长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.347	10085	9.963	2320	2240	1.229	--
2	3.435	91138	90.037	9216	2841	1.185	11.235
总计		101223	100.000	11536			

图64 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042702批-均一性1-pH5.5介质-5min-片2
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 29-15/27-238-2 - zzp-6042702p-rcqx-pH5.5jz-jyx1-5min-P3.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260507-FX276.lcb

样品瓶号: 2-19

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/07 20:21:17

处理时间(V2): 2026/05/08 14:40:17

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min


波 长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.348	4791	10.040	1102	2246	1.235	--
2	3.444	42929	89.960	4367	2876	1.145	11.310
总计		47720	100.000	5469			

图65 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042702批-均一性1-pH5.5介质-5min-片3
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 29-15/27-239-2 - zzp-6042702p-rcqx-pH5.5jz-jyx1-5min-P4.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260507-FX276.lcb

样品瓶号: 2-28

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/07 20:26:41

处理时间(V2): 2026/05/08 14:40:20

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min


波 长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.350	7732	10.017	1778	2261	1.234	--
2	3.441	69460	89.983	7039	2864	1.169	11.284
总计		77192	100.000	8817			

图66 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042702批-均一性1-pH5.5介质-5min-片4
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 29-15/27-240-2 - zzp-6042702p-rcqx-pH5.5jz-jyx1-5min-P5.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260507-FX276.lcb

样品瓶号: 2-37

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/07 20:32:05

处理时间(V2): 2026/05/08 14:40:22

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流速: 1.5ml/min


波长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.349	8697	10.216	2000	2263	1.226	--
2	3.439	76437	89.784	7744	2838	1.173	11.246
总计		85134	100.000	9744			

图67 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042702批-均一性1-pH5.5介质-5min-片5
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 29-15/27-241-2 - zzp-6042702p-rcqx-pH5.5jz-jyx1-5min-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260507-FX276.lcb
样品瓶号: 2-46
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/07 20:37:31
处理时间(V2): 2026/05/08 14:40:25
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.349	10775	10.164	2472	2253	1.238	--
2	3.438	95234	89.836	9619	2836	1.189	11.234
总计		106009	100.000	12091			

图68 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042702批-均一性1-pH5.5介质-5min-片6
供试品溶液-1




QTL-235

＜样品信息＞

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$QTL-235 - 29-15/27-242-2 - zzp-6042702p-rcqx-pH5.5jz-jyx1-10min-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260507-FX276.lcb
样品瓶号: 2-2
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/07 20:42:57
处理时间(V2): 2026/05/08 14:40:27
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.349	17137	10.947	3932	2253	1.231	--
2	3.432	139411	89.053	14033	2802	1.220	11.168
总计		156548	100.000	17965			

图69 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042702批-均一性1-pH5.5介质-10min-片1
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 29-15/27-243-2 - zzp-6042702p-rcqx-pH5.5jz-jyx1-10min-P2.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260507-FX276.lcb

样品瓶号: 2-11

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/07 20:48:21

处理时间(V2): 2026/05/08 14:40:30

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min


波 长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.348	20019	10.912	4605	2249	1.230	--
2	3.428	163447	89.088	16385	2778	1.238	11.125
总计		183466	100.000	20990			

图70 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042702批-均一性1-pH5.5介质-10min-片2
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 29-15/27-244-2 - zzp-6042702p-rcqx-pH5.5jz-jyx1-10min-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260507-FX276.lcb
样品瓶号: 2-20
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/07 20:53:46
处理时间(V2): 2026/05/08 14:40:33
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.348	16536	10.843	3806	2250	1.229	--
2	3.431	135974	89.157	13677	2795	1.217	11.163
总计		152510	100.000	17483			

图71 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042702批-均一性1-pH5.5介质-10min-片3
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 29-15/27-245-2 - zzp-6042702p-rcqx-pH5.5jz-jyx1-10min-P4.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260507-FX276.lcb

样品瓶号: 2-29

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/07 20:59:10

处理时间(V2): 2026/05/08 14:40:35

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min


波 长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.349	18417	11.022	4223	2249	1.231	--
2	3.431	148680	88.978	14925	2787	1.227	11.142
总计		167096	100.000	19147			

图72 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042702批-均一性1-pH5.5介质-10min-片4
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 29-15/27-246-2 - zzp-6042702p-rcqx-pH5.5jz-jyx1-10min-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260507-FX276.lcb
样品瓶号: 2-38
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/07 21:04:34
处理时间(V2): 2026/05/08 14:40:37
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.348	19073	11.160	4378	2246	1.232	--
2	3.432	151833	88.840	15224	2783	1.231	11.143
总计		170906	100.000	19602			

图73 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042702批-均一性1-pH5.5介质-10min-片5
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 29-15/27-247-2 - zzp-6042702p-rcqx-pH5.5jz-jyx1-10min-P6.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260507-FX276.lcb

样品瓶号: 2-47

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/07 21:09:57

处理时间(V2): 2026/05/08 14:40:40

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min


波 长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.350	20223	11.092	4617	2249	1.235	--
2	3.430	162104	88.908	16237	2774	1.238	11.112
总计		182327	100.000	20854			

图74 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042702批-均一性1-pH5.5介质-10min-片6
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 29-15/27-248-2 - zzp-6042702p-rcqx-pH5.5jz-jyx1-15min-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260507-FX276.lcb
样品瓶号: 2-3
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/07 21:15:21
处理时间(V2): 2026/05/08 14:40:42
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.349	22062	11.301	5054	2252	1.230	--
2	3.431	173154	88.699	17319	2765	1.246	11.110
总计		195217	100.000	22373			

图75 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042702批-均一性1-pH5.5介质-15min-片1
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 29-15/27-249-2 - zzp-6042702p-rcqx-pH5.5jz-jyx1-15min-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260507-FX276.lcb
样品瓶号: 2-12
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/07 21:20:46
处理时间(V2): 2026/05/08 14:40:45
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.349	24389	11.376	5589	2246	1.232	--
2	3.428	190004	88.624	18963	2753	1.259	11.083
总计		214392	100.000	24552			

图76 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042702批-均一性1-pH5.5介质-15min-片2
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 29-15/27-250-2 - zzp-6042702p-rcqx-pH5.5jz-jyx1-15min-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260507-FX276.lcb
样品瓶号: 2-21
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/07 21:26:10
处理时间(V2): 2026/05/08 14:40:48
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.349	22179	11.238	5089	2247	1.232	--
2	3.431	175180	88.762	17489	2760	1.250	11.105
总计		197359	100.000	22578			

图77 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042702批-均一性1-pH5.5介质-15min-片3
供试品溶液-1




QTL-235

＜样品信息＞

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$QTL-235 - 29-15/27-251-2 - zzp-6042702p-rcqx-pH5.5jz-jyx1-15min-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260507-FX276.lcb
样品瓶号: 2-30
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/07 21:31:34
处理时间(V2): 2026/05/08 14:40:51
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.348	22790	11.334	5228	2244	1.231	--
2	3.430	178283	88.666	17822	2758	1.250	11.098
总计		201072	100.000	23050			

图78 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042702批-均一性1-pH5.5介质-15min-片4
供试品溶液-1



QTL-235


<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 29-15/27-252-2 - zzp-6042702p-rcqx-pH5.5jz-jyx1-15min-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260507-FX276.lcb
样品瓶号: 2-39
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/07 21:36:58
处理时间(V2): 2026/05/08 14:40:53
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm

版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.350	23645	11.482	5404	2252	1.233	--
2	3.431	182281	88.518	18199	2759	1.254	11.099
总计		205926	100.000	23603			

图79 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042702批-均一性1-pH5.5介质-15min-片5
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 29-15/27-253-2 - zzp-6042702p-rcqx-pH5.5jz-jyx1-15min-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260507-FX276.lcb
样品瓶号: 2-48
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/07 21:42:22
处理时间(V2): 2026/05/08 14:40:56
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.349	23956	11.363	5493	2251	1.233	--
2	3.429	186860	88.637	18664	2755	1.258	11.094
总计		210816	100.000	24157			

图80 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042702批-均一性1-pH5.5介质-15min-片6
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 29-15/27-254-2 - zzp-6042702p-rcqx-pH5.5jz-jyx1-20min-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260507-FX276.lcb
样品瓶号: 2-4
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/07 21:47:46
处理时间(V2): 2026/05/08 14:40:58
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.349	24831	11.462	5698	2246	1.229	--
2	3.431	191802	88.538	19144	2753	1.261	11.094
总计		216633	100.000	24842			

图81 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042702批-均一性1-pH5.5介质-20min-片1
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 29-15/27-255-2 - zzp-6042702p-rcqx-pH5.5jz-jyx1-20min-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260507-FX276.lcb
样品瓶号: 2-13
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/07 21:53:10
处理时间(V2): 2026/05/08 14:41:01
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.350	26751	11.541	6097	2248	1.234	--
2	3.430	205033	88.459	20448	2746	1.269	11.072
总计		231785	100.000	26544			

图82 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042702批-均一性1-pH5.5介质-20min-片2
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 29-15/27-256-2 - zzp-6042702p-rcqx-pH5.5jz-jyx1-20min-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260507-FX276.lcb
样品瓶号: 2-22
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/07 21:58:35
处理时间(V2): 2026/05/08 14:41:03
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.348	25177	11.413	5775	2243	1.232	--
2	3.428	195427	88.587	19453	2737	1.265	11.064
总计		220604	100.000	25228			

图83 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042702批-均一性1-pH5.5介质-20min-片3
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 29-15/27-257-2 - zzp-6042702p-rcqx-pH5.5jz-jyx1-20min-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260507-FX276.lcb
样品瓶号: 2-31
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/07 22:03:58
处理时间(V2): 2026/05/08 14:41:06
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.349	25246	11.443	5787	2253	1.233	--
2	3.430	195377	88.557	19499	2748	1.263	11.085
总计		220623	100.000	25286			

图84 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042702批-均一性1-pH5.5介质-20min-片4
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 29-15/27-258-2 - zzp-6042702p-rcqx-pH5.5jz-jyx1-20min-P5.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260507-FX276.lcb

样品瓶号: 2-40

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/07 22:09:23

处理时间(V2): 2026/05/08 14:41:08

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流速: 1.5ml/min


波长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.349	26037	11.601	5954	2250	1.235	--
2	3.429	198394	88.399	19747	2739	1.268	11.067
总计		224431	100.000	25701			

图85 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042702批-均一性1-pH5.5介质-20min-片5
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 29-15/27-259-2 - zzp-6042702p-rcqx-pH5.5jz-jyx1-20min-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260507-FX276.lcb
样品瓶号: 2-49
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/07 22:14:46
处理时间(V2): 2026/05/08 14:41:11
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.349	25888	11.447	5946	2248	1.232	--
2	3.430	200270	88.553	20032	2752	1.263	11.091
总计		226157	100.000	25978			

图86 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042702批-均一性1-pH5.5介质-20min-片6
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 29-15/27-260-2 - zzp-6042702p-rcqx-pH5.5jz-jyx1-30min-P1.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260507-FX276.lcb

样品瓶号: 2-5

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/07 22:20:11

处理时间(V2): 2026/05/08 14:41:13

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min


波 长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.349	27817	11.518	6383	2246	1.234	--
2	3.429	213699	88.482	21243	2728	1.278	11.055
总计		241516	100.000	27626			

图87 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042702批-均一性1-pH5.5介质-30min-片1
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 29-15/27-261-2 - zzp-6042702p-rcqx-pH5.5jz-jyx1-30min-P2.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260507-FX276.lcb

样品瓶号: 2-14

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/07 22:25:36

处理时间(V2): 2026/05/08 14:41:16

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min


波 长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.349	29217	11.558	6684	2252	1.234	--
2	3.429	223571	88.442	22193	2724	1.284	11.044
总计		252788	100.000	28877			

图88 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042702批-均一性1-pH5.5介质-30min-片2
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 29-15/27-262-2 - zzp-6042702p-rcqx-pH5.5jz-jyx1-30min-P3.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260507-FX276.lcb

样品瓶号: 2-23

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/07 22:31:00

处理时间(V2): 2026/05/08 14:41:18

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流速: 1.5ml/min


波长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.348	28181	11.459	6464	2246	1.235	--
2	3.428	217752	88.541	21637	2724	1.280	11.046
总计		245933	100.000	28101			

图89 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042702批-均一性1-pH5.5介质-30min-片3
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 29-15/27-263-2 - zzp-6042702p-rcqx-pH5.5jz-jyx1-30min-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260507-FX276.lcb
样品瓶号: 2-32
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/07 22:36:24
处理时间(V2): 2026/05/08 14:41:21
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.348	27967	11.484	6416	2249	1.234	--
2	3.429	215571	88.516	21443	2734	1.280	11.067
总计		243538	100.000	27859			

图90 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042702批-均一性1-pH5.5介质-30min-片4
供试品溶液-1



QTL-235


＜样品信息＞

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$QTL-235 - 29-15/27-264-2 - zzp-6042702p-rcqx-pH5.5jz-jyx1-30min-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260507-FX276.lcb
样品瓶号: 2-41
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/07 22:41:49
处理时间(V2): 2026/05/08 14:41:24
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm

版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.349	28574	11.594	6552	2251	1.230	--
2	3.429	217879	88.406	21634	2725	1.281	11.050
总计		246453	100.000	28187			

图91 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042702批-均一性1-pH5.5介质-30min-片5
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 29-15/27-265-2 - zzp-6042702p-rcqx-pH5.5jz-jyx1-30min-P6.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260507-FX276.lcb

样品瓶号: 2-50

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/07 22:47:13

处理时间(V2): 2026/05/08 14:41:26

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流速: 1.5ml/min


波长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.351	28194	11.403	6402	2251	1.236	--
2	3.432	219052	88.597	21759	2734	1.283	11.060
总计		247246	100.000	28161			

图92 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042702批-均一性1-pH5.5介质-30min-片6
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 29-15/27-266-2 - zzp-6042702p-rcqx-pH5.5jz-jyx1-45min-P1.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260507-FX276.lcb

样品瓶号: 2-6

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/07 22:52:37

处理时间(V2): 2026/05/08 14:41:29

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min


波 长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.350	29739	11.487	6790	2249	1.235	--
2	3.429	229161	88.513	22738	2719	1.289	11.033
总计		258900	100.000	29528			

图93 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042702批-均一性1-pH5.5介质-45min-片1
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 29-15/27-267-2 - zzp-6042702p-rcqx-pH5.5jz-jyx1-45min-P2.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260507-FX276.lcb

样品瓶号: 2-15

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/07 22:58:02

处理时间(V2): 2026/05/08 14:41:31

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min


波 长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.352	30621	11.418	6969	2252	1.232	--
2	3.431	237563	88.582	23563	2721	1.296	11.031
总计		268184	100.000	30532			

图94 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042702批-均一性1-pH5.5介质-45min-片2
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 29-15/27-268-2 - zzp-6042702p-rcqx-pH5.5jz-jyx1-45min-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260507-FX276.lcb
样品瓶号: 2-24
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/07 23:03:26
处理时间(V2): 2026/05/08 14:41:34
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.349	30182	11.409	6915	2249	1.234	--
2	3.431	234365	88.591	23211	2712	1.295	11.035
总计		264546	100.000	30125			

图95 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042702批-均一性1-pH5.5介质-45min-片3
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 29-15/27-269-2 - zzp-6042702p-rcqx-pH5.5jz-jyx1-45min-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260507-FX276.lcb
样品瓶号: 2-33
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/07 23:08:51
处理时间(V2): 2026/05/08 14:41:36
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.349	30041	11.434	6875	2253	1.235	--
2	3.431	232695	88.566	23051	2714	1.293	11.039
总计		262736	100.000	29926			

图96 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042702批-均一性1-pH5.5介质-45min-片4
供试品溶液-1



QTL-235

＜样品信息＞

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$QTL-235 - 29-15/27-270-2 - zzp-6042702p-rcqx-pH5.5jz-jyx1-45min-P5.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260507-FX276.lcb

样品瓶号: 2-42

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/07 23:14:15

处理时间(V2): 2026/05/08 14:41:39

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min


波 长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.350	30473	11.535	6954	2246	1.234	--
2	3.432	233709	88.465	23111	2708	1.294	11.027
总计		264182	100.000	30065			

图97 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042702批-均一性1-pH5.5介质-45min-片5
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 29-15/27-271-2 - zzp-6042702p-rcqx-pH5.5jz-jyx1-45min-P6.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260507-FX276.lcb

样品瓶号: 2-51

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/07 23:19:38

处理时间(V2): 2026/05/08 14:41:41

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min


波 长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.351	29893	11.316	6786	2250	1.236	--
2	3.434	234271	88.684	23156	2713	1.295	11.034
总计		264164	100.000	29942			

图98 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042702批-均一性1-pH5.5介质-45min-片6
供试品溶液-1




QTL-235

＜样品信息＞

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$QTL-235 - 29-15/27-272-2 - zzp-6042702p-rcqx-pH5.5jz-jyx1-60min-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260507-FX276.lcb
样品瓶号: 2-7
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/07 23:25:02
处理时间(V2): 2026/05/08 14:41:44
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.352	30806	11.521	7021	2251	1.234	--
2	3.434	236590	88.479	23380	2708	1.297	11.019
总计		267396	100.000	30401			

图99 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042702批-均一性1-pH5.5介质-60min-片1
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 29-15/27-273-2 - zzp-6042702p-rcqx-pH5.5jz-jyx1-60min-P2.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260507-FX276.lcb

样品瓶号: 2-16

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/07 23:30:27

处理时间(V2): 2026/05/08 14:41:46

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min


波 长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.351	31465	11.336	7158	2251	1.233	--
2	3.433	246109	88.664	24305	2703	1.303	11.019
总计		277574	100.000	31462			

图100 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042702批-均一性1-pH5.5介质-60min-片2
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 29-15/27-274-2 - zzp-6042702p-rcqx-pH5.5jz-jyx1-60min-P3.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260507-FX276.lcb

样品瓶号: 2-25

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/07 23:35:53

处理时间(V2): 2026/05/08 14:41:49

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min


波 长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.350	31148	11.348	7104	2249	1.233	--
2	3.432	243341	88.652	24055	2707	1.301	11.022
总计		274489	100.000	31158			

图101 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042702批-均一性1-pH5.5介质-60min-片3
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 29-15/27-275-2 - zzp-6042702p-rcqx-pH5.5jz-jyx1-60min-P4.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260507-FX276.lcb

样品瓶号: 2-34

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/07 23:41:18

处理时间(V2): 2026/05/08 14:41:51

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min


波 长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.350	30763	11.485	7004	2247	1.234	--
2	3.432	237089	88.515	23469	2711	1.298	11.027
总计		267852	100.000	30473			

图102 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042702批-均一性1-pH5.5介质-60min-片4
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 29-15/27-276-2 - zzp-6042702p-rcqx-pH5.5jz-jyx1-60min-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260507-FX276.lcb
样品瓶号: 2-43
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/07 23:46:43
处理时间(V2): 2026/05/08 14:41:54
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.351	31194	11.435	7079	2249	1.234	--
2	3.435	241593	88.565	23846	2707	1.300	11.027
总计		272787	100.000	30925			

图103 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042702批-均一性1-pH5.5介质-60min-片5
供试品溶液-1



QTL-235


＜样品信息＞

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$QTL-235 - 29-15/27-277-2 - zzp-6042702p-rcqx-pH5.5jz-jyx1-60min-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260507-FX276.lcb
样品瓶号: 2-52
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/07 23:52:07
处理时间(V2): 2026/05/08 14:41:56
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm

版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.351	30849	11.269	7009	2254	1.233	--
2	3.433	242901	88.731	24004	2706	1.302	11.023
总计		273750	100.000	31013			

图104 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042702批-均一性1-pH5.5介质-60min-片6
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 29-15/27-278-2 - zzp-6042702p-rcqx-pH5.5jz-jyx1-JX-P1.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260507-FX276.lcb

样品瓶号: 2-8

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/07 23:57:31

处理时间(V2): 2026/05/08 14:41:59

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流速: 1.5ml/min


波长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.351	31368	11.462	7123	2246	1.235	--
2	3.434	242306	88.538	23870	2701	1.303	11.012
总计		273675	100.000	30992			

图105 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042702批-均一性1-pH5.5介质-极限转速-片1
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 29-15/27-279-2 - zzp-6042702p-rcqx-pH5.5jz-jyx1-JX-P2.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260507-FX276.lcb

样品瓶号: 2-17

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/08 00:02:57

处理时间(V2): 2026/05/08 14:42:01

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流速: 1.5ml/min


波长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.353	32171	11.345	7344	2251	1.232	--
2	3.435	251383	88.655	24770	2699	1.310	11.005
总计		283554	100.000	32113			

图106 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042702批-均一性1-pH5.5介质-极限转速-片2
供试品溶液-1



QTL-235

＜样品信息＞

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$QTL-235 - 29-15/27-280-2 - zzp-6042702p-rcqx-pH5.5jz-jyx1-JX-P3.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260507-FX276.lcb

样品瓶号: 2-26

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/08 00:08:21

处理时间(V2): 2026/05/08 14:42:04

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min


波 长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.352	31805	11.325	7261	2256	1.233	--
2	3.435	249041	88.675	24557	2702	1.305	11.018
总计		280846	100.000	31818			

图107 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042702批-均一性1-pH5.5介质-极限转速-片3
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 29-15/27-281-2 - zzp-6042702p-rcqx-pH5.5jz-jyx1-JX-P4.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260507-FX276.lcb

样品瓶号: 2-35

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/08 00:13:45

处理时间(V2): 2026/05/08 14:42:06

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流速: 1.5ml/min


波长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.350	31801	11.451	7241	2252	1.235	--
2	3.433	245923	88.549	24284	2704	1.305	11.023
总计		277724	100.000	31525			

图108 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042702批-均一性1-pH5.5介质-极限转速-片4
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 29-15/27-282-2 - zzp-6042702p-rcqx-pH5.5jz-jyx1-JX-P5.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260507-FX276.lcb

样品瓶号: 2-44

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/08 00:19:11

处理时间(V2): 2026/05/08 14:42:09

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min


波 长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.351	31984	11.454	7265	2249	1.233	--
2	3.435	247256	88.546	24391	2706	1.306	11.020
总计		279240	100.000	31656			

图109 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042702批-均一性1-pH5.5介质-极限转速-片5
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$QTL-235 - 29-15/27-283-2 - zzp-6042702p-rcqx-pH5.5jz-jyx1-JX-P6.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260507-FX276.lcb

样品瓶号: 2-53

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/08 00:24:35

处理时间(V2): 2026/05/08 14:42:11

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流速: 1.5ml/min


波长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.351	31560	11.285	7179	2259	1.235	--
2	3.435	248089	88.715	24453	2703	1.306	11.029
总计		279648	100.000	31632			

图110 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042702批-均一性1-pH5.5介质-极限转速-片6
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 29-16/27-284-2 - zzp-6042702p-rcqx-pH5.5jz-jyx1-dz-2-1.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260507-FX276.lcb

样品瓶号: 2-27

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/08 00:30:00

处理时间(V2): 2026/05/08 14:44:34

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min


波 长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.325	37678	12.066	7197	1493	1.232	--
2	3.423	274578	87.934	25764	2378	1.356	10.038
总计		312255	100.000	32961			

图111 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042702批-均一性1-pH5.5介质
对照品溶液-2-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 29-16/27-285-2 - zzp-6042702p-rcqx-pH5.5jz-jyx1-dz-2-2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260507-FX276.lcb
样品瓶号: 2-27
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/08 00:35:24
处理时间(V2): 2026/05/08 14:44:37
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.325	37785	12.123	7222	1493	1.234	--
2	3.423	273901	87.877	25770	2389	1.358	10.057
总计		311685	100.000	32992			

图112 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042702批-均一性1-pH5.5介质
对照品溶液-2-2



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温: 30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 29-18/27-286-2 - zzp-6042703p-rcqx-pH5.5jz-jyx1-rj.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260507-FX276.lcb

样品瓶号: 3-9

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/08 00:40:48

处理时间(V2): 2026/05/08 14:45:29

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流速: 1.5ml/min


波长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图113 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042703批-均一性1-pH5.5介质
溶剂



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 29-18/27-287-2 - zzp-6042703p-rcqx-pH5.5jz-jyx1-dz-1-1.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260507-FX276.lcb

样品瓶号: 3-18

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/08 00:46:10

处理时间(V2): 2026/05/08 14:45:32

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min


波 长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.324	37102	11.978	7022	1478	1.253	--
2	3.425	272651	88.022	25410	2394	1.369	10.058
总计		309753	100.000	32433			

图114 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042703批-均一性1-pH5.5介质
对照品溶液-1-1




QTL-235

＜样品信息＞

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$QTL-235 - 29-18/27-288-2 - zzp-6042703p-rcqx-pH5.5jz-jyx1-dz-1-2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260507-FX276.lcb
样品瓶号: 3-18
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/08 00:51:33
处理时间(V2): 2026/05/08 14:45:35
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.326	37146	11.986	6997	1482	1.254	--
2	3.427	272758	88.014	25446	2399	1.368	10.065
总计		309904	100.000	32443			

图115 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042703批-均一性1-pH5.5介质
对照品溶液-1-2




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 29-18/27-289-2 - zzp-6042703p-rcqx-pH5.5jz-jyx1-dz-1-3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260507-FX276.lcb
样品瓶号: 3-18
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/08 00:56:57
处理时间(V2): 2026/05/08 14:45:38
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.326	37170	11.971	7014	1484	1.254	--
2	3.427	273342	88.029	25465	2394	1.367	10.062
总计		310511	100.000	32479			

图116 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042703批-均一性1-pH5.5介质
对照品溶液-1-3




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 29-18/27-290-2 - zzp-6042703p-rcqx-pH5.5jz-jyx1-dz-1-4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260507-FX276.lcb
样品瓶号: 3-18
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/08 01:02:20
处理时间(V2): 2026/05/08 14:45:40
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.324	36966	11.984	6991	1476	1.251	--
2	3.427	271482	88.016	25336	2404	1.365	10.075
总计		308448	100.000	32326			

图117 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042703批-均一性1-pH5.5介质
对照品溶液-1-4



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 29-18/27-291-2 - zzp-6042703p-rcqx-pH5.5jz-jyx1-dz-1-5.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260507-FX276.lcb

样品瓶号: 3-18

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/08 01:07:42

处理时间(V2): 2026/05/08 14:45:43

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min


波 长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.325	37182	12.016	7008	1479	1.253	--
2	3.430	272241	87.984	25421	2407	1.365	10.082
总计		309423	100.000	32429			

图118 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042703批-均一性1-pH5.5介质
对照品溶液-1-5




QTL-235

＜样品信息＞

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 29-18/27-292-2 - zzp-6042703p-rcqx-pH5.5jz-jyx1-5min-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260507-FX276.lcb
样品瓶号: 3-1
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/08 01:13:04
处理时间(V2): 2026/05/08 14:45:45
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.350	7507	10.477	1712	2242	1.225	--
2	3.458	64146	89.523	6454	2806	1.156	11.240
总计		71653	100.000	8166			

图119 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042703批-均一性1-pH5.5介质-5min-片1
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 29-18/27-293-2 - zzp-6042703p-rcqx-pH5.5jz-jyx1-5min-P2.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260507-FX276.lcb

样品瓶号: 3-10

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/08 01:18:27

处理时间(V2): 2026/05/08 14:45:48

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min


波 长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.350	10998	10.456	2501	2248	1.234	--
2	3.458	94182	89.544	9382	2788	1.198	11.212
总计		105180	100.000	11883			

图120 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042703批-均一性1-pH5.5介质-5min-片2
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 29-18/27-294-2 - zzp-6042703p-rcqx-pH5.5jz-jyx1-5min-P3.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260507-FX276.lcb

样品瓶号: 3-19

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/08 01:23:49

处理时间(V2): 2026/05/08 14:45:50

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min


波 长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.352	11321	10.313	2590	2265	1.231	--
2	3.460	98453	89.687	9816	2804	1.201	11.243
总计		109774	100.000	12406			

图121 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042703批-均一性1-pH5.5介质-5min-片3
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 29-18/27-295-2 - zzp-6042703p-rcqx-pH5.5jz-jyx1-5min-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260507-FX276.lcb
样品瓶号: 3-28
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/08 01:29:11
处理时间(V2): 2026/05/08 14:45:53
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.351	10531	10.309	2398	2260	1.229	--
2	3.460	91624	89.691	9306	2893	1.180	11.371
总计		102154	100.000	11704			

图122 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042703批-均一性1-pH5.5介质-5min-片4
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 29-18/27-296-2 - zzp-6042703p-rcqx-pH5.5jz-jyx1-5min-P5.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260507-FX276.lcb

样品瓶号: 3-37

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/08 01:34:34

处理时间(V2): 2026/05/08 14:45:55

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流速: 1.5ml/min


波长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.349	10271	10.385	2351	2249	1.232	--
2	3.452	88639	89.615	8866	2801	1.190	11.222
总计		98910	100.000	11217			

图123 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042703批-均一性1-pH5.5介质-5min-片5
供试品溶液-1



QTL-235

＜样品信息＞

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$QTL-235 - 29-18/27-297-2 - zzp-6042703p-rcqx-pH5.5jz-jyx1-5min-P6.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260507-FX276.lcb

样品瓶号: 3-46

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/08 01:39:56

处理时间(V2): 2026/05/08 14:45:57

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min


波 长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.350	9890	10.303	2255	2253	1.228	--
2	3.454	86103	89.697	8617	2805	1.191	11.229
总计		95993	100.000	10871			

图124 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042703批-均一性1-pH5.5介质-5min-片6
供试品溶液-1



QTL-235

＜样品信息＞

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$QTL-235 - 29-18/27-298-2 - zzp-6042703p-rcqx-pH5.5jz-jyx1-10min-P1.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260507-FX276.lcb

样品瓶号: 3-2

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/08 01:45:18

处理时间(V2): 2026/05/08 14:46:00

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min


波 长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.350	18186	11.015	4152	2256	1.232	--
2	3.445	146916	88.985	14616	2759	1.234	11.143
总计		165102	100.000	18769			

图125 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042703批-均一性1-pH5.5介质-10min-片1
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 29-18/27-299-2 - zzp-6042703p-rcqx-pH5.5jz-jyx1-10min-P2.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260507-FX276.lcb

样品瓶号: 3-11

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/08 01:50:41

处理时间(V2): 2026/05/08 14:46:03

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min


波 长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.350	20535	11.335	4687	2250	1.230	--
2	3.449	160626	88.665	15921	2747	1.244	11.131
总计		181161	100.000	20608			

图126 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042703批-均一性1-pH5.5介质-10min-片2
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 29-18/27-300-2 - zzp-6042703p-rcqx-pH5.5jz-jyx1-10min-P3.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260507-FX276.lcb

样品瓶号: 3-20

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/08 01:56:03

处理时间(V2): 2026/05/08 14:46:05

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流速: 1.5ml/min


波长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.351	20349	11.181	4642	2262	1.231	--
2	3.449	161654	88.819	16046	2757	1.245	11.146
总计		182003	100.000	20687			

图127 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042703批-均一性1-pH5.5介质-10min-片3
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 29-18/27-301-2 - zzp-6042703p-rcqx-pH5.5jz-jyx1-10min-P4.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260507-FX276.lcb

样品瓶号: 3-29

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/08 02:01:27

处理时间(V2): 2026/05/08 14:46:07

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min


波 长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.350	20039	11.108	4575	2247	1.232	--
2	3.448	160373	88.892	15894	2749	1.247	11.132
总计		180412	100.000	20469			

图128 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042703批-均一性1-pH5.5介质-10min-片4
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 29-18/27-302-2 - zzp-6042703p-rcqx-pH5.5jz-jyx1-10min-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260507-FX276.lcb
样品瓶号: 3-38
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/08 02:06:49
处理时间(V2): 2026/05/08 14:46:10
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.352	19749	11.249	4499	2253	1.232	--
2	3.452	155810	88.751	15458	2763	1.241	11.156
总计		175559	100.000	19957			

图129 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042703批-均一性1-pH5.5介质-10min-片5
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 29-18/27-303-2 - zzp-6042703p-rcqx-pH5.5jz-jyx1-10min-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260507-FX276.lcb
样品瓶号: 3-47
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/08 02:12:11
处理时间(V2): 2026/05/08 14:46:13
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.351	19198	11.037	4373	2256	1.230	--
2	3.451	154745	88.963	15357	2761	1.240	11.155
总计		173943	100.000	19730			

图130 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042703批-均一性1-pH5.5介质-10min-片6
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 29-18/27-304-2 - zzp-6042703p-rcqx-pH5.5jz-jyx1-15min-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260507-FX276.lcb
样品瓶号: 3-3
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/08 02:17:34
处理时间(V2): 2026/05/08 14:46:15
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.351	22908	11.356	5201	2253	1.235	--
2	3.449	178816	88.644	17644	2734	1.263	11.110
总计		201724	100.000	22845			

图131 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042703批-均一性1-pH5.5介质-15min-片1
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 29-18/27-305-2 - zzp-6042703p-rcqx-pH5.5jz-jyx1-15min-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260507-FX276.lcb
样品瓶号: 3-12
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/08 02:22:56
处理时间(V2): 2026/05/08 14:46:18
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.351	24240	11.515	5505	2251	1.234	--
2	3.448	186276	88.485	18391	2728	1.266	11.098
总计		210516	100.000	23895			

图132 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042703批-均一性1-pH5.5介质-15min-片2
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 29-18/27-306-2 - zzp-6042703p-rcqx-pH5.5jz-jyx1-15min-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260507-FX276.lcb
样品瓶号: 3-21
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/08 02:28:18
处理时间(V2): 2026/05/08 14:46:20
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.350	24110	11.451	5490	2247	1.229	--
2	3.448	186435	88.549	18405	2728	1.265	11.098
总计		210545	100.000	23895			

图133 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042703批-均一性1-pH5.5介质-15min-片3
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 29-18/27-307-2 - zzp-6042703p-rcqx-pH5.5jz-jyx1-15min-P4.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260507-FX276.lcb

样品瓶号: 3-30

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/08 02:33:41

处理时间(V2): 2026/05/08 14:46:23

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min


波 长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.352	23892	11.461	5450	2253	1.233	--
2	3.450	184581	88.539	18240	2738	1.265	11.108
总计		208473	100.000	23690			

图134 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042703批-均一性1-pH5.5介质-15min-片4
供试品溶液-1




QTL-235

＜样品信息＞

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$QTL-235 - 29-18/27-308-2 - zzp-6042703p-rcqx-pH5.5jz-jyx1-15min-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260507-FX276.lcb
样品瓶号: 3-39
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/08 02:39:03
处理时间(V2): 2026/05/08 14:46:25
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.351	23754	11.506	5401	2251	1.231	--
2	3.450	182692	88.494	18034	2732	1.262	11.109
总计		206447	100.000	23436			

图135 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042703批-均一性1-pH5.5介质-15min-片5
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 29-18/27-309-2 - zzp-6042703p-rcqx-pH5.5jz-jyx1-15min-P6.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260507-FX276.lcb

样品瓶号: 3-48

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/08 02:44:26

处理时间(V2): 2026/05/08 14:46:28

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min


波 长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.351	23421	11.387	5326	2254	1.235	--
2	3.450	182269	88.613	17996	2737	1.264	11.114
总计		205690	100.000	23323			

图136 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042703批-均一性1-pH5.5介质-15min-片6
供试品溶液-1




QTL-235

＜样品信息＞

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 29-18/27-310-2 - zzp-6042703p-rcqx-pH5.5jz-jyx1-20min-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260507-FX276.lcb
样品瓶号: 3-4
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/08 02:49:48
处理时间(V2): 2026/05/08 14:46:30
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.352	25344	11.498	5765	2252	1.232	--
2	3.449	195088	88.502	19220	2723	1.274	11.085
总计		220432	100.000	24986			

图137 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042703批-均一性1-pH5.5介质-20min-片1
供试品溶液-1



QTL-235

＜样品信息＞

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$QTL-235 - 29-18/27-311-2 - zzp-6042703p-rcqx-pH5.5jz-jyx1-20min-P2.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260507-FX276.lcb

样品瓶号: 3-13

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/08 02:55:10

处理时间(V2): 2026/05/08 14:46:33

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min


波 长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.351	26232	11.598	5950	2249	1.234	--
2	3.450	199954	88.402	19668	2716	1.277	11.085
总计		226186	100.000	25618			

图138 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042703批-均一性1-pH5.5介质-20min-片2
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 29-18/27-312-2 - zzp-6042703p-rcqx-pH5.5jz-jyx1-20min-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260507-FX276.lcb
样品瓶号: 3-22
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/08 03:00:31
处理时间(V2): 2026/05/08 14:46:35
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.351	26014	11.496	5907	2246	1.235	--
2	3.449	200268	88.504	19749	2717	1.275	11.081
总计		226282	100.000	25656			

图139 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042703批-均一性1-pH5.5介质-20min-片3
供试品溶液-1



QTL-235

＜样品信息＞

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 29-18/27-313-2 - zzp-6042703p-rcqx-pH5.5jz-jyx1-20min-P4.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260507-FX276.lcb

样品瓶号: 3-31

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/08 03:05:53

处理时间(V2): 2026/05/08 14:46:38

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min


波 长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.352	25902	11.511	5894	2248	1.232	--
2	3.451	199123	88.489	19589	2717	1.275	11.083
总计		225025	100.000	25483			

图140 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042703批-均一性1-pH5.5介质-20min-片4
供试品溶液-1




QTL-235

＜样品信息＞

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 29-18/27-314-2 - zzp-6042703p-rcqx-pH5.5jz-jyx1-20min-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260507-FX276.lcb
样品瓶号: 3-40
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/08 03:11:16
处理时间(V2): 2026/05/08 14:46:40
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.351	25912	11.667	5883	2249	1.234	--
2	3.450	196195	88.333	19308	2723	1.276	11.093
总计		222108	100.000	25192			

图141 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042703批-均一性1-pH5.5介质-20min-片5
供试品溶液-1




QTL-235

＜样品信息＞

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$QTL-235 - 29-18/27-315-2 - zzp-6042703p-rcqx-pH5.5jz-jyx1-20min-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260507-FX276.lcb
样品瓶号: 3-49
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/08 03:16:38
处理时间(V2): 2026/05/08 14:46:42
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.351	25669	11.518	5829	2253	1.233	--
2	3.450	197186	88.482	19458	2732	1.273	11.110
总计		222856	100.000	25287			

图142 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042703批-均一性1-pH5.5介质-20min-片6
供试品溶液-1




QTL-235

＜样品信息＞

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$QTL-235 - 29-18/27-316-2 - zzp-6042703p-rcqx-pH5.5jz-jyx1-30min-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260507-FX276.lcb
样品瓶号: 3-5
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/08 03:22:00
处理时间(V2): 2026/05/08 14:46:45
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.351	27693	11.510	6304	2253	1.231	--
2	3.449	212899	88.490	20935	2708	1.287	11.071
总计		240592	100.000	27239			

图143 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042703批-均一性1-pH5.5介质-30min-片1
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 29-18/27-317-2 - zzp-6042703p-rcqx-pH5.5jz-jyx1-30min-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260507-FX276.lcb
样品瓶号: 3-14
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/08 03:27:23
处理时间(V2): 2026/05/08 14:46:47
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.352	28504	11.563	6495	2248	1.231	--
2	3.448	218007	88.437	21419	2705	1.291	11.053
总计		246511	100.000	27914			

图144 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042703批-均一性1-pH5.5介质-30min-片2
供试品溶液-1



QTL-235

＜样品信息＞

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$QTL-235 - 29-18/27-318-2 - zzp-6042703p-rcqx-pH5.5jz-jyx1-30min-P3.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260507-FX276.lcb

样品瓶号: 3-23

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/08 03:32:45

处理时间(V2): 2026/05/08 14:46:50

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min


波 长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.351	28396	11.543	6447	2254	1.234	--
2	3.449	217594	88.457	21409	2707	1.289	11.073
总计		245989	100.000	27856			

图145 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042703批-均一性1-pH5.5介质-30min-片3
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 29-18/27-319-2 - zzp-6042703p-rcqx-pH5.5jz-jyx1-30min-P4.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260507-FX276.lcb

样品瓶号: 3-32

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/08 03:38:07

处理时间(V2): 2026/05/08 14:46:52

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流速: 1.5ml/min


波长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.351	28160	11.521	6400	2251	1.234	--
2	3.450	216268	88.479	21240	2708	1.290	11.071
总计		244428	100.000	27640			

图146 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042703批-均一性1-pH5.5介质-30min-片4
供试品溶液-1



QTL-235

＜样品信息＞

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$QTL-235 - 29-18/27-320-2 - zzp-6042703p-rcqx-pH5.5jz-jyx1-30min-P5.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260507-FX276.lcb

样品瓶号: 3-41

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/08 03:43:30

处理时间(V2): 2026/05/08 14:46:55

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min


波 长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.352	28245	11.649	6435	2251	1.233	--
2	3.451	214228	88.351	21033	2712	1.288	11.077
总计		242472	100.000	27468			

图147 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042703批-均一性1-pH5.5介质-30min-片5
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 29-18/27-321-2 - zzp-6042703p-rcqx-pH5.5jz-jyx1-30min-P6.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260507-FX276.lcb

样品瓶号: 3-50

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/08 03:48:51

处理时间(V2): 2026/05/08 14:46:57

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min


波 长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.353	27864	11.556	6372	2257	1.230	--
2	3.453	213261	88.444	20976	2711	1.287	11.080
总计		241125	100.000	27348			

图148 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042703批-均一性1-pH5.5介质-30min-片6
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 29-18/27-322-2 - zzp-6042703p-rcqx-pH5.5jz-jyx1-45min-P1.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260507-FX276.lcb

样品瓶号: 3-6

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/08 03:54:14

处理时间(V2): 2026/05/08 14:47:00

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min


波 长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.351	29437	11.435	6693	2247	1.232	--
2	3.449	227990	88.565	22358	2695	1.299	11.046
总计		257428	100.000	29052			

图149 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042703批-均一性1-pH5.5介质-45min-片1
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 29-18/27-323-2 - zzp-6042703p-rcqx-pH5.5jz-jyx1-45min-P2.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260507-FX276.lcb

样品瓶号: 3-15

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/08 03:59:36

处理时间(V2): 2026/05/08 14:47:02

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min


波 长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.351	30159	11.510	6855	2255	1.235	--
2	3.448	231858	88.490	22753	2694	1.301	11.051
总计		262017	100.000	29608			

图150 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042703批-均一性1-pH5.5介质-45min-片2
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 29-18/27-324-2 - zzp-6042703p-rcqx-pH5.5jz-jyx1-45min-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260507-FX276.lcb
样品瓶号: 3-24
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/08 04:04:58
处理时间(V2): 2026/05/08 14:47:05
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.352	29942	11.486	6820	2249	1.233	--
2	3.450	230727	88.514	22598	2691	1.299	11.042
总计		260668	100.000	29418			

图151 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042703批-均一性1-pH5.5介质-45min-片3
供试品溶液-1



QTL-235


＜样品信息＞

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$QTL-235 - 29-18/27-325-2 - zzp-6042703p-rcqx-pH5.5jz-jyx1-45min-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260507-FX276.lcb
样品瓶号: 3-33
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/08 04:10:20
处理时间(V2): 2026/05/08 14:47:07
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm

版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.353	29844	11.520	6819	2257	1.232	--
2	3.452	229223	88.480	22490	2705	1.298	11.063
总计		259067	100.000	29310			

图152 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042703批-均一性1-pH5.5介质-45min-片4
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 29-18/27-326-2 - zzp-6042703p-rcqx-pH5.5jz-jyx1-45min-P5.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260507-FX276.lcb

样品瓶号: 3-42

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/08 04:15:42

处理时间(V2): 2026/05/08 14:47:10

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min


波 长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.352	29978	11.635	6851	2259	1.231	--
2	3.450	227673	88.365	22342	2700	1.298	11.057
总计		257651	100.000	29193			

图153 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042703批-均一性1-pH5.5介质-45min-片5
供试品溶液-1



QTL-235

＜样品信息＞

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$QTL-235 - 29-18/27-327-2 - zzp-6042703p-rcqx-pH5.5jz-jyx1-45min-P6.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260507-FX276.lcb

样品瓶号: 3-51

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/08 04:21:04

处理时间(V2): 2026/05/08 14:47:12

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min


波 长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.351	29678	11.492	6754	2254	1.232	--
2	3.449	228581	88.508	22430	2697	1.298	11.056
总计		258259	100.000	29185			

图154 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042703批-均一性1-pH5.5介质-45min-片6
供试品溶液-1




QTL-235

＜样品信息＞

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 29-18/27-328-2 - zzp-6042703p-rcqx-pH5.5jz-jyx1-60min-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260507-FX276.lcb
样品瓶号: 3-7
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/08 04:26:25
处理时间(V2): 2026/05/08 14:47:15
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.353	30342	11.397	6931	2256	1.231	--
2	3.450	235892	88.603	23118	2699	1.305	11.053
总计		266234	100.000	30048			

图155 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042703批-均一性1-pH5.5介质-60min-片1
供试品溶液-1



QTL-235


＜样品信息＞

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$QTL-235 - 29-18/27-329-2 - zzp-6042703p-rcqx-pH5.5jz-jyx1-60min-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260507-FX276.lcb
样品瓶号: 3-16
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/08 04:31:48
处理时间(V2): 2026/05/08 14:47:17
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm

版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.351	31022	11.473	7059	2252	1.230	--
2	3.449	239362	88.527	23430	2682	1.309	11.033
总计		270384	100.000	30489			

图156 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042703批-均一性1-pH5.5介质-60min-片2
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 29-18/27-330-2 - zzp-6042703p-rcqx-pH5.5jz-jyx1-60min-P3.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260507-FX276.lcb

样品瓶号: 3-25

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/08 04:37:09

处理时间(V2): 2026/05/08 14:47:20

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流速: 1.5ml/min


波长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.352	30772	11.446	7009	2251	1.231	--
2	3.449	238083	88.554	23364	2700	1.307	11.055
总计		268855	100.000	30373			

图157 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042703批-均一性1-pH5.5介质-60min-片3
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 29-18/27-331-2 - zzp-6042703p-rcqx-pH5.5jz-jyx1-60min-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260507-FX276.lcb
样品瓶号: 3-34
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/08 04:42:32
处理时间(V2): 2026/05/08 14:47:22
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.353	30886	11.549	7053	2256	1.231	--
2	3.451	236559	88.451	23170	2700	1.306	11.055
总计		267445	100.000	30223			

图158 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042703批-均一性1-pH5.5介质-60min-片4
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 29-18/27-332-2 - zzp-6042703p-rcqx-pH5.5jz-jyx1-60min-P5.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260507-FX276.lcb

样品瓶号: 3-43

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/08 04:47:53

处理时间(V2): 2026/05/08 14:47:25

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流速: 1.5ml/min


波长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.352	30866	11.607	7025	2254	1.232	--
2	3.452	235060	88.393	23021	2696	1.305	11.060
总计		265926	100.000	30045			

图159 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042703批-均一性1-pH5.5介质-60min-片5
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 29-18/27-333-2 - zzp-6042703p-rcqx-pH5.5jz-jyx1-60min-P6.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260507-FX276.lcb

样品瓶号: 3-52

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/08 04:53:15

处理时间(V2): 2026/05/08 14:47:28

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流速: 1.5ml/min


波长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.353	30471	11.472	6971	2254	1.230	--
2	3.455	235146	88.528	23083	2704	1.304	11.067
总计		265617	100.000	30053			

图160 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042703批-均一性1-pH5.5介质-60min-片6
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 29-18/27-334-2 - zzp-6042703p-rcqx-pH5.5jz-jyx1-JX-P1.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260507-FX276.lcb

样品瓶号: 3-8

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/08 04:58:39

处理时间(V2): 2026/05/08 14:47:30

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min


波 长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.353	31030	11.389	7085	2252	1.229	--
2	3.452	241418	88.611	23641	2695	1.311	11.047
总计		272448	100.000	30726			

图161 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042703批-均一性1-pH5.5介质-极限转速-片1
供试品溶液-1



QTL-235

＜样品信息＞

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$QTL-235 - 29-18/27-335-2 - zzp-6042703p-rcqx-pH5.5jz-jyx1-JX-P2.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260507-FX276.lcb

样品瓶号: 3-17

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/08 05:04:02

处理时间(V2): 2026/05/08 14:47:33

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min


波 长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.352	31437	11.427	7165	2256	1.232	--
2	3.450	243668	88.573	23876	2691	1.311	11.048
总计		275105	100.000	31041			

图162 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042703批-均一性1-pH5.5介质-极限转速-片2
供试品溶液-1



QTL-235

＜样品信息＞

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$QTL-235 - 29-18/27-336-2 - zzp-6042703p-rcqx-pH5.5jz-jyx1-JX-P3.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260507-FX276.lcb

样品瓶号: 3-26

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/08 05:09:25

处理时间(V2): 2026/05/08 14:47:35

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min


波 长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.354	31543	11.459	7228	2260	1.229	--
2	3.452	243713	88.541	23872	2692	1.312	11.040
总计		275256	100.000	31100			

图163 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042703批-均一性1-pH5.5介质-极限转速-片3
供试品溶液-1



QTL-235

＜样品信息＞

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$QTL-235 - 29-18/27-337-2 - zzp-6042703p-rcqx-pH5.5jz-jyx1-JX-P4.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260507-FX276.lcb

样品瓶号: 3-35

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/08 05:14:48

处理时间(V2): 2026/05/08 14:47:37

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min


波 长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.353	31375	11.521	7176	2257	1.230	--
2	3.453	240960	88.479	23622	2695	1.309	11.051
总计		272335	100.000	30797			

图164 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042703批-均一性1-pH5.5介质-极限转速-片4
供试品溶液-1



QTL-235

＜样品信息＞

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$QTL-235 - 29-18/27-338-2 - zzp-6042703p-rcqx-pH5.5jz-jyx1-JX-P5.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260507-FX276.lcb

样品瓶号: 3-44

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/08 05:20:10

处理时间(V2): 2026/05/08 14:47:40

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min


波 长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.353	31443	11.622	7194	2257	1.231	--
2	3.453	239112	88.378	23455	2695	1.307	11.052
总计		270555	100.000	30649			

图165 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042703批-均一性1-pH5.5介质-极限转速-片5
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 29-18/27-339-2 - zzp-6042703p-rcqx-pH5.5jz-jyx1-JX-P6.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260507-FX276.lcb

样品瓶号: 3-53

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/08 05:25:32

处理时间(V2): 2026/05/08 14:47:43

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流速: 1.5ml/min


波长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.353	31060	11.600	7116	2259	1.230	--
2	3.453	236694	88.400	23510	2727	1.289	11.099
总计		267754	100.000	30626			

图166 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042703批-均一性1-pH5.5介质-极限转速-片6
供试品溶液-1



QTL-235


<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 29-17/27-340-2 - zzp-6042703p-rcqx-pH5.5jz-jyx1-dz-2-1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260507-FX276.lcb
样品瓶号: 3-27
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/08 05:30:56
处理时间(V2): 2026/05/08 14:44:52
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm

版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.329	37842	11.981	7276	1505	1.231	--
2	3.446	277997	88.019	26099	2414	1.354	10.140
总计		315839	100.000	33375			

图167 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042703批-均一性1-pH5.5介质
对照品溶液-2-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 29-17/27-341-2 - zzp-6042703p-rcqx-pH5.5jz-jyx1-dz-2-2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260507-FX276.lcb
样品瓶号: 3-27
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/08 05:36:19
处理时间(V2): 2026/05/08 14:44:54
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.328	37883	11.999	7270	1504	1.232	--
2	3.447	277842	88.001	26100	2416	1.354	10.154
总计		315725	100.000	33370			

图168 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042703批-均一性1-pH5.5介质
对照品溶液-2-2