



非布司他多替诺雷片项目信息

介质体积(ml)	900	取样体积(ml)	1.5	补液体积(ml)	1.5
对照品批号	241101	对照品来源	ZZ	对照品使用方法	直接使用
对照品含量(%)	99.69	对照品水分(%)	0	对照品稀释倍数	5000
标示量(mg)	2	供试品稀释倍数	1	系数	1

对照品溶液

序号	称样量(mg)	A ₁	A ₂	A ₃	A ₄	A ₅	A _{平均}	RSD%
1	11.24	36986	37148	37098	37161	37189	37116	0.22
2	11.37	36748	37003				36876	0.49

单位质量响应值		RSD%	判断
3302.14	3243.27	1.28	数据可信



操作者:

日期: 2026-08-09

复核者:

未审阅版本



供试品溶液-6042701批-多替诺雷-pH5.5

时间 (分钟)	样品	A ₁	A ₂	A _{平均}	溶出量(%)	平均(%)	RSD%	累计溶 出量(%)	平均(%)	RSD%
5min	1	12343	-	12343	33.841	28.32	24.29	33.84	28.32	24.29
	2	10072	-	10072	27.615			27.61		
	3	11734	-	11734	32.171			32.17		
	4	11851	-	11851	32.492			32.49		
	5	10447	-	10447	28.643			28.64		
	6	5530	-	5530	15.162			15.16		
10min	1	21011	-	21011	57.606	55.22	7.11	57.66	55.27	7.13
	2	20155	-	20155	55.259			55.31		
	3	20968	-	20968	57.488			57.54		
	4	21194	-	21194	58.108			58.16		
	5	20157	-	20157	55.265			55.31		
	6	17367	-	17367	47.615			47.64		
15min	1	24443	-	24443	67.016	66.11	3.76	67.17	66.25	3.78
	2	24302	-	24302	66.629			66.77		
	3	24292	-	24292	66.602			66.75		
	4	25025	-	25025	68.611			68.76		
	5	24251	-	24251	66.489			66.63		
	6	22359	-	22359	61.302			61.41		
20min	1	26531	-	26531	72.740	72.03	2.81	73.00	72.28	2.83
	2	26266	-	26266	72.014			72.26		
	3	26336	-	26336	72.206			72.47		
	4	27200	-	27200	74.575			74.84		
	5	26361	-	26361	72.274			72.53		
	6	24943	-	24943	68.387			68.59		
30min	1	28854	-	28854	79.109	78.42	1.93	79.49	78.79	1.95
	2	28779	-	28779	78.904			79.27		
	3	28553	-	28553	78.284			78.67		
	4	29300	-	29300	80.332			80.72		
	5	28492	-	28492	78.117			78.49		
	6	27643	-	27643	75.789			76.11		
45min	1	30604	-	30604	83.907	83.26	1.58	84.42	83.76	1.59
	2	30300	-	30300	83.074			83.57		
	3	30191	-	30191	82.775			83.29		
	4	31177	-	31177	85.479			86.00		
	5	30169	-	30169	82.715			83.22		
	6	29773	-	29773	81.629			82.08		
60min	1	31146	-	31146	85.394	85.65	1.57	86.05	86.29	1.58
	2	31322	-	31322	85.876			86.52		
	3	30976	-	30976	84.927			85.58		
	4	32175	-	32175	88.215			88.88		
	5	31000	-	31000	84.993			85.63		
	6	30817	-	30817	84.491			85.07		
极限	1	32136	-	32136	88.108	87.65	1.77	88.91	88.44	1.79
	2	32116	-	32116	88.053			88.84		
	3	31539	-	31539	86.471			87.26		
	4	32884	-	32884	90.159			90.97		
	5	31904	-	31904	87.472			88.25		
	6	31245	-	31245	85.665			86.39		



操作者:

日期: 2026-08-09

复核者:

未审阅版本



非布司他多替诺雷片项目信息

介质体积(ml)	900	取样体积(ml)	1.5	补液体积(ml)	1.5
对照品批号	101278-202405	对照品来源	中检所	对照品使用方法	直接使用
对照品含量(%)	99.9	对照品水分(%)	0	对照品稀释倍数	250
标示量(mg)	40	供试品稀释倍数	1	系数	1

对照品溶液

序号	称样量(mg)	A ₁	A ₂	A ₃	A ₄	A ₅	A _{平均}	RSD%
1	11.34	267214	267111	267158	267201	267805	267298	0.11
2	11.39	264635	264739				264687	0.03

单位质量响应值		RSD%	判断
23571.25	23238.54	1.01	数据可信



操作者:

日期: 2026-08-09

复核者:

未审阅版本



供试品溶液-6042701批-非布司他-pH5.5

时间 (分钟)	样品	A ₁	A ₂	A _{平均}	溶出量(%)	平均(%)	RSD%	累计溶 出量(%)	平均(%)	RSD%
5min	1	106321	-	106321	40.845	34.64	22.86	40.85	34.64	22.86
	2	87960	-	87960	33.792			33.79		
	3	103194	-	103194	39.644			39.64		
	4	101198	-	101198	38.877			38.88		
	5	91650	-	91650	35.209			35.21		
	6	50627	-	50627	19.449			19.45		
10min	1	162683	-	162683	62.498	60.83	6.08	62.57	60.89	6.09
	2	159350	-	159350	61.217			61.27		
	3	164386	-	164386	63.152			63.22		
	4	164719	-	164719	63.280			63.34		
	5	159681	-	159681	61.345			61.40		
	6	139279	-	139279	53.507			53.54		
15min	1	185561	-	185561	71.287	70.45	3.28	71.46	70.61	3.29
	2	185428	-	185428	71.236			71.39		
	3	185077	-	185077	71.101			71.27		
	4	188363	-	188363	72.363			72.53		
	5	184423	-	184423	70.850			71.01		
	6	171454	-	171454	65.867			65.99		
20min	1	199733	-	199733	76.731	76.12	2.23	77.02	76.40	2.25
	2	201133	-	201133	77.269			77.55		
	3	198146	-	198146	76.122			76.41		
	4	201663	-	201663	77.473			77.76		
	5	198604	-	198604	76.298			76.58		
	6	189613	-	189613	72.844			73.07		
30min	1	217574	-	217574	83.585	82.81	1.58	84.00	83.22	1.60
	2	218138	-	218138	83.802			84.21		
	3	213059	-	213059	81.851			82.27		
	4	217732	-	217732	83.646			84.07		
	5	217159	-	217159	83.426			83.83		
	6	209748	-	209748	80.579			80.93		
45min	1	231844	-	231844	89.067	88.23	1.56	89.63	88.77	1.57
	2	232601	-	232601	89.358			89.90		
	3	225595	-	225595	86.667			87.22		
	4	232260	-	232260	89.227			89.79		
	5	231018	-	231018	88.750			89.30		
	6	224620	-	224620	86.292			86.78		
60min	1	238830	-	238830	91.751	91.07	1.62	92.46	91.76	1.63
	2	240689	-	240689	92.465			93.16		
	3	232804	-	232804	89.436			90.13		
	4	239969	-	239969	92.189			92.90		
	5	238336	-	238336	91.561			92.25		
	6	231714	-	231714	89.018			89.65		
极限	1	244728	-	244728	94.017	92.97	1.55	94.88	93.82	1.56
	2	244704	-	244704	94.008			94.86		
	3	237586	-	237586	91.273			92.12		
	4	244757	-	244757	94.028			94.89		
	5	243356	-	243356	93.490			94.34		
	6	236919	-	236919	91.017			91.80		



操作者:

日期: 2026-08-09

复核者:

未审阅版本



非布司他多替诺雷片项目信息

介质体积(ml)	900	取样体积(ml)	1.5	补液体积(ml)	1.5
对照品批号	241101	对照品来源	ZZ	对照品使用方法	直接使用
对照品含量(%)	99.69	对照品水分(%)	0	对照品稀释倍数	5000
标示量(mg)	2	供试品稀释倍数	1	系数	1

对照品溶液

序号	称样量(mg)	A ₁	A ₂	A ₃	A ₄	A ₅	A _{平均}	RSD%
1	11.24	37696	37837	37731	37554	37454	37654	0.41
2	11.37	38349	38318				38334	0.06
单位质量响应值			RSD%		判断			
3350.00			3371.50		0.46 数据可信			



操作者:

日期: 2026-08-09

复核者:

未审阅版本



供试品溶液-6042702批-多替诺雷-pH5.5

时间 (分钟)	样品	A ₁	A ₂	A _{平均}	溶出量(%)	平均(%)	RSD%	累计溶 出量(%)	平均(%)	RSD%
5min	1	9139	-	9139	24.398	26.25	13.99	24.40	26.25	13.99
	2	8836	-	8836	23.589			23.59		
	3	8739	-	8739	23.330			23.33		
	4	11989	-	11989	32.007			32.01		
	5	9162	-	9162	24.460			24.46		
	6	11127	-	11127	29.706			29.71		
10min	1	20295	-	20295	54.182	53.13	4.59	54.22	53.18	4.59
	2	19797	-	19797	52.852			52.89		
	3	18488	-	18488	49.357			49.40		
	4	21157	-	21157	56.483			56.54		
	5	19385	-	19385	51.752			51.79		
	6	20292	-	20292	54.174			54.22		
15min	1	24448	-	24448	65.269	64.13	2.55	65.40	64.26	2.56
	2	23888	-	23888	63.774			63.90		
	3	23000	-	23000	61.403			61.52		
	4	24793	-	24793	66.190			66.34		
	5	23865	-	23865	63.712			63.84		
	6	24132	-	24132	64.425			64.56		
20min	1	26642	-	26642	71.126	70.05	1.91	71.37	70.29	1.92
	2	26143	-	26143	69.794			70.03		
	3	25448	-	25448	67.938			68.16		
	4	26900	-	26900	71.815			72.07		
	5	26122	-	26122	69.738			69.97		
	6	26181	-	26181	69.895			70.14		
30min	1	28926	-	28926	77.224	76.65	1.65	77.58	77.01	1.65
	2	28580	-	28580	76.300			76.65		
	3	27948	-	27948	74.613			74.95		
	4	29276	-	29276	78.158			78.54		
	5	29033	-	29033	77.509			77.86		
	6	28507	-	28507	76.105			76.47		
45min	1	30917	-	30917	82.539	81.33	1.65	83.03	81.82	1.65
	2	30413	-	30413	81.194			81.67		
	3	29557	-	29557	78.908			79.37		
	4	30906	-	30906	82.510			83.02		
	5	30599	-	30599	81.690			82.17		
	6	30393	-	30393	81.140			81.63		
60min	1	31582	-	31582	84.314	83.71	1.10	84.94	84.33	1.10
	2	31472	-	31472	84.021			84.63		
	3	30753	-	30753	82.101			82.69		
	4	31611	-	31611	84.392			85.04		
	5	31570	-	31570	84.282			84.90		
	6	31142	-	31142	83.140			83.77		
极限	1	32540	-	32540	86.872	85.79	1.19	87.64	86.55	1.20
	2	32242	-	32242	86.076			86.83		
	3	31461	-	31461	83.991			84.72		
	4	32405	-	32405	86.512			87.30		
	5	32181	-	32181	85.914			86.67		
	6	31975	-	31975	85.364			86.13		



操作者:

日期: 2026-08-09

复核者:

未审阅版本



非布司他多替诺雷片项目信息

介质体积(ml)	900	取样体积(ml)	1.5	补液体积(ml)	1.5
对照品批号	101278-202405	对照品来源	中检所	对照品使用方法	直接使用
对照品含量(%)	99.9	对照品水分(%)	0	对照品稀释倍数	250
标示量(mg)	40	供试品稀释倍数	1	系数	1

对照品溶液

序号	称样量(mg)	A ₁	A ₂	A ₃	A ₄	A ₅	A _{平均}	RSD%
1	11.34	270727	271598	271593	270816	270964	271140	0.16
2	11.39	277507	277149				277328	0.10
单位质量响应值				RSD%	判断			
23910.05				1.29	数据可信			



操作者:

日期: 2026-08-09

复核者:

未审阅版本



供试品溶液-6042702批-非布司他-pH5.5

时间 (分钟)	样品	A ₁	A ₂	A _{平均}	溶出量(%)	平均(%)	RSD%	累计溶 出量(%)	平均(%)	RSD%
5min	1	81191	-	81191	30.256	32.20	13.58	30.26	32.20	13.58
	2	77717	-	77717	28.961			28.96		
	3	76958	-	76958	28.678			28.68		
	4	105509	-	105509	39.318			39.32		
	5	80775	-	80775	30.101			30.10		
	6	96374	-	96374	35.914			35.91		
10min	1	160538	-	160538	59.824	58.88	3.83	59.87	58.94	3.83
	2	158589	-	158589	59.098			59.15		
	3	148982	-	148982	55.518			55.57		
	4	166609	-	166609	62.087			62.15		
	5	153788	-	153788	57.309			57.36		
	6	159578	-	159578	59.467			59.53		
15min	1	186946	-	186946	69.665	69.23	2.65	69.82	69.38	2.66
	2	185990	-	185990	69.309			69.46		
	3	178939	-	178939	66.682			66.82		
	4	193921	-	193921	72.265			72.43		
	5	183243	-	183243	68.285			68.43		
	6	185627	-	185627	69.174			69.33		
20min	1	202214	-	202214	75.355	74.84	1.48	75.62	75.10	1.49
	2	201454	-	201454	75.072			75.33		
	3	196078	-	196078	73.068			73.32		
	4	205012	-	205012	76.398			76.69		
	5	199696	-	199696	74.417			74.68		
	6	200498	-	200498	74.715			74.99		
30min	1	220662	-	220662	82.230	81.60	0.92	82.62	81.99	0.93
	2	219326	-	219326	81.732			82.12		
	3	215366	-	215366	80.256			80.63		
	4	220813	-	220813	82.286			82.70		
	5	219403	-	219403	81.760			82.14		
	6	218201	-	218201	81.313			81.71		
45min	1	236009	-	236009	87.949	87.21	0.95	88.48	87.74	0.95
	2	235817	-	235817	87.877			88.40		
	3	230765	-	230765	85.994			86.50		
	4	235597	-	235597	87.795			88.35		
	5	234007	-	234007	87.203			87.72		
	6	232004	-	232004	86.456			86.99		
60min	1	244736	-	244736	91.201	90.17	0.98	91.88	90.84	0.98
	2	244462	-	244462	91.099			91.77		
	3	238695	-	238695	88.950			89.60		
	4	242017	-	242017	90.188			90.89		
	5	241749	-	241749	90.088			90.75		
	6	240187	-	240187	89.506			90.18		
极限	1	250298	-	250298	93.273	92.25	1.01	94.10	93.07	1.01
	2	250277	-	250277	93.266			94.09		
	3	244512	-	244512	91.117			91.92		
	4	247672	-	247672	92.295			93.15		
	5	247541	-	247541	92.246			93.06		
	6	244936	-	244936	91.275			92.10		



操作者:

日期: 2026-08-09

复核者:

未审阅版本



非布司他多替诺雷片项目信息

介质体积(ml)	900	取样体积(ml)	1.5	补液体积(ml)	1.5
对照品批号	241101	对照品来源	ZZ	对照品使用方法	直接使用
对照品含量(%)	99.69	对照品水分(%)	0	对照品稀释倍数	5000
标示量(mg)	2	供试品稀释倍数	1	系数	1

对照品溶液

序号	称样量(mg)	A ₁	A ₂	A ₃	A ₄	A ₅	A _{平均}	RSD%
1	11.24	37537	37390	37635	37401	37691	37531	0.37
2	11.37	37811	37844				37828	0.07
单位质量响应值				RSD%	判断			
3339.06		3327.00		0.26	数据可信			



操作者:

日期: 2026-08-09

复核者:

未审阅版本



供试品溶液-6042703批-多替诺雷-pH5.5

时间 (分钟)	样品	A ₁	A ₂	A _{平均}	溶出量(%)	平均(%)	RSD%	累计溶 出量(%)	平均(%)	RSD%
5min	1	3970	-	3970	10.687	20.38	38.00	10.69	20.38	38.00
	2	10123	-	10123	27.250			27.25		
	3	10507	-	10507	28.284			28.28		
	4	4151	-	4151	11.174			11.17		
	5	8784	-	8784	23.646			23.65		
	6	7879	-	7879	21.209			21.21		
10min	1	15782	-	15782	42.483	49.43	10.95	42.50	49.46	10.97
	2	20278	-	20278	54.586			54.63		
	3	20492	-	20492	55.162			55.21		
	4	16135	-	16135	43.434			43.45		
	5	18946	-	18946	51.000			51.04		
	6	18535	-	18535	49.894			49.93		
15min	1	21453	-	21453	57.749	62.21	4.79	57.84	62.33	4.81
	2	24364	-	24364	65.585			65.72		
	3	24156	-	24156	65.025			65.16		
	4	22332	-	22332	60.115			60.21		
	5	22968	-	22968	61.827			61.95		
	6	23396	-	23396	62.979			63.10		
20min	1	24064	-	24064	64.778	68.77	3.59	64.96	68.99	3.61
	2	26573	-	26573	71.531			71.78		
	3	26419	-	26419	71.117			71.36		
	4	25363	-	25363	68.274			68.47		
	5	25191	-	25191	67.811			68.04		
	6	25672	-	25672	69.106			69.33		
30min	1	27287	-	27287	73.453	75.87	2.71	73.75	76.20	2.72
	2	29041	-	29041	78.175			78.54		
	3	28842	-	28842	77.639			78.01		
	4	28429	-	28429	76.528			76.83		
	5	27257	-	27257	73.373			73.71		
	6	28249	-	28249	76.043			76.38		
45min	1	29231	-	29231	78.686	81.27	2.60	79.10	81.73	2.61
	2	30956	-	30956	83.330			83.83		
	3	30789	-	30789	82.880			83.38		
	4	30702	-	30702	82.646			83.08		
	5	29220	-	29220	78.657			79.12		
	6	30250	-	30250	81.430			81.89		
60min	1	30675	-	30675	82.574	83.82	2.52	83.12	84.42	2.52
	2	31673	-	31673	85.260			85.89		
	3	31860	-	31860	85.763			86.40		
	4	31714	-	31714	85.370			85.94		
	5	29831	-	29831	80.302			80.90		
	6	31075	-	31075	83.650			84.25		
极限	1	31022	-	31022	83.508	85.57	2.59	84.19	86.31	2.59
	2	32484	-	32484	87.443			88.22		
	3	32237	-	32237	86.778			87.55		
	4	32443	-	32443	87.333			88.05		
	5	30521	-	30521	82.159			82.89		
	6	32029	-	32029	86.218			86.96		



操作者:

日期: 2026-08-09

复核者:

未审阅版本



非布司他多替诺雷片项目信息

介质体积(ml)	900	取样体积(ml)	1.5	补液体积(ml)	1.5
对照品批号	101278-202405	对照品来源	中检所	对照品使用方法	直接使用
对照品含量(%)	99.9	对照品水分(%)	0	对照品稀释倍数	250
标示量(mg)	40	供试品稀释倍数	1	系数	1

对照品溶液

序号	称样量(mg)	A ₁	A ₂	A ₃	A ₄	A ₅	A _{平均}	RSD%
1	11.34	273383	273308	273586	273278	273464	273404	0.05
2	11.39	276131	275887				276009	0.07
单位质量响应值				RSD%	判断			
24109.70				0.36	数据可信			



操作者:

日期: 2026-08-09

复核者:

未审阅版本



供试品溶液-6042703批-非布司他-pH5.5

时间 (分钟)	样品	A ₁	A ₂	A _{平均}	溶出量(%)	平均(%)	RSD%	累计溶 出量(%)	平均(%)	RSD%
5min	1	36096	-	36096	13.427	24.20	37.35	13.43	24.20	37.35
	2	86130	-	86130	32.038			32.04		
	3	89460	-	89460	33.277			33.28		
	4	34347	-	34347	12.776			12.78		
	5	75988	-	75988	28.266			28.27		
	6	68277	-	68277	25.397			25.40		
10min	1	127624	-	127624	47.473	54.11	9.32	47.50	54.15	9.34
	2	158437	-	158437	58.935			58.99		
	3	158019	-	158019	58.779			58.83		
	4	130113	-	130113	48.399			48.42		
	5	151441	-	151441	56.332			56.38		
	6	147090	-	147090	54.714			54.76		
15min	1	166383	-	166383	61.890	66.07	3.82	61.99	66.20	3.85
	2	185062	-	185062	68.838			68.99		
	3	182577	-	182577	67.914			68.07		
	4	173447	-	173447	64.518			64.62		
	5	178232	-	178232	66.298			66.44		
	6	179970	-	179970	66.944			67.08		
20min	1	186239	-	186239	69.276	72.29	2.65	69.48	72.53	2.67
	2	200318	-	200318	74.513			74.78		
	3	196592	-	196592	73.127			73.39		
	4	192916	-	192916	71.760			71.97		
	5	191677	-	191677	71.299			71.55		
	6	198352	-	198352	73.782			74.03		
30min	1	209281	-	209281	77.847	79.27	1.92	78.17	79.63	1.93
	2	218662	-	218662	81.337			81.73		
	3	214208	-	214208	79.680			80.07		
	4	214441	-	214441	79.767			80.10		
	5	207409	-	207409	77.151			77.52		
	6	214577	-	214577	79.817			80.19		
45min	1	225695	-	225695	83.953	84.76	1.80	84.40	85.25	1.80
	2	232501	-	232501	86.485			87.01		
	3	228869	-	228869	85.134			85.65		
	4	230961	-	230961	85.912			86.37		
	5	221002	-	221002	82.207			82.71		
	6	228184	-	228184	84.879			85.38		
60min	1	233733	-	233733	86.943	87.82	2.01	87.53	88.46	2.01
	2	241802	-	241802	89.944			90.61		
	3	237105	-	237105	88.197			88.86		
	4	239669	-	239669	89.151			89.76		
	5	228312	-	228312	84.926			85.56		
	6	235999	-	235999	87.786			88.43		
极限	1	238447	-	238447	88.696	89.67	2.18	89.43	90.45	2.17
	2	246045	-	246045	91.523			92.34		
	3	241916	-	241916	89.987			90.80		
	4	245406	-	245406	91.285			92.04		
	5	231939	-	231939	86.276			87.05		
	6	242643	-	242643	90.257			91.05		



操作者:

日期: 2026-08-09

复核者:

未审阅版本




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 29-19/30-290-2 - zzp-6042701p-rcqx-pH5.5jz-jyx2-rj.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx279.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260507-FX279.lcb
样品瓶号: 1-9
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/07 14:28:20
处理时间(V2): 2026/05/08 14:50:07
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图1 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042701批-均一性2-pH5.5介质
溶剂



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 29-19/30-291-2 - zzp-6042701p-rcqx-pH5.5jz-jyx2-dz-1-1.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx279.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260507-FX279.lcb

样品瓶号: 1-18

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/07 14:33:44

处理时间(V2): 2026/05/08 14:50:11

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流 速: 1.5ml/min


波 长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.334	36986	12.158	6825	1406	1.228	--
2	3.655	267214	87.842	25077	2722	1.420	10.983
总计		304200	100.000	31902			

图2 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042701批-均一性2-pH5.5介质
对照品溶液-1-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 29-19/30-292-2 - zzp-6042701p-rcqx-pH5.5jz-jyx2-dz-1-2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx279.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260507-FX279.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/07 14:39:08
处理时间(V2): 2026/05/08 14:50:14
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.334	37148	12.209	6840	1402	1.232	--
2	3.653	267111	87.791	24985	2707	1.420	10.955
总计		304260	100.000	31825			

图3 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042701批-均一性2-pH5.5介质
对照品溶液-1-2



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 29-19/30-293-2 - zzp-6042701p-rcqx-pH5.5jz-jyx2-dz-1-3.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx279.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260507-FX279.lcb

样品瓶号: 1-18

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/07 14:44:32

处理时间(V2): 2026/05/08 14:50:17

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流 速: 1.5ml/min


波 长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.334	37098	12.193	6840	1401	1.238	--
2	3.650	267158	87.807	24955	2700	1.419	10.938
总计		304257	100.000	31795			

图4 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042701批-均一性2-pH5.5介质
对照品溶液-1-3



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 29-19/30-294-2 - zzp-6042701p-rcqx-pH5.5jz-jyx2-dz-1-4.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx279.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260507-FX279.lcb

样品瓶号: 1-18

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/07 14:49:56

处理时间(V2): 2026/05/08 14:50:20

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流 速: 1.5ml/min


波 长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.334	37161	12.209	6871	1410	1.230	--
2	3.648	267201	87.791	25005	2691	1.417	10.936
总计		304362	100.000	31875			

图5 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042701批-均一性2-pH5.5介质
对照品溶液-1-4




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 29-19/30-295-2 - zzp-6042701p-rcqx-pH5.5jz-jyx2-dz-1-5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx279.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260507-FX279.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/07 14:55:20
处理时间(V2): 2026/05/08 14:50:23
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.334	37189	12.193	6848	1405	1.242	--
2	3.653	267805	87.807	24939	2680	1.414	10.919
总计		304994	100.000	31787			

图6 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042701批-均一性2-pH5.5介质
对照品溶液-1-5




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 29-19/30-296-2 - zzp-6042701p-rcqx-pH5.5jz-jyx2-5min-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx279.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260507-FX279.lcb
样品瓶号: 1-1
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/07 15:00:43
处理时间(V2): 2026/05/08 14:50:25
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.367	12343	10.402	2761	2221	1.253	--
2	3.681	106321	89.598	10549	3136	1.296	12.212
总计		118664	100.000	13310			

图7 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042701批-均一性2-pH5.5介质-5min-片1
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 29-19/30-297-2 - zzp-6042701p-rcqx-pH5.5jz-jyx2-5min-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx279.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260507-FX279.lcb
样品瓶号: 1-10
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/07 15:06:06
处理时间(V2): 2026/05/08 14:50:28
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.369	10072	10.274	2251	2231	1.266	--
2	3.699	87960	89.726	8741	3176	1.271	12.312
总计		98033	100.000	10992			

图8 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042701批-均一性2-pH5.5介质-5min-片2
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 29-19/30-298-2 - zzp-6042701p-rcqx-pH5.5jz-jyx2-5min-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx279.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260507-FX279.lcb
样品瓶号: 1-19
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/07 15:11:28
处理时间(V2): 2026/05/08 14:50:30
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.370	11734	10.210	2674	2266	1.249	--
2	3.708	103194	89.790	10238	3158	1.293	12.336
总计		114928	100.000	12911			

图9 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042701批-均一性2-pH5.5介质-5min-片3
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 29-19/30-299-2 - zzp-6042701p-rcqx-pH5.5jz-jyx2-5min-P4.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx279.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260507-FX279.lcb

样品瓶号: 1-28

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/07 15:16:51

处理时间(V2): 2026/05/08 14:50:33

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流 速: 1.5ml/min


波 长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.369	11851	10.483	2655	2205	1.237	--
2	3.714	101198	89.517	10000	3171	1.286	12.325
总计		113050	100.000	12654			

图10 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042701批-均一性2-pH5.5介质-5min-片4
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 29-19/30-300-2 - zzp-6042701p-rcqx-pH5.5jz-jyx2-5min-P5.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx279.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260507-FX279.lcb

样品瓶号: 1-37

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/07 15:22:14

处理时间(V2): 2026/05/08 14:50:35

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流 速: 1.5ml/min


波 长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.370	10447	10.232	2347	2206	1.234	--
2	3.721	91650	89.768	9067	3212	1.278	12.396
总计		102097	100.000	11414			

图11 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042701批-均一性2-pH5.5介质-5min-片5
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 29-19/30-301-2 - zzp-6042701p-rcqx-pH5.5jz-jyx2-5min-P6.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx279.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260507-FX279.lcb

样品瓶号: 1-46

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/07 15:27:36

处理时间(V2): 2026/05/08 14:50:38

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流 速: 1.5ml/min


波 长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.371	5530	9.848	1269	2325	1.281	--
2	3.738	50627	90.152	5007	3222	1.243	12.553
总计		56157	100.000	6275			

图12 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042701批-均一性2-pH5.5介质-5min-片6
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 29-19/30-302-2 - zzp-6042701p-rcqx-pH5.5jz-jyx2-10min-P1.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx279.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260507-FX279.lcb

样品瓶号: 1-2

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/07 15:32:59

处理时间(V2): 2026/05/08 14:50:40

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流 速: 1.5ml/min


波 长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.370	21011	11.438	4702	2220	1.258	--
2	3.709	162683	88.562	15858	3082	1.364	12.198
总计		183693	100.000	20560			

图13 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042701批-均一性2-pH5.5介质-10min-片1
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 29-19/30-303-2 - zzp-6042701p-rcqx-pH5.5jz-jyx2-10min-P2.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx279.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260507-FX279.lcb

样品瓶号: 1-11

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/07 15:38:22

处理时间(V2): 2026/05/08 14:50:43

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流速: 1.5ml/min


波长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.371	20155	11.228	4552	2251	1.264	--
2	3.711	159350	88.772	15623	3111	1.358	12.260
总计		179504	100.000	20176			

图14 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042701批-均一性2-pH5.5介质-10min-片2
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 29-19/30-304-2 - zzp-6042701p-rcqx-pH5.5jz-jyx2-10min-P3.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx279.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260507-FX279.lcb

样品瓶号: 1-20

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/07 15:43:44

处理时间(V2): 2026/05/08 14:50:45

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流 速: 1.5ml/min


波 长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.370	20968	11.312	4734	2243	1.249	--
2	3.708	164386	88.688	16066	3093	1.365	12.226
总计		185354	100.000	20799			

图15 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042701批-均一性2-pH5.5介质-10min-片3
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 29-19/30-305-2 - zzp-6042701p-rcqx-pH5.5jz-jyx2-10min-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx279.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260507-FX279.lcb
样品瓶号: 1-29
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/07 15:49:07
处理时间(V2): 2026/05/08 14:50:48
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.370	21194	11.400	4746	2240	1.266	--
2	3.705	164719	88.600	16069	3072	1.368	12.191
总计		185913	100.000	20815			

图16 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042701批-均一性2-pH5.5介质-10min-片4
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 29-19/30-306-2 - zzp-6042701p-rcqx-pH5.5jz-jyx2-10min-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx279.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260507-FX279.lcb
样品瓶号: 1-38
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/07 15:54:30
处理时间(V2): 2026/05/08 14:50:30
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.370	20157	11.209	4549	2242	1.248	--
2	3.705	159681	88.791	15672	3094	1.356	12.221
总计		179838	100.000	20221			

图17 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042701批-均一性2-pH5.5介质-10min-片5
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 29-19/30-307-2 - zzp-6042701p-rcqx-pH5.5jz-jyx2-10min-P6.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx279.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260507-FX279.lcb

样品瓶号: 1-47

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/07 15:59:52

处理时间(V2): 2026/05/08 14:50:53

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流 速: 1.5ml/min


波 长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.370	17367	11.087	3909	2235	1.247	--
2	3.709	139279	88.913	13682	3127	1.336	12.274
总计		156647	100.000	17590			

图18 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042701批-均一性2-pH5.5介质-10min-片6
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 29-19/30-308-2 - zzp-6042701p-rcqx-pH5.5jz-jyx2-15min-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx279.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260507-FX279.lcb
样品瓶号: 1-3
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/07 16:05:15
处理时间(V2): 2026/05/08 14:50:55
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.370	24443	11.639	5509	2243	1.265	--
2	3.698	185561	88.361	18122	3057	1.386	12.151
总计		210004	100.000	23631			

图19 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042701批-均一性2-pH5.5介质-15min-片1
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 29-19/30-309-2 - zzp-6042701p-rcqx-pH5.5jz-jyx2-15min-P2.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx279.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260507-FX279.lcb

样品瓶号: 1-12

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/07 16:10:38

处理时间(V2): 2026/05/08 14:50:57

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流速: 1.5ml/min


波长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.369	24302	11.587	5443	2214	1.259	--
2	3.697	185428	88.413	18126	3054	1.383	12.124
总计		209730	100.000	23569			

图20 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042701批-均一性2-pH5.5介质-15min-片2
供试品溶液-1



QTL-235


<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 29-19/30-310-2 - zzp-6042701p-rcqx-pH5.5jz-jyx2-15min-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx279.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260507-FX279.lcb
样品瓶号: 1-21
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/07 16:16:01
处理时间(V2): 2026/05/08 14:51:00
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm

版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.370	24292	11.602	5483	2242	1.251	--
2	3.696	185077	88.398	18110	3061	1.383	12.147
总计		209368	100.000	23593			

图21 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042701批-均一性2-pH5.5介质-15min-片3
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 29-19/30-311-2 - zzp-6042701p-rcqx-pH5.5jz-jyx2-15min-P4.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx279.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260507-FX279.lcb

样品瓶号: 1-30

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/07 16:21:24

处理时间(V2): 2026/05/08 14:51:02

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流速: 1.5ml/min


波长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.370	25025	11.727	5644	2241	1.256	--
2	3.695	188363	88.273	18377	3053	1.381	12.132
总计		213388	100.000	24020			

图22 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042701批-均一性2-pH5.5介质-15min-片4
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 29-19/30-312-2 - zzp-6042701p-rcqx-pH5.5jz-jyx2-15min-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx279.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260507-FX279.lcb
样品瓶号: 1-39
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/07 16:26:47
处理时间(V2): 2026/05/08 14:51:05
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.370	24251	11.622	5460	2234	1.259	--
2	3.693	184423	88.378	18020	3060	1.387	12.131
总计		208674	100.000	23479			

图23 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042701批-均一性2-pH5.5介质-15min-片5
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 29-19/30-313-2 - zzp-6042701p-rcqx-pH5.5jz-jyx2-15min-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx279.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260507-FX279.lcb
样品瓶号: 1-48
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/07 16:32:10
处理时间(V2): 2026/05/08 14:51:07
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.370	22359	11.536	5019	2230	1.268	--
2	3.696	171454	88.464	16859	3096	1.370	12.184
总计		193813	100.000	21878			

图24 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042701批-均一性2-pH5.5介质-15min-片6
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 29-19/30-314-2 - zzp-6042701p-rcqx-pH5.5jz-jyx2-20min-P1.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx279.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260507-FX279.lcb

样品瓶号: 1-4

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/07 16:37:32

处理时间(V2): 2026/05/08 14:51:10

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流速: 1.5ml/min


波长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.370	26531	11.726	5974	2233	1.252	--
2	3.690	199733	88.274	19457	3036	1.399	12.089
总计		226264	100.000	25431			

图25 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042701批-均一性2-pH5.5介质-20min-片1
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 29-19/30-315-2 - zzp-6042701p-rcqx-pH5.5jz-jyx2-20min-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx279.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260507-FX279.lcb
样品瓶号: 1-13
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/07 16:42:55
处理时间(V2): 2026/05/08 14:51:13
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.370	26266	11.550	5954	2254	1.252	--
2	3.687	201133	88.450	19596	3043	1.405	12.106
总计		227398	100.000	25550			

图26 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042701批-均一性2-pH5.5介质-20min-片2
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 29-19/30-316-2 - zzp-6042701p-rcqx-pH5.5jz-jyx2-20min-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx279.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260507-FX279.lcb
样品瓶号: 1-22
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/07 16:48:18
处理时间(V2): 2026/05/08 14:51:15
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.370	26336	11.732	5942	2250	1.253	--
2	3.687	198146	88.268	19368	3039	1.396	12.101
总计		224482	100.000	25310			

图27 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042701批-均一性2-pH5.5介质-20min-片3
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 29-19/30-317-2 - zzp-6042701p-rcqx-pH5.5jz-jyx2-20min-P4.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx279.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260507-FX279.lcb

样品瓶号: 1-31

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/07 16:53:41

处理时间(V2): 2026/05/08 14:51:18

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流 速: 1.5ml/min


波 长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.370	27200	11.885	6101	2238	1.259	--
2	3.686	201663	88.115	19662	3017	1.397	12.057
总计		228863	100.000	25763			

图28 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042701批-均一性2-pH5.5介质-20min-片4
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 29-19/30-318-2 - zzp-6042701p-rcqx-pH5.5jz-jyx2-20min-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx279.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260507-FX279.lcb
样品瓶号: 1-40
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/07 16:59:04
处理时间(V2): 2026/05/08 14:51:21
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.370	26361	11.718	5926	2250	1.258	--
2	3.685	198604	88.282	19409	3027	1.394	12.076
总计		224965	100.000	25334			

图29 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042701批-均一性2-pH5.5介质-20min-片5
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 29-19/30-319-2 - zzp-6042701p-rcqx-pH5.5jz-jyx2-20min-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx279.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260507-FX279.lcb
样品瓶号: 1-49
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/07 17:04:26
处理时间(V2): 2026/05/08 14:51:24
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.370	24943	11.625	5624	2246	1.258	--
2	3.687	189613	88.375	18576	3060	1.388	12.122
总计		214556	100.000	24200			

图30 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042701批-均一性2-pH5.5介质-20min-片6
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 29-19/30-320-2 - zzp-6042701p-rcqx-pH5.5jz-jyx2-30min-P1.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx279.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260507-FX279.lcb

样品瓶号: 1-5

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/07 17:09:48

处理时间(V2): 2026/05/08 14:51:26

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流 速: 1.5ml/min


波 长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.369	28854	11.709	6501	2244	1.265	--
2	3.680	217574	88.291	21161	3015	1.421	12.049
总计		246428	100.000	27662			

图31 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042701批-均一性2-pH5.5介质-30min-片1
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 29-19/30-321-2 - zzp-6042701p-rcqx-pH5.5jz-jyx2-30min-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx279.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260507-FX279.lcb
样品瓶号: 1-14
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/07 17:15:11
处理时间(V2): 2026/05/08 14:51:29
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.370	28779	11.655	6483	2245	1.254	--
2	3.680	218138	88.345	21264	3017	1.419	12.043
总计		246917	100.000	27747			

图32 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042701批-均一性2-pH5.5介质-30min-片2
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 29-19/30-322-2 - zzp-6042701p-rcqx-pH5.5jz-jyx2-30min-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx279.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260507-FX279.lcb
样品瓶号: 1-23
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/07 17:20:34
处理时间(V2): 2026/05/08 14:51:31
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.370	28553	11.818	6438	2257	1.258	--
2	3.680	213059	88.182	20783	3018	1.411	12.053
总计		241612	100.000	27221			

图33 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042701批-均一性2-pH5.5介质-30min-片3
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 29-19/30-323-2 - zzp-6042701p-rcqx-pH5.5jz-jyx2-30min-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx279.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260507-FX279.lcb
样品瓶号: 1-32
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/07 17:25:57
处理时间(V2): 2026/05/08 14:51:34
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.369	29300	11.861	6611	2253	1.257	--
2	3.678	217732	88.139	21226	3009	1.408	12.038
总计		247032	100.000	27837			

图34 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042701批-均一性2-pH5.5介质-30min-片4
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 29-19/30-324-2 - zzp-6042701p-rcqx-pH5.5jz-jyx2-30min-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx279.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260507-FX279.lcb
样品瓶号: 1-41
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/07 17:31:20
处理时间(V2): 2026/05/08 14:51:36
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.369	28492	11.598	6429	2250	1.264	--
2	3.676	217159	88.402	21097	3001	1.418	12.018
总计		245650	100.000	27527			

图35 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042701批-均一性2-pH5.5介质-30min-片5
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 29-19/30-325-2 - zzp-6042701p-rcqx-pH5.5jz-jyx2-30min-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx279.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260507-FX279.lcb
样品瓶号: 1-50
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/07 17:36:43
处理时间(V2): 2026/05/08 14:51:39
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.369	27643	11.644	6234	2252	1.266	--
2	3.678	209748	88.356	20434	3020	1.411	12.051
总计		237390	100.000	26668			

图36 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042701批-均一性2-pH5.5介质-30min-片6
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 29-19/30-326-2 - zzp-6042701p-rcqx-pH5.5jz-jyx2-45min-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx279.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260507-FX279.lcb
样品瓶号: 1-6
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/07 17:42:05
处理时间(V2): 2026/05/08 14:51:42
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.369	30604	11.661	6878	2243	1.256	--
2	3.674	231844	88.339	22551	2983	1.430	11.983
总计		262447	100.000	29429			

图37 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042701批-均一性2-pH5.5介质-45min-片1
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 29-19/30-327-2 - zzp-6042701p-rcqx-pH5.5jz-jyx2-45min-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx279.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260507-FX279.lcb
样品瓶号: 1-15
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/07 17:47:28
处理时间(V2): 2026/05/08 14:51:44
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.368	30300	11.525	6831	2257	1.264	--
2	3.669	232601	88.475	22608	2979	1.428	11.981
总计		262902	100.000	29439			

图38 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042701批-均一性2-pH5.5介质-45min-片2
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 29-19/30-328-2 - zzp-6042701p-rcqx-pH5.5jz-jyx2-45min-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx279.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260507-FX279.lcb
样品瓶号: 1-24
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/07 17:52:51
处理时间(V2): 2026/05/08 14:51:47
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.369	30191	11.803	6778	2251	1.255	--
2	3.670	225595	88.197	22024	2995	1.420	11.999
总计		255786	100.000	28802			

图39 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042701批-均一性2-pH5.5介质-45min-片3
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 29-19/30-329-2 - zzp-6042701p-rcqx-pH5.5jz-jyx2-45min-P4.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx279.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260507-FX279.lcb

样品瓶号: 1-33

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/07 17:58:14

处理时间(V2): 2026/05/08 14:51:49

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流 速: 1.5ml/min


波 长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.368	31177	11.835	7001	2249	1.255	--
2	3.668	232260	88.165	22534	2978	1.429	11.972
总计		263437	100.000	29534			

图40 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042701批-均一性2-pH5.5介质-45min-片4
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 29-19/30-330-2 - zzp-6042701p-rcqx-pH5.5jz-jyx2-45min-P5.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx279.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260507-FX279.lcb

样品瓶号: 1-42

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/07 18:03:37

处理时间(V2): 2026/05/08 14:51:52

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流 速: 1.5ml/min


波 长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.368	30169	11.551	6755	2238	1.262	--
2	3.666	231018	88.449	22459	2988	1.430	11.974
总计		261187	100.000	29214			

图41 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042701批-均一性2-pH5.5介质-45min-片5
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 29-19/30-331-2 - zzp-6042701p-rcqx-pH5.5jz-jyx2-45min-P6.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx279.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260507-FX279.lcb

样品瓶号: 1-51

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/07 18:08:59

处理时间(V2): 2026/05/08 14:51:54

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流 速: 1.5ml/min


波 长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.369	29773	11.704	6687	2232	1.251	--
2	3.669	224620	88.296	21847	2989	1.422	11.971
总计		254394	100.000	28534			

图42 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042701批-均一性2-pH5.5介质-45min-片6
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 29-19/30-332-2 - zzp-6042701p-rcqx-pH5.5jz-jyx2-60min-P1.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx279.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260507-FX279.lcb

样品瓶号: 1-7

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/07 18:14:23

处理时间(V2): 2026/05/08 14:51:57

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流 速: 1.5ml/min


波 长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.368	31146	11.537	7000	2255	1.258	--
2	3.666	238830	88.463	23206	2972	1.437	11.963
总计		269976	100.000	30206			

图43 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042701批-均一性2-pH5.5介质-60min-片1
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 29-19/30-333-2 - zzp-6042701p-rcqx-pH5.5jz-jyx2-60min-P2.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx279.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260507-FX279.lcb

样品瓶号: 1-16

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/07 18:19:46

处理时间(V2): 2026/05/08 14:51:59

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流 速: 1.5ml/min


波 长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.368	31322	11.515	7035	2236	1.260	--
2	3.665	240689	88.485	23337	2965	1.442	11.932
总计		272011	100.000	30372			

图44 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042701批-均一性2-pH5.5介质-60min-片2
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 29-19/30-334-2 - zzp-6042701p-rcqx-pH5.5jz-jyx2-60min-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx279.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260507-FX279.lcb
样品瓶号: 1-25
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/07 18:25:09
处理时间(V2): 2026/05/08 14:52:02
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.368	30976	11.743	6961	2243	1.265	--
2	3.665	232804	88.257	22656	2982	1.430	11.962
总计		263779	100.000	29617			

图45 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042701批-均一性2-pH5.5介质-60min-片3
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 29-19/30-335-2 - zzp-6042701p-rcqx-pH5.5jz-jyx2-60min-P4.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx279.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260507-FX279.lcb

样品瓶号: 1-34

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/07 18:30:32

处理时间(V2): 2026/05/08 14:52:04

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流 速: 1.5ml/min


波 长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.368	32175	11.823	7226	2258	1.254	--
2	3.664	239969	88.177	23332	2962	1.435	11.943
总计		272145	100.000	30558			

图46 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042701批-均一性2-pH5.5介质-60min-片4
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 29-19/30-336-2 - zzp-6042701p-rcqx-pH5.5jz-jyx2-60min-P5.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx279.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260507-FX279.lcb

样品瓶号: 1-43

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/07 18:35:55

处理时间(V2): 2026/05/08 14:52:07

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流速: 1.5ml/min


波长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.368	31000	11.510	6950	2242	1.257	--
2	3.662	238336	88.490	23172	2963	1.436	11.928
总计		269336	100.000	30122			

图47 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042701批-均一性2-pH5.5介质-60min-片5
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 29-19/30-337-2 - zzp-6042701p-rcqx-pH5.5jz-jyx2-60min-P6.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx279.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260507-FX279.lcb

样品瓶号: 1-52

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/07 18:41:17

处理时间(V2): 2026/05/08 14:52:09

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流速: 1.5ml/min


波长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.368	30817	11.738	6917	2237	1.259	--
2	3.664	231714	88.262	22606	2980	1.427	11.952
总计		262531	100.000	29523			

图48 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042701批-均一性2-pH5.5介质-60min-片6
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 29-19/30-338-2 - zzp-6042701p-rcqx-pH5.5jz-jyx2-JX-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx279.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260507-FX279.lcb
样品瓶号: 1-8
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/07 18:46:41
处理时间(V2): 2026/05/08 14:52:12
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.368	32136	11.607	7208	2242	1.269	--
2	3.662	244728	88.393	23785	2957	1.437	11.918
总计		276864	100.000	30993			

图49 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042701批-均一性2-pH5.5介质-极限转速-片1
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 29-19/30-339-2 - zzp-6042701p-rcqx-pH5.5jz-jyx2-JX-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx279.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260507-FX279.lcb
样品瓶号: 1-17
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/07 18:52:05
处理时间(V2): 2026/05/08 14:52:14
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.368	32116	11.602	7165	2230	1.263	--
2	3.660	244704	88.398	23774	2965	1.439	11.917
总计		276820	100.000	30939			

图50 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042701批-均一性2-pH5.5介质-极限转速-片2
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 29-19/30-340-2 - zzp-6042701p-rcqx-pH5.5jz-jyx2-JX-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx279.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260507-FX279.lcb
样品瓶号: 1-26
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/07 18:57:29
处理时间(V2): 2026/05/08 14:52:17
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.368	31539	11.719	7100	2248	1.263	--
2	3.662	237586	88.281	23131	2976	1.433	11.948
总计		269125	100.000	30231			

图51 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042701批-均一性2-pH5.5介质-极限转速-片3
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 29-19/30-341-2 - zzp-6042701p-rcqx-pH5.5jz-jyx2-JX-P4.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx279.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260507-FX279.lcb

样品瓶号: 1-35

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/07 19:02:53

处理时间(V2): 2026/05/08 14:52:20

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流速: 1.5ml/min


波长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.368	32884	11.844	7359	2240	1.265	--
2	3.660	244757	88.156	23770	2963	1.442	11.922
总计		277641	100.000	31129			

图52 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042701批-均一性2-pH5.5介质-极限转速-片4
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 29-19/30-342-2 - zzp-6042701p-rcqx-pH5.5jz-jyx2-JX-P5.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx279.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260507-FX279.lcb

样品瓶号: 1-44

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/07 19:08:17

处理时间(V2): 2026/05/08 14:52:22

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流 速: 1.5ml/min


波 长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.368	31904	11.590	7147	2237	1.262	--
2	3.659	243356	88.410	23612	2953	1.437	11.900
总计		275260	100.000	30759			

图53 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042701批-均一性2-pH5.5介质-极限转速-片5
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 29-19/30-343-2 - zzp-6042701p-rcqx-pH5.5jz-jyx2-JX-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx279.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260507-FX279.lcb
样品瓶号: 1-53
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/07 19:13:40
处理时间(V2): 2026/05/08 14:52:25
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.368	31245	11.651	7032	2258	1.258	--
2	3.660	236919	88.349	23085	2984	1.430	11.967
总计		268164	100.000	30116			

图54 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042701批-均一性2-pH5.5介质-极限转速-片6
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 29-19/30-344-2 - zzp-6042701p-rcqx-pH5.5jz-jyx2-dz-2-1.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx279.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260507-FX279.lcb

样品瓶号: 1-27

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/07 19:19:04

处理时间(V2): 2026/05/08 14:52:27

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流 速: 1.5ml/min


波 长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.335	36748	12.193	6781	1409	1.236	--
2	3.675	264635	87.807	24841	2766	1.417	11.094
总计		301383	100.000	31622			

图55 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042701批-均一性2-pH5.5介质
对照品溶液-2-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 29-19/30-345-2 - zzp-6042701p-rcqx-pH5.5jz-jyx2-dz-2-2.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx279.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260507-FX279.lcb

样品瓶号: 1-27

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/07 19:24:28

处理时间(V2): 2026/05/08 14:52:30

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流 速: 1.5ml/min


波 长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.335	37003	12.263	6817	1401	1.241	--
2	3.673	264739	87.737	24863	2754	1.416	11.063
总计		301742	100.000	31680			

图56 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042701批-均一性2-pH5.5介质
对照品溶液-2-2




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 29-19/30-346-2 - zzp-6042702p-rcqx-pH5.5jz-jyx2-rj.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx279.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260507-FX279.lcb
样品瓶号: 2-9
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/07 19:29:53
处理时间(V2): 2026/05/08 14:52:32
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图57 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042702批-均一性2-pH5.5介质
溶剂



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 29-19/30-347-2 - zzp-6042702p-rcqx-pH5.5jz-jyx2-dz-1-1.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx279.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260507-FX279.lcb

样品瓶号: 2-18

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/07 19:35:18

处理时间(V2): 2026/05/08 14:52:35

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流 速: 1.5ml/min


波 长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.344	37696	12.222	7439	1635	1.246	--
2	3.673	270727	87.778	25944	2866	1.425	11.429
总计		308424	100.000	33382			

图58 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042702批-均一性2-pH5.5介质
对照品溶液-1-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 29-19/30-348-2 - zzp-6042702p-rcqx-pH5.5jz-jyx2-dz-1-2.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx279.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260507-FX279.lcb

样品瓶号: 2-18

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/07 19:40:43

处理时间(V2): 2026/05/08 14:52:37

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流 速: 1.5ml/min


波 长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.344	37837	12.228	7455	1625	1.237	--
2	3.670	271598	87.772	25939	2849	1.429	11.390
总计		309434	100.000	33394			

图59 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042702批-均一性2-pH5.5介质
对照品溶液-1-2



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 29-19/30-349-2 - zzp-6042702p-rcqx-pH5.5jz-jyx2-dz-1-3.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx279.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260507-FX279.lcb

样品瓶号: 2-18

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/07 19:46:08

处理时间(V2): 2026/05/08 14:52:40

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流 速: 1.5ml/min


波 长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.344	37731	12.198	7453	1641	1.252	--
2	3.669	271593	87.802	25916	2857	1.433	11.418
总计		309324	100.000	33370			

图60 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042702批-均一性2-pH5.5介质
对照品溶液-1-3



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 29-19/30-350-2 - zzp-6042702p-rcqx-pH5.5jz-jyx2-dz-1-4.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx279.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260507-FX279.lcb

样品瓶号: 2-18

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/07 19:51:33

处理时间(V2): 2026/05/08 14:52:43

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流 速: 1.5ml/min


波 长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.344	37554	12.178	7408	1629	1.239	--
2	3.670	270816	87.822	25848	2861	1.428	11.409
总计		308370	100.000	33256			

图61 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042702批-均一性2-pH5.5介质
对照品溶液-1-4



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 29-19/30-351-2 - zzp-6042702p-rcqx-pH5.5jz-jyx2-dz-1-5.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx279.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260507-FX279.lcb

样品瓶号: 2-18

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/07 19:56:58

处理时间(V2): 2026/05/08 14:52:45

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流 速: 1.5ml/min


波 长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.344	37454	12.144	7413	1642	1.239	--
2	3.668	270964	87.856	25854	2856	1.430	11.417
总计		308418	100.000	33267			

图62 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042702批-均一性2-pH5.5介质
对照品溶液-1-5




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 29-19/30-352-2 - zzp-6042702p-rcqx-pH5.5jz-jyx2-5min-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx279.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260507-FX279.lcb
样品瓶号: 2-1
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/07 20:02:22
处理时间(V2): 2026/05/08 14:52:48
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.367	9139	10.117	2074	2271	1.264	--
2	3.690	81191	89.883	8162	3233	1.273	12.408
总计		90331	100.000	10237			

图63 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042702批-均一性2-pH5.5介质-5min-片1
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 29-19/30-353-2 - zzp-6042702p-rcqx-pH5.5jz-jyx2-5min-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx279.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260507-FX279.lcb
样品瓶号: 2-10
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/07 20:07:46
处理时间(V2): 2026/05/08 14:52:50
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.368	8836	10.209	1991	2253	1.249	--
2	3.692	77717	89.791	7829	3258	1.262	12.425
总计		86553	100.000	9820			

图64 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042702批-均一性2-pH5.5介质-5min-片2
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 29-19/30-354-2 - zzp-6042702p-rcqx-pH5.5jz-jyx2-5min-P3.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx279.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260507-FX279.lcb

样品瓶号: 2-19

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/07 20:13:10

处理时间(V2): 2026/05/08 14:52:53

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流 速: 1.5ml/min


波 长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.367	8739	10.198	1967	2245	1.262	--
2	3.690	76958	89.802	7737	3248	1.261	12.411
总计		85698	100.000	9703			

图65 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042702批-均一性2-pH5.5介质-5min-片3
供试品溶液-1



QTL-235


<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 29-19/30-355-2 - zzp-6042702p-rcqx-pH5.5jz-jyx2-5min-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx279.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260507-FX279.lcb
样品瓶号: 2-28
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/07 20:18:34
处理时间(V2): 2026/05/08 14:52:55
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm

版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>
mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.367	11989	10.204	2715	2268	1.253	--
2	3.683	105509	89.796	10536	3208	1.293	12.354
总计		117498	100.000	13252			

图66 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042702批-均一性2-pH5.5介质-5min-片4
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 29-19/30-356-2 - zzp-6042702p-rcqx-pH5.5jz-jyx2-5min-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx279.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260507-FX279.lcb
样品瓶号: 2-37
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/07 20:23:58
处理时间(V2): 2026/05/08 14:52:58
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.367	9162	10.187	2061	2239	1.270	--
2	3.689	80775	89.813	8154	3230	1.260	12.378
总计		89938	100.000	10215			

图67 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042702批-均一性2-pH5.5介质-5min-片5
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 29-19/30-357-2 - zzp-6042702p-rcqx-pH5.5jz-jyx2-5min-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx279.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260507-FX279.lcb
样品瓶号: 2-46
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/07 20:29:21
处理时间(V2): 2026/05/08 14:53:01
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.367	11127	10.351	2497	2259	1.280	--
2	3.684	96374	89.649	9688	3204	1.283	12.347
总计		107501	100.000	12185			

图68 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042702批-均一性2-pH5.5介质-5min-片6
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 29-19/30-358-2 - zzp-6042702p-rcqx-pH5.5jz-jyx2-10min-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx279.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260507-FX279.lcb
样品瓶号: 2-2
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/07 20:34:45
处理时间(V2): 2026/05/08 14:53:04
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.367	20295	11.223	4551	2253	1.266	--
2	3.670	160538	88.777	15939	3119	1.349	12.178
总计		180833	100.000	20490			

图69 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042702批-均一性2-pH5.5介质-10min-片1
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 29-19/30-359-2 - zzp-6042702p-rcqx-pH5.5jz-jyx2-10min-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx279.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260507-FX279.lcb
样品瓶号: 2-11
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/07 20:40:09
处理时间(V2): 2026/05/08 14:53:07
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.367	19797	11.098	4447	2249	1.254	--
2	3.670	158589	88.902	15750	3115	1.348	12.172
总计		178386	100.000	20197			

图70 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042702批-均一性2-pH5.5介质-10min-片2
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 29-19/30-360-2 - zzp-6042702p-rcqx-pH5.5jz-jyx2-10min-P3.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx279.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260507-FX279.lcb

样品瓶号: 2-20

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/07 20:45:33

处理时间(V2): 2026/05/08 14:53:09

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流 速: 1.5ml/min


波 长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.367	18488	11.039	4166	2252	1.262	--
2	3.671	148982	88.961	14823	3138	1.339	12.213
总计		167470	100.000	18989			

图71 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042702批-均一性2-pH5.5介质-10min-片3
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 29-19/30-361-2 - zzp-6042702p-rcqx-pH5.5jz-jyx2-10min-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx279.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260507-FX279.lcb
样品瓶号: 2-29
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/07 20:50:57
处理时间(V2): 2026/05/08 14:53:12
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.367	21157	11.268	4782	2267	1.250	--
2	3.667	166609	88.732	16525	3105	1.358	12.166
总计		187766	100.000	21307			

图72 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042702批-均一性2-pH5.5介质-10min-片4
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 29-19/30-362-2 - zzp-6042702p-rcqx-pH5.5jz-jyx2-10min-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx279.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260507-FX279.lcb
样品瓶号: 2-38
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/07 20:56:21
处理时间(V2): 2026/05/08 14:53:14
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.367	19385	11.194	4346	2245	1.255	--
2	3.671	153788	88.806	15303	3132	1.338	12.194
总计		173173	100.000	19649			

图73 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042702批-均一性2-pH5.5介质-10min-片5
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 29-19/30-363-2 - zzp-6042702p-rcqx-pH5.5jz-jyx2-10min-P6.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx279.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260507-FX279.lcb

样品瓶号: 2-47

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/07 21:01:45

处理时间(V2): 2026/05/08 14:53:17

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流 速: 1.5ml/min


波 长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.367	20292	11.281	4544	2244	1.271	--
2	3.668	159578	88.719	15831	3110	1.352	12.162
总计		179870	100.000	20375			

图74 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042702批-均一性2-pH5.5介质-10min-片6
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 29-19/30-364-2 - zzp-6042702p-rcqx-pH5.5jz-jyx2-15min-P1.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx279.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260507-FX279.lcb

样品瓶号: 2-3

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/07 21:07:10

处理时间(V2): 2026/05/08 14:53:20

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流速: 1.5ml/min


波长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.367	24448	11.565	5478	2250	1.267	--
2	3.663	186946	88.435	18497	3080	1.376	12.103
总计		211394	100.000	23975			

图75 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042702批-均一性2-pH5.5介质-15min-片1
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 29-19/30-365-2 - zzp-6042702p-rcqx-pH5.5jz-jyx2-15min-P2.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx279.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260507-FX279.lcb

样品瓶号: 2-12

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/07 21:12:35

处理时间(V2): 2026/05/08 14:53:23

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流速: 1.5ml/min


波长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.368	23888	11.382	5391	2262	1.258	--
2	3.664	185990	88.618	18378	3084	1.374	12.113
总计		209879	100.000	23769			

图76 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042702批-均一性2-pH5.5介质-15min-片2
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 29-19/30-366-2 - zzp-6042702p-rcqx-pH5.5jz-jyx2-15min-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx279.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260507-FX279.lcb
样品瓶号: 2-21
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/07 21:17:59
处理时间(V2): 2026/05/08 14:53:25
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.368	23000	11.390	5180	2248	1.258	--
2	3.665	178939	88.610	17737	3100	1.366	12.128
总计		201940	100.000	22916			

图77 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042702批-均一性2-pH5.5介质-15min-片3
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 29-19/30-367-2 - zzp-6042702p-rcqx-pH5.5jz-jyx2-15min-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx279.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260507-FX279.lcb
样品瓶号: 2-30
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/07 21:23:23
处理时间(V2): 2026/05/08 14:53:28
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.367	24793	11.336	5589	2248	1.254	--
2	3.656	193921	88.664	18742	3052	1.486	12.049
总计		218715	100.000	24331			

图78 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042702批-均一性2-pH5.5介质-15min-片4
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 29-19/30-368-2 - zzp-6042702p-rcqx-pH5.5jz-jyx2-15min-P5.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx279.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260507-FX279.lcb

样品瓶号: 2-39

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/07 21:28:48

处理时间(V2): 2026/05/08 14:53:31

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流 速: 1.5ml/min


波 长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.367	23865	11.523	5345	2240	1.266	--
2	3.662	183243	88.477	18119	3089	1.373	12.106
总计		207108	100.000	23464			

图79 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042702批-均一性2-pH5.5介质-15min-片5
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 29-19/30-369-2 - zzp-6042702p-rcqx-pH5.5jz-jyx2-15min-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx279.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260507-FX279.lcb
样品瓶号: 2-48
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/07 21:34:12
处理时间(V2): 2026/05/08 14:53:33
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.367	24132	11.505	5412	2242	1.266	--
2	3.662	185627	88.495	18376	3077	1.368	12.091
总计		209758	100.000	23789			

图80 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042702批-均一性2-pH5.5介质-15min-片6
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 29-19/30-370-2 - zzp-6042702p-rcqx-pH5.5jz-jyx2-20min-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx279.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260507-FX279.lcb
样品瓶号: 2-4
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/07 21:39:37
处理时间(V2): 2026/05/08 14:53:36
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.367	26642	11.641	5970	2225	1.267	--
2	3.657	202214	88.359	19931	3048	1.394	12.023
总计		228857	100.000	25901			

图81 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042702批-均一性2-pH5.5介质-20min-片1
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 29-19/30-371-2 - zzp-6042702p-rcqx-pH5.5jz-jyx2-20min-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx279.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260507-FX279.lcb
样品瓶号: 2-13
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/07 21:45:03
处理时间(V2): 2026/05/08 14:53:38
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.368	26143	11.486	5867	2252	1.251	--
2	3.658	201454	88.514	19859	3043	1.389	12.038
总计		227597	100.000	25726			

图82 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042702批-均一性2-pH5.5介质-20min-片2
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 29-19/30-372-2 - zzp-6042702p-rcqx-pH5.5jz-jyx2-20min-P3.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx279.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260507-FX279.lcb

样品瓶号: 2-22

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/07 21:50:27

处理时间(V2): 2026/05/08 14:53:41

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流速: 1.5ml/min


波长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.367	25448	11.488	5727	2251	1.264	--
2	3.658	196078	88.512	19354	3065	1.386	12.073
总计		221526	100.000	25080			

图83 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042702批-均一性2-pH5.5介质-20min-片3
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 29-19/30-373-2 - zzp-6042702p-rcqx-pH5.5jz-jyx2-20min-P4.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx279.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260507-FX279.lcb

样品瓶号: 2-31

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/07 21:55:52

处理时间(V2): 2026/05/08 14:53:43

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流 速: 1.5ml/min


波 长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.367	26900	11.599	6052	2260	1.256	--
2	3.656	205012	88.401	20180	3035	1.395	12.030
总计		231912	100.000	26232			

图84 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042702批-均一性2-pH5.5介质-20min-片4
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 29-19/30-374-2 - zzp-6042702p-rcqx-pH5.5jz-jyx2-20min-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx279.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260507-FX279.lcb
样品瓶号: 2-40
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/07 22:01:17
处理时间(V2): 2026/05/08 14:53:46
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.368	26122	11.568	5896	2259	1.256	--
2	3.657	199696	88.432	19709	3054	1.389	12.056
总计		225818	100.000	25605			

图85 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042702批-均一性2-pH5.5介质-20min-片5
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 29-19/30-375-2 - zzp-6042702p-rcqx-pH5.5jz-jyx2-20min-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx279.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260507-FX279.lcb
样品瓶号: 2-49
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/07 22:06:41
处理时间(V2): 2026/05/08 14:53:48
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.367	26181	11.550	5892	2263	1.266	--
2	3.657	200498	88.450	19782	3050	1.391	12.055
总计		226680	100.000	25674			

图86 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042702批-均一性2-pH5.5介质-20min-片6
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 29-19/30-376-2 - zzp-6042702p-rcqx-pH5.5jz-jyx2-30min-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx279.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260507-FX279.lcb
样品瓶号: 2-5
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/07 22:12:06
处理时间(V2): 2026/05/08 14:53:51
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.367	28926	11.589	6496	2244	1.261	--
2	3.651	220662	88.411	21602	3012	1.415	11.971
总计		249587	100.000	28099			

图87 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042702批-均一性2-pH5.5介质-30min-片1
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 29-19/30-377-2 - zzp-6042702p-rcqx-pH5.5jz-jyx2-30min-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx279.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260507-FX279.lcb
样品瓶号: 2-14
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/07 22:17:30
处理时间(V2): 2026/05/08 14:53:53
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.367	28580	11.528	6417	2249	1.258	--
2	3.651	219326	88.472	21602	3023	1.403	11.992
总计		247905	100.000	28019			

图88 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042702批-均一性2-pH5.5介质-30min-片2
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 29-19/30-378-2 - zzp-6042702p-rcqx-pH5.5jz-jyx2-30min-P3.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx279.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260507-FX279.lcb

样品瓶号: 2-23

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/07 22:22:54

处理时间(V2): 2026/05/08 14:53:56

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流速: 1.5ml/min


波长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.367	27948	11.486	6297	2255	1.261	--
2	3.652	215366	88.514	21163	3025	1.404	12.004
总计		243313	100.000	27460			

图89 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042702批-均一性2-pH5.5介质-30min-片3
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 29-19/30-379-2 - zzp-6042702p-rcqx-pH5.5jz-jyx2-30min-P4.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx279.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260507-FX279.lcb

样品瓶号: 2-32

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/07 22:28:19

处理时间(V2): 2026/05/08 14:53:58

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流速: 1.5ml/min


波长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.367	29276	11.706	6553	2241	1.258	--
2	3.649	220813	88.294	21696	3015	1.408	11.970
总计		250088	100.000	28248			

图90 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042702批-均一性2-pH5.5介质-30min-片4
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 29-19/30-380-2 - zzp-6042702p-rcqx-pH5.5jz-jyx2-30min-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx279.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260507-FX279.lcb
样品瓶号: 2-41
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/07 22:33:44
处理时间(V2): 2026/05/08 14:54:01
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.367	29033	11.686	6527	2256	1.255	--
2	3.651	219403	88.314	21542	3023	1.407	11.993
总计		248435	100.000	28069			

图91 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042702批-均一性2-pH5.5介质-30min-片5
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 29-19/30-381-2 - zzp-6042702p-rcqx-pH5.5jz-jyx2-30min-P6.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx279.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260507-FX279.lcb

样品瓶号: 2-50

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/07 22:39:08

处理时间(V2): 2026/05/08 14:54:04

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流 速: 1.5ml/min


波 长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.367	28507	11.555	6414	2249	1.261	--
2	3.650	218201	88.445	21408	3025	1.410	11.994
总计		246708	100.000	27822			

图92 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042702批-均一性2-pH5.5介质-30min-片6
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 29-19/30-382-2 - zzp-6042702p-rcqx-pH5.5jz-jyx2-45min-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx279.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260507-FX279.lcb
样品瓶号: 2-6
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/07 22:44:32
处理时间(V2): 2026/05/08 14:54:06
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.367	30917	11.583	6935	2244	1.270	--
2	3.647	236009	88.417	23096	2983	1.424	11.919
总计		266926	100.000	30031			

图93 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042702批-均一性2-pH5.5介质-45min-片1
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 29-19/30-383-2 - zzp-6042702p-rcqx-pH5.5jz-jyx2-45min-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx279.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260507-FX279.lcb
样品瓶号: 2-15
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/07 22:49:57
处理时间(V2): 2026/05/08 14:54:08
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.367	30413	11.424	6811	2242	1.262	--
2	3.646	235817	88.576	23139	2994	1.420	11.930
总计		266230	100.000	29950			

图94 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042702批-均一性2-pH5.5介质-45min-片2
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 29-19/30-384-2 - zzp-6042702p-rcqx-pH5.5jz-jyx2-45min-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx279.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260507-FX279.lcb
样品瓶号: 2-24
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/07 22:55:21
处理时间(V2): 2026/05/08 14:54:11
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.367	29557	11.354	6672	2251	1.255	--
2	3.648	230765	88.646	22634	2997	1.416	11.948
总计		260322	100.000	29305			

图95 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042702批-均一性2-pH5.5介质-45min-片3
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 29-19/30-385-2 - zzp-6042702p-rcqx-pH5.5jz-jyx2-45min-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx279.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260507-FX279.lcb
样品瓶号: 2-33
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/07 23:00:46
处理时间(V2): 2026/05/08 14:54:14
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.367	30906	11.597	6926	2246	1.267	--
2	3.646	235597	88.403	23057	2993	1.424	11.931
总计		266504	100.000	29984			

图96 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042702批-均一性2-pH5.5介质-45min-片4
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 29-19/30-386-2 - zzp-6042702p-rcqx-pH5.5jz-jyx2-45min-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx279.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260507-FX279.lcb
样品瓶号: 2-42
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/07 23:06:10
处理时间(V2): 2026/05/08 14:54:16
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.368	30599	11.564	6866	2248	1.259	--
2	3.647	234007	88.436	22981	2997	1.419	11.939
总计		264606	100.000	29848			

图97 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042702批-均一性2-pH5.5介质-45min-片5
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 29-19/30-387-2 - zzp-6042702p-rcqx-pH5.5jz-jyx2-45min-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx279.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260507-FX279.lcb
样品瓶号: 2-51
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/07 23:11:34
处理时间(V2): 2026/05/08 14:54:19
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.367	30393	11.583	6834	2252	1.252	--
2	3.647	232004	88.417	22803	2995	1.418	11.942
总计		262397	100.000	29637			

图98 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042702批-均一性2-pH5.5介质-45min-片6
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 29-19/30-388-2 - zzp-6042702p-rcqx-pH5.5jz-jyx2-60min-P1.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx279.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260507-FX279.lcb

样品瓶号: 2-7

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/07 23:16:58

处理时间(V2): 2026/05/08 14:54:21

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流 速: 1.5ml/min


波 长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.367	31582	11.429	7101	2247	1.256	--
2	3.644	244736	88.571	23899	2961	1.431	11.881
总计		276318	100.000	31000			

图99 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042702批-均一性2-pH5.5介质-60min-片1
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 29-19/30-389-2 - zzp-6042702p-rcqx-pH5.5jz-jyx2-60min-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx279.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260507-FX279.lcb
样品瓶号: 2-16
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/07 23:22:23
处理时间(V2): 2026/05/08 14:54:24
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.367	31472	11.406	7052	2256	1.254	--
2	3.643	244462	88.594	23939	2990	1.429	11.926
总计		275934	100.000	30991			

图100 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042702批-均一性2-pH5.5介质-60min-片2
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 29-19/30-390-2 - zzp-6042702p-rcqx-pH5.5jz-jyx2-60min-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx279.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260507-FX279.lcb
样品瓶号: 2-25
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/07 23:27:48
处理时间(V2): 2026/05/08 14:54:26
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.367	30753	11.413	6916	2248	1.265	--
2	3.645	238695	88.587	23431	2995	1.426	11.935
总计		269448	100.000	30346			

图101 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042702批-均一性2-pH5.5介质-60min-片3
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 29-19/30-391-2 - zzp-6042702p-rcqx-pH5.5jz-jyx2-60min-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx279.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260507-FX279.lcb
样品瓶号: 2-34
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/07 23:33:12
处理时间(V2): 2026/05/08 14:54:29
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.367	31611	11.553	7103	2245	1.256	--
2	3.642	242017	88.447	23654	2973	1.431	11.894
总计		273628	100.000	30757			

图102 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042702批-均一性2-pH5.5介质-60min-片4
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 29-19/30-392-2 - zzp-6042702p-rcqx-pH5.5jz-jyx2-60min-P5.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx279.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260507-FX279.lcb

样品瓶号: 2-43

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/07 23:38:36

处理时间(V2): 2026/05/08 14:54:31

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流 速: 1.5ml/min


波 长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.367	31570	11.550	7093	2249	1.260	--
2	3.643	241749	88.450	23694	2998	1.430	11.933
总计		273319	100.000	30787			

图103 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042702批-均一性2-pH5.5介质-60min-片5
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 29-19/30-393-2 - zzp-6042702p-rcqx-pH5.5jz-jyx2-60min-P6.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx279.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260507-FX279.lcb

样品瓶号: 2-52

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/07 23:44:01

处理时间(V2): 2026/05/08 14:54:34

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流 速: 1.5ml/min


波 长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.367	31142	11.478	7026	2251	1.260	--
2	3.643	240187	88.522	23541	2988	1.427	11.921
总计		271329	100.000	30567			

图104 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042702批-均一性2-pH5.5介质-60min-片6
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 29-19/30-394-2 - zzp-6042702p-rcqx-pH5.5jz-jyx2-JX-P1.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx279.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260507-FX279.lcb

样品瓶号: 2-8

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/07 23:49:26

处理时间(V2): 2026/05/08 14:54:36

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流 速: 1.5ml/min


波 长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.367	32540	11.505	7311	2256	1.262	--
2	3.641	250298	88.495	24505	2970	1.436	11.895
总计		282838	100.000	31816			

图105 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042702批-均一性2-pH5.5介质-极限转速-片1
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 29-19/30-395-2 - zzp-6042702p-rcqx-pH5.5jz-jyx2-JX-P2.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx279.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260507-FX279.lcb

样品瓶号: 2-17

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/07 23:54:51

处理时间(V2): 2026/05/08 14:54:39

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流 速: 1.5ml/min


波 长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.367	32242	11.412	7246	2247	1.251	--
2	3.640	250277	88.588	24500	2969	1.434	11.881
总计		282520	100.000	31746			

图106 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042702批-均一性2-pH5.5介质-极限转速-片2
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 29-19/30-396-2 - zzp-6042702p-rcqx-pH5.5jz-jyx2-JX-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx279.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260507-FX279.lcb
样品瓶号: 2-26
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/08 00:00:16
处理时间(V2): 2026/05/08 14:54:41
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.367	31461	11.400	7085	2257	1.257	--
2	3.642	244512	88.600	23950	3000	1.428	11.939
总计		275973	100.000	31034			

图107 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042702批-均一性2-pH5.5介质-极限转速-片3
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 29-19/30-397-2 - zzp-6042702p-rcqx-pH5.5jz-jyx2-JX-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx279.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260507-FX279.lcb
样品瓶号: 2-35
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/08 00:05:42
处理时间(V2): 2026/05/08 14:54:44
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.367	32405	11.570	7305	2250	1.255	--
2	3.640	247672	88.430	24250	2977	1.434	11.899
总计		280077	100.000	31555			

图108 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042702批-均一性2-pH5.5介质-极限转速-片4
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 29-19/30-398-2 - zzp-6042702p-rcqx-pH5.5jz-jyx2-JX-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx279.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260507-FX279.lcb
样品瓶号: 2-44
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/08 00:11:08
处理时间(V2): 2026/05/08 14:54:46
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.367	32181	11.505	7243	2252	1.256	--
2	3.640	247541	88.495	24250	2982	1.434	11.906
总计		279723	100.000	31493			

图109 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042702批-均一性2-pH5.5介质-极限转速-片5
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 29-19/30-399-2 - zzp-6042702p-rcqx-pH5.5jz-jyx2-JX-P6.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx279.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260507-FX279.lcb

样品瓶号: 2-53

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/08 00:16:32

处理时间(V2): 2026/05/08 14:54:49

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流速: 1.5ml/min


波长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.367	31975	11.547	7194	2256	1.253	--
2	3.641	244936	88.453	24039	2990	1.437	11.922
总计		276911	100.000	31233			

图110 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042702批-均一性2-pH5.5介质-极限转速-片6
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 29-19/30-400-2 - zzp-6042702p-rcqx-pH5.5jz-jyx2-dz-2-1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx279.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260507-FX279.lcb
样品瓶号: 2-27
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/08 00:21:57
处理时间(V2): 2026/05/08 14:54:51
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.344	38349	12.141	7563	1634	1.239	--
2	3.652	277507	87.859	26799	2908	1.440	11.430
总计		315856	100.000	34362			

图111 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042702批-均一性2-pH5.5介质
对照品溶液-2-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 29-19/30-401-2 - zzp-6042702p-rcqx-pH5.5jz-jyx2-dz-2-2.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx279.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260507-FX279.lcb

样品瓶号: 2-27

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/08 00:27:23

处理时间(V2): 2026/05/08 14:54:54

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流 速: 1.5ml/min


波 长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.344	38318	12.147	7554	1635	1.242	--
2	3.651	277149	87.853	26723	2895	1.444	11.411
总计		315467	100.000	34277			

图112 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042702批-均一性2-pH5.5介质
对照品溶液-2-2




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 29-19/30-402-2 - zzp-6042703p-rcqx-pH5.5jz-jyx2-rj.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx279.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260507-FX279.lcb
样品瓶号: 3-9
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/08 00:32:46
处理时间(V2): 2026/05/08 14:54:56
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图113 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042703批-均一性2-pH5.5介质
溶剂



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 29-19/30-403-2 - zzp-6042703p-rcqx-pH5.5jz-jyx2-dz-1-1.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx279.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260507-FX279.lcb

样品瓶号: 3-18

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/08 00:38:09

处理时间(V2): 2026/05/08 14:54:59

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流 速: 1.5ml/min


波 长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.345	37537	12.073	7407	1628	1.232	--
2	3.656	273383	87.927	26466	2918	1.434	11.442
总计		310920	100.000	33873			

图114 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042703批-均一性2-pH5.5介质
对照品溶液-1-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 29-19/30-404-2 - zzp-6042703p-rcqx-pH5.5jz-jyx2-dz-1-2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx279.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260507-FX279.lcb
样品瓶号: 3-18
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/08 00:43:32
处理时间(V2): 2026/05/08 14:55:02
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.345	37390	12.034	7398	1635	1.235	--
2	3.656	273308	87.966	26412	2910	1.432	11.436
总计		310698	100.000	33811			

图115 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042703批-均一性2-pH5.5介质
对照品溶液-1-2



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 29-19/30-405-2 - zzp-6042703p-rcqx-pH5.5jz-jyx2-dz-1-3.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx279.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260507-FX279.lcb

样品瓶号: 3-18

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/08 00:48:55

处理时间(V2): 2026/05/08 14:55:04

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流 速: 1.5ml/min


波 长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.346	37635	12.093	7427	1629	1.241	--
2	3.657	273586	87.907	26435	2917	1.436	11.437
总计		311221	100.000	33861			

图116 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042703批-均一性2-pH5.5介质
对照品溶液-1-3



QTL-235


<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 29-19/30-406-2 - zzp-6042703p-rcqx-pH5.5jz-jyx2-dz-1-4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx279.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260507-FX279.lcb
样品瓶号: 3-18
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/08 00:54:18
处理时间(V2): 2026/05/08 14:55:07
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm

版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.345	37401	12.038	7388	1625	1.230	--
2	3.656	273278	87.962	26373	2909	1.434	11.423
总计		310679	100.000	33761			

图117 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042703批-均一性2-pH5.5介质
对照品溶液-1-4



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 29-19/30-407-2 - zzp-6042703p-rcqx-pH5.5jz-jyx2-dz-1-5.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx279.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260507-FX279.lcb

样品瓶号: 3-18

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/08 00:59:41

处理时间(V2): 2026/05/08 14:55:09

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流 速: 1.5ml/min


波 长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.345	37691	12.113	7450	1639	1.233	--
2	3.655	273464	87.887	26466	2920	1.438	11.449
总计		311155	100.000	33916			

图118 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042703批-均一性2-pH5.5介质
对照品溶液-1-5




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 29-19/30-408-2 - zzp-6042703p-rcqx-pH5.5jz-jyx2-5min-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx279.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260507-FX279.lcb
样品瓶号: 3-1
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/08 01:05:03
处理时间(V2): 2026/05/08 14:55:12
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.367	3970	9.908	921	2288	1.261	--
2	3.685	36096	90.092	3673	3332	1.214	12.542
总计		40066	100.000	4594			

图119 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042703批-均一性2-pH5.5介质-5min-片1
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 29-19/30-409-2 - zzp-6042703p-rcqx-pH5.5jz-jyx2-5min-P2.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx279.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260507-FX279.lcb

样品瓶号: 3-10

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/08 01:10:27

处理时间(V2): 2026/05/08 14:55:14

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流速: 1.5ml/min


波长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.368	10123	10.517	2278	2258	1.256	--
2	3.671	86130	89.483	8714	3245	1.266	12.353
总计		96253	100.000	10992			

图120 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042703批-均一性2-pH5.5介质-5min-片2
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 29-19/30-410-2 - zzp-6042703p-rcqx-pH5.5jz-jyx2-5min-P3.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx279.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260507-FX279.lcb

样品瓶号: 3-19

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/08 01:15:49

处理时间(V2): 2026/05/08 14:55:17

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流速: 1.5ml/min


波长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.368	10507	10.511	2364	2252	1.249	--
2	3.669	89460	89.489	9012	3216	1.278	12.305
总计		99967	100.000	11376			

图121 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042703批-均一性2-pH5.5介质-5min-片3
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 29-19/30-411-2 - zzp-6042703p-rcqx-pH5.5jz-jyx2-5min-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx279.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260507-FX279.lcb
样品瓶号: 3-28
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/08 01:21:12
处理时间(V2): 2026/05/08 14:55:19
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.368	4151	10.781	910	2193	1.347	--
2	3.685	34347	89.219	3490	3357	1.203	12.481
总计		38498	100.000	4399			

图122 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042703批-均一性2-pH5.5介质-5min-片4
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 29-19/30-412-2 - zzp-6042703p-rcqx-pH5.5jz-jyx2-5min-P5.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx279.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260507-FX279.lcb

样品瓶号: 3-37

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/08 01:26:35

处理时间(V2): 2026/05/08 14:55:22

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流速: 1.5ml/min


波长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.368	8784	10.362	1971	2244	1.273	--
2	3.672	75988	89.638	7683	3238	1.248	12.336
总计		84772	100.000	9655			

图123 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042703批-均一性2-pH5.5介质-5min-片5
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 29-19/30-413-2 - zzp-6042703p-rcqx-pH5.5jz-jyx2-5min-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx279.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260507-FX279.lcb
样品瓶号: 3-46
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/08 01:31:58
处理时间(V2): 2026/05/08 14:55:25
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.368	7879	10.346	1784	2300	1.260	--
2	3.675	68277	89.654	6866	3243	1.255	12.393
总计		76157	100.000	8650			

图124 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042703批-均一性2-pH5.5介质-5min-片6
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 29-19/30-414-2 - zzp-6042703p-rcqx-pH5.5jz-jyx2-10min-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx279.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260507-FX279.lcb
样品瓶号: 3-2
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/08 01:37:23
处理时间(V2): 2026/05/08 14:55:27
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.368	15782	11.005	3555	2243	1.248	--
2	3.661	127624	88.995	12787	3179	1.316	12.222
总计		143406	100.000	16342			

图125 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042703批-均一性2-pH5.5介质-10min-片1
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 29-19/30-415-2 - zzp-6042703p-rcqx-pH5.5jz-jyx2-10min-P2.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx279.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260507-FX279.lcb

样品瓶号: 3-11

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/08 01:42:46

处理时间(V2): 2026/05/08 14:55:30

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流速: 1.5ml/min


波长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.368	20278	11.347	4548	2255	1.256	--
2	3.653	158437	88.653	15773	3110	1.349	12.116
总计		178715	100.000	20322			

图126 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042703批-均一性2-pH5.5介质-10min-片2
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 29-19/30-416-2 - zzp-6042703p-rcqx-pH5.5jz-jyx2-10min-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx279.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260507-FX279.lcb
样品瓶号: 3-20
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/08 01:48:09
处理时间(V2): 2026/05/08 14:55:32
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.368	20492	11.479	4592	2258	1.255	--
2	3.653	158019	88.521	15766	3118	1.342	12.129
总计		178511	100.000	20359			

图127 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042703批-均一性2-pH5.5介质-10min-片3
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 29-19/30-417-2 - zzp-6042703p-rcqx-pH5.5jz-jyx2-10min-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx279.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260507-FX279.lcb
样品瓶号: 3-29
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/08 01:53:32
处理时间(V2): 2026/05/08 14:55:35
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.368	16135	11.033	3628	2253	1.257	--
2	3.660	130113	88.967	13028	3163	1.315	12.202
总计		146248	100.000	16656			

图128 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042703批-均一性2-pH5.5介质-10min-片4
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 29-19/30-418-2 - zzp-6042703p-rcqx-pH5.5jz-jyx2-10min-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx279.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260507-FX279.lcb
样品瓶号: 3-38
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/08 01:58:54
处理时间(V2): 2026/05/08 14:55:37
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.368	18946	11.119	4257	2248	1.269	--
2	3.654	151441	88.881	15109	3130	1.340	12.140
总计		170387	100.000	19366			

图129 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042703批-均一性2-pH5.5介质-10min-片5
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 29-19/30-419-2 - zzp-6042703p-rcqx-pH5.5jz-jyx2-10min-P6.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx279.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260507-FX279.lcb

样品瓶号: 3-47

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/08 02:04:17

处理时间(V2): 2026/05/08 14:55:40

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流速: 1.5ml/min


波长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.368	18535	11.191	4189	2258	1.253	--
2	3.656	147090	88.809	14707	3156	1.336	12.184
总计		165624	100.000	18895			

图130 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042703批-均一性2-pH5.5介质-10min-片6
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 29-19/30-420-2 - zzp-6042703p-rcqx-pH5.5jz-jyx2-15min-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx279.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260507-FX279.lcb
样品瓶号: 3-3
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/08 02:09:39
处理时间(V2): 2026/05/08 14:55:43
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.367	21453	11.421	4818	2243	1.251	--
2	3.651	166383	88.579	16563	3106	1.349	12.101
总计		187836	100.000	21381			

图131 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042703批-均一性2-pH5.5介质-15min-片1
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 29-19/30-421-2 - zzp-6042703p-rcqx-pH5.5jz-jyx2-15min-P2.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx279.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260507-FX279.lcb

样品瓶号: 3-12

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/08 02:15:03

处理时间(V2): 2026/05/08 14:55:45

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流速: 1.5ml/min


波长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.368	24364	11.634	5482	2254	1.255	--
2	3.646	185062	88.366	18404	3086	1.368	12.063
总计		209427	100.000	23886			

图132 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042703批-均一性2-pH5.5介质-15min-片2
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 29-19/30-422-2 - zzp-6042703p-rcqx-pH5.5jz-jyx2-15min-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx279.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260507-FX279.lcb
样品瓶号: 3-21
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/08 02:20:25
处理时间(V2): 2026/05/08 14:55:48
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.368	24156	11.684	5434	2256	1.265	--
2	3.648	182577	88.316	18152	3102	1.367	12.089
总计		206733	100.000	23586			

图133 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042703批-均一性2-pH5.5介质-15min-片3
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 29-19/30-423-2 - zzp-6042703p-rcqx-pH5.5jz-jyx2-15min-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx279.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260507-FX279.lcb
样品瓶号: 3-30
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/08 02:25:47
处理时间(V2): 2026/05/08 14:55:50
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.367	22332	11.407	5023	2249	1.253	--
2	3.648	173447	88.593	17246	3091	1.361	12.074
总计		195779	100.000	22269			

图134 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042703批-均一性2-pH5.5介质-15min-片4
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 29-19/30-424-2 - zzp-6042703p-rcqx-pH5.5jz-jyx2-15min-P5.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx279.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260507-FX279.lcb

样品瓶号: 3-39

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/08 02:31:10

处理时间(V2): 2026/05/08 14:55:53

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流速: 1.5ml/min


波长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.368	22968	11.415	5194	2270	1.265	--
2	3.648	178232	88.585	17697	3098	1.364	12.091
总计		201200	100.000	22891			

图135 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042703批-均一性2-pH5.5介质-15min-片5
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 29-19/30-425-2 - zzp-6042703p-rcqx-pH5.5jz-jyx2-15min-P6.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx279.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260507-FX279.lcb

样品瓶号: 3-48

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/08 02:36:33

处理时间(V2): 2026/05/08 14:55:55

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流速: 1.5ml/min


波长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.368	23396	11.504	5261	2250	1.259	--
2	3.648	179970	88.496	17867	3082	1.364	12.057
总计		203366	100.000	23128			

图136 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042703批-均一性2-pH5.5介质-15min-片6
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 29-19/30-426-2 - zzp-6042703p-rcqx-pH5.5jz-jyx2-20min-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx279.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260507-FX279.lcb
样品瓶号: 3-4
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/08 02:41:55
处理时间(V2): 2026/05/08 14:55:58
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.367	24064	11.442	5439	2251	1.254	--
2	3.643	186239	88.558	18443	3054	1.375	12.016
总计		210302	100.000	23881			

图137 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042703批-均一性2-pH5.5介质-20min-片1
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 29-19/30-427-2 - zzp-6042703p-rcqx-pH5.5jz-jyx2-20min-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx279.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260507-FX279.lcb
样品瓶号: 3-13
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/08 02:47:18
处理时间(V2): 2026/05/08 14:56:00
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.367	26573	11.712	5981	2260	1.255	--
2	3.643	200318	88.288	19856	3063	1.382	12.031
总计		226891	100.000	25837			

图138 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042703批-均一性2-pH5.5介质-20min-片2
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 29-19/30-428-2 - zzp-6042703p-rcqx-pH5.5jz-jyx2-20min-P3.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx279.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260507-FX279.lcb

样品瓶号: 3-22

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/08 02:52:40

处理时间(V2): 2026/05/08 14:56:03

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流速: 1.5ml/min


波长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.367	26419	11.847	5922	2255	1.262	--
2	3.643	196592	88.153	19482	3057	1.380	12.017
总计		223011	100.000	25404			

图139 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042703批-均一性2-pH5.5介质-20min-片3
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 29-19/30-429-2 - zzp-6042703p-rcqx-pH5.5jz-jyx2-20min-P4.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx279.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260507-FX279.lcb

样品瓶号: 3-31

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/08 02:58:03

处理时间(V2): 2026/05/08 14:56:06

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流速: 1.5ml/min


波长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.368	25363	11.620	5709	2257	1.262	--
2	3.643	192916	88.380	19150	3071	1.379	12.034
总计		218279	100.000	24858			

图140 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042703批-均一性2-pH5.5介质-20min-片4
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 29-19/30-430-2 - zzp-6042703p-rcqx-pH5.5jz-jyx2-20min-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx279.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260507-FX279.lcb
样品瓶号: 3-40
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/08 03:03:25
处理时间(V2): 2026/05/08 14:56:08
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.369	25191	11.616	5667	2258	1.268	--
2	3.646	191677	88.384	18981	3058	1.379	12.018
总计		216867	100.000	24648			

图141 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042703批-均一性2-pH5.5介质-20min-片5
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 29-19/30-431-2 - zzp-6042703p-rcqx-pH5.5jz-jyx2-20min-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx279.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260507-FX279.lcb
样品瓶号: 3-49
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/08 03:08:47
处理时间(V2): 2026/05/08 14:56:11
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.368	25672	11.460	5772	2255	1.253	--
2	3.639	198352	88.540	19574	3123	1.451	12.091
总计		224025	100.000	25347			

图142 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042703批-均一性2-pH5.5介质-20min-片6
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 29-19/30-432-2 - zzp-6042703p-rcqx-pH5.5jz-jyx2-30min-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx279.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260507-FX279.lcb
样品瓶号: 3-5
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/08 03:14:09
处理时间(V2): 2026/05/08 14:56:13
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.367	27287	11.534	6151	2252	1.262	--
2	3.631	209281	88.466	20745	3057	1.391	11.986
总计		236568	100.000	26896			

图143 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042703批-均一性2-pH5.5介质-30min-片1
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 29-19/30-433-2 - zzp-6042703p-rcqx-pH5.5jz-jyx2-30min-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx279.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260507-FX279.lcb
样品瓶号: 3-14
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/08 03:19:31
处理时间(V2): 2026/05/08 14:56:16
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.366	29041	11.724	6559	2260	1.256	--
2	3.628	218662	88.276	21622	3034	1.403	11.953
总计		247703	100.000	28181			

图144 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042703批-均一性2-pH5.5介质-30min-片2
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 29-19/30-434-2 - zzp-6042703p-rcqx-pH5.5jz-jyx2-30min-P3.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx279.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260507-FX279.lcb

样品瓶号: 3-23

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/08 03:24:53

处理时间(V2): 2026/05/08 14:56:18

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流 速: 1.5ml/min


波 长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.367	28842	11.867	6459	2257	1.253	--
2	3.630	214208	88.133	21241	3028	1.397	11.938
总计		243050	100.000	27700			

图145 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042703批-均一性2-pH5.5介质-30min-片3
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 29-19/30-435-2 - zzp-6042703p-rcqx-pH5.5jz-jyx2-30min-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx279.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260507-FX279.lcb
样品瓶号: 3-32
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/08 03:30:15
处理时间(V2): 2026/05/08 14:56:21
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.368	28429	11.706	6414	2263	1.263	--
2	3.632	214441	88.294	21277	3043	1.393	11.966
总计		242870	100.000	27691			

图146 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042703批-均一性2-pH5.5介质-30min-片4
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 29-19/30-436-2 - zzp-6042703p-rcqx-pH5.5jz-jyx2-30min-P5.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx279.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260507-FX279.lcb

样品瓶号: 3-41

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/08 03:35:37

处理时间(V2): 2026/05/08 14:56:24

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流 速: 1.5ml/min


波 长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.367	27257	11.615	6135	2254	1.264	--
2	3.633	207409	88.385	20504	3029	1.390	11.954
总计		234666	100.000	26639			

图147 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042703批-均一性2-pH5.5介质-30min-片5
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 29-19/30-437-2 - zzp-6042703p-rcqx-pH5.5jz-jyx2-30min-P6.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx279.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260507-FX279.lcb

样品瓶号: 3-50

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/08 03:40:59

处理时间(V2): 2026/05/08 14:56:26

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流 速: 1.5ml/min


波 长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.369	28249	11.634	6364	2245	1.264	--
2	3.638	214577	88.366	21232	3041	1.395	11.963
总计		242826	100.000	27597			

图148 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042703批-均一性2-pH5.5介质-30min-片6
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 29-19/30-438-2 - zzp-6042703p-rcqx-pH5.5jz-jyx2-45min-P1.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx279.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260507-FX279.lcb

样品瓶号: 3-6

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/08 03:46:21

处理时间(V2): 2026/05/08 14:56:29

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流 速: 1.5ml/min


波 长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.367	29231	11.466	6608	2266	1.247	--
2	3.635	225695	88.534	22183	3019	1.420	11.952
总计		254925	100.000	28791			

图149 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042703批-均一性2-pH5.5介质-45min-片1
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 29-19/30-439-2 - zzp-6042703p-rcqx-pH5.5jz-jyx2-45min-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx279.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260507-FX279.lcb
样品瓶号: 3-15
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/08 03:51:43
处理时间(V2): 2026/05/08 14:56:31
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.367	30956	11.750	6959	2263	1.260	--
2	3.632	232501	88.250	22935	3011	1.416	11.931
总计		263457	100.000	29894			

图150 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042703批-均一性2-pH5.5介质-45min-片2
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 29-19/30-440-2 - zzp-6042703p-rcqx-pH5.5jz-jyx2-45min-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx279.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260507-FX279.lcb
样品瓶号: 3-24
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/08 03:57:06
处理时间(V2): 2026/05/08 14:56:34
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.367	30789	11.858	6911	2255	1.264	--
2	3.635	228869	88.142	22549	3018	1.418	11.938
总计		259657	100.000	29460			

图151 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042703批-均一性2-pH5.5介质-45min-片3
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 29-19/30-441-2 - zzp-6042703p-rcqx-pH5.5jz-jyx2-45min-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx279.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260507-FX279.lcb
样品瓶号: 3-33
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/08 04:02:27
处理时间(V2): 2026/05/08 14:56:36
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.367	30702	11.733	6902	2240	1.259	--
2	3.632	230961	88.267	22771	3001	1.412	11.901
总计		261663	100.000	29673			

图152 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042703批-均一性2-pH5.5介质-45min-片4
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 29-19/30-442-2 - zzp-6042703p-rcqx-pH5.5jz-jyx2-45min-P5.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx279.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260507-FX279.lcb

样品瓶号: 3-42

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/08 04:07:49

处理时间(V2): 2026/05/08 14:56:39

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流速: 1.5ml/min


波长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.368	29220	11.678	6556	2262	1.259	--
2	3.635	221002	88.322	21862	3033	1.402	11.962
总计		250222	100.000	28418			

图153 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042703批-均一性2-pH5.5介质-45min-片5
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 29-19/30-443-2 - zzp-6042703p-rcqx-pH5.5jz-jyx2-45min-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx279.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260507-FX279.lcb
样品瓶号: 3-51
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/08 04:13:11
处理时间(V2): 2026/05/08 14:56:41
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.367	30250	11.705	6794	2259	1.267	--
2	3.634	228184	88.295	22520	3025	1.410	11.950
总计		258435	100.000	29313			

图154 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042703批-均一性2-pH5.5介质-45min-片6
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 29-19/30-444-2 - zzp-6042703p-rcqx-pH5.5jz-jyx2-60min-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx279.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260507-FX279.lcb
样品瓶号: 3-7
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/08 04:18:31
处理时间(V2): 2026/05/08 14:56:44
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.368	30675	11.601	6877	2258	1.269	--
2	3.632	233733	88.399	23038	3009	1.413	11.916
总计		264408	100.000	29915			

图155 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042703批-均一性2-pH5.5介质-60min-片1
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 29-19/30-445-2 - zzp-6042703p-rcqx-pH5.5jz-jyx2-60min-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx279.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260507-FX279.lcb
样品瓶号: 3-16
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/08 04:23:54
处理时间(V2): 2026/05/08 14:56:46
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.368	31673	11.582	7159	2263	1.254	--
2	3.633	241802	88.418	23737	2988	1.428	11.891
总计		273475	100.000	30896			

图156 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042703批-均一性2-pH5.5介质-60min-片2
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 29-19/30-446-2 - zzp-6042703p-rcqx-pH5.5jz-jyx2-60min-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx279.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260507-FX279.lcb
样品瓶号: 3-25
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/08 04:29:17
处理时间(V2): 2026/05/08 14:56:49
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.368	31860	11.845	7140	2251	1.259	--
2	3.632	237105	88.155	23355	3000	1.419	11.899
总计		268965	100.000	30495			

图157 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042703批-均一性2-pH5.5介质-60min-片3
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 29-19/30-447-2 - zzp-6042703p-rcqx-pH5.5jz-jyx2-60min-P4.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx279.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260507-FX279.lcb

样品瓶号: 3-34

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/08 04:34:38

处理时间(V2): 2026/05/08 14:56:51

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流速: 1.5ml/min


波长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.368	31714	11.686	7142	2257	1.251	--
2	3.632	239669	88.314	23569	2994	1.419	11.896
总计		271383	100.000	30711			

图158 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042703批-均一性2-pH5.5介质-60min-片4
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 29-19/30-448-2 - zzp-6042703p-rcqx-pH5.5jz-jyx2-60min-P5.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx279.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260507-FX279.lcb

样品瓶号: 3-43

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/08 04:40:00

处理时间(V2): 2026/05/08 14:56:54

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流速: 1.5ml/min


波长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.368	29831	11.556	6696	2255	1.255	--
2	3.634	228312	88.444	22425	2997	1.415	11.906
总计		258143	100.000	29120			

图159 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042703批-均一性2-pH5.5介质-60min-片5
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 29-19/30-449-2 - zzp-6042703p-rcqx-pH5.5jz-jyx2-60min-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx279.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260507-FX279.lcb
样品瓶号: 3-52
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/08 04:45:23
处理时间(V2): 2026/05/08 14:56:56
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.368	31075	11.635	7016	2263	1.257	--
2	3.634	235999	88.365	23216	3003	1.418	11.917
总计		267074	100.000	30232			

图160 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042703批-均一性2-pH5.5介质-60min-片6
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 29-19/30-450-2 - zzp-6042703p-rcqx-pH5.5jz-jyx2-JX-P1.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx279.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260507-FX279.lcb

样品瓶号: 3-8

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/08 04:50:46

处理时间(V2): 2026/05/08 14:56:59

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流 速: 1.5ml/min


波 长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.368	31022	11.512	6972	2259	1.261	--
2	3.633	238447	88.488	23441	2992	1.421	11.899
总计		269470	100.000	30413			

图161 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042703批-均一性2-pH5.5介质-极限转速-片1
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 29-19/30-451-2 - zzp-6042703p-rcqx-pH5.5jz-jyx2-JX-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx279.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260507-FX279.lcb
样品瓶号: 3-17
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/08 04:56:09
处理时间(V2): 2026/05/08 14:57:01
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.368	32484	11.663	7305	2252	1.249	--
2	3.631	246045	88.337	24217	2987	1.424	11.879
总计		278529	100.000	31523			

图162 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042703批-均一性2-pH5.5介质-极限转速-片2
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 29-19/30-452-2 - zzp-6042703p-rcqx-pH5.5jz-jyx2-JX-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx279.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260507-FX279.lcb
样品瓶号: 3-26
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/08 05:01:31
处理时间(V2): 2026/05/08 14:57:04
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.368	32237	11.759	7251	2256	1.256	--
2	3.633	241916	88.241	23816	2996	1.422	11.898
总计		274153	100.000	31067			

图163 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042703批-均一性2-pH5.5介质-极限转速-片3
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 29-19/30-453-2 - zzp-6042703p-rcqx-pH5.5jz-jyx2-JX-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx279.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260507-FX279.lcb
样品瓶号: 3-35
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/08 05:06:54
处理时间(V2): 2026/05/08 14:57:06
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.368	32443	11.677	7288	2254	1.264	--
2	3.631	245406	88.323	24102	2973	1.424	11.862
总计		277849	100.000	31390			

图164 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042703批-均一性2-pH5.5介质-极限转速-片4
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 29-19/30-454-2 - zzp-6042703p-rcqx-pH5.5jz-jyx2-JX-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx279.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260507-FX279.lcb
样品瓶号: 3-44
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/08 05:12:16
处理时间(V2): 2026/05/08 14:57:09
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.368	30521	11.629	6855	2261	1.262	--
2	3.635	231939	88.371	22882	3017	1.413	11.938
总计		262460	100.000	29737			

图165 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042703批-均一性2-pH5.5介质-极限转速-片5
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 29-19/30-455-2 - zzp-6042703p-rcqx-pH5.5jz-jyx2-JX-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx279.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260507-FX279.lcb
样品瓶号: 3-53
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/08 05:17:39
处理时间(V2): 2026/05/08 14:57:11
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.368	32029	11.661	7181	2255	1.262	--
2	3.631	242643	88.339	23850	2986	1.421	11.882
总计		274672	100.000	31032			

图166 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042703批-均一性2-pH5.5介质-极限转速-片6
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 29-19/30-456-2 - zzp-6042703p-rcqx-pH5.5jz-jyx2-dz-2-1.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx279.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260507-FX279.lcb

样品瓶号: 3-27

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/08 05:23:00

处理时间(V2): 2026/05/08 14:57:14

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流 速: 1.5ml/min


波 长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.345	37811	12.044	7528	1655	1.235	--
2	3.649	276131	87.956	26815	2930	1.436	11.462
总计		313942	100.000	34344			

图167 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042703批-均一性2-pH5.5介质
对照品溶液-2-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 29-19/30-457-2 - zzp-6042703p-rcqx-pH5.5jz-jyx2-dz-2-2.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx279.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260507-FX279.lcb

样品瓶号: 3-27

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/08 05:28:23

处理时间(V2): 2026/05/08 14:57:17

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流 速: 1.5ml/min


波 长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.344	37844	12.063	7505	1656	1.247	--
2	3.648	275887	87.937	26738	2921	1.437	11.456
总计		313732	100.000	34243			

图168 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042703批-均一性2-pH5.5介质
对照品溶液-2-2