



非布司他多替诺雷片项目信息

介质体积(ml)	900	取样体积(ml)	1.5	补液体积(ml)	1.5
对照品批号	241101	对照品来源	ZZ	对照品使用方法	直接使用
对照品含量(%)	99.69	对照品水分(%)	0	对照品稀释倍数	5000
标示量(mg)	2	供试品稀释倍数	1	系数	1

对照品溶液

序号	称样量(mg)	A ₁	A ₂	A ₃	A ₄	A ₅	A _{平均}	RSD%
1	11.37	75099	75140	74957	74955	74977	75026	0.12
2	11.24	74527	74440				74484	0.09

单位质量响应值		RSD%	判断
6598.59	6626.69	0.31	数据可信



操作者:

日期: 2026-08-09

复核者:

未审阅版本



供试品溶液-6041601批-多替诺雷-pH5.5

时间 (分钟)	样品	A ₁	A ₂	A _{平均}	溶出量(%)	平均(%)	RSD%	累计溶 出量(%)	平均(%)	RSD%
5min	1	21276	-	21276	28.868	24.92	11.96	28.87	24.92	11.96
	2	19157	-	19157	25.993			25.99		
	3	19572	-	19572	26.556			26.56		
	4	18621	-	18621	25.265			25.27		
	5	15632	-	15632	21.210			21.21		
	6	15918	-	15918	21.598			21.60		
10min	1	38462	-	38462	52.186	50.40	2.46	52.23	50.44	2.46
	2	37161	-	37161	50.421			50.46		
	3	37725	-	37725	51.186			51.23		
	4	36669	-	36669	49.753			49.80		
	5	37093	-	37093	50.328			50.36		
	6	35785	-	35785	48.554			48.59		
15min	1	45916	-	45916	62.300	61.01	1.74	62.43	61.13	1.75
	2	45408	-	45408	61.610			61.74		
	3	44971	-	44971	61.017			61.15		
	4	44241	-	44241	60.027			60.15		
	5	45391	-	45391	61.587			61.71		
	6	43845	-	43845	59.490			59.61		
20min	1	50227	-	50227	68.149	67.04	1.54	68.39	67.27	1.54
	2	49901	-	49901	67.706			67.94		
	3	49647	-	49647	67.362			67.59		
	4	48535	-	48535	65.853			66.08		
	5	49764	-	49764	67.521			67.74		
	6	48400	-	48400	65.670			65.89		
30min	1	54954	-	54954	74.562	73.76	1.18	74.91	74.10	1.17
	2	54946	-	54946	74.552			74.89		
	3	54173	-	54173	73.503			73.85		
	4	53310	-	53310	72.332			72.67		
	5	54696	-	54696	74.212			74.55		
	6	54075	-	54075	73.370			73.70		
45min	1	58350	-	58350	79.170	78.55	1.37	79.65	79.01	1.37
	2	58665	-	58665	79.598			80.06		
	3	57552	-	57552	78.087			78.55		
	4	56663	-	56663	76.881			77.34		
	5	58614	-	58614	79.528			79.99		
	6	57498	-	57498	78.014			78.46		
60min	1	60491	-	60491	82.075	81.36	1.49	82.68	81.95	1.48
	2	60707	-	60707	82.368			82.97		
	3	59416	-	59416	80.617			81.21		
	4	58622	-	58622	79.539			80.12		
	5	60912	-	60912	82.646			83.24		
	6	59623	-	59623	80.897			81.48		
极限	1	61700	-	61700	83.716	83.27	1.29	84.46	84.00	1.29
	2	61972	-	61972	84.085			84.82		
	3	60923	-	60923	82.661			83.39		
	4	60057	-	60057	81.486			82.20		
	5	62216	-	62216	84.416			85.14		
	6	61365	-	61365	83.261			83.97		



操作者:

日期: 2026-08-09

复核者:

未审阅版本



非布司他多替诺雷片项目信息

介质体积(ml)	900	取样体积(ml)	1.5	补液体积(ml)	1.5
对照品批号	101278-202405	对照品来源	中检所	对照品使用方法	直接使用
对照品含量(%)	99.9	对照品水分(%)	0	对照品稀释倍数	250
标示量(mg)	40	供试品稀释倍数	1	系数	1

对照品溶液

序号	称样量(mg)	A ₁	A ₂	A ₃	A ₄	A ₅	A _{平均}	RSD%
1	11.39	555706	555395	556023	554885	556431	555688	0.11
2	11.34	555061	556124				555592	0.14

单位质量响应值		RSD%	判断
48787.36	48994.00	0.30	数据可信



操作者:

日期: 2026-08-09

复核者:

未审阅版本



供试品溶液-6041601批-非布司他-pH5.5

时间 (分钟)	样品	A ₁	A ₂	A _{平均}	溶出量(%)	平均(%)	RSD%	累计溶 出量(%)	平均(%)	RSD%
5min	1	189345	-	189345	34.821	30.25	11.09	34.82	30.25	11.10
	2	170476	-	170476	31.351			31.35		
	3	173647	-	173647	31.934			31.93		
	4	167188	-	167188	30.746			30.75		
	5	141567	-	141567	26.034			26.03		
	6	144664	-	144664	26.604			26.60		
10min	1	307902	-	307902	56.623	54.91	2.02	56.68	54.96	2.03
	2	295934	-	295934	54.423			54.47		
	3	301356	-	301356	55.420			55.47		
	4	298749	-	298749	54.940			54.99		
	5	298058	-	298058	54.813			54.86		
	6	289640	-	289640	53.265			53.31		
15min	1	354827	-	354827	65.253	64.15	1.45	65.41	64.30	1.46
	2	349832	-	349832	64.334			64.48		
	3	350197	-	350197	64.402			64.55		
	4	346633	-	346633	63.746			63.89		
	5	351505	-	351505	64.642			64.78		
	6	340127	-	340127	62.550			62.68		
20min	1	382942	-	382942	70.423	69.47	1.30	70.68	69.72	1.30
	2	379373	-	379373	69.767			70.02		
	3	378838	-	378838	69.669			69.92		
	4	374012	-	374012	68.781			69.03		
	5	381408	-	381408	70.141			70.38		
	6	369938	-	369938	68.032			68.27		
30min	1	414893	-	414893	76.299	75.66	1.01	76.68	76.02	1.01
	2	414101	-	414101	76.154			76.52		
	3	411514	-	411514	75.678			76.05		
	4	406246	-	406246	74.709			75.07		
	5	415201	-	415201	76.356			76.72		
	6	406458	-	406458	74.748			75.10		
45min	1	444037	-	444037	81.659	81.05	1.01	82.16	81.54	1.01
	2	444075	-	444075	81.666			82.16		
	3	440412	-	440412	80.992			81.49		
	4	434951	-	434951	79.988			80.48		
	5	445001	-	445001	81.836			82.32		
	6	435846	-	435846	80.152			80.63		
60min	1	459425	-	459425	84.489	84.17	1.02	85.13	84.79	1.02
	2	461918	-	461918	84.947			85.58		
	3	457842	-	457842	84.198			84.83		
	4	450359	-	450359	82.821			83.44		
	5	462256	-	462256	85.009			85.63		
	6	454266	-	454266	83.540			84.15		
极限	1	473839	-	473839	87.139	86.61	0.99	87.92	87.38	0.99
	2	473828	-	473828	87.137			87.91		
	3	471220	-	471220	86.658			87.43		
	4	462450	-	462450	85.045			85.80		
	5	474995	-	474995	87.352			88.12		
	6	469496	-	469496	86.341			87.09		



操作者:

日期: 2026-08-09

复核者:

未审阅版本



非布司他多替诺雷片项目信息

介质体积(ml)	900	取样体积(ml)	1.5	补液体积(ml)	1.5
对照品批号	241101	对照品来源	ZZ	对照品使用方法	直接使用
对照品含量(%)	99.69	对照品水分(%)	0	对照品稀释倍数	5000
标示量(mg)	2	供试品稀释倍数	1	系数	1

对照品溶液

序号	称样量(mg)	A ₁	A ₂	A ₃	A ₄	A ₅	A _{平均}	RSD%
1	11.37	76653	76866	76658	76668	76812	76731	0.14
2	11.24	76512	76367				76440	0.14
单位质量响应值			RSD%		判断			
6748.55			6800.71		0.55 数据可信			



操作者:

日期: 2026-08-09

复核者:

未审阅版本



供试品溶液-6042201批-多替诺雷-pH5.5

时间 (分钟)	样品	A ₁	A ₂	A _{平均}	溶出量(%)	平均(%)	RSD%	累计溶 出量(%)	平均(%)	RSD%
5min	1	22180	-	22180	29.375	28.91	6.47	29.37	28.91	6.46
	2	22310	-	22310	29.547			29.55		
	3	23576	-	23576	31.224			31.22		
	4	19623	-	19623	25.988			25.99		
	5	22549	-	22549	29.864			29.86		
	6	20750	-	20750	27.481			27.48		
10min	1	40091	-	40091	53.096	52.22	2.92	53.14	52.27	2.92
	2	39888	-	39888	52.827			52.88		
	3	40357	-	40357	53.448			53.50		
	4	37970	-	37970	50.287			50.33		
	5	40314	-	40314	53.391			53.44		
	6	37952	-	37952	50.263			50.31		
15min	1	47845	-	47845	63.365	62.06	2.09	63.50	62.19	2.09
	2	47192	-	47192	62.500			62.64		
	3	46925	-	46925	62.147			62.29		
	4	45818	-	45818	60.681			60.81		
	5	47813	-	47813	63.323			63.46		
	6	45555	-	45555	60.332			60.46		
20min	1	51597	-	51597	68.334	67.95	1.83	68.58	68.19	1.83
	2	51954	-	51954	68.807			69.05		
	3	51287	-	51287	67.924			68.17		
	4	50254	-	50254	66.556			66.78		
	5	52544	-	52544	69.589			69.83		
	6	50203	-	50203	66.488			66.72		
30min	1	55805	-	55805	73.907	73.86	1.10	74.26	74.22	1.11
	2	56101	-	56101	74.299			74.66		
	3	56205	-	56205	74.437			74.80		
	4	55053	-	55053	72.911			73.25		
	5	56458	-	56458	74.772			75.13		
	6	55004	-	55004	72.847			73.19		
45min	1	58764	-	58764	77.826	78.28	0.93	78.31	78.75	0.94
	2	59373	-	59373	78.633			79.11		
	3	59281	-	59281	78.511			78.99		
	4	58335	-	58335	77.258			77.72		
	5	59923	-	59923	79.361			79.85		
	6	58950	-	58950	78.073			78.53		
60min	1	60919	-	60919	80.680	80.75	1.04	81.29	81.36	1.04
	2	60924	-	60924	80.687			81.30		
	3	61110	-	61110	80.933			81.55		
	4	59832	-	59832	79.241			79.83		
	5	61675	-	61675	81.682			82.30		
	6	61383	-	61383	81.295			81.89		
极限	1	61986	-	61986	82.093	82.70	0.81	82.84	83.44	0.80
	2	62523	-	62523	82.805			83.55		
	3	62521	-	62521	82.802			83.55		
	4	61753	-	61753	81.785			82.51		
	5	63094	-	63094	83.561			84.31		
	6	62802	-	62802	83.174			83.90		



操作者:

日期: 2026-08-09

复核者:

未审阅版本



非布司他多替诺雷片项目信息

介质体积(ml)	900	取样体积(ml)	1.5	补液体积(ml)	1.5
对照品批号	101278-202405	对照品来源	中检所	对照品使用方法	直接使用
对照品含量(%)	99.9	对照品水分(%)	0	对照品稀释倍数	250
标示量(mg)	40	供试品稀释倍数	1	系数	1

对照品溶液

序号	称样量(mg)	A ₁	A ₂	A ₃	A ₄	A ₅	A _{平均}	RSD%
1	11.39	576747	576902	577168	576904	576009	576746	0.08
2	11.34	572505	572436				572470	0.01
单位质量响应值				RSD%	判断			
50636.17				0.22	数据可信			



操作者:

日期: 2026-08-09

复核者:

未审阅版本



供试品溶液-6042201批-非布司他-pH5.5

时间 (分钟)	样品	A ₁	A ₂	A _{平均}	溶出量(%)	平均(%)	RSD%	累计溶 出量(%)	平均(%)	RSD%
5min	1	189450	-	189450	33.690	33.06	5.87	33.69	33.06	5.87
	2	189987	-	189987	33.786			33.79		
	3	199054	-	199054	35.398			35.40		
	4	170680	-	170680	30.352			30.35		
	5	191602	-	191602	34.073			34.07		
	6	174613	-	174613	31.052			31.05		
10min	1	308048	-	308048	54.781	53.86	3.04	54.84	53.91	3.04
	2	304902	-	304902	54.221			54.28		
	3	309250	-	309250	54.994			55.05		
	4	296774	-	296774	52.776			52.83		
	5	310989	-	310989	55.304			55.36		
	6	287134	-	287134	51.061			51.11		
15min	1	351257	-	351257	62.464	61.66	1.90	62.61	61.80	1.91
	2	346831	-	346831	61.677			61.82		
	3	350389	-	350389	62.310			62.46		
	4	344428	-	344428	61.250			61.39		
	5	352720	-	352720	62.725			62.87		
	6	334815	-	334815	59.541			59.68		
20min	1	374614	-	374614	66.618	66.29	1.50	66.87	66.54	1.51
	2	374013	-	374013	66.511			66.76		
	3	376481	-	376481	66.950			67.20		
	4	370323	-	370323	65.855			66.10		
	5	378385	-	378385	67.289			67.54		
	6	362780	-	362780	64.514			64.75		
30min	1	405290	-	405290	72.073	71.77	0.93	72.44	72.13	0.93
	2	402609	-	402609	71.596			71.96		
	3	407179	-	407179	72.409			72.78		
	4	400499	-	400499	71.221			71.57		
	5	407568	-	407568	72.478			72.84		
	6	398399	-	398399	70.848			71.19		
45min	1	430895	-	430895	76.627	76.71	0.82	77.11	77.19	0.83
	2	431030	-	431030	76.651			77.13		
	3	434668	-	434668	77.298			77.78		
	4	427696	-	427696	76.058			76.53		
	5	436195	-	436195	77.569			78.06		
	6	427628	-	427628	76.046			76.51		
60min	1	449074	-	449074	79.859	79.93	0.70	80.47	80.53	0.71
	2	449279	-	449279	79.896			80.50		
	3	452405	-	452405	80.452			81.07		
	4	444621	-	444621	79.068			79.66		
	5	453298	-	453298	80.611			81.23		
	6	448038	-	448038	79.675			80.26		
极限	1	461978	-	461978	82.154	82.17	0.63	82.90	82.91	0.64
	2	461505	-	461505	82.070			82.81		
	3	464495	-	464495	82.602			83.35		
	4	457313	-	457313	81.325			82.05		
	5	465623	-	465623	82.802			83.55		
	6	461479	-	461479	82.065			82.79		



操作者:

日期: 2026-08-09

复核者:

未审阅版本



非布司他多替诺雷片项目信息

介质体积(ml)	900	取样体积(ml)	1.5	补液体积(ml)	1.5
对照品批号	241101	对照品来源	ZZ	对照品使用方法	直接使用
对照品含量(%)	99.69	对照品水分(%)	0	对照品稀释倍数	5000
标示量(mg)	2	供试品稀释倍数	1	系数	1

对照品溶液

序号	称样量(mg)	A ₁	A ₂	A ₃	A ₄	A ₅	A _{平均}	RSD%
1	11.37	74180	74532	74252	74222	74345	74306	0.19
2	11.24	74246	74328				74287	0.08
单位质量响应值				RSD%	判断			
6535.27				0.80	数据可信			



操作者:

日期: 2026-08-09

复核者:

未审阅版本



供试品溶液-6042401批-多替诺雷-pH5.5

时间 (分钟)	样品	A ₁	A ₂	A _{平均}	溶出量(%)	平均(%)	RSD%	累计溶 出量(%)	平均(%)	RSD%
5min	1	21710	-	21710	29.638	22.00	31.81	29.64	22.00	31.82
	2	19235	-	19235	26.260			26.26		
	3	15269	-	15269	20.845			20.85		
	4	19911	-	19911	27.182			27.18		
	5	12126	-	12126	16.554			16.55		
	6	8419	-	8419	11.494			11.49		
10min	1	39102	-	39102	53.382	48.89	10.27	53.43	48.92	10.29
	2	38893	-	38893	53.097			53.14		
	3	35051	-	35051	47.852			47.89		
	4	38350	-	38350	52.355			52.40		
	5	33587	-	33587	45.853			45.88		
	6	29873	-	29873	40.783			40.80		
15min	1	46486	-	46486	63.463	60.99	4.52	63.60	61.11	4.54
	2	46764	-	46764	63.842			63.97		
	3	43966	-	43966	60.022			60.14		
	4	45717	-	45717	62.413			62.55		
	5	43604	-	43604	59.528			59.63		
	6	41518	-	41518	56.680			56.77		
20min	1	50457	-	50457	68.884	67.33	2.42	69.13	67.55	2.45
	2	50346	-	50346	68.732			68.97		
	3	48738	-	48738	66.537			66.75		
	4	50006	-	50006	68.268			68.50		
	5	48999	-	48999	66.893			67.10		
	6	47360	-	47360	64.656			64.84		
30min	1	55270	-	55270	75.455	74.29	1.26	75.81	74.62	1.29
	2	54825	-	54825	74.847			75.20		
	3	53692	-	53692	73.300			73.63		
	4	54861	-	54861	74.896			75.25		
	5	54249	-	54249	74.061			74.38		
	6	53586	-	53586	73.156			73.44		
45min	1	58508	-	58508	79.875	79.10	0.87	80.36	79.56	0.89
	2	58421	-	58421	79.756			80.23		
	3	57183	-	57183	78.066			78.51		
	4	57897	-	57897	79.041			79.52		
	5	58019	-	58019	79.207			79.65		
	6	57609	-	57609	78.648			79.06		
60min	1	60075	-	60075	82.014	81.65	0.65	82.63	82.24	0.66
	2	59928	-	59928	81.814			82.42		
	3	59298	-	59298	80.954			81.53		
	4	60047	-	60047	81.976			82.58		
	5	60153	-	60153	82.121			82.69		
	6	59345	-	59345	81.018			81.56		
极限	1	62045	-	62045	84.704	83.94	0.83	85.46	84.66	0.83
	2	61855	-	61855	84.444			85.19		
	3	60705	-	60705	82.874			83.59		
	4	61099	-	61099	83.412			84.16		
	5	61741	-	61741	84.289			85.00		
	6	61457	-	61457	83.901			84.58		



操作者:

日期: 2026-08-09

复核者:

未审阅版本



非布司他多替诺雷片项目信息

介质体积(ml)	900	取样体积(ml)	1.5	补液体积(ml)	1.5
对照品批号	101278-202405	对照品来源	中检所	对照品使用方法	直接使用
对照品含量(%)	99.9	对照品水分(%)	0	对照品稀释倍数	250
标示量(mg)	40	供试品稀释倍数	1	系数	1

对照品溶液

序号	称样量(mg)	A ₁	A ₂	A ₃	A ₄	A ₅	A _{平均}	RSD%
1	11.39	555671	555781	554709	554582	554171	554983	0.13
2	11.34	554151	554912				554532	0.10
单位质量响应值				RSD%	判断			
48725.46				0.26	数据可信			



操作者:

日期: 2026-08-09

复核者:

未审阅版本



供试品溶液-6042401批-非布司他-pH5.5

时间 (分钟)	样品	A ₁	A ₂	A _{平均}	溶出量(%)	平均(%)	RSD%	累计溶 出量(%)	平均(%)	RSD%
5min	1	186842	-	186842	34.415	25.87	30.56	34.42	25.87	30.57
	2	166078	-	166078	30.590			30.59		
	3	135280	-	135280	24.918			24.92		
	4	172301	-	172301	31.737			31.74		
	5	106686	-	106686	19.651			19.65		
	6	75485	-	75485	13.904			13.90		
10min	1	305113	-	305113	56.200	51.90	8.79	56.26	51.95	8.80
	2	301355	-	301355	55.508			55.56		
	3	280115	-	280115	51.595			51.64		
	4	297222	-	297222	54.746			54.80		
	5	265465	-	265465	48.897			48.93		
	6	241454	-	241454	44.474			44.50		
15min	1	348930	-	348930	64.271	62.15	3.69	64.42	62.28	3.71
	2	348179	-	348179	64.132			64.28		
	3	335686	-	335686	61.831			61.96		
	4	344104	-	344104	63.382			63.53		
	5	330946	-	330946	60.958			61.07		
	6	316574	-	316574	58.311			58.41		
20min	1	374862	-	374862	69.047	67.65	2.02	69.31	67.88	2.04
	2	374211	-	374211	68.927			69.18		
	3	364232	-	364232	67.089			67.32		
	4	370982	-	370982	68.332			68.58		
	5	363333	-	363333	66.924			67.14		
	6	355949	-	355949	65.563			65.76		
30min	1	405207	-	405207	74.636	74.01	0.87	75.01	74.35	0.90
	2	405286	-	405286	74.651			75.02		
	3	398777	-	398777	73.452			73.79		
	4	403892	-	403892	74.394			74.76		
	5	400359	-	400359	73.743			74.07		
	6	397177	-	397177	73.157			73.46		
45min	1	432905	-	432905	79.738	79.27	0.54	80.24	79.75	0.56
	2	432786	-	432786	79.716			80.21		
	3	427435	-	427435	78.731			79.20		
	4	430692	-	430692	79.331			79.82		
	5	430466	-	430466	79.289			79.74		
	6	428026	-	428026	78.840			79.27		
60min	1	449012	-	449012	82.705	82.46	0.44	83.34	83.06	0.45
	2	449722	-	449722	82.836			83.46		
	3	444629	-	444629	81.898			82.49		
	4	447627	-	447627	82.450			83.07		
	5	448755	-	448755	82.658			83.24		
	6	446205	-	446205	82.188			82.75		
极限	1	463292	-	463292	85.335	85.17	0.44	86.10	85.91	0.43
	2	464302	-	464302	85.521			86.28		
	3	459022	-	459022	84.549			85.28		
	4	460984	-	460984	84.910			85.67		
	5	463298	-	463298	85.336			86.06		
	6	463525	-	463525	85.378			86.07		



操作者:

日期: 2026-08-09

复核者:

未审阅版本



非布司他多替诺雷片项目信息

介质体积(ml)	900	取样体积(ml)	1.5	补液体积(ml)	1.5
对照品批号	241101	对照品来源	ZZ	对照品使用方法	直接使用
对照品含量(%)	99.69	对照品水分(%)	0	对照品稀释倍数	5000
标示量(mg)	2	供试品稀释倍数	1	系数	1

对照品溶液

序号	称样量(mg)	A ₁	A ₂	A ₃	A ₄	A ₅	A _{平均}	RSD%
1	11.37	78193	78192	78214	78539	78608	78349	0.27
2	11.24	76781	77147				76964	0.34
单位质量响应值				RSD%	判断			
6890.85		6847.33		0.45	数据可信			



操作者:

日期: 2026-08-09

复核者:

未审阅版本



供试品溶液-6042401批-多替诺雷-pH5.5

时间 (分钟)	样品	A ₁	A ₂	A _{平均}	溶出量(%)	平均(%)	RSD%	累计溶 出量(%)	平均(%)	RSD%
5min	1	14380	-	14380	18.783	18.33	33.42	18.78	18.34	33.42
	2	14954	-	14954	19.532			19.53		
	3	18435	-	18435	24.079			24.08		
	4	7806	-	7806	10.196			10.20		
	5	9286	-	9286	12.129			12.13		
	6	19360	-	19360	25.287			25.29		
10min	1	36019	-	36019	47.047	45.57	12.14	47.08	45.60	12.16
	2	36453	-	36453	47.614			47.65		
	3	38443	-	38443	50.213			50.25		
	4	28003	-	28003	36.577			36.59		
	5	31628	-	31628	41.311			41.33		
	6	38793	-	38793	50.670			50.71		
15min	1	44794	-	44794	58.509	57.69	6.33	58.62	57.80	6.35
	2	45620	-	45620	59.587			59.70		
	3	46229	-	46229	60.383			60.51		
	4	39572	-	39572	51.688			51.77		
	5	42049	-	42049	54.923			55.01		
	6	46758	-	46758	61.074			61.20		
20min	1	49830	-	49830	65.086	64.34	3.90	65.29	64.54	3.93
	2	50357	-	50357	65.775			65.99		
	3	50601	-	50601	66.093			66.32		
	4	45951	-	45951	60.020			60.18		
	5	47980	-	47980	62.670			62.85		
	6	50826	-	50826	66.387			66.62		
30min	1	54678	-	54678	71.419	71.48	2.16	71.73	71.79	2.19
	2	55223	-	55223	72.131			72.45		
	3	55253	-	55253	72.170			72.50		
	4	52420	-	52420	68.469			68.73		
	5	55072	-	55072	71.933			72.22		
	6	55718	-	55718	72.777			73.12		
45min	1	58321	-	58321	76.177	76.57	1.70	76.61	77.00	1.72
	2	58916	-	58916	76.954			77.40		
	3	59187	-	59187	77.308			77.76		
	4	56756	-	56756	74.133			74.51		
	5	59066	-	59066	77.150			77.56		
	6	59484	-	59484	77.696			78.16		
60min	1	60113	-	60113	78.518	79.08	1.16	79.08	79.64	1.18
	2	60885	-	60885	79.526			80.10		
	3	60819	-	60819	79.440			80.02		
	4	59319	-	59319	77.481			77.98		
	5	61183	-	61183	79.915			80.45		
	6	60943	-	60943	79.602			80.19		
极限	1	61637	-	61637	80.508	80.87	1.21	81.20	81.56	1.22
	2	61954	-	61954	80.922			81.62		
	3	61724	-	61724	80.622			81.34		
	4	60745	-	60745	79.343			79.97		
	5	62661	-	62661	81.846			82.51		
	6	62770	-	62770	81.988			82.71		



操作者:

日期: 2026-08-09

复核者:

未审阅版本



非布司他多替诺雷片项目信息

介质体积(ml)	900	取样体积(ml)	1.5	补液体积(ml)	1.5
对照品批号	101278-202405	对照品来源	中检所	对照品使用方法	直接使用
对照品含量(%)	99.9	对照品水分(%)	0	对照品稀释倍数	250
标示量(mg)	40	供试品稀释倍数	1	系数	1

对照品溶液

序号	称样量(mg)	A ₁	A ₂	A ₃	A ₄	A ₅	A _{平均}	RSD%
1	11.39	596822	597961	598605	599033	598730	598230	0.15
2	11.34	586978	587611				587294	0.08
单位质量响应值				RSD%	判断			
52522.39				1.00	数据可信			



操作者:

日期: 2026-08-09

复核者:

未审阅版本



供试品溶液-6042401批-非布司他-pH5.5

时间 (分钟)	样品	A ₁	A ₂	A _{平均}	溶出量(%)	平均(%)	RSD%	累计溶 出量(%)	平均(%)	RSD%
5min	1	127562	-	127562	21.991	21.38	32.23	21.99	21.38	32.23
	2	132038	-	132038	22.763			22.76		
	3	162516	-	162516	28.017			28.02		
	4	71408	-	71408	12.310			12.31		
	5	82538	-	82538	14.229			14.23		
	6	168068	-	168068	28.974			28.97		
10min	1	282859	-	282859	48.764	47.44	10.30	48.80	47.47	10.31
	2	287459	-	287459	49.557			49.59		
	3	299665	-	299665	51.661			51.71		
	4	230560	-	230560	39.747			39.77		
	5	250594	-	250594	43.201			43.22		
	6	299813	-	299813	51.686			51.73		
15min	1	335464	-	335464	57.832	57.40	4.75	57.95	57.52	4.78
	2	343224	-	343224	59.170			59.29		
	3	346741	-	346741	59.776			59.91		
	4	310146	-	310146	53.468			53.55		
	5	316648	-	316648	54.589			54.68		
	6	345638	-	345638	59.586			59.72		
20min	1	365564	-	365564	63.021	62.95	2.46	63.24	63.17	2.49
	2	371476	-	371476	64.041			64.26		
	3	372785	-	372785	64.266			64.50		
	4	352267	-	352267	60.729			60.91		
	5	356181	-	356181	61.404			61.59		
	6	372794	-	372794	64.268			64.50		
30min	1	400459	-	400459	69.037	69.20	0.97	69.36	69.51	0.99
	2	404983	-	404983	69.817			70.14		
	3	403538	-	403538	69.568			69.91		
	4	394839	-	394839	68.068			68.35		
	5	399818	-	399818	68.927			69.22		
	6	404630	-	404630	69.756			70.10		
45min	1	427635	-	427635	73.722	74.25	0.60	74.16	74.68	0.60
	2	433726	-	433726	74.772			75.21		
	3	429761	-	429761	74.089			74.54		
	4	428113	-	428113	73.805			74.20		
	5	432415	-	432415	74.546			74.95		
	6	432581	-	432581	74.575			75.03		
60min	1	445827	-	445827	76.858	77.27	0.44	77.42	77.83	0.44
	2	450902	-	450902	77.733			78.30		
	3	447285	-	447285	77.110			77.69		
	4	446938	-	446938	77.050			77.56		
	5	450057	-	450057	77.588			78.12		
	6	448343	-	448343	77.292			77.87		
极限	1	459548	-	459548	79.224	79.59	0.66	79.91	80.28	0.65
	2	464841	-	464841	80.136			80.83		
	3	457521	-	457521	78.874			79.58		
	4	460527	-	460527	79.393			80.03		
	5	465026	-	465026	80.168			80.83		
	6	462688	-	462688	79.765			80.48		



操作者:

日期: 2026-08-09

复核者:

未审阅版本




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 29-20/29-744-2 - zzp-6041601p-rcqx-pH5.5jz-rj.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260507-FX278.lcb
样品瓶号: 1-9
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/07 14:13:48
处理时间(V2): 2026/05/08 14:58:53
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图1 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6041601批-pH5.5介质
溶剂




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 29-20/29-745-2 - zzp-6041601p-rcqx-pH5.5jz-dz-1-1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260507-FX278.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/07 14:19:12
处理时间(V2): 2026/05/08 14:58:57
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.360	75099	11.905	14386	1609	1.204	--
2	3.967	555706	88.095	47573	2829	1.414	12.019
总计		630805	100.000	61959			

图2 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6041601批-pH5.5介质
对照品溶液-1-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 29-20/29-746-2 - zzp-6041601p-rcqx-pH5.5jz-dz-1-2.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx278.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260507-FX278.lcb

样品瓶号: 1-18

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/07 14:24:36

处理时间(V2): 2026/05/08 14:59:00

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流 速: 1.5ml/min


波 长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.362	75140	11.917	14460	1617	1.195	--
2	3.997	555395	88.083	47000	2794	1.421	12.036
总计		630535	100.000	61460			

图3 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6041601批-pH5.5介质
对照品溶液-1-2



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 29-20/29-747-2 - zzp-6041601p-rcqx-pH5.5jz-dz-1-3.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx278.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260507-FX278.lcb

样品瓶号: 1-18

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/07 14:30:00

处理时间(V2): 2026/05/08 14:59:03

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流 速: 1.5ml/min


波 长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.364	74957	11.879	14449	1617	1.196	--
2	4.028	556023	88.121	46358	2764	1.433	12.048
总计		630980	100.000	60807			

图4 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6041601批-pH5.5介质
对照品溶液-1-3



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 29-20/29-748-2 - zzp-6041601p-rcqx-pH5.5jz-dz-1-4.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx278.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260507-FX278.lcb

样品瓶号: 1-18

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/07 14:35:24

处理时间(V2): 2026/05/08 14:59:05

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流 速: 1.5ml/min


波 长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.367	74955	11.901	14356	1623	1.196	--
2	4.057	554885	88.099	45692	2726	1.448	12.050
总计		629840	100.000	60048			

图5 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6041601批-pH5.5介质
对照品溶液-1-4




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 29-20/29-749-2 - zzp-6041601p-rcqx-pH5.5jz-dz-1-5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260507-FX278.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/07 14:40:48
处理时间(V2): 2026/05/08 14:59:08
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.367	74977	11.875	14326	1613	1.190	--
2	4.084	556431	88.125	45107	2686	1.460	12.040
总计		631408	100.000	59433			

图6 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6041601批-pH5.5介质
对照品溶液-1-5




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 29-20/29-750-2 - zzp-6041601p-rcqx-pH5.5jz-5min-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260507-FX278.lcb
样品瓶号: 1-1
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/07 14:53:26
处理时间(V2): 2026/05/08 14:59:11
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.351	21276	10.102	5088	2474	1.156	--
2	3.268	189345	89.898	21833	3333	1.112	11.448
总计		210621	100.000	26922			

图7 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6041601批-pH5.5介质-5min-片1
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 29-20/29-751-2 - zzp-6041601p-rcqx-pH5.5jz-5min-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260507-FX278.lcb
样品瓶号: 1-10
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/07 14:58:50
处理时间(V2): 2026/05/08 14:59:14
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.351	19157	10.102	4589	2476	1.144	--
2	3.273	170476	89.898	19608	3319	1.109	11.448
总计		189633	100.000	24196			

图8 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6041601批-pH5.5介质-5min-片2
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 29-20/29-752-2 - zzp-6041601p-rcqx-pH5.5jz-5min-P3.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx278.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260507-FX278.lcb

样品瓶号: 1-19

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/07 15:04:14

处理时间(V2): 2026/05/08 14:59:16

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流速: 1.5ml/min


波长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.352	19572	10.130	4704	2490	1.143	--
2	3.278	173647	89.870	20035	3339	1.111	11.491
总计		193220	100.000	24739			

图9 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6041601批-pH5.5介质-5min-片3
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 29-20/29-753-2 - zzp-6041601p-rcqx-pH5.5jz-5min-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260507-FX278.lcb
样品瓶号: 1-28
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/07 15:09:38
处理时间(V2): 2026/05/08 14:59:19
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.352	18621	10.022	4471	2484	1.144	--
2	3.281	167188	89.978	19241	3321	1.114	11.477
总计		185809	100.000	23713			

图10 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6041601批-pH5.5介质-5min-片4
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 29-20/29-754-2 - zzp-6041601p-rcqx-pH5.5jz-5min-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260507-FX278.lcb
样品瓶号: 1-37
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/07 15:15:00
处理时间(V2): 2026/05/08 14:59:22
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.352	15632	9.944	3781	2500	1.127	--
2	3.285	141567	90.056	16226	3309	1.109	11.486
总计		157199	100.000	20007			

图11 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6041601批-pH5.5介质-5min-片5
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 29-20/29-755-2 - zzp-6041601p-rcqx-pH5.5jz-5min-P6.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx278.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260507-FX278.lcb

样品瓶号: 1-46

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/07 15:20:24

处理时间(V2): 2026/05/08 14:59:24

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流 速: 1.5ml/min


波 长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.353	15918	9.913	3858	2509	1.138	--
2	3.291	144664	90.087	16588	3330	1.110	11.530
总计		160582	100.000	20446			

图12 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6041601批-pH5.5介质-5min-片6
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 29-20/29-756-2 - zzp-6041601p-rcqx-pH5.5jz-10min-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260507-FX278.lcb
样品瓶号: 1-2
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/07 15:25:49
处理时间(V2): 2026/05/08 14:59:27
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.353	38462	11.105	9312	2507	1.141	--
2	3.280	307902	88.895	35116	3281	1.154	11.435
总计		346365	100.000	44428			

图13 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6041601批-pH5.5介质-10min-片1
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 29-20/29-757-2 - zzp-6041601p-rcqx-pH5.5jz-10min-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260507-FX278.lcb
样品瓶号: 1-11
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/07 15:31:11
处理时间(V2): 2026/05/08 14:59:29
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.353	37161	11.156	8975	2503	1.141	--
2	3.283	295934	88.844	33650	3278	1.156	11.438
总计		333095	100.000	42626			

图14 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6041601批-pH5.5介质-10min-片2
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 29-20/29-758-2 - zzp-6041601p-rcqx-pH5.5jz-10min-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260507-FX278.lcb
样品瓶号: 1-20
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/07 15:36:34
处理时间(V2): 2026/05/08 14:59:32
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.353	37725	11.126	9135	2508	1.137	--
2	3.286	301356	88.874	34251	3280	1.159	11.449
总计		339081	100.000	43386			

图15 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6041601批-pH5.5介质-10min-片3
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 29-20/29-759-2 - zzp-6041601p-rcqx-pH5.5jz-10min-P4.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx278.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260507-FX278.lcb

样品瓶号: 1-29

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/07 15:41:57

处理时间(V2): 2026/05/08 14:59:34

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流 速: 1.5ml/min


波 长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.353	36669	10.932	8865	2495	1.139	--
2	3.288	298749	89.068	33917	3267	1.161	11.434
总计		335418	100.000	42782			

图16 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6041601批-pH5.5介质-10min-片4
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 29-20/29-760-2 - zzp-6041601p-rcqx-pH5.5jz-10min-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260507-FX278.lcb
样品瓶号: 1-38
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/07 15:47:20
处理时间(V2): 2026/05/08 14:59:37
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.354	37093	11.067	8975	2501	1.139	--
2	3.290	298058	88.933	33866	3268	1.163	11.440
总计		335150	100.000	42841			

图17 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6041601批-pH5.5介质-10min-片5
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 29-20/29-761-2 - zzp-6041601p-rcqx-pH5.5jz-10min-P6.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx278.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260507-FX278.lcb

样品瓶号: 1-47

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/07 15:52:42

处理时间(V2): 2026/05/08 14:59:40

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流 速: 1.5ml/min


波 长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.354	35785	10.996	8696	2515	1.140	--
2	3.293	289640	89.004	32805	3271	1.164	11.465
总计		325425	100.000	41501			

图18 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6041601批-pH5.5介质-10min-片6
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 29-20/29-762-2 - zzp-6041601p-rcqx-pH5.5jz-15min-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260507-FX278.lcb
样品瓶号: 1-3
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/07 15:58:05
处理时间(V2): 2026/05/08 14:59:42
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.354	45916	11.458	11136	2513	1.137	--
2	3.289	354827	88.542	40010	3229	1.187	11.398
总计		400744	100.000	51146			

图19 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6041601批-pH5.5介质-15min-片1
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 29-20/29-763-2 - zzp-6041601p-rcqx-pH5.5jz-15min-P2.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx278.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260507-FX278.lcb

样品瓶号: 1-12

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/07 16:03:28

处理时间(V2): 2026/05/08 14:59:45

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流 速: 1.5ml/min


波 长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.354	45408	11.489	10989	2502	1.134	--
2	3.291	349832	88.511	39321	3225	1.187	11.389
总计		395239	100.000	50310			

图20 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6041601批-pH5.5介质-15min-片2
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 29-20/29-764-2 - zzp-6041601p-rcqx-pH5.5jz-15min-P3.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx278.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260507-FX278.lcb

样品瓶号: 1-21

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/07 16:08:51

处理时间(V2): 2026/05/08 14:59:48

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流 速: 1.5ml/min


波 长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.354	44971	11.380	10920	2512	1.133	--
2	3.293	350197	88.620	39346	3229	1.191	11.406
总计		395168	100.000	50266			

图21 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6041601批-pH5.5介质-15min-片3
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 29-20/29-765-2 - zzp-6041601p-rcqx-pH5.5jz-15min-P4.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx278.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260507-FX278.lcb

样品瓶号: 1-30

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/07 16:14:14

处理时间(V2): 2026/05/08 14:59:50

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流 速: 1.5ml/min


波 长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.354	44241	11.319	10750	2507	1.136	--
2	3.294	346633	88.681	38990	3222	1.190	11.400
总计		390874	100.000	49740			

图22 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6041601批-pH5.5介质-15min-片4
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 29-20/29-766-2 - zzp-6041601p-rcqx-pH5.5jz-15min-P5.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx278.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260507-FX278.lcb

样品瓶号: 1-39

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/07 16:19:36

处理时间(V2): 2026/05/08 14:59:53

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流 速: 1.5ml/min


波 长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.356	45391	11.437	10983	2510	1.134	--
2	3.296	351505	88.563	39460	3210	1.195	11.381
总计		396897	100.000	50443			

图23 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6041601批-pH5.5介质-15min-片5
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 29-20/29-767-2 - zzp-6041601p-rcqx-pH5.5jz-15min-P6.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx278.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260507-FX278.lcb

样品瓶号: 1-48

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/07 16:24:59

处理时间(V2): 2026/05/08 14:59:55

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流 速: 1.5ml/min


波 长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.355	43845	11.419	10642	2510	1.135	--
2	3.299	340127	88.581	38167	3222	1.194	11.411
总计		383972	100.000	48810			

图24 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6041601批-pH5.5介质-15min-片6
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 29-20/29-768-2 - zzp-6041601p-rcqx-pH5.5jz-20min-P1.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx278.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260507-FX278.lcb

样品瓶号: 1-4

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/07 16:30:22

处理时间(V2): 2026/05/08 14:59:58

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流 速: 1.5ml/min


波 长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.356	50227	11.595	12209	2526	1.135	--
2	3.297	382942	88.405	42786	3193	1.209	11.375
总计		433169	100.000	54996			

图25 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6041601批-pH5.5介质-20min-片1
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 29-20/29-769-2 - zzp-6041601p-rcqx-pH5.5jz-20min-P2.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx278.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260507-FX278.lcb

样品瓶号: 1-13

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/07 16:35:46

处理时间(V2): 2026/05/08 15:00:00

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流 速: 1.5ml/min


波 长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.356	49901	11.625	12094	2512	1.137	--
2	3.298	379373	88.375	42325	3186	1.211	11.355
总计		429274	100.000	54420			

图26 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6041601批-pH5.5介质-20min-片2
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 29-20/29-770-2 - zzp-6041601p-rcqx-pH5.5jz-20min-P3.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx278.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260507-FX278.lcb

样品瓶号: 1-22

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/07 16:41:10

处理时间(V2): 2026/05/08 15:00:03

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流 速: 1.5ml/min


波 长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.357	49647	11.587	12022	2519	1.133	--
2	3.300	378838	88.413	42250	3191	1.213	11.372
总计		428486	100.000	54272			

图27 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6041601批-pH5.5介质-20min-片3
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 29-20/29-771-2 - zzp-6041601p-rcqx-pH5.5jz-20min-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260507-FX278.lcb
样品瓶号: 1-31
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/07 16:46:33
处理时间(V2): 2026/05/08 15:00:05
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.356	48535	11.486	11790	2515	1.137	--
2	3.300	374012	88.514	41642	3179	1.212	11.361
总计		422547	100.000	53432			

图28 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6041601批-pH5.5介质-20min-片4
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 29-20/29-772-2 - zzp-6041601p-rcqx-pH5.5jz-20min-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260507-FX278.lcb
样品瓶号: 1-40
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/07 16:51:56
处理时间(V2): 2026/05/08 15:00:08
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.356	49764	11.542	12082	2512	1.138	--
2	3.300	381408	88.458	42465	3181	1.215	11.360
总计		431172	100.000	54547			

图29 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6041601批-pH5.5介质-20min-片5
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 29-20/29-773-2 - zzp-6041601p-rcqx-pH5.5jz-20min-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260507-FX278.lcb
样品瓶号: 1-49
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/07 16:57:20
处理时间(V2): 2026/05/08 15:00:11
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.356	48400	11.570	11755	2510	1.131	--
2	3.302	369938	88.430	41266	3191	1.214	11.381
总计		418338	100.000	53021			

图30 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6041601批-pH5.5介质-20min-片6
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 29-20/29-774-2 - zzp-6041601p-rcqx-pH5.5jz-30min-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260507-FX278.lcb
样品瓶号: 1-5
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/07 17:02:46
处理时间(V2): 2026/05/08 15:00:14
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.356	54954	11.696	13289	2515	1.137	--
2	3.300	414893	88.304	46008	3153	1.230	11.323
总计		469847	100.000	59297			

图31 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6041601批-pH5.5介质-30min-片1
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 29-20/29-775-2 - zzp-6041601p-rcqx-pH5.5jz-30min-P2.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx278.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260507-FX278.lcb

样品瓶号: 1-14

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/07 17:08:10

处理时间(V2): 2026/05/08 15:00:16

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流 速: 1.5ml/min


波 长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.356	54946	11.714	13343	2515	1.131	--
2	3.300	414101	88.286	45871	3150	1.230	11.320
总计		469047	100.000	59214			

图32 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6041601批-pH5.5介质-30min-片2
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 29-20/29-776-2 - zzp-6041601p-rcqx-pH5.5jz-30min-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260507-FX278.lcb
样品瓶号: 1-23
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/07 17:13:33
处理时间(V2): 2026/05/08 15:00:19
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.357	54173	11.633	13075	2512	1.138	--
2	3.302	411514	88.367	45562	3147	1.231	11.312
总计		465687	100.000	58637			

图33 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6041601批-pH5.5介质-30min-片3
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 29-20/29-777-2 - zzp-6041601p-rcqx-pH5.5jz-30min-P4.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx278.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260507-FX278.lcb

样品瓶号: 1-32

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/07 17:18:56

处理时间(V2): 2026/05/08 15:00:21

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流 速: 1.5ml/min


波 长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.357	53310	11.600	12872	2514	1.134	--
2	3.303	406246	88.400	45054	3154	1.229	11.327
总计		459556	100.000	57926			

图34 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6041601批-pH5.5介质-30min-片4
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 29-20/29-778-2 - zzp-6041601p-rcqx-pH5.5jz-30min-P5.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx278.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260507-FX278.lcb

样品瓶号: 1-41

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/07 17:24:19

处理时间(V2): 2026/05/08 15:00:24

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流 速: 1.5ml/min


波 长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.357	54696	11.640	13228	2516	1.137	--
2	3.303	415201	88.360	45885	3135	1.236	11.306
总计		469896	100.000	59112			

图35 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6041601批-pH5.5介质-30min-片5
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 29-20/29-779-2 - zzp-6041601p-rcqx-pH5.5jz-30min-P6.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx278.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260507-FX278.lcb

样品瓶号: 1-50

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/07 17:29:41

处理时间(V2): 2026/05/08 15:00:26

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流 速: 1.5ml/min


波 长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.357	54075	11.742	13062	2511	1.133	--
2	3.304	406458	88.258	45083	3156	1.231	11.329
总计		460533	100.000	58145			

图36 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6041601批-pH5.5介质-30min-片6
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 29-20/29-780-2 - zzp-6041601p-rcqx-pH5.5jz-45min-P1.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx278.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260507-FX278.lcb

样品瓶号: 1-6

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/07 17:35:03

处理时间(V2): 2026/05/08 15:00:29

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流 速: 1.5ml/min


波 长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.357	58350	11.614	14124	2517	1.135	--
2	3.301	444037	88.386	48916	3125	1.247	11.286
总计		502386	100.000	63040			

图37 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6041601批-pH5.5介质-45min-片1
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$QTL-235 - 29-20/29-781-2 - zzp-6041601p-rcqx-pH5.5jz-45min-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260507-FX278.lcb
样品瓶号: 1-15
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/07 17:40:26
处理时间(V2): 2026/05/08 15:00:32
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.357	58665	11.669	14197	2520	1.135	--
2	3.302	444075	88.331	48938	3122	1.245	11.289
总计		502741	100.000	63135			

图38 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6041601批-pH5.5介质-45min-片2
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$QTL-235 - 29-20/29-782-2 - zzp-6041601p-rcqx-pH5.5jz-45min-P3.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx278.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260507-FX278.lcb

样品瓶号: 1-24

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/07 17:45:49

处理时间(V2): 2026/05/08 15:00:34

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流 速: 1.5ml/min


波 长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.358	57552	11.557	13918	2524	1.138	--
2	3.303	440412	88.443	48660	3129	1.245	11.302
总计		497963	100.000	62579			

图39 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6041601批-pH5.5介质-45min-片3
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$QTL-235 - 29-20/29-783-2 - zzp-6041601p-rcqx-pH5.5jz-45min-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260507-FX278.lcb
样品瓶号: 1-33
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/07 17:51:13
处理时间(V2): 2026/05/08 15:00:37
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.358	56663	11.526	13662	2523	1.132	--
2	3.306	434951	88.474	48086	3135	1.244	11.312
总计		491614	100.000	61747			

图40 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6041601批-pH5.5介质-45min-片4
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$QTL-235 - 29-20/29-784-2 - zzp-6041601p-rcqx-pH5.5jz-45min-P5.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx278.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260507-FX278.lcb

样品瓶号: 1-42

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/07 17:56:36

处理时间(V2): 2026/05/08 15:00:40

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流 速: 1.5ml/min


波 长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.358	58614	11.639	14160	2522	1.132	--
2	3.303	445001	88.361	49129	3123	1.249	11.291
总计		503615	100.000	63289			

图41 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6041601批-pH5.5介质-45min-片5
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 29-20/29-785-2 - zzp-6041601p-rcqx-pH5.5jz-45min-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260507-FX278.lcb
样品瓶号: 1-51
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/07 18:01:59
处理时间(V2): 2026/05/08 15:00:42
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.358	57498	11.655	13866	2521	1.133	--
2	3.306	435846	88.345	48096	3128	1.245	11.305
总计		493344	100.000	61962			

图42 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6041601批-pH5.5介质-45min-片6
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 29-20/29-786-2 - zzp-6041601p-rcqx-pH5.5jz-60min-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260507-FX278.lcb
样品瓶号: 1-7
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/07 18:07:23
处理时间(V2): 2026/05/08 15:00:45
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.358	60491	11.635	14541	2521	1.137	--
2	3.304	459425	88.365	50666	3116	1.253	11.283
总计		519916	100.000	65206			

图43 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6041601批-pH5.5介质-60min-片1
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$QTL-235 - 29-20/29-787-2 - zzp-6041601p-rcqx-pH5.5jz-60min-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260507-FX278.lcb
样品瓶号: 1-16
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/07 18:12:47
处理时间(V2): 2026/05/08 15:00:47
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.358	60707	11.616	14673	2524	1.133	--
2	3.303	461918	88.384	50842	3106	1.255	11.271
总计		522625	100.000	65515			

图44 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6041601批-pH5.5介质-60min-片2
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 29-20/29-788-2 - zzp-6041601p-rcqx-pH5.5jz-60min-P3.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx278.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260507-FX278.lcb

样品瓶号: 1-25

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/07 18:18:10

处理时间(V2): 2026/05/08 15:00:50

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流速: 1.5ml/min


波长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.357	59416	11.487	14368	2522	1.133	--
2	3.303	457842	88.513	50413	3109	1.254	11.278
总计		517259	100.000	64781			

图45 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6041601批-pH5.5介质-60min-片3
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$QTL-235 - 29-20/29-789-2 - zzp-6041601p-rcqx-pH5.5jz-60min-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260507-FX278.lcb
样品瓶号: 1-34
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/07 18:23:33
处理时间(V2): 2026/05/08 15:00:54
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.358	58622	11.518	14145	2518	1.136	--
2	3.304	450359	88.482	49609	3114	1.250	11.281
总计		508981	100.000	63753			

图46 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6041601批-pH5.5介质-60min-片4
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$QTL-235 - 29-20/29-790-2 - zzp-6041601p-rcqx-pH5.5jz-60min-P5.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx278.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260507-FX278.lcb

样品瓶号: 1-43

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/07 18:28:56

处理时间(V2): 2026/05/08 15:00:57

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流 速: 1.5ml/min


波 长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.357	60912	11.643	14755	2515	1.132	--
2	3.303	462256	88.357	50942	3114	1.255	11.283
总计		523168	100.000	65696			

图47 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6041601批-pH5.5介质-60min-片5
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 29-20/29-791-2 - zzp-6041601p-rcqx-pH5.5jz-60min-P6.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx278.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260507-FX278.lcb

样品瓶号: 1-52

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/07 18:34:18

处理时间(V2): 2026/05/08 15:00:59

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流 速: 1.5ml/min


波 长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.358	59623	11.602	14412	2527	1.137	--
2	3.305	454266	88.398	50117	3121	1.252	11.299
总计		513889	100.000	64528			

图48 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6041601批-pH5.5介质-60min-片6
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$QTL-235 - 29-20/29-792-2 - zzp-6041601p-rcqx-pH5.5jz-JX-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260507-FX278.lcb
样品瓶号: 1-8
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/07 18:39:43
处理时间(V2): 2026/05/08 15:01:02
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.358	61700	11.521	14904	2523	1.134	--
2	3.304	473839	88.479	52120	3105	1.259	11.272
总计		535539	100.000	67024			

图49 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6041601批-pH5.5介质-极限转速-片1
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 29-20/29-793-2 - zzp-6041601p-rcqx-pH5.5jz-JX-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260507-FX278.lcb
样品瓶号: 1-17
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/07 18:45:07
处理时间(V2): 2026/05/08 15:01:04
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.358	61972	11.566	14970	2518	1.135	--
2	3.304	473828	88.434	52088	3100	1.259	11.262
总计		535799	100.000	67058			

图50 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6041601批-pH5.5介质-极限转速-片2
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 29-20/29-794-2 - zzp-6041601p-rcqx-pH5.5jz-JX-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260507-FX278.lcb
样品瓶号: 1-26
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/07 18:50:30
处理时间(V2): 2026/05/08 15:01:07
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.358	60923	11.449	14724	2524	1.134	--
2	3.305	471220	88.551	51802	3098	1.259	11.265
总计		532143	100.000	66526			

图51 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6041601批-pH5.5介质-极限转速-片3
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 29-20/29-795-2 - zzp-6041601p-rcqx-pH5.5jz-JX-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260507-FX278.lcb
样品瓶号: 1-35
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/07 18:55:54
处理时间(V2): 2026/05/08 15:01:10
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.358	60057	11.494	14514	2524	1.136	--
2	3.306	462450	88.506	50943	3111	1.256	11.286
总计		522506	100.000	65457			

图52 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6041601批-pH5.5介质-极限转速-片4
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 29-20/29-796-2 - zzp-6041601p-rcqx-pH5.5jz-JX-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260507-FX278.lcb
样品瓶号: 1-44
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/07 19:01:17
处理时间(V2): 2026/05/08 15:01:12
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.358	62216	11.581	15033	2526	1.134	--
2	3.304	474995	88.419	52202	3097	1.261	11.267
总计		537210	100.000	67234			

图53 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6041601批-pH5.5介质-极限转速-片5
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 29-20/29-797-2 - zzp-6041601p-rcqx-pH5.5jz-JX-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260507-FX278.lcb
样品瓶号: 1-53
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/07 19:06:40
处理时间(V2): 2026/05/08 15:01:14
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.358	61365	11.560	14853	2531	1.135	--
2	3.306	469496	88.440	51716	3107	1.260	11.289
总计		530861	100.000	66569			

图54 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6041601批-pH5.5介质-极限转速-片6
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 29-20/29-798-2 - zzp-6041601p-rcqx-pH5.5jz-dz-2-1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260507-FX278.lcb
样品瓶号: 1-27
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/07 19:12:05
处理时间(V2): 2026/05/08 15:01:17
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.334	74527	11.837	15018	1683	1.156	--
2	3.323	555061	88.163	60126	2994	1.263	10.665
总计		629588	100.000	75144			

图55 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6041601批-pH5.5介质
对照品溶液-2-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 29-20/29-799-2 - zzp-6041601p-rcqx-pH5.5jz-dz-2-2.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx278.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260507-FX278.lcb

样品瓶号: 1-27

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/07 19:17:29

处理时间(V2): 2026/05/08 15:01:19

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流速: 1.5ml/min


波长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.334	74440	11.805	15024	1688	1.158	--
2	3.322	556124	88.195	60227	2996	1.264	10.672
总计		630564	100.000	75251			

图56 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6041601批-pH5.5介质
对照品溶液-2-2




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 29-20/29-800-2 - zzp-6042201p-rcqx-pH5.5jz-rj.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260507-FX278.lcb
样品瓶号: 2-9
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/07 19:22:55
处理时间(V2): 2026/05/08 15:01:22
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图57 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042201批-pH5.5介质
溶剂




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 29-20/29-801-2 - zzp-6042201p-rcqx-pH5.5jz-dz-1-1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260507-FX278.lcb
样品瓶号: 2-18
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/07 19:28:21
处理时间(V2): 2026/05/08 15:01:24
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.333	76653	11.731	15497	1686	1.154	--
2	3.320	576747	88.269	62342	2985	1.271	10.655
总计		653400	100.000	77839			

图58 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042201批-pH5.5介质
对照品溶液-1-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 29-20/29-802-2 - zzp-6042201p-rcqx-pH5.5jz-dz-1-2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260507-FX278.lcb
样品瓶号: 2-18
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/07 19:33:47
处理时间(V2): 2026/05/08 15:01:27
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.333	76866	11.757	15592	1697	1.156	--
2	3.320	576902	88.243	62444	2992	1.270	10.675
总计		653768	100.000	78036			

图59 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042201批-pH5.5介质
对照品溶液-1-2




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 29-20/29-803-2 - zzp-6042201p-rcqx-pH5.5jz-dz-1-3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260507-FX278.lcb
样品瓶号: 2-18
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/07 19:39:13
处理时间(V2): 2026/05/08 15:01:29
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.334	76658	11.724	15504	1689	1.155	--
2	3.321	577168	88.276	62390	2987	1.271	10.660
总计		653825	100.000	77894			

图60 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042201批-pH5.5介质
对照品溶液-1-3




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 29-20/29-804-2 - zzp-6042201p-rcqx-pH5.5jz-dz-1-4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260507-FX278.lcb
样品瓶号: 2-18
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/07 19:44:37
处理时间(V2): 2026/05/08 15:01:32
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.334	76668	11.731	15531	1699	1.156	--
2	3.322	576904	88.269	62362	2984	1.271	10.668
总计		653572	100.000	77893			

图61 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042201批-pH5.5介质
对照品溶液-1-4




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 29-20/29-805-2 - zzp-6042201p-rcqx-pH5.5jz-dz-1-5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260507-FX278.lcb
样品瓶号: 2-18
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/07 19:50:02
处理时间(V2): 2026/05/08 15:01:35
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.334	76812	11.766	15542	1691	1.153	--
2	3.321	576009	88.234	62297	2984	1.270	10.660
总计		652821	100.000	77839			

图62 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042201批-pH5.5介质
对照品溶液-1-5



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 29-20/29-806-2 - zzp-6042201p-rcqx-pH5.5jz-5min-P1.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx278.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260507-FX278.lcb

样品瓶号: 2-1

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/07 19:55:27

处理时间(V2): 2026/05/08 15:01:37

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流 速: 1.5ml/min


波 长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.357	22180	10.480	5400	2518	1.143	--
2	3.331	189450	89.520	21216	3265	1.149	11.569
总计		211630	100.000	26616			

图63 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042201批-pH5.5介质-5min-片1
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 29-20/29-807-2 - zzp-6042201p-rcqx-pH5.5jz-5min-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260507-FX278.lcb
样品瓶号: 2-10
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/07 20:00:51
处理时间(V2): 2026/05/08 15:01:40
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.357	22310	10.509	5420	2536	1.140	--
2	3.333	189987	89.491	21303	3277	1.150	11.597
总计		212298	100.000	26724			

图64 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042201批-pH5.5介质-5min-片2
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 29-20/29-808-2 - zzp-6042201p-rcqx-pH5.5jz-5min-P3.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx278.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260507-FX278.lcb

样品瓶号: 2-19

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/07 20:06:15

处理时间(V2): 2026/05/08 15:01:42

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流 速: 1.5ml/min


波 长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.357	23576	10.590	5716	2509	1.133	--
2	3.331	199054	89.410	22228	3245	1.157	11.536
总计		222630	100.000	27944			

图65 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042201批-pH5.5介质-5min-片3
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 29-20/29-809-2 - zzp-6042201p-rcqx-pH5.5jz-5min-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260507-FX278.lcb
样品瓶号: 2-28
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/07 20:11:40
处理时间(V2): 2026/05/08 15:01:45
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.357	19623	10.311	4756	2524	1.139	--
2	3.335	170680	89.689	19092	3275	1.141	11.596
总计		190303	100.000	23848			

图66 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042201批-pH5.5介质-5min-片4
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 29-20/29-810-2 - zzp-6042201p-rcqx-pH5.5jz-5min-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260507-FX278.lcb
样品瓶号: 2-37
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/07 20:17:03
处理时间(V2): 2026/05/08 15:01:47
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.357	22549	10.530	5463	2524	1.131	--
2	3.334	191602	89.470	21471	3278	1.151	11.593
总计		214151	100.000	26934			

图67 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042201批-pH5.5介质-5min-片5
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 29-20/29-811-2 - zzp-6042201p-rcqx-pH5.5jz-5min-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260507-FX278.lcb
样品瓶号: 2-46
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/07 20:22:27
处理时间(V2): 2026/05/08 15:01:50
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.358	20750	10.621	5060	2544	1.130	--
2	3.336	174613	89.379	19591	3280	1.144	11.615
总计		195363	100.000	24651			

图68 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042201批-pH5.5介质-5min-片6
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 29-20/29-812-2 - zzp-6042201p-rcqx-pH5.5jz-10min-P1.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx278.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260507-FX278.lcb

样品瓶号: 2-2

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/07 20:27:51

处理时间(V2): 2026/05/08 15:01:52

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流 速: 1.5ml/min


波 长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.357	40091	11.516	9753	2530	1.134	--
2	3.322	308048	88.484	34264	3204	1.199	11.468
总计		348140	100.000	44017			

图69 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042201批-pH5.5介质-10min-片1
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 29-20/29-813-2 - zzp-6042201p-rcqx-pH5.5jz-10min-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260507-FX278.lcb
样品瓶号: 2-11
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/07 20:33:15
处理时间(V2): 2026/05/08 15:01:55
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.357	39888	11.569	9649	2519	1.131	--
2	3.323	304902	88.431	33861	3205	1.197	11.463
总计		344790	100.000	43510			

图70 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042201批-pH5.5介质-10min-片2
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 29-20/29-814-2 - zzp-6042201p-rcqx-pH5.5jz-10min-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260507-FX278.lcb
样品瓶号: 2-20
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/07 20:38:39
处理时间(V2): 2026/05/08 15:01:57
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.358	40357	11.544	9742	2528	1.136	--
2	3.323	309250	88.456	34338	3199	1.199	11.458
总计		349606	100.000	44080			

图71 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042201批-pH5.5介质-10min-片3
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 29-20/29-815-2 - zzp-6042201p-rcqx-pH5.5jz-10min-P4.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx278.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260507-FX278.lcb

样品瓶号: 2-29

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/07 20:44:04

处理时间(V2): 2026/05/08 15:02:00

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流 速: 1.5ml/min


波 长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.358	37970	11.343	9181	2530	1.130	--
2	3.325	296774	88.657	32968	3212	1.196	11.480
总计		334744	100.000	42149			

图72 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042201批-pH5.5介质-10min-片4
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 29-20/29-816-2 - zzp-6042201p-rcqx-pH5.5jz-10min-P5.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx278.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260507-FX278.lcb

样品瓶号: 2-38

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/07 20:49:28

处理时间(V2): 2026/05/08 15:02:03

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流 速: 1.5ml/min


波 长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.359	40314	11.476	9749	2539	1.130	--
2	3.325	310989	88.524	34565	3213	1.201	11.482
总计		351304	100.000	44315			

图73 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042201批-pH5.5介质-10min-片5
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 29-20/29-817-2 - zzp-6042201p-rcqx-pH5.5jz-10min-P6.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx278.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260507-FX278.lcb

样品瓶号: 2-47

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/07 20:54:52

处理时间(V2): 2026/05/08 15:02:06

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流 速: 1.5ml/min


波 长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.358	37952	11.675	9145	2525	1.132	--
2	3.327	287134	88.325	31882	3213	1.191	11.482
总计		325087	100.000	41027			

图74 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042201批-pH5.5介质-10min-片6
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 29-20/29-818-2 - zzp-6042201p-rcqx-pH5.5jz-15min-P1.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx278.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260507-FX278.lcb

样品瓶号: 2-3

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/07 21:00:16

处理时间(V2): 2026/05/08 15:02:09

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流 速: 1.5ml/min


波 长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.358	47845	11.988	11512	2526	1.134	--
2	3.321	351257	88.012	38850	3175	1.216	11.414
总计		399101	100.000	50362			

图75 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042201批-pH5.5介质-15min-片1
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 29-20/29-819-2 - zzp-6042201p-rcqx-pH5.5jz-15min-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260507-FX278.lcb
样品瓶号: 2-12
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/07 21:05:40
处理时间(V2): 2026/05/08 15:02:11
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.359	47192	11.977	11369	2532	1.132	--
2	3.322	346831	88.023	38456	3183	1.215	11.430
总计		394023	100.000	49826			

图76 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042201批-pH5.5介质-15min-片2
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 29-20/29-820-2 - zzp-6042201p-rcqx-pH5.5jz-15min-P3.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx278.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260507-FX278.lcb

样品瓶号: 2-21

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/07 21:11:04

处理时间(V2): 2026/05/08 15:02:14

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流 速: 1.5ml/min


波 长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.358	46925	11.811	11325	2538	1.132	--
2	3.321	350389	88.189	38785	3171	1.216	11.420
总计		397314	100.000	50110			

图77 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042201批-pH5.5介质-15min-片3
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 29-20/29-821-2 - zzp-6042201p-rcqx-pH5.5jz-15min-P4.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx278.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260507-FX278.lcb

样品瓶号: 2-30

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/07 21:16:28

处理时间(V2): 2026/05/08 15:02:17

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流 速: 1.5ml/min


波 长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.358	45818	11.741	11050	2530	1.132	--
2	3.323	344428	88.259	38199	3189	1.212	11.441
总计		390246	100.000	49249			

图78 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042201批-pH5.5介质-15min-片4
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 29-20/29-822-2 - zzp-6042201p-rcqx-pH5.5jz-15min-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260507-FX278.lcb
样品瓶号: 2-39
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/07 21:21:53
处理时间(V2): 2026/05/08 15:02:20
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.359	47813	11.937	11497	2530	1.130	--
2	3.322	352720	88.063	39048	3176	1.216	11.421
总计		400533	100.000	50545			

图79 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042201批-pH5.5介质-15min-片5
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 29-20/29-823-2 - zzp-6042201p-rcqx-pH5.5jz-15min-P6.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx278.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260507-FX278.lcb

样品瓶号: 2-48

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/07 21:27:17

处理时间(V2): 2026/05/08 15:02:22

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流 速: 1.5ml/min


波 长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.359	45555	11.977	10985	2532	1.135	--
2	3.324	334815	88.023	37103	3191	1.209	11.449
总计		380370	100.000	48088			

图80 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042201批-pH5.5介质-15min-片6
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 29-20/29-824-2 - zzp-6042201p-rcqx-pH5.5jz-20min-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260507-FX278.lcb
样品瓶号: 2-4
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/07 21:32:41
处理时间(V2): 2026/05/08 15:02:25
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.358	51597	12.106	12462	2535	1.134	--
2	3.320	374614	87.894	41329	3153	1.226	11.391
总计		426211	100.000	53791			

图81 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042201批-pH5.5介质-20min-片1
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 29-20/29-825-2 - zzp-6042201p-rcqx-pH5.5jz-20min-P2.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx278.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260507-FX278.lcb

样品瓶号: 2-13

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/07 21:38:07

处理时间(V2): 2026/05/08 15:02:28

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流 速: 1.5ml/min


波 长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.359	51954	12.197	12486	2523	1.135	--
2	3.320	374013	87.803	41288	3159	1.225	11.389
总计		425967	100.000	53774			

图82 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042201批-pH5.5介质-20min-片2
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 29-20/29-826-2 - zzp-6042201p-rcqx-pH5.5jz-20min-P3.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx278.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260507-FX278.lcb

样品瓶号: 2-22

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/07 21:43:31

处理时间(V2): 2026/05/08 15:02:30

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流 速: 1.5ml/min


波 长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.359	51287	11.989	12325	2532	1.132	--
2	3.321	376481	88.011	41576	3156	1.226	11.391
总计		427768	100.000	53902			

图83 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042201批-pH5.5介质-20min-片3
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 29-20/29-827-2 - zzp-6042201p-rcqx-pH5.5jz-20min-P4.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx278.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260507-FX278.lcb

样品瓶号: 2-31

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/07 21:48:55

处理时间(V2): 2026/05/08 15:02:33

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流 速: 1.5ml/min


波 长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.358	50254	11.949	12169	2527	1.128	--
2	3.321	370323	88.051	40895	3160	1.225	11.402
总计		420577	100.000	53064			

图84 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042201批-pH5.5介质-20min-片4
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 29-20/29-828-2 - zzp-6042201p-rcqx-pH5.5jz-20min-P5.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx278.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260507-FX278.lcb

样品瓶号: 2-40

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/07 21:54:19

处理时间(V2): 2026/05/08 15:02:36

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流 速: 1.5ml/min


波 长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.358	52544	12.193	12699	2529	1.133	--
2	3.320	378385	87.807	41792	3158	1.227	11.400
总计		430929	100.000	54491			

图85 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042201批-pH5.5介质-20min-片5
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 29-20/29-829-2 - zzp-6042201p-rcqx-pH5.5jz-20min-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260507-FX278.lcb
样品瓶号: 2-49
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/07 21:59:43
处理时间(V2): 2026/05/08 15:02:39
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.358	50203	12.156	12081	2525	1.133	--
2	3.323	362780	87.844	40061	3165	1.221	11.409
总计		412983	100.000	52142			

图86 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042201批-pH5.5介质-20min-片6
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 29-20/29-830-2 - zzp-6042201p-rcqx-pH5.5jz-30min-P1.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx278.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260507-FX278.lcb

样品瓶号: 2-5

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/07 22:05:08

处理时间(V2): 2026/05/08 15:02:41

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流 速: 1.5ml/min


波 长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.359	55805	12.103	13443	2533	1.130	--
2	3.320	405290	87.897	44680	3141	1.237	11.369
总计		461095	100.000	58123			

图87 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042201批-pH5.5介质-30min-片1
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 29-20/29-831-2 - zzp-6042201p-rcqx-pH5.5jz-30min-P2.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx278.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260507-FX278.lcb

样品瓶号: 2-14

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/07 22:10:32

处理时间(V2): 2026/05/08 15:02:44

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流 速: 1.5ml/min


波 长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.359	56101	12.230	13483	2533	1.133	--
2	3.320	402609	87.770	44280	3136	1.237	11.361
总计		458710	100.000	57763			

图88 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042201批-pH5.5介质-30min-片2
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 29-20/29-832-2 - zzp-6042201p-rcqx-pH5.5jz-30min-P3.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx278.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260507-FX278.lcb

样品瓶号: 2-23

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/07 22:15:56

处理时间(V2): 2026/05/08 15:02:47

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流 速: 1.5ml/min


波 长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.358	56205	12.129	13505	2525	1.133	--
2	3.319	407179	87.871	44814	3143	1.239	11.369
总计		463384	100.000	58318			

图89 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042201批-pH5.5介质-30min-片3
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 29-20/29-833-2 - zzp-6042201p-rcqx-pH5.5jz-30min-P4.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx278.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260507-FX278.lcb

样品瓶号: 2-32

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/07 22:21:20

处理时间(V2): 2026/05/08 15:02:49

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流 速: 1.5ml/min


波 长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.358	55053	12.085	13299	2533	1.131	--
2	3.320	400499	87.915	44096	3140	1.235	11.374
总计		455552	100.000	57395			

图90 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042201批-pH5.5介质-30min-片4
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 29-20/29-834-2 - zzp-6042201p-rcqx-pH5.5jz-30min-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260507-FX278.lcb
样品瓶号: 2-41
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/07 22:26:46
处理时间(V2): 2026/05/08 15:02:52
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.358	56458	12.167	13654	2535	1.130	--
2	3.320	407568	87.833	44889	3144	1.237	11.381
总计		464026	100.000	58543			

图91 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042201批-pH5.5介质-30min-片5
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 29-20/29-835-2 - zzp-6042201p-rcqx-pH5.5jz-30min-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260507-FX278.lcb
样品瓶号: 2-50
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/07 22:32:10
处理时间(V2): 2026/05/08 15:02:55
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.358	55004	12.131	13309	2533	1.135	--
2	3.320	398399	87.869	43916	3150	1.234	11.391
总计		453403	100.000	57225			

图92 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042201批-pH5.5介质-30min-片6
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 29-20/29-836-2 - zzp-6042201p-rcqx-pH5.5jz-45min-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260507-FX278.lcb
样品瓶号: 2-6
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/07 22:37:34
处理时间(V2): 2026/05/08 15:02:57
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.358	58764	12.001	14178	2529	1.135	--
2	3.318	430895	87.999	47188	3120	1.248	11.338
总计		489659	100.000	61366			

图93 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042201批-pH5.5介质-45min-片1
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 29-20/29-837-2 - zzp-6042201p-rcqx-pH5.5jz-45min-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260507-FX278.lcb
样品瓶号: 2-15
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/07 22:42:59
处理时间(V2): 2026/05/08 15:03:00
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.358	59373	12.107	14323	2529	1.131	--
2	3.317	431030	87.893	47313	3127	1.248	11.348
总计		490403	100.000	61636			

图94 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042201批-pH5.5介质-45min-片2
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 29-20/29-838-2 - zzp-6042201p-rcqx-pH5.5jz-45min-P3.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx278.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260507-FX278.lcb

样品瓶号: 2-24

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/07 22:48:24

处理时间(V2): 2026/05/08 15:03:02

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流 速: 1.5ml/min


波 长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.358	59281	12.002	14299	2533	1.132	--
2	3.317	434668	87.998	47717	3123	1.250	11.343
总计		493950	100.000	62016			

图95 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042201批-pH5.5介质-45min-片3
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 29-20/29-839-2 - zzp-6042201p-rcqx-pH5.5jz-45min-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260507-FX278.lcb
样品瓶号: 2-33
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/07 22:53:49
处理时间(V2): 2026/05/08 15:03:05
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.359	58335	12.002	14027	2529	1.132	--
2	3.319	427696	87.998	46964	3124	1.246	11.343
总计		486031	100.000	60991			

图96 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042201批-pH5.5介质-45min-片4
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 29-20/29-840-2 - zzp-6042201p-rcqx-pH5.5jz-45min-P5.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx278.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260507-FX278.lcb

样品瓶号: 2-42

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/07 22:59:13

处理时间(V2): 2026/05/08 15:03:08

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流 速: 1.5ml/min


波 长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.358	59923	12.078	14467	2534	1.132	--
2	3.318	436195	87.922	47928	3134	1.249	11.362
总计		496118	100.000	62395			

图97 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042201批-pH5.5介质-45min-片5
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 29-20/29-841-2 - zzp-6042201p-rcqx-pH5.5jz-45min-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260507-FX278.lcb
样品瓶号: 2-51
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/07 23:04:38
处理时间(V2): 2026/05/08 15:03:10
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.358	58950	12.115	14248	2533	1.134	--
2	3.319	427628	87.885	47057	3134	1.245	11.365
总计		486579	100.000	61305			

图98 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042201批-pH5.5介质-45min-片6
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$QTL-235 - 29-20/29-842-2 - zzp-6042201p-rcqx-pH5.5jz-60min-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260507-FX278.lcb
样品瓶号: 2-7
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/07 23:10:03
处理时间(V2): 2026/05/08 15:03:13
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.358	60919	11.945	14731	2533	1.130	--
2	3.316	449074	88.055	49243	3110	1.254	11.327
总计		509993	100.000	63973			

图99 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042201批-pH5.5介质-60min-片1
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 29-20/29-843-2 - zzp-6042201p-rcqx-pH5.5jz-60min-P2.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx278.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260507-FX278.lcb

样品瓶号: 2-16

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/07 23:15:27

处理时间(V2): 2026/05/08 15:03:16

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流 速: 1.5ml/min


波 长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.359	60924	11.941	14645	2531	1.132	--
2	3.318	449279	88.059	49130	3106	1.254	11.317
总计		510203	100.000	63775			

图100 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042201批-pH5.5介质-60min-片2
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$QTL-235 - 29-20/29-844-2 - zzp-6042201p-rcqx-pH5.5jz-60min-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260507-FX278.lcb
样品瓶号: 2-25
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/07 23:20:53
处理时间(V2): 2026/05/08 15:03:18
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.358	61110	11.900	14755	2524	1.135	--
2	3.316	452405	88.100	49555	3100	1.255	11.306
总计		513515	100.000	64310			

图101 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042201批-pH5.5介质-60min-片3
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$QTL-235 - 29-20/29-845-2 - zzp-6042201p-rcqx-pH5.5jz-60min-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260507-FX278.lcb
样品瓶号: 2-34
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/07 23:26:18
处理时间(V2): 2026/05/08 15:03:21
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.358	59832	11.861	14464	2532	1.132	--
2	3.318	444621	88.139	48671	3113	1.253	11.331
总计		504453	100.000	63135			

图102 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042201批-pH5.5介质-60min-片4
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 29-20/29-846-2 - zzp-6042201p-rcqx-pH5.5jz-60min-P5.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx278.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260507-FX278.lcb

样品瓶号: 2-43

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/07 23:31:43

处理时间(V2): 2026/05/08 15:03:24

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流 速: 1.5ml/min


波 长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.358	61675	11.976	14881	2535	1.131	--
2	3.317	453298	88.024	49697	3115	1.254	11.337
总计		514973	100.000	64578			

图103 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042201批-pH5.5介质-60min-片5
供试品溶液-1



QTL-235


<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$QTL-235 - 29-20/29-847-2 - zzp-6042201p-rcqx-pH5.5jz-60min-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260507-FX278.lcb
样品瓶号: 2-52
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/07 23:37:08
处理时间(V2): 2026/05/08 15:03:26
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm

版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.358	61383	12.050	14767	2530	1.131	--
2	3.318	448038	87.950	49063	3111	1.253	11.329
总计		509420	100.000	63830			

图104 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042201批-pH5.5介质-60min-片6
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$QTL-235 - 29-20/29-848-2 - zzp-6042201p-rcqx-pH5.5jz-JX-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260507-FX278.lcb
样品瓶号: 2-8
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/07 23:42:34
处理时间(V2): 2026/05/08 15:03:29
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.359	61986	11.830	14903	2532	1.129	--
2	3.317	461978	88.170	50587	3107	1.259	11.317
总计		523964	100.000	65490			

图105 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042201批-pH5.5介质-极限转速-片1
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$QTL-235 - 29-20/29-849-2 - zzp-6042201p-rcqx-pH5.5jz-JX-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260507-FX278.lcb
样品瓶号: 2-17
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/07 23:48:00
处理时间(V2): 2026/05/08 15:03:32
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.358	62523	11.931	15074	2533	1.131	--
2	3.317	461505	88.069	50497	3098	1.258	11.310
总计		524029	100.000	65572			

图106 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042201批-pH5.5介质-极限转速-片2
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$QTL-235 - 29-20/29-850-2 - zzp-6042201p-rcqx-pH5.5jz-JX-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260507-FX278.lcb
样品瓶号: 2-26
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/07 23:53:24
处理时间(V2): 2026/05/08 15:03:34
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.359	62521	11.863	15008	2534	1.133	--
2	3.318	464495	88.137	50787	3104	1.260	11.315
总计		527016	100.000	65795			

图107 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042201批-pH5.5介质-极限转速-片3
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 29-20/29-851-2 - zzp-6042201p-rcqx-pH5.5jz-JX-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260507-FX278.lcb
样品瓶号: 2-35
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/07 23:58:50
处理时间(V2): 2026/05/08 15:03:37
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.359	61753	11.897	14819	2534	1.130	--
2	3.319	457313	88.103	50177	3115	1.255	11.333
总计		519067	100.000	64996			

图108 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042201批-pH5.5介质-极限转速-片4
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$QTL-235 - 29-20/29-852-2 - zzp-6042201p-rcqx-pH5.5jz-JX-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260507-FX278.lcb
样品瓶号: 2-44
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/08 00:04:14
处理时间(V2): 2026/05/08 15:03:39
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.358	63094	11.933	15192	2530	1.131	--
2	3.318	465623	88.067	50967	3106	1.260	11.321
总计		528717	100.000	66159			

图109 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042201批-pH5.5介质-极限转速-片5
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 29-20/29-853-2 - zzp-6042201p-rcqx-pH5.5jz-JX-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260507-FX278.lcb
样品瓶号: 2-53
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/08 00:09:39
处理时间(V2): 2026/05/08 15:03:42
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.358	62802	11.979	15161	2534	1.132	--
2	3.319	461479	88.021	50580	3114	1.256	11.338
总计		524281	100.000	65741			

图110 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042201批-pH5.5介质-极限转速-片6
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 29-20/29-854-2 - zzp-6042201p-rcqx-pH5.5jz-dz-2-1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260507-FX278.lcb
样品瓶号: 2-27
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/08 00:15:04
处理时间(V2): 2026/05/08 15:03:44
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.335	76512	11.789	15579	1711	1.148	--
2	3.333	572505	88.211	61732	2991	1.273	10.712
总计		649018	100.000	77311			

图111 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042201批-pH5.5介质
对照品溶液-2-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 29-20/29-855-2 - zzp-6042201p-rcqx-pH5.5jz-dz-2-2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260507-FX278.lcb
样品瓶号: 2-27
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/08 00:20:29
处理时间(V2): 2026/05/08 15:03:47
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.336	76367	11.770	15559	1713	1.147	--
2	3.333	572436	88.230	61659	2992	1.272	10.714
总计		648803	100.000	77218			

图112 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042201批-pH5.5介质
对照品溶液-2-2




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 29-20/29-856-2 - zzp-6042401p-rcqx-pH5.5jz-jyx1-rj.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260507-FX278.lcb
样品瓶号: 3-9
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/08 00:25:53
处理时间(V2): 2026/05/08 15:03:50
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图113 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042401批-均一性1-pH5.5介质
溶剂




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 29-20/29-857-2 - zzp-6042401p-rcqx-pH5.5jz-jyx1-dz-1-1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260507-FX278.lcb
样品瓶号: 3-18
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/08 00:31:16
处理时间(V2): 2026/05/08 15:03:52
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.337	74180	11.777	15144	1704	1.145	--
2	3.336	555671	88.223	59926	2998	1.267	10.715
总计		629851	100.000	75070			

图114 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042401批-均一性1-pH5.5介质
对照品溶液-1-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 29-20/29-858-2 - zzp-6042401p-rcqx-pH5.5jz-jyx1-dz-1-2.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx278.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260507-FX278.lcb

样品瓶号: 3-18

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/08 00:36:39

处理时间(V2): 2026/05/08 15:03:55

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流速: 1.5ml/min


波长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.337	74532	11.825	15196	1708	1.147	--
2	3.336	555781	88.175	60017	3008	1.266	10.728
总计		630313	100.000	75213			

图115 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042401批-均一性1-pH5.5介质
对照品溶液-1-2




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 29-20/29-859-2 - zzp-6042401p-rcqx-pH5.5jz-jyx1-dz-1-3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260507-FX278.lcb
样品瓶号: 3-18
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/08 00:42:02
处理时间(V2): 2026/05/08 15:03:58
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.337	74252	11.805	15157	1708	1.145	--
2	3.336	554709	88.195	59904	3011	1.266	10.731
总计		628960	100.000	75061			

图116 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042401批-均一性1-pH5.5介质
对照品溶液-1-3




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$QTL-235 - 29-20/29-860-2 - zzp-6042401p-rcqx-pH5.5jz-jyx1-dz-1-4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260507-FX278.lcb
样品瓶号: 3-18
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/08 00:47:26
处理时间(V2): 2026/05/08 15:04:01
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.337	74222	11.804	15130	1707	1.145	--
2	3.336	554582	88.196	59857	3005	1.264	10.727
总计		628803	100.000	74987			

图117 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042401批-均一性1-pH5.5介质
对照品溶液-1-4



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 29-20/29-861-2 - zzp-6042401p-rcqx-pH5.5jz-jyx1-dz-1-5.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx278.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260507-FX278.lcb

样品瓶号: 3-18

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/08 00:52:49

处理时间(V2): 2026/05/08 15:04:03

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流 速: 1.5ml/min


波 长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.337	74345	11.829	15148	1706	1.145	--
2	3.337	554171	88.171	59832	3005	1.266	10.726
总计		628516	100.000	74979			

图118 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042401批-均一性1-pH5.5介质
对照品溶液-1-5



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 29-20/29-862-2 - zzp-6042401p-rcqx-pH5.5jz-jyx1-5min-P1.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx278.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260507-FX278.lcb

样品瓶号: 3-1

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/08 00:58:11

处理时间(V2): 2026/05/08 15:04:06

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流速: 1.5ml/min


波长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.359	21710	10.410	5225	2540	1.136	--
2	3.347	186842	89.590	20888	3279	1.146	11.636
总计		208552	100.000	26113			

图119 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042401批-均一性1-pH5.5介质-5min-片1
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 29-20/29-863-2 - zzp-6042401p-rcqx-pH5.5jz-jyx1-5min-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260507-FX278.lcb
样品瓶号: 3-10
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/08 01:03:34
处理时间(V2): 2026/05/08 15:04:09
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.359	19235	10.380	4632	2531	1.125	--
2	3.349	166078	89.620	18555	3292	1.138	11.651
总计		185314	100.000	23187			

图120 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042401批-均一性1-pH5.5介质-5min-片2
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 29-20/29-864-2 - zzp-6042401p-rcqx-pH5.5jz-jyx1-5min-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260507-FX278.lcb
样品瓶号: 3-19
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/08 01:08:57
处理时间(V2): 2026/05/08 15:04:12
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.360	15269	10.142	3693	2547	1.130	--
2	3.353	135280	89.858	15168	3298	1.124	11.679
总计		150549	100.000	18861			

图121 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042401批-均一性1-pH5.5介质-5min-片3
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 29-20/29-865-2 - zzp-6042401p-rcqx-pH5.5jz-jyx1-5min-P4.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx278.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260507-FX278.lcb

样品瓶号: 3-28

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/08 01:14:21

处理时间(V2): 2026/05/08 15:04:14

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流速: 1.5ml/min


波长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.360	19911	10.359	4786	2531	1.128	--
2	3.349	172301	89.641	19274	3292	1.139	11.648
总计		192212	100.000	24060			

图122 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042401批-均一性1-pH5.5介质-5min-片4
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 29-20/29-866-2 - zzp-6042401p-rcqx-pH5.5jz-jyx1-5min-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260507-FX278.lcb
样品瓶号: 3-37
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/08 01:19:43
处理时间(V2): 2026/05/08 15:04:17
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.360	12126	10.206	2905	2535	1.127	--
2	3.357	106686	89.794	11971	3326	1.112	11.719
总计		118811	100.000	14876			

图123 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042401批-均一性1-pH5.5介质-5min-片5
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 29-20/29-867-2 - zzp-6042401p-rcqx-pH5.5jz-jyx1-5min-P6.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx278.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260507-FX278.lcb

样品瓶号: 3-46

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/08 01:25:06

处理时间(V2): 2026/05/08 15:04:19

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流速: 1.5ml/min


波长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.360	8419	10.034	2047	2567	1.130	--
2	3.362	75485	89.966	8450	3308	1.097	11.734
总计		83904	100.000	10497			

图124 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042401批-均一性1-pH5.5介质-5min-片6
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 29-20/29-868-2 - zzp-6042401p-rcqx-pH5.5jz-jyx1-10min-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260507-FX278.lcb
样品瓶号: 3-2
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/08 01:30:28
处理时间(V2): 2026/05/08 15:04:22
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.360	39102	11.360	9456	2540	1.129	--
2	3.336	305113	88.640	33770	3205	1.196	11.502
总计		344215	100.000	43226			

图125 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042401批-均一性1-pH5.5介质-10min-片1
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 29-20/29-869-2 - zzp-6042401p-rcqx-pH5.5jz-jyx1-10min-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260507-FX278.lcb
样品瓶号: 3-11
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/08 01:35:51
处理时间(V2): 2026/05/08 15:04:25
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.360	38893	11.431	9369	2537	1.134	--
2	3.337	301355	88.569	33373	3212	1.194	11.510
总计		340247	100.000	42742			

图126 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042401批-均一性1-pH5.5介质-10min-片2
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 29-20/29-870-2 - zzp-6042401p-rcqx-pH5.5jz-jyx1-10min-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260507-FX278.lcb
样品瓶号: 3-20
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/08 01:41:13
处理时间(V2): 2026/05/08 15:04:27
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.360	35051	11.121	8443	2538	1.129	--
2	3.338	280115	88.879	31044	3214	1.185	11.520
总计		315166	100.000	39487			

图127 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042401批-均一性1-pH5.5介质-10min-片3
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 29-20/29-871-2 - zzp-6042401p-rcqx-pH5.5jz-jyx1-10min-P4.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx278.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260507-FX278.lcb

样品瓶号: 3-29

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/08 01:46:37

处理时间(V2): 2026/05/08 15:04:30

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流速: 1.5ml/min


波长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.361	38350	11.428	9270	2539	1.133	--
2	3.339	297222	88.572	32979	3216	1.191	11.518
总计		335572	100.000	42249			

图128 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042401批-均一性1-pH5.5介质-10min-片4
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 29-20/29-872-2 - zzp-6042401p-rcqx-pH5.5jz-jyx1-10min-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260507-FX278.lcb
样品瓶号: 3-38
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/08 01:51:58
处理时间(V2): 2026/05/08 15:04:33
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.360	33587	11.231	8096	2534	1.127	--
2	3.341	265465	88.769	29453	3232	1.178	11.542
总计		299052	100.000	37549			

图129 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042401批-均一性1-pH5.5介质-10min-片5
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 29-20/29-873-2 - zzp-6042401p-rcqx-pH5.5jz-jyx1-10min-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260507-FX278.lcb
样品瓶号: 3-47
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/08 01:57:21
处理时间(V2): 2026/05/08 15:04:35
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.361	29873	11.010	7206	2525	1.131	--
2	3.345	241454	88.990	26831	3249	1.168	11.566
总计		271327	100.000	34037			

图130 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042401批-均一性1-pH5.5介质-10min-片6
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 29-20/29-874-2 - zzp-6042401p-rcqx-pH5.5jz-jyx1-15min-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260507-FX278.lcb
样品瓶号: 3-3
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/08 02:02:43
处理时间(V2): 2026/05/08 15:04:38
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.360	46486	11.756	11216	2534	1.130	--
2	3.334	348930	88.244	38405	3178	1.214	11.452
总计		395415	100.000	49621			

图131 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042401批-均一性1-pH5.5介质-15min-片1
供试品溶液-1



QTL-235


<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 29-20/29-875-2 - zzp-6042401p-rcqx-pH5.5jz-jyx1-15min-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260507-FX278.lcb
样品瓶号: 3-12
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/08 02:08:05
处理时间(V2): 2026/05/08 15:04:40
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm

版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.360	46764	11.841	11255	2533	1.124	--
2	3.334	348179	88.159	38344	3177	1.215	11.451
总计		394943	100.000	49599			

图132 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042401批-均一性1-pH5.5介质-15min-片2
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 29-20/29-876-2 - zzp-6042401p-rcqx-pH5.5jz-jyx1-15min-P3.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx278.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260507-FX278.lcb

样品瓶号: 3-21

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/08 02:13:28

处理时间(V2): 2026/05/08 15:04:43

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流 速: 1.5ml/min


波 长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.361	43966	11.580	10648	2545	1.127	--
2	3.335	335686	88.420	37074	3191	1.208	11.479
总计		379652	100.000	47721			

图133 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042401批-均一性1-pH5.5介质-15min-片3
供试品溶液-1



QTL-235


<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 29-20/29-877-2 - zzp-6042401p-rcqx-pH5.5jz-jyx1-15min-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260507-FX278.lcb
样品瓶号: 3-30
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/08 02:18:50
处理时间(V2): 2026/05/08 15:04:45
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm

版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.360	45717	11.728	11079	2543	1.123	--
2	3.334	344104	88.272	37892	3178	1.213	11.461
总计		389822	100.000	48970			

图134 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042401批-均一性1-pH5.5介质-15min-片4
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 29-20/29-878-2 - zzp-6042401p-rcqx-pH5.5jz-jyx1-15min-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260507-FX278.lcb
样品瓶号: 3-39
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/08 02:24:13
处理时间(V2): 2026/05/08 15:04:48
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.361	43604	11.642	10559	2539	1.126	--
2	3.336	330946	88.358	36578	3196	1.208	11.484
总计		374550	100.000	47137			

图135 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042401批-均一性1-pH5.5介质-15min-片5
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 29-20/29-879-2 - zzp-6042401p-rcqx-pH5.5jz-jyx1-15min-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260507-FX278.lcb
样品瓶号: 3-48
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/08 02:29:36
处理时间(V2): 2026/05/08 15:04:51
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.361	41518	11.594	9991	2525	1.127	--
2	3.337	316574	88.406	35028	3197	1.199	11.480
总计		358092	100.000	45020			

图136 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042401批-均一性1-pH5.5介质-15min-片6
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 29-20/29-880-2 - zzp-6042401p-rcqx-pH5.5jz-jyx1-20min-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260507-FX278.lcb
样品瓶号: 3-4
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/08 02:34:58
处理时间(V2): 2026/05/08 15:04:53
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.360	50457	11.863	12174	2537	1.126	--
2	3.332	374862	88.137	41280	3162	1.225	11.432
总计		425319	100.000	53453			

图137 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042401批-均一性1-pH5.5介质-20min-片1
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 29-20/29-881-2 - zzp-6042401p-rcqx-pH5.5jz-jyx1-20min-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260507-FX278.lcb
样品瓶号: 3-13
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/08 02:40:20
处理时间(V2): 2026/05/08 15:04:56
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.360	50346	11.858	12149	2537	1.127	--
2	3.332	374211	88.142	41152	3162	1.225	11.433
总计		424557	100.000	53302			

图138 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042401批-均一性1-pH5.5介质-20min-片2
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 29-20/29-882-2 - zzp-6042401p-rcqx-pH5.5jz-jyx1-20min-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260507-FX278.lcb
样品瓶号: 3-22
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/08 02:45:43
处理时间(V2): 2026/05/08 15:04:59
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.360	48738	11.802	11718	2534	1.130	--
2	3.334	364232	88.198	40045	3167	1.220	11.444
总计		412971	100.000	51763			

图139 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042401批-均一性1-pH5.5介质-20min-片3
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 29-20/29-883-2 - zzp-6042401p-rcqx-pH5.5jz-jyx1-20min-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260507-FX278.lcb
样品瓶号: 3-31
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/08 02:51:07
处理时间(V2): 2026/05/08 15:05:02
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.360	50006	11.878	12069	2543	1.127	--
2	3.333	370982	88.122	40779	3164	1.224	11.441
总计		420989	100.000	52848			

图140 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042401批-均一性1-pH5.5介质-20min-片4
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 29-20/29-884-2 - zzp-6042401p-rcqx-pH5.5jz-jyx1-20min-P5.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx278.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260507-FX278.lcb

样品瓶号: 3-40

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/08 02:56:28

处理时间(V2): 2026/05/08 15:05:04

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流 速: 1.5ml/min


波 长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.360	48999	11.883	11779	2533	1.133	--
2	3.334	363333	88.117	39951	3165	1.220	11.437
总计		412332	100.000	51730			

图141 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042401批-均一性1-pH5.5介质-20min-片5
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 29-20/29-885-2 - zzp-6042401p-rcqx-pH5.5jz-jyx1-20min-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260507-FX278.lcb
样品瓶号: 3-49
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/08 03:01:51
处理时间(V2): 2026/05/08 15:05:07
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.361	47360	11.743	11475	2541	1.129	--
2	3.335	355949	88.257	39177	3170	1.218	11.449
总计		403308	100.000	50652			

图142 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042401批-均一性1-pH5.5介质-20min-片6
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 29-20/29-886-2 - zzp-6042401p-rcqx-pH5.5jz-jyx1-30min-P1.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx278.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260507-FX278.lcb

样品瓶号: 3-5

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/08 03:07:13

处理时间(V2): 2026/05/08 15:05:09

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流 速: 1.5ml/min


波 长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.361	55270	12.003	13356	2535	1.127	--
2	3.331	405207	87.997	44542	3147	1.234	11.401
总计		460477	100.000	57898			

图143 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042401批-均一性1-pH5.5介质-30min-片1
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 29-20/29-887-2 - zzp-6042401p-rcqx-pH5.5jz-jyx1-30min-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260507-FX278.lcb
样品瓶号: 3-14
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/08 03:12:35
处理时间(V2): 2026/05/08 15:05:12
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.361	54825	11.916	13288	2537	1.127	--
2	3.331	405286	88.084	44469	3138	1.237	11.391
总计		460111	100.000	57757			

图144 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042401批-均一性1-pH5.5介质-30min-片2
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 29-20/29-888-2 - zzp-6042401p-rcqx-pH5.5jz-jyx1-30min-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260507-FX278.lcb
样品瓶号: 3-23
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/08 03:17:56
处理时间(V2): 2026/05/08 15:05:14
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.360	53692	11.866	12967	2541	1.128	--
2	3.331	398777	88.134	43942	3160	1.233	11.426
总计		452469	100.000	56909			

图145 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042401批-均一性1-pH5.5介质-30min-片3
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 29-20/29-889-2 - zzp-6042401p-rcqx-pH5.5jz-jyx1-30min-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260507-FX278.lcb
样品瓶号: 3-32
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/08 03:23:18
处理时间(V2): 2026/05/08 15:05:17
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.360	54861	11.959	13254	2539	1.130	--
2	3.330	403892	88.041	44394	3145	1.235	11.402
总计		458753	100.000	57648			

图146 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042401批-均一性1-pH5.5介质-30min-片4
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 29-20/29-890-2 - zzp-6042401p-rcqx-pH5.5jz-jyx1-30min-P5.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx278.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260507-FX278.lcb

样品瓶号: 3-41

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/08 03:28:40

处理时间(V2): 2026/05/08 15:05:20

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流速: 1.5ml/min


波长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.360	54249	11.933	13103	2538	1.127	--
2	3.332	400359	88.067	44027	3149	1.232	11.412
总计		454608	100.000	57130			

图147 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042401批-均一性1-pH5.5介质-30min-片5
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 29-20/29-891-2 - zzp-6042401p-rcqx-pH5.5jz-jyx1-30min-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260507-FX278.lcb
样品瓶号: 3-50
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/08 03:34:03
处理时间(V2): 2026/05/08 15:05:22
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.360	53586	11.888	12900	2536	1.131	--
2	3.331	397177	88.112	43631	3147	1.232	11.411
总计		450764	100.000	56531			

图148 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042401批-均一性1-pH5.5介质-30min-片6
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 29-20/29-892-2 - zzp-6042401p-rcqx-pH5.5jz-jyx1-45min-P1.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx278.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260507-FX278.lcb

样品瓶号: 3-6

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/08 03:39:26

处理时间(V2): 2026/05/08 15:05:25

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流 速: 1.5ml/min


波 长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.361	58508	11.906	14148	2543	1.130	--
2	3.329	432905	88.094	47429	3122	1.246	11.370
总计		491412	100.000	61577			

图149 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042401批-均一性1-pH5.5介质-45min-片1
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 29-20/29-893-2 - zzp-6042401p-rcqx-pH5.5jz-jyx1-45min-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260507-FX278.lcb
样品瓶号: 3-15
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/08 03:44:48
处理时间(V2): 2026/05/08 15:05:28
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.360	58421	11.893	14103	2540	1.130	--
2	3.329	432786	88.107	47420	3123	1.246	11.370
总计		491207	100.000	61524			

图150 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042401批-均一性1-pH5.5介质-45min-片2
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 29-20/29-894-2 - zzp-6042401p-rcqx-pH5.5jz-jyx1-45min-P3.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx278.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260507-FX278.lcb

样品瓶号: 3-24

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/08 03:50:10

处理时间(V2): 2026/05/08 15:05:30

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流 速: 1.5ml/min


波 长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.361	57183	11.800	13834	2539	1.127	--
2	3.330	427435	88.200	46854	3122	1.244	11.368
总计		484618	100.000	60688			

图151 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042401批-均一性1-pH5.5介质-45min-片3
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 29-20/29-895-2 - zzp-6042401p-rcqx-pH5.5jz-jyx1-45min-P4.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx278.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260507-FX278.lcb

样品瓶号: 3-33

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/08 03:55:31

处理时间(V2): 2026/05/08 15:05:33

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流 速: 1.5ml/min


波 长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.361	57897	11.850	14021	2542	1.127	--
2	3.330	430692	88.150	47252	3130	1.246	11.385
总计		488590	100.000	61273			

图152 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042401批-均一性1-pH5.5介质-45min-片4
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 29-20/29-896-2 - zzp-6042401p-rcqx-pH5.5jz-jyx1-45min-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260507-FX278.lcb
样品瓶号: 3-42
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/08 04:00:53
处理时间(V2): 2026/05/08 15:05:36
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.360	58019	11.877	13999	2538	1.127	--
2	3.329	430466	88.123	47113	3117	1.245	11.368
总计		488485	100.000	61113			

图153 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042401批-均一性1-pH5.5介质-45min-片5
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 29-20/29-897-2 - zzp-6042401p-rcqx-pH5.5jz-jyx1-45min-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260507-FX278.lcb
样品瓶号: 3-51
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/08 04:06:15
处理时间(V2): 2026/05/08 15:05:38
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.361	57609	11.863	13932	2539	1.128	--
2	3.330	428026	88.137	46966	3132	1.244	11.385
总计		485635	100.000	60898			

图154 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042401批-均一性1-pH5.5介质-45min-片6
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 29-20/29-898-2 - zzp-6042401p-rcqx-pH5.5jz-jyx1-60min-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260507-FX278.lcb
样品瓶号: 3-7
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/08 04:11:37
处理时间(V2): 2026/05/08 15:05:41
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.361	60075	11.801	14563	2542	1.127	--
2	3.329	449012	88.199	49161	3115	1.251	11.357
总计		509087	100.000	63724			

图155 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042401批-均一性1-pH5.5介质-60min-片1
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 29-20/29-899-2 - zzp-6042401p-rcqx-pH5.5jz-jyx1-60min-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260507-FX278.lcb
样品瓶号: 3-16
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/08 04:16:59
处理时间(V2): 2026/05/08 15:05:44
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.361	59928	11.759	14532	2545	1.129	--
2	3.329	449722	88.241	49235	3118	1.252	11.364
总计		509651	100.000	63767			

图156 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042401批-均一性1-pH5.5介质-60min-片2
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 29-20/29-900-2 - zzp-6042401p-rcqx-pH5.5jz-jyx1-60min-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260507-FX278.lcb
样品瓶号: 3-25
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/08 04:22:22
处理时间(V2): 2026/05/08 15:05:46
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.361	59298	11.767	14306	2538	1.130	--
2	3.329	444629	88.233	48651	3112	1.251	11.355
总计		503927	100.000	62958			

图157 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042401批-均一性1-pH5.5介质-60min-片3
供试品溶液-1



QTL-235


<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$QTL-235 - 29-20/29-901-2 - zzp-6042401p-rcqx-pH5.5jz-jyx1-60min-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260507-FX278.lcb
样品瓶号: 3-34
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/08 04:27:44
处理时间(V2): 2026/05/08 15:05:49
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm

版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.360	60047	11.828	14526	2540	1.127	--
2	3.329	447627	88.172	49007	3119	1.251	11.369
总计		507673	100.000	63532			

图158 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042401批-均一性1-pH5.5介质-60min-片4
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 29-20/29-902-2 - zzp-6042401p-rcqx-pH5.5jz-jyx1-60min-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260507-FX278.lcb
样品瓶号: 3-43
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/08 04:33:06
处理时间(V2): 2026/05/08 15:05:51
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.360	60153	11.820	14487	2539	1.127	--
2	3.328	448755	88.180	49086	3114	1.253	11.362
总计		508907	100.000	63573			

图159 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042401批-均一性1-pH5.5介质-60min-片5
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$QTL-235 - 29-20/29-903-2 - zzp-6042401p-rcqx-pH5.5jz-jyx1-60min-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260507-FX278.lcb
样品瓶号: 3-52
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/08 04:38:28
处理时间(V2): 2026/05/08 15:05:54
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.360	59345	11.739	14290	2535	1.127	--
2	3.328	446205	88.261	48771	3110	1.251	11.356
总计		505550	100.000	63061			

图160 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042401批-均一性1-pH5.5介质-60min-片6
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$QTL-235 - 29-20/29-904-2 - zzp-6042401p-rcqx-pH5.5jz-jyx1-JX-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260507-FX278.lcb
样品瓶号: 3-8
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/08 04:43:52
处理时间(V2): 2026/05/08 15:05:57
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.360	62045	11.810	14910	2537	1.131	--
2	3.328	463292	88.190	50572	3103	1.257	11.345
总计		525337	100.000	65482			

图161 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042401批-均一性1-pH5.5介质-极限转速-片1
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 29-20/29-905-2 - zzp-6042401p-rcqx-pH5.5jz-jyx1-JX-P2.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx278.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260507-FX278.lcb

样品瓶号: 3-17

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/08 04:49:15

处理时间(V2): 2026/05/08 15:06:00

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流速: 1.5ml/min


波长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.360	61855	11.756	14916	2534	1.129	--
2	3.327	464302	88.244	50611	3096	1.258	11.328
总计		526157	100.000	65527			

图162 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042401批-均一性1-pH5.5介质-极限转速-片2
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 29-20/29-906-2 - zzp-6042401p-rcqx-pH5.5jz-jyx1-JX-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260507-FX278.lcb
样品瓶号: 3-26
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/08 04:54:38
处理时间(V2): 2026/05/08 15:06:03
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.360	60705	11.680	14622	2540	1.126	--
2	3.327	459022	88.320	50172	3108	1.256	11.353
总计		519726	100.000	64795			

图163 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042401批-均一性1-pH5.5介质-极限转速-片3
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 29-20/29-907-2 - zzp-6042401p-rcqx-pH5.5jz-jyx1-JX-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260507-FX278.lcb
样品瓶号: 3-35
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/08 05:00:01
处理时间(V2): 2026/05/08 15:06:05
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.360	61099	11.703	14749	2540	1.128	--
2	3.328	460984	88.297	50298	3102	1.257	11.345
总计		522083	100.000	65046			

图164 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042401批-均一性1-pH5.5介质-极限转速-片4
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 29-20/29-908-2 - zzp-6042401p-rcqx-pH5.5jz-jyx1-JX-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260507-FX278.lcb
样品瓶号: 3-44
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/08 05:05:24
处理时间(V2): 2026/05/08 15:06:08
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.361	61741	11.759	14926	2537	1.128	--
2	3.329	463298	88.241	50569	3100	1.258	11.335
总计		525039	100.000	65496			

图165 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042401批-均一性1-pH5.5介质-极限转速-片5
供试品溶液-1



QTL-235


<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$QTL-235 - 29-20/29-909-2 - zzp-6042401p-rcqx-pH5.5jz-jyx1-JX-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260507-FX278.lcb
样品瓶号: 3-53
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/08 05:10:46
处理时间(V2): 2026/05/08 15:06:11
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm

版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.361	61457	11.706	14872	2540	1.130	--
2	3.330	463525	88.294	50621	3107	1.258	11.345
总计		524982	100.000	65493			

图166 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042401批-均一性1-pH5.5介质-极限转速-片6
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 29-20/29-910-2 - zzp-6042401p-rcqx-pH5.5jz-jyx1-dz-2-1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260507-FX278.lcb
样品瓶号: 3-27
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/08 05:16:10
处理时间(V2): 2026/05/08 15:06:13
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.338	74246	11.815	15116	1693	1.148	--
2	3.344	554151	88.185	59509	2986	1.268	10.705
总计		628398	100.000	74625			

图167 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042401批-均一性1-pH5.5介质
对照品溶液-2-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 29-20/29-911-2 - zzp-6042401p-rcqx-pH5.5jz-jyx1-dz-2-2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260507-FX278.lcb
样品瓶号: 3-27
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/08 05:21:34
处理时间(V2): 2026/05/08 15:06:16
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.337	74328	11.812	15101	1697	1.147	--
2	3.344	554912	88.188	59518	2984	1.268	10.710
总计		629240	100.000	74618			

图168 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042401批-均一性1-pH5.5介质
对照品溶液-2-2




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 29-20/29-912-2 - zzp-6042401p-rcqx-pH5.5jz-jyx2-rj.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260507-FX278.lcb
样品瓶号: 4-9
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/08 05:26:58
处理时间(V2): 2026/05/08 15:06:19
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图169 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042401批-均一性2-pH5.5介质
溶剂




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 29-20/29-913-2 - zzp-6042401p-rcqx-pH5.5jz-jyx2-dz-1-1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260507-FX278.lcb
样品瓶号: 4-18
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/08 05:32:24
处理时间(V2): 2026/05/08 15:06:21
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.338	78193	11.584	16106	1747	1.150	--
2	3.342	596822	88.416	64121	2989	1.281	10.756
总计		675014	100.000	80227			

图170 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042401批-均一性2-pH5.5介质
对照品溶液-1-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 29-20/29-914-2 - zzp-6042401p-rcqx-pH5.5jz-jyx2-dz-1-2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260507-FX278.lcb
样品瓶号: 4-18
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/08 05:37:49
处理时间(V2): 2026/05/08 15:06:24
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.338	78192	11.564	16114	1742	1.150	--
2	3.341	597961	88.436	64245	2985	1.282	10.747
总计		676153	100.000	80359			

图171 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042401批-均一性2-pH5.5介质
对照品溶液-1-2




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 29-20/29-915-2 - zzp-6042401p-rcqx-pH5.5jz-jyx2-dz-1-3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260507-FX278.lcb
样品瓶号: 4-18
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/08 05:43:13
处理时间(V2): 2026/05/08 15:06:27
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.338	78214	11.556	16154	1748	1.152	--
2	3.341	598605	88.444	64295	2989	1.282	10.759
总计		676820	100.000	80449			

图172 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042401批-均一性2-pH5.5介质
对照品溶液-1-3




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 29-20/29-916-2 - zzp-6042401p-rcqx-pH5.5jz-jyx2-dz-1-4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260507-FX278.lcb
样品瓶号: 4-18
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/08 05:48:38
处理时间(V2): 2026/05/08 15:06:29
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.338	78539	11.591	16201	1746	1.144	--
2	3.341	599033	88.409	64329	2989	1.282	10.756
总计		677572	100.000	80530			

图173 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042401批-均一性2-pH5.5介质
对照品溶液-1-4




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5µm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 29-20/29-917-2 - zzp-6042401p-rcqx-pH5.5jz-jyx2-dz-1-5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260507-FX278.lcb
样品瓶号: 4-18
进样体积: 20 µl
进样时间: 2026/05/08 05:54:05
处理时间(V2): 2026/05/08 15:06:32
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.338	78608	11.605	16186	1742	1.146	--
2	3.342	598730	88.395	64223	2982	1.282	10.743
总计		677338	100.000	80409			

图174 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042401批-均一性2-pH5.5介质
对照品溶液-1-5




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 29-20/29-918-2 - zzp-6042401p-rcqx-pH5.5jz-jyx2-5min-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260507-FX278.lcb
样品瓶号: 4-1
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/08 05:59:28
处理时间(V2): 2026/05/08 15:06:34
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.360	14380	10.131	3503	2552	1.117	--
2	3.363	127562	89.869	14270	3312	1.117	11.730
总计		141942	100.000	17773			

图175 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042401批-均一性2-pH5.5介质-5min-片1
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 29-20/29-919-2 - zzp-6042401p-rcqx-pH5.5jz-jyx2-5min-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260507-FX278.lcb
样品瓶号: 4-10
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/08 06:04:53
处理时间(V2): 2026/05/08 15:06:37
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.360	14954	10.173	3602	2530	1.129	--
2	3.362	132038	89.827	14750	3316	1.116	11.718
总计		146992	100.000	18352			

图176 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042401批-均一性2-pH5.5介质-5min-片2
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 29-20/29-920-2 - zzp-6042401p-rcqx-pH5.5jz-jyx2-5min-P3.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx278.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260507-FX278.lcb

样品瓶号: 4-19

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/08 06:10:17

处理时间(V2): 2026/05/08 15:06:40

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流速: 1.5ml/min


波长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.360	18435	10.188	4462	2553	1.127	--
2	3.358	162516	89.812	18119	3289	1.135	11.687
总计		180951	100.000	22581			

图177 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042401批-均一性2-pH5.5介质-5min-片3
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 29-20/29-921-2 - zzp-6042401p-rcqx-pH5.5jz-jyx2-5min-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260507-FX278.lcb
样品瓶号: 4-28
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/08 06:15:40
处理时间(V2): 2026/05/08 15:06:42
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.360	7806	9.855	1890	2554	1.138	--
2	3.371	71408	90.145	8042	3341	1.091	11.795
总计		79215	100.000	9932			

图178 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042401批-均一性2-pH5.5介质-5min-片4
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 29-20/29-922-2 - zzp-6042401p-rcqx-pH5.5jz-jyx2-5min-P5.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx278.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260507-FX278.lcb

样品瓶号: 4-37

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/08 06:21:03

处理时间(V2): 2026/05/08 15:06:45

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流 速: 1.5ml/min


波 长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.360	9286	10.113	2257	2566	1.130	--
2	3.370	82538	89.887	9223	3317	1.093	11.771
总计		91824	100.000	11480			

图179 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042401批-均一性2-pH5.5介质-5min-片5
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 29-20/29-923-2 - zzp-6042401p-rcqx-pH5.5jz-jyx2-5min-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260507-FX278.lcb
样品瓶号: 4-46
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/08 06:26:25
处理时间(V2): 2026/05/08 15:06:48
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.360	19360	10.329	4670	2531	1.131	--
2	3.358	168068	89.671	18723	3277	1.137	11.656
总计		187428	100.000	23394			

图180 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042401批-均一性2-pH5.5介质-5min-片6
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 29-20/29-924-2 - zzp-6042401p-rcqx-pH5.5jz-jyx2-10min-P1.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx278.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260507-FX278.lcb

样品瓶号: 4-2

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/08 06:31:49

处理时间(V2): 2026/05/08 15:06:51

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流速: 1.5ml/min


波长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.360	36019	11.296	8684	2540	1.131	--
2	3.346	282859	88.704	31337	3231	1.185	11.567
总计		318878	100.000	40021			

图181 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042401批-均一性2-pH5.5介质-10min-片1
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 29-20/29-925-2 - zzp-6042401p-rcqx-pH5.5jz-jyx2-10min-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260507-FX278.lcb
样品瓶号: 4-11
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/08 06:37:13
处理时间(V2): 2026/05/08 15:06:53
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.360	36453	11.254	8819	2537	1.125	--
2	3.346	287459	88.746	31843	3222	1.190	11.549
总计		323912	100.000	40663			

图182 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042401批-均一性2-pH5.5介质-10min-片2
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 29-20/29-926-2 - zzp-6042401p-rcqx-pH5.5jz-jyx2-10min-P3.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx278.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260507-FX278.lcb

样品瓶号: 4-20

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/08 06:42:35

处理时间(V2): 2026/05/08 15:06:56

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流 速: 1.5ml/min


波 长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.360	38443	11.370	9270	2537	1.124	--
2	3.344	299665	88.630	33158	3221	1.194	11.547
总计		338108	100.000	42429			

图183 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042401批-均一性2-pH5.5介质-10min-片3
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 29-20/29-927-2 - zzp-6042401p-rcqx-pH5.5jz-jyx2-10min-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260507-FX278.lcb
样品瓶号: 4-29
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/08 06:47:59
处理时间(V2): 2026/05/08 15:06:59
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.360	28003	10.830	6729	2539	1.123	--
2	3.352	230560	89.170	25568	3254	1.164	11.611
总计		258563	100.000	32297			

图184 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042401批-均一性2-pH5.5介质-10min-片4
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 29-20/29-928-2 - zzp-6042401p-rcqx-pH5.5jz-jyx2-10min-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260507-FX278.lcb
样品瓶号: 4-38
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/08 06:53:23
处理时间(V2): 2026/05/08 15:07:01
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.361	31628	11.207	7653	2530	1.128	--
2	3.350	250594	88.793	27734	3243	1.176	11.578
总计		282221	100.000	35386			

图185 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042401批-均一性2-pH5.5介质-10min-片5
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 29-20/29-929-2 - zzp-6042401p-rcqx-pH5.5jz-jyx2-10min-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260507-FX278.lcb
样品瓶号: 4-47
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/08 06:58:48
处理时间(V2): 2026/05/08 15:07:04
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.361	38793	11.457	9392	2538	1.130	--
2	3.345	299813	88.543	33089	3207	1.195	11.524
总计		338606	100.000	42481			

图186 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042401批-均一性2-pH5.5介质-10min-片6
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 29-20/29-930-2 - zzp-6042401p-rcqx-pH5.5jz-jyx2-15min-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260507-FX278.lcb
样品瓶号: 4-3
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/08 07:04:12
处理时间(V2): 2026/05/08 15:07:06
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.361	44794	11.780	10843	2549	1.127	--
2	3.342	335464	88.220	37020	3200	1.209	11.513
总计		380259	100.000	47862			

图187 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042401批-均一性2-pH5.5介质-15min-片1
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 29-20/29-931-2 - zzp-6042401p-rcqx-pH5.5jz-jyx2-15min-P2.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx278.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260507-FX278.lcb

样品瓶号: 4-12

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/08 07:09:35

处理时间(V2): 2026/05/08 15:07:09

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流 速: 1.5ml/min


波 长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.361	45620	11.732	11057	2537	1.125	--
2	3.341	343224	88.268	37797	3174	1.212	11.470
总计		388844	100.000	48854			

图188 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042401批-均一性2-pH5.5介质-15min-片2
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 29-20/29-932-2 - zzp-6042401p-rcqx-pH5.5jz-jyx2-15min-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260507-FX278.lcb
样品瓶号: 4-21
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/08 07:14:59
处理时间(V2): 2026/05/08 15:07:11
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.360	46229	11.764	11165	2539	1.123	--
2	3.341	346741	88.236	38190	3177	1.213	11.478
总计		392970	100.000	49355			

图189 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042401批-均一性2-pH5.5介质-15min-片3
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 29-20/29-933-2 - zzp-6042401p-rcqx-pH5.5jz-jyx2-15min-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260507-FX278.lcb
样品瓶号: 4-30
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/08 07:20:23
处理时间(V2): 2026/05/08 15:07:14
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.360	39572	11.315	9566	2541	1.128	--
2	3.344	310146	88.685	34294	3209	1.198	11.533
总计		349718	100.000	43860			

图190 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042401批-均一性2-pH5.5介质-15min-片4
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 29-20/29-934-2 - zzp-6042401p-rcqx-pH5.5jz-jyx2-15min-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260507-FX278.lcb
样品瓶号: 4-39
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/08 07:25:47
处理时间(V2): 2026/05/08 15:07:17
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.360	42049	11.723	10153	2541	1.127	--
2	3.344	316648	88.277	34960	3203	1.201	11.526
总计		358697	100.000	45113			

图191 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042401批-均一性2-pH5.5介质-15min-片5
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 29-20/29-935-2 - zzp-6042401p-rcqx-pH5.5jz-jyx2-15min-P6.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx278.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260507-FX278.lcb

样品瓶号: 4-48

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/08 07:31:10

处理时间(V2): 2026/05/08 15:07:19

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流 速: 1.5ml/min


波 长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.360	46758	11.916	11284	2539	1.132	--
2	3.341	345638	88.084	38129	3192	1.214	11.499
总计		392396	100.000	49413			

图192 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042401批-均一性2-pH5.5介质-15min-片6
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 29-20/29-936-2 - zzp-6042401p-rcqx-pH5.5jz-jyx2-20min-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260507-FX278.lcb
样品瓶号: 4-4
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/08 07:36:34
处理时间(V2): 2026/05/08 15:07:22
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.361	49830	11.996	12063	2546	1.128	--
2	3.341	365564	88.004	40271	3184	1.220	11.486
总计		415394	100.000	52334			

图193 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042401批-均一性2-pH5.5介质-20min-片1
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 29-20/29-937-2 - zzp-6042401p-rcqx-pH5.5jz-jyx2-20min-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260507-FX278.lcb
样品瓶号: 4-13
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/08 07:41:57
处理时间(V2): 2026/05/08 15:07:25
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.361	50357	11.938	12194	2545	1.128	--
2	3.340	371476	88.062	40922	3171	1.223	11.467
总计		421834	100.000	53116			

图194 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042401批-均一性2-pH5.5介质-20min-片2
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 29-20/29-938-2 - zzp-6042401p-rcqx-pH5.5jz-jyx2-20min-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260507-FX278.lcb
样品瓶号: 4-22
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/08 07:47:22
处理时间(V2): 2026/05/08 15:07:28
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.361	50601	11.951	12242	2539	1.127	--
2	3.340	372785	88.049	40935	3164	1.225	11.454
总计		423386	100.000	53177			

图195 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042401批-均一性2-pH5.5介质-20min-片3
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 29-20/29-939-2 - zzp-6042401p-rcqx-pH5.5jz-jyx2-20min-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260507-FX278.lcb
样品瓶号: 4-31
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/08 07:52:46
处理时间(V2): 2026/05/08 15:07:30
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.360	45951	11.539	11107	2539	1.127	--
2	3.342	352267	88.461	38769	3186	1.218	11.493
总计		398218	100.000	49876			

图196 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042401批-均一性2-pH5.5介质-20min-片4
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 29-20/29-940-2 - zzp-6042401p-rcqx-pH5.5jz-jyx2-20min-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260507-FX278.lcb
样品瓶号: 4-40
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/08 07:58:10
处理时间(V2): 2026/05/08 15:07:33
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.361	47980	11.871	11666	2547	1.129	--
2	3.342	356181	88.129	39143	3181	1.219	11.486
总计		404161	100.000	50810			

图197 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042401批-均一性2-pH5.5介质-20min-片5
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 29-20/29-941-2 - zzp-6042401p-rcqx-pH5.5jz-jyx2-20min-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260507-FX278.lcb
样品瓶号: 4-49
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/08 08:03:34
处理时间(V2): 2026/05/08 15:07:36
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.361	50826	11.998	12326	2541	1.129	--
2	3.340	372794	88.002	40959	3165	1.223	11.454
总计		423620	100.000	53285			

图198 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042401批-均一性2-pH5.5介质-20min-片6
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 29-20/29-942-2 - zzp-6042401p-rcqx-pH5.5jz-jyx2-30min-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260507-FX278.lcb
样品瓶号: 4-5
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/08 08:08:58
处理时间(V2): 2026/05/08 15:07:38
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.361	54678	12.013	13248	2542	1.129	--
2	3.338	400459	87.987	43926	3147	1.235	11.427
总计		455136	100.000	57175			

图199 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042401批-均一性2-pH5.5介质-30min-片1
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 29-20/29-943-2 - zzp-6042401p-rcqx-pH5.5jz-jyx2-30min-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260507-FX278.lcb
样品瓶号: 4-14
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/08 08:14:22
处理时间(V2): 2026/05/08 15:07:41
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.360	55223	12.000	13352	2543	1.129	--
2	3.337	404983	88.000	44441	3150	1.236	11.436
总计		460206	100.000	57793			

图200 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042401批-均一性2-pH5.5介质-30min-片2
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 29-20/29-944-2 - zzp-6042401p-rcqx-pH5.5jz-jyx2-30min-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260507-FX278.lcb
样品瓶号: 4-23
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/08 08:19:46
处理时间(V2): 2026/05/08 15:07:44
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.360	55253	12.043	13345	2538	1.129	--
2	3.337	403538	87.957	44243	3140	1.237	11.421
总计		458791	100.000	57588			

图201 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042401批-均一性2-pH5.5介质-30min-片3
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 29-20/29-945-2 - zzp-6042401p-rcqx-pH5.5jz-jyx2-30min-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260507-FX278.lcb
样品瓶号: 4-32
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/08 08:25:10
处理时间(V2): 2026/05/08 15:07:47
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.360	52420	11.720	12681	2546	1.126	--
2	3.338	394839	88.280	43392	3158	1.233	11.451
总计		447259	100.000	56072			

图202 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042401批-均一性2-pH5.5介质-30min-片4
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 29-20/29-946-2 - zzp-6042401p-rcqx-pH5.5jz-jyx2-30min-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260507-FX278.lcb
样品瓶号: 4-41
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/08 08:30:34
处理时间(V2): 2026/05/08 15:07:49
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.361	55072	12.107	13329	2539	1.125	--
2	3.339	399818	87.893	43916	3150	1.235	11.432
总计		454890	100.000	57245			

图203 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042401批-均一性2-pH5.5介质-30min-片5
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 29-20/29-947-2 - zzp-6042401p-rcqx-pH5.5jz-jyx2-30min-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260507-FX278.lcb
样品瓶号: 4-50
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/08 08:35:58
处理时间(V2): 2026/05/08 15:07:52
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.361	55718	12.103	13488	2544	1.128	--
2	3.338	404630	87.897	44326	3134	1.237	11.414
总计		460348	100.000	57814			

图204 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042401批-均一性2-pH5.5介质-30min-片6
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 29-20/29-948-2 - zzp-6042401p-rcqx-pH5.5jz-jyx2-45min-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260507-FX278.lcb
样品瓶号: 4-6
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/08 08:41:23
处理时间(V2): 2026/05/08 15:07:55
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.360	58321	12.001	14078	2542	1.128	--
2	3.336	427635	87.999	46814	3130	1.244	11.407
总计		485955	100.000	60891			

图205 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042401批-均一性2-pH5.5介质-45min-片1
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 29-20/29-949-2 - zzp-6042401p-rcqx-pH5.5jz-jyx2-45min-P2.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx278.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260507-FX278.lcb

样品瓶号: 4-15

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/08 08:46:47

处理时间(V2): 2026/05/08 15:07:57

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流 速: 1.5ml/min


波 长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.360	58916	11.959	14210	2538	1.127	--
2	3.336	433726	88.041	47326	3122	1.249	11.393
总计		492642	100.000	61537			

图206 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042401批-均一性2-pH5.5介质-45min-片2
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 29-20/29-950-2 - zzp-6042401p-rcqx-pH5.5jz-jyx2-45min-P3.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx278.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260507-FX278.lcb

样品瓶号: 4-24

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/08 08:52:11

处理时间(V2): 2026/05/08 15:08:00

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流速: 1.5ml/min


波长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.360	59187	12.105	14242	2536	1.124	--
2	3.336	429761	87.895	47033	3129	1.247	11.400
总计		488948	100.000	61275			

图207 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042401批-均一性2-pH5.5介质-45min-片3
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 29-20/29-951-2 - zzp-6042401p-rcqx-pH5.5jz-jyx2-45min-P4.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx278.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260507-FX278.lcb

样品瓶号: 4-33

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/08 08:57:35

处理时间(V2): 2026/05/08 15:08:03

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流速: 1.5ml/min


波长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.360	56756	11.705	13708	2543	1.124	--
2	3.335	428113	88.295	46806	3133	1.246	11.412
总计		484869	100.000	60514			

图208 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042401批-均一性2-pH5.5介质-45min-片4
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 29-20/29-952-2 - zzp-6042401p-rcqx-pH5.5jz-jyx2-45min-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260507-FX278.lcb
样品瓶号: 4-42
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/08 09:02:58
处理时间(V2): 2026/05/08 15:08:06
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.361	59066	12.018	14323	2542	1.126	--
2	3.337	432415	87.982	47356	3138	1.249	11.412
总计		491482	100.000	61678			

图209 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042401批-均一性2-pH5.5介质-45min-片5
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 29-20/29-953-2 - zzp-6042401p-rcqx-pH5.5jz-jyx2-45min-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260507-FX278.lcb
样品瓶号: 4-51
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/08 09:09:07
处理时间(V2): 2026/05/08 15:08:09
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.361	59484	12.089	14409	2542	1.127	--
2	3.336	432581	87.911	47294	3125	1.249	11.397
总计		492065	100.000	61703			

图210 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042401批-均一性2-pH5.5介质-45min-片6
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 29-20/29-954-2 - zzp-6042401p-rcqx-pH5.5jz-jyx2-60min-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260507-FX278.lcb
样品瓶号: 4-7
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/08 09:14:32
处理时间(V2): 2026/05/08 15:08:12
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.361	60113	11.881	14507	2536	1.129	--
2	3.336	445827	88.119	48654	3113	1.254	11.377
总计		505940	100.000	63160			

图211 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042401批-均一性2-pH5.5介质-60min-片1
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 29-20/29-955-2 - zzp-6042401p-rcqx-pH5.5jz-jyx2-60min-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260507-FX278.lcb
样品瓶号: 4-16
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/08 09:19:56
处理时间(V2): 2026/05/08 15:08:15
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.362	60885	11.896	14746	2542	1.129	--
2	3.337	450902	88.104	49203	3116	1.256	11.379
总计		511786	100.000	63949			

图212 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042401批-均一性2-pH5.5介质-60min-片2
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 29-20/29-956-2 - zzp-6042401p-rcqx-pH5.5jz-jyx2-60min-P3.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx278.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260507-FX278.lcb

样品瓶号: 4-25

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/08 09:25:21

处理时间(V2): 2026/05/08 15:08:17

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流速: 1.5ml/min


波长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.361	60819	11.970	14750	2543	1.127	--
2	3.337	447285	88.030	48831	3114	1.253	11.380
总计		508104	100.000	63581			

图213 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042401批-均一性2-pH5.5介质-60min-片3
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 29-20/29-957-2 - zzp-6042401p-rcqx-pH5.5jz-jyx2-60min-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260507-FX278.lcb
样品瓶号: 4-34
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/08 09:30:45
处理时间(V2): 2026/05/08 15:08:20
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.361	59319	11.717	14365	2546	1.131	--
2	3.337	446938	88.283	48828	3126	1.253	11.397
总计		506257	100.000	63193			

图214 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042401批-均一性2-pH5.5介质-60min-片4
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 29-20/29-958-2 - zzp-6042401p-rcqx-pH5.5jz-jyx2-60min-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260507-FX278.lcb
样品瓶号: 4-43
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/08 09:36:08
处理时间(V2): 2026/05/08 15:08:23
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.361	61183	11.968	14802	2537	1.127	--
2	3.336	450057	88.032	49118	3115	1.255	11.379
总计		511241	100.000	63920			

图215 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042401批-均一性2-pH5.5介质-60min-片5
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 29-20/29-959-2 - zzp-6042401p-rcqx-pH5.5jz-jyx2-60min-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260507-FX278.lcb
样品瓶号: 4-52
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/08 09:41:32
处理时间(V2): 2026/05/08 15:08:25
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.361	60943	11.966	14729	2536	1.129	--
2	3.335	448343	88.034	48872	3109	1.256	11.368
总计		509286	100.000	63601			

图216 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042401批-均一性2-pH5.5介质-60min-片6
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 29-20/29-960-2 - zzp-6042401p-rcqx-pH5.5jz-jyx2-JX-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260507-FX278.lcb
样品瓶号: 4-8
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/08 09:46:57
处理时间(V2): 2026/05/08 15:08:28
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.361	61637	11.826	14946	2545	1.128	--
2	3.336	459548	88.174	50172	3120	1.258	11.386
总计		521185	100.000	65118			

图217 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042401批-均一性2-pH5.5介质-极限转速-片1
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$QTL-235 - 29-20/29-961-2 - zzp-6042401p-rcqx-pH5.5jz-jyx2-JX-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260507-FX278.lcb
样品瓶号: 4-17
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/08 09:52:21
处理时间(V2): 2026/05/08 15:08:30
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.361	61954	11.760	15036	2543	1.128	--
2	3.335	464841	88.240	50674	3111	1.261	11.373
总计		526795	100.000	65709			

图218 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042401批-均一性2-pH5.5介质-极限转速-片2
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 29-20/29-962-2 - zzp-6042401p-rcqx-pH5.5jz-jyx2-JX-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260507-FX278.lcb
样品瓶号: 4-26
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/08 09:57:46
处理时间(V2): 2026/05/08 15:08:33
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.361	61724	11.887	14990	2546	1.129	--
2	3.336	457521	88.113	49907	3109	1.258	11.375
总计		519244	100.000	64897			

图219 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042401批-均一性2-pH5.5介质-极限转速-片3
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 29-20/29-963-2 - zzp-6042401p-rcqx-pH5.5jz-jyx2-JX-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260507-FX278.lcb
样品瓶号: 4-35
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/08 10:03:11
处理时间(V2): 2026/05/08 15:08:36
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.362	60745	11.653	14739	2544	1.129	--
2	3.336	460527	88.347	50222	3107	1.261	11.370
总计		521271	100.000	64960			

图220 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042401批-均一性2-pH5.5介质-极限转速-片4
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 29-20/29-964-2 - zzp-6042401p-rcqx-pH5.5jz-jyx2-JX-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260507-FX278.lcb
样品瓶号: 4-44
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/08 10:08:35
处理时间(V2): 2026/05/08 15:08:38
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.361	62661	11.875	15183	2543	1.128	--
2	3.336	465026	88.125	50780	3112	1.261	11.378
总计		527687	100.000	65962			

图221 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042401批-均一性2-pH5.5介质-极限转速-片5
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 29-20/29-965-2 - zzp-6042401p-rcqx-pH5.5jz-jyx2-JX-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260507-FX278.lcb
样品瓶号: 4-53
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/08 10:14:00
处理时间(V2): 2026/05/08 15:08:41
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.361	62770	11.946	15216	2545	1.130	--
2	3.336	462688	88.054	50426	3108	1.260	11.372
总计		525457	100.000	65642			

图222 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042401批-均一性2-pH5.5介质-极限转速-片6
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$QTL-235 - 29-20/29-966-2 - zzp-6042401p-rcqx-pH5.5jz-jyx2-dz-2-1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260507-FX278.lcb
样品瓶号: 4-27
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/08 10:19:24
处理时间(V2): 2026/05/08 15:08:44
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.337	76781	11.568	15762	1726	1.148	--
2	3.349	586978	88.432	62846	2975	1.282	10.748
总计		663759	100.000	78609			

图223 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042401批-均一性2-pH5.5介质
对照品溶液-2-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 29-20/29-967-2 - zzp-6042401p-rcqx-pH5.5jz-jyx2-dz-2-2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260507-FX278.lcb
样品瓶号: 4-27
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/08 10:27:31
处理时间(V2): 2026/05/08 15:08:46
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.337	77147	11.605	15827	1728	1.150	--
2	3.348	587611	88.395	63028	2982	1.282	10.753
总计		664758	100.000	78855			

图224 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042401批-均一性2-pH5.5介质
对照品溶液-2-2