



非布司他多替诺雷片项目信息

介质体积(ml)	900	取样体积(ml)	1.5	补液体积(ml)	1.5
对照品批号	241101	对照品来源	ZZ	对照品使用方法	直接使用
对照品含量(%)	99.69	对照品水分(%)	0	对照品稀释倍数	5000
标示量(mg)	2	供试品稀释倍数	1	系数	1

对照品溶液

序号	称样量(mg)	A ₁	A ₂	A ₃	A ₄	A ₅	A _{平均}	RSD%
1	10.90	70603	70631	70665	70350	70419	70534	0.20
2	10.99	71137	71321				71229	0.19

单位质量响应值		RSD%	判断
6471.01	6481.26	0.12	数据可信



操作者:

日期: 2026-08-09

复核者:

未审阅版本



供试品溶液-6041601批-多替诺雷-pH4.5

时间 (分钟)	样品	A ₁	A ₂	A _{平均}	溶出量(%)	平均(%)	RSD%	累计溶出量(%)	平均(%)	RSD%
5min	1	12579	-	12579	17.427	17.47	5.38	17.43	17.47	5.38
	2	13480	-	13480	18.675			18.68		
	3	12459	-	12459	17.261			17.26		
	4	11753	-	11753	16.283			16.28		
	5	13306	-	13306	18.434			18.43		
	6	12067	-	12067	16.718			16.72		
10min	1	23994	-	23994	33.242	33.16	1.72	33.27	33.19	1.72
	2	24447	-	24447	33.869			33.90		
	3	24051	-	24051	33.321			33.35		
	4	23481	-	23481	32.531			32.56		
	5	24226	-	24226	33.563			33.59		
	6	23412	-	23412	32.435			32.46		
15min	1	29726	-	29726	41.183	41.04	0.84	41.27	41.13	0.84
	2	30014	-	30014	41.582			41.67		
	3	29512	-	29512	40.886			40.97		
	4	29575	-	29575	40.974			41.05		
	5	29663	-	29663	41.095			41.18		
	6	29269	-	29269	40.550			40.63		
20min	1	33429	-	33429	46.313	46.42	0.49	46.47	46.57	0.50
	2	33595	-	33595	46.543			46.70		
	3	33667	-	33667	46.643			46.80		
	4	33576	-	33576	46.517			46.67		
	5	33550	-	33550	46.481			46.64		
	6	33214	-	33214	46.015			46.16		
30min	1	38107	-	38107	52.794	53.09	0.51	53.02	53.32	0.51
	2	38285	-	38285	53.040			53.27		
	3	38586	-	38586	53.457			53.69		
	4	38472	-	38472	53.300			53.53		
	5	38106	-	38106	52.792			53.03		
	6	38358	-	38358	53.142			53.37		
45min	1	42760	-	42760	59.240	59.55	0.49	59.56	59.86	0.48
	2	43056	-	43056	59.650			59.97		
	3	43024	-	43024	59.606			59.93		
	4	43165	-	43165	59.801			60.12		
	5	42693	-	42693	59.147			59.47		
	6	43184	-	43184	59.828			60.14		
60min	1	46095	-	46095	63.861	63.82	0.46	64.28	64.24	0.45
	2	46046	-	46046	63.793			64.21		
	3	46136	-	46136	63.917			64.34		
	4	46370	-	46370	64.242			64.66		
	5	45726	-	45726	63.349			63.77		
	6	46025	-	46025	63.764			64.18		
90min	1	50138	-	50138	69.462	69.41	0.52	69.99	69.94	0.51
	2	50106	-	50106	69.417			69.95		
	3	50158	-	50158	69.489			70.01		
	4	50368	-	50368	69.780			70.30		
	5	49615	-	49615	68.737			69.26		
	6	50233	-	50233	69.593			70.11		
120min	1	52676	-	52676	72.978	73.02	0.86	73.62	73.66	0.85
	2	52813	-	52813	73.168			73.81		
	3	52995	-	52995	73.420			74.06		
	4	52842	-	52842	73.208			73.85		
	5	51837	-	51837	71.816			72.45		
	6	53073	-	53073	73.528			74.16		



操作者:

日期: 2026-08-09

复核者:

未审阅版本



时间 (分钟)	样品	A ₁	A ₂	A _{平均}	溶出量(%)	平均(%)	RSD%	累计溶 出量(%)	平均(%)	RSD%
极限	1	53163	-	53163	73.653	73.88	0.67	74.41	74.64	0.67
	2	53247	-	53247	73.769			74.54		
	3	53600	-	53600	74.258			75.02		
	4	53612	-	53612	74.275			75.04		
	5	52729	-	52729	73.051			73.81		
	6	53624	-	53624	74.291			75.05		



操作者:

日 期: 2026-08-09

复核者:

未审阅版本



非布司他多替诺雷片项目信息

介质体积(ml)	900	取样体积(ml)	1.5	补液体积(ml)	1.5
对照品批号	101278-202405	对照品来源	中检所	对照品使用方法	直接使用
对照品含量(%)	99.9	对照品水分(%)	0	对照品稀释倍数	250
标示量(mg)	40	供试品稀释倍数	1	系数	1

对照品溶液

序号	称样量(mg)	A ₁	A ₂	A ₃	A ₄	A ₅	A _{平均}	RSD%
1	10.86	529057	530407	528889	529209	528486	529210	0.14
2	11.10	541184	541743				541464	0.08

单位质量响应值		RSD%	判断
48730.20	48780.54	0.08	数据可信



操作者:

日期: 2026-08-09

复核者:

未审阅版本



供试品溶液-6041601批-非布司他-pH4.5

时间 (分钟)	样品	A ₁	A ₂	A _{平均}	溶出量(%)	平均(%)	RSD%	累计溶 出量(%)	平均(%)	RSD%
5min	1	58399	-	58399	10.769	10.79	3.59	10.77	10.79	3.60
	2	62037	-	62037	11.440			11.44		
	3	57725	-	57725	10.645			10.65		
	4	56734	-	56734	10.462			10.46		
	5	59817	-	59817	11.031			11.03		
	6	56477	-	56477	10.415			10.41		
10min	1	85684	-	85684	15.801	15.73	1.62	15.82	15.74	1.63
	2	87410	-	87410	16.119			16.14		
	3	85325	-	85325	15.735			15.75		
	4	84789	-	84789	15.636			15.65		
	5	85294	-	85294	15.729			15.75		
	6	83159	-	83159	15.335			15.35		
15min	1	93466	-	93466	17.236	17.27	1.01	17.28	17.31	1.01
	2	94481	-	94481	17.423			17.47		
	3	94752	-	94752	17.473			17.52		
	4	93522	-	93522	17.246			17.29		
	5	93485	-	93485	17.240			17.28		
	6	92092	-	92092	16.983			17.03		
20min	1	97322	-	97322	17.947	17.96	0.77	18.02	18.03	0.77
	2	98636	-	98636	18.190			18.26		
	3	97748	-	97748	18.026			18.10		
	4	96955	-	96955	17.880			17.95		
	5	97157	-	97157	17.917			17.99		
	6	96479	-	96479	17.792			17.86		
30min	1	100634	-	100634	18.558	18.61	0.88	18.66	18.72	0.87
	2	101771	-	101771	18.768			18.87		
	3	101643	-	101643	18.744			18.85		
	4	101362	-	101362	18.692			18.79		
	5	100830	-	100830	18.594			18.70		
	6	99391	-	99391	18.329			18.43		
45min	1	104342	-	104342	19.242	19.06	1.45	19.38	19.19	1.46
	2	105144	-	105144	19.390			19.53		
	3	104487	-	104487	19.268			19.40		
	4	101506	-	101506	18.719			18.85		
	5	102404	-	102404	18.884			19.02		
	6	102180	-	102180	18.843			18.97		
60min	1	105731	-	105731	19.498	19.45	1.02	19.66	19.61	1.02
	2	106716	-	106716	19.680			19.85		
	3	105065	-	105065	19.375			19.54		
	4	106599	-	106599	19.658			19.82		
	5	104428	-	104428	19.258			19.42		
	6	104234	-	104234	19.222			19.38		
90min	1	107424	-	107424	19.810	19.68	1.63	20.01	19.88	1.61
	2	104596	-	104596	19.289			19.49		
	3	109230	-	109230	20.143			20.34		
	4	107721	-	107721	19.865			20.06		
	5	105122	-	105122	19.386			19.58		
	6	106244	-	106244	19.593			19.79		
120min	1	109550	-	109550	20.202	19.84	1.87	20.43	20.08	1.83
	2	104178	-	104178	19.212			19.45		
	3	109375	-	109375	20.170			20.40		
	4	107862	-	107862	19.891			20.12		
	5	108114	-	108114	19.937			20.17		
	6	106565	-	106565	19.652			19.88		



操作者:

日期: 2026-08-09

复核者:

未审阅版本



时间 (分钟)	样品	A ₁	A ₂	A _{平均}	溶出量(%)	平均(%)	RSD%	累计溶 出量(%)	平均(%)	RSD%
极限	1	108568	-	108568	20.021	19.86	0.95	20.29	20.13	0.95
	2	108293	-	108293	19.970			20.24		
	3	107434	-	107434	19.812			20.08		
	4	108904	-	108904	20.083			20.35		
	5	106587	-	106587	19.656			19.92		
	6	106547	-	106547	19.648			19.91		



操作者:

日 期: 2026-08-09

复核者:

未审阅版本



非布司他多替诺雷片项目信息

介质体积(ml)	900	取样体积(ml)	1.5	补液体积(ml)	1.5
对照品批号	241101	对照品来源	ZZ	对照品使用方法	直接使用
对照品含量(%)	99.69	对照品水分(%)	0	对照品稀释倍数	5000
标示量(mg)	2	供试品稀释倍数	1	系数	1

对照品溶液

序号	称样量(mg)	A ₁	A ₂	A ₃	A ₄	A ₅	A _{平均}	RSD%
1	10.90	69997	70178	70206	69923	70035	70068	0.18
2	10.99	70463	70308				70386	0.16
单位质量响应值				RSD%	判断			
6428.26		6404.55		0.27	数据可信			



操作者:

日期: 2026-08-09

复核者:

未审阅版本



供试品溶液-6042201批-多替诺雷-pH4.5

时间 (分钟)	样品	A ₁	A ₂	A _{平均}	溶出量(%)	平均(%)	RSD%	累计溶 出量(%)	平均(%)	RSD%
5min	1	12406	-	12406	17.347	15.68	21.32	17.35	15.68	21.33
	2	11461	-	11461	16.026			16.03		
	3	12997	-	12997	18.174			18.17		
	4	8448	-	8448	11.813			11.81		
	5	13821	-	13821	19.326			19.33		
	6	8140	-	8140	11.382			11.38		
10min	1	23877	-	23877	33.387	31.64	8.64	33.42	31.66	8.65
	2	23030	-	23030	32.203			32.23		
	3	23710	-	23710	33.154			33.18		
	4	20190	-	20190	28.232			28.25		
	5	24727	-	24727	34.576			34.61		
	6	20210	-	20210	28.260			28.28		
15min	1	29869	-	29869	41.766	40.54	4.72	41.85	40.61	4.74
	2	29213	-	29213	40.849			40.93		
	3	29758	-	29758	41.611			41.70		
	4	27438	-	27438	38.367			38.43		
	5	30479	-	30479	42.619			42.71		
	6	27174	-	27174	37.998			38.06		
20min	1	33658	-	33658	47.064	46.29	2.60	47.22	46.43	2.62
	2	33305	-	33305	46.571			46.72		
	3	33504	-	33504	46.849			47.00		
	4	32064	-	32064	44.835			44.97		
	5	34060	-	34060	47.626			47.79		
	6	32019	-	32019	44.773			44.90		
30min	1	38803	-	38803	54.259	53.79	1.07	54.49	54.01	1.09
	2	38461	-	38461	53.780			54.01		
	3	38607	-	38607	53.985			54.22		
	4	37883	-	37883	52.972			53.18		
	5	38947	-	38947	54.460			54.70		
	6	38093	-	38093	53.266			53.47		
45min	1	43325	-	43325	60.582	60.60	0.63	60.90	60.91	0.63
	2	43235	-	43235	60.456			60.77		
	3	43315	-	43315	60.568			60.89		
	4	42905	-	42905	59.995			60.29		
	5	43557	-	43557	60.906			61.24		
	6	43677	-	43677	61.074			61.37		
60min	1	46219	-	46219	64.629	64.88	0.67	65.05	65.30	0.65
	2	46258	-	46258	64.683			65.10		
	3	46057	-	46057	64.402			64.83		
	4	46358	-	46358	64.823			65.22		
	5	46590	-	46590	65.147			65.58		
	6	46912	-	46912	65.598			65.99		
90min	1	50206	-	50206	70.204	70.39	0.69	70.74	70.92	0.67
	2	49992	-	49992	69.904			70.43		
	3	50086	-	50086	70.036			70.57		
	4	50479	-	50479	70.585			71.09		
	5	50341	-	50341	70.392			70.93		
	6	50948	-	50948	71.241			71.75		
120min	1	52805	-	52805	73.838	74.01	0.85	74.49	74.65	0.83
	2	52522	-	52522	73.442			74.08		
	3	52815	-	52815	73.852			74.50		
	4	52905	-	52905	73.978			74.60		
	5	52731	-	52731	73.734			74.39		
	6	53803	-	53803	75.233			75.86		



操作者:

日期: 2026-08-09

复核者:

未审阅版本



时间 (分钟)	样品	A ₁	A ₂	A _{平均}	溶出量(%)	平均(%)	RSD%	累计溶 出量(%)	平均(%)	RSD%
极限	1	53688	-	53688	75.073	75.09	0.82	75.84	75.85	0.81
	2	53231	-	53231	74.434			75.20		
	3	53366	-	53366	74.622			75.39		
	4	53727	-	53727	75.127			75.87		
	5	53697	-	53697	75.085			75.87		
	6	54495	-	54495	76.201			76.95		



操作者:

日 期: 2026-08-09

复核者:

未审阅版本



非布司他多替诺雷片项目信息

介质体积(ml)	900	取样体积(ml)	1.5	补液体积(ml)	1.5
对照品批号	101278-202405	对照品来源	中检所	对照品使用方法	直接使用
对照品含量(%)	99.9	对照品水分(%)	0	对照品稀释倍数	250
标示量(mg)	40	供试品稀释倍数	1	系数	1

对照品溶液

序号	称样量(mg)	A ₁	A ₂	A ₃	A ₄	A ₅	A _{平均}	RSD%
1	10.86	524279	526034	525437	525638	523874	525052	0.18
2	11.10	529363	528604				528984	0.11
单位质量响应值				RSD%	判断			
48347.33				1.02	数据可信			



操作者:

日期: 2026-08-09

复核者:

未审阅版本



供试品溶液-6042201批-非布司他-pH4.5

时间 (分钟)	样品	A ₁	A ₂	A _{平均}	溶出量(%)	平均(%)	RSD%	累计溶 出量(%)	平均(%)	RSD%
5min	1	58177	-	58177	10.897	10.22	14.64	10.90	10.22	14.62
	2	55788	-	55788	10.450			10.45		
	3	61613	-	61613	11.541			11.54		
	4	45139	-	45139	8.455			8.46		
	5	62407	-	62407	11.690			11.69		
	6	44349	-	44349	8.307			8.31		
10min	1	82313	-	82313	15.418	15.10	5.01	15.44	15.12	5.04
	2	82586	-	82586	15.470			15.49		
	3	83422	-	83422	15.626			15.65		
	4	76400	-	76400	14.311			14.32		
	5	84239	-	84239	15.779			15.80		
	6	74623	-	74623	13.978			13.99		
15min	1	88803	-	88803	16.634	16.81	2.46	16.68	16.85	2.48
	2	90912	-	90912	17.029			17.07		
	3	92332	-	92332	17.295			17.34		
	4	87742	-	87742	16.435			16.47		
	5	91631	-	91631	17.164			17.21		
	6	86945	-	86945	16.286			16.32		
20min	1	94385	-	94385	17.680	17.65	1.55	17.75	17.72	1.57
	2	95473	-	95473	17.884			17.96		
	3	96164	-	96164	18.013			18.09		
	4	93896	-	93896	17.588			17.65		
	5	93370	-	93370	17.490			17.56		
	6	92123	-	92123	17.256			17.32		
30min	1	99801	-	99801	18.694	18.55	1.69	18.80	18.65	1.70
	2	100858	-	100858	18.892			18.99		
	3	100665	-	100665	18.856			18.96		
	4	98329	-	98329	18.419			18.51		
	5	97619	-	97619	18.286			18.39		
	6	96814	-	96814	18.135			18.23		
45min	1	103410	-	103410	19.370	19.12	0.85	19.50	19.26	0.85
	2	102524	-	102524	19.204			19.34		
	3	101945	-	101945	19.096			19.23		
	4	102350	-	102350	19.172			19.30		
	5	101203	-	101203	18.957			19.09		
	6	101145	-	101145	18.946			19.07		
60min	1	103036	-	103036	19.300	19.46	1.46	19.46	19.63	1.46
	2	106460	-	106460	19.942			20.11		
	3	104549	-	104549	19.584			19.75		
	4	103697	-	103697	19.424			19.58		
	5	101982	-	101982	19.103			19.27		
	6	103730	-	103730	19.430			19.59		
90min	1	106306	-	106306	19.913	19.71	1.52	20.11	19.90	1.50
	2	106501	-	106501	19.949			20.15		
	3	105552	-	105552	19.772			19.97		
	4	105141	-	105141	19.695			19.88		
	5	102121	-	102121	19.129			19.33		
	6	105680	-	105680	19.795			19.98		
120min	1	108076	-	108076	20.244	19.92	1.33	20.47	20.15	1.32
	2	105003	-	105003	19.669			19.90		
	3	107235	-	107235	20.087			20.32		
	4	105762	-	105762	19.811			20.03		
	5	107369	-	107369	20.112			20.34		
	6	104619	-	104619	19.597			19.82		



操作者:

日期: 2026-08-09

复核者:

未审阅版本



时间 (分钟)	样品	A ₁	A ₂	A _{平均}	溶出量(%)	平均(%)	RSD%	累计溶 出量(%)	平均(%)	RSD%
极限	1	107492	-	107492	20.135	19.31	5.33	20.40	19.57	5.25
	2	94614	-	94614	17.723			17.99		
	3	106079	-	106079	19.870			20.14		
	4	106809	-	106809	20.007			20.26		
	5	97643	-	97643	18.290			18.55		
	6	105774	-	105774	19.813			20.07		



操作者:

日 期: 2026-08-09

复核者:

未审阅版本



非布司他多替诺雷片项目信息

介质体积(ml)	900	取样体积(ml)	1.5	补液体积(ml)	1.5
对照品批号	241101	对照品来源	ZZ	对照品使用方法	直接使用
对照品含量(%)	99.69	对照品水分(%)	0	对照品稀释倍数	5000
标示量(mg)	2	供试品稀释倍数	1	系数	1

对照品溶液

序号	称样量(mg)	A ₁	A ₂	A ₃	A ₄	A ₅	A _{平均}	RSD%
1	10.90	70349	70058	70281	69973	70187	70170	0.23
2	10.99	70322	70169				70246	0.16
单位质量响应值				RSD%	判断			
6437.61		6391.81		0.51	数据可信			



操作者:

日期: 2026-08-09

复核者:

未审阅版本



供试品溶液-6042401批-多替诺雷-pH4.5

时间 (分钟)	样品	A ₁	A ₂	A _{平均}	溶出量(%)	平均(%)	RSD%	累计溶出量(%)	平均(%)	RSD%
5min	1	15850	-	15850	22.169	19.51	14.36	22.17	19.51	14.37
	2	14705	-	14705	20.568			20.57		
	3	14628	-	14628	20.460			20.46		
	4	14751	-	14751	20.632			20.63		
	5	13644	-	13644	19.084			19.08		
	6	10120	-	10120	14.155			14.15		
10min	1	25790	-	25790	36.072	34.67	5.19	36.11	34.70	5.20
	2	25203	-	25203	35.251			35.29		
	3	25515	-	25515	35.688			35.72		
	4	25153	-	25153	35.181			35.22		
	5	24796	-	24796	34.682			34.71		
	6	22253	-	22253	31.125			31.15		
15min	1	30966	-	30966	43.312	42.43	2.88	43.41	42.52	2.89
	2	30283	-	30283	42.357			42.45		
	3	31028	-	31028	43.399			43.49		
	4	30704	-	30704	42.945			43.04		
	5	30347	-	30347	42.446			42.54		
	6	28666	-	28666	40.095			40.17		
20min	1	34324	-	34324	48.009	47.19	2.65	48.18	47.36	2.66
	2	33751	-	33751	47.207			47.37		
	3	34544	-	34544	48.316			48.48		
	4	34530	-	34530	48.297			48.46		
	5	32663	-	32663	45.686			45.85		
	6	32633	-	32633	45.644			45.79		
30min	1	38985	-	38985	54.528	54.21	1.47	54.78	54.45	1.48
	2	38325	-	38325	53.605			53.85		
	3	39138	-	39138	54.742			54.99		
	4	39394	-	39394	55.100			55.35		
	5	38846	-	38846	54.334			54.57		
	6	37859	-	37859	52.953			53.17		
45min	1	43244	-	43244	60.485	60.45	0.87	60.83	60.78	0.87
	2	42916	-	42916	60.026			60.36		
	3	43673	-	43673	61.085			61.42		
	4	43660	-	43660	61.067			61.40		
	5	43004	-	43004	60.149			60.48		
	6	42826	-	42826	59.900			60.21		
60min	1	46123	-	46123	64.512	64.32	1.02	64.95	64.75	1.03
	2	45779	-	45779	64.031			64.46		
	3	46401	-	46401	64.901			65.34		
	4	46540	-	46540	65.095			65.53		
	5	45802	-	45802	64.063			64.49		
	6	45270	-	45270	63.319			63.73		
90min	1	49740	-	49740	69.571	69.63	0.89	70.12	70.17	0.90
	2	49273	-	49273	68.918			69.46		
	3	50213	-	50213	70.233			70.78		
	4	50383	-	50383	70.470			71.02		
	5	49685	-	49685	69.494			70.03		
	6	49388	-	49388	69.079			69.59		
120min	1	52425	-	52425	73.326	73.08	0.88	73.99	73.73	0.89
	2	51815	-	51815	72.473			73.13		
	3	52704	-	52704	73.717			74.38		
	4	52810	-	52810	73.865			74.53		
	5	51858	-	51858	72.533			73.18		
	6	51866	-	51866	72.545			73.17		



操作者:

日期: 2026-08-09

复核者:

未审阅版本



时间 (分钟)	样品	A ₁	A ₂	A _{平均}	溶出量(%)	平均(%)	RSD%	累计溶 出量(%)	平均(%)	RSD%
极限	1	53034	-	53034	74.178	74.07	1.01	74.96	74.85	1.00
	2	52238	-	52238	73.065			73.84		
	3	53653	-	53653	75.044			75.83		
	4	53432	-	53432	74.735			75.52		
	5	52566	-	52566	73.524			74.29		
	6	52826	-	52826	73.887			74.64		



操作者:

日 期: 2026-08-09

复核者:

未审阅版本



非布司他多替诺雷片项目信息

介质体积(ml)	900	取样体积(ml)	1.5	补液体积(ml)	1.5
对照品批号	101278-202405	对照品来源	中检所	对照品使用方法	直接使用
对照品含量(%)	99.9	对照品水分(%)	0	对照品稀释倍数	250
标示量(mg)	40	供试品稀释倍数	1	系数	1

对照品溶液

序号	称样量(mg)	A ₁	A ₂	A ₃	A ₄	A ₅	A _{平均}	RSD%
1	10.86	525802	525252	525939	525643	525616	525650	0.05
2	11.10	526718	525745				526232	0.14
单位质量响应值				RSD%	判断			
48402.39				1.47	数据可信			



操作者:

日期: 2026-08-09

复核者:

未审阅版本



供试品溶液-6042401批-非布司他-pH4.5

时间 (分钟)	样品	A ₁	A ₂	A _{平均}	溶出量(%)	平均(%)	RSD%	累计溶 出量(%)	平均(%)	RSD%
5min	1	67440	-	67440	12.659	11.64	10.59	12.66	11.64	10.57
	2	63995	-	63995	12.012			12.01		
	3	64058	-	64058	12.024			12.02		
	4	66599	-	66599	12.501			12.50		
	5	60504	-	60504	11.357			11.36		
	6	49585	-	49585	9.307			9.31		
10min	1	87906	-	87906	16.500	15.69	3.12	16.52	15.71	3.13
	2	82319	-	82319	15.452			15.47		
	3	84951	-	84951	15.946			15.97		
	4	82801	-	82801	15.542			15.56		
	5	83258	-	83258	15.628			15.65		
	6	80269	-	80269	15.067			15.08		
15min	1	95247	-	95247	17.878	16.99	2.73	17.93	17.04	2.74
	2	88074	-	88074	16.532			16.58		
	3	90811	-	90811	17.045			17.09		
	4	89621	-	89621	16.822			16.87		
	5	89689	-	89689	16.835			16.88		
	6	89785	-	89785	16.853			16.89		
20min	1	91524	-	91524	17.179	17.43	2.80	17.26	17.51	2.79
	2	94351	-	94351	17.710			17.78		
	3	95018	-	95018	17.835			17.91		
	4	94271	-	94271	17.695			17.77		
	5	93930	-	93930	17.631			17.70		
	6	88184	-	88184	16.552			16.62		
30min	1	98096	-	98096	18.413	17.94	4.66	18.52	18.04	4.61
	2	99736	-	99736	18.721			18.82		
	3	92180	-	92180	17.302			17.41		
	4	88125	-	88125	16.541			16.65		
	5	97614	-	97614	18.322			18.42		
	6	97564	-	97564	18.313			18.41		
45min	1	103840	-	103840	19.491	19.20	4.36	19.63	19.34	4.33
	2	103569	-	103569	19.440			19.57		
	3	97710	-	97710	18.340			18.47		
	4	109536	-	109536	20.560			20.69		
	5	101528	-	101528	19.057			19.19		
	6	97715	-	97715	18.341			18.47		
60min	1	101238	-	101238	19.003	18.66	3.31	19.17	18.82	3.29
	2	97269	-	97269	18.258			18.42		
	3	94642	-	94642	17.765			17.93		
	4	102815	-	102815	19.299			19.46		
	5	102518	-	102518	19.243			19.41		
	6	97949	-	97949	18.385			18.54		
90min	1	99817	-	99817	18.736	18.31	9.11	18.94	18.51	9.02
	2	103800	-	103800	19.484			19.68		
	3	88491	-	88491	16.610			16.80		
	4	84385	-	84385	15.839			16.04		
	5	104579	-	104579	19.630			19.83		
	6	104303	-	104303	19.578			19.77		
120min	1	97224	-	97224	18.249	18.98	3.81	18.48	19.21	3.75
	2	106192	-	106192	19.933			20.16		
	3	100989	-	100989	18.956			19.18		
	4	100710	-	100710	18.904			19.13		
	5	96792	-	96792	18.168			18.40		
	6	104909	-	104909	19.692			19.91		



操作者:

日期: 2026-08-09

复核者:

未审阅版本



时间 (分钟)	样品	A ₁	A ₂	A _{平均}	溶出量(%)	平均(%)	RSD%	累计溶 出量(%)	平均(%)	RSD%
极限	1	104847	-	104847	19.680	19.32	5.35	19.94	19.58	5.29
	2	104047	-	104047	19.530			19.79		
	3	92005	-	92005	17.270			17.52		
	4	107550	-	107550	20.187			20.44		
	5	104743	-	104743	19.661			19.92		
	6	104451	-	104451	19.606			19.86		



操作者:

日 期: 2026-08-09

复核者:

未审阅版本




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-44/30-972-2 - zzp-6041601p-rcqx-pH4.5jz-jyx2-rj.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx279.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260514-FX279.lcb
样品瓶号: 1-9
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/14 19:51:55
处理时间(V2): 2026/05/18 09:58:56
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图1 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6041601批-均一性2-pH4.5介质
溶剂




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-44/30-973-2 - zzp-6041601p-rcqx-pH4.5jz-jyx2-dz-1-1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx279.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260514-FX279.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/14 19:57:19
处理时间(V2): 2026/05/18 09:58:59
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.328	70603	11.774	14816	1791	1.189	--
2	3.298	529057	88.226	60362	3275	1.256	11.069
总计		599660	100.000	75178			

图2 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6041601批-均一性2-pH4.5介质
对照品溶液-1-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-44/30-974-2 - zzp-6041601p-rcqx-pH4.5jz-jyx2-dz-1-2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx279.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260514-FX279.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/14 20:02:43
处理时间(V2): 2026/05/18 09:59:02
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.327	70631	11.751	14858	1801	1.189	--
2	3.298	530407	88.249	60485	3273	1.257	11.084
总计		601038	100.000	75343			

图3 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6041601批-均一性2-pH4.5介质
对照品溶液-1-2




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-44/30-975-2 - zzp-6041601p-rcqx-pH4.5jz-jyx2-dz-1-3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx279.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260514-FX279.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/14 20:08:07
处理时间(V2): 2026/05/18 09:59:05
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.327	70665	11.786	14853	1800	1.185	--
2	3.300	528889	88.214	60269	3276	1.258	11.088
总计		599554	100.000	75122			

图4 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6041601批-均一性2-pH4.5介质
对照品溶液-1-3




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-44/30-976-2 - zzp-6041601p-rcqx-pH4.5jz-jyx2-dz-1-4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx279.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260514-FX279.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/14 20:13:31
处理时间(V2): 2026/05/18 09:59:07
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.327	70350	11.734	14849	1806	1.182	--
2	3.301	529209	88.266	60203	3274	1.260	11.098
总计		599559	100.000	75052			

图5 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6041601批-均一性2-pH4.5介质
对照品溶液-1-4




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-44/30-977-2 - zzp-6041601p-rcqx-pH4.5jz-jyx2-dz-1-5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx279.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260514-FX279.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/14 20:18:54
处理时间(V2): 2026/05/18 09:59:09
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.327	70419	11.758	14826	1799	1.186	--
2	3.302	528486	88.242	60096	3266	1.259	11.087
总计		598905	100.000	74922			

图6 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6041601批-均一性2-pH4.5介质
对照品溶液-1-5



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-44/30-978-2 - zzp-6041601p-rcqx-pH4.5jz-jyx2-5min-P1.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx279.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260514-FX279.lcb

样品瓶号: 1-1

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/14 20:24:17

处理时间(V2): 2026/05/18 09:59:12

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流 速: 1.5ml/min


波 长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.342	12579	17.723	2993	2407	1.185	--
2	3.261	58399	82.277	6567	3184	1.189	11.266
总计		70979	100.000	9561			

图7 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6041601批-均一性2-pH4.5介质-5min-片1
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-44/30-979-2 - zzp-6041601p-rcqx-pH4.5jz-jyx2-5min-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx279.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260514-FX279.lcb
样品瓶号: 1-10
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/14 20:29:40
处理时间(V2): 2026/05/18 09:59:14
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.342	13480	17.850	3216	2418	1.197	--
2	3.263	62037	82.150	6979	3184	1.183	11.280
总计		75517	100.000	10195			

图8 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6041601批-均一性2-pH4.5介质-5min-片2
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-44/30-980-2 - zzp-6041601p-rcqx-pH4.5jz-jyx2-5min-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx279.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260514-FX279.lcb
样品瓶号: 1-19
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/14 20:35:03
处理时间(V2): 2026/05/18 09:59:17
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.342	12459	17.752	2960	2424	1.199	--
2	3.264	57725	82.248	6501	3167	1.188	11.268
总计		70184	100.000	9461			

图9 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6041601批-均一性2-pH4.5介质-5min-片3
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-44/30-981-2 - zzp-6041601p-rcqx-pH4.5jz-jyx2-5min-P4.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx279.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260514-FX279.lcb

样品瓶号: 1-28

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/14 20:40:26

处理时间(V2): 2026/05/18 09:59:19

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流速: 1.5ml/min


波长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.342	11753	17.161	2795	2378	1.183	--
2	3.264	56734	82.839	6369	3160	1.179	11.227
总计		68486	100.000	9164			

图10 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6041601批-均一性2-pH4.5介质-5min-片4
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-44/30-982-2 - zzp-6041601p-rcqx-pH4.5jz-jyx2-5min-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx279.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260514-FX279.lcb
样品瓶号: 1-37
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/14 20:45:49
处理时间(V2): 2026/05/18 09:59:22
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.343	13306	18.197	3163	2406	1.199	--
2	3.265	59817	81.803	6708	3151	1.191	11.236
总计		73122	100.000	9871			

图11 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6041601批-均一性2-pH4.5介质-5min-片5
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-44/30-983-2 - zzp-6041601p-rcqx-pH4.5jz-jyx2-5min-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx279.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260514-FX279.lcb
样品瓶号: 1-46
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/14 20:51:11
处理时间(V2): 2026/05/18 09:59:24
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.343	12067	17.605	2842	2392	1.200	--
2	3.266	56477	82.395	6294	3154	1.190	11.232
总计		68544	100.000	9137			

图12 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6041601批-均一性2-pH4.5介质-5min-片6
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-44/30-984-2 - zzp-6041601p-rcqx-pH4.5jz-jyx2-10min-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx279.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260514-FX279.lcb
样品瓶号: 1-2
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/14 20:56:35
处理时间(V2): 2026/05/18 09:59:26
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.343	23994	21.876	5682	2386	1.202	--
2	3.263	85684	78.124	9592	3153	1.202	11.218
总计		109677	100.000	15273			

图13 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6041601批-均一性2-pH4.5介质-10min-片1
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-44/30-985-2 - zzp-6041601p-rcqx-pH4.5jz-jyx2-10min-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx279.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260514-FX279.lcb
样品瓶号: 1-11
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/14 21:01:59
处理时间(V2): 2026/05/18 09:59:29
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.343	24447	21.856	5794	2398	1.190	--
2	3.265	87410	78.144	9751	3146	1.210	11.222
总计		111857	100.000	15545			

图14 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6041601批-均一性2-pH4.5介质-10min-片2
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-44/30-986-2 - zzp-6041601p-rcqx-pH4.5jz-jyx2-10min-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx279.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260514-FX279.lcb
样品瓶号: 1-20
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/14 21:07:21
处理时间(V2): 2026/05/18 09:59:31
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.343	24051	21.989	5684	2399	1.196	--
2	3.265	85325	78.011	9551	3156	1.206	11.238
总计		109376	100.000	15235			

图15 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6041601批-均一性2-pH4.5介质-10min-片3
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-44/30-987-2 - zzp-6041601p-rcqx-pH4.5jz-jyx2-10min-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx279.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260514-FX279.lcb
样品瓶号: 1-29
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/14 21:12:44
处理时间(V2): 2026/05/18 09:59:34
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.343	23481	21.688	5555	2400	1.195	--
2	3.266	84789	78.312	9459	3150	1.206	11.234
总计		108270	100.000	15014			

图16 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6041601批-均一性2-pH4.5介质-10min-片4
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-44/30-988-2 - zzp-6041601p-rcqx-pH4.5jz-jyx2-10min-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx279.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260514-FX279.lcb
样品瓶号: 1-38
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/14 21:18:07
处理时间(V2): 2026/05/18 09:59:36
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.343	24226	22.120	5715	2386	1.196	--
2	3.267	85294	77.880	9520	3173	1.207	11.255
总计		109521	100.000	15235			

图17 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6041601批-均一性2-pH4.5介质-10min-片5
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-44/30-989-2 - zzp-6041601p-rcqx-pH4.5jz-jyx2-10min-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx279.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260514-FX279.lcb
样品瓶号: 1-47
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/14 21:23:30
处理时间(V2): 2026/05/18 09:59:39
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.343	23412	21.969	5553	2395	1.210	--
2	3.268	83159	78.031	9267	3151	1.204	11.234
总计		106571	100.000	14820			

图18 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6041601批-均一性2-pH4.5介质-10min-片6
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-44/30-990-2 - zzp-6041601p-rcqx-pH4.5jz-jyx2-15min-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx279.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260514-FX279.lcb
样品瓶号: 1-3
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/14 21:28:54
处理时间(V2): 2026/05/18 09:59:41
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.343	29726	24.130	7065	2416	1.202	--
2	3.269	93466	75.870	10461	3170	1.208	11.277
总计		123192	100.000	17527			

图19 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6041601批-均一性2-pH4.5介质-15min-片1
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-44/30-991-2 - zzp-6041601p-rcqx-pH4.5jz-jyx2-15min-P2.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx279.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260514-FX279.lcb

样品瓶号: 1-12

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/14 21:34:17

处理时间(V2): 2026/05/18 09:59:43

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流 速: 1.5ml/min


波 长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.343	30014	24.108	7151	2406	1.187	--
2	3.269	94481	75.892	10524	3157	1.213	11.252
总计		124495	100.000	17676			

图20 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6041601批-均一性2-pH4.5介质-15min-片2
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-44/30-992-2 - zzp-6041601p-rcqx-pH4.5jz-jyx2-15min-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx279.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260514-FX279.lcb
样品瓶号: 1-21
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/14 21:39:40
处理时间(V2): 2026/05/18 09:59:46
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.343	29512	23.750	7047	2412	1.194	--
2	3.269	94752	76.250	10535	3130	1.209	11.226
总计		124264	100.000	17582			

图21 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6041601批-均一性2-pH4.5介质-15min-片3
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-44/30-993-2 - zzp-6041601p-rcqx-pH4.5jz-jyx2-15min-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx279.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260514-FX279.lcb
样品瓶号: 1-30
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/14 21:45:02
处理时间(V2): 2026/05/18 09:59:48
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.343	29575	24.026	7037	2411	1.197	--
2	3.270	93522	75.974	10456	3161	1.208	11.266
总计		123097	100.000	17493			

图22 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6041601批-均一性2-pH4.5介质-15min-片4
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-44/30-994-2 - zzp-6041601p-rcqx-pH4.5jz-jyx2-15min-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx279.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260514-FX279.lcb
样品瓶号: 1-39
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/14 21:50:25
处理时间(V2): 2026/05/18 09:59:51
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.343	29663	24.087	7080	2413	1.197	--
2	3.271	93485	75.913	10460	3155	1.204	11.261
总计		123148	100.000	17540			

图23 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6041601批-均一性2-pH4.5介质-15min-片5
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-44/30-995-2 - zzp-6041601p-rcqx-pH4.5jz-jyx2-15min-P6.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx279.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260514-FX279.lcb

样品瓶号: 1-48

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/14 21:55:47

处理时间(V2): 2026/05/18 09:59:53

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流 速: 1.5ml/min


波 长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.343	29269	24.118	6971	2406	1.199	--
2	3.272	92092	75.882	10273	3146	1.211	11.248
总计		121362	100.000	17243			

图24 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6041601批-均一性2-pH4.5介质-15min-片6
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-44/30-996-2 - zzp-6041601p-rcqx-pH4.5jz-jyx2-20min-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx279.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260514-FX279.lcb
样品瓶号: 1-4
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/14 22:01:10
处理时间(V2): 2026/05/18 09:59:55
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.343	33429	25.567	7963	2403	1.194	--
2	3.271	97322	74.433	10882	3162	1.209	11.261
总计		130751	100.000	18845			

图25 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6041601批-均一性2-pH4.5介质-20min-片1
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-44/30-997-2 - zzp-6041601p-rcqx-pH4.5jz-jyx2-20min-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx279.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260514-FX279.lcb
样品瓶号: 1-13
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/14 22:06:31
处理时间(V2): 2026/05/18 09:59:58
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.343	33595	25.406	7992	2402	1.192	--
2	3.272	98636	74.594	10962	3167	1.214	11.271
总计		132231	100.000	18953			

图26 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6041601批-均一性2-pH4.5介质-20min-片2
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-44/30-998-2 - zzp-6041601p-rcqx-pH4.5jz-jyx2-20min-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx279.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260514-FX279.lcb
样品瓶号: 1-22
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/14 22:11:54
处理时间(V2): 2026/05/18 10:00:00
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.344	33667	25.619	7998	2401	1.194	--
2	3.272	97748	74.381	10923	3154	1.211	11.254
总计		131415	100.000	18921			

图27 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6041601批-均一性2-pH4.5介质-20min-片3
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-44/30-999-2 - zzp-6041601p-rcqx-pH4.5jz-jyx2-20min-P4.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx279.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260514-FX279.lcb

样品瓶号: 1-31

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/14 22:17:16

处理时间(V2): 2026/05/18 10:00:03

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流 速: 1.5ml/min


波 长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.343	33576	25.723	7963	2403	1.200	--
2	3.273	96955	74.277	10834	3163	1.212	11.271
总计		130531	100.000	18797			

图28 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6041601批-均一性2-pH4.5介质-20min-片4
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-44/30-1000-2 - zzp-6041601p-rcqx-pH4.5jz-jyx2-20min-P5.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx279.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260514-FX279.lcb

样品瓶号: 1-40

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/14 22:22:39

处理时间(V2): 2026/05/18 10:00:05

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流 速: 1.5ml/min


波 长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.344	33550	25.668	7978	2407	1.200	--
2	3.273	97157	74.332	10806	3137	1.211	11.240
总计		130707	100.000	18784			

图29 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6041601批-均一性2-pH4.5介质-20min-片5
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-44/30-1001-2 - zzp-6041601p-rcqx-pH4.5jz-jyx2-20min-P6.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx279.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260514-FX279.lcb

样品瓶号: 1-49

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/14 22:28:02

处理时间(V2): 2026/05/18 10:00:08

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流 速: 1.5ml/min


波 长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.344	33214	25.610	7929	2404	1.192	--
2	3.274	96479	74.390	10729	3158	1.213	11.267
总计		129693	100.000	18658			

图30 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6041601批-均一性2-pH4.5介质-20min-片6
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-44/30-1002-2 - zzp-6041601p-rcqx-pH4.5jz-jyx2-30min-P1.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx279.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260514-FX279.lcb

样品瓶号: 1-5

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/14 22:33:23

处理时间(V2): 2026/05/18 10:00:10

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流 速: 1.5ml/min


波 长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.344	38107	27.466	9093	2408	1.194	--
2	3.274	100634	72.534	11230	3170	1.218	11.285
总计		138741	100.000	20323			

图31 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6041601批-均一性2-pH4.5介质-30min-片1
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-44/30-1003-2 - zzp-6041601p-rcqx-pH4.5jz-jyx2-30min-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx279.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260514-FX279.lcb
样品瓶号: 1-14
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/14 22:38:47
处理时间(V2): 2026/05/18 10:00:13
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.344	38285	27.336	9147	2412	1.193	--
2	3.275	101771	72.664	11332	3158	1.217	11.274
总计		140056	100.000	20479			

图32 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6041601批-均一性2-pH4.5介质-30min-片2
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-44/30-1004-2 - zzp-6041601p-rcqx-pH4.5jz-jyx2-30min-P3.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx279.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260514-FX279.lcb

样品瓶号: 1-23

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/14 22:44:08

处理时间(V2): 2026/05/18 10:00:15

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流 速: 1.5ml/min


波 长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.344	38586	27.517	9179	2401	1.193	--
2	3.275	101643	72.483	11299	3147	1.217	11.253
总计		140230	100.000	20478			

图33 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6041601批-均一性2-pH4.5介质-30min-片3
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-44/30-1005-2 - zzp-6041601p-rcqx-pH4.5jz-jyx2-30min-P4.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx279.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260514-FX279.lcb

样品瓶号: 1-32

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/14 22:49:31

处理时间(V2): 2026/05/18 10:00:18

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流 速: 1.5ml/min


波 长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.344	38472	27.513	9178	2402	1.188	--
2	3.276	101362	72.487	11226	3153	1.217	11.265
总计		139835	100.000	20404			

图34 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6041601批-均一性2-pH4.5介质-30min-片4
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-44/30-1006-2 - zzp-6041601p-rcqx-pH4.5jz-jyx2-30min-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx279.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260514-FX279.lcb
样品瓶号: 1-41
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/14 22:54:54
处理时间(V2): 2026/05/18 10:00:21
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.344	38106	27.427	9084	2405	1.199	--
2	3.276	100830	72.573	11197	3160	1.213	11.274
总计		138937	100.000	20281			

图35 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6041601批-均一性2-pH4.5介质-30min-片5
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-44/30-1007-2 - zzp-6041601p-rcqx-pH4.5jz-jyx2-30min-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx279.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260514-FX279.lcb
样品瓶号: 1-50
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/14 23:00:16
处理时间(V2): 2026/05/18 10:00:23
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.344	38358	27.846	9142	2407	1.192	--
2	3.277	99391	72.154	11047	3166	1.214	11.285
总计		137749	100.000	20190			

图36 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6041601批-均一性2-pH4.5介质-30min-片6
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-44/30-1008-2 - zzp-6041601p-rcqx-pH4.5jz-jyx2-45min-P1.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx279.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260514-FX279.lcb

样品瓶号: 1-6

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/14 23:05:39

处理时间(V2): 2026/05/18 10:00:26

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流 速: 1.5ml/min


波 长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.344	42760	29.068	10229	2418	1.190	--
2	3.276	104342	70.932	11614	3169	1.218	11.297
总计		147101	100.000	21843			

图37 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6041601批-均一性2-pH4.5介质-45min-片1
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-44/30-1009-2 - zzp-6041601p-rcqx-pH4.5jz-jyx2-45min-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx279.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260514-FX279.lcb
样品瓶号: 1-15
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/14 23:11:02
处理时间(V2): 2026/05/18 10:00:28
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.344	43056	29.053	10268	2404	1.197	--
2	3.277	105144	70.947	11710	3164	1.215	11.281
总计		148201	100.000	21978			

图38 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6041601批-均一性2-pH4.5介质-45min-片2
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-44/30-1010-2 - zzp-6041601p-rcqx-pH4.5jz-jyx2-45min-P3.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx279.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260514-FX279.lcb

样品瓶号: 1-24

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/14 23:16:25

处理时间(V2): 2026/05/18 10:00:30

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流 速: 1.5ml/min


波 长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.344	43024	29.167	10288	2410	1.190	--
2	3.276	104487	70.833	11578	3141	1.214	11.257
总计		147512	100.000	21865			

图39 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6041601批-均一性2-pH4.5介质-45min-片3
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-44/30-1130-2 - zzp-6041601p-rcqx-pH4.5jz-jyx2-45min-P4.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx279.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260514-FX279.lcb

样品瓶号: 1-33

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/15 10:04:36

处理时间(V2): 2026/05/18 10:00:33

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流速: 1.5ml/min


波长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.347	43165	29.837	10338	2420	1.199	--
2	3.301	101506	70.163	11195	3162	1.213	11.343
总计		144671	100.000	21533			

图40 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6041601批-均一性2-pH4.5介质-45min-片4
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-44/30-1012-2 - zzp-6041601p-rcqx-pH4.5jz-jyx2-45min-P5.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx279.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260514-FX279.lcb

样品瓶号: 1-42

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/14 23:27:11

处理时间(V2): 2026/05/18 10:00:35

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流 速: 1.5ml/min


波 长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.344	42693	29.424	10205	2414	1.195	--
2	3.278	102404	70.576	11395	3164	1.216	11.291
总计		145097	100.000	21599			

图41 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6041601批-均一性2-pH4.5介质-45min-片5
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-44/30-1013-2 - zzp-6041601p-rcqx-pH4.5jz-jyx2-45min-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx279.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260514-FX279.lcb
样品瓶号: 1-51
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/14 23:32:34
处理时间(V2): 2026/05/18 10:00:38
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.344	43184	29.707	10310	2407	1.190	--
2	3.279	102180	70.293	11364	3159	1.210	11.284
总计		145364	100.000	21673			

图42 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6041601批-均一性2-pH4.5介质-45min-片6
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-44/30-1014-2 - zzp-6041601p-rcqx-pH4.5jz-jyx2-60min-P1.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx279.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260514-FX279.lcb

样品瓶号: 1-7

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/14 23:37:56

处理时间(V2): 2026/05/18 10:00:40

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流 速: 1.5ml/min


波 长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.344	46095	30.361	11017	2415	1.202	--
2	3.277	105731	69.639	11796	3150	1.217	11.273
总计		151826	100.000	22812			

图43 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6041601批-均一性2-pH4.5介质-60min-片1
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-44/30-1015-2 - zzp-6041601p-rcqx-pH4.5jz-jyx2-60min-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx279.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260514-FX279.lcb
样品瓶号: 1-16
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/14 23:43:19
处理时间(V2): 2026/05/18 10:00:43
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.344	46046	30.142	11009	2407	1.198	--
2	3.279	106716	69.858	11886	3167	1.218	11.292
总计		152762	100.000	22894			

图44 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6041601批-均一性2-pH4.5介质-60min-片2
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-44/30-1016-2 - zzp-6041601p-rcqx-pH4.5jz-jyx2-60min-P3.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx279.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260514-FX279.lcb

样品瓶号: 1-25

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/14 23:48:42

处理时间(V2): 2026/05/18 10:00:45

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流 速: 1.5ml/min


波 长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.344	46136	30.513	10992	2404	1.201	--
2	3.279	105065	69.487	11666	3158	1.218	11.279
总计		151201	100.000	22658			

图45 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6041601批-均一性2-pH4.5介质-60min-片3
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-44/30-1017-2 - zzp-6041601p-rcqx-pH4.5jz-jyx2-60min-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx279.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260514-FX279.lcb
样品瓶号: 1-34
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/14 23:54:05
处理时间(V2): 2026/05/18 10:00:48
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.344	46370	30.313	11042	2405	1.193	--
2	3.279	106599	69.687	11857	3163	1.222	11.288
总计		152968	100.000	22899			

图46 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6041601批-均一性2-pH4.5介质-60min-片4
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-44/30-1018-2 - zzp-6041601p-rcqx-pH4.5jz-jyx2-60min-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx279.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260514-FX279.lcb
样品瓶号: 1-43
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/14 23:59:28
处理时间(V2): 2026/05/18 10:00:50
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.344	45726	30.453	10927	2411	1.191	--
2	3.279	104428	69.547	11630	3166	1.210	11.297
总计		150154	100.000	22556			

图47 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6041601批-均一性2-pH4.5介质-60min-片5
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-44/30-1019-2 - zzp-6041601p-rcqx-pH4.5jz-jyx2-60min-P6.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx279.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260514-FX279.lcb

样品瓶号: 1-52

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/15 00:04:51

处理时间(V2): 2026/05/18 10:00:52

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流 速: 1.5ml/min


波 长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.344	46025	30.630	11021	2418	1.196	--
2	3.280	104234	69.370	11591	3146	1.217	11.279
总计		150259	100.000	22612			

图48 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6041601批-均一性2-pH4.5介质-60min-片6
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-44/30-1020-2 - zzp-6041601p-rcqx-pH4.5jz-jyx2-90min-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx279.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260514-FX279.lcb
样品瓶号: 1-8
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/15 00:10:13
处理时间(V2): 2026/05/18 10:00:55
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.345	50138	31.821	11958	2399	1.191	--
2	3.279	107424	68.179	11969	3161	1.214	11.277
总计		157563	100.000	23927			

图49 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6041601批-均一性2-pH4.5介质-90min-片1
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-45/30-1021-2 - zzp-6041601p-rcqx-pH4.5jz-jyx2-90min-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx279.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260514-FX279.lcb
样品瓶号: 1-17
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/15 00:15:38
处理时间(V2): 2026/05/18 10:02:25
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.344	50106	32.389	11977	2406	1.194	--
2	3.279	104596	67.611	11623	3169	1.213	11.297
总计		154702	100.000	23600			

图50 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6041601批-均一性2-pH4.5介质-90min-片2
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-46/30-1022-2 - zzp-6041601p-rcqx-pH4.5jz-jyx2-90min-P3.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx279.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260514-FX279.lcb

样品瓶号: 1-26

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/15 00:21:01

处理时间(V2): 2026/05/18 10:03:21

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流 速: 1.5ml/min


波 长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.345	50158	31.469	12023	2410	1.192	--
2	3.281	109230	68.531	12157	3166	1.212	11.293
总计		159388	100.000	24179			

图51 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6041601批-均一性2-pH4.5介质-90min-片3
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-46/30-1023-2 - zzp-6041601p-rcqx-pH4.5jz-jyx2-90min-P4.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx279.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260514-FX279.lcb

样品瓶号: 1-35

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/15 00:26:24

处理时间(V2): 2026/05/18 10:03:25

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流 速: 1.5ml/min


波 长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.345	50368	31.860	12035	2406	1.193	--
2	3.281	107721	68.140	11986	3152	1.217	11.275
总计		158089	100.000	24021			

图52 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6041601批-均一性2-pH4.5介质-90min-片4
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-46/30-1024-2 - zzp-6041601p-rcqx-pH4.5jz-jyx2-90min-P5.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx279.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260514-FX279.lcb

样品瓶号: 1-44

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/15 00:31:48

处理时间(V2): 2026/05/18 10:03:28

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流 速: 1.5ml/min


波 长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.344	49615	32.064	11845	2409	1.193	--
2	3.280	105122	67.936	11676	3146	1.219	11.274
总计		154738	100.000	23522			

图53 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6041601批-均一性2-pH4.5介质-90min-片5
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-46/30-1025-2 - zzp-6041601p-rcqx-pH4.5jz-jyx2-90min-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx279.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260514-FX279.lcb
样品瓶号: 1-53
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/15 00:37:11
处理时间(V2): 2026/05/18 10:03:30
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.345	50233	32.102	12044	2413	1.194	--
2	3.282	106244	67.898	11791	3167	1.212	11.300
总计		156477	100.000	23835			

图54 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6041601批-均一性2-pH4.5介质-90min-片6
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-46/30-1026-2 - zzp-6041601p-rcqx-pH4.5jz-jyx2-120min-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx279.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260514-FX279.lcb
样品瓶号: 4-1
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/15 00:42:34
处理时间(V2): 2026/05/18 10:03:33
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.345	52676	32.471	12599	2413	1.194	--
2	3.282	109550	67.529	12185	3153	1.216	11.283
总计		162225	100.000	24784			

图55 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6041601批-均一性2-pH4.5介质-120min-片1
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-46/30-1027-2 - zzp-6041601p-rcqx-pH4.5jz-jyx2-120min-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx279.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260514-FX279.lcb
样品瓶号: 4-10
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/15 00:47:57
处理时间(V2): 2026/05/18 10:03:36
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.345	52813	33.641	12616	2408	1.190	--
2	3.283	104178	66.359	11594	3166	1.215	11.299
总计		156990	100.000	24211			

图56 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6041601批-均一性2-pH4.5介质-120min-片2
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-46/30-1028-2 - zzp-6041601p-rcqx-pH4.5jz-jyx2-120min-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx279.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260514-FX279.lcb
样品瓶号: 4-19
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/15 00:53:21
处理时间(V2): 2026/05/18 10:03:38
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.345	52995	32.638	12691	2419	1.192	--
2	3.283	109375	67.362	12139	3169	1.221	11.310
总计		162369	100.000	24830			

图57 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6041601批-均一性2-pH4.5介质-120min-片3
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-46/30-1029-2 - zzp-6041601p-rcqx-pH4.5jz-jyx2-120min-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx279.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260514-FX279.lcb
样品瓶号: 4-28
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/15 00:58:44
处理时间(V2): 2026/05/18 10:03:41
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.344	52842	32.882	12635	2409	1.195	--
2	3.282	107862	67.118	12024	3157	1.216	11.293
总计		160703	100.000	24659			

图58 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6041601批-均一性2-pH4.5介质-120min-片4
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-46/30-1030-2 - zzp-6041601p-rcqx-pH4.5jz-jyx2-120min-P5.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx279.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260514-FX279.lcb

样品瓶号: 4-37

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/15 01:04:08

处理时间(V2): 2026/05/18 10:03:43

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流 速: 1.5ml/min


波 长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.344	51837	32.408	12404	2409	1.192	--
2	3.282	108114	67.592	12007	3155	1.215	11.291
总计		159951	100.000	24411			

图59 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6041601批-均一性2-pH4.5介质-120min-片5
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-46/30-1031-2 - zzp-6041601p-rcqx-pH4.5jz-jyx2-120min-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx279.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260514-FX279.lcb
样品瓶号: 4-46
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/15 01:09:29
处理时间(V2): 2026/05/18 10:03:45
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.345	53073	33.246	12701	2407	1.191	--
2	3.283	106565	66.754	11850	3158	1.210	11.289
总计		159638	100.000	24550			

图60 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6041601批-均一性2-pH4.5介质-120min-片6
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-46/30-1032-2 - zzp-6041601p-rcqx-pH4.5jz-jyx2-JX-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx279.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260514-FX279.lcb
样品瓶号: 4-2
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/15 01:14:53
处理时间(V2): 2026/05/18 10:03:48
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.344	53163	32.871	12726	2406	1.189	--
2	3.283	108568	67.129	12071	3172	1.216	11.310
总计		161731	100.000	24797			

图61 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6041601批-均一性2-pH4.5介质-极限转速-片1
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-46/30-1033-2 - zzp-6041601p-rcqx-pH4.5jz-jyx2-JX-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx279.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260514-FX279.lcb
样品瓶号: 4-11
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/15 01:20:17
处理时间(V2): 2026/05/18 10:03:50
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.345	53247	32.962	12753	2415	1.194	--
2	3.283	108293	67.038	11997	3164	1.215	11.302
总计		161540	100.000	24750			

图62 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6041601批-均一性2-pH4.5介质-极限转速-片2
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-46/30-1034-2 - zzp-6041601p-rcqx-pH4.5jz-jyx2-JX-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx279.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260514-FX279.lcb
样品瓶号: 4-20
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/15 01:25:40
处理时间(V2): 2026/05/18 10:03:53
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.345	53600	33.285	12806	2402	1.192	--
2	3.284	107434	66.715	11957	3169	1.214	11.305
总计		161034	100.000	24763			

图63 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6041601批-均一性2-pH4.5介质-极限转速-片3
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-46/30-1035-2 - zzp-6041601p-rcqx-pH4.5jz-jyx2-JX-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx279.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260514-FX279.lcb
样品瓶号: 4-29
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/15 01:31:03
处理时间(V2): 2026/05/18 10:03:55
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.345	53612	32.989	12826	2413	1.192	--
2	3.284	108904	67.011	12088	3152	1.218	11.289
总计		162516	100.000	24914			

图64 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6041601批-均一性2-pH4.5介质-极限转速-片4
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-46/30-1036-2 - zzp-6041601p-rcqx-pH4.5jz-jyx2-JX-P5.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx279.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260514-FX279.lcb

样品瓶号: 4-38

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/15 01:36:27

处理时间(V2): 2026/05/18 10:03:58

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流 速: 1.5ml/min


波 长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.345	52729	33.097	12659	2413	1.190	--
2	3.284	106587	66.903	11796	3157	1.214	11.293
总计		159316	100.000	24455			

图65 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6041601批-均一性2-pH4.5介质-极限转速-片5
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-46/30-1037-2 - zzp-6041601p-rcqx-pH4.5jz-jyx2-JX-P6.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx279.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260514-FX279.lcb

样品瓶号: 4-47

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/15 01:41:50

处理时间(V2): 2026/05/18 10:04:00

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流 速: 1.5ml/min


波 长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.345	53624	33.479	12840	2413	1.191	--
2	3.285	106547	66.521	11832	3170	1.217	11.316
总计		160171	100.000	24672			

图66 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6041601批-均一性2-pH4.5介质-极限转速-片6
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-46/30-1038-2 - zzp-6041601p-rcqx-pH4.5jz-jyx2-dz-2-1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx279.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260514-FX279.lcb
样品瓶号: 1-27
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/15 01:47:14
处理时间(V2): 2026/05/18 10:04:03
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.330	71137	11.618	15063	1814	1.185	--
2	3.332	541184	88.382	61001	3259	1.275	11.169
总计		612321	100.000	76064			

图67 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6041601批-均一性2-pH4.5介质
对照品溶液-2-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-46/30-1039-2 - zzp-6041601p-rcqx-pH4.5jz-jyx2-dz-2-2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx279.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260514-FX279.lcb
样品瓶号: 1-27
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/15 01:52:38
处理时间(V2): 2026/05/18 10:04:05
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.330	71321	11.634	15099	1815	1.187	--
2	3.332	541743	88.366	61091	3259	1.275	11.170
总计		613065	100.000	76190			

图68 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6041601批-均一性2-pH4.5介质
对照品溶液-2-2




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-46/30-1040-2 - zzp-6042201p-rcqx-pH4.5jz-jyx2-rj.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx279.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260514-FX279.lcb
样品瓶号: 2-9
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/15 01:58:04
处理时间(V2): 2026/05/18 10:04:08
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图69 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042201批-均一性2-pH4.5介质
溶剂




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-46/30-1041-2 - zzp-6042201p-rcqx-pH4.5jz-jyx2-dz-1-1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx279.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260514-FX279.lcb
样品瓶号: 2-18
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/15 02:03:30
处理时间(V2): 2026/05/18 10:04:10
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.330	69997	11.779	14753	1802	1.187	--
2	3.333	524279	88.221	59018	3257	1.270	11.158
总计		594276	100.000	73771			

图70 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042201批-均一性2-pH4.5介质
对照品溶液-1-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-46/30-1042-2 - zzp-6042201p-rcqx-pH4.5jz-jyx2-dz-1-2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx279.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260514-FX279.lcb
样品瓶号: 2-18
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/15 02:08:54
处理时间(V2): 2026/05/18 10:04:13
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.330	70178	11.771	14784	1797	1.187	--
2	3.333	526034	88.229	59149	3253	1.271	11.149
总计		596212	100.000	73933			

图71 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042201批-均一性2-pH4.5介质
对照品溶液-1-2




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-46/30-1043-2 - zzp-6042201p-rcqx-pH4.5jz-jyx2-dz-1-3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx279.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260514-FX279.lcb
样品瓶号: 2-18
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/15 02:14:19
处理时间(V2): 2026/05/18 10:04:15
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.330	70206	11.787	14787	1796	1.188	--
2	3.332	525437	88.213	59173	3252	1.270	11.151
总计		595643	100.000	73960			

图72 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042201批-均一性2-pH4.5介质
对照品溶液-1-3




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-46/30-1044-2 - zzp-6042201p-rcqx-pH4.5jz-jyx2-dz-1-4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx279.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260514-FX279.lcb
样品瓶号: 2-18
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/15 02:19:45
处理时间(V2): 2026/05/18 10:04:18
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.331	69923	11.741	14721	1796	1.187	--
2	3.334	525638	88.259	58973	3253	1.271	11.146
总计		595561	100.000	73694			

图73 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042201批-均一性2-pH4.5介质
对照品溶液-1-4




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-46/30-1045-2 - zzp-6042201p-rcqx-pH4.5jz-jyx2-dz-1-5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx279.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260514-FX279.lcb
样品瓶号: 2-18
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/15 02:25:10
处理时间(V2): 2026/05/18 10:04:20
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.331	70035	11.792	14729	1797	1.187	--
2	3.334	523874	88.208	58827	3252	1.270	11.148
总计		593909	100.000	73556			

图74 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042201批-均一性2-pH4.5介质
对照品溶液-1-5




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-46/30-1046-2 - zzp-6042201p-rcqx-pH4.5jz-jyx2-5min-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx279.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260514-FX279.lcb
样品瓶号: 2-1
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/15 02:30:34
处理时间(V2): 2026/05/18 10:04:23
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.346	12406	17.576	2967	2398	1.210	--
2	3.293	58177	82.424	6470	3173	1.188	11.332
总计		70583	100.000	9437			

图75 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042201批-均一性2-pH4.5介质-5min-片1
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-46/30-1047-2 - zzp-6042201p-rcqx-pH4.5jz-jyx2-5min-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx279.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260514-FX279.lcb
样品瓶号: 2-10
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/15 02:35:58
处理时间(V2): 2026/05/18 10:04:25
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.345	11461	17.043	2717	2382	1.206	--
2	3.294	55788	82.957	6203	3158	1.195	11.311
总计		67249	100.000	8920			

图76 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042201批-均一性2-pH4.5介质-5min-片2
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-46/30-1048-2 - zzp-6042201p-rcqx-pH4.5jz-jyx2-5min-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx279.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260514-FX279.lcb
样品瓶号: 2-19
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/15 02:41:22
处理时间(V2): 2026/05/18 10:04:27
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.346	12997	17.419	3139	2435	1.181	--
2	3.293	61613	82.581	6813	3169	1.193	11.354
总计		74610	100.000	9952			

图77 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042201批-均一性2-pH4.5介质-5min-片3
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-46/30-1049-2 - zzp-6042201p-rcqx-pH4.5jz-jyx2-5min-P4.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx279.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260514-FX279.lcb

样品瓶号: 2-28

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/15 02:46:47

处理时间(V2): 2026/05/18 10:04:31

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流 速: 1.5ml/min


波 长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.345	8448	15.766	2027	2417	1.205	--
2	3.295	45139	84.234	5025	3173	1.172	11.357
总计		53588	100.000	7052			

图78 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042201批-均一性2-pH4.5介质-5min-片4
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-46/30-1050-2 - zzp-6042201p-rcqx-pH4.5jz-jyx2-5min-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx279.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260514-FX279.lcb
样品瓶号: 2-37
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/15 02:52:12
处理时间(V2): 2026/05/18 10:04:33
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.344	13821	18.131	3330	2422	1.186	--
2	3.292	62407	81.869	6957	3184	1.199	11.367
总计		76228	100.000	10287			

图79 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042201批-均一性2-pH4.5介质-5min-片5
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-46/30-1051-2 - zzp-6042201p-rcqx-pH4.5jz-jyx2-5min-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx279.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260514-FX279.lcb
样品瓶号: 2-46
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/15 02:57:36
处理时间(V2): 2026/05/18 10:04:36
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.344	8140	15.508	1938	2409	1.203	--
2	3.295	44349	84.492	4948	3199	1.184	11.386
总计		52489	100.000	6886			

图80 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042201批-均一性2-pH4.5介质-5min-片6
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-46/30-1052-2 - zzp-6042201p-rcqx-pH4.5jz-jyx2-10min-P1.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx279.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260514-FX279.lcb

样品瓶号: 2-2

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/15 03:03:00

处理时间(V2): 2026/05/18 10:04:38

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流 速: 1.5ml/min


波 长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.345	23877	22.485	5728	2416	1.193	--
2	3.290	82313	77.515	9159	3168	1.201	11.335
总计		106190	100.000	14887			

图81 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042201批-均一性2-pH4.5介质-10min-片1
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-46/30-1053-2 - zzp-6042201p-rcqx-pH4.5jz-jyx2-10min-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx279.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260514-FX279.lcb
样品瓶号: 2-11
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/15 03:08:24
处理时间(V2): 2026/05/18 10:04:41
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.345	23030	21.805	5515	2410	1.189	--
2	3.290	82586	78.195	9170	3168	1.201	11.333
总计		105615	100.000	14685			

图82 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042201批-均一性2-pH4.5介质-10min-片2
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-46/30-1054-2 - zzp-6042201p-rcqx-pH4.5jz-jyx2-10min-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx279.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260514-FX279.lcb
样品瓶号: 2-20
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/15 03:13:48
处理时间(V2): 2026/05/18 10:04:44
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.345	23710	22.132	5686	2411	1.184	--
2	3.290	83422	77.868	9285	3181	1.201	11.348
总计		107132	100.000	14971			

图83 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042201批-均一性2-pH4.5介质-10min-片3
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-46/30-1055-2 - zzp-6042201p-rcqx-pH4.5jz-jyx2-10min-P4.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx279.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260514-FX279.lcb

样品瓶号: 2-29

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/15 03:19:12

处理时间(V2): 2026/05/18 10:04:47

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流 速: 1.5ml/min


波 长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.345	20190	20.903	4833	2415	1.191	--
2	3.290	76400	79.097	8470	3156	1.204	11.322
总计		96590	100.000	13303			

图84 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042201批-均一性2-pH4.5介质-10min-片4
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-46/30-1056-2 - zzp-6042201p-rcqx-pH4.5jz-jyx2-10min-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx279.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260514-FX279.lcb
样品瓶号: 2-38
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/15 03:24:36
处理时间(V2): 2026/05/18 10:04:49
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.345	24727	22.692	5939	2426	1.189	--
2	3.289	84239	77.308	9357	3162	1.206	11.333
总计		108966	100.000	15296			

图85 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042201批-均一性2-pH4.5介质-10min-片5
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-46/30-1057-2 - zzp-6042201p-rcqx-pH4.5jz-jyx2-10min-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx279.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260514-FX279.lcb
样品瓶号: 2-47
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/15 03:30:00
处理时间(V2): 2026/05/18 10:04:52
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.345	20210	21.312	4822	2409	1.186	--
2	3.291	74623	78.688	8300	3170	1.203	11.335
总计		94833	100.000	13122			

图86 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042201批-均一性2-pH4.5介质-10min-片6
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-46/30-1058-2 - zzp-6042201p-rcqx-pH4.5jz-jyx2-15min-P1.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx279.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260514-FX279.lcb

样品瓶号: 2-3

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/15 03:35:25

处理时间(V2): 2026/05/18 10:04:54

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流 速: 1.5ml/min


波 长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.345	29869	25.169	7139	2411	1.199	--
2	3.290	88803	74.831	9901	3174	1.212	11.339
总计		118672	100.000	17040			

图87 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042201批-均一性2-pH4.5介质-15min-片1
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-46/30-1059-2 - zzp-6042201p-rcqx-pH4.5jz-jyx2-15min-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx279.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260514-FX279.lcb
样品瓶号: 2-12
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/15 03:40:50
处理时间(V2): 2026/05/18 10:04:57
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.346	29213	24.319	7022	2416	1.196	--
2	3.293	90912	75.681	10082	3182	1.211	11.347
总计		120125	100.000	17104			

图88 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042201批-均一性2-pH4.5介质-15min-片2
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-46/30-1060-2 - zzp-6042201p-rcqx-pH4.5jz-jyx2-15min-P3.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx279.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260514-FX279.lcb

样品瓶号: 2-21

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/15 03:46:15

处理时间(V2): 2026/05/18 10:04:59

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流速: 1.5ml/min


波长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.346	29758	24.374	7138	2411	1.189	--
2	3.292	92332	75.626	10221	3171	1.211	11.329
总计		122090	100.000	17359			

图89 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042201批-均一性2-pH4.5介质-15min-片3
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-46/30-1061-2 - zzp-6042201p-rcqx-pH4.5jz-jyx2-15min-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx279.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260514-FX279.lcb
样品瓶号: 2-30
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/15 03:51:38
处理时间(V2): 2026/05/18 10:05:02
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.346	27438	23.822	6579	2402	1.193	--
2	3.292	87742	76.178	9747	3168	1.201	11.317
总计		115180	100.000	16327			

图90 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042201批-均一性2-pH4.5介质-15min-片4
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-46/30-1062-2 - zzp-6042201p-rcqx-pH4.5jz-jyx2-15min-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx279.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260514-FX279.lcb
样品瓶号: 2-39
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/15 03:57:02
处理时间(V2): 2026/05/18 10:05:04
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.347	30479	24.961	7304	2415	1.192	--
2	3.292	91631	75.039	10159	3172	1.214	11.330
总计		122110	100.000	17462			

图91 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042201批-均一性2-pH4.5介质-15min-片5
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-46/30-1063-2 - zzp-6042201p-rcqx-pH4.5jz-jyx2-15min-P6.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx279.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260514-FX279.lcb

样品瓶号: 2-48

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/15 04:02:26

处理时间(V2): 2026/05/18 10:05:07

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流 速: 1.5ml/min


波 长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.346	27174	23.812	6519	2411	1.183	--
2	3.292	86945	76.188	9607	3162	1.210	11.318
总计		114119	100.000	16125			

图92 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042201批-均一性2-pH4.5介质-15min-片6
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-46/30-1064-2 - zzp-6042201p-rcqx-pH4.5jz-jyx2-20min-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx279.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260514-FX279.lcb
样品瓶号: 2-4
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/15 04:07:50
处理时间(V2): 2026/05/18 10:05:09
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.346	33658	26.287	8086	2428	1.200	--
2	3.291	94385	73.713	10462	3174	1.209	11.348
总计		128043	100.000	18548			

图93 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042201批-均一性2-pH4.5介质-20min-片1
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-46/30-1065-2 - zzp-6042201p-rcqx-pH4.5jz-jyx2-20min-P2.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx279.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260514-FX279.lcb

样品瓶号: 2-13

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/15 04:13:16

处理时间(V2): 2026/05/18 10:05:12

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流 速: 1.5ml/min


波 长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.347	33305	25.862	7994	2417	1.186	--
2	3.293	95473	74.138	10563	3163	1.211	11.323
总计		128778	100.000	18557			

图94 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042201批-均一性2-pH4.5介质-20min-片2
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-46/30-1066-2 - zzp-6042201p-rcqx-pH4.5jz-jyx2-20min-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx279.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260514-FX279.lcb
样品瓶号: 2-22
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/15 04:18:40
处理时间(V2): 2026/05/18 10:05:14
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.346	33504	25.838	8049	2421	1.193	--
2	3.293	96164	74.162	10663	3179	1.203	11.347
总计		129667	100.000	18712			

图95 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042201批-均一性2-pH4.5介质-20min-片3
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-46/30-1067-2 - zzp-6042201p-rcqx-pH4.5jz-jyx2-20min-P4.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx279.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260514-FX279.lcb

样品瓶号: 2-31

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/15 04:24:04

处理时间(V2): 2026/05/18 10:05:17

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流 速: 1.5ml/min


波 长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.346	32064	25.456	7696	2417	1.195	--
2	3.292	93896	74.544	10400	3146	1.207	11.301
总计		125961	100.000	18097			

图96 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042201批-均一性2-pH4.5介质-20min-片4
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-46/30-1068-2 - zzp-6042201p-rcqx-pH4.5jz-jyx2-20min-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx279.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260514-FX279.lcb
样品瓶号: 2-40
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/15 04:29:28
处理时间(V2): 2026/05/18 10:05:19
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.346	34060	26.729	8164	2410	1.189	--
2	3.293	93370	73.271	10340	3168	1.213	11.324
总计		127431	100.000	18503			

图97 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042201批-均一性2-pH4.5介质-20min-片5
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-46/30-1069-2 - zzp-6042201p-rcqx-pH4.5jz-jyx2-20min-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx279.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260514-FX279.lcb
样品瓶号: 2-49
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/15 04:34:53
处理时间(V2): 2026/05/18 10:05:22
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.346	32019	25.792	7707	2428	1.190	--
2	3.293	92123	74.208	10242	3173	1.204	11.347
总计		124142	100.000	17949			

图98 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042201批-均一性2-pH4.5介质-20min-片6
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-46/30-1070-2 - zzp-6042201p-rcqx-pH4.5jz-jyx2-30min-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx279.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260514-FX279.lcb
样品瓶号: 2-5
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/15 04:40:17
处理时间(V2): 2026/05/18 10:05:24
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.346	38803	27.996	9307	2416	1.191	--
2	3.293	99801	72.004	11054	3182	1.215	11.346
总计		138604	100.000	20361			

图99 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042201批-均一性2-pH4.5介质-30min-片1
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-46/30-1071-2 - zzp-6042201p-rcqx-pH4.5jz-jyx2-30min-P2.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx279.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260514-FX279.lcb

样品瓶号: 2-14

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/15 04:45:43

处理时间(V2): 2026/05/18 10:05:26

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流 速: 1.5ml/min


波 长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.346	38461	27.607	9223	2416	1.197	--
2	3.291	100858	72.393	11145	3165	1.216	11.328
总计		139320	100.000	20367			

图100 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042201批-均一性2-pH4.5介质-30min-片2
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-46/30-1072-2 - zzp-6042201p-rcqx-pH4.5jz-jyx2-30min-P3.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx279.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260514-FX279.lcb

样品瓶号: 2-23

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/15 04:51:07

处理时间(V2): 2026/05/18 10:05:29

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流 速: 1.5ml/min


波 长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.346	38607	27.720	9230	2408	1.194	--
2	3.292	100665	72.280	11137	3152	1.209	11.308
总计		139272	100.000	20367			

图101 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042201批-均一性2-pH4.5介质-30min-片3
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-46/30-1073-2 - zzp-6042201p-rcqx-pH4.5jz-jyx2-30min-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx279.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260514-FX279.lcb
样品瓶号: 2-32
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/15 04:56:31
处理时间(V2): 2026/05/18 10:05:31
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.346	37883	27.812	9068	2415	1.195	--
2	3.291	98329	72.188	10935	3162	1.214	11.324
总计		136212	100.000	20003			

图102 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042201批-均一性2-pH4.5介质-30min-片4
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-46/30-1074-2 - zzp-6042201p-rcqx-pH4.5jz-jyx2-30min-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx279.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260514-FX279.lcb
样品瓶号: 2-41
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/15 05:01:55
处理时间(V2): 2026/05/18 10:05:34
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.346	38947	28.519	9340	2419	1.191	--
2	3.291	97619	71.481	10846	3174	1.209	11.341
总计		136566	100.000	20186			

图103 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042201批-均一性2-pH4.5介质-30min-片5
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-46/30-1075-2 - zzp-6042201p-rcqx-pH4.5jz-jyx2-30min-P6.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx279.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260514-FX279.lcb

样品瓶号: 2-50

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/15 05:07:20

处理时间(V2): 2026/05/18 10:05:36

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流 速: 1.5ml/min


波 长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.346	38093	28.236	9146	2414	1.197	--
2	3.293	96814	71.764	10742	3165	1.210	11.325
总计		134907	100.000	19888			

图104 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042201批-均一性2-pH4.5介质-30min-片6
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-46/30-1076-2 - zzp-6042201p-rcqx-pH4.5jz-jyx2-45min-P1.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx279.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260514-FX279.lcb

样品瓶号: 2-6

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/15 05:12:45

处理时间(V2): 2026/05/18 10:05:39

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流 速: 1.5ml/min


波 长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.346	43325	29.526	10408	2406	1.193	--
2	3.292	103410	70.474	11437	3157	1.220	11.308
总计		146735	100.000	21845			

图105 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042201批-均一性2-pH4.5介质-45min-片1
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-46/30-1077-2 - zzp-6042201p-rcqx-pH4.5jz-jyx2-45min-P2.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx279.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260514-FX279.lcb

样品瓶号: 2-15

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/15 05:18:10

处理时间(V2): 2026/05/18 10:05:41

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流 速: 1.5ml/min


波 长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.347	43235	29.662	10358	2409	1.190	--
2	3.293	102524	70.338	11340	3172	1.213	11.328
总计		145759	100.000	21698			

图106 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042201批-均一性2-pH4.5介质-45min-片2
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-46/30-1078-2 - zzp-6042201p-rcqx-pH4.5jz-jyx2-45min-P3.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx279.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260514-FX279.lcb

样品瓶号: 2-24

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/15 05:23:34

处理时间(V2): 2026/05/18 10:05:44

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流 速: 1.5ml/min


波 长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.346	43315	29.819	10376	2411	1.195	--
2	3.293	101945	70.181	11314	3171	1.213	11.331
总计		145260	100.000	21690			

图107 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042201批-均一性2-pH4.5介质-45min-片3
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-46/30-1079-2 - zzp-6042201p-rcqx-pH4.5jz-jyx2-45min-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx279.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260514-FX279.lcb
样品瓶号: 2-33
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/15 05:28:58
处理时间(V2): 2026/05/18 10:05:46
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.346	42905	29.538	10312	2420	1.190	--
2	3.292	102350	70.462	11323	3159	1.209	11.327
总计		145255	100.000	21636			

图108 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042201批-均一性2-pH4.5介质-45min-片4
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-46/30-1080-2 - zzp-6042201p-rcqx-pH4.5jz-jyx2-45min-P5.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx279.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260514-FX279.lcb

样品瓶号: 2-42

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/15 05:34:23

处理时间(V2): 2026/05/18 10:05:49

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流 速: 1.5ml/min


波 长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.346	43557	30.089	10433	2409	1.191	--
2	3.292	101203	69.911	11211	3168	1.211	11.328
总计		144760	100.000	21644			

图109 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042201批-均一性2-pH4.5介质-45min-片5
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-46/30-1081-2 - zzp-6042201p-rcqx-pH4.5jz-jyx2-45min-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx279.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260514-FX279.lcb
样品瓶号: 2-51
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/15 05:39:47
处理时间(V2): 2026/05/18 10:05:51
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.346	43677	30.159	10453	2414	1.191	--
2	3.292	101145	69.841	11200	3168	1.205	11.334
总计		144822	100.000	21652			

图110 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042201批-均一性2-pH4.5介质-45min-片6
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-46/30-1082-2 - zzp-6042201p-rcqx-pH4.5jz-jyx2-60min-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx279.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260514-FX279.lcb
样品瓶号: 2-7
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/15 05:45:12
处理时间(V2): 2026/05/18 10:05:54
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.346	46219	30.966	11083	2414	1.192	--
2	3.293	103036	69.034	11439	3176	1.213	11.346
总计		149254	100.000	22522			

图111 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042201批-均一性2-pH4.5介质-60min-片1
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-46/30-1083-2 - zzp-6042201p-rcqx-pH4.5jz-jyx2-60min-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx279.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260514-FX279.lcb
样品瓶号: 2-16
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/15 05:50:38
处理时间(V2): 2026/05/18 10:05:56
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.346	46258	30.290	11075	2410	1.191	--
2	3.293	106460	69.710	11805	3176	1.214	11.342
总计		152718	100.000	22880			

图112 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042201批-均一性2-pH4.5介质-60min-片2
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-46/30-1084-2 - zzp-6042201p-rcqx-pH4.5jz-jyx2-60min-P3.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx279.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260514-FX279.lcb

样品瓶号: 2-25

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/15 05:56:02

处理时间(V2): 2026/05/18 10:05:59

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流 速: 1.5ml/min


波 长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.346	46057	30.581	11075	2424	1.191	--
2	3.294	104549	69.419	11598	3176	1.216	11.351
总计		150606	100.000	22674			

图113 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042201批-均一性2-pH4.5介质-60min-片3
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-46/30-1085-2 - zzp-6042201p-rcqx-pH4.5jz-jyx2-60min-P4.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx279.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260514-FX279.lcb

样品瓶号: 2-34

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/15 06:01:27

处理时间(V2): 2026/05/18 10:06:01

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流 速: 1.5ml/min


波 长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.346	46358	30.894	11108	2413	1.196	--
2	3.292	103697	69.106	11508	3182	1.218	11.350
总计		150056	100.000	22617			

图114 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042201批-均一性2-pH4.5介质-60min-片4
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-46/30-1086-2 - zzp-6042201p-rcqx-pH4.5jz-jyx2-60min-P5.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx279.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260514-FX279.lcb

样品瓶号: 2-43

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/15 06:06:51

处理时间(V2): 2026/05/18 10:06:03

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流 速: 1.5ml/min


波 长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.346	46590	31.358	11164	2410	1.191	--
2	3.294	101982	68.642	11290	3175	1.209	11.336
总计		148572	100.000	22455			

图115 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042201批-均一性2-pH4.5介质-60min-片5
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-46/30-1087-2 - zzp-6042201p-rcqx-pH4.5jz-jyx2-60min-P6.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx279.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260514-FX279.lcb

样品瓶号: 2-52

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/15 06:12:16

处理时间(V2): 2026/05/18 10:06:06

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流 速: 1.5ml/min


波 长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.346	46912	31.141	11243	2411	1.189	--
2	3.295	103730	68.859	11500	3159	1.218	11.324
总计		150641	100.000	22743			

图116 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042201批-均一性2-pH4.5介质-60min-片6
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-46/30-1088-2 - zzp-6042201p-rcqx-pH4.5jz-jyx2-90min-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx279.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260514-FX279.lcb
样品瓶号: 2-8
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/15 06:17:42
处理时间(V2): 2026/05/18 10:06:09
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.347	50206	32.078	12084	2419	1.192	--
2	3.295	106306	67.922	11759	3167	1.216	11.335
总计		156512	100.000	23843			

图117 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042201批-均一性2-pH4.5介质-90min-片1
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-46/30-1089-2 - zzp-6042201p-rcqx-pH4.5jz-jyx2-90min-P2.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx279.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260514-FX279.lcb

样品瓶号: 2-17

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/15 06:23:06

处理时间(V2): 2026/05/18 10:06:11

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流 速: 1.5ml/min


波 长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.347	49992	31.945	12009	2413	1.192	--
2	3.294	106501	68.055	11801	3171	1.222	11.335
总计		156494	100.000	23810			

图118 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042201批-均一性2-pH4.5介质-90min-片2
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-46/30-1090-2 - zzp-6042201p-rcqx-pH4.5jz-jyx2-90min-P3.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx279.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260514-FX279.lcb

样品瓶号: 2-26

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/15 06:28:30

处理时间(V2): 2026/05/18 10:06:13

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流 速: 1.5ml/min


波 长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.347	50086	32.181	12017	2414	1.193	--
2	3.295	105552	67.819	11704	3183	1.221	11.351
总计		155637	100.000	23721			

图119 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042201批-均一性2-pH4.5介质-90min-片3
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-46/30-1091-2 - zzp-6042201p-rcqx-pH4.5jz-jyx2-90min-P4.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx279.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260514-FX279.lcb

样品瓶号: 2-35

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/15 06:33:54

处理时间(V2): 2026/05/18 10:06:16

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流 速: 1.5ml/min


波 长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.347	50479	32.438	12105	2417	1.190	--
2	3.295	105141	67.562	11648	3168	1.215	11.336
总计		155620	100.000	23753			

图120 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042201批-均一性2-pH4.5介质-90min-片4
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-46/30-1092-2 - zzp-6042201p-rcqx-pH4.5jz-jyx2-90min-P5.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx279.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260514-FX279.lcb

样品瓶号: 2-44

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/15 06:39:18

处理时间(V2): 2026/05/18 10:06:18

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流 速: 1.5ml/min


波 长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.347	50341	33.019	12081	2416	1.191	--
2	3.295	102121	66.981	11331	3171	1.208	11.339
总计		152462	100.000	23412			

图121 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042201批-均一性2-pH4.5介质-90min-片5
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-46/30-1093-2 - zzp-6042201p-rcqx-pH4.5jz-jyx2-90min-P6.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx279.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260514-FX279.lcb

样品瓶号: 2-53

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/15 06:44:43

处理时间(V2): 2026/05/18 10:06:21

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流 速: 1.5ml/min


波 长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.346	50948	32.528	12247	2416	1.192	--
2	3.296	105680	67.472	11718	3178	1.216	11.352
总计		156628	100.000	23965			

图122 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042201批-均一性2-pH4.5介质-90min-片6
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-46/30-1094-2 - zzp-6042201p-rcqx-pH4.5jz-jyx2-120min-P1.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx279.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260514-FX279.lcb

样品瓶号: 4-3

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/15 06:50:06

处理时间(V2): 2026/05/18 10:06:23

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流 速: 1.5ml/min


波 长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.347	52805	32.822	12704	2421	1.195	--
2	3.296	108076	67.178	12025	3172	1.212	11.347
总计		160881	100.000	24729			

图123 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042201批-均一性2-pH4.5介质-120min-片1
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-46/30-1095-2 - zzp-6042201p-rcqx-pH4.5jz-jyx2-120min-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx279.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260514-FX279.lcb
样品瓶号: 4-12
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/15 06:55:30
处理时间(V2): 2026/05/18 10:06:26
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.347	52522	33.342	12593	2420	1.194	--
2	3.295	105003	66.658	11659	3161	1.216	11.330
总计		157524	100.000	24252			

图124 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042201批-均一性2-pH4.5介质-120min-片2
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-46/30-1096-2 - zzp-6042201p-rcqx-pH4.5jz-jyx2-120min-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx279.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260514-FX279.lcb
样品瓶号: 4-21
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/15 07:00:54
处理时间(V2): 2026/05/18 10:06:28
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.347	52815	32.999	12649	2413	1.193	--
2	3.295	107235	67.001	11905	3171	1.215	11.337
总计		160050	100.000	24554			

图125 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042201批-均一性2-pH4.5介质-120min-片3
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-46/30-1097-2 - zzp-6042201p-rcqx-pH4.5jz-jyx2-120min-P4.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx279.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260514-FX279.lcb

样品瓶号: 4-30

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/15 07:06:16

处理时间(V2): 2026/05/18 10:06:31

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流 速: 1.5ml/min


波 长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.347	52905	33.343	12716	2420	1.188	--
2	3.296	105762	66.657	11743	3175	1.213	11.348
总计		158667	100.000	24459			

图126 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042201批-均一性2-pH4.5介质-120min-片4
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-46/30-1098-2 - zzp-6042201p-rcqx-pH4.5jz-jyx2-120min-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx279.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260514-FX279.lcb
样品瓶号: 4-39
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/15 07:11:39
处理时间(V2): 2026/05/18 10:06:33
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.347	52731	32.936	12646	2415	1.191	--
2	3.295	107369	67.064	11898	3185	1.212	11.353
总计		160100	100.000	24545			

图127 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042201批-均一性2-pH4.5介质-120min-片5
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-46/30-1099-2 - zzp-6042201p-rcqx-pH4.5jz-jyx2-120min-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx279.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260514-FX279.lcb
样品瓶号: 4-48
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/15 07:17:02
处理时间(V2): 2026/05/18 10:06:36
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.347	53803	33.962	12866	2410	1.194	--
2	3.296	104619	66.038	11577	3162	1.218	11.327
总计		158422	100.000	24443			

图128 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042201批-均一性2-pH4.5介质-120min-片6
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-46/30-1100-2 - zzp-6042201p-rcqx-pH4.5jz-jyx2-JX-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx279.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260514-FX279.lcb
样品瓶号: 4-4
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/15 07:22:26
处理时间(V2): 2026/05/18 10:06:38
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.347	53688	33.309	12886	2421	1.191	--
2	3.297	107492	66.691	11920	3163	1.217	11.336
总计		161180	100.000	24806			

图129 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042201批-均一性2-pH4.5介质-极限转速-片1
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-46/30-1101-2 - zzp-6042201p-rcqx-pH4.5jz-jyx2-JX-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx279.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260514-FX279.lcb
样品瓶号: 4-13
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/15 07:27:50
处理时间(V2): 2026/05/18 10:06:41
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.347	53231	36.005	12738	2414	1.192	--
2	3.298	94614	63.995	10514	3189	1.205	11.367
总计		147846	100.000	23252			

图130 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042201批-均一性2-pH4.5介质-极限转速-片2
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-46/30-1102-2 - zzp-6042201p-rcqx-pH4.5jz-jyx2-JX-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx279.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260514-FX279.lcb
样品瓶号: 4-22
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/15 07:33:12
处理时间(V2): 2026/05/18 10:06:43
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.347	53366	33.470	12788	2420	1.194	--
2	3.298	106079	66.530	11776	3183	1.214	11.361
总计		159445	100.000	24564			

图131 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042201批-均一性2-pH4.5介质-极限转速-片3
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-46/30-1103-2 - zzp-6042201p-rcqx-pH4.5jz-jyx2-JX-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx279.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260514-FX279.lcb
样品瓶号: 4-31
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/15 07:38:36
处理时间(V2): 2026/05/18 10:06:46
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.347	53727	33.467	12889	2423	1.196	--
2	3.297	106809	66.533	11847	3186	1.213	11.368
总计		160535	100.000	24735			

图132 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042201批-均一性2-pH4.5介质-极限转速-片4
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-46/30-1104-2 - zzp-6042201p-rcqx-pH4.5jz-jyx2-JX-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx279.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260514-FX279.lcb
样品瓶号: 4-40
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/15 07:43:59
处理时间(V2): 2026/05/18 10:06:48
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.347	53697	35.481	12861	2412	1.192	--
2	3.298	97643	64.519	10842	3163	1.206	11.332
总计		151340	100.000	23704			

图133 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042201批-均一性2-pH4.5介质-极限转速-片5
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-46/30-1105-2 - zzp-6042201p-rcqx-pH4.5jz-jyx2-JX-P6.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx279.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260514-FX279.lcb

样品瓶号: 4-49

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/15 07:49:22

处理时间(V2): 2026/05/18 10:06:51

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流速: 1.5ml/min


波长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.347	54495	34.002	13067	2417	1.192	--
2	3.298	105774	65.998	11715	3170	1.215	11.345
总计		160269	100.000	24782			

图134 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042201批-均一性2-pH4.5介质-极限转速-片6
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-46/30-1106-2 - zzp-6042201p-rcqx-pH4.5jz-jyx2-dz-2-1.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx279.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260514-FX279.lcb

样品瓶号: 2-27

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/15 07:54:46

处理时间(V2): 2026/05/18 10:06:53

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流 速: 1.5ml/min


波 长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.332	70463	11.747	14826	1805	1.189	--
2	3.345	529363	88.253	59373	3256	1.274	11.185
总计		599825	100.000	74199			

图135 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042201批-均一性2-pH4.5介质
对照品溶液-2-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-46/30-1107-2 - zzp-6042201p-rcqx-pH4.5jz-jyx2-dz-2-2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx279.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260514-FX279.lcb
样品瓶号: 2-27
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/15 08:00:11
处理时间(V2): 2026/05/18 10:06:56
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.332	70308	11.739	14785	1805	1.188	--
2	3.345	528604	88.261	59373	3259	1.273	11.189
总计		598912	100.000	74159			

图136 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042201批-均一性2-pH4.5介质
对照品溶液-2-2




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-46/30-1108-2 - zzp-6042401p-rcqx-pH4.5jz-jyx2-rj.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx279.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260514-FX279.lcb
样品瓶号: 3-9
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/15 08:05:34
处理时间(V2): 2026/05/18 10:06:58
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图137 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042401批-均一性2-pH4.5介质
溶剂



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-46/30-1109-2 - zzp-6042401p-rcqx-pH4.5jz-jyx2-dz-1-1.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx279.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260514-FX279.lcb

样品瓶号: 3-18

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/15 08:10:57

处理时间(V2): 2026/05/18 10:07:01

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流 速: 1.5ml/min


波 长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.333	70349	11.801	14737	1797	1.190	--
2	3.346	525802	88.199	59044	3258	1.272	11.179
总计		596152	100.000	73781			

图138 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042401批-均一性2-pH4.5介质
对照品溶液-1-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-46/30-1110-2 - zzp-6042401p-rcqx-pH4.5jz-jyx2-dz-1-2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx279.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260514-FX279.lcb
样品瓶号: 3-18
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/15 08:16:20
处理时间(V2): 2026/05/18 10:07:03
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.332	70058	11.768	14713	1801	1.191	--
2	3.346	525252	88.232	59010	3260	1.273	11.187
总计		595311	100.000	73723			

图139 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042401批-均一性2-pH4.5介质
对照品溶液-1-2




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-46/30-1111-2 - zzp-6042401p-rcqx-pH4.5jz-jyx2-dz-1-3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx279.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260514-FX279.lcb
样品瓶号: 3-18
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/15 08:21:43
处理时间(V2): 2026/05/18 10:07:06
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.333	70281	11.788	14737	1800	1.185	--
2	3.346	525939	88.212	59073	3259	1.273	11.184
总计		596221	100.000	73810			

图140 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042401批-均一性2-pH4.5介质
对照品溶液-1-3




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-46/30-1112-2 - zzp-6042401p-rcqx-pH4.5jz-jyx2-dz-1-4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx279.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260514-FX279.lcb
样品瓶号: 3-18
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/15 08:27:06
处理时间(V2): 2026/05/18 10:07:08
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.332	69973	11.748	14735	1807	1.185	--
2	3.346	525643	88.252	59037	3263	1.273	11.198
总计		595617	100.000	73772			

图141 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042401批-均一性2-pH4.5介质
对照品溶液-1-4




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-46/30-1113-2 - zzp-6042401p-rcqx-pH4.5jz-jyx2-dz-1-5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx279.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260514-FX279.lcb
样品瓶号: 3-18
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/15 08:32:29
处理时间(V2): 2026/05/18 10:07:11
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.333	70187	11.780	14692	1799	1.188	--
2	3.347	525616	88.220	58998	3261	1.272	11.185
总计		595803	100.000	73690			

图142 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042401批-均一性2-pH4.5介质
对照品溶液-1-5




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-46/30-1114-2 - zzp-6042401p-rcqx-pH4.5jz-jyx2-5min-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx279.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260514-FX279.lcb
样品瓶号: 3-1
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/15 08:37:52
处理时间(V2): 2026/05/18 10:07:13
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.348	15850	19.030	3807	2408	1.184	--
2	3.304	67440	80.970	7474	3173	1.187	11.360
总计		83290	100.000	11281			

图143 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042401批-均一性2-pH4.5介质-5min-片1
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-46/30-1115-2 - zzp-6042401p-rcqx-pH4.5jz-jyx2-5min-P2.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx279.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260514-FX279.lcb

样品瓶号: 3-10

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/15 08:43:15

处理时间(V2): 2026/05/18 10:07:16

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流 速: 1.5ml/min


波 长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.347	14705	18.685	3534	2420	1.199	--
2	3.305	63995	81.315	7112	3171	1.187	11.370
总计		78700	100.000	10646			

图144 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042401批-均一性2-pH4.5介质-5min-片2
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-46/30-1116-2 - zzp-6042401p-rcqx-pH4.5jz-jyx2-5min-P3.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx279.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260514-FX279.lcb

样品瓶号: 3-19

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/15 08:48:37

处理时间(V2): 2026/05/18 10:07:18

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流 速: 1.5ml/min


波 长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.347	14628	18.590	3522	2434	1.185	--
2	3.304	64058	81.410	7131	3184	1.187	11.396
总计		78686	100.000	10652			

图145 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042401批-均一性2-pH4.5介质-5min-片3
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-46/30-1117-2 - zzp-6042401p-rcqx-pH4.5jz-jyx2-5min-P4.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx279.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260514-FX279.lcb

样品瓶号: 3-28

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/15 08:54:00

处理时间(V2): 2026/05/18 10:07:21

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流 速: 1.5ml/min


波 长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.347	14751	18.132	3544	2420	1.203	--
2	3.303	66599	81.868	7377	3159	1.196	11.351
总计		81350	100.000	10920			

图146 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042401批-均一性2-pH4.5介质-5min-片4
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-46/30-1118-2 - zzp-6042401p-rcqx-pH4.5jz-jyx2-5min-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx279.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260514-FX279.lcb
样品瓶号: 3-37
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/15 08:59:22
处理时间(V2): 2026/05/18 10:07:23
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.347	13644	18.401	3261	2404	1.184	--
2	3.305	60504	81.599	6704	3195	1.192	11.388
总计		74149	100.000	9965			

图147 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042401批-均一性2-pH4.5介质-5min-片5
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-46/30-1119-2 - zzp-6042401p-rcqx-pH4.5jz-jyx2-5min-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx279.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260514-FX279.lcb
样品瓶号: 3-46
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/15 09:04:45
处理时间(V2): 2026/05/18 10:07:26
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.347	10120	16.950	2401	2402	1.179	--
2	3.306	49585	83.050	5493	3192	1.200	11.390
总计		59705	100.000	7894			

图148 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042401批-均一性2-pH4.5介质-5min-片6
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-46/30-1120-2 - zzp-6042401p-rcqx-pH4.5jz-jyx2-10min-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx279.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260514-FX279.lcb
样品瓶号: 3-2
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/15 09:10:08
处理时间(V2): 2026/05/18 10:07:28
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.346	25790	22.683	6191	2417	1.189	--
2	3.300	87906	77.317	9696	3170	1.211	11.358
总计		113696	100.000	15887			

图149 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042401批-均一性2-pH4.5介质-10min-片1
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-46/30-1121-2 - zzp-6042401p-rcqx-pH4.5jz-jyx2-10min-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx279.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260514-FX279.lcb
样品瓶号: 3-11
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/15 09:15:30
处理时间(V2): 2026/05/18 10:07:31
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.347	25203	23.440	6013	2401	1.195	--
2	3.302	82319	76.560	9121	3158	1.198	11.331
总计		107522	100.000	15134			

图150 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042401批-均一性2-pH4.5介质-10min-片2
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-46/30-1122-2 - zzp-6042401p-rcqx-pH4.5jz-jyx2-10min-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx279.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260514-FX279.lcb
样品瓶号: 3-20
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/15 09:20:52
处理时间(V2): 2026/05/18 10:07:33
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.347	25515	23.098	6109	2408	1.198	--
2	3.302	84951	76.902	9432	3181	1.199	11.363
总计		110466	100.000	15541			

图151 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042401批-均一性2-pH4.5介质-10min-片3
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-46/30-1123-2 - zzp-6042401p-rcqx-pH4.5jz-jyx2-10min-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx279.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260514-FX279.lcb
样品瓶号: 3-29
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/15 09:26:14
处理时间(V2): 2026/05/18 10:07:36
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.347	25153	23.299	6021	2412	1.195	--
2	3.302	82801	76.701	9177	3188	1.206	11.377
总计		107953	100.000	15198			

图152 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042401批-均一性2-pH4.5介质-10min-片4
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-46/30-1124-2 - zzp-6042401p-rcqx-pH4.5jz-jyx2-10min-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx279.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260514-FX279.lcb
样品瓶号: 3-38
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/15 09:31:37
处理时间(V2): 2026/05/18 10:07:38
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.347	24796	22.948	5951	2418	1.190	--
2	3.303	83258	77.052	9199	3164	1.192	11.352
总计		108054	100.000	15151			

图153 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042401批-均一性2-pH4.5介质-10min-片5
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-46/30-1125-2 - zzp-6042401p-rcqx-pH4.5jz-jyx2-10min-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx279.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260514-FX279.lcb
样品瓶号: 3-47
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/15 09:37:00
处理时间(V2): 2026/05/18 10:07:41
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.347	22253	21.706	5323	2422	1.187	--
2	3.303	80269	78.294	8885	3173	1.204	11.367
总计		102522	100.000	14208			

图154 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042401批-均一性2-pH4.5介质-10min-片6
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-46/30-1126-2 - zzp-6042401p-rcqx-pH4.5jz-jyx2-15min-P1.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx279.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260514-FX279.lcb

样品瓶号: 3-3

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/15 09:42:21

处理时间(V2): 2026/05/18 10:07:43

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流 速: 1.5ml/min


波 长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.347	30966	24.535	7426	2415	1.196	--
2	3.300	95247	75.465	10502	3161	1.211	11.344
总计		126213	100.000	17928			

图155 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042401批-均一性2-pH4.5介质-15min-片1
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-46/30-1127-2 - zzp-6042401p-rcqx-pH4.5jz-jyx2-15min-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx279.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260514-FX279.lcb
样品瓶号: 3-12
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/15 09:47:44
处理时间(V2): 2026/05/18 10:07:46
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.348	30283	25.586	7269	2409	1.191	--
2	3.302	88074	74.414	9748	3189	1.207	11.374
总计		118357	100.000	17017			

图156 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042401批-均一性2-pH4.5介质-15min-片2
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-46/30-1128-2 - zzp-6042401p-rcqx-pH4.5jz-jyx2-15min-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx279.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260514-FX279.lcb
样品瓶号: 3-21
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/15 09:53:06
处理时间(V2): 2026/05/18 10:07:48
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.347	31028	25.466	7420	2411	1.191	--
2	3.302	90811	74.534	10026	3166	1.206	11.347
总计		121839	100.000	17446			

图157 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042401批-均一性2-pH4.5介质-15min-片3
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-46/30-1129-2 - zzp-6042401p-rcqx-pH4.5jz-jyx2-15min-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx279.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260514-FX279.lcb
样品瓶号: 3-30
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/15 09:58:29
处理时间(V2): 2026/05/18 10:07:50
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.347	30704	25.518	7362	2414	1.196	--
2	3.301	89621	74.482	9909	3172	1.209	11.355
总计		120326	100.000	17272			

图158 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042401批-均一性2-pH4.5介质-15min-片4
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-46/30-1131-2 - zzp-6042401p-rcqx-pH4.5jz-jyx2-15min-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx279.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260514-FX279.lcb
样品瓶号: 3-39
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/15 10:12:17
处理时间(V2): 2026/05/18 10:07:53
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.347	30347	25.282	7253	2402	1.191	--
2	3.303	89689	74.718	9962	3185	1.204	11.365
总计		120037	100.000	17215			

图159 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042401批-均一性2-pH4.5介质-15min-片5
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-46/30-1132-2 - zzp-6042401p-rcqx-pH4.5jz-jyx2-15min-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx279.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260514-FX279.lcb
样品瓶号: 3-48
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/15 10:17:39
处理时间(V2): 2026/05/18 10:07:56
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.348	28666	24.201	6849	2410	1.198	--
2	3.303	89785	75.799	9935	3186	1.206	11.372
总计		118451	100.000	16784			

图160 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042401批-均一性2-pH4.5介质-15min-片6
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-46/30-1133-2 - zzp-6042401p-rcqx-pH4.5jz-jyx2-20min-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx279.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260514-FX279.lcb
样品瓶号: 3-4
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/15 10:23:02
处理时间(V2): 2026/05/18 10:07:58
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.347	34324	27.274	8195	2403	1.198	--
2	3.302	91524	72.726	10156	3190	1.203	11.376
总计		125848	100.000	18352			

图161 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042401批-均一性2-pH4.5介质-20min-片1
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-46/30-1134-2 - zzp-6042401p-rcqx-pH4.5jz-jyx2-20min-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx279.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260514-FX279.lcb
样品瓶号: 3-13
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/15 10:28:23
处理时间(V2): 2026/05/18 10:08:01
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.347	33751	26.347	8094	2413	1.188	--
2	3.301	94351	73.653	10443	3188	1.206	11.378
总计		128103	100.000	18537			

图162 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042401批-均一性2-pH4.5介质-20min-片2
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-46/30-1135-2 - zzp-6042401p-rcqx-pH4.5jz-jyx2-20min-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx279.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260514-FX279.lcb
样品瓶号: 3-22
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/15 10:33:46
处理时间(V2): 2026/05/18 10:08:03
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.347	34544	26.662	8272	2411	1.183	--
2	3.301	95018	73.338	10507	3178	1.213	11.365
总计		129562	100.000	18779			

图163 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042401批-均一性2-pH4.5介质-20min-片3
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-46/30-1136-2 - zzp-6042401p-rcqx-pH4.5jz-jyx2-20min-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx279.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260514-FX279.lcb
样品瓶号: 3-31
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/15 10:39:07
处理时间(V2): 2026/05/18 10:08:05
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.347	34530	26.809	8278	2414	1.190	--
2	3.301	94271	73.191	10403	3171	1.209	11.358
总计		128802	100.000	18681			

图164 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042401批-均一性2-pH4.5介质-20min-片4
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-46/30-1137-2 - zzp-6042401p-rcqx-pH4.5jz-jyx2-20min-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx279.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260514-FX279.lcb
样品瓶号: 3-40
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/15 10:44:30
处理时间(V2): 2026/05/18 10:08:08
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.347	32663	25.802	7854	2413	1.188	--
2	3.303	93930	74.198	10380	3176	1.212	11.362
总计		126593	100.000	18234			

图165 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042401批-均一性2-pH4.5介质-20min-片5
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-46/30-1138-2 - zzp-6042401p-rcqx-pH4.5jz-jyx2-20min-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx279.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260514-FX279.lcb
样品瓶号: 3-49
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/15 10:49:51
处理时间(V2): 2026/05/18 10:08:10
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.348	32633	27.010	7841	2425	1.192	--
2	3.304	88184	72.990	9785	3179	1.197	11.378
总计		120817	100.000	17627			

图166 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042401批-均一性2-pH4.5介质-20min-片6
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-46/30-1139-2 - zzp-6042401p-rcqx-pH4.5jz-jyx2-30min-P1.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx279.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260514-FX279.lcb

样品瓶号: 3-5

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/15 10:55:13

处理时间(V2): 2026/05/18 10:08:13

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流 速: 1.5ml/min


波 长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.347	38985	28.439	9343	2408	1.190	--
2	3.301	98096	71.561	10858	3173	1.216	11.359
总计		137081	100.000	20200			

图167 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042401批-均一性2-pH4.5介质-30min-片1
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-46/30-1140-2 - zzp-6042401p-rcqx-pH4.5jz-jyx2-30min-P2.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx279.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260514-FX279.lcb

样品瓶号: 3-14

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/15 11:00:36

处理时间(V2): 2026/05/18 10:08:15

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流 速: 1.5ml/min


波 长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.347	38325	27.759	9170	2420	1.193	--
2	3.301	99736	72.241	11034	3189	1.205	11.384
总计		138061	100.000	20203			

图168 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042401批-均一性2-pH4.5介质-30min-片2
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-46/30-1141-2 - zzp-6042401p-rcqx-pH4.5jz-jyx2-30min-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx279.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260514-FX279.lcb
样品瓶号: 3-23
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/15 11:05:58
处理时间(V2): 2026/05/18 10:08:18
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.347	39138	29.804	9388	2410	1.193	--
2	3.303	92180	70.196	10233	3197	1.202	11.392
总计		131319	100.000	19621			

图169 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042401批-均一性2-pH4.5介质-30min-片3
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-46/30-1142-2 - zzp-6042401p-rcqx-pH4.5jz-jyx2-30min-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx279.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260514-FX279.lcb
样品瓶号: 3-32
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/15 11:11:19
处理时间(V2): 2026/05/18 10:08:20
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.347	39394	30.893	9429	2411	1.197	--
2	3.303	88125	69.107	9736	3181	1.204	11.376
总计		127519	100.000	19165			

图170 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042401批-均一性2-pH4.5介质-30min-片4
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-46/30-1143-2 - zzp-6042401p-rcqx-pH4.5jz-jyx2-30min-P5.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx279.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260514-FX279.lcb

样品瓶号: 3-41

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/15 11:16:42

处理时间(V2): 2026/05/18 10:08:23

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流 速: 1.5ml/min


波 长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.347	38846	28.467	9293	2406	1.192	--
2	3.302	97614	71.533	10797	3176	1.210	11.361
总计		136460	100.000	20090			

图171 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042401批-均一性2-pH4.5介质-30min-片5
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-46/30-1144-2 - zzp-6042401p-rcqx-pH4.5jz-jyx2-30min-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx279.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260514-FX279.lcb
样品瓶号: 3-50
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/15 11:22:03
处理时间(V2): 2026/05/18 10:08:25
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.347	37859	27.956	9092	2418	1.198	--
2	3.302	97564	72.044	10801	3187	1.212	11.386
总计		135424	100.000	19893			

图172 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042401批-均一性2-pH4.5介质-30min-片6
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-46/30-1145-2 - zzp-6042401p-rcqx-pH4.5jz-jyx2-45min-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx279.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260514-FX279.lcb
样品瓶号: 3-6
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/15 11:27:25
处理时间(V2): 2026/05/18 10:08:28
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.347	43244	29.401	10362	2410	1.191	--
2	3.301	103840	70.599	11485	3176	1.215	11.363
总计		147084	100.000	21847			

图173 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042401批-均一性2-pH4.5介质-45min-片1
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-46/30-1146-2 - zzp-6042401p-rcqx-pH4.5jz-jyx2-45min-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx279.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260514-FX279.lcb
样品瓶号: 3-15
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/15 11:32:47
处理时间(V2): 2026/05/18 10:08:30
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.347	42916	29.297	10280	2414	1.193	--
2	3.302	103569	70.703	11472	3177	1.216	11.368
总计		146485	100.000	21751			

图174 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042401批-均一性2-pH4.5介质-45min-片2
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-46/30-1147-2 - zzp-6042401p-rcqx-pH4.5jz-jyx2-45min-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx279.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260514-FX279.lcb
样品瓶号: 3-24
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/15 11:38:09
处理时间(V2): 2026/05/18 10:08:33
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.347	43673	30.890	10475	2420	1.195	--
2	3.302	97710	69.110	10798	3163	1.209	11.357
总计		141383	100.000	21273			

图175 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042401批-均一性2-pH4.5介质-45min-片3
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-46/30-1148-2 - zzp-6042401p-rcqx-pH4.5jz-jyx2-45min-P4.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx279.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260514-FX279.lcb

样品瓶号: 3-33

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/15 11:43:31

处理时间(V2): 2026/05/18 10:08:35

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流 速: 1.5ml/min


波 长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.347	43660	28.499	10486	2414	1.189	--
2	3.300	109536	71.501	12068	3164	1.215	11.347
总计		153195	100.000	22555			

图176 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042401批-均一性2-pH4.5介质-45min-片4
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-46/30-1149-2 - zzp-6042401p-rcqx-pH4.5jz-jyx2-45min-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx279.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260514-FX279.lcb
样品瓶号: 3-42
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/15 11:48:53
处理时间(V2): 2026/05/18 10:08:38
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.347	43004	29.754	10276	2406	1.193	--
2	3.303	101528	70.246	11260	3190	1.212	11.383
总计		144532	100.000	21536			

图177 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042401批-均一性2-pH4.5介质-45min-片5
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-46/30-1150-2 - zzp-6042401p-rcqx-pH4.5jz-jyx2-45min-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx279.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260514-FX279.lcb
样品瓶号: 3-51
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/15 11:54:14
处理时间(V2): 2026/05/18 10:08:40
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.347	42826	30.472	10244	2408	1.196	--
2	3.302	97715	69.528	10813	3175	1.209	11.366
总计		140541	100.000	21057			

图178 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042401批-均一性2-pH4.5介质-45min-片6
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-46/30-1151-2 - zzp-6042401p-rcqx-pH4.5jz-jyx2-60min-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx279.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260514-FX279.lcb
样品瓶号: 3-7
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/15 11:59:37
处理时间(V2): 2026/05/18 10:08:43
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.347	46123	31.299	11047	2409	1.193	--
2	3.302	101238	68.701	11211	3195	1.211	11.389
总计		147361	100.000	22258			

图179 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042401批-均一性2-pH4.5介质-60min-片1
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-46/30-1152-2 - zzp-6042401p-rcqx-pH4.5jz-jyx2-60min-P2.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx279.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260514-FX279.lcb

样品瓶号: 3-16

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/15 12:04:59

处理时间(V2): 2026/05/18 10:08:45

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流 速: 1.5ml/min


波 长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.347	45779	32.003	10954	2414	1.195	--
2	3.303	97269	67.997	10804	3190	1.205	11.388
总计		143049	100.000	21758			

图180 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042401批-均一性2-pH4.5介质-60min-片2
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-46/30-1153-2 - zzp-6042401p-rcqx-pH4.5jz-jyx2-60min-P3.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx279.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260514-FX279.lcb

样品瓶号: 3-25

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/15 12:10:21

处理时间(V2): 2026/05/18 10:08:48

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流 速: 1.5ml/min


波 长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.347	46401	32.899	11119	2411	1.197	--
2	3.303	94642	67.101	10508	3191	1.204	11.389
总计		141044	100.000	21627			

图181 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042401批-均一性2-pH4.5介质-60min-片3
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-46/30-1154-2 - zzp-6042401p-rcqx-pH4.5jz-jyx2-60min-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx279.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260514-FX279.lcb
样品瓶号: 3-34
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/15 12:15:42
处理时间(V2): 2026/05/18 10:08:50
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.347	46540	31.160	11158	2415	1.194	--
2	3.303	102815	68.840	11398	3187	1.208	11.384
总计		149355	100.000	22555			

图182 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042401批-均一性2-pH4.5介质-60min-片4
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-46/30-1155-2 - zzp-6042401p-rcqx-pH4.5jz-jyx2-60min-P5.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx279.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260514-FX279.lcb

样品瓶号: 3-43

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/15 12:21:05

处理时间(V2): 2026/05/18 10:08:53

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流 速: 1.5ml/min


波 长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.347	45802	30.881	10993	2415	1.192	--
2	3.303	102518	69.119	11345	3164	1.211	11.357
总计		148320	100.000	22338			

图183 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042401批-均一性2-pH4.5介质-60min-片5
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-46/30-1156-2 - zzp-6042401p-rcqx-pH4.5jz-jyx2-60min-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx279.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260514-FX279.lcb
样品瓶号: 3-52
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/15 12:26:25
处理时间(V2): 2026/05/18 10:08:55
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.347	45270	31.609	10892	2421	1.194	--
2	3.303	97949	68.391	10831	3180	1.206	11.382
总计		143218	100.000	21723			

图184 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042401批-均一性2-pH4.5介质-60min-片6
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-46/30-1157-2 - zzp-6042401p-rcqx-pH4.5jz-jyx2-90min-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx279.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260514-FX279.lcb
样品瓶号: 3-8
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/15 12:31:48
处理时间(V2): 2026/05/18 10:08:58
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.347	49740	33.258	11926	2420	1.194	--
2	3.303	99817	66.742	11064	3178	1.208	11.379
总计		149557	100.000	22990			

图185 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042401批-均一性2-pH4.5介质-90min-片1
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-46/30-1158-2 - zzp-6042401p-rcqx-pH4.5jz-jyx2-90min-P2.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx279.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260514-FX279.lcb

样品瓶号: 3-17

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/15 12:37:11

处理时间(V2): 2026/05/18 10:09:00

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流 速: 1.5ml/min


波 长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.348	49273	32.189	11829	2417	1.193	--
2	3.304	103800	67.811	11507	3190	1.215	11.386
总计		153073	100.000	23335			

图186 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042401批-均一性2-pH4.5介质-90min-片2
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-46/30-1159-2 - zzp-6042401p-rcqx-pH4.5jz-jyx2-90min-P3.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx279.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260514-FX279.lcb

样品瓶号: 3-26

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/15 12:42:34

处理时间(V2): 2026/05/18 10:09:03

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流速: 1.5ml/min


波长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.348	50213	36.202	12046	2415	1.193	--
2	3.305	88491	63.798	9827	3183	1.203	11.382
总计		138704	100.000	21874			

图187 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042401批-均一性2-pH4.5介质-90min-片3
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-46/30-1160-2 - zzp-6042401p-rcqx-pH4.5jz-jyx2-90min-P4.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx279.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260514-FX279.lcb

样品瓶号: 3-35

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/15 12:47:58

处理时间(V2): 2026/05/18 10:09:05

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流 速: 1.5ml/min


波 长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.348	50383	37.385	12077	2414	1.194	--
2	3.306	84385	62.615	9353	3193	1.203	11.395
总计		134768	100.000	21430			

图188 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042401批-均一性2-pH4.5介质-90min-片4
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-46/30-1161-2 - zzp-6042401p-rcqx-pH4.5jz-jyx2-90min-P5.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx279.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260514-FX279.lcb

样品瓶号: 3-44

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/15 12:53:20

处理时间(V2): 2026/05/18 10:09:08

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流 速: 1.5ml/min


波 长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.348	49685	32.208	11908	2416	1.190	--
2	3.304	104579	67.792	11595	3191	1.208	11.389
总计		154264	100.000	23503			

图189 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042401批-均一性2-pH4.5介质-90min-片5
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-46/30-1162-2 - zzp-6042401p-rcqx-pH4.5jz-jyx2-90min-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx279.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260514-FX279.lcb
样品瓶号: 3-53
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/15 12:58:43
处理时间(V2): 2026/05/18 10:09:10
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.348	49388	32.134	11848	2420	1.194	--
2	3.304	104303	67.866	11561	3185	1.209	11.385
总计		153691	100.000	23408			

图190 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042401批-均一性2-pH4.5介质-90min-片6
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-46/30-1163-2 - zzp-6042401p-rcqx-pH4.5jz-jyx2-120min-P1.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx279.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260514-FX279.lcb

样品瓶号: 4-5

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/15 13:04:07

处理时间(V2): 2026/05/18 10:09:13

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流 速: 1.5ml/min


波 长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.348	52425	35.032	12546	2411	1.194	--
2	3.306	97224	64.968	10796	3182	1.209	11.378
总计		149649	100.000	23343			

图191 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042401批-均一性2-pH4.5介质-120min-片1
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-46/30-1164-2 - zzp-6042401p-rcqx-pH4.5jz-jyx2-120min-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx279.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260514-FX279.lcb
样品瓶号: 4-14
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/15 13:09:30
处理时间(V2): 2026/05/18 10:09:15
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.348	51815	32.793	12403	2413	1.194	--
2	3.305	106192	67.207	11768	3187	1.210	11.382
总计		158007	100.000	24171			

图192 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042401批-均一性2-pH4.5介质-120min-片2
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-46/30-1165-2 - zzp-6042401p-rcqx-pH4.5jz-jyx2-120min-P3.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx279.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260514-FX279.lcb

样品瓶号: 4-23

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/15 13:14:53

处理时间(V2): 2026/05/18 10:09:18

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流 速: 1.5ml/min


波 长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.348	52704	34.292	12626	2412	1.191	--
2	3.305	100989	65.708	11186	3188	1.215	11.383
总计		153693	100.000	23812			

图193 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042401批-均一性2-pH4.5介质-120min-片3
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-46/30-1166-2 - zzp-6042401p-rcqx-pH4.5jz-jyx2-120min-P4.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx279.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260514-FX279.lcb

样品瓶号: 4-32

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/15 13:20:18

处理时间(V2): 2026/05/18 10:09:20

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流 速: 1.5ml/min


波 长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.348	52810	34.400	12654	2405	1.192	--
2	3.305	100710	65.600	11108	3191	1.212	11.382
总计		153520	100.000	23762			

图194 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042401批-均一性2-pH4.5介质-120min-片4
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-46/30-1167-2 - zzp-6042401p-rcqx-pH4.5jz-jyx2-120min-P5.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx279.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260514-FX279.lcb

样品瓶号: 4-41

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/15 13:25:42

处理时间(V2): 2026/05/18 10:09:23

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流 速: 1.5ml/min


波 长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.348	51858	34.886	12447	2417	1.191	--
2	3.306	96792	65.114	10750	3193	1.212	11.398
总计		148650	100.000	23197			

图195 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042401批-均一性2-pH4.5介质-120min-片5
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-46/30-1168-2 - zzp-6042401p-rcqx-pH4.5jz-jyx2-120min-P6.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx279.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260514-FX279.lcb

样品瓶号: 4-50

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/15 13:31:05

处理时间(V2): 2026/05/18 10:09:25

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流 速: 1.5ml/min


波 长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.348	51866	33.083	12426	2410	1.189	--
2	3.306	104909	66.917	11601	3182	1.210	11.376
总计		156776	100.000	24027			

图196 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042401批-均一性2-pH4.5介质-120min-片6
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-46/30-1169-2 - zzp-6042401p-rcqx-pH4.5jz-jyx2-JX-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx279.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260514-FX279.lcb
样品瓶号: 4-6
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/15 13:36:29
处理时间(V2): 2026/05/18 10:09:28
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.348	53034	33.591	12640	2410	1.197	--
2	3.306	104847	66.409	11610	3173	1.211	11.362
总计		157881	100.000	24250			

图197 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042401批-均一性2-pH4.5介质-极限转速-片1
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-46/30-1170-2 - zzp-6042401p-rcqx-pH4.5jz-jyx2-JX-P2.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx279.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260514-FX279.lcb

样品瓶号: 4-15

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/15 13:41:53

处理时间(V2): 2026/05/18 10:09:30

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流 速: 1.5ml/min


波 长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.348	52238	33.425	12498	2412	1.193	--
2	3.307	104047	66.575	11499	3174	1.212	11.370
总计		156285	100.000	23997			

图198 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042401批-均一性2-pH4.5介质-极限转速-片2
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-46/30-1171-2 - zzp-6042401p-rcqx-pH4.5jz-jyx2-JX-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx279.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260514-FX279.lcb
样品瓶号: 4-24
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/15 13:47:17
处理时间(V2): 2026/05/18 10:09:33
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.348	53653	36.835	12811	2409	1.196	--
2	3.307	92005	63.165	10193	3182	1.211	11.380
总计		145658	100.000	23004			

图199 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042401批-均一性2-pH4.5介质-极限转速-片3
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-46/30-1172-2 - zzp-6042401p-rcqx-pH4.5jz-jyx2-JX-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx279.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260514-FX279.lcb
样品瓶号: 4-33
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/15 13:52:41
处理时间(V2): 2026/05/18 10:09:36
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.348	53432	33.192	12796	2417	1.192	--
2	3.305	107550	66.808	11894	3189	1.220	11.387
总计		160982	100.000	24690			

图200 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042401批-均一性2-pH4.5介质-极限转速-片4
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-46/30-1173-2 - zzp-6042401p-rcqx-pH4.5jz-jyx2-JX-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx279.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260514-FX279.lcb
样品瓶号: 4-42
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/15 13:58:05
处理时间(V2): 2026/05/18 10:09:38
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.348	52566	33.416	12591	2410	1.194	--
2	3.306	104743	66.584	11603	3190	1.209	11.386
总计		157309	100.000	24194			

图201 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042401批-均一性2-pH4.5介质-极限转速-片5
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-46/30-1174-2 - zzp-6042401p-rcqx-pH4.5jz-jyx2-JX-P6.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx279.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260514-FX279.lcb

样品瓶号: 4-51

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/15 14:03:28

处理时间(V2): 2026/05/18 10:09:41

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流速: 1.5ml/min


波长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.348	52826	33.588	12622	2409	1.198	--
2	3.306	104451	66.412	11582	3187	1.210	11.381
总计		157276	100.000	24205			

图202 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042401批-均一性2-pH4.5介质-极限转速-片6
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-46/30-1175-2 - zzp-6042401p-rcqx-pH4.5jz-jyx2-dz-2-1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx279.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260514-FX279.lcb
样品瓶号: 3-27
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/15 14:08:52
处理时间(V2): 2026/05/18 10:09:44
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.332	70322	11.778	14776	1809	1.190	--
2	3.353	526718	88.222	58806	3243	1.273	11.199
总计		597040	100.000	73582			

图203 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042401批-均一性2-pH4.5介质
对照品溶液-2-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-46/30-1176-2 - zzp-6042401p-rcqx-pH4.5jz-jyx2-dz-2-2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx279.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260514-FX279.lcb
样品瓶号: 3-27
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/15 14:14:15
处理时间(V2): 2026/05/18 10:09:46
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.333	70169	11.775	14749	1802	1.185	--
2	3.353	525745	88.225	58772	3249	1.273	11.197
总计		595914	100.000	73521			

图204 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042401批-均一性2-pH4.5介质
对照品溶液-2-2