



非布司他多替诺雷片项目信息

介质体积(ml)	900	取样体积(ml)	1.5	补液体积(ml)	1.5
对照品批号	241101	对照品来源	ZZ	对照品使用方法	直接使用
对照品含量(%)	99.69	对照品水分(%)	0	对照品稀释倍数	5000
标示量(mg)	2	供试品稀释倍数	1	系数	1

对照品溶液

序号	称样量(mg)	A ₁	A ₂	A ₃	A ₄	A ₅	A _{平均}	RSD%
1	10.90	35449	35538	35368	35165	35351	35374	0.40
2	10.99	35901	35855				35878	0.10

单位质量响应值		RSD%	判断
3245.32	3264.60	0.42	数据可信



操作者:

日期: 2026-08-09

复核者:

未审阅版本



供试品溶液-6042701批-多替诺雷-pH1.2

时间 (分钟)	样品	A ₁	A ₂	A _{平均}	溶出量(%)	平均(%)	RSD%	累计溶 出量(%)	平均(%)	RSD%
5min	1	2944	-	2944	8.115	9.38	9.42	8.12	9.38	9.42
	2	3564	-	3564	9.824			9.82		
	3	3555	-	3555	9.799			9.80		
	4	3797	-	3797	10.466			10.47		
	5	3464	-	3464	9.548			9.55		
	6	3095	-	3095	8.531			8.53		
10min	1	7587	-	7587	20.913	22.10	4.28	20.93	22.12	4.29
	2	8490	-	8490	23.402			23.42		
	3	8239	-	8239	22.710			22.73		
	4	8177	-	8177	22.540			22.56		
	5	7887	-	7887	21.740			21.76		
	6	7720	-	7720	21.280			21.29		
15min	1	10790	-	10790	29.742	30.17	1.89	29.79	30.22	1.90
	2	11139	-	11139	30.704			30.76		
	3	11114	-	11114	30.635			30.69		
	4	11140	-	11140	30.707			30.76		
	5	10791	-	10791	29.745			29.80		
	6	10696	-	10696	29.483			29.53		
20min	1	12714	-	12714	35.046	35.51	2.00	35.14	35.62	2.01
	2	13127	-	13127	36.184			36.29		
	3	13188	-	13188	36.352			36.46		
	4	12931	-	12931	35.644			35.75		
	5	12841	-	12841	35.396			35.50		
	6	12501	-	12501	34.459			34.56		
30min	1	15212	-	15212	41.931	42.65	1.61	42.09	42.81	1.61
	2	15808	-	15808	43.574			43.74		
	3	15620	-	15620	43.056			43.22		
	4	15483	-	15483	42.678			42.84		
	5	15557	-	15557	42.882			43.04		
	6	15159	-	15159	41.785			41.94		
45min	1	17903	-	17903	49.349	49.50	1.62	49.58	49.74	1.62
	2	18287	-	18287	50.407			50.65		
	3	18223	-	18223	50.231			50.47		
	4	17985	-	17985	49.575			49.81		
	5	17877	-	17877	49.277			49.51		
	6	17478	-	17478	48.177			48.40		
60min	1	19593	-	19593	54.007	54.30	1.25	54.32	54.62	1.26
	2	20024	-	20024	55.195			55.52		
	3	19892	-	19892	54.832			55.15		
	4	19663	-	19663	54.200			54.52		
	5	19717	-	19717	54.349			54.66		
	6	19315	-	19315	53.241			53.55		
90min	1	21991	-	21991	60.617	60.65	1.20	61.02	61.06	1.20
	2	22286	-	22286	61.430			61.85		
	3	22206	-	22206	61.210			61.62		
	4	21963	-	21963	60.540			60.95		
	5	22036	-	22036	60.741			61.15		
	6	21532	-	21532	59.352			59.75		
120min	1	23677	-	23677	65.265	65.02	1.07	65.76	65.53	1.07
	2	23813	-	23813	65.640			66.16		
	3	23792	-	23792	65.582			66.10		
	4	23488	-	23488	64.744			65.25		
	5	23622	-	23622	65.113			65.62		
	6	23139	-	23139	63.782			64.28		



操作者:

日期: 2026-08-09

复核者:

未审阅版本



时间 (分钟)	样品	A ₁	A ₂	A _{平均}	溶出量(%)	平均(%)	RSD%	累计溶 出量(%)	平均(%)	RSD%
极限	1	24105	-	24105	66.445	66.36	1.10	67.05	66.97	1.11
	2	24471	-	24471	67.453			68.08		
	3	24117	-	24117	66.478			67.10		
	4	23996	-	23996	66.144			66.76		
	5	24104	-	24104	66.442			67.06		
	6	23648	-	23648	65.185			65.78		



操作者:

日 期: 2026-08-09

复核者:

未审阅版本



非布司他多替诺雷片项目信息

介质体积(ml)	900	取样体积(ml)	1.5	补液体积(ml)	1.5
对照品批号	101278-202405	对照品来源	中检所	对照品使用方法	直接使用
对照品含量(%)	99.9	对照品水分(%)	0	对照品稀释倍数	250
标示量(mg)	40	供试品稀释倍数	1	系数	1

对照品溶液

序号	称样量(mg)	A ₁	A ₂	A ₃	A ₄	A ₅	A _{平均}	RSD%
1	10.86	264229	265343	264535	263695	264624	264485	0.23
2	11.10	269511	269484				269498	0.01

单位质量响应值		RSD%	判断
24354.05	24279.10	0.22	数据可信



操作者:

日期: 2026-08-09

复核者:

未审阅版本



供试品溶液-6042701批-非布司他-pH1.2

时间 (分钟)	样品	A ₁	A ₂	A _{平均}	溶出量(%)	平均(%)	RSD%	累计溶 出量(%)	平均(%)	RSD%
5min	1	2136	-	2136	0.790	0.91	7.23	0.79	0.91	7.42
	2	2565	-	2565	0.948			0.95		
	3	2416	-	2416	0.893			0.89		
	4	2638	-	2638	0.975			0.98		
	5	2478	-	2478	0.916			0.92		
	6	2558	-	2558	0.946			0.95		
10min	1	4202	-	4202	1.554	1.52	3.60	1.56	1.52	3.78
	2	4102	-	4102	1.517			1.52		
	3	4132	-	4132	1.528			1.53		
	4	3847	-	3847	1.422			1.42		
	5	4096	-	4096	1.514			1.52		
	6	4284	-	4284	1.584			1.59		
15min	1	4666	-	4666	1.725	1.75	5.06	1.73	1.76	5.14
	2	4693	-	4693	1.735			1.74		
	3	4995	-	4995	1.847			1.85		
	4	5063	-	5063	1.872			1.88		
	5	4430	-	4430	1.638			1.64		
	6	4623	-	4623	1.709			1.71		
20min	1	4873	-	4873	1.802	1.84	1.85	1.81	1.84	1.78
	2	5008	-	5008	1.852			1.86		
	3	5037	-	5037	1.862			1.87		
	4	5103	-	5103	1.887			1.89		
	5	4891	-	4891	1.808			1.82		
	6	4916	-	4916	1.818			1.82		
30min	1	5197	-	5197	1.922	1.86	2.37	1.93	1.87	2.37
	2	5149	-	5149	1.904			1.91		
	3	5041	-	5041	1.864			1.87		
	4	5014	-	5014	1.854			1.86		
	5	4877	-	4877	1.803			1.81		
	6	4957	-	4957	1.833			1.84		
45min	1	5603	-	5603	2.072	1.92	5.44	2.08	1.93	5.32
	2	5328	-	5328	1.970			1.98		
	3	5000	-	5000	1.849			1.86		
	4	5210	-	5210	1.926			1.94		
	5	4777	-	4777	1.766			1.78		
	6	5215	-	5215	1.928			1.94		
60min	1	5429	-	5429	2.007	1.92	3.67	2.02	1.93	3.64
	2	5274	-	5274	1.950			1.97		
	3	5122	-	5122	1.894			1.91		
	4	5209	-	5209	1.926			1.94		
	5	4855	-	4855	1.795			1.81		
	6	5197	-	5197	1.922			1.94		
90min	1	5152	-	5152	1.905	1.91	2.20	1.92	1.94	2.14
	2	5221	-	5221	1.930			1.95		
	3	5216	-	5216	1.929			1.95		
	4	5353	-	5353	1.979			2.00		
	5	5021	-	5021	1.857			1.88		
	6	5102	-	5102	1.886			1.91		
120min	1	5147	-	5147	1.903	1.85	3.17	1.93	1.88	3.24
	2	5069	-	5069	1.874			1.90		
	3	5202	-	5202	1.923			1.95		
	4	4786	-	4786	1.770			1.79		
	5	5007	-	5007	1.851			1.87		
	6	4875	-	4875	1.803			1.83		



操作者:

日期: 2026-08-09

复核者:

未审阅版本



时间 (分钟)	样品	A ₁	A ₂	A _{平均}	溶出量(%)	平均(%)	RSD%	累计溶 出量(%)	平均(%)	RSD%
极限	1	5161	-	5161	1.908	1.89	1.95	1.93	1.92	1.83
	2	5006	-	5006	1.851			1.88		
	3	5060	-	5060	1.871			1.90		
	4	5238	-	5238	1.937			1.96		
	5	5022	-	5022	1.857			1.88		
	6	5209	-	5209	1.926			1.95		



操作者:

日 期: 2026-08-09

复核者:

未审阅版本



非布司他多替诺雷片项目信息

介质体积(ml)	900	取样体积(ml)	1.5	补液体积(ml)	1.5
对照品批号	241101	对照品来源	ZZ	对照品使用方法	直接使用
对照品含量(%)	99.69	对照品水分(%)	0	对照品稀释倍数	5000
标示量(mg)	2	供试品稀释倍数	1	系数	1

对照品溶液

序号	称样量(mg)	A ₁	A ₂	A ₃	A ₄	A ₅	A _{平均}	RSD%
1	10.90	35163	35342	35280	35467	35343	35319	0.32
2	10.99	36275	36215				36245	0.12
单位质量响应值				RSD%	判断			
3240.28				1.25	数据可信			



操作者:

日期: 2026-08-09

复核者:

未审阅版本



供试品溶液-6042702批-多替诺雷-pH1.2

时间 (分钟)	样品	A ₁	A ₂	A _{平均}	溶出量(%)	平均(%)	RSD%	累计溶出量(%)	平均(%)	RSD%
5min	1	3230	-	3230	8.865	10.17	16.21	8.87	10.17	16.19
	2	4522	-	4522	12.412			12.41		
	3	2809	-	2809	7.710			7.71		
	4	3926	-	3926	10.776			10.78		
	5	3891	-	3891	10.680			10.68		
	6	3852	-	3852	10.573			10.57		
10min	1	7735	-	7735	21.230	22.25	5.56	21.25	22.26	5.56
	2	8696	-	8696	23.868			23.89		
	3	7439	-	7439	20.418			20.43		
	4	8287	-	8287	22.745			22.76		
	5	8156	-	8156	22.386			22.40		
	6	8322	-	8322	22.841			22.86		
15min	1	10614	-	10614	29.132	29.66	3.37	29.18	29.71	3.37
	2	11223	-	11223	30.804			30.86		
	3	10188	-	10188	27.963			28.01		
	4	11008	-	11008	30.214			30.27		
	5	10841	-	10841	29.755			29.81		
	6	10965	-	10965	30.096			30.15		
20min	1	12563	-	12563	34.482	34.99	1.68	34.58	35.09	1.70
	2	13079	-	13079	35.898			36.01		
	3	12503	-	12503	34.317			34.41		
	4	12892	-	12892	35.385			35.49		
	5	12685	-	12685	34.817			34.92		
	6	12761	-	12761	35.025			35.13		
30min	1	15068	-	15068	41.357	41.95	1.14	41.51	42.11	1.15
	2	15477	-	15477	42.480			42.65		
	3	15094	-	15094	41.429			41.58		
	4	15452	-	15452	42.411			42.58		
	5	15327	-	15327	42.068			42.23		
	6	15284	-	15284	41.950			42.11		
45min	1	17715	-	17715	48.622	48.84	0.66	48.85	49.07	0.65
	2	17848	-	17848	48.987			49.23		
	3	17951	-	17951	49.270			49.49		
	4	17867	-	17867	49.040			49.28		
	5	17743	-	17743	48.699			48.93		
	6	17634	-	17634	48.400			48.63		
60min	1	19365	-	19365	53.151	53.32	0.80	53.46	53.63	0.79
	2	19352	-	19352	53.115			53.44		
	3	19494	-	19494	53.505			53.81		
	4	19707	-	19707	54.090			54.41		
	5	19339	-	19339	53.080			53.39		
	6	19294	-	19294	52.956			53.27		
90min	1	21710	-	21710	59.587	60.16	0.91	59.98	60.56	0.91
	2	21837	-	21837	59.936			60.35		
	3	22214	-	22214	60.971			61.36		
	4	22094	-	22094	60.641			61.05		
	5	21916	-	21916	60.153			60.56		
	6	21744	-	21744	59.681			60.08		
120min	1	23292	-	23292	63.930	64.20	0.63	64.42	64.70	0.63
	2	23455	-	23455	64.377			64.89		
	3	23520	-	23520	64.555			65.05		
	4	23576	-	23576	64.709			65.22		
	5	23219	-	23219	63.729			64.23		
	6	23274	-	23274	63.880			64.38		



操作者:

日期: 2026-08-09

复核者:

未审阅版本



时间 (分钟)	样品	A ₁	A ₂	A _{平均}	溶出量(%)	平均(%)	RSD%	累计溶 出量(%)	平均(%)	RSD%
极限	1	23838	-	23838	65.428	65.38	0.89	66.03	65.99	0.87
	2	23803	-	23803	65.332			65.95		
	3	24194	-	24194	66.405			67.01		
	4	23793	-	23793	65.305			65.92		
	5	23742	-	23742	65.165			65.77		
	6	23550	-	23550	64.638			65.25		



操作者:

日 期: 2026-08-09

复核者:

未审阅版本



非布司他多替诺雷片项目信息

介质体积(ml)	900	取样体积(ml)	1.5	补液体积(ml)	1.5
对照品批号	101278-202405	对照品来源	中检所	对照品使用方法	直接使用
对照品含量(%)	99.9	对照品水分(%)	0	对照品稀释倍数	250
标示量(mg)	40	供试品稀释倍数	1	系数	1

对照品溶液

序号	称样量(mg)	A ₁	A ₂	A ₃	A ₄	A ₅	A _{平均}	RSD%
1	10.86	263748	263568	264238	264133	264235	263984	0.12
2	11.10	275573	274736				275154	0.22
单位质量响应值				RSD%	判断			
24307.92				1.39	数据可信			



操作者:

日期: 2026-08-09

复核者:

未审阅版本



供试品溶液-6042702批-非布司他-pH1.2

时间 (分钟)	样品	A ₁	A ₂	A _{平均}	溶出量(%)	平均(%)	RSD%	累计溶 出量(%)	平均(%)	RSD%
5min	1	3213	-	3213	1.177	1.19	9.72	1.18	1.19	9.75
	2	3821	-	3821	1.400			1.40		
	3	3195	-	3195	1.170			1.17		
	4	3191	-	3191	1.169			1.17		
	5	2844	-	2844	1.042			1.04		
	6	3253	-	3253	1.192			1.19		
10min	1	4323	-	4323	1.583	1.61	1.88	1.59	1.61	1.72
	2	4537	-	4537	1.662			1.66		
	3	4326	-	4326	1.585			1.59		
	4	4416	-	4416	1.618			1.62		
	5	4338	-	4338	1.589			1.59		
	6	4396	-	4396	1.610			1.61		
15min	1	4786	-	4786	1.753	1.82	3.41	1.76	1.82	3.29
	2	5130	-	5130	1.879			1.88		
	3	4941	-	4941	1.810			1.81		
	4	5206	-	5206	1.907			1.91		
	5	4878	-	4878	1.787			1.79		
	6	4836	-	4836	1.771			1.78		
20min	1	4925	-	4925	1.804	1.86	3.52	1.81	1.87	3.44
	2	5071	-	5071	1.857			1.87		
	3	5208	-	5208	1.908			1.92		
	4	5257	-	5257	1.926			1.93		
	5	5179	-	5179	1.897			1.90		
	6	4801	-	4801	1.759			1.77		
30min	1	5337	-	5337	1.955	1.92	4.31	1.97	1.92	4.21
	2	5137	-	5137	1.882			1.89		
	3	5607	-	5607	2.054			2.06		
	4	5249	-	5249	1.923			1.93		
	5	5023	-	5023	1.840			1.85		
	6	5013	-	5013	1.836			1.85		
45min	1	5453	-	5453	1.997	1.92	2.98	2.01	1.94	2.92
	2	5172	-	5172	1.894			1.91		
	3	5341	-	5341	1.956			1.97		
	4	5340	-	5340	1.956			1.97		
	5	5066	-	5066	1.856			1.87		
	6	5092	-	5092	1.865			1.88		
60min	1	5199	-	5199	1.904	1.88	4.62	1.92	1.90	4.58
	2	5258	-	5258	1.926			1.94		
	3	5498	-	5498	2.014			2.03		
	4	5023	-	5023	1.840			1.86		
	5	4793	-	4793	1.756			1.77		
	6	5085	-	5085	1.863			1.88		
90min	1	5164	-	5164	1.892	1.87	3.00	1.91	1.89	3.04
	2	4969	-	4969	1.820			1.84		
	3	5161	-	5161	1.890			1.91		
	4	5376	-	5376	1.969			1.99		
	5	5006	-	5006	1.834			1.85		
	6	5007	-	5007	1.834			1.85		
120min	1	5349	-	5349	1.959	1.91	4.60	1.98	1.94	4.55
	2	4986	-	4986	1.826			1.85		
	3	5371	-	5371	1.967			1.99		
	4	5210	-	5210	1.908			1.93		
	5	4909	-	4909	1.798			1.82		
	6	5530	-	5530	2.026			2.05		



操作者:

日期: 2026-08-09

复核者:

未审阅版本



时间 (分钟)	样品	A ₁	A ₂	A _{平均}	溶出量(%)	平均(%)	RSD%	累计溶 出量(%)	平均(%)	RSD%
极限	1	5222	-	5222	1.913	1.89	2.32	1.94	1.92	2.32
	2	5007	-	5007	1.834			1.86		
	3	5160	-	5160	1.890			1.92		
	4	5354	-	5354	1.961			1.99		
	5	5191	-	5191	1.901			1.93		
	6	5081	-	5081	1.861			1.89		



操作者:

日 期: 2026-08-09

复核者:

未审阅版本



非布司他多替诺雷片项目信息

介质体积(ml)	900	取样体积(ml)	1.5	补液体积(ml)	1.5
对照品批号	241101	对照品来源	ZZ	对照品使用方法	直接使用
对照品含量(%)	99.69	对照品水分(%)	0	对照品稀释倍数	5000
标示量(mg)	2	供试品稀释倍数	1	系数	1

对照品溶液

序号	称样量(mg)	A ₁	A ₂	A ₃	A ₄	A ₅	A _{平均}	RSD%
1	10.90	36110	36253	36091	36174	36248	36175	0.21
2	10.99	35496	35440				35468	0.12
单位质量响应值				RSD%	判断			
3318.81		3227.30		1.98	数据可信			



操作者:

日期: 2026-08-09

复核者:

未审阅版本



供试品溶液-6042703批-多替诺雷-pH1.2

时间 (分钟)	样品	A ₁	A ₂	A _{平均}	溶出量(%)	平均(%)	RSD%	累计溶出量(%)	平均(%)	RSD%
5min	1	3645	-	3645	9.994	10.07	9.79	9.99	10.07	9.77
	2	4013	-	4013	11.003			11.00		
	3	3712	-	3712	10.177			10.18		
	4	3137	-	3137	8.601			8.60		
	5	4101	-	4101	11.244			11.24		
	6	3434	-	3434	9.415			9.42		
10min	1	8279	-	8279	22.699	23.15	3.71	22.72	23.17	3.71
	2	8842	-	8842	24.242			24.26		
	3	8311	-	8311	22.787			22.80		
	4	8004	-	8004	21.945			21.96		
	5	8747	-	8747	23.982			24.00		
	6	8487	-	8487	23.269			23.28		
15min	1	11012	-	11012	30.192	30.42	1.71	30.25	30.48	1.71
	2	11159	-	11159	30.595			30.65		
	3	11138	-	11138	30.537			30.59		
	4	10763	-	10763	29.509			29.56		
	5	11204	-	11204	30.718			30.78		
	6	11304	-	11304	30.993			31.05		
20min	1	13057	-	13057	35.799	35.49	1.00	35.90	35.60	1.00
	2	13033	-	13033	35.733			35.84		
	3	12873	-	12873	35.294			35.40		
	4	12721	-	12721	34.878			34.98		
	5	13028	-	13028	35.719			35.83		
	6	12956	-	12956	35.522			35.63		
30min	1	15456	-	15456	42.376	42.42	0.54	42.54	42.58	0.53
	2	15598	-	15598	42.766			42.93		
	3	15517	-	15517	42.544			42.71		
	4	15477	-	15477	42.434			42.59		
	5	15355	-	15355	42.099			42.27		
	6	15430	-	15430	42.305			42.47		
45min	1	17992	-	17992	49.329	49.47	0.64	49.56	49.71	0.64
	2	17899	-	17899	49.074			49.31		
	3	18139	-	18139	49.732			49.97		
	4	17951	-	17951	49.217			49.45		
	5	18188	-	18188	49.867			50.11		
	6	18096	-	18096	49.614			49.85		
60min	1	19664	-	19664	53.914	54.19	0.50	54.23	54.50	0.49
	2	19788	-	19788	54.254			54.58		
	3	19942	-	19942	54.676			54.99		
	4	19742	-	19742	54.127			54.44		
	5	19695	-	19695	53.999			54.32		
	6	19752	-	19752	54.155			54.47		
90min	1	22254	-	22254	61.015	60.66	0.65	61.42	61.07	0.64
	2	22157	-	22157	60.749			61.16		
	3	22317	-	22317	61.187			61.60		
	4	22052	-	22052	60.461			60.86		
	5	21944	-	21944	60.165			60.58		
	6	22033	-	22033	60.409			60.82		
120min	1	23722	-	23722	65.040	64.91	0.77	65.55	65.42	0.76
	2	23582	-	23582	64.656			65.17		
	3	23931	-	23931	65.613			66.12		
	4	23805	-	23805	65.267			65.77		
	5	23570	-	23570	64.623			65.14		
	6	23428	-	23428	64.233			64.74		



操作者:

日期: 2026-08-09

复核者:

未审阅版本



时间 (分钟)	样品	A ₁	A ₂	A _{平均}	溶出量(%)	平均(%)	RSD%	累计溶 出量(%)	平均(%)	RSD%
极限	1	24032	-	24032	65.889	66.10	0.48	66.51	66.72	0.47
	2	24065	-	24065	65.980			66.60		
	3	24287	-	24287	66.589			67.21		
	4	24131	-	24131	66.161			66.77		
	5	23964	-	23964	65.703			66.32		
	6	24171	-	24171	66.271			66.89		



操作者:
日期: 2026-08-09

复核者:

未审阅版本



非布司他多替诺雷片项目信息

介质体积(ml)	900	取样体积(ml)	1.5	补液体积(ml)	1.5
对照品批号	101278-202405	对照品来源	中检所	对照品使用方法	直接使用
对照品含量(%)	99.9	对照品水分(%)	0	对照品稀释倍数	250
标示量(mg)	40	供试品稀释倍数	1	系数	1

对照品溶液

序号	称样量(mg)	A ₁	A ₂	A ₃	A ₄	A ₅	A _{平均}	RSD%
1	10.86	274861	275062	274585	274949	274495	274790	0.09
2	11.10	266007	265896				265952	0.03
单位质量响应值			RSD%		判断			
25302.95			3.86		数据不可信!(响应值差异过大,请重新称样测定!)			



操作者:

日期: 2026-08-09

复核者:

未审阅版本



供试品溶液-6042703批-非布司他-pH1.2

时间 (分钟)	样品	A ₁	A ₂	A _{平均}	溶出量(%)	平均(%)	RSD%	累计溶 出量(%)	平均(%)	RSD%
5min	1	2072	-	2072	0.757	0.75	12.69	0.76	0.75	12.51
	2	2336	-	2336	0.853			0.85		
	3	2184	-	2184	0.798			0.80		
	4	1760	-	1760	0.643			0.64		
	5	2251	-	2251	0.822			0.82		
	6	1712	-	1712	0.625			0.63		
10min	1	4100	-	4100	1.498	1.51	2.30	1.50	1.52	2.24
	2	4299	-	4299	1.570			1.57		
	3	4097	-	4097	1.497			1.50		
	4	4017	-	4017	1.467			1.47		
	5	4150	-	4150	1.516			1.52		
	6	4180	-	4180	1.527			1.53		
15min	1	4659	-	4659	1.702	1.73	1.74	1.71	1.73	1.58
	2	4778	-	4778	1.745			1.75		
	3	4820	-	4820	1.761			1.76		
	4	4605	-	4605	1.682			1.69		
	5	4742	-	4742	1.732			1.74		
	6	4778	-	4778	1.745			1.75		
20min	1	5038	-	5038	1.840	1.77	3.86	1.85	1.78	3.93
	2	4756	-	4756	1.737			1.74		
	3	5094	-	5094	1.861			1.87		
	4	4885	-	4885	1.784			1.79		
	5	4605	-	4605	1.682			1.69		
	6	4750	-	4750	1.735			1.74		
30min	1	5068	-	5068	1.851	1.84	2.50	1.86	1.85	2.50
	2	5089	-	5089	1.859			1.87		
	3	5077	-	5077	1.855			1.86		
	4	5001	-	5001	1.827			1.84		
	5	5191	-	5191	1.896			1.91		
	6	4814	-	4814	1.759			1.77		
45min	1	5199	-	5199	1.899	1.90	4.19	1.91	1.91	4.05
	2	4908	-	4908	1.793			1.81		
	3	5554	-	5554	2.029			2.04		
	4	5262	-	5262	1.922			1.93		
	5	5214	-	5214	1.905			1.92		
	6	5051	-	5051	1.845			1.86		
60min	1	5312	-	5312	1.940	1.89	3.88	1.96	1.90	3.92
	2	4946	-	4946	1.807			1.82		
	3	5288	-	5288	1.932			1.95		
	4	5360	-	5360	1.958			1.97		
	5	4888	-	4888	1.786			1.80		
	6	5207	-	5207	1.902			1.92		
90min	1	5179	-	5179	1.892	1.84	4.05	1.91	1.86	4.14
	2	4967	-	4967	1.814			1.83		
	3	5284	-	5284	1.930			1.95		
	4	5196	-	5196	1.898			1.92		
	5	4825	-	4825	1.763			1.78		
	6	4806	-	4806	1.756			1.77		
120min	1	5327	-	5327	1.946	1.86	5.49	1.97	1.88	5.51
	2	4627	-	4627	1.690			1.71		
	3	5243	-	5243	1.915			1.94		
	4	4867	-	4867	1.778			1.80		
	5	5106	-	5106	1.865			1.89		
	6	5302	-	5302	1.937			1.96		



操作者:

日期: 2026-08-09

复核者:

未审阅版本



时间 (分钟)	样品	A ₁	A ₂	A _{平均}	溶出量(%)	平均(%)	RSD%	累计溶 出量(%)	平均(%)	RSD%
极限	1	4765	-	4765	1.741	1.80	2.05	1.77	1.82	2.04
	2	4995	-	4995	1.825			1.85		
	3	4813	-	4813	1.758			1.78		
	4	4984	-	4984	1.821			1.85		
	5	4987	-	4987	1.822			1.85		
	6	4946	-	4946	1.807			1.83		



操作者:

日 期: 2026-08-09

复核者:

未审阅版本




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-40/30-1178-3 - zzp-6042701p-rcqx-pH1.2jz-jyx2-rj.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-1.2-Fx279.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260515-FX279.lcb
样品瓶号: 1-9
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/15 16:40:42
处理时间(V3): 2026/05/18 09:41:29
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图1 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042701批-均一性2-pH1.2介质
溶剂



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-40/30-1179-3 - zzp-6042701p-rcqx-pH1.2jz-jyx2-dz-1-1.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-1.2-Fx279.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260515-FX279.lcb

样品瓶号: 1-18

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/15 16:46:07

处理时间(V3): 2026/05/18 09:41:31

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流速: 1.5ml/min


波长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.316	35449	11.829	7467	1773	1.183	--
2	3.309	264229	88.171	30613	3404	1.172	11.325
总计		299679	100.000	38080			

图2 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042701批-均一性2-pH1.2介质
对照品溶液-1-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-40/30-1180-3 - zzp-6042701p-rcqx-pH1.2jz-jyx2-dz-1-2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-1.2-Fx279.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260515-FX279.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/15 16:51:31
处理时间(V3): 2026/05/18 09:41:34
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.316	35538	11.811	7493	1771	1.189	--
2	3.308	265343	88.189	30714	3408	1.171	11.329
总计		300881	100.000	38207			

图3 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042701批-均一性2-pH1.2介质
对照品溶液-1-2



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-40/30-1181-3 - zzp-6042701p-rcqx-pH1.2jz-jyx2-dz-1-3.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-1.2-Fx279.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260515-FX279.lcb

样品瓶号: 1-18

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/15 16:56:55

处理时间(V3): 2026/05/18 09:41:36

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流 速: 1.5ml/min


波 长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.316	35368	11.793	7460	1777	1.191	--
2	3.309	264535	88.207	30606	3399	1.167	11.327
总计		299904	100.000	38067			

图4 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042701批-均一性2-pH1.2介质
对照品溶液-1-3




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-40/30-1182-3 - zzp-6042701p-rcqx-pH1.2jz-jyx2-dz-1-4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-1.2-Fx279.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260515-FX279.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/15 17:02:20
处理时间(V3): 2026/05/18 09:41:39
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.316	35165	11.766	7411	1770	1.193	--
2	3.309	263695	88.234	30533	3405	1.169	11.326
总计		298860	100.000	37944			

图5 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042701批-均一性2-pH1.2介质
对照品溶液-1-4



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-40/30-1183-3 - zzp-6042701p-rcqx-pH1.2jz-jyx2-dz-1-5.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-1.2-Fx279.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260515-FX279.lcb

样品瓶号: 1-18

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/15 17:07:44

处理时间(V3): 2026/05/18 09:41:41

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流速: 1.5ml/min


波长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.316	35351	11.785	7446	1770	1.191	--
2	3.309	264624	88.215	30612	3403	1.170	11.324
总计		299975	100.000	38058			

图6 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042701批-均一性2-pH1.2介质
对照品溶液-1-5




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-40/30-1184-3 - zzp-6042701p-rcqx-pH1.2jz-jyx2-5min-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-1.2-Fx279.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260515-FX279.lcb
样品瓶号: 1-1
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/15 17:13:06
处理时间(V3): 2026/05/18 09:41:44
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.343	2944	57.959	714	2481	1.161	--
2	3.364	2136	42.041	287	4555	1.119	13.159
总计		5080	100.000	1001			

图7 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042701批-均一性2-pH1.2介质-5min-片1
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-40/30-1185-3 - zzp-6042701p-rcqx-pH1.2jz-jyx2-5min-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-1.2-Fx279.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260515-FX279.lcb
样品瓶号: 1-10
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/15 17:18:29
处理时间(V3): 2026/05/18 09:41:46
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.342	3564	58.152	864	2497	1.141	--
2	3.366	2565	41.848	339	4535	1.112	13.165
总计		6129	100.000	1203			

图8 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042701批-均一性2-pH1.2介质-5min-片2
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-40/30-1186-3 - zzp-6042701p-rcqx-pH1.2jz-jyx2-5min-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-1.2-Fx279.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260515-FX279.lcb
样品瓶号: 1-19
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/15 17:23:52
处理时间(V3): 2026/05/18 09:41:48
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.342	3555	59.535	853	2503	1.277	--
2	3.375	2416	40.465	308	4303	1.068	12.983
总计		5971	100.000	1161			

图9 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042701批-均一性2-pH1.2介质-5min-片3
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-40/30-1187-3 - zzp-6042701p-rcqx-pH1.2jz-jyx2-5min-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-1.2-Fx279.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260515-FX279.lcb
样品瓶号: 1-28
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/15 17:29:15
处理时间(V3): 2026/05/18 09:41:51
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.343	3797	59.004	899	2402	1.196	--
2	3.371	2638	40.996	322	4493	1.151	13.052
总计		6435	100.000	1221			

图10 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042701批-均一性2-pH1.2介质-5min-片4
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-40/30-1188-3 - zzp-6042701p-rcqx-pH1.2jz-jyx2-5min-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-1.2-Fx279.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260515-FX279.lcb
样品瓶号: 1-37
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/15 17:34:38
处理时间(V3): 2026/05/18 09:41:53
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.343	3464	58.297	844	2452	1.188	--
2	3.380	2478	41.703	313	4090	1.133	12.737
总计		5942	100.000	1156			

图11 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042701批-均一性2-pH1.2介质-5min-片5
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-40/30-1189-3 - zzp-6042701p-rcqx-pH1.2jz-jyx2-5min-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-1.2-Fx279.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260515-FX279.lcb
样品瓶号: 1-46
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/15 17:40:00
处理时间(V3): 2026/05/18 09:41:56
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.343	3095	54.747	763	2550	1.166	--
2	3.378	2558	45.253	311	4339	1.101	13.066
总计		5653	100.000	1073			

图12 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042701批-均一性2-pH1.2介质-5min-片6
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-40/30-1190-3 - zzp-6042701p-rcqx-pH1.2jz-jyx2-10min-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-1.2-Fx279.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260515-FX279.lcb
样品瓶号: 1-2
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/15 17:45:23
处理时间(V3): 2026/05/18 09:41:58
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.343	7587	64.354	1838	2523	1.190	--
2	3.379	4202	35.646	518	4350	1.116	13.057
总计		11790	100.000	2356			

图13 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042701批-均一性2-pH1.2介质-10min-片1
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-40/30-1191-3 - zzp-6042701p-rcqx-pH1.2jz-jyx2-10min-P2.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-1.2-Fx279.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260515-FX279.lcb

样品瓶号: 1-11

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/15 17:50:47

处理时间(V3): 2026/05/18 09:42:01

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流速: 1.5ml/min


波长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.343	8490	67.422	2037	2493	1.200	--
2	3.380	4102	32.578	504	3798	1.116	12.461
总计		12592	100.000	2541			

图14 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042701批-均一性2-pH1.2介质-10min-片2
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-40/30-1192-3 - zzp-6042701p-rcqx-pH1.2jz-jyx2-10min-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-1.2-Fx279.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260515-FX279.lcb
样品瓶号: 1-20
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/15 17:56:10
处理时间(V3): 2026/05/18 09:42:03
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.342	8239	66.598	2022	2532	1.164	--
2	3.381	4132	33.402	518	3981	1.044	12.703
总计		12372	100.000	2540			

图15 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042701批-均一性2-pH1.2介质-10min-片3
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-40/30-1193-3 - zzp-6042701p-rcqx-pH1.2jz-jyx2-10min-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-1.2-Fx279.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260515-FX279.lcb
样品瓶号: 1-29
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/15 18:01:32
处理时间(V3): 2026/05/18 09:42:06
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.342	8177	68.006	2012	2528	1.180	--
2	3.380	3847	31.994	493	4435	1.053	13.157
总计		12024	100.000	2505			

图16 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042701批-均一性2-pH1.2介质-10min-片4
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-40/30-1194-3 - zzp-6042701p-rcqx-pH1.2jz-jyx2-10min-P5.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-1.2-Fx279.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260515-FX279.lcb

样品瓶号: 1-38

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/15 18:06:55

处理时间(V3): 2026/05/18 09:42:08

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流 速: 1.5ml/min


波 长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.342	7887	65.818	1943	2539	1.180	--
2	3.384	4096	34.182	508	3968	1.006	12.706
总计		11983	100.000	2451			

图17 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042701批-均一性2-pH1.2介质-10min-片5
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-40/30-1195-3 - zzp-6042701p-rcqx-pH1.2jz-jyx2-10min-P6.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-1.2-Fx279.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260515-FX279.lcb

样品瓶号: 1-47

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/15 18:12:18

处理时间(V3): 2026/05/18 09:42:11

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流 速: 1.5ml/min


波 长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.342	7720	64.311	1882	2540	1.202	--
2	3.382	4284	35.689	523	4129	1.091	12.867
总计		12004	100.000	2405			

图18 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042701批-均一性2-pH1.2介质-10min-片6
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-40/30-1196-3 - zzp-6042701p-rcqx-pH1.2jz-jyx2-15min-P1.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-1.2-Fx279.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260515-FX279.lcb

样品瓶号: 1-3

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/15 18:17:40

处理时间(V3): 2026/05/18 09:42:13

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流 速: 1.5ml/min


波 长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.342	10790	69.813	2593	2471	1.186	--
2	3.381	4666	30.187	584	3950	1.083	12.618
总计		15455	100.000	3178			

图19 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042701批-均一性2-pH1.2介质-15min-片1
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-40/30-1197-3 - zzp-6042701p-rcqx-pH1.2jz-jyx2-15min-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-1.2-Fx279.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260515-FX279.lcb
样品瓶号: 1-12
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/15 18:23:04
处理时间(V3): 2026/05/18 09:42:16
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.342	11139	70.357	2721	2523	1.177	--
2	3.385	4693	29.643	598	3971	1.085	12.701
总计		15832	100.000	3319			

图20 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042701批-均一性2-pH1.2介质-15min-片2
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-40/30-1198-3 - zzp-6042701p-rcqx-pH1.2jz-jyx2-15min-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-1.2-Fx279.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260515-FX279.lcb
样品瓶号: 1-21
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/15 18:28:27
处理时间(V3): 2026/05/18 09:42:18
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.343	11114	68.994	2717	2517	1.183	--
2	3.384	4995	31.006	599	3925	1.126	12.634
总计		16109	100.000	3317			

图21 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042701批-均一性2-pH1.2介质-15min-片3
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-40/30-1199-3 - zzp-6042701p-rcqx-pH1.2jz-jyx2-15min-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-1.2-Fx279.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260515-FX279.lcb
样品瓶号: 1-30
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/15 18:33:50
处理时间(V3): 2026/05/18 09:42:21
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.343	11140	68.753	2692	2500	1.182	--
2	3.384	5063	31.247	611	3853	1.140	12.543
总计		16202	100.000	3304			

图22 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042701批-均一性2-pH1.2介质-15min-片4
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-40/30-1200-3 - zzp-6042701p-rcqx-pH1.2jz-jyx2-15min-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-1.2-Fx279.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260515-FX279.lcb
样品瓶号: 1-39
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/15 18:39:12
处理时间(V3): 2026/05/18 09:42:23
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.343	10791	70.895	2634	2517	1.172	--
2	3.386	4430	29.105	571	4218	1.062	12.950
总计		15221	100.000	3205			

图23 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042701批-均一性2-pH1.2介质-15min-片5
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-40/30-1201-3 - zzp-6042701p-rcqx-pH1.2jz-jyx2-15min-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-1.2-Fx279.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260515-FX279.lcb
样品瓶号: 1-48
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/15 18:44:35
处理时间(V3): 2026/05/18 09:42:25
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.343	10696	69.821	2599	2495	1.172	--
2	3.385	4623	30.179	570	4225	1.061	12.924
总计		15319	100.000	3169			

图24 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042701批-均一性2-pH1.2介质-15min-片6
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-40/30-1202-3 - zzp-6042701p-rcqx-pH1.2jz-jyx2-20min-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-1.2-Fx279.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260515-FX279.lcb
样品瓶号: 1-4
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/15 18:49:58
处理时间(V3): 2026/05/18 09:42:28
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.343	12714	72.292	3089	2520	1.175	--
2	3.384	4873	27.708	611	4223	1.043	12.948
总计		17588	100.000	3700			

图25 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042701批-均一性2-pH1.2介质-20min-片1
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-40/30-1203-3 - zzp-6042701p-rcqx-pH1.2jz-jyx2-20min-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-1.2-Fx279.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260515-FX279.lcb
样品瓶号: 1-13
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/15 18:55:21
处理时间(V3): 2026/05/18 09:42:30
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.343	13127	72.384	3194	2532	1.196	--
2	3.389	5008	27.616	626	3862	0.992	12.597
总计		18136	100.000	3820			

图26 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042701批-均一性2-pH1.2介质-20min-片2
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-40/30-1204-3 - zzp-6042701p-rcqx-pH1.2jz-jyx2-20min-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-1.2-Fx279.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260515-FX279.lcb
样品瓶号: 1-22
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/15 19:00:43
处理时间(V3): 2026/05/18 09:42:33
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.343	13188	72.361	3194	2511	1.169	--
2	3.387	5037	27.639	630	3769	1.127	12.470
总计		18225	100.000	3824			

图27 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042701批-均一性2-pH1.2介质-20min-片3
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-40/30-1205-3 - zzp-6042701p-rcqx-pH1.2jz-jyx2-20min-P4.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-1.2-Fx279.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260515-FX279.lcb

样品瓶号: 1-31

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/15 19:06:06

处理时间(V3): 2026/05/18 09:42:35

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流 速: 1.5ml/min


波 长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.342	12931	71.705	3135	2489	1.186	--
2	3.387	5103	28.295	632	3608	1.144	12.274
总计		18033	100.000	3766			

图28 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042701批-均一性2-pH1.2介质-20min-片4
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-40/30-1206-3 - zzp-6042701p-rcqx-pH1.2jz-jyx2-20min-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-1.2-Fx279.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260515-FX279.lcb
样品瓶号: 1-40
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/15 19:11:28
处理时间(V3): 2026/05/18 09:42:38
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.342	12841	72.418	3110	2514	1.179	--
2	3.388	4891	27.582	614	4018	1.072	12.748
总计		17731	100.000	3724			

图29 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042701批-均一性2-pH1.2介质-20min-片5
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-40/30-1207-3 - zzp-6042701p-rcqx-pH1.2jz-jyx2-20min-P6.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-1.2-Fx279.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260515-FX279.lcb

样品瓶号: 1-49

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/15 19:16:51

处理时间(V3): 2026/05/18 09:42:40

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流速: 1.5ml/min


波长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.342	12501	71.774	3032	2515	1.192	--
2	3.389	4916	28.226	603	3775	1.024	12.490
总计		17418	100.000	3635			

图30 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042701批-均一性2-pH1.2介质-20min-片6
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-40/30-1208-3 - zzp-6042701p-rcqx-pH1.2jz-jyx2-30min-P1.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-1.2-Fx279.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260515-FX279.lcb

样品瓶号: 1-5

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/15 19:22:14

处理时间(V3): 2026/05/18 09:42:43

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流速: 1.5ml/min


波长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.342	15212	74.536	3699	2534	1.193	--
2	3.389	5197	25.464	637	3702	1.080	12.424
总计		20410	100.000	4336			

图31 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042701批-均一性2-pH1.2介质-30min-片1
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-40/30-1209-3 - zzp-6042701p-rcqx-pH1.2jz-jyx2-30min-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-1.2-Fx279.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260515-FX279.lcb
样品瓶号: 1-14
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/15 19:27:37
处理时间(V3): 2026/05/18 09:42:46
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.343	15808	75.432	3823	2518	1.183	--
2	3.390	5149	24.568	642	3992	1.045	12.727
总计		20957	100.000	4465			

图32 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042701批-均一性2-pH1.2介质-30min-片2
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-40/30-1210-3 - zzp-6042701p-rcqx-pH1.2jz-jyx2-30min-P3.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-1.2-Fx279.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260515-FX279.lcb

样品瓶号: 1-23

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/15 19:32:58

处理时间(V3): 2026/05/18 09:42:48

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流速: 1.5ml/min


波长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.343	15620	75.603	3819	2520	1.178	--
2	3.390	5041	24.397	615	4014	1.069	12.754
总计		20661	100.000	4434			

图33 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042701批-均一性2-pH1.2介质-30min-片3
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-40/30-1211-3 - zzp-6042701p-rcqx-pH1.2jz-jyx2-30min-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-1.2-Fx279.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260515-FX279.lcb
样品瓶号: 1-32
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/15 19:38:22
处理时间(V3): 2026/05/18 09:42:51
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.343	15483	75.537	3756	2517	1.181	--
2	3.388	5014	24.463	621	3930	1.107	12.653
总计		20497	100.000	4377			

图34 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042701批-均一性2-pH1.2介质-30min-片4
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-40/30-1212-3 - zzp-6042701p-rcqx-pH1.2jz-jyx2-30min-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-1.2-Fx279.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260515-FX279.lcb
样品瓶号: 1-41
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/15 19:43:44
处理时间(V3): 2026/05/18 09:42:53
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.343	15557	76.133	3742	2488	1.199	--
2	3.393	4877	23.867	613	4044	1.063	12.772
总计		20434	100.000	4354			

图35 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042701批-均一性2-pH1.2介质-30min-片5
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-40/30-1213-3 - zzp-6042701p-rcqx-pH1.2jz-jyx2-30min-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-1.2-Fx279.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260515-FX279.lcb
样品瓶号: 1-50
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/15 19:49:08
处理时间(V3): 2026/05/18 09:42:56
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.343	15159	75.358	3664	2502	1.191	--
2	3.392	4957	24.642	617	3847	1.093	12.564
总计		20116	100.000	4281			

图36 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042701批-均一性2-pH1.2介质-30min-片6
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-40/30-1214-3 - zzp-6042701p-rcqx-pH1.2jz-jyx2-45min-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-1.2-Fx279.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260515-FX279.lcb
样品瓶号: 1-6
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/15 19:54:30
处理时间(V3): 2026/05/18 09:42:58
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.343	17903	76.162	4356	2509	1.189	--
2	3.395	5603	23.838	670	3636	1.122	12.342
总计		23506	100.000	5026			

图37 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042701批-均一性2-pH1.2介质-45min-片1
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-40/30-1215-3 - zzp-6042701p-rcqx-pH1.2jz-jyx2-45min-P2.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-1.2-Fx279.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260515-FX279.lcb

样品瓶号: 1-15

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/15 19:59:53

处理时间(V3): 2026/05/18 09:43:01

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流 速: 1.5ml/min


波 长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.343	18287	77.438	4428	2500	1.178	--
2	3.392	5328	22.562	637	3861	1.104	12.577
总计		23615	100.000	5065			

图38 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042701批-均一性2-pH1.2介质-45min-片2
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-40/30-1216-3 - zzp-6042701p-rcqx-pH1.2jz-jyx2-45min-P3.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-1.2-Fx279.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260515-FX279.lcb

样品瓶号: 1-24

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/15 20:05:15

处理时间(V3): 2026/05/18 09:43:03

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流速: 1.5ml/min


波长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.343	18223	78.470	4421	2502	1.187	--
2	3.395	5000	21.530	613	4151	1.054	12.896
总计		23223	100.000	5035			

图39 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042701批-均一性2-pH1.2介质-45min-片3
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-40/30-1217-3 - zzp-6042701p-rcqx-pH1.2jz-jyx2-45min-P4.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-1.2-Fx279.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260515-FX279.lcb

样品瓶号: 1-33

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/15 20:10:36

处理时间(V3): 2026/05/18 09:43:06

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流 速: 1.5ml/min


波 长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.343	17985	77.538	4359	2491	1.178	--
2	3.394	5210	22.462	645	3810	1.109	12.520
总计		23196	100.000	5003			

图40 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042701批-均一性2-pH1.2介质-45min-片4
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-40/30-1218-3 - zzp-6042701p-rcqx-pH1.2jz-jyx2-45min-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-1.2-Fx279.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260515-FX279.lcb
样品瓶号: 1-42
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/15 20:16:00
处理时间(V3): 2026/05/18 09:43:08
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.343	17877	78.912	4362	2511	1.188	--
2	3.397	4777	21.088	590	4167	1.044	12.928
总计		22654	100.000	4951			

图41 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042701批-均一性2-pH1.2介质-45min-片5
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-40/30-1219-3 - zzp-6042701p-rcqx-pH1.2jz-jyx2-45min-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-1.2-Fx279.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260515-FX279.lcb
样品瓶号: 1-51
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/15 20:21:23
处理时间(V3): 2026/05/18 09:43:10
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.343	17478	77.020	4249	2516	1.188	--
2	3.396	5215	22.980	638	3782	1.097	12.521
总计		22693	100.000	4887			

图42 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042701批-均一性2-pH1.2介质-45min-片6
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-40/30-1220-3 - zzp-6042701p-rcqx-pH1.2jz-jyx2-60min-P1.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-1.2-Fx279.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260515-FX279.lcb

样品瓶号: 1-7

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/15 20:26:46

处理时间(V3): 2026/05/18 09:43:13

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流 速: 1.5ml/min


波 长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.343	19593	78.303	4758	2493	1.177	--
2	3.396	5429	21.697	650	3830	1.062	12.553
总计		25022	100.000	5408			

图43 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042701批-均一性2-pH1.2介质-60min-片1
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-40/30-1221-3 - zzp-6042701p-rcqx-pH1.2jz-jyx2-60min-P2.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-1.2-Fx279.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260515-FX279.lcb

样品瓶号: 1-16

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/15 20:32:09

处理时间(V3): 2026/05/18 09:43:15

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流 速: 1.5ml/min


波 长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.343	20024	79.152	4869	2507	1.170	--
2	3.396	5274	20.848	664	4081	1.086	12.833
总计		25299	100.000	5533			

图44 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042701批-均一性2-pH1.2介质-60min-片2
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-40/30-1222-3 - zzp-6042701p-rcqx-pH1.2jz-jyx2-60min-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-1.2-Fx279.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260515-FX279.lcb
样品瓶号: 1-25
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/15 20:37:31
处理时间(V3): 2026/05/18 09:43:18
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.343	19892	79.523	4848	2507	1.177	--
2	3.396	5122	20.477	639	4121	1.123	12.872
总计		25014	100.000	5486			

图45 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042701批-均一性2-pH1.2介质-60min-片3
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-40/30-1223-3 - zzp-6042701p-rcqx-pH1.2jz-jyx2-60min-P4.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-1.2-Fx279.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260515-FX279.lcb

样品瓶号: 1-34

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/15 20:42:54

处理时间(V3): 2026/05/18 09:43:20

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流速: 1.5ml/min


波长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.343	19663	79.058	4786	2525	1.187	--
2	3.398	5209	20.942	666	3963	1.068	12.727
总计		24872	100.000	5452			

图46 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042701批-均一性2-pH1.2介质-60min-片4
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-40/30-1224-3 - zzp-6042701p-rcqx-pH1.2jz-jyx2-60min-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-1.2-Fx279.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260515-FX279.lcb
样品瓶号: 1-43
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/15 20:48:16
处理时间(V3): 2026/05/18 09:43:22
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.344	19717	80.241	4811	2505	1.173	--
2	3.397	4855	19.759	610	3833	1.059	12.565
总计		24573	100.000	5421			

图47 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042701批-均一性2-pH1.2介质-60min-片5
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-40/30-1225-3 - zzp-6042701p-rcqx-pH1.2jz-jyx2-60min-P6.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-1.2-Fx279.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260515-FX279.lcb

样品瓶号: 1-52

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/15 20:53:40

处理时间(V3): 2026/05/18 09:43:25

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流 速: 1.5ml/min


波 长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.344	19315	78.799	4708	2517	1.179	--
2	3.395	5197	21.201	633	3832	1.061	12.565
总计		24511	100.000	5341			

图48 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042701批-均一性2-pH1.2介质-60min-片6
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-40/30-1226-3 - zzp-6042701p-rcqx-pH1.2jz-jyx2-90min-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-1.2-Fx279.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260515-FX279.lcb
样品瓶号: 1-8
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/15 20:59:04
处理时间(V3): 2026/05/18 09:43:27
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.344	21991	81.018	5357	2498	1.179	--
2	3.399	5152	18.982	641	3839	1.044	12.570
总计		27143	100.000	5998			

图49 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042701批-均一性2-pH1.2介质-90min-片1
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-40/30-1227-3 - zzp-6042701p-rcqx-pH1.2jz-jyx2-90min-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-1.2-Fx279.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260515-FX279.lcb
样品瓶号: 1-17
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/15 21:04:28
处理时间(V3): 2026/05/18 09:43:30
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.344	22286	81.019	5431	2510	1.181	--
2	3.398	5221	18.981	646	3715	1.095	12.439
总计		27507	100.000	6077			

图50 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042701批-均一性2-pH1.2介质-90min-片2
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-40/30-1228-3 - zzp-6042701p-rcqx-pH1.2jz-jyx2-90min-P3.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-1.2-Fx279.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260515-FX279.lcb

样品瓶号: 1-26

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/15 21:09:51

处理时间(V3): 2026/05/18 09:43:32

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流 速: 1.5ml/min


波 长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.344	22206	80.979	5419	2515	1.196	--
2	3.398	5216	19.021	631	3977	1.090	12.728
总计		27422	100.000	6050			

图51 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042701批-均一性2-pH1.2介质-90min-片3
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-40/30-1229-2 - zzp-6042701p-rcqx-pH1.2jz-jyx2-90min-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-1.2-Fx279.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260515-FX279.lcb
样品瓶号: 1-35
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/15 21:15:16
处理时间(V2): 2026/05/18 09:43:34
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.344	21963	80.403	5333	2498	1.194	--
2	3.398	5353	19.597	654	3903	1.079	12.633
总计		27316	100.000	5988			

图52 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042701批-均一性2-pH1.2介质-90min-片4
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-40/30-1230-2 - zzp-6042701p-rcqx-pH1.2jz-jyx2-90min-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-1.2-Fx279.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260515-FX279.lcb
样品瓶号: 1-44
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/15 21:20:39
处理时间(V2): 2026/05/18 09:43:37
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.344	22036	81.443	5344	2506	1.189	--
2	3.398	5021	18.557	602	4176	1.061	12.933
总计		27056	100.000	5947			

图53 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042701批-均一性2-pH1.2介质-90min-片5
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-40/30-1231-2 - zzp-6042701p-rcqx-pH1.2jz-jyx2-90min-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-1.2-Fx279.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260515-FX279.lcb
样品瓶号: 1-53
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/15 21:26:03
处理时间(V2): 2026/05/18 09:43:40
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.344	21532	80.843	5234	2517	1.189	--
2	3.399	5102	19.157	622	3833	1.107	12.576
总计		26634	100.000	5857			

图54 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042701批-均一性2-pH1.2介质-90min-片6
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-40/30-1232-2 - zzp-6042701p-rcqx-pH1.2jz-jyx2-120min-P1.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-1.2-Fx279.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260515-FX279.lcb

样品瓶号: 4-1

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/15 21:31:26

处理时间(V2): 2026/05/18 09:43:42

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流 速: 1.5ml/min


波 长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.344	23677	82.143	5737	2496	1.183	--
2	3.403	5147	17.857	638	3929	1.089	12.678
总计		28825	100.000	6374			

图55 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042701批-均一性2-pH1.2介质-120min-片1
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-40/30-1233-2 - zzp-6042701p-rcqx-pH1.2jz-jyx2-120min-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-1.2-Fx279.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260515-FX279.lcb
样品瓶号: 4-10
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/15 21:36:48
处理时间(V2): 2026/05/18 09:43:45
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.344	23813	82.451	5818	2515	1.182	--
2	3.398	5069	17.549	618	3919	1.123	12.669
总计		28882	100.000	6436			

图56 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042701批-均一性2-pH1.2介质-120min-片2
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-40/30-1234-2 - zzp-6042701p-rcqx-pH1.2jz-jyx2-120min-P3.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-1.2-Fx279.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260515-FX279.lcb

样品瓶号: 4-19

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/15 21:42:11

处理时间(V2): 2026/05/18 09:43:47

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流 速: 1.5ml/min


波 长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.344	23792	82.058	5816	2511	1.175	--
2	3.398	5202	17.942	652	4351	1.143	13.109
总计		28994	100.000	6467			

图57 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042701批-均一性2-pH1.2介质-120min-片3
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-40/30-1235-2 - zzp-6042701p-rcqx-pH1.2jz-jyx2-120min-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-1.2-Fx279.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260515-FX279.lcb
样品瓶号: 4-28
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/15 21:47:34
处理时间(V2): 2026/05/18 09:43:50
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.344	23488	83.073	5711	2500	1.182	--
2	3.396	4786	16.927	607	4170	1.109	12.911
总计		28274	100.000	6318			

图58 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042701批-均一性2-pH1.2介质-120min-片4
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-40/30-1236-2 - zzp-6042701p-rcqx-pH1.2jz-jyx2-120min-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-1.2-Fx279.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260515-FX279.lcb
样品瓶号: 4-37
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/15 21:52:57
处理时间(V2): 2026/05/18 09:43:52
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.344	23622	82.510	5774	2511	1.175	--
2	3.399	5007	17.490	626	4267	1.068	13.029
总计		28630	100.000	6400			

图59 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042701批-均一性2-pH1.2介质-120min-片5
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-40/30-1237-2 - zzp-6042701p-rcqx-pH1.2jz-jyx2-120min-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-1.2-Fx279.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260515-FX279.lcb
样品瓶号: 4-46
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/15 21:58:20
处理时间(V2): 2026/05/18 09:43:55
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.344	23139	82.599	5641	2499	1.180	--
2	3.398	4875	17.401	613	4006	1.169	12.744
总计		28014	100.000	6254			

图60 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042701批-均一性2-pH1.2介质-120min-片6
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-40/30-1238-2 - zzp-6042701p-rcqx-pH1.2jz-jyx2-JX-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-1.2-Fx279.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260515-FX279.lcb
样品瓶号: 4-2
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/15 22:03:43
处理时间(V2): 2026/05/18 09:43:57
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.344	24105	82.366	5856	2499	1.180	--
2	3.403	5161	17.634	650	4145	1.015	12.911
总计		29265	100.000	6507			

图61 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042701批-均一性2-pH1.2介质-极限转速-片1
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-40/30-1239-2 - zzp-6042701p-rcqx-pH1.2jz-jyx2-JX-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-1.2-Fx279.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260515-FX279.lcb
样品瓶号: 4-11
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/15 22:09:06
处理时间(V2): 2026/05/18 09:44:00
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.345	24471	83.018	5961	2508	1.176	--
2	3.408	5006	16.982	629	4124	1.034	12.908
总计		29476	100.000	6591			

图62 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042701批-均一性2-pH1.2介质-极限转速-片2
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-40/30-1240-2 - zzp-6042701p-rcqx-pH1.2jz-jyx2-JX-P3.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-1.2-Fx279.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260515-FX279.lcb

样品瓶号: 4-20

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/15 22:14:30

处理时间(V2): 2026/05/18 09:44:03

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流 速: 1.5ml/min


波 长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.344	24117	82.658	5889	2511	1.171	--
2	3.402	5060	17.342	627	3845	1.147	12.598
总计		29177	100.000	6517			

图63 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042701批-均一性2-pH1.2介质-极限转速-片3
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-40/30-1241-2 - zzp-6042701p-rcqx-pH1.2jz-jyx2-JX-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-1.2-Fx279.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260515-FX279.lcb
样品瓶号: 4-29
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/15 22:19:53
处理时间(V2): 2026/05/18 09:44:07
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.344	23996	82.082	5860	2514	1.180	--
2	3.401	5238	17.918	646	3786	1.150	12.528
总计		29234	100.000	6506			

图64 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042701批-均一性2-pH1.2介质-极限转速-片4
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-40/30-1242-2 - zzp-6042701p-rcqx-pH1.2jz-jyx2-JX-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-1.2-Fx279.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260515-FX279.lcb
样品瓶号: 4-38
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/15 22:25:15
处理时间(V2): 2026/05/18 09:44:09
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.345	24104	82.757	5884	2504	1.173	--
2	3.405	5022	17.243	633	4189	1.014	12.961
总计		29127	100.000	6517			

图65 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042701批-均一性2-pH1.2介质-极限转速-片5
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-40/30-1243-2 - zzp-6042701p-rcqx-pH1.2jz-jyx2-JX-P6.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-1.2-Fx279.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260515-FX279.lcb

样品瓶号: 4-47

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/15 22:30:38

处理时间(V2): 2026/05/18 09:44:12

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流 速: 1.5ml/min


波 长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.344	23648	81.949	5759	2511	1.181	--
2	3.402	5209	18.051	642	3993	1.117	12.754
总计		28857	100.000	6401			

图66 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042701批-均一性2-pH1.2介质-极限转速-片6
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-40/30-1244-2 - zzp-6042701p-rcqx-pH1.2jz-jyx2-dz-2-1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-1.2-Fx279.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260515-FX279.lcb
样品瓶号: 1-27
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/15 22:36:02
处理时间(V2): 2026/05/18 09:44:14
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.318	35901	11.755	7567	1783	1.185	--
2	3.347	269511	88.245	30764	3376	1.170	11.418
总计		305412	100.000	38330			

图67 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042701批-均一性2-pH1.2介质
对照品溶液-2-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-40/30-1245-2 - zzp-6042701p-rcqx-pH1.2jz-jyx2-dz-2-2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-1.2-Fx279.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260515-FX279.lcb
样品瓶号: 1-27
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/15 22:41:27
处理时间(V2): 2026/05/18 09:44:17
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.320	35855	11.743	7584	1797	1.189	--
2	3.347	269484	88.257	30744	3373	1.169	11.420
总计		305340	100.000	38328			

图68 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042701批-均一性2-pH1.2介质
对照品溶液-2-2




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-40/30-1246-2 - zzp-6042702p-rcqx-pH1.2jz-jyx2-rj.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-1.2-Fx279.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260515-FX279.lcb
样品瓶号: 2-9
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/15 22:46:52
处理时间(V2): 2026/05/18 09:44:19
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图69 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042702批-均一性2-pH1.2介质
溶剂



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-40/30-1247-2 - zzp-6042702p-rcqx-pH1.2jz-jyx2-dz-1-1.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-1.2-Fx279.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260515-FX279.lcb

样品瓶号: 2-18

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/15 22:52:16

处理时间(V2): 2026/05/18 09:44:22

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流 速: 1.5ml/min


波 长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.319	35163	11.764	7410	1782	1.191	--
2	3.347	263748	88.236	30084	3367	1.169	11.402
总计		298911	100.000	37494			

图70 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042702批-均一性2-pH1.2介质
对照品溶液-1-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-40/30-1248-2 - zzp-6042702p-rcqx-pH1.2jz-jyx2-dz-1-2.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-1.2-Fx279.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260515-FX279.lcb

样品瓶号: 2-18

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/15 22:57:42

处理时间(V2): 2026/05/18 09:44:24

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流 速: 1.5ml/min


波 长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.319	35342	11.823	7423	1772	1.187	--
2	3.346	263568	88.177	30123	3374	1.166	11.396
总计		298910	100.000	37546			

图71 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042702批-均一性2-pH1.2介质
对照品溶液-1-2



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-40/30-1249-2 - zzp-6042702p-rcqx-pH1.2jz-jyx2-dz-1-3.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-1.2-Fx279.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260515-FX279.lcb

样品瓶号: 2-18

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/15 23:03:06

处理时间(V2): 2026/05/18 09:44:27

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流 速: 1.5ml/min


波 长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.319	35280	11.779	7417	1781	1.186	--
2	3.346	264238	88.221	30171	3374	1.167	11.403
总计		299518	100.000	37588			

图72 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042702批-均一性2-pH1.2介质
对照品溶液-1-3



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-40/30-1250-2 - zzp-6042702p-rcqx-pH1.2jz-jyx2-dz-1-4.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-1.2-Fx279.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260515-FX279.lcb

样品瓶号: 2-18

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/15 23:08:32

处理时间(V2): 2026/05/18 09:44:29

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流 速: 1.5ml/min


波 长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.319	35467	11.838	7439	1775	1.197	--
2	3.345	264133	88.162	30176	3376	1.168	11.398
总计		299600	100.000	37614			

图73 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042702批-均一性2-pH1.2介质
对照品溶液-1-4




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-40/30-1251-2 - zzp-6042702p-rcqx-pH1.2jz-jyx2-dz-1-5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-1.2-Fx279.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260515-FX279.lcb
样品瓶号: 2-18
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/15 23:13:56
处理时间(V2): 2026/05/18 09:44:32
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.319	35343	11.798	7423	1780	1.189	--
2	3.344	264235	88.202	30181	3374	1.167	11.399
总计		299578	100.000	37605			

图74 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042702批-均一性2-pH1.2介质
对照品溶液-1-5




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-40/30-1252-2 - zzp-6042702p-rcqx-pH1.2jz-jyx2-5min-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-1.2-Fx279.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260515-FX279.lcb
样品瓶号: 2-1
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/15 23:19:21
处理时间(V2): 2026/05/18 09:44:34
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.345	3230	50.136	790	2519	1.212	--
2	3.399	3213	49.864	400	4466	1.091	13.221
总计		6443	100.000	1190			

图75 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042702批-均一性2-pH1.2介质-5min-片1
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-40/30-1253-2 - zzp-6042702p-rcqx-pH1.2jz-jyx2-5min-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-1.2-Fx279.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260515-FX279.lcb
样品瓶号: 2-10
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/15 23:24:45
处理时间(V2): 2026/05/18 09:44:37
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.346	4522	54.200	1115	2573	1.254	--
2	3.402	3821	45.800	463	3858	1.119	12.644
总计		8343	100.000	1578			

图76 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042702批-均一性2-pH1.2介质-5min-片2
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-40/30-1254-2 - zzp-6042702p-rcqx-pH1.2jz-jyx2-5min-P3.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-1.2-Fx279.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260515-FX279.lcb

样品瓶号: 2-19

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/15 23:30:09

处理时间(V2): 2026/05/18 09:44:40

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流速: 1.5ml/min


波长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.346	2809	46.793	693	2492	1.194	--
2	3.403	3195	53.207	411	4172	1.138	12.916
总计		6004	100.000	1104			

图77 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042702批-均一性2-pH1.2介质-5min-片3
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-40/30-1255-2 - zzp-6042702p-rcqx-pH1.2jz-jyx2-5min-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-1.2-Fx279.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260515-FX279.lcb
样品瓶号: 2-28
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/15 23:35:32
处理时间(V2): 2026/05/18 09:44:43
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.345	3926	55.170	957	2480	1.166	--
2	3.403	3191	44.830	398	4239	1.069	12.980
总计		7117	100.000	1355			

图78 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042702批-均一性2-pH1.2介质-5min-片4
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-40/30-1256-2 - zzp-6042702p-rcqx-pH1.2jz-jyx2-5min-P5.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-1.2-Fx279.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260515-FX279.lcb

样品瓶号: 2-37

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/15 23:40:57

处理时间(V2): 2026/05/18 09:44:45

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流 速: 1.5ml/min


波 长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.345	3891	57.773	939	2404	1.179	--
2	3.401	2844	42.227	365	3954	1.059	12.611
总计		6735	100.000	1303			

图79 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042702批-均一性2-pH1.2介质-5min-片5
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-40/30-1257-2 - zzp-6042702p-rcqx-pH1.2jz-jyx2-5min-P6.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-1.2-Fx279.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260515-FX279.lcb

样品瓶号: 2-46

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/15 23:46:20

处理时间(V2): 2026/05/18 09:44:48

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流速: 1.5ml/min


波长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.345	3852	54.219	934	2450	1.149	--
2	3.405	3253	45.781	393	3908	1.109	12.612
总计		7105	100.000	1327			

图80 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042702批-均一性2-pH1.2介质-5min-片6
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-40/30-1258-2 - zzp-6042702p-rcqx-pH1.2jz-jyx2-10min-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-1.2-Fx279.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260515-FX279.lcb
样品瓶号: 2-2
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/15 23:51:44
处理时间(V2): 2026/05/18 09:44:50
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.345	7735	64.148	1875	2516	1.213	--
2	3.406	4323	35.852	533	4037	1.085	12.814
总计		12058	100.000	2407			

图81 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042702批-均一性2-pH1.2介质-10min-片1
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-40/30-1259-2 - zzp-6042702p-rcqx-pH1.2jz-jyx2-10min-P2.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-1.2-Fx279.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260515-FX279.lcb

样品瓶号: 2-11

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/15 23:57:08

处理时间(V2): 2026/05/18 09:44:53

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流 速: 1.5ml/min


波 长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.345	8696	65.712	2133	2505	1.147	--
2	3.405	4537	34.288	551	4254	1.025	13.025
总计		13233	100.000	2684			

图82 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042702批-均一性2-pH1.2介质-10min-片2
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-40/30-1260-2 - zzp-6042702p-rcqx-pH1.2jz-jyx2-10min-P3.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-1.2-Fx279.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260515-FX279.lcb

样品瓶号: 2-20

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/16 00:02:33

处理时间(V2): 2026/05/18 09:44:55

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流 速: 1.5ml/min


波 长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.345	7439	63.231	1813	2467	1.162	--
2	3.405	4326	36.769	538	4119	1.164	12.855
总计		11765	100.000	2351			

图83 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042702批-均一性2-pH1.2介质-10min-片3
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-40/30-1261-2 - zzp-6042702p-rcqx-pH1.2jz-jyx2-10min-P4.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-1.2-Fx279.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260515-FX279.lcb

样品瓶号: 2-29

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/16 00:07:57

处理时间(V2): 2026/05/18 09:44:58

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流 速: 1.5ml/min


波 长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.345	8287	65.237	2027	2496	1.190	--
2	3.399	4416	34.763	549	4331	1.145	13.073
总计		12704	100.000	2577			

图84 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042702批-均一性2-pH1.2介质-10min-片4
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-40/30-1262-2 - zzp-6042702p-rcqx-pH1.2jz-jyx2-10min-P5.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-1.2-Fx279.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260515-FX279.lcb

样品瓶号: 2-38

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/16 00:13:21

处理时间(V2): 2026/05/18 09:45:01

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流速: 1.5ml/min


波长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.345	8156	65.279	2001	2505	1.169	--
2	3.403	4338	34.721	522	3808	1.057	12.549
总计		12494	100.000	2523			

图85 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042702批-均一性2-pH1.2介质-10min-片5
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-40/30-1263-2 - zzp-6042702p-rcqx-pH1.2jz-jyx2-10min-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-1.2-Fx279.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260515-FX279.lcb
样品瓶号: 2-47
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/16 00:18:44
处理时间(V2): 2026/05/18 09:45:03
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.345	8322	65.435	2021	2521	1.199	--
2	3.406	4396	34.565	552	4032	1.083	12.811
总计		12717	100.000	2573			

图86 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042702批-均一性2-pH1.2介质-10min-片6
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-40/30-1264-2 - zzp-6042702p-rcqx-pH1.2jz-jyx2-15min-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-1.2-Fx279.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260515-FX279.lcb
样品瓶号: 2-3
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/16 00:24:08
处理时间(V2): 2026/05/18 09:45:06
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.346	10614	68.924	2574	2472	1.193	--
2	3.407	4786	31.076	591	4127	1.008	12.866
总计		15400	100.000	3165			

图87 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042702批-均一性2-pH1.2介质-15min-片1
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-40/30-1265-2 - zzp-6042702p-rcqx-pH1.2jz-jyx2-15min-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-1.2-Fx279.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260515-FX279.lcb
样品瓶号: 2-12
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/16 00:29:33
处理时间(V2): 2026/05/18 09:45:08
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.346	11223	68.630	2752	2486	1.168	--
2	3.406	5130	31.370	628	3944	1.083	12.682
总计		16352	100.000	3379			

图88 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042702批-均一性2-pH1.2介质-15min-片2
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-40/30-1266-2 - zzp-6042702p-rcqx-pH1.2jz-jyx2-15min-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-1.2-Fx279.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260515-FX279.lcb
样品瓶号: 2-21
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/16 00:34:57
处理时间(V2): 2026/05/18 09:45:10
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.346	10188	67.343	2497	2534	1.164	--
2	3.406	4941	32.657	604	4157	1.046	12.946
总计		15129	100.000	3100			

图89 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042702批-均一性2-pH1.2介质-15min-片3
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-40/30-1267-2 - zzp-6042702p-rcqx-pH1.2jz-jyx2-15min-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-1.2-Fx279.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260515-FX279.lcb
样品瓶号: 2-30
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/16 00:40:21
处理时间(V2): 2026/05/18 09:45:13
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.346	11008	67.892	2696	2511	1.188	--
2	3.408	5206	32.108	635	4145	1.068	12.923
总计		16214	100.000	3331			

图90 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042702批-均一性2-pH1.2介质-15min-片4
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-40/30-1268-2 - zzp-6042702p-rcqx-pH1.2jz-jyx2-15min-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-1.2-Fx279.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260515-FX279.lcb
样品瓶号: 2-39
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/16 00:45:46
处理时间(V2): 2026/05/18 09:45:15
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.346	10841	68.967	2645	2491	1.170	--
2	3.408	4878	31.033	596	4198	1.071	12.960
总计		15720	100.000	3242			

图91 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042702批-均一性2-pH1.2介质-15min-片5
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-40/30-1269-2 - zzp-6042702p-rcqx-pH1.2jz-jyx2-15min-P6.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-1.2-Fx279.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260515-FX279.lcb

样品瓶号: 2-48

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/16 00:51:09

处理时间(V2): 2026/05/18 09:45:18

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流 速: 1.5ml/min


波 长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.346	10965	69.393	2677	2488	1.183	--
2	3.410	4836	30.607	598	3721	1.111	12.449
总计		15801	100.000	3275			

图92 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042702批-均一性2-pH1.2介质-15min-片6
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-40/30-1270-2 - zzp-6042702p-rcqx-pH1.2jz-jyx2-20min-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-1.2-Fx279.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260515-FX279.lcb
样品瓶号: 2-4
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/16 00:56:34
处理时间(V2): 2026/05/18 09:45:20
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.345	12563	71.839	3058	2520	1.199	--
2	3.407	4925	28.161	615	4112	1.077	12.901
总计		17487	100.000	3673			

图93 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042702批-均一性2-pH1.2介质-20min-片1
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-40/30-1271-2 - zzp-6042702p-rcqx-pH1.2jz-jyx2-20min-P2.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-1.2-Fx279.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260515-FX279.lcb

样品瓶号: 2-13

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/16 01:01:59

处理时间(V2): 2026/05/18 09:45:23

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流 速: 1.5ml/min


波 长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.345	13079	72.060	3172	2497	1.178	--
2	3.406	5071	27.940	636	4283	1.088	13.049
总计		18150	100.000	3807			

图94 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042702批-均一性2-pH1.2介质-20min-片2
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-40/30-1272-2 - zzp-6042702p-rcqx-pH1.2jz-jyx2-20min-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-1.2-Fx279.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260515-FX279.lcb
样品瓶号: 2-22
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/16 01:07:23
处理时间(V2): 2026/05/18 09:45:26
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.345	12503	70.594	3032	2496	1.172	--
2	3.407	5208	29.406	642	3778	1.085	12.518
总计		17710	100.000	3674			

图95 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042702批-均一性2-pH1.2介质-20min-片3
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-40/30-1273-2 - zzp-6042702p-rcqx-pH1.2jz-jyx2-20min-P4.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-1.2-Fx279.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260515-FX279.lcb

样品瓶号: 2-31

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/16 01:12:48

处理时间(V2): 2026/05/18 09:45:28

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流 速: 1.5ml/min


波 长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.345	12892	71.034	3138	2515	1.185	--
2	3.410	5257	28.966	640	3807	1.067	12.578
总计		18149	100.000	3777			

图96 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042702批-均一性2-pH1.2介质-20min-片4
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-40/30-1274-2 - zzp-6042702p-rcqx-pH1.2jz-jyx2-20min-P5.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-1.2-Fx279.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260515-FX279.lcb

样品瓶号: 2-40

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/16 01:18:13

处理时间(V2): 2026/05/18 09:45:31

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流 速: 1.5ml/min


波 长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.345	12685	71.010	3111	2511	1.188	--
2	3.405	5179	28.990	623	4003	1.165	12.764
总计		17864	100.000	3735			

图97 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042702批-均一性2-pH1.2介质-20min-片5
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-40/30-1275-2 - zzp-6042702p-rcqx-pH1.2jz-jyx2-20min-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-1.2-Fx279.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260515-FX279.lcb
样品瓶号: 2-49
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/16 01:23:37
处理时间(V2): 2026/05/18 09:45:33
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.345	12761	72.665	3101	2493	1.182	--
2	3.412	4801	27.335	603	4104	1.022	12.885
总计		17562	100.000	3705			

图98 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042702批-均一性2-pH1.2介质-20min-片6
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-40/30-1276-2 - zzp-6042702p-rcqx-pH1.2jz-jyx2-30min-P1.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-1.2-Fx279.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260515-FX279.lcb

样品瓶号: 2-5

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/16 01:29:01

处理时间(V2): 2026/05/18 09:45:36

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流 速: 1.5ml/min


波 长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.345	15068	73.847	3666	2495	1.174	--
2	3.410	5337	26.153	648	4274	1.155	13.053
总计		20405	100.000	4315			

图99 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042702批-均一性2-pH1.2介质-30min-片1
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-40/30-1277-2 - zzp-6042702p-rcqx-pH1.2jz-jyx2-30min-P2.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-1.2-Fx279.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260515-FX279.lcb

样品瓶号: 2-14

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/16 01:34:27

处理时间(V2): 2026/05/18 09:45:38

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流速: 1.5ml/min


波长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.345	15477	75.079	3780	2520	1.186	--
2	3.406	5137	24.921	636	4131	1.105	12.915
总计		20614	100.000	4416			

图100 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042702批-均一性2-pH1.2介质-30min-片2
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-40/30-1278-2 - zzp-6042702p-rcqx-pH1.2jz-jyx2-30min-P3.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-1.2-Fx279.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260515-FX279.lcb

样品瓶号: 2-23

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/16 01:39:51

处理时间(V2): 2026/05/18 09:45:41

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流速: 1.5ml/min


波长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.345	15094	72.914	3691	2508	1.169	--
2	3.408	5607	27.086	683	4073	1.104	12.854
总计		20702	100.000	4374			

图101 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042702批-均一性2-pH1.2介质-30min-片3
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-40/30-1279-2 - zzp-6042702p-rcqx-pH1.2jz-jyx2-30min-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-1.2-Fx279.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260515-FX279.lcb
样品瓶号: 2-32
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/16 01:45:17
处理时间(V2): 2026/05/18 09:45:43
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.345	15452	74.645	3763	2503	1.181	--
2	3.408	5249	25.355	639	3811	1.082	12.564
总计		20700	100.000	4402			

图102 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042702批-均一性2-pH1.2介质-30min-片4
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-40/30-1280-2 - zzp-6042702p-rcqx-pH1.2jz-jyx2-30min-P5.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-1.2-Fx279.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260515-FX279.lcb

样品瓶号: 2-41

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/16 01:50:41

处理时间(V2): 2026/05/18 09:45:46

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流 速: 1.5ml/min


波 长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.345	15327	75.318	3722	2484	1.182	--
2	3.408	5023	24.682	612	3819	1.130	12.557
总计		20349	100.000	4334			

图103 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042702批-均一性2-pH1.2介质-30min-片5
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-40/30-1281-2 - zzp-6042702p-rcqx-pH1.2jz-jyx2-30min-P6.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-1.2-Fx279.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260515-FX279.lcb

样品瓶号: 2-50

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/16 01:56:05

处理时间(V2): 2026/05/18 09:45:48

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流 速: 1.5ml/min


波 长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.345	15284	75.303	3725	2503	1.179	--
2	3.410	5013	24.697	614	3990	1.088	12.768
总计		20297	100.000	4339			

图104 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042702批-均一性2-pH1.2介质-30min-片6
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-40/30-1282-2 - zzp-6042702p-rcqx-pH1.2jz-jyx2-45min-P1.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-1.2-Fx279.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260515-FX279.lcb

样品瓶号: 2-6

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/16 02:01:30

处理时间(V2): 2026/05/18 09:45:51

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流 速: 1.5ml/min


波 长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.345	17715	76.463	4309	2493	1.175	--
2	3.407	5453	23.537	656	3775	1.164	12.514
总计		23168	100.000	4966			

图105 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042702批-均一性2-pH1.2介质-45min-片1
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-40/30-1283-2 - zzp-6042702p-rcqx-pH1.2jz-jyx2-45min-P2.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-1.2-Fx279.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260515-FX279.lcb

样品瓶号: 2-15

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/16 02:06:56

处理时间(V2): 2026/05/18 09:45:53

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流 速: 1.5ml/min


波 长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.345	17848	77.533	4360	2518	1.174	--
2	3.413	5172	22.467	630	3851	1.032	12.636
总计		23019	100.000	4991			

图106 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042702批-均一性2-pH1.2介质-45min-片2
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-40/30-1284-2 - zzp-6042702p-rcqx-pH1.2jz-jyx2-45min-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-1.2-Fx279.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260515-FX279.lcb
样品瓶号: 2-24
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/16 02:12:21
处理时间(V2): 2026/05/18 09:45:56
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.345	17951	77.068	4358	2496	1.176	--
2	3.413	5341	22.932	661	4160	1.079	12.948
总计		23292	100.000	5019			

图107 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042702批-均一性2-pH1.2介质-45min-片3
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-40/30-1285-2 - zzp-6042702p-rcqx-pH1.2jz-jyx2-45min-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-1.2-Fx279.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260515-FX279.lcb
样品瓶号: 2-33
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/16 02:17:46
处理时间(V2): 2026/05/18 09:45:58
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.345	17867	76.989	4361	2517	1.180	--
2	3.411	5340	23.011	669	4164	1.088	12.966
总计		23208	100.000	5030			

图108 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042702批-均一性2-pH1.2介质-45min-片4
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-40/30-1286-2 - zzp-6042702p-rcqx-pH1.2jz-jyx2-45min-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-1.2-Fx279.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260515-FX279.lcb
样品瓶号: 2-42
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/16 02:23:10
处理时间(V2): 2026/05/18 09:46:01
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.345	17743	77.789	4341	2529	1.184	--
2	3.411	5066	22.211	629	4195	1.031	13.005
总计		22809	100.000	4970			

图109 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042702批-均一性2-pH1.2介质-45min-片5
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-40/30-1287-2 - zzp-6042702p-rcqx-pH1.2jz-jyx2-45min-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-1.2-Fx279.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260515-FX279.lcb
样品瓶号: 2-51
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/16 02:28:36
处理时间(V2): 2026/05/18 09:46:03
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.346	17634	77.595	4335	2537	1.171	--
2	3.409	5092	22.405	632	4239	1.090	13.050
总计		22726	100.000	4967			

图110 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042702批-均一性2-pH1.2介质-45min-片6
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-40/30-1288-2 - zzp-6042702p-rcqx-pH1.2jz-jyx2-60min-P1.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-1.2-Fx279.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260515-FX279.lcb

样品瓶号: 2-7

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/16 02:34:00

处理时间(V2): 2026/05/18 09:46:06

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流 速: 1.5ml/min


波 长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.345	19365	78.834	4757	2535	1.174	--
2	3.413	5199	21.166	638	4012	1.101	12.826
总计		24564	100.000	5395			

图111 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042702批-均一性2-pH1.2介质-60min-片1
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-40/30-1289-2 - zzp-6042702p-rcqx-pH1.2jz-jyx2-60min-P2.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-1.2-Fx279.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260515-FX279.lcb

样品瓶号: 2-16

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/16 02:39:24

处理时间(V2): 2026/05/18 09:46:08

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流 速: 1.5ml/min


波 长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.346	19352	78.635	4764	2543	1.178	--
2	3.410	5258	21.365	638	3705	1.033	12.480
总计		24609	100.000	5402			

图112 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042702批-均一性2-pH1.2介质-60min-片2
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-40/30-1290-2 - zzp-6042702p-rcqx-pH1.2jz-jyx2-60min-P3.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-1.2-Fx279.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260515-FX279.lcb

样品瓶号: 2-25

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/16 02:44:50

处理时间(V2): 2026/05/18 09:46:11

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流 速: 1.5ml/min


波 长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.346	19494	78.001	4812	2559	1.171	--
2	3.414	5498	21.999	671	3988	1.093	12.816
总计		24992	100.000	5483			

图113 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042702批-均一性2-pH1.2介质-60min-片3
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-40/30-1291-2 - zzp-6042702p-rcqx-pH1.2jz-jyx2-60min-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-1.2-Fx279.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260515-FX279.lcb
样品瓶号: 2-34
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/16 02:50:13
处理时间(V2): 2026/05/18 09:46:13
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.345	19707	79.688	4810	2525	1.182	--
2	3.411	5023	20.312	629	4288	1.121	13.097
总计		24731	100.000	5440			

图114 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042702批-均一性2-pH1.2介质-60min-片4
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-40/30-1292-2 - zzp-6042702p-rcqx-pH1.2jz-jyx2-60min-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-1.2-Fx279.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260515-FX279.lcb
样品瓶号: 2-43
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/16 02:55:38
处理时间(V2): 2026/05/18 09:46:16
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.345	19339	80.139	4770	2534	1.168	--
2	3.413	4793	19.861	592	4070	1.033	12.887
总计		24132	100.000	5362			

图115 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042702批-均一性2-pH1.2介质-60min-片5
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-40/30-1293-2 - zzp-6042702p-rcqx-pH1.2jz-jyx2-60min-P6.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-1.2-Fx279.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260515-FX279.lcb

样品瓶号: 2-52

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/16 03:01:03

处理时间(V2): 2026/05/18 09:46:18

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流速: 1.5ml/min


波长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.345	19294	79.143	4733	2517	1.178	--
2	3.410	5085	20.857	624	3659	1.099	12.406
总计		24379	100.000	5357			

图116 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042702批-均一性2-pH1.2介质-60min-片6
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-40/30-1294-2 - zzp-6042702p-rcqx-pH1.2jz-jyx2-90min-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-1.2-Fx279.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260515-FX279.lcb
样品瓶号: 2-8
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/16 03:06:29
处理时间(V2): 2026/05/18 09:46:21
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.345	21710	80.784	5317	2525	1.181	--
2	3.413	5164	19.216	642	4102	1.076	12.913
总计		26874	100.000	5959			

图117 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042702批-均一性2-pH1.2介质-90min-片1
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-40/30-1295-2 - zzp-6042702p-rcqx-pH1.2jz-jyx2-90min-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-1.2-Fx279.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260515-FX279.lcb
样品瓶号: 2-17
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/16 03:11:54
处理时间(V2): 2026/05/18 09:46:23
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.346	21837	81.463	5346	2521	1.181	--
2	3.412	4969	18.537	619	4205	1.024	13.011
总计		26807	100.000	5964			

图118 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042702批-均一性2-pH1.2介质-90min-片2
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-40/30-1296-2 - zzp-6042702p-rcqx-pH1.2jz-jyx2-90min-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-1.2-Fx279.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260515-FX279.lcb
样品瓶号: 2-26
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/16 03:17:19
处理时间(V2): 2026/05/18 09:46:26
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.346	22214	81.148	5419	2507	1.176	--
2	3.411	5161	18.852	645	4049	1.115	12.833
总计		27375	100.000	6064			

图119 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042702批-均一性2-pH1.2介质-90min-片3
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-40/30-1297-2 - zzp-6042702p-rcqx-pH1.2jz-jyx2-90min-P4.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-1.2-Fx279.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260515-FX279.lcb

样品瓶号: 2-35

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/16 03:22:44

处理时间(V2): 2026/05/18 09:46:28

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流速: 1.5ml/min


波长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.346	22094	80.429	5395	2519	1.169	--
2	3.411	5376	19.571	637	3828	1.140	12.603
总计		27470	100.000	6031			

图120 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042702批-均一性2-pH1.2介质-90min-片4
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-40/30-1298-2 - zzp-6042702p-rcqx-pH1.2jz-jyx2-90min-P5.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-1.2-Fx279.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260515-FX279.lcb

样品瓶号: 2-44

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/16 03:28:08

处理时间(V2): 2026/05/18 09:46:31

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流速: 1.5ml/min


波长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.346	21916	81.407	5365	2538	1.183	--
2	3.414	5006	18.593	622	4232	1.133	13.061
总计		26922	100.000	5987			

图121 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042702批-均一性2-pH1.2介质-90min-片5
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-40/30-1299-2 - zzp-6042702p-rcqx-pH1.2jz-jyx2-90min-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-1.2-Fx279.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260515-FX279.lcb
样品瓶号: 2-53
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/16 03:33:33
处理时间(V2): 2026/05/18 09:46:33
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.346	21744	81.282	5320	2529	1.191	--
2	3.411	5007	18.718	610	3779	1.145	12.559
总计		26752	100.000	5930			

图122 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042702批-均一性2-pH1.2介质-90min-片6
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-40/30-1300-2 - zzp-6042702p-rcqx-pH1.2jz-jyx2-120min-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-1.2-Fx279.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260515-FX279.lcb
样品瓶号: 4-3
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/16 03:38:56
处理时间(V2): 2026/05/18 09:46:36
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.346	23292	81.325	5723	2534	1.172	--
2	3.415	5349	18.675	645	3857	1.107	12.655
总计		28641	100.000	6369			

图123 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042702批-均一性2-pH1.2介质-120min-片1
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-40/30-1301-2 - zzp-6042702p-rcqx-pH1.2jz-jyx2-120min-P2.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-1.2-Fx279.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260515-FX279.lcb

样品瓶号: 4-12

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/16 03:44:20

处理时间(V2): 2026/05/18 09:46:39

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流 速: 1.5ml/min


波 长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.346	23455	82.468	5726	2529	1.169	--
2	3.414	4986	17.532	646	4098	1.027	12.911
总计		28441	100.000	6372			

图124 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042702批-均一性2-pH1.2介质-120min-片2
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-40/30-1302-2 - zzp-6042702p-rcqx-pH1.2jz-jyx2-120min-P3.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-1.2-Fx279.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260515-FX279.lcb

样品瓶号: 4-21

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/16 03:49:44

处理时间(V2): 2026/05/18 09:46:41

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流速: 1.5ml/min


波长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.346	23520	81.411	5778	2531	1.168	--
2	3.415	5371	18.589	650	4363	1.191	13.191
总计		28890	100.000	6428			

图125 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042702批-均一性2-pH1.2介质-120min-片3
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-40/30-1303-2 - zzp-6042702p-rcqx-pH1.2jz-jyx2-120min-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-1.2-Fx279.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260515-FX279.lcb
样品瓶号: 4-30
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/16 03:55:08
处理时间(V2): 2026/05/18 09:46:43
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.346	23576	81.902	5764	2523	1.166	--
2	3.417	5210	18.098	641	3997	1.049	12.813
总计		28786	100.000	6405			

图126 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042702批-均一性2-pH1.2介质-120min-片4
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-40/30-1304-2 - zzp-6042702p-rcqx-pH1.2jz-jyx2-120min-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-1.2-Fx279.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260515-FX279.lcb
样品瓶号: 4-39
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/16 04:00:31
处理时间(V2): 2026/05/18 09:46:46
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.345	23219	82.546	5718	2536	1.175	--
2	3.415	4909	17.454	591	3910	1.136	12.723
总计		28128	100.000	6309			

图127 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042702批-均一性2-pH1.2介质-120min-片5
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-40/30-1305-2 - zzp-6042702p-rcqx-pH1.2jz-jyx2-120min-P6.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-1.2-Fx279.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260515-FX279.lcb

样品瓶号: 4-48

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/16 04:05:54

处理时间(V2): 2026/05/18 09:46:49

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流速: 1.5ml/min


波长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.346	23274	80.802	5707	2532	1.179	--
2	3.415	5530	19.198	668	3966	1.063	12.779
总计		28804	100.000	6375			

图128 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042702批-均一性2-pH1.2介质-120min-片6
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-40/30-1306-2 - zzp-6042702p-rcqx-pH1.2jz-jyx2-JX-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-1.2-Fx279.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260515-FX279.lcb
样品瓶号: 4-4
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/16 04:11:18
处理时间(V2): 2026/05/18 09:46:51
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.346	23838	82.030	5819	2531	1.183	--
2	3.411	5222	17.970	629	3833	1.127	12.610
总计		29060	100.000	6448			

图129 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042702批-均一性2-pH1.2介质-极限转速-片1
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-40/30-1307-2 - zzp-6042702p-rcqx-pH1.2jz-jyx2-JX-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-1.2-Fx279.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260515-FX279.lcb
样品瓶号: 4-13
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/16 04:16:41
处理时间(V2): 2026/05/18 09:46:54
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.347	23803	82.622	5825	2520	1.174	--
2	3.414	5007	17.378	619	4043	1.047	12.836
总计		28809	100.000	6445			

图130 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042702批-均一性2-pH1.2介质-极限转速-片2
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-40/30-1308-2 - zzp-6042702p-rcqx-pH1.2jz-jyx2-JX-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-1.2-Fx279.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260515-FX279.lcb
样品瓶号: 4-22
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/16 04:22:04
处理时间(V2): 2026/05/18 09:46:56
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.346	24194	82.422	5907	2528	1.176	--
2	3.413	5160	17.578	644	3890	1.072	12.684
总计		29354	100.000	6551			

图131 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042702批-均一性2-pH1.2介质-极限转速-片3
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-40/30-1309-2 - zzp-6042702p-rcqx-pH1.2jz-jyx2-JX-P4.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-1.2-Fx279.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260515-FX279.lcb

样品瓶号: 4-31

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/16 04:27:28

处理时间(V2): 2026/05/18 09:46:59

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流速: 1.5ml/min


波长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.346	23793	81.630	5854	2528	1.171	--
2	3.416	5354	18.370	658	3881	1.055	12.687
总计		29147	100.000	6512			

图132 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042702批-均一性2-pH1.2介质-极限转速-片4
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-40/30-1310-2 - zzp-6042702p-rcqx-pH1.2jz-jyx2-JX-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-1.2-Fx279.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260515-FX279.lcb
样品瓶号: 4-40
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/16 04:32:51
处理时间(V2): 2026/05/18 09:47:01
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.346	23742	82.059	5832	2527	1.180	--
2	3.416	5191	17.941	634	4242	1.077	13.068
总计		28933	100.000	6466			

图133 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042702批-均一性2-pH1.2介质-极限转速-片5
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-40/30-1311-2 - zzp-6042702p-rcqx-pH1.2jz-jyx2-JX-P6.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-1.2-Fx279.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260515-FX279.lcb

样品瓶号: 4-49

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/16 04:38:14

处理时间(V2): 2026/05/18 09:47:04

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流 速: 1.5ml/min


波 长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.346	23550	82.254	5789	2533	1.177	--
2	3.412	5081	17.746	623	3897	1.046	12.693
总计		28631	100.000	6412			

图134 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042702批-均一性2-pH1.2介质-极限转速-片6
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-42/30-1312-3 - zzp-6042702p-rcqx-pH1.2jz-jyx2-dz-2-1.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-1.2-Fx279.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260515-FX279.lcb

样品瓶号: 2-27

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/16 04:43:40

处理时间(V3): 2026/05/18 09:51:16

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流 速: 1.5ml/min


波 长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.320	36275	11.632	7776	1823	1.181	--
2	3.360	275573	88.368	31104	3341	1.162	11.451
总计		311848	100.000	38880			

图135 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042702批-均一性2-pH1.2介质
对照品溶液-2-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-42/30-1313-3 - zzp-6042702p-rcqx-pH1.2jz-jyx2-dz-2-2.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-1.2-Fx279.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260515-FX279.lcb

样品瓶号: 2-27

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/16 04:49:06

处理时间(V3): 2026/05/18 09:51:18

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流速: 1.5ml/min


波长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.320	36215	11.647	7772	1825	1.181	--
2	3.358	274736	88.353	31114	3354	1.164	11.467
总计		310951	100.000	38886			

图136 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042702批-均一性2-pH1.2介质
对照品溶液-2-2




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-42/30-1314-3 - zzp-6042703p-rcqx-pH1.2jz-jyx2-rj.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-1.2-Fx279.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260515-FX279.lcb
样品瓶号: 3-9
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/16 04:54:30
处理时间(V3): 2026/05/18 09:51:21
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图137 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042703批-均一性2-pH1.2介质
溶剂




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-42/30-1315-3 - zzp-6042703p-rcqx-pH1.2jz-jyx2-dz-1-1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-1.2-Fx279.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260515-FX279.lcb
样品瓶号: 3-18
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/16 04:59:54
处理时间(V3): 2026/05/18 09:51:24
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.321	36110	11.612	7733	1815	1.171	--
2	3.360	274861	88.388	31041	3346	1.163	11.442
总计		310972	100.000	38774			

图138 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042703批-均一性2-pH1.2介质
对照品溶液-1-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-42/30-1316-3 - zzp-6042703p-rcqx-pH1.2jz-jyx2-dz-1-2.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-1.2-Fx279.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260515-FX279.lcb

样品瓶号: 3-18

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/16 05:05:18

处理时间(V3): 2026/05/18 09:51:26

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流 速: 1.5ml/min


波 长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.321	36253	11.645	7776	1817	1.172	--
2	3.358	275062	88.355	31134	3353	1.162	11.449
总计		311315	100.000	38911			

图139 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042703批-均一性2-pH1.2介质
对照品溶液-1-2



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-42/30-1317-3 - zzp-6042703p-rcqx-pH1.2jz-jyx2-dz-1-3.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-1.2-Fx279.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260515-FX279.lcb

样品瓶号: 3-18

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/16 05:10:40

处理时间(V3): 2026/05/18 09:51:29

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流速: 1.5ml/min


波长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.321	36091	11.617	7740	1823	1.169	--
2	3.358	274585	88.383	31127	3350	1.163	11.447
总计		310676	100.000	38867			

图140 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042703批-均一性2-pH1.2介质
对照品溶液-1-3




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-42/30-1318-3 - zzp-6042703p-rcqx-pH1.2jz-jyx2-dz-1-4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-1.2-Fx279.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260515-FX279.lcb
样品瓶号: 3-18
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/16 05:16:04
处理时间(V3): 2026/05/18 09:51:32
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.321	36174	11.627	7748	1814	1.170	--
2	3.357	274949	88.373	31172	3354	1.165	11.442
总计		311124	100.000	38920			

图141 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042703批-均一性2-pH1.2介质
对照品溶液-1-4




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-42/30-1319-3 - zzp-6042703p-rcqx-pH1.2jz-jyx2-dz-1-5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-1.2-Fx279.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260515-FX279.lcb
样品瓶号: 3-18
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/16 05:21:28
处理时间(V3): 2026/05/18 09:51:35
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.320	36248	11.665	7744	1810	1.180	--
2	3.356	274495	88.335	31154	3353	1.164	11.437
总计		310743	100.000	38898			

图142 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042703批-均一性2-pH1.2介质
对照品溶液-1-5




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-43/30-1320-2 - zzp-6042703p-rcqx-pH1.2jz-jyx2-5min-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-1.2-Fx279.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260515-FX279.lcb
样品瓶号: 3-1
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/16 05:26:51
处理时间(V2): 2026/05/18 09:52:48
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.347	3645	63.755	889	2511	1.188	--
2	3.411	2072	36.245	277	5201	1.102	13.914
总计		5717	100.000	1166			

图143 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042703批-均一性2-pH1.2介质-5min-片1
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-43/30-1321-2 - zzp-6042703p-rcqx-pH1.2jz-jyx2-5min-P2.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-1.2-Fx279.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260515-FX279.lcb

样品瓶号: 3-10

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/16 05:32:14

处理时间(V2): 2026/05/18 09:52:51

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流 速: 1.5ml/min


波 长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.346	4013	63.201	999	2588	1.166	--
2	3.410	2336	36.799	306	4686	1.114	13.528
总计		6349	100.000	1305			

图144 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042703批-均一性2-pH1.2介质-5min-片2
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-43/30-1322-2 - zzp-6042703p-rcqx-pH1.2jz-jyx2-5min-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-1.2-Fx279.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260515-FX279.lcb
样品瓶号: 3-19
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/16 05:37:37
处理时间(V2): 2026/05/18 09:52:54
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.346	3712	62.959	886	2489	1.214	--
2	3.419	2184	37.041	279	4402	1.069	13.200
总计		5897	100.000	1165			

图145 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042703批-均一性2-pH1.2介质-5min-片3
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-43/30-1323-2 - zzp-6042703p-rcqx-pH1.2jz-jyx2-5min-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-1.2-Fx279.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260515-FX279.lcb
样品瓶号: 3-28
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/16 05:43:00
处理时间(V2): 2026/05/18 09:52:56
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.346	3137	64.061	757	2492	1.216	--
2	3.421	1760	35.939	237	5210	1.021	13.948
总计		4897	100.000	994			

图146 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042703批-均一性2-pH1.2介质-5min-片4
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-43/30-1324-2 - zzp-6042703p-rcqx-pH1.2jz-jyx2-5min-P5.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-1.2-Fx279.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260515-FX279.lcb

样品瓶号: 3-37

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/16 05:48:22

处理时间(V2): 2026/05/18 09:52:59

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流速: 1.5ml/min


波长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.347	4101	64.565	1003	2523	1.196	--
2	3.416	2251	35.435	292	4970	1.065	13.747
总计		6351	100.000	1294			

图147 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042703批-均一性2-pH1.2介质-5min-片5
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-43/30-1325-2 - zzp-6042703p-rcqx-pH1.2jz-jyx2-5min-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-1.2-Fx279.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260515-FX279.lcb
样品瓶号: 3-46
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/16 05:53:45
处理时间(V2): 2026/05/18 09:53:02
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.347	3434	66.728	855	2605	1.215	--
2	3.409	1712	33.272	232	4684	1.231	13.532
总计		5146	100.000	1086			

图148 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042703批-均一性2-pH1.2介质-5min-片6
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-43/30-1326-2 - zzp-6042703p-rcqx-pH1.2jz-jyx2-10min-P1.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-1.2-Fx279.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260515-FX279.lcb

样品瓶号: 3-2

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/16 05:59:06

处理时间(V2): 2026/05/18 09:53:05

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流 速: 1.5ml/min


波 长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.346	8279	66.880	2025	2510	1.195	--
2	3.413	4100	33.120	506	3929	1.081	12.706
总计		12379	100.000	2531			

图149 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042703批-均一性2-pH1.2介质-10min-片1
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-43/30-1327-2 - zzp-6042703p-rcqx-pH1.2jz-jyx2-10min-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-1.2-Fx279.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260515-FX279.lcb
样品瓶号: 3-11
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/16 06:04:29
处理时间(V2): 2026/05/18 09:53:07
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.347	8842	67.286	2131	2502	1.175	--
2	3.416	4299	32.714	527	4036	1.159	12.823
总计		13141	100.000	2658			

图150 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042703批-均一性2-pH1.2介质-10min-片2
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-43/30-1328-2 - zzp-6042703p-rcqx-pH1.2jz-jyx2-10min-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-1.2-Fx279.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260515-FX279.lcb
样品瓶号: 3-20
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/16 06:09:51
处理时间(V2): 2026/05/18 09:53:10
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.347	8311	66.981	2039	2534	1.182	--
2	3.412	4097	33.019	508	4092	1.141	12.894
总计		12408	100.000	2548			

图151 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042703批-均一性2-pH1.2介质-10min-片3
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-43/30-1329-2 - zzp-6042703p-rcqx-pH1.2jz-jyx2-10min-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-1.2-Fx279.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260515-FX279.lcb
样品瓶号: 3-29
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/16 06:15:14
处理时间(V2): 2026/05/18 09:53:12
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.347	8004	66.583	1962	2520	1.158	--
2	3.425	4017	33.417	481	3869	1.063	12.691
总计		12021	100.000	2444			

图152 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042703批-均一性2-pH1.2介质-10min-片4
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-43/30-1330-2 - zzp-6042703p-rcqx-pH1.2jz-jyx2-10min-P5.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-1.2-Fx279.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260515-FX279.lcb

样品瓶号: 3-38

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/16 06:20:35

处理时间(V2): 2026/05/18 09:53:15

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流 速: 1.5ml/min


波 长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.346	8747	67.823	2137	2518	1.149	--
2	3.415	4150	32.177	513	4192	1.111	12.997
总计		12897	100.000	2650			

图153 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042703批-均一性2-pH1.2介质-10min-片5
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-43/30-1331-2 - zzp-6042703p-rcqx-pH1.2jz-jyx2-10min-P6.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-1.2-Fx279.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260515-FX279.lcb

样品瓶号: 3-47

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/16 06:25:58

处理时间(V2): 2026/05/18 09:53:18

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流 速: 1.5ml/min


波 长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.347	8487	66.999	2081	2570	1.185	--
2	3.418	4180	33.001	499	3955	1.118	12.795
总计		12667	100.000	2579			

图154 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042703批-均一性2-pH1.2介质-10min-片6
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-43/30-1332-2 - zzp-6042703p-rcqx-pH1.2jz-jyx2-15min-P1.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-1.2-Fx279.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260515-FX279.lcb

样品瓶号: 3-3

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/16 06:31:21

处理时间(V2): 2026/05/18 09:53:20

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流速: 1.5ml/min


波长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.347	11012	70.269	2717	2536	1.170	--
2	3.419	4659	29.731	567	3980	1.047	12.802
总计		15671	100.000	3284			

图155 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042703批-均一性2-pH1.2介质-15min-片1
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-43/30-1333-2 - zzp-6042703p-rcqx-pH1.2jz-jyx2-15min-P2.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-1.2-Fx279.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260515-FX279.lcb

样品瓶号: 3-12

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/16 06:36:43

处理时间(V2): 2026/05/18 09:53:23

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流 速: 1.5ml/min


波 长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.347	11159	70.019	2760	2573	1.178	--
2	3.418	4778	29.981	587	3949	1.094	12.797
总计		15937	100.000	3347			

图156 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042703批-均一性2-pH1.2介质-15min-片2
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-43/30-1334-2 - zzp-6042703p-rcqx-pH1.2jz-jyx2-15min-P3.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-1.2-Fx279.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260515-FX279.lcb

样品瓶号: 3-21

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/16 06:42:05

处理时间(V2): 2026/05/18 09:53:26

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流 速: 1.5ml/min


波 长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.347	11138	69.796	2728	2530	1.180	--
2	3.419	4820	30.204	590	4131	1.083	12.959
总计		15958	100.000	3318			

图157 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042703批-均一性2-pH1.2介质-15min-片3
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-43/30-1335-2 - zzp-6042703p-rcqx-pH1.2jz-jyx2-15min-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-1.2-Fx279.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260515-FX279.lcb
样品瓶号: 3-30
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/16 06:47:27
处理时间(V2): 2026/05/18 09:53:28
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.346	10763	70.035	2661	2536	1.166	--
2	3.418	4605	29.965	583	4188	1.068	13.020
总计		15368	100.000	3244			

图158 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042703批-均一性2-pH1.2介质-15min-片4
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-43/30-1336-2 - zzp-6042703p-rcqx-pH1.2jz-jyx2-15min-P5.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-1.2-Fx279.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260515-FX279.lcb

样品瓶号: 3-39

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/16 06:52:50

处理时间(V2): 2026/05/18 09:53:31

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流 速: 1.5ml/min


波 长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.347	11204	70.262	2766	2549	1.167	--
2	3.421	4742	29.738	588	4165	1.035	13.017
总计		15946	100.000	3354			

图159 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042703批-均一性2-pH1.2介质-15min-片5
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-43/30-1337-2 - zzp-6042703p-rcqx-pH1.2jz-jyx2-15min-P6.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-1.2-Fx279.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260515-FX279.lcb

样品瓶号: 3-48

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/16 06:58:11

处理时间(V2): 2026/05/18 09:53:33

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流 速: 1.5ml/min


波 长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.347	11304	70.290	2748	2503	1.184	--
2	3.422	4778	29.710	577	4019	1.130	12.828
总计		16083	100.000	3325			

图160 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042703批-均一性2-pH1.2介质-15min-片6
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-43/30-1338-2 - zzp-6042703p-rcqx-pH1.2jz-jyx2-20min-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-1.2-Fx279.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260515-FX279.lcb
样品瓶号: 3-4
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/16 07:03:34
处理时间(V2): 2026/05/18 09:53:36
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.347	13057	72.157	3184	2513	1.176	--
2	3.421	5038	27.843	615	4103	1.067	12.921
总计		18096	100.000	3799			

图161 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042703批-均一性2-pH1.2介质-20min-片1
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-43/30-1339-2 - zzp-6042703p-rcqx-pH1.2jz-jyx2-20min-P2.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-1.2-Fx279.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260515-FX279.lcb

样品瓶号: 3-13

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/16 07:08:56

处理时间(V2): 2026/05/18 09:53:38

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流 速: 1.5ml/min


波 长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.346	13033	73.266	3202	2529	1.174	--
2	3.416	4756	26.734	595	3972	1.064	12.778
总计		17789	100.000	3797			

图162 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042703批-均一性2-pH1.2介质-20min-片2
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-43/30-1340-2 - zzp-6042703p-rcqx-pH1.2jz-jyx2-20min-P3.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-1.2-Fx279.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260515-FX279.lcb

样品瓶号: 3-22

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/16 07:14:19

处理时间(V2): 2026/05/18 09:53:41

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流速: 1.5ml/min


波长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.347	12873	71.648	3172	2535	1.170	--
2	3.420	5094	28.352	617	4060	1.219	12.889
总计		17967	100.000	3789			

图163 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042703批-均一性2-pH1.2介质-20min-片3
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-43/30-1341-2 - zzp-6042703p-rcqx-pH1.2jz-jyx2-20min-P4.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-1.2-Fx279.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260515-FX279.lcb

样品瓶号: 3-31

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/16 07:19:41

处理时间(V2): 2026/05/18 09:53:43

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流 速: 1.5ml/min


波 长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.346	12721	72.254	3135	2530	1.186	--
2	3.419	4885	27.746	589	3986	1.138	12.806
总计		17607	100.000	3724			

图164 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042703批-均一性2-pH1.2介质-20min-片4
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-43/30-1342-2 - zzp-6042703p-rcqx-pH1.2jz-jyx2-20min-P5.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-1.2-Fx279.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260515-FX279.lcb

样品瓶号: 3-40

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/16 07:25:03

处理时间(V2): 2026/05/18 09:53:46

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流 速: 1.5ml/min


波 长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.346	13028	73.885	3179	2509	1.174	--
2	3.419	4605	26.115	565	3609	1.017	12.371
总计		17633	100.000	3744			

图165 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042703批-均一性2-pH1.2介质-20min-片5
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-43/30-1343-2 - zzp-6042703p-rcqx-pH1.2jz-jyx2-20min-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-1.2-Fx279.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260515-FX279.lcb
样品瓶号: 3-49
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/16 07:30:25
处理时间(V2): 2026/05/18 09:53:48
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.346	12956	73.174	3170	2529	1.177	--
2	3.421	4750	26.826	580	4205	1.107	13.048
总计		17706	100.000	3750			

图166 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042703批-均一性2-pH1.2介质-20min-片6
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-43/30-1344-2 - zzp-6042703p-rcqx-pH1.2jz-jyx2-30min-P1.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-1.2-Fx279.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260515-FX279.lcb

样品瓶号: 3-5

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/16 07:35:47

处理时间(V2): 2026/05/18 09:53:51

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流 速: 1.5ml/min


波 长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.347	15456	75.309	3777	2531	1.173	--
2	3.417	5068	24.691	624	3812	1.111	12.605
总计		20524	100.000	4401			

图167 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042703批-均一性2-pH1.2介质-30min-片1
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-43/30-1345-2 - zzp-6042703p-rcqx-pH1.2jz-jyx2-30min-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-1.2-Fx279.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260515-FX279.lcb
样品瓶号: 3-14
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/16 07:41:09
处理时间(V2): 2026/05/18 09:53:53
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.347	15598	75.399	3819	2527	1.190	--
2	3.420	5089	24.601	638	4199	1.084	13.029
总计		20687	100.000	4456			

图168 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042703批-均一性2-pH1.2介质-30min-片2
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-43/30-1346-2 - zzp-6042703p-rcqx-pH1.2jz-jyx2-30min-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-1.2-Fx279.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260515-FX279.lcb
样品瓶号: 3-23
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/16 07:46:31
处理时间(V2): 2026/05/18 09:53:56
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.347	15517	75.348	3831	2543	1.170	--
2	3.420	5077	24.652	632	4043	1.036	12.877
总计		20593	100.000	4463			

图169 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042703批-均一性2-pH1.2介质-30min-片3
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-43/30-1347-2 - zzp-6042703p-rcqx-pH1.2jz-jyx2-30min-P4.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-1.2-Fx279.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260515-FX279.lcb

样品瓶号: 3-32

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/16 07:51:53

处理时间(V2): 2026/05/18 09:53:58

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流速: 1.5ml/min


波长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.347	15477	75.579	3775	2525	1.188	--
2	3.416	5001	24.421	612	3700	1.121	12.470
总计		20478	100.000	4386			

图170 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042703批-均一性2-pH1.2介质-30min-片4
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-43/30-1348-2 - zzp-6042703p-rcqx-pH1.2jz-jyx2-30min-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-1.2-Fx279.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260515-FX279.lcb
样品瓶号: 3-41
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/16 07:57:14
处理时间(V2): 2026/05/18 09:54:01
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.347	15355	74.736	3787	2538	1.165	--
2	3.418	5191	25.264	625	3806	1.123	12.604
总计		20546	100.000	4412			

图171 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042703批-均一性2-pH1.2介质-30min-片5
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-43/30-1349-2 - zzp-6042703p-rcqx-pH1.2jz-jyx2-30min-P6.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-1.2-Fx279.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260515-FX279.lcb

样品瓶号: 3-50

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/16 08:02:36

处理时间(V2): 2026/05/18 09:54:04

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流 速: 1.5ml/min


波 长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.346	15430	76.220	3793	2534	1.182	--
2	3.417	4814	23.780	604	4221	1.005	13.052
总计		20244	100.000	4397			

图172 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042703批-均一性2-pH1.2介质-30min-片6
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-43/30-1350-2 - zzp-6042703p-rcqx-pH1.2jz-jyx2-45min-P1.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-1.2-Fx279.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260515-FX279.lcb

样品瓶号: 3-6

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/16 08:07:59

处理时间(V2): 2026/05/18 09:54:06

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流 速: 1.5ml/min


波 长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.347	17992	77.583	4424	2534	1.187	--
2	3.419	5199	22.417	635	4199	1.142	13.029
总计		23190	100.000	5059			

图173 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042703批-均一性2-pH1.2介质-45min-片1
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-43/30-1351-2 - zzp-6042703p-rcqx-pH1.2jz-jyx2-45min-P2.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-1.2-Fx279.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260515-FX279.lcb

样品瓶号: 3-15

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/16 08:13:21

处理时间(V2): 2026/05/18 09:54:09

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流 速: 1.5ml/min


波 长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.347	17899	78.480	4408	2541	1.175	--
2	3.418	4908	21.520	605	4104	1.090	12.933
总计		22807	100.000	5013			

图174 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042703批-均一性2-pH1.2介质-45min-片2
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-43/30-1352-2 - zzp-6042703p-rcqx-pH1.2jz-jyx2-45min-P3.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-1.2-Fx279.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260515-FX279.lcb

样品瓶号: 3-24

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/16 08:18:43

处理时间(V2): 2026/05/18 09:54:11

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流速: 1.5ml/min


波长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.347	18139	76.557	4453	2528	1.195	--
2	3.418	5554	23.443	670	4084	1.129	12.900
总计		23693	100.000	5123			

图175 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042703批-均一性2-pH1.2介质-45min-片3
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-43/30-1353-2 - zzp-6042703p-rcqx-pH1.2jz-jyx2-45min-P4.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-1.2-Fx279.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260515-FX279.lcb

样品瓶号: 3-33

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/16 08:24:05

处理时间(V2): 2026/05/18 09:54:14

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流 速: 1.5ml/min


波 长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.347	17951	77.333	4385	2519	1.170	--
2	3.422	5262	22.667	633	3978	1.089	12.794
总计		23213	100.000	5017			

图176 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042703批-均一性2-pH1.2介质-45min-片4
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-43/30-1354-2 - zzp-6042703p-rcqx-pH1.2jz-jyx2-45min-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-1.2-Fx279.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260515-FX279.lcb
样品瓶号: 3-42
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/16 08:29:27
处理时间(V2): 2026/05/18 09:54:16
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.347	18188	77.720	4437	2513	1.180	--
2	3.418	5214	22.280	621	3949	1.135	12.743
总计		23402	100.000	5058			

图177 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042703批-均一性2-pH1.2介质-45min-片5
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-43/30-1355-2 - zzp-6042703p-rcqx-pH1.2jz-jyx2-45min-P6.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-1.2-Fx279.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260515-FX279.lcb

样品瓶号: 3-51

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/16 08:34:48

处理时间(V2): 2026/05/18 09:54:19

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流 速: 1.5ml/min


波 长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.347	18096	78.179	4412	2513	1.188	--
2	3.422	5051	21.821	619	4077	1.074	12.896
总计		23146	100.000	5031			

图178 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042703批-均一性2-pH1.2介质-45min-片6
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-43/30-1356-2 - zzp-6042703p-rcqx-pH1.2jz-jyx2-60min-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-1.2-Fx279.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260515-FX279.lcb
样品瓶号: 3-7
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/16 08:40:10
处理时间(V2): 2026/05/18 09:54:21
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.347	19664	78.732	4830	2528	1.181	--
2	3.423	5312	21.268	641	3941	1.157	12.766
总计		24977	100.000	5471			

图179 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042703批-均一性2-pH1.2介质-60min-片1
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-43/30-1357-2 - zzp-6042703p-rcqx-pH1.2jz-jyx2-60min-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-1.2-Fx279.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260515-FX279.lcb
样品瓶号: 3-16
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/16 08:45:32
处理时间(V2): 2026/05/18 09:54:24
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.347	19788	80.003	4846	2522	1.189	--
2	3.419	4946	19.997	611	3983	1.085	12.789
总计		24734	100.000	5456			

图180 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042703批-均一性2-pH1.2介质-60min-片2
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-43/30-1358-2 - zzp-6042703p-rcqx-pH1.2jz-jyx2-60min-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-1.2-Fx279.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260515-FX279.lcb
样品瓶号: 3-25
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/16 08:50:54
处理时间(V2): 2026/05/18 09:54:26
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.347	19942	79.042	4892	2509	1.166	--
2	3.423	5288	20.958	642	3948	1.065	12.756
总计		25230	100.000	5535			

图181 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042703批-均一性2-pH1.2介质-60min-片3
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-43/30-1359-2 - zzp-6042703p-rcqx-pH1.2jz-jyx2-60min-P4.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-1.2-Fx279.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260515-FX279.lcb

样品瓶号: 3-34

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/16 08:56:16

处理时间(V2): 2026/05/18 09:54:29

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流 速: 1.5ml/min


波 长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.347	19742	78.648	4847	2518	1.191	--
2	3.422	5360	21.352	641	3798	1.079	12.596
总计		25102	100.000	5488			

图182 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042703批-均一性2-pH1.2介质-60min-片4
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-43/30-1360-2 - zzp-6042703p-rcqx-pH1.2jz-jyx2-60min-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-1.2-Fx279.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260515-FX279.lcb
样品瓶号: 3-43
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/16 09:01:38
处理时间(V2): 2026/05/18 09:54:31
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.347	19695	80.116	4828	2521	1.181	--
2	3.421	4888	19.884	600	4197	1.042	13.025
总计		24584	100.000	5428			

图183 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042703批-均一性2-pH1.2介质-60min-片5
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-43/30-1361-2 - zzp-6042703p-rcqx-pH1.2jz-jyx2-60min-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-1.2-Fx279.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260515-FX279.lcb
样品瓶号: 3-52
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/16 09:06:59
处理时间(V2): 2026/05/18 09:54:34
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.347	19752	79.139	4830	2515	1.186	--
2	3.421	5207	20.861	634	3911	1.135	12.715
总计		24958	100.000	5464			

图184 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042703批-均一性2-pH1.2介质-60min-片6
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-43/30-1362-2 - zzp-6042703p-rcqx-pH1.2jz-jyx2-90min-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-1.2-Fx279.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260515-FX279.lcb
样品瓶号: 3-8
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/16 09:12:22
处理时间(V2): 2026/05/18 09:54:36
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.347	22254	81.121	5428	2530	1.182	--
2	3.418	5179	18.879	631	4066	1.187	12.881
总计		27433	100.000	6060			

图185 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042703批-均一性2-pH1.2介质-90min-片1
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-43/30-1363-2 - zzp-6042703p-rcqx-pH1.2jz-jyx2-90min-P2.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-1.2-Fx279.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260515-FX279.lcb

样品瓶号: 3-17

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/16 09:17:45

处理时间(V2): 2026/05/18 09:54:39

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流 速: 1.5ml/min


波 长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.346	22157	81.689	5410	2529	1.186	--
2	3.419	4967	18.311	611	3917	1.094	12.733
总计		27123	100.000	6021			

图186 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042703批-均一性2-pH1.2介质-90min-片2
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-43/30-1364-2 - zzp-6042703p-rcqx-pH1.2jz-jyx2-90min-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-1.2-Fx279.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260515-FX279.lcb
样品瓶号: 3-26
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/16 09:23:07
处理时间(V2): 2026/05/18 09:54:41
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.346	22317	80.856	5468	2521	1.182	--
2	3.424	5284	19.144	639	4133	1.115	12.976
总计		27601	100.000	6107			

图187 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042703批-均一性2-pH1.2介质-90min-片3
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-43/30-1365-2 - zzp-6042703p-rcqx-pH1.2jz-jyx2-90min-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-1.2-Fx279.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260515-FX279.lcb
样品瓶号: 3-35
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/16 09:28:31
处理时间(V2): 2026/05/18 09:54:44
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.346	22052	80.930	5393	2523	1.170	--
2	3.420	5196	19.070	624	3822	1.111	12.628
总计		27249	100.000	6017			

图188 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042703批-均一性2-pH1.2介质-90min-片4
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-43/30-1366-2 - zzp-6042703p-rcqx-pH1.2jz-jyx2-90min-P5.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-1.2-Fx279.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260515-FX279.lcb

样品瓶号: 3-44

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/16 09:33:53

处理时间(V2): 2026/05/18 09:54:46

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流 速: 1.5ml/min


波 长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.346	21944	81.975	5377	2513	1.177	--
2	3.423	4825	18.025	599	4237	1.033	13.072
总计		26769	100.000	5976			

图189 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042703批-均一性2-pH1.2介质-90min-片5
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-43/30-1367-2 - zzp-6042703p-rcqx-pH1.2jz-jyx2-90min-P6.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-1.2-Fx279.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260515-FX279.lcb

样品瓶号: 3-53

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/16 09:39:16

处理时间(V2): 2026/05/18 09:54:49

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流 速: 1.5ml/min


波 长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.346	22033	82.093	5368	2513	1.188	--
2	3.422	4806	17.907	596	4350	1.120	13.182
总计		26839	100.000	5964			

图190 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042703批-均一性2-pH1.2介质-90min-片6
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-43/30-1368-2 - zzp-6042703p-rcqx-pH1.2jz-jyx2-120min-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-1.2-Fx279.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260515-FX279.lcb
样品瓶号: 4-5
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/16 09:44:39
处理时间(V2): 2026/05/18 09:54:52
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.346	23722	81.663	5829	2545	1.186	--
2	3.422	5327	18.337	644	3916	1.114	12.757
总计		29049	100.000	6473			

图191 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042703批-均一性2-pH1.2介质-120min-片1
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-43/30-1369-2 - zzp-6042703p-rcqx-pH1.2jz-jyx2-120min-P2.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-1.2-Fx279.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260515-FX279.lcb

样品瓶号: 4-14

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/16 09:50:03

处理时间(V2): 2026/05/18 09:54:54

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流 速: 1.5ml/min


波 长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.346	23582	83.599	5779	2537	1.191	--
2	3.423	4627	16.401	590	4182	1.045	13.035
总计		28209	100.000	6369			

图192 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042703批-均一性2-pH1.2介质-120min-片2
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-43/30-1370-2 - zzp-6042703p-rcqx-pH1.2jz-jyx2-120min-P3.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-1.2-Fx279.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260515-FX279.lcb

样品瓶号: 4-23

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/16 09:55:27

处理时间(V2): 2026/05/18 09:54:57

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流速: 1.5ml/min


波长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.347	23931	82.029	5877	2542	1.184	--
2	3.422	5243	17.971	644	3866	1.031	12.688
总计		29174	100.000	6521			

图193 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042703批-均一性2-pH1.2介质-120min-片3
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-43/30-1371-2 - zzp-6042703p-rcqx-pH1.2jz-jyx2-120min-P4.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-1.2-Fx279.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260515-FX279.lcb

样品瓶号: 4-32

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/16 10:00:51

处理时间(V2): 2026/05/18 09:54:59

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流速: 1.5ml/min


波长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.347	23805	83.024	5827	2516	1.178	--
2	3.421	4867	16.976	602	4400	1.160	13.226
总计		28673	100.000	6429			

图194 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042703批-均一性2-pH1.2介质-120min-片4
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-43/30-1372-2 - zzp-6042703p-rcqx-pH1.2jz-jyx2-120min-P5.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-1.2-Fx279.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260515-FX279.lcb

样品瓶号: 4-41

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/16 10:06:14

处理时间(V2): 2026/05/18 09:55:02

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流 速: 1.5ml/min


波 长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.347	23570	82.193	5763	2523	1.183	--
2	3.425	5106	17.807	625	3897	1.075	12.723
总计		28677	100.000	6388			

图195 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042703批-均一性2-pH1.2介质-120min-片5
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-43/30-1373-2 - zzp-6042703p-rcqx-pH1.2jz-jyx2-120min-P6.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-1.2-Fx279.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260515-FX279.lcb

样品瓶号: 4-50

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/16 10:11:38

处理时间(V2): 2026/05/18 09:55:05

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流 速: 1.5ml/min


波 长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.347	23428	81.545	5774	2543	1.187	--
2	3.418	5302	18.455	620	3962	1.146	12.781
总计		28731	100.000	6394			

图196 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042703批-均一性2-pH1.2介质-120min-片6
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-43/30-1374-2 - zzp-6042703p-rcqx-pH1.2jz-jyx2-JX-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-1.2-Fx279.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260515-FX279.lcb
样品瓶号: 4-6
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/16 10:17:02
处理时间(V2): 2026/05/18 09:55:07
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.346	24032	83.453	5913	2545	1.175	--
2	3.423	4765	16.547	599	4298	1.107	13.161
总计		28797	100.000	6512			

图197 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042703批-均一性2-pH1.2介质-极限转速-片1
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-43/30-1375-2 - zzp-6042703p-rcqx-pH1.2jz-jyx2-JX-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-1.2-Fx279.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260515-FX279.lcb
样品瓶号: 4-15
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/16 10:22:26
处理时间(V2): 2026/05/18 09:55:10
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.346	24065	82.811	5922	2542	1.181	--
2	3.418	4995	17.189	615	4054	1.062	12.885
总计		29060	100.000	6537			

图198 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042703批-均一性2-pH1.2介质-极限转速-片2
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-43/30-1376-2 - zzp-6042703p-rcqx-pH1.2jz-jyx2-JX-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-1.2-Fx279.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260515-FX279.lcb
样品瓶号: 4-24
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/16 10:27:50
处理时间(V2): 2026/05/18 09:55:13
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.346	24287	83.461	5957	2546	1.181	--
2	3.422	4813	16.539	604	4030	1.017	12.880
总计		29099	100.000	6561			

图199 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042703批-均一性2-pH1.2介质-极限转速-片3
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-43/30-1377-2 - zzp-6042703p-rcqx-pH1.2jz-jyx2-JX-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-1.2-Fx279.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260515-FX279.lcb
样品瓶号: 4-33
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/16 10:33:14
处理时间(V2): 2026/05/18 09:55:15
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.346	24131	82.881	5924	2545	1.183	--
2	3.423	4984	17.119	609	4115	1.113	12.973
总计		29115	100.000	6533			

图200 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042703批-均一性2-pH1.2介质-极限转速-片4
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-43/30-1378-2 - zzp-6042703p-rcqx-pH1.2jz-jyx2-JX-P5.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-1.2-Fx279.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260515-FX279.lcb

样品瓶号: 4-42

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/16 10:38:38

处理时间(V2): 2026/05/18 09:55:18

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流速: 1.5ml/min


波长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.346	23964	82.776	5885	2535	1.177	--
2	3.422	4987	17.224	609	3886	1.094	12.714
总计		28951	100.000	6494			

图201 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042703批-均一性2-pH1.2介质-极限转速-片5
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-43/30-1379-2 - zzp-6042703p-rcqx-pH1.2jz-jyx2-JX-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-1.2-Fx279.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260515-FX279.lcb
样品瓶号: 4-51
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/16 10:44:02
处理时间(V2): 2026/05/18 09:55:21
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.346	24171	83.013	5901	2518	1.173	--
2	3.420	4946	16.987	611	3990	1.057	12.803
总计		29117	100.000	6512			

图202 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042703批-均一性2-pH1.2介质-极限转速-片6
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-43/30-1380-2 - zzp-6042703p-rcqx-pH1.2jz-jyx2-dz-2-1.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-1.2-Fx279.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260515-FX279.lcb

样品瓶号: 3-27

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/16 10:49:25

处理时间(V2): 2026/05/18 09:55:23

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流 速: 1.5ml/min


波 长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.321	35496	11.773	7502	1788	1.182	--
2	3.371	266007	88.227	29741	3278	1.156	11.376
总计		301503	100.000	37243			

图203 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042703批-均一性2-pH1.2介质
对照品溶液-2-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-43/30-1381-2 - zzp-6042703p-rcqx-pH1.2jz-jyx2-dz-2-2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-1.2-Fx279.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260515-FX279.lcb
样品瓶号: 3-27
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/16 10:54:48
处理时间(V2): 2026/05/18 09:55:26
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.321	35440	11.761	7482	1783	1.194	--
2	3.370	265896	88.239	29751	3293	1.156	11.384
总计		301336	100.000	37233			

图204 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042703批-均一性2-pH1.2介质
对照品溶液-2-2