



布洛芬混悬液项目信息

介质体积(ml)	900	取样体积(ml)	5	补液体积(ml)	0
对照品批号	100179-202308	对照品来源	中检院	对照品使用方法	直接使用
对照品含量(%)	99.9	对照品水分(%)	0	对照品稀释倍数	50
标示量(mg)	200	供试品稀释倍数	1	系数	1

对照品溶液

序号	称样量(mg)	A ₁	A ₂	A ₃	A ₄	A ₅	A _{平均}	RSD%
1	11.15	5277012	5285755	5280178	5288468	5292844	5284851	0.13
2	11.09	5294974	5289520				5292247	0.08

单位质量响应值		RSD%	判断
473977.67	477208.93	0.49	数据可信



操作者:

日期: 2026-08-09

复核者:

未审阅版本



供试品溶液-2025103151批-pH7.2

时间 (分钟)	样品	A ₁	A ₂	A _{平均}	溶出量(%)	平均(%)	RSD%	累计溶 出量(%)	平均(%)	RSD%
极限	1	5324627	5331275	5327951	100.725	99.74	1.07	100.73	99.75	1.08
	2	5172127	5173478	5172802	97.792			97.79		
	3	5252581	5260113	5256347	99.371			99.37		
	4	5309903	5314322	5312112	100.426			100.43		
	5	5306302	5303435	5304868	100.289			100.29		
	6	5281142	5283944	5282543	99.867			99.87		



操作者:

日 期: 2026-08-09

复核者:

未审阅版本



布洛芬混悬液项目信息

介质体积(ml)	900	取样体积(ml)	5	补液体积(ml)	0
对照品批号	100179-202308	对照品来源	中检院	对照品使用方法	直接使用
对照品含量(%)	99.9	对照品水分(%)	0	对照品稀释倍数	50
标示量(mg)	200	供试品稀释倍数	1	系数	1

对照品溶液

序号	称样量(mg)	A ₁	A ₂	A ₃	A ₄	A ₅	A _{平均}	RSD%
1	11.15	5298814	5293266	5299854	5292673	5292059	5295333	0.07
2	11.09	5295935	5290193				5293064	0.08
单位质量响应值				RSD%	判断			
474917.76				0.36	数据可信			



操作者:

日期: 2026-08-09

复核者:

未审阅版本



供试品溶液-2025110151批-pH7.2

时间 (分钟)	样品	A ₁	A ₂	A _{平均}	溶出量(%)	平均(%)	RSD%	累计溶 出量(%)	平均(%)	RSD%
极限	1	5119677	5112240	5115958	96.614	96.81	0.78	96.61	96.81	0.78
	2	5133370	5130961	5132166	96.920			96.92		
	3	5193683	5194307	5193995	98.088			98.09		
	4	5136391	5137415	5136903	97.009			97.01		
	5	5076504	5075790	5076147	95.862			95.86		
	6	5102700	5102545	5102622	96.362			96.36		



操作者:

日 期: 2026-08-09

复核者:

未审阅版本



布洛芬混悬液项目信息

介质体积(ml)	900	取样体积(ml)	5	补液体积(ml)	0
对照品批号	100179-202308	对照品来源	中检院	对照品使用方法	直接使用
对照品含量(%)	99.9	对照品水分(%)	0	对照品稀释倍数	50
标示量(mg)	200	供试品稀释倍数	1	系数	1

对照品溶液

序号	称样量(mg)	A ₁	A ₂	A ₃	A ₄	A ₅	A _{平均}	RSD%
1	11.15	5284315	5282064	5287408	5273553	5282052	5281878	0.10
2	11.09	5276759	5281023				5278891	0.06
单位质量响应值				RSD%	判断			
473711.03				0.35	数据可信			



操作者:

日期: 2026-08-09

复核者:

未审阅版本



供试品溶液-2025110251批-pH7.2

时间 (分钟)	样品	A ₁	A ₂	A _{平均}	溶出量(%)	平均(%)	RSD%	累计溶 出量(%)	平均(%)	RSD%
极限	1	5188408	5217664	5203036	98.515	98.13	0.88	98.52	98.13	0.88
	2	5124501	5117135	5120818	96.959			96.96		
	3	5240897	5236213	5238555	99.188			99.19		
	4	5202832	5199056	5200944	98.476			98.48		
	5	5198529	5198352	5198440	98.428			98.43		
	6	5135341	5133993	5134667	97.221			97.22		



操作者:
日期: 2026-08-09

复核者:

未审阅版本



布洛芬混悬液项目信息

介质体积(ml)	900	取样体积(ml)	5	补液体积(ml)	0
对照品批号	100179-202308	对照品来源	中检院	对照品使用方法	直接使用
对照品含量(%)	99.9	对照品水分(%)	0	对照品稀释倍数	50
标示量(mg)	200	供试品稀释倍数	1	系数	1

对照品溶液

序号	称样量(mg)	A ₁	A ₂	A ₃	A ₄	A ₅	A _{平均}	RSD%
1	11.15	5279288	5284143	5259546	5275583	5282936	5276299	0.19
2	11.09	5292152	5290240				5291196	0.03
单位质量响应值				RSD%	判断			
473210.67				0.59	数据可信			



操作者:

日期: 2026-08-09

复核者:

未审阅版本



供试品溶液批-pH7.2

时间 (分钟)	样品	A ₁	A ₂	A _{平均}	溶出量(%)	平均(%)	RSD%	累计溶 出量(%)	平均(%)	RSD%
极限	1	5290363	5103884	5197124	98.341	97.39	1.57	98.34	97.39	1.57
	2	5207376	5254549	5230962	98.982			98.98		
	3	5234252	5204379	5219316	98.761			98.76		
	4	5091158	5087712	5089435	96.304			96.30		
	5	5143775	5081310	5112542	96.741			96.74		
	6	5026406	5038492	5032449	95.225			95.23		



操作者:

日 期: 2026-08-09

复核者:

未审阅版本




QTL-4141

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱 温:35°C
数据文件名: RC\$QTL-4141 - 0-55/27-539-2 - zzp-2025103151p-rcd-dsjs1y-pH7.2jz-rj.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4141 - QTL-4141-rcd-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4141 - 20260506-FX276.lcb
样品瓶号: 1-9
进样体积: 10 μl
进样时间: 2026/05/06 15:06:57
处理时间 (V2) : 2026/05/07 10:18:00
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速:1.0ml/min
波长:220nm
版本号:6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图1 布洛芬混悬液低湿加速1月溶出度测定HPLC图谱
自制品-2025103151批-pH7.2介质
溶剂




QTL-4141

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱 温:35°C
数据文件名: RC\$QTL-4141 - 0-55/27-540-2 - zzp-2025103151p-rcd-dsjs1y-pH7.2jz-dz1-1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4141 - QTL-4141-rcd-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4141 - 20260506-FX276.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 10 μl
进样时间: 2026/05/06 15:13:21
处理时间 (V2) : 2026/05/07 10:18:05
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速:1.0ml/min
波长:220nm
版本号:6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 220nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.322	5277012	100.000	815069	10387	1.132	--
总计		5277012	100.000	815069			

图2 布洛芬混悬液低湿加速1月溶出度测定HPLC图谱
自制品-2025103151批-pH7.2介质
对照品溶液-1-1



QTL-4141

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)

柱 温:35°C

数据文件名: RC\$QTL-4141 - 0-55/27-541-2 - zzp-2025103151p-rcd-dsjs1y-pH7.2jz-dz1-2.lcd

方法文件名: RC\$QTL-4141 - QTL-4141-rcd-FX276.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-4141 - 20260506-FX276.lcb

样品瓶号: 1-18

进样体积: 10 μl

进样时间: 2026/05/06 15:19:42

处理时间 (V2) : 2026/05/07 10:18:08

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速:1.0ml/min


波长:220nm

版本号:6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.321	5285755	100.000	815702	10364	1.131	--
总计		5285755	100.000	815702			

图3 布洛芬混悬液低湿加速1月溶出度测定HPLC图谱
自制品-2025103151批-pH7.2介质
对照品溶液-1-2




QTL-4141

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱 温:35°C
数据文件名: RC\$QTL-4141 - 0-55/27-542-2 - zzp-2025103151p-rcd-dsjs1y-pH7.2jz-dz1-3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4141 - QTL-4141-rcd-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4141 - 20260506-FX276.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 10 μl
进样时间: 2026/05/06 15:26:06
处理时间 (V2) : 2026/05/07 10:18:10
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速:1.0ml/min
波长:220nm
版本号:6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 220nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.323	5280178	100.000	814332	10354	1.131	--
总计		5280178	100.000	814332			

图4 布洛芬混悬液低湿加速1月溶出度测定HPLC图谱
自制品-2025103151批-pH7.2介质
对照品溶液-1-3



QTL-4141

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)

柱 温:35°C

数据文件名: RC\$QTL-4141 - 0-55/27-543-2 - zzp-2025103151p-rcd-dsjs1y-pH7.2jz-dz1-4.lcd

方法文件名: RC\$QTL-4141 - QTL-4141-rcd-FX276.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-4141 - 20260506-FX276.lcb

样品瓶号: 1-18

进样体积: 10 μl

进样时间: 2026/05/06 15:32:28

处理时间 (V2) : 2026/05/07 10:18:12

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速:1.0ml/min


波长:220nm

版本号:6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.322	5288468	100.000	815338	10341	1.131	--
总计		5288468	100.000	815338			

图5 布洛芬混悬液低湿加速1月溶出度测定HPLC图谱
自制品-2025103151批-pH7.2介质
对照品溶液-1-4




QTL-4141

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱 温:35°C
数据文件名: RC\$QTL-4141 - 0-55/27-544-2 - zzp-2025103151p-rcd-dsjs1y-pH7.2jz-dz1-5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4141 - QTL-4141-rcd-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4141 - 20260506-FX276.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 10 μl
进样时间: 2026/05/06 15:38:51
处理时间 (V2) : 2026/05/07 10:18:15
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速:1.0ml/min
波长:220nm
版本号:6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 220nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.323	5292844	100.000	818210	10414	1.132	--
总计		5292844	100.000	818210			

图6 布洛芬混悬液低湿加速1月溶出度测定HPLC图谱
自制品-2025103151批-pH7.2介质
对照品溶液-1-5




QTL-4141

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱 温:35°C
数据文件名: RC\$QTL-4141 - 0-55/27-545-2 - zzp-2025103151p-rcd-dsjs1y-pH7.2jz-P1-1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4141 - QTL-4141-rcd-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4141 - 20260506-FX276.lcb
样品瓶号: 1-1
进样体积: 10 μl
进样时间: 2026/05/06 15:45:13
处理时间 (V2) : 2026/05/07 10:18:18
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速:1.0ml/min
波长:220nm
版本号:6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 220nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.325	5324627	100.000	807162	10061	1.126	--
总计		5324627	100.000	807162			

图7 布洛芬混悬液低湿加速1月溶出度测定HPLC图谱
自制品-2025103151批-pH7.2介质-片1
供试品溶液-1




QTL-4141

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱 温:35°C
数据文件名: RC\$QTL-4141 - 0-55/27-546-2 - zzp-2025103151p-rcd-dsjs1y-pH7.2jz-P1-2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4141 - QTL-4141-rcd-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4141 - 20260506-FX276.lcb
样品瓶号: 1-1
进样体积: 10 μl
进样时间: 2026/05/06 15:51:35
处理时间 (V2) : 2026/05/07 10:18:20
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速:1.0ml/min
波长:220nm
版本号:6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 220nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.327	5331275	100.000	807958	10051	1.126	--
总计		5331275	100.000	807958			

图8 布洛芬混悬液低湿加速1月溶出度测定HPLC图谱
自制品-2025103151批-pH7.2介质-片1
供试品溶液-2




QTL-4141

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱 温:35°C
数据文件名: RC\$QTL-4141 - 0-55/27-547-2 - zzp-2025103151p-rcd-dsjs1y-pH7.2jz-P2-1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4141 - QTL-4141-rcd-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4141 - 20260506-FX276.lcb
样品瓶号: 1-10
进样体积: 10 μl
进样时间: 2026/05/06 15:57:57
处理时间 (V2) : 2026/05/07 10:18:23
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速:1.0ml/min
波长:220nm
版本号:6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 220nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.329	5172127	100.000	784509	10037	1.125	--
总计		5172127	100.000	784509			

图9 布洛芬混悬液低湿加速1月溶出度测定HPLC图谱
自制品-2025103151批-pH7.2介质-片2
供试品溶液-1




QTL-4141

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱 温:35°C
数据文件名: RC\$QTL-4141 - 0-55/27-548-2 - zzp-2025103151p-rcd-dsjs1y-pH7.2jz-P2-2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4141 - QTL-4141-rcd-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4141 - 20260506-FX276.lcb
样品瓶号: 1-10
进样体积: 10 μl
进样时间: 2026/05/06 16:04:19
处理时间 (V2) : 2026/05/07 10:18:25
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速:1.0ml/min
波长:220nm
版本号:6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.328	5173478	100.000	784826	10055	1.125	--
总计		5173478	100.000	784826			

图10 布洛芬混悬液低湿加速1月溶出度测定HPLC图谱
自制品-2025103151批-pH7.2介质-片2
供试品溶液-2




QTL-4141

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱 温:35°C
数据文件名: RC\$QTL-4141 - 0-55/27-549-2 - zzp-2025103151p-rcd-dsjs1y-pH7.2jz-P3-1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4141 - QTL-4141-rcd-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4141 - 20260506-FX276.lcb
样品瓶号: 1-19
进样体积: 10 μl
进样时间: 2026/05/06 16:10:41
处理时间 (V2) : 2026/05/07 10:18:28
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速:1.0ml/min
波长:220nm
版本号:6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 220nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.328	5252581	100.000	797886	10080	1.126	--
总计		5252581	100.000	797886			

图11 布洛芬混悬液低湿加速1月溶出度测定HPLC图谱
自制品-2025103151批-pH7.2介质-片3
供试品溶液-1




QTL-4141

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱 温:35°C
数据文件名: RC\$QTL-4141 - 0-55/27-550-2 - zzp-2025103151p-rcd-dsjs1y-pH7.2jz-P3-2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4141 - QTL-4141-rcd-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4141 - 20260506-FX276.lcb
样品瓶号: 1-19
进样体积: 10 μl
进样时间: 2026/05/06 16:17:02
处理时间 (V2) : 2026/05/07 10:18:30
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速:1.0ml/min
波长:220nm
版本号:6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.330	5260113	100.000	802348	10156	1.127	--
总计		5260113	100.000	802348			

图12 布洛芬混悬液低湿加速1月溶出度测定HPLC图谱
自制品-2025103151批-pH7.2介质-片3
供试品溶液-2




QTL-4141

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱 温:35°C
数据文件名: RC\$QTL-4141 - 0-55/27-551-2 - zzp-2025103151p-rcd-dsjs1y-pH7.2jz-P4-1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4141 - QTL-4141-rcd-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4141 - 20260506-FX276.lcb
样品瓶号: 1-28
进样体积: 10 μl
进样时间: 2026/05/06 16:23:24
处理时间 (V2) : 2026/05/07 10:18:33
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速:1.0ml/min
波长:220nm
版本号:6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 220nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.328	5309903	100.000	806877	10093	1.127	--
总计		5309903	100.000	806877			

图13 布洛芬混悬液低湿加速1月溶出度测定HPLC图谱
自制品-2025103151批-pH7.2介质-片4
供试品溶液-1




QTL-4141

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱 温:35°C
数据文件名: RC\$QTL-4141 - 0-55/27-552-2 - zzp-2025103151p-rcd-dsjs1y-pH7.2jz-P4-2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4141 - QTL-4141-rcd-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4141 - 20260506-FX276.lcb
样品瓶号: 1-28
进样体积: 10 μl
进样时间: 2026/05/06 16:29:46
处理时间 (V2) : 2026/05/07 10:18:35
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速:1.0ml/min
波长:220nm
版本号:6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 220nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.329	5314322	100.000	810279	10159	1.127	--
总计		5314322	100.000	810279			

图14 布洛芬混悬液低湿加速1月溶出度测定HPLC图谱
自制品-2025103151批-pH7.2介质-片4
供试品溶液-2




QTL-4141

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱 温:35°C
数据文件名: RC\$QTL-4141 - 0-55/27-553-2 - zzp-2025103151p-rcd-dsjs1y-pH7.2jz-P5-1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4141 - QTL-4141-rcd-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4141 - 20260506-FX276.lcb
样品瓶号: 1-37
进样体积: 10 μl
进样时间: 2026/05/06 16:36:08
处理时间 (V2) : 2026/05/07 10:18:37
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速:1.0ml/min
波长:220nm
版本号:6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.328	5306302	100.000	806847	10112	1.127	--
总计		5306302	100.000	806847			

图15 布洛芬混悬液低湿加速1月溶出度测定HPLC图谱
自制品-2025103151批-pH7.2介质-片5
供试品溶液-1



QTL-4141

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)

柱 温:35°C

数据文件名: RC\$QTL-4141 - 0-55/27-554-2 - zzp-2025103151p-rcd-dsjs1y-pH7.2jz-P5-2.lcd

方法文件名: RC\$QTL-4141 - QTL-4141-rcd-FX276.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-4141 - 20260506-FX276.lcb

样品瓶号: 1-37

进样体积: 10 μl

进样时间: 2026/05/06 16:42:31

处理时间 (V2) : 2026/05/07 10:18:40

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速:1.0ml/min


波长:220nm

版本号:6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.327	5303435	100.000	804901	10087	1.128	--
总计		5303435	100.000	804901			

图16 布洛芬混悬液低湿加速1月溶出度测定HPLC图谱
自制品-2025103151批-pH7.2介质-片5
供试品溶液-2




QTL-4141

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱 温:35°C
数据文件名: RC\$QTL-4141 - 0-55/27-555-2 - zzp-2025103151p-rcd-dsjs1y-pH7.2jz-P6-1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4141 - QTL-4141-rcd-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4141 - 20260506-FX276.lcb
样品瓶号: 1-46
进样体积: 10 μl
进样时间: 2026/05/06 16:48:54
处理时间 (V2) : 2026/05/07 10:18:42
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速:1.0ml/min
波长:220nm
版本号:6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.328	5281142	100.000	801676	10082	1.128	--
总计		5281142	100.000	801676			

图17 布洛芬混悬液低湿加速1月溶出度测定HPLC图谱
自制品-2025103151批-pH7.2介质-片6
供试品溶液-1




QTL-4141

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱 温:35°C
数据文件名: RC\$QTL-4141 - 0-55/27-556-2 - zzp-2025103151p-rcd-dsjs1y-pH7.2jz-P6-2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4141 - QTL-4141-rcd-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4141 - 20260506-FX276.lcb
样品瓶号: 1-46
进样体积: 10 μl
进样时间: 2026/05/06 16:55:16
处理时间 (V2) : 2026/05/07 10:18:44
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速:1.0ml/min
波长:220nm
版本号:6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 220nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.328	5283944	100.000	805283	10147	1.129	--
总计		5283944	100.000	805283			

图18 布洛芬混悬液低湿加速1月溶出度测定HPLC图谱
自制品-2025103151批-pH7.2介质-片6
供试品溶液-2




QTL-4141

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱 温:35°C
数据文件名: RC\$QTL-4141 - 0-55/27-557-2 - zzp-2025103151p-rcd-dsjs1y-pH7.2jz-dz2-1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4141 - QTL-4141-rcd-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4141 - 20260506-FX276.lcb
样品瓶号: 1-27
进样体积: 10 μl
进样时间: 2026/05/06 17:01:41
处理时间 (V2) : 2026/05/07 10:18:47
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速:1.0ml/min
波长:220nm
版本号:6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 220nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.330	5294974	100.000	819068	10453	1.135	--
总计		5294974	100.000	819068			

图19 布洛芬混悬液低湿加速1月溶出度测定HPLC图谱
自制品-2025103151批-pH7.2介质
对照品溶液-2-1




QTL-4141

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱 温:35°C
数据文件名: RC\$QTL-4141 - 0-55/27-558-2 - zzp-2025103151p-rcd-dsjs1y-pH7.2jz-dz2-2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4141 - QTL-4141-rcd-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4141 - 20260506-FX276.lcb
样品瓶号: 1-27
进样体积: 10 μl
进样时间: 2026/05/06 17:08:03
处理时间 (V2) : 2026/05/07 10:18:49
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速:1.0ml/min
波长:220nm
版本号:6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.330	5289520	100.000	818222	10457	1.134	--
总计		5289520	100.000	818222			

图20 布洛芬混悬液低湿加速1月溶出度测定HPLC图谱
自制品-2025103151批-pH7.2介质
对照品溶液-2-2




QTL-4141

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱 温:35°C
数据文件名: RC\$QTL-4141 - 0-55/27-559-2 - zzp-2025110151p-rcd-dsjs1y-pH7.2jz-rj.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4141 - QTL-4141-rcd-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4141 - 20260506-FX276.lcb
样品瓶号: 2-9
进样体积: 10 μl
进样时间: 2026/05/06 17:14:27
处理时间 (V2) : 2026/05/07 10:18:53
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速:1.0ml/min
波长:220nm
版本号:6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图21 布洛芬混悬液低湿加速1月溶出度测定HPLC图谱
自制品-2025110151批-pH7.2介质
溶剂




QTL-4141

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱 温:35°C
数据文件名: RC\$QTL-4141 - 0-55/27-560-2 - zzp-2025110151p-rcd-dsjs1y-pH7.2jz-dz1-1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4141 - QTL-4141-rcd-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4141 - 20260506-FX276.lcb
样品瓶号: 2-18
进样体积: 10 μl
进样时间: 2026/05/06 17:20:50
处理时间 (V2) : 2026/05/07 10:18:55
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速:1.0ml/min
波长:220nm
版本号:6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 220nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.328	5298814	100.000	818854	10448	1.135	--
总计		5298814	100.000	818854			

图22 布洛芬混悬液低湿加速1月溶出度测定HPLC图谱
自制品-2025110151批-pH7.2介质
对照品溶液-1-1



QTL-4141

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)

柱 温:35°C

数据文件名: RC\$QTL-4141 - 0-55/27-561-2 - zzp-2025110151p-rcd-dsjs1y-pH7.2jz-dz1-2.lcd

方法文件名: RC\$QTL-4141 - QTL-4141-rcd-FX276.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-4141 - 20260506-FX276.lcb

样品瓶号: 2-18

进样体积: 10 μl

进样时间: 2026/05/06 17:27:15

处理时间 (V2) : 2026/05/07 10:18:57

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速:1.0ml/min


波长:220nm

版本号:6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.329	5293266	100.000	815775	10381	1.134	--
总计		5293266	100.000	815775			

图23 布洛芬混悬液低湿加速1月溶出度测定HPLC图谱
自制品-2025110151批-pH7.2介质
对照品溶液-1-2




QTL-4141

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱 温:35°C
数据文件名: RC\$QTL-4141 - 0-55/27-562-2 - zzp-2025110151p-rcd-dsjs1y-pH7.2jz-dz1-3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4141 - QTL-4141-rcd-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4141 - 20260506-FX276.lcb
样品瓶号: 2-18
进样体积: 10 μl
进样时间: 2026/05/06 17:33:40
处理时间 (V2) : 2026/05/07 10:19:00
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速:1.0ml/min
波长:220nm
版本号:6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 220nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.329	5299854	100.000	818719	10433	1.134	--
总计		5299854	100.000	818719			

图24 布洛芬混悬液低湿加速1月溶出度测定HPLC图谱
自制品-2025110151批-pH7.2介质
对照品溶液-1-3



QTL-4141

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)

柱 温:35°C

数据文件名: RC\$QTL-4141 - 0-55/27-563-2 - zzp-2025110151p-rcd-dsjs1y-pH7.2jz-dz1-4.lcd

方法文件名: RC\$QTL-4141 - QTL-4141-rcd-FX276.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-4141 - 20260506-FX276.lcb

样品瓶号: 2-18

进样体积: 10 μl

进样时间: 2026/05/06 17:40:04

处理时间 (V2) : 2026/05/07 10:19:02

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速:1.0ml/min


波长:220nm

版本号:6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 220nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.328	5292673	100.000	817365	10429	1.134	--
总计		5292673	100.000	817365			

图25 布洛芬混悬液低湿加速1月溶出度测定HPLC图谱
自制品-2025110151批-pH7.2介质
对照品溶液-1-4



QTL-4141

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)

柱 温:35°C

数据文件名: RC\$QTL-4141 - 0-55/27-564-2 - zzp-2025110151p-rcd-dsjs1y-pH7.2jz-dz1-5.lcd

方法文件名: RC\$QTL-4141 - QTL-4141-rcd-FX276.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-4141 - 20260506-FX276.lcb

样品瓶号: 2-18

进样体积: 10 μl

进样时间: 2026/05/06 17:46:29

处理时间 (V2) : 2026/05/07 10:19:05

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速:1.0ml/min


波长:220nm

版本号:6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 220nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.328	5292059	100.000	817983	10446	1.135	--
总计		5292059	100.000	817983			

图26 布洛芬混悬液低湿加速1月溶出度测定HPLC图谱
自制品-2025110151批-pH7.2介质
对照品溶液-1-5




QTL-4141

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱 温:35°C
数据文件名: RC\$QTL-4141 - 0-55/27-565-2 - zzp-2025110151p-rcd-dsjs1y-pH7.2jz-P1-1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4141 - QTL-4141-rcd-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4141 - 20260506-FX276.lcb
样品瓶号: 2-1
进样体积: 10 μl
进样时间: 2026/05/06 17:52:52
处理时间 (V2) : 2026/05/07 10:19:07
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速:1.0ml/min
波长:220nm
版本号:6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 220nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.329	5119677	100.000	789521	10402	1.133	--
总计		5119677	100.000	789521			

图27 布洛芬混悬液低湿加速1月溶出度测定HPLC图谱
自制品-2025110151批-pH7.2介质-片1
供试品溶液-1




QTL-4141

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱 温:35°C
数据文件名: RC\$QTL-4141 - 0-55/27-566-2 - zzp-2025110151p-rcd-dsjs1y-pH7.2jz-P1-2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4141 - QTL-4141-rcd-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4141 - 20260506-FX276.lcb
样品瓶号: 2-1
进样体积: 10 μl
进样时间: 2026/05/06 17:59:16
处理时间 (V2) : 2026/05/07 10:19:09
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速:1.0ml/min
波长:220nm
版本号:6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 220nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.330	5112240	100.000	789353	10420	1.133	--
总计		5112240	100.000	789353			

图28 布洛芬混悬液低湿加速1月溶出度测定HPLC图谱
自制品-2025110151批-pH7.2介质-片1
供试品溶液-2




QTL-4141

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱 温:35°C
数据文件名: RC\$QTL-4141 - 0-55/27-567-2 - zzp-2025110151p-rcd-dsjs1y-pH7.2jz-P2-1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4141 - QTL-4141-rcd-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4141 - 20260506-FX276.lcb
样品瓶号: 2-10
进样体积: 10 μl
进样时间: 2026/05/06 18:05:40
处理时间 (V2) : 2026/05/07 10:19:12
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速:1.0ml/min
波长:220nm
版本号:6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 220nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.329	5133370	100.000	790908	10377	1.133	--
总计		5133370	100.000	790908			

图29 布洛芬混悬液低湿加速1月溶出度测定HPLC图谱
自制品-2025110151批-pH7.2介质-片2
供试品溶液-1




QTL-4141

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱 温:35°C
数据文件名: RC\$QTL-4141 - 0-55/27-568-2 - zzp-2025110151p-rcd-dsjs1y-pH7.2jz-P2-2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4141 - QTL-4141-rcd-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4141 - 20260506-FX276.lcb
样品瓶号: 2-10
进样体积: 10 μl
进样时间: 2026/05/06 18:12:04
处理时间 (V2) : 2026/05/07 10:19:14
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速:1.0ml/min
波长:220nm
版本号:6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 220nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.329	5130961	100.000	789483	10338	1.133	--
总计		5130961	100.000	789483			

图30 布洛芬混悬液低湿加速1月溶出度测定HPLC图谱
自制品-2025110151批-pH7.2介质-片2
供试品溶液-2



QTL-4141

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)

柱 温:35°C

数据文件名: RC\$QTL-4141 - 0-55/27-569-2 - zzp-2025110151p-rcd-dsjs1y-pH7.2jz-P3-1.lcd

方法文件名: RC\$QTL-4141 - QTL-4141-rcd-FX276.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-4141 - 20260506-FX276.lcb

样品瓶号: 2-19

进样体积: 10 μl

进样时间: 2026/05/06 18:18:28

处理时间 (V2) : 2026/05/07 10:19:17

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速:1.0ml/min


波长:220nm

版本号:6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 220nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.328	5193683	100.000	799060	10352	1.134	--
总计		5193683	100.000	799060			

图31 布洛芬混悬液低湿加速1月溶出度测定HPLC图谱
自制品-2025110151批-pH7.2介质-片3
供试品溶液-1



QTL-4141

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)

柱 温:35°C

数据文件名: RC\$QTL-4141 - 0-55/27-570-2 - zzp-2025110151p-rcd-dsjs1y-pH7.2jz-P3-2.lcd

方法文件名: RC\$QTL-4141 - QTL-4141-rcd-FX276.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-4141 - 20260506-FX276.lcb

样品瓶号: 2-19

进样体积: 10 μl

进样时间: 2026/05/06 18:24:51

处理时间 (V2) : 2026/05/07 10:19:19

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速:1.0ml/min


波长:220nm

版本号:6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 220nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.329	5194307	100.000	799399	10353	1.134	--
总计		5194307	100.000	799399			

图32 布洛芬混悬液低湿加速1月溶出度测定HPLC图谱
自制品-2025110151批-pH7.2介质-片3
供试品溶液-2




QTL-4141

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱 温:35°C
数据文件名: RC\$QTL-4141 - 0-55/27-571-2 - zzp-2025110151p-rcd-dsjs1y-pH7.2jz-P4-1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4141 - QTL-4141-rcd-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4141 - 20260506-FX276.lcb
样品瓶号: 2-28
进样体积: 10 μl
进样时间: 2026/05/06 18:31:13
处理时间 (V2) : 2026/05/07 10:19:22
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速:1.0ml/min
波长:220nm
版本号:6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 220nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.330	5136391	100.000	789052	10304	1.134	--
总计		5136391	100.000	789052			

图33 布洛芬混悬液低湿加速1月溶出度测定HPLC图谱
自制品-2025110151批-pH7.2介质-片4
供试品溶液-1




QTL-4141

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱 温:35°C
数据文件名: RC\$QTL-4141 - 0-55/27-572-2 - zzp-2025110151p-rcd-dsjs1y-pH7.2jz-P4-2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4141 - QTL-4141-rcd-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4141 - 20260506-FX276.lcb
样品瓶号: 2-28
进样体积: 10 μl
进样时间: 2026/05/06 18:37:36
处理时间 (V2) : 2026/05/07 10:19:24
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速:1.0ml/min
波长:220nm
版本号:6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 220nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.330	5137415	100.000	790521	10338	1.135	--
总计		5137415	100.000	790521			

图34 布洛芬混悬液低湿加速1月溶出度测定HPLC图谱
自制品-2025110151批-pH7.2介质-片4
供试品溶液-2




QTL-4141

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱 温:35°C
数据文件名: RC\$QTL-4141 - 0-55/27-573-2 - zzp-2025110151p-rcd-dsjs1y-pH7.2jz-P5-1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4141 - QTL-4141-rcd-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4141 - 20260506-FX276.lcb
样品瓶号: 2-37
进样体积: 10 μl
进样时间: 2026/05/06 18:43:59
处理时间 (V2) : 2026/05/07 10:19:27
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速:1.0ml/min
波长:220nm
版本号:6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.330	5076504	100.000	781672	10363	1.135	--
总计		5076504	100.000	781672			

图35 布洛芬混悬液低湿加速1月溶出度测定HPLC图谱
自制品-2025110151批-pH7.2介质-片5
供试品溶液-1




QTL-4141

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱 温:35°C
数据文件名: RC\$QTL-4141 - 0-55/27-574-2 - zzp-2025110151p-rcd-dsjs1y-pH7.2jz-P5-2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4141 - QTL-4141-rcd-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4141 - 20260506-FX276.lcb
样品瓶号: 2-37
进样体积: 10 μl
进样时间: 2026/05/06 18:50:24
处理时间 (V2) : 2026/05/07 10:19:29
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速:1.0ml/min
波长:220nm
版本号:6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 220nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.330	5075790	100.000	779369	10303	1.135	--
总计		5075790	100.000	779369			

图36 布洛芬混悬液低湿加速1月溶出度测定HPLC图谱
自制品-2025110151批-pH7.2介质-片5
供试品溶液-2




QTL-4141

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱 温:35°C
数据文件名: RC\$QTL-4141 - 0-55/27-575-2 - zzp-2025110151p-rcd-dsjs1y-pH7.2jz-P6-1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4141 - QTL-4141-rcd-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4141 - 20260506-FX276.lcb
样品瓶号: 2-46
进样体积: 10 μl
进样时间: 2026/05/06 18:56:46
处理时间 (V2) : 2026/05/07 10:19:31
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速:1.0ml/min
波长:220nm
版本号:6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.330	5102700	100.000	782511	10273	1.135	--
总计		5102700	100.000	782511			

图37 布洛芬混悬液低湿加速1月溶出度测定HPLC图谱
自制品-2025110151批-pH7.2介质-片6
供试品溶液-1




QTL-4141

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱 温:35°C
数据文件名: RC\$QTL-4141 - 0-55/27-576-2 - zzp-2025110151p-rcd-dsjs1y-pH7.2jz-P6-2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4141 - QTL-4141-rcd-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4141 - 20260506-FX276.lcb
样品瓶号: 2-46
进样体积: 10 μl
进样时间: 2026/05/06 19:03:08
处理时间 (V2) : 2026/05/07 10:19:34
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速:1.0ml/min
波长:220nm
版本号:6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 220nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.330	5102545	100.000	784019	10307	1.136	--
总计		5102545	100.000	784019			

图38 布洛芬混悬液低湿加速1月溶出度测定HPLC图谱
自制品-2025110151批-pH7.2介质-片6
供试品溶液-2




QTL-4141

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱 温:35°C
数据文件名: RC\$QTL-4141 - 0-55/27-577-2 - zzp-2025110151p-rcd-dsjs1y-pH7.2jz-dz2-1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4141 - QTL-4141-rcd-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4141 - 20260506-FX276.lcb
样品瓶号: 2-27
进样体积: 10 μl
进样时间: 2026/05/06 19:09:32
处理时间 (V2) : 2026/05/07 10:19:36
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速:1.0ml/min
波长:220nm
版本号:6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 220nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.329	5295935	100.000	815156	10336	1.137	--
总计		5295935	100.000	815156			

图39 布洛芬混悬液低湿加速1月溶出度测定HPLC图谱
自制品-2025110151批-pH7.2介质
对照品溶液-2-1



QTL-4141

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)

柱 温:35°C

数据文件名: RC\$QTL-4141 - 0-55/27-578-2 - zzp-2025110151p-rcd-dsjs1y-pH7.2jz-dz2-2.lcd

方法文件名: RC\$QTL-4141 - QTL-4141-rcd-FX276.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-4141 - 20260506-FX276.lcb

样品瓶号: 2-27

进样体积: 10 μl

进样时间: 2026/05/06 19:15:55

处理时间 (V2) : 2026/05/07 10:19:38

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速:1.0ml/min


波长:220nm

版本号:6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 220nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.330	5290193	100.000	813993	10339	1.137	--
总计		5290193	100.000	813993			

图40 布洛芬混悬液低湿加速1月溶出度测定HPLC图谱
自制品-2025110151批-pH7.2介质
对照品溶液-2-2




QTL-4141

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱 温:35°C
数据文件名: RC\$QTL-4141 - 0-55/27-579-2 - zzp-2025110251p-rcd-dsjs1y-pH7.2jz-rj.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4141 - QTL-4141-rcd-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4141 - 20260506-FX276.lcb
样品瓶号: 3-9
进样体积: 10 μl
进样时间: 2026/05/06 19:22:17
处理时间 (V2) : 2026/05/07 10:19:41
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速:1.0ml/min
波长:220nm
版本号:6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图41 布洛芬混悬液低湿加速1月溶出度测定HPLC图谱
自制品-2025110251批-pH7.2介质
溶剂



QTL-4141

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)

柱 温:35°C

数据文件名: RC\$QTL-4141 - 0-55/27-580-2 - zzp-2025110251p-rcd-dsjs1y-pH7.2jz-dz1-1.lcd

方法文件名: RC\$QTL-4141 - QTL-4141-rcd-FX276.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-4141 - 20260506-FX276.lcb

样品瓶号: 3-18

进样体积: 10 μl

进样时间: 2026/05/06 19:28:41

处理时间 (V2) : 2026/05/07 10:19:43

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速:1.0ml/min


波长:220nm

版本号:6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 220nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.329	5284315	100.000	813437	10339	1.137	--
总计		5284315	100.000	813437			

图42 布洛芬混悬液低湿加速1月溶出度测定HPLC图谱
自制品-2025110251批-pH7.2介质
对照品溶液-1-1



QTL-4141

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)

柱 温:35°C

数据文件名: RC\$QTL-4141 - 0-55/27-581-2 - zzp-2025110251p-rcd-dsjs1y-pH7.2jz-dz1-2.lcd

方法文件名: RC\$QTL-4141 - QTL-4141-rcd-FX276.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-4141 - 20260506-FX276.lcb

样品瓶号: 3-18

进样体积: 10 μl

进样时间: 2026/05/06 19:35:02

处理时间 (V2) : 2026/05/07 10:19:45

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速:1.0ml/min


波长:220nm

版本号:6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.330	5282064	100.000	813158	10339	1.137	--
总计		5282064	100.000	813158			

图43 布洛芬混悬液低湿加速1月溶出度测定HPLC图谱
自制品-2025110251批-pH7.2介质
对照品溶液-1-2




QTL-4141

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱 温:35°C
数据文件名: RC\$QTL-4141 - 0-55/27-582-2 - zzp-2025110251p-rcd-dsjs1y-pH7.2jz-dz1-3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4141 - QTL-4141-rcd-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4141 - 20260506-FX276.lcb
样品瓶号: 3-18
进样体积: 10 μl
进样时间: 2026/05/06 19:41:24
处理时间 (V2) : 2026/05/07 10:19:48
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速:1.0ml/min
波长:220nm
版本号:6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 220nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.330	5287408	100.000	813370	10323	1.137	--
总计		5287408	100.000	813370			

图44 布洛芬混悬液低湿加速1月溶出度测定HPLC图谱
自制品-2025110251批-pH7.2介质
对照品溶液-1-3




QTL-4141

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱 温:35°C
数据文件名: RC\$QTL-4141 - 0-55/27-583-2 - zzp-2025110251p-rcd-dsjs1y-pH7.2jz-dz1-4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4141 - QTL-4141-rcd-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4141 - 20260506-FX276.lcb
样品瓶号: 3-18
进样体积: 10 μl
进样时间: 2026/05/06 19:47:47
处理时间 (V2) : 2026/05/07 10:19:50
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速:1.0ml/min
波长:220nm
版本号:6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 220nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.330	5273553	100.000	812158	10353	1.137	--
总计		5273553	100.000	812158			

图45 布洛芬混悬液低湿加速1月溶出度测定HPLC图谱
自制品-2025110251批-pH7.2介质
对照品溶液-1-4



QTL-4141

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)

柱 温:35°C

数据文件名: RC\$QTL-4141 - 0-55/27-584-2 - zzp-2025110251p-rcd-dsjs1y-pH7.2jz-dz1-5.lcd

方法文件名: RC\$QTL-4141 - QTL-4141-rcd-FX276.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-4141 - 20260506-FX276.lcb

样品瓶号: 3-18

进样体积: 10 μl

进样时间: 2026/05/06 19:54:09

处理时间 (V2) : 2026/05/07 10:19:53

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速:1.0ml/min


波长:220nm

版本号:6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 220nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.329	5282052	100.000	813129	10347	1.137	--
总计		5282052	100.000	813129			

图46 布洛芬混悬液低湿加速1月溶出度测定HPLC图谱
自制品-2025110251批-pH7.2介质
对照品溶液-1-5




QTL-4141

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱 温:35°C
数据文件名: RC\$QTL-4141 - 0-55/27-585-2 - zzp-2025110251p-rcd-dsjs1y-pH7.2jz-P1-1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4141 - QTL-4141-rcd-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4141 - 20260506-FX276.lcb
样品瓶号: 3-1
进样体积: 10 μl
进样时间: 2026/05/06 20:00:31
处理时间 (V2) : 2026/05/07 10:19:55
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速:1.0ml/min
波长:220nm
版本号:6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 220nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.329	5188408	100.000	788053	10065	1.132	--
总计		5188408	100.000	788053			

图47 布洛芬混悬液低湿加速1月溶出度测定HPLC图谱
自制品-2025110251批-pH7.2介质-片1
供试品溶液-1




QTL-4141

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱 温:35°C
数据文件名: RC\$QTL-4141 - 0-55/27-586-2 - zzp-2025110251p-rcd-dsjs1y-pH7.2jz-P1-2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4141 - QTL-4141-rcd-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4141 - 20260506-FX276.lcb
样品瓶号: 3-1
进样体积: 10 μl
进样时间: 2026/05/06 20:06:53
处理时间 (V2) : 2026/05/07 10:19:57
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速:1.0ml/min
波长:220nm
版本号:6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 220nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.328	5217664	100.000	791738	10067	1.132	--
总计		5217664	100.000	791738			

图48 布洛芬混悬液低湿加速1月溶出度测定HPLC图谱
自制品-2025110251批-pH7.2介质-片1
供试品溶液-2




QTL-4141

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱 温:35°C
数据文件名: RC\$QTL-4141 - 0-55/27-587-2 - zzp-2025110251p-rcd-dsjs1y-pH7.2jz-P2-1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4141 - QTL-4141-rcd-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4141 - 20260506-FX276.lcb
样品瓶号: 3-10
进样体积: 10 μl
进样时间: 2026/05/06 20:13:15
处理时间 (V2) : 2026/05/07 10:20:00
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速:1.0ml/min
波长:220nm
版本号:6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 220nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.328	5124501	100.000	774009	9962	1.130	--
总计		5124501	100.000	774009			

图49 布洛芬混悬液低湿加速1月溶出度测定HPLC图谱
自制品-2025110251批-pH7.2介质-片2
供试品溶液-1




QTL-4141

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱 温:35°C
数据文件名: RC\$QTL-4141 - 0-55/27-588-2 - zzp-2025110251p-rcd-dsjs1y-pH7.2jz-P2-2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4141 - QTL-4141-rcd-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4141 - 20260506-FX276.lcb
样品瓶号: 3-10
进样体积: 10 μl
进样时间: 2026/05/06 20:19:36
处理时间 (V2) : 2026/05/07 10:20:02
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速:1.0ml/min
波长:220nm
版本号:6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 220nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.328	5117135	100.000	775159	10008	1.132	--
总计		5117135	100.000	775159			

图50 布洛芬混悬液低湿加速1月溶出度测定HPLC图谱
自制品-2025110251批-pH7.2介质-片2
供试品溶液-2




QTL-4141

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱 温:35°C
数据文件名: RC\$QTL-4141 - 0-55/27-589-2 - zzp-2025110251p-rcd-dsjs1y-pH7.2jz-P3-1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4141 - QTL-4141-rcd-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4141 - 20260506-FX276.lcb
样品瓶号: 3-19
进样体积: 10 μl
进样时间: 2026/05/06 20:25:58
处理时间 (V2) : 2026/05/07 10:20:04
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速:1.0ml/min
波长:220nm
版本号:6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.329	5240897	100.000	794160	10012	1.132	--
总计		5240897	100.000	794160			

图51 布洛芬混悬液低湿加速1月溶出度测定HPLC图谱
自制品-2025110251批-pH7.2介质-片3
供试品溶液-1




QTL-4141

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱 温:35°C
数据文件名: RC\$QTL-4141 - 0-55/27-590-2 - zzp-2025110251p-rcd-dsjs1y-pH7.2jz-P3-2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4141 - QTL-4141-rcd-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4141 - 20260506-FX276.lcb
样品瓶号: 3-19
进样体积: 10 μl
进样时间: 2026/05/06 20:32:20
处理时间 (V2) : 2026/05/07 10:20:07
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速:1.0ml/min
波长:220nm
版本号:6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.329	5236213	100.000	792671	9995	1.131	--
总计		5236213	100.000	792671			

图52 布洛芬混悬液低湿加速1月溶出度测定HPLC图谱
自制品-2025110251批-pH7.2介质-片3
供试品溶液-2




QTL-4141

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱 温:35°C
数据文件名: RC\$QTL-4141 - 0-55/27-591-2 - zzp-2025110251p-rcd-dsjs1y-pH7.2jz-P4-1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4141 - QTL-4141-rcd-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4141 - 20260506-FX276.lcb
样品瓶号: 3-28
进样体积: 10 μl
进样时间: 2026/05/06 20:38:43
处理时间 (V2) : 2026/05/07 10:20:09
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速:1.0ml/min
波长:220nm
版本号:6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 220nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.329	5202832	100.000	788739	10020	1.131	--
总计		5202832	100.000	788739			

图53 布洛芬混悬液低湿加速1月溶出度测定HPLC图谱
自制品-2025110251批-pH7.2介质-片4
供试品溶液-1




QTL-4141

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱 温:35°C
数据文件名: RC\$QTL-4141 - 0-55/27-592-2 - zzp-2025110251p-rcd-dsjs1y-pH7.2jz-P4-2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4141 - QTL-4141-rcd-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4141 - 20260506-FX276.lcb
样品瓶号: 3-28
进样体积: 10 μl
进样时间: 2026/05/06 20:45:04
处理时间 (V2) : 2026/05/07 10:20:11
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速:1.0ml/min
波长:220nm
版本号:6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 220nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.329	5199056	100.000	786677	9981	1.131	--
总计		5199056	100.000	786677			

图54 布洛芬混悬液低湿加速1月溶出度测定HPLC图谱
自制品-2025110251批-pH7.2介质-片4
供试品溶液-2




QTL-4141

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱 温:35°C
数据文件名: RC\$QTL-4141 - 0-55/27-593-2 - zzp-2025110251p-rcd-dsjs1y-pH7.2jz-P5-1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4141 - QTL-4141-rcd-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4141 - 20260506-FX276.lcb
样品瓶号: 3-37
进样体积: 10 μl
进样时间: 2026/05/06 20:51:27
处理时间 (V2) : 2026/05/07 10:20:14
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速:1.0ml/min
波长:220nm
版本号:6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.330	5198529	100.000	788645	10037	1.132	--
总计		5198529	100.000	788645			

图55 布洛芬混悬液低湿加速1月溶出度测定HPLC图谱
自制品-2025110251批-pH7.2介质-片5
供试品溶液-1



QTL-4141

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)

柱 温:35°C

数据文件名: RC\$QTL-4141 - 0-55/27-594-2 - zzp-2025110251p-rcd-dsjs1y-pH7.2jz-P5-2.lcd

方法文件名: RC\$QTL-4141 - QTL-4141-rcd-FX276.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-4141 - 20260506-FX276.lcb

样品瓶号: 3-37

进样体积: 10 μl

进样时间: 2026/05/06 20:57:49

处理时间 (V2) : 2026/05/07 10:20:16

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速:1.0ml/min


波长:220nm

版本号:6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 220nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.329	5198352	100.000	787742	10014	1.133	--
总计		5198352	100.000	787742			

图56 布洛芬混悬液低湿加速1月溶出度测定HPLC图谱
自制品-2025110251批-pH7.2介质-片5
供试品溶液-2




QTL-4141

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱 温:35°C
数据文件名: RC\$QTL-4141 - 0-55/27-595-2 - zzp-2025110251p-rcd-dsjs1y-pH7.2jz-P6-1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4141 - QTL-4141-rcd-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4141 - 20260506-FX276.lcb
样品瓶号: 3-46
进样体积: 10 μl
进样时间: 2026/05/06 21:04:11
处理时间 (V2) : 2026/05/07 10:20:18
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速:1.0ml/min
波长:220nm
版本号:6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.329	5135341	100.000	788254	10280	1.137	--
总计		5135341	100.000	788254			

图57 布洛芬混悬液低湿加速1月溶出度测定HPLC图谱
自制品-2025110251批-pH7.2介质-片6
供试品溶液-1




QTL-4141

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱 温:35°C
数据文件名: RC\$QTL-4141 - 0-55/27-596-2 - zzp-2025110251p-rcd-dsjs1y-pH7.2jz-P6-2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4141 - QTL-4141-rcd-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4141 - 20260506-FX276.lcb
样品瓶号: 3-46
进样体积: 10 μl
进样时间: 2026/05/06 21:10:32
处理时间 (V2) : 2026/05/07 10:20:21
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速:1.0ml/min
波长:220nm
版本号:6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 220nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.331	5133993	100.000	787659	10274	1.138	--
总计		5133993	100.000	787659			

图58 布洛芬混悬液低湿加速1月溶出度测定HPLC图谱
自制品-2025110251批-pH7.2介质-片6
供试品溶液-2




QTL-4141

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱 温:35°C
数据文件名: RC\$QTL-4141 - 0-55/27-597-2 - zzp-2025110251p-rcd-dsjs1y-pH7.2jz-dz2-1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4141 - QTL-4141-rcd-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4141 - 20260506-FX276.lcb
样品瓶号: 3-27
进样体积: 10 μl
进样时间: 2026/05/06 21:16:55
处理时间 (V2) : 2026/05/07 10:20:23
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速:1.0ml/min
波长:220nm
版本号:6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 220nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.331	5276759	100.000	810658	10304	1.139	--
总计		5276759	100.000	810658			

图59 布洛芬混悬液低湿加速1月溶出度测定HPLC图谱
自制品-2025110251批-pH7.2介质
对照品溶液-2-1



QTL-4141

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)

柱 温:35°C

数据文件名: RC\$QTL-4141 - 0-55/27-598-2 - zzp-2025110251p-rcd-dsjs1y-pH7.2jz-dz2-2.lcd

方法文件名: RC\$QTL-4141 - QTL-4141-rcd-FX276.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-4141 - 20260506-FX276.lcb

样品瓶号: 3-27

进样体积: 10 μl

进样时间: 2026/05/06 21:23:17

处理时间 (V2) : 2026/05/07 10:20:25

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速:1.0ml/min


波长:220nm

版本号:6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.330	5281023	100.000	813704	10364	1.139	--
总计		5281023	100.000	813704			

图60 布洛芬混悬液低湿加速1月溶出度测定HPLC图谱
自制品-2025110251批-pH7.2介质
对照品溶液-2-2




QTL-4141

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱 温:35°C
数据文件名: RC\$QTL-4141 - 0-55/27-599-2 - zzp-rcd-dsjs1y-pH7.2jz-jx-rj.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4141 - QTL-4141-rcd-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4141 - 20260506-FX276.lcb
样品瓶号: 4-9
进样体积: 10 μl
进样时间: 2026/05/06 21:29:40
处理时间 (V2) : 2026/05/07 10:20:28
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速:1.0ml/min
波长:220nm
版本号:6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 220nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.147	14582	100.000	2473	11215	1.093	--
总计		14582	100.000	2473			

图61 布洛芬混悬液低湿加速1月溶出度测定HPLC图谱
自制品-pH7.2介质-极限转速
溶剂




QTL-4141

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱 温:35°C
数据文件名: RC\$QTL-4141 - 0-55/27-600-2 - zzp-rcd-dsjs1y-pH7.2jz-jx-dz1-1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4141 - QTL-4141-rcd-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4141 - 20260506-FX276.lcb
样品瓶号: 4-18
进样体积: 10 μl
进样时间: 2026/05/06 21:36:04
处理时间 (V2) : 2026/05/07 10:20:30
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速:1.0ml/min
波长:220nm
版本号:6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 220nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.330	5279288	100.000	812154	10332	1.139	--
总计		5279288	100.000	812154			

图62 布洛芬混悬液低湿加速1月溶出度测定HPLC图谱
自制品-pH7.2介质-极限转速
对照品溶液-1-1




QTL-4141

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱 温:35°C
数据文件名: RC\$QTL-4141 - 0-55/27-601-2 - zzp-rcd-dsjs1y-pH7.2jz-jx-dz1-2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4141 - QTL-4141-rcd-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4141 - 20260506-FX276.lcb
样品瓶号: 4-18
进样体积: 10 μl
进样时间: 2026/05/06 21:42:27
处理时间 (V2) : 2026/05/07 10:20:33
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速:1.0ml/min
波长:220nm
版本号:6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 220nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.329	5284143	100.000	812353	10317	1.139	--
总计		5284143	100.000	812353			

图63 布洛芬混悬液低湿加速1月溶出度测定HPLC图谱
自制品-pH7.2介质-极限转速
对照品溶液-1-2




QTL-4141

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱 温:35°C
数据文件名: RC\$QTL-4141 - 0-55/27-602-2 - zzp-rcd-dsjs1y-pH7.2jz-jx-dz1-3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4141 - QTL-4141-rcd-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4141 - 20260506-FX276.lcb
样品瓶号: 4-18
进样体积: 10 μl
进样时间: 2026/05/06 21:48:51
处理时间 (V2) : 2026/05/07 10:20:35
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速:1.0ml/min
波长:220nm
版本号:6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 220nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.330	5259546	100.000	810079	10354	1.139	--
总计		5259546	100.000	810079			

图64 布洛芬混悬液低湿加速1月溶出度测定HPLC图谱
自制品-pH7.2介质-极限转速
对照品溶液-1-3




QTL-4141

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱 温:35°C
数据文件名: RC\$QTL-4141 - 0-55/27-603-2 - zzp-rcd-dsjs1y-pH7.2jz-jx-dz1-4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4141 - QTL-4141-rcd-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4141 - 20260506-FX276.lcb
样品瓶号: 4-18
进样体积: 10 μl
进样时间: 2026/05/06 21:55:16
处理时间 (V2) : 2026/05/07 10:20:37
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速:1.0ml/min
波长:220nm
版本号:6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 220nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.329	5275583	100.000	813641	10385	1.139	--
总计		5275583	100.000	813641			

图65 布洛芬混悬液低湿加速1月溶出度测定HPLC图谱
自制品-pH7.2介质-极限转速
对照品溶液-1-4




QTL-4141

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱 温:35°C
数据文件名: RC\$QTL-4141 - 0-55/27-604-2 - zzp-rcd-dsjs1y-pH7.2jz-jx-dz1-5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4141 - QTL-4141-rcd-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4141 - 20260506-FX276.lcb
样品瓶号: 4-18
进样体积: 10 μl
进样时间: 2026/05/06 22:01:40
处理时间 (V2) : 2026/05/07 10:20:40
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速:1.0ml/min
波长:220nm
版本号:6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 220nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.329	5282936	100.000	812132	10306	1.139	--
总计		5282936	100.000	812132			

图66 布洛芬混悬液低湿加速1月溶出度测定HPLC图谱
自制品-pH7.2介质-极限转速
对照品溶液-1-5




QTL-4141

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱 温:35°C
数据文件名: RC\$QTL-4141 - 0-55/27-605-2 - zzp-2025103151p-rcd-dsjs1y-pH7.2jz-jx-P1-1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4141 - QTL-4141-rcd-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4141 - 20260506-FX276.lcb
样品瓶号: 4-1
进样体积: 10 μl
进样时间: 2026/05/06 22:08:01
处理时间 (V2) : 2026/05/07 10:20:42
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速:1.0ml/min
波长:220nm
版本号:6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 220nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.330	5290363	100.000	802941	10044	1.133	--
总计		5290363	100.000	802941			

图67 布洛芬混悬液低湿加速1月溶出度测定HPLC图谱
自制品-2025103151批-pH7.2介质-极限转速-片1
供试品溶液-1




QTL-4141

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱 温:35°C
数据文件名: RC\$QTL-4141 - 0-55/27-606-2 - zzp-2025103151p-rcd-dsjs1y-pH7.2jz-jx-P2-1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4141 - QTL-4141-rcd-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4141 - 20260506-FX276.lcb
样品瓶号: 4-10
进样体积: 10 μl
进样时间: 2026/05/06 22:14:23
处理时间 (V2) : 2026/05/07 10:20:45
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速:1.0ml/min
波长:220nm
版本号:6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 220nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.330	5103884	100.000	774504	10042	1.133	--
总计		5103884	100.000	774504			

图68 布洛芬混悬液低湿加速1月溶出度测定HPLC图谱
自制品-2025103151批-pH7.2介质-极限转速-片2
供试品溶液-1




QTL-4141

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱 温:35°C
数据文件名: RC\$QTL-4141 - 0-55/27-607-2 - zzp-2025103151p-rcd-dsjs1y-pH7.2jz-jx-P3-1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4141 - QTL-4141-rcd-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4141 - 20260506-FX276.lcb
样品瓶号: 4-19
进样体积: 10 μl
进样时间: 2026/05/06 22:20:47
处理时间 (V2) : 2026/05/07 10:20:47
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速:1.0ml/min
波长:220nm
版本号:6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 220nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.330	5207376	100.000	787465	9968	1.132	--
总计		5207376	100.000	787465			

图69 布洛芬混悬液低湿加速1月溶出度测定HPLC图谱
自制品-2025103151批-pH7.2介质-极限转速-片3
供试品溶液-1




QTL-4141

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱 温:35°C
数据文件名: RC\$QTL-4141 - 0-55/27-608-2 - zzp-2025103151p-rcd-dsjs1y-pH7.2jz-jx-P4-1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4141 - QTL-4141-rcd-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4141 - 20260506-FX276.lcb
样品瓶号: 4-28
进样体积: 10 μl
进样时间: 2026/05/06 22:27:09
处理时间 (V2) : 2026/05/07 10:20:50
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速:1.0ml/min
波长:220nm
版本号:6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 220nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.329	5254549	100.000	794391	9963	1.133	--
总计		5254549	100.000	794391			

图70 布洛芬混悬液低湿加速1月溶出度测定HPLC图谱
自制品-2025103151批-pH7.2介质-极限转速-片4
供试品溶液-1




QTL-4141

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱 温:35°C
数据文件名: RC\$QTL-4141 - 0-55/27-609-2 - zzp-2025103151p-rcd-dsjs1y-pH7.2jz-jx-P5-1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4141 - QTL-4141-rcd-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4141 - 20260506-FX276.lcb
样品瓶号: 4-37
进样体积: 10 μl
进样时间: 2026/05/06 22:33:32
处理时间 (V2) : 2026/05/07 10:20:52
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速:1.0ml/min
波长:220nm
版本号:6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 220nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.329	5234252	100.000	793062	10005	1.133	--
总计		5234252	100.000	793062			

图71 布洛芬混悬液低湿加速1月溶出度测定HPLC图谱
自制品-2025103151批-pH7.2介质-极限转速-片5
供试品溶液-1




QTL-4141

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱 温:35°C
数据文件名: RC\$QTL-4141 - 0-55/27-610-2 - zzp-2025103151p-rcd-dsjs1y-pH7.2jz-jx-P6-1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4141 - QTL-4141-rcd-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4141 - 20260506-FX276.lcb
样品瓶号: 4-46
进样体积: 10 μl
进样时间: 2026/05/06 22:39:54
处理时间 (V2) : 2026/05/07 10:20:54
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速:1.0ml/min
波长:220nm
版本号:6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 220nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.329	5204379	100.000	787224	9973	1.133	--
总计		5204379	100.000	787224			

图72 布洛芬混悬液低湿加速1月溶出度测定HPLC图谱
自制品-2025103151批-pH7.2介质-极限转速-片6
供试品溶液-1




QTL-4141

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱 温:35°C
数据文件名: RC\$QTL-4141 - 0-55/27-611-2 - zzp-2025110151p-rcd-dsjs1y-pH7.2jz-jx-P1-1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4141 - QTL-4141-rcd-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4141 - 20260506-FX276.lcb
样品瓶号: 4-2
进样体积: 10 μl
进样时间: 2026/05/06 22:46:16
处理时间 (V2) : 2026/05/07 10:20:57
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速:1.0ml/min
波长:220nm
版本号:6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 220nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.330	5091158	100.000	778410	10200	1.136	--
总计		5091158	100.000	778410			

图73 布洛芬混悬液低湿加速1月溶出度测定HPLC图谱
自制品-2025110151批-pH7.2介质-极限转速-片1
供试品溶液-1




QTL-4141

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱 温:35°C
数据文件名: RC\$QTL-4141 - 0-55/27-612-2 - zzp-2025110151p-rcd-dsjs1y-pH7.2jz-jx-P2-1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4141 - QTL-4141-rcd-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4141 - 20260506-FX276.lcb
样品瓶号: 4-11
进样体积: 10 μl
进样时间: 2026/05/06 22:52:39
处理时间 (V2) : 2026/05/07 10:20:59
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速:1.0ml/min
波长:220nm
版本号:6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 220nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.330	5087712	100.000	778274	10212	1.136	--
总计		5087712	100.000	778274			

图74 布洛芬混悬液低湿加速1月溶出度测定HPLC图谱
自制品-2025110151批-pH7.2介质-极限转速-片2
供试品溶液-1




QTL-4141

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱 温:35°C
数据文件名: RC\$QTL-4141 - 0-55/27-613-2 - zzp-2025110151p-rcd-dsjs1y-pH7.2jz-jx-P3-1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4141 - QTL-4141-rcd-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4141 - 20260506-FX276.lcb
样品瓶号: 4-20
进样体积: 10 μl
进样时间: 2026/05/06 22:59:02
处理时间 (V2) : 2026/05/07 10:21:02
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速:1.0ml/min
波长:220nm
版本号:6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 220nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.330	5143775	100.000	786137	10195	1.136	--
总计		5143775	100.000	786137			

图75 布洛芬混悬液低湿加速1月溶出度测定HPLC图谱
自制品-2025110151批-pH7.2介质-极限转速-片3
供试品溶液-1



QTL-4141

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)

柱 温:35°C

数据文件名: RC\$QTL-4141 - 0-55/27-614-2 - zzp-2025110151p-rcd-dsjs1y-pH7.2jz-jx-P4-1.lcd

方法文件名: RC\$QTL-4141 - QTL-4141-rcd-FX276.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-4141 - 20260506-FX276.lcb

样品瓶号: 4-29

进样体积: 10 μl

进样时间: 2026/05/06 23:05:25

处理时间 (V2) : 2026/05/07 10:21:04

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速:1.0ml/min


波长:220nm

版本号:6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.331	5081310	100.000	777404	10215	1.137	--
总计		5081310	100.000	777404			

图76 布洛芬混悬液低湿加速1月溶出度测定HPLC图谱
自制品-2025110151批-pH7.2介质-极限转速-片4
供试品溶液-1




QTL-4141

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱 温:35°C
数据文件名: RC\$QTL-4141 - 0-55/27-615-2 - zzp-2025110151p-rcd-dsjs1y-pH7.2jz-jx-P5-1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4141 - QTL-4141-rcd-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4141 - 20260506-FX276.lcb
样品瓶号: 4-38
进样体积: 10 μl
进样时间: 2026/05/06 23:11:46
处理时间 (V2) : 2026/05/07 10:21:06
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速:1.0ml/min
波长:220nm
版本号:6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 220nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.332	5026406	100.000	768575	10217	1.137	--
总计		5026406	100.000	768575			

图77 布洛芬混悬液低湿加速1月溶出度测定HPLC图谱
自制品-2025110151批-pH7.2介质-极限转速-片5
供试品溶液-1




QTL-4141

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱 温:35°C
数据文件名: RC\$QTL-4141 - 0-55/27-616-2 - zzp-2025110151p-rcd-dsjs1y-pH7.2jz-jx-P6-1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4141 - QTL-4141-rcd-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4141 - 20260506-FX276.lcb
样品瓶号: 4-47
进样体积: 10 μl
进样时间: 2026/05/06 23:18:09
处理时间 (V2) : 2026/05/07 10:21:08
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速:1.0ml/min
波长:220nm
版本号:6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 220nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.332	5038492	100.000	769842	10214	1.137	--
总计		5038492	100.000	769842			

图78 布洛芬混悬液低湿加速1月溶出度测定HPLC图谱
自制品-2025110151批-pH7.2介质-极限转速-片6
供试品溶液-1




QTL-4141

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱 温:35°C
数据文件名: RC\$QTL-4141 - 0-55/27-617-2 - zzp-2025110251p-rcd-dsjs1y-pH7.2jz-jx-P1-1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4141 - QTL-4141-rcd-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4141 - 20260506-FX276.lcb
样品瓶号: 4-3
进样体积: 10 μl
进样时间: 2026/05/06 23:24:31
处理时间 (V2) : 2026/05/07 10:21:11
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速:1.0ml/min
波长:220nm
版本号:6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 220nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.328	5116737	100.000	772252	9939	1.132	--
总计		5116737	100.000	772252			

图79 布洛芬混悬液低湿加速1月溶出度测定HPLC图谱
自制品-2025110251批-pH7.2介质-极限转速-片1
供试品溶液-1




QTL-4141

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱 温:35°C
数据文件名: RC\$QTL-4141 - 0-55/27-618-2 - zzp-2025110251p-rcd-dsjs1y-pH7.2jz-jx-P2-1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4141 - QTL-4141-rcd-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4141 - 20260506-FX276.lcb
样品瓶号: 4-12
进样体积: 10 μl
进样时间: 2026/05/06 23:30:54
处理时间 (V2) : 2026/05/07 10:21:13
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速:1.0ml/min
波长:220nm
版本号:6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 220nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.329	5053610	100.000	763386	9944	1.132	--
总计		5053610	100.000	763386			

图80 布洛芬混悬液低湿加速1月溶出度测定HPLC图谱
自制品-2025110251批-pH7.2介质-极限转速-片2
供试品溶液-1



QTL-4141

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)

柱 温:35°C

数据文件名: RC\$QTL-4141 - 0-55/27-619-2 - zzp-2025110251p-rcd-dsjs1y-pH7.2jz-jx-P3-1.lcd

方法文件名: RC\$QTL-4141 - QTL-4141-rcd-FX276.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-4141 - 20260506-FX276.lcb

样品瓶号: 4-21

进样体积: 10 μl

进样时间: 2026/05/06 23:37:18

处理时间 (V2) : 2026/05/07 10:21:15

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速:1.0ml/min


波长:220nm

版本号:6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.330	5176106	100.000	782531	9958	1.133	--
总计		5176106	100.000	782531			

图81 布洛芬混悬液低湿加速1月溶出度测定HPLC图谱
自制品-2025110251批-pH7.2介质-极限转速-片3
供试品溶液-1




QTL-4141

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱 温:35°C
数据文件名: RC\$QTL-4141 - 0-55/27-620-2 - zzp-2025110251p-rcd-dsjs1y-pH7.2jz-jx-P4-1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4141 - QTL-4141-rcd-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4141 - 20260506-FX276.lcb
样品瓶号: 4-30
进样体积: 10 μl
进样时间: 2026/05/06 23:43:40
处理时间 (V2) : 2026/05/07 10:21:18
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速:1.0ml/min
波长:220nm
版本号:6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 220nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.328	5150086	100.000	777587	9935	1.133	--
总计		5150086	100.000	777587			

图82 布洛芬混悬液低湿加速1月溶出度测定HPLC图谱
自制品-2025110251批-pH7.2介质-极限转速-片4
供试品溶液-1




QTL-4141

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱 温:35°C
数据文件名: RC\$QTL-4141 - 0-55/27-621-2 - zzp-2025110251p-rcd-dsjs1y-pH7.2jz-jx-P5-1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4141 - QTL-4141-rcd-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4141 - 20260506-FX276.lcb
样品瓶号: 4-39
进样体积: 10 μl
进样时间: 2026/05/06 23:50:04
处理时间 (V2) : 2026/05/07 10:21:20
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速:1.0ml/min
波长:220nm
版本号:6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 220nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.329	5145067	100.000	779207	9995	1.134	--
总计		5145067	100.000	779207			

图83 布洛芬混悬液低湿加速1月溶出度测定HPLC图谱
自制品-2025110251批-pH7.2介质-极限转速-片5
供试品溶液-1



QTL-4141

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)

柱 温:35°C

数据文件名: RC\$QTL-4141 - 0-55/27-622-2 - zzp-2025110251p-rcd-dsjs1y-pH7.2jz-jx-P6-1.lcd

方法文件名: RC\$QTL-4141 - QTL-4141-rcd-FX276.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-4141 - 20260506-FX276.lcb

样品瓶号: 4-48

进样体积: 10 μl

进样时间: 2026/05/06 23:56:27

处理时间 (V2) : 2026/05/07 10:21:22

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速:1.0ml/min


波长:220nm

版本号:6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 220nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.331	5100576	100.000	780600	10229	1.137	--
总计		5100576	100.000	780600			

图84 布洛芬混悬液低湿加速1月溶出度测定HPLC图谱
自制品-2025110251批-pH7.2介质-极限转速-片6
供试品溶液-1




QTL-4141

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱 温:35°C
数据文件名: RC\$QTL-4141 - 0-55/27-623-2 - zzp-rcd-dsjs1y-pH7.2jz-jx-dz2-1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4141 - QTL-4141-rcd-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4141 - 20260506-FX276.lcb
样品瓶号: 4-27
进样体积: 10 μl
进样时间: 2026/05/07 00:02:50
处理时间 (V2) : 2026/05/07 10:21:25
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速:1.0ml/min
波长:220nm
版本号:6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 220nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.330	5292152	100.000	812761	10290	1.139	--
总计		5292152	100.000	812761			

图85 布洛芬混悬液低湿加速1月溶出度测定HPLC图谱
自制品-pH7.2介质-极限转速
对照品溶液-2-1




QTL-4141

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱 温:35°C
数据文件名: RC\$QTL-4141 - 0-55/27-624-2 - zzp-rcd-dsjs1y-pH7.2jz-jx-dz2-2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4141 - QTL-4141-rcd-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4141 - 20260506-FX276.lcb
样品瓶号: 4-27
进样体积: 10 μl
进样时间: 2026/05/07 00:09:15
处理时间 (V2) : 2026/05/07 10:21:27
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速:1.0ml/min
波长:220nm
版本号:6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 220nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.330	5290240	100.000	814553	10348	1.140	--
总计		5290240	100.000	814553			

图86 布洛芬混悬液低湿加速1月溶出度测定HPLC图谱
自制品-pH7.2介质-极限转速
对照品溶液-2-2