



艾托格列净片项目信息

介质体积(ml)	900	取样体积(ml)	1.5	补液体积(ml)	1.5
对照品批号	741-2407001-D	对照品来源	自制	对照品使用方法	直接使用
对照品含量(%)	99.4	对照品水分(%)	0	对照品稀释倍数	2000
标示量(mg)	5	供试品稀释倍数	1	系数	0.7719

对照品溶液

序号	称样量(mg)	A ₁	A ₂	A ₃	A ₄	A ₅	A _{平均}	RSD%
1	14.33	370328	370423	370316	370452	370080	370320	0.04
2	14.47	369944	369320				369632	0.12

单位质量响应值		RSD%	判断
25842.29	25544.71	0.82	数据可信



操作者:

日期: 2026-08-09

复核者:

未审阅版本



供试品溶液-2026032321批-pH6.8

时间 (分钟)	样品	A ₁	A ₂	A _{平均}	溶出量(%)	平均(%)	RSD%	累计溶 出量(%)	平均(%)	RSD%
5min	1	252529	-	252529	67.872	70.59	3.90	67.87	70.59	3.90
	2	267555	-	267555	71.911			71.91		
	3	272635	-	272635	73.276			73.28		
	4	250267	-	250267	67.264			67.26		
	5	274029	-	274029	73.651			73.65		
	6	258864	-	258864	69.575			69.57		
10min	1	303455	-	303455	81.560	84.04	2.86	81.67	84.16	2.86
	2	313505	-	313505	84.261			84.38		
	3	321306	-	321306	86.357			86.48		
	4	302077	-	302077	81.189			81.30		
	5	323814	-	323814	87.032			87.15		
	6	311958	-	311958	83.845			83.96		
15min	1	320551	-	320551	86.155	88.76	2.65	86.40	89.01	2.65
	2	328890	-	328890	88.396			88.66		
	3	337668	-	337668	90.755			91.02		
	4	320506	-	320506	86.142			86.39		
	5	341715	-	341715	91.843			92.11		
	6	332035	-	332035	89.241			89.50		
20min	1	327416	-	327416	88.000	90.76	2.77	88.39	91.17	2.78
	2	338052	-	338052	90.858			91.27		
	3	345631	-	345631	92.895			93.31		
	4	327095	-	327095	87.913			88.30		
	5	350166	-	350166	94.114			94.54		
	6	337840	-	337840	90.801			91.21		
30min	1	335693	-	335693	90.224	93.17	2.82	90.76	93.73	2.82
	2	346370	-	346370	93.094			93.65		
	3	355057	-	355057	95.429			96.00		
	4	336194	-	336194	90.359			90.90		
	5	359922	-	359922	96.736			97.31		
	6	346741	-	346741	93.194			93.75		
45min	1	339476	-	339476	91.241	94.59	2.76	91.93	95.30	2.76
	2	353398	-	353398	94.983			95.70		
	3	360652	-	360652	96.933			97.66		
	4	341931	-	341931	91.901			92.59		
	5	363670	-	363670	97.744			98.48		
	6	352495	-	352495	94.740			95.45		
60min	1	342541	-	342541	92.065	94.97	2.70	92.91	95.84	2.70
	2	353864	-	353864	95.108			95.98		
	3	361859	-	361859	97.257			98.15		
	4	342315	-	342315	92.004			92.85		
	5	365228	-	365228	98.162			99.06		
	6	354341	-	354341	95.236			96.11		
极限	1	343990	-	343990	92.454	95.43	2.84	93.45	96.45	2.84
	2	357159	-	357159	95.994			97.02		
	3	363567	-	363567	97.716			98.77		
	4	342896	-	342896	92.160			93.15		
	5	367735	-	367735	98.836			99.90		
	6	354959	-	354959	95.402			96.43		



操作者:

日期: 2026-08-09

复核者:

未审阅版本



艾托格列净片项目信息

介质体积(ml)	900	取样体积(ml)	1.5	补液体积(ml)	1.5
对照品批号	741-2407001-D	对照品来源	自制	对照品使用方法	直接使用
对照品含量(%)	99.4	对照品水分(%)	0	对照品稀释倍数	2000
标示量(mg)	5	供试品稀释倍数	1	系数	0.7719

对照品溶液

序号	称样量(mg)	A ₁	A ₂	A ₃	A ₄	A ₅	A _{平均}	RSD%
1	14.33	370233	370467	369796	370112	370155	370153	0.07
2	14.47	368027	368168				368098	0.03
单位质量响应值				RSD%	判断			
25830.64				1.09	数据可信			



操作者:

日期: 2026-08-09

复核者:

未审阅版本



供试品溶液-2026032421批-pH6.8

时间 (分钟)	样品	A ₁	A ₂	A _{平均}	溶出量(%)	平均(%)	RSD%	累计溶 出量(%)	平均(%)	RSD%
5min	1	264752	-	264752	71.323	69.63	1.68	71.32	69.63	1.68
	2	256004	-	256004	68.966			68.97		
	3	256754	-	256754	69.168			69.17		
	4	262940	-	262940	70.834			70.83		
	5	256529	-	256529	69.107			69.11		
	6	253814	-	253814	68.376			68.38		
10min	1	315102	-	315102	84.887	83.85	1.41	85.01	83.97	1.41
	2	311037	-	311037	83.791			83.91		
	3	311981	-	311981	84.046			84.16		
	4	314272	-	314272	84.663			84.78		
	5	302894	-	302894	81.598			81.71		
	6	312249	-	312249	84.118			84.23		
15min	1	332324	-	332324	89.526	88.74	1.28	89.79	89.00	1.28
	2	329392	-	329392	88.736			88.99		
	3	329313	-	329313	88.715			88.97		
	4	332745	-	332745	89.639			89.90		
	5	321349	-	321349	86.569			86.82		
	6	331338	-	331338	89.260			89.51		
20min	1	341214	-	341214	91.921	90.98	1.21	92.33	91.38	1.21
	2	337698	-	337698	90.974			91.38		
	3	337825	-	337825	91.008			91.41		
	4	339987	-	339987	91.590			92.00		
	5	329873	-	329873	88.866			89.26		
	6	339670	-	339670	91.505			91.91		
30min	1	349217	-	349217	94.077	93.44	1.19	94.64	94.00	1.19
	2	350420	-	350420	94.401			94.96		
	3	345136	-	345136	92.978			93.53		
	4	348160	-	348160	93.792			94.35		
	5	339283	-	339283	91.401			91.94		
	6	349008	-	349008	94.021			94.58		
45min	1	354039	-	354039	95.376	94.75	1.11	96.10	95.46	1.11
	2	355149	-	355149	95.675			96.39		
	3	349946	-	349946	94.273			94.98		
	4	352596	-	352596	94.987			95.70		
	5	344708	-	344708	92.862			93.56		
	6	353944	-	353944	95.350			96.06		
60min	1	353893	-	353893	95.337	95.12	1.32	96.22	95.99	1.31
	2	356994	-	356994	96.172			97.04		
	3	350233	-	350233	94.351			95.22		
	4	354744	-	354744	95.566			96.44		
	5	345205	-	345205	92.996			93.85		
	6	357423	-	357423	96.288			97.16		
极限	1	355201	-	355201	95.689	95.50	1.28	96.73	96.52	1.28
	2	357276	-	357276	96.248			97.28		
	3	351039	-	351039	94.568			95.59		
	4	356726	-	356726	96.100			97.13		
	5	347231	-	347231	93.542			94.55		
	6	359479	-	359479	96.841			97.87		



操作者:

日期: 2026-08-09

复核者:

未审阅版本



艾托格列净片项目信息

介质体积(ml)	900	取样体积(ml)	1.5	补液体积(ml)	1.5
对照品批号	741-2407001-D	对照品来源	自制	对照品使用方法	直接使用
对照品含量(%)	99.4	对照品水分(%)	0	对照品稀释倍数	2000
标示量(mg)	5	供试品稀释倍数	1	系数	0.7719

对照品溶液

序号	称样量(mg)	A ₁	A ₂	A ₃	A ₄	A ₅	A _{平均}	RSD%
1	14.33	367690	367419	367280	367549	367589	367505	0.05
2	14.47	367849	367985				367917	0.03
单位质量响应值			RSD%	判断				
25645.85			0.61	数据可信				



操作者:

日期: 2026-08-09

复核者:

未审阅版本



供试品溶液-2026032521批-pH6.8

时间 (分钟)	样品	A ₁	A ₂	A _{平均}	溶出量(%)	平均(%)	RSD%	累计溶 出量(%)	平均(%)	RSD%
5min	1	270429	-	270429	73.130	72.37	2.40	73.13	72.37	2.40
	2	268576	-	268576	72.629			72.63		
	3	271884	-	271884	73.524			73.52		
	4	259855	-	259855	70.271			70.27		
	5	275177	-	275177	74.414			74.41		
	6	259832	-	259832	70.265			70.26		
10min	1	320093	-	320093	86.561	84.82	2.06	86.68	84.94	2.06
	2	314555	-	314555	85.063			85.18		
	3	318101	-	318101	86.022			86.14		
	4	305659	-	305659	82.657			82.77		
	5	317858	-	317858	85.956			86.08		
	6	305694	-	305694	82.667			82.78		
15min	1	336480	-	336480	90.992	88.59	2.16	91.26	88.85	2.16
	2	327077	-	327077	88.449			88.71		
	3	332093	-	332093	89.806			90.07		
	4	319693	-	319693	86.453			86.71		
	5	331147	-	331147	89.550			89.82		
	6	318996	-	318996	86.264			86.52		
20min	1	344129	-	344129	93.061	90.45	2.11	93.48	90.86	2.11
	2	333457	-	333457	90.175			90.58		
	3	338090	-	338090	91.428			91.84		
	4	326501	-	326501	88.294			88.69		
	5	338148	-	338148	91.443			91.86		
	6	326462	-	326462	88.283			88.68		
30min	1	352309	-	352309	95.273	92.46	2.08	95.85	93.02	2.08
	2	341505	-	341505	92.351			92.91		
	3	344541	-	344541	93.172			93.74		
	4	334697	-	334697	90.510			91.06		
	5	345064	-	345064	93.313			93.88		
	6	333278	-	333278	90.126			90.67		
45min	1	358754	-	358754	97.016	93.89	2.08	97.75	94.60	2.08
	2	346151	-	346151	93.607			94.32		
	3	347013	-	347013	93.841			94.56		
	4	340547	-	340547	92.092			92.79		
	5	351451	-	351451	95.041			95.77		
	6	339223	-	339223	91.734			92.43		
60min	1	360409	-	360409	97.463	94.67	1.84	98.36	95.54	1.84
	2	348171	-	348171	94.154			95.02		
	3	350513	-	350513	94.787			95.67		
	4	344095	-	344095	93.051			93.90		
	5	353909	-	353909	95.705			96.59		
	6	343404	-	343404	92.865			93.71		
极限	1	360317	-	360317	97.438	95.03	1.63	98.49	96.06	1.63
	2	350329	-	350329	94.737			95.76		
	3	352649	-	352649	95.365			96.40		
	4	346638	-	346638	93.739			94.74		
	5	354205	-	354205	95.785			96.83		
	6	344282	-	344282	93.102			94.11		



操作者:

日期: 2026-08-09

复核者:

未审阅版本



SHIMADZU

LabSolutions


SMF-4160

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱温 : 35°C 波 长: 225nm
数据文件名 : RC\$SMF-4160 - 27-9/27-505-2 - zzp-2026032321p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx1-rj.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-4160 - SMF-4160-rcqx-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4160 - 20260508-FX276.lcb
样品瓶号 : 1-9
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2026/05/08 15:02:52 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2026/05/09 08:44:28 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 225nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图1 艾托格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026032321批-均一性1-pH6.8介质-篮法-100转
溶剂



SHIMADZU

LabSolutions


SMF-4160

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱温 : 35°C 波 长: 225nm
数据文件名 : RC\$SMF-4160 - 27-9/27-506-2 - zzp-2026032321p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx1-dz1-1.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-4160 - SMF-4160-rcqx-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4160 - 20260508-FX276.lcb
样品瓶号 : 1-18
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2026/05/08 15:06:17 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2026/05/09 08:44:35 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 225nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.618	370328	100.000	74669	6638	1.104	--
总计		370328	100.000	74669			

图2 艾托格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026032321批-均一性1-pH6.8介质-篮法-100转
对照品溶液-1-1



SHIMADZU

LabSolutions


SMF-4160

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱温 : 35°C 波 长: 225nm
数据文件名 : RC\$SMF-4160 - 27-9/27-507-2 - zzp-2026032321p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx1-dz1-2.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-4160 - SMF-4160-rcqx-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4160 - 20260508-FX276.lcb
样品瓶号 : 1-18
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2026/05/08 15:09:44 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2026/05/09 08:44:38 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 225nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.618	370423	100.000	74604	6649	1.101	--
总计		370423	100.000	74604			

图3 艾托格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026032321批-均一性1-pH6.8介质-篮法-100转
对照品溶液-1-2



SHIMADZU

LabSolutions


SMF-4160

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 35°C 波长: 225nm
数据文件名 : RC\$SMF-4160 - 27-9/27-508-2 - zzp-2026032321p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx1-dz1-3.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-4160 - SMF-4160-rcqx-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4160 - 20260508-FX276.lcb
样品瓶号 : 1-18
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2026/05/08 15:13:10 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2026/05/09 08:44:41 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 225nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.617	370316	100.000	74673	6633	1.102	--
总计		370316	100.000	74673			

图4 艾托格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026032321批-均一性1-pH6.8介质-篮法-100转
对照品溶液-1-3



SHIMADZU

LabSolutions


SMF-4160

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱温 : 35°C 波 长: 225nm
数据文件名 : RC\$SMF-4160 - 27-9/27-509-2 - zzp-2026032321p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx1-dz1-4.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-4160 - SMF-4160-rcqx-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4160 - 20260508-FX276.lcb
样品瓶号 : 1-18
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2026/05/08 15:16:35 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2026/05/09 08:44:43 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 225nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.617	370452	100.000	74614	6646	1.102	--
总计		370452	100.000	74614			

图5 艾托格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026032321批-均一性1-pH6.8介质-篮法-100转
对照品溶液-1-4



SHIMADZU

LabSolutions


SMF-4160

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱温 : 35°C 波 长: 225nm
数据文件名 : RC\$SMF-4160 - 27-9/27-510-2 - zzp-2026032321p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx1-dz1-5.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-4160 - SMF-4160-rcqx-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4160 - 20260508-FX276.lcb
样品瓶号 : 1-18
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2026/05/08 15:20:01 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2026/05/09 08:44:46 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 225nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.616	370080	100.000	74909	6644	1.102	--
总计		370080	100.000	74909			

图6 艾托格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026032321批-均一性1-pH6.8介质-篮法-100转
对照品溶液-1-5



SHIMADZU

LabSolutions


SMF-4160

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱温 : 35°C 波 长: 225nm
数据文件名 : RC\$SMF-4160 - 27-9/27-511-2 - zzp-2026032321p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx1-p1-5min.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-4160 - SMF-4160-rcqx-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4160 - 20260508-FX276.lcb
样品瓶号 : 1-1
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2026/05/08 15:23:26 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2026/05/09 08:44:49 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 225nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.631	252529	100.000	52210	6977	1.089	--
总计		252529	100.000	52210			

图7 艾托格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026032321批-均一性1-pH6.8介质-篮法-100转-5min-片1
供试品溶液-1



SHIMADZU

LabSolutions


SMF-4160

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 35°C 波长: 225nm
数据文件名 : RC\$SMF-4160 - 27-9/27-512-2 - zzp-2026032321p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx1-p2-5min.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-4160 - SMF-4160-rcqx-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4160 - 20260508-FX276.lcb
样品瓶号 : 1-10
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2026/05/08 15:26:51 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2026/05/09 08:44:51 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 225nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.630	267555	100.000	55348	6967	1.091	--
总计		267555	100.000	55348			

图8 艾托格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026032321批-均一性1-pH6.8介质-篮法-100转-5min-片2
供试品溶液-1



SHIMADZU

LabSolutions


SMF-4160

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 35°C 波长: 225nm
数据文件名 : RC\$SMF-4160 - 27-9/27-513-2 - zzp-2026032321p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx1-p3-5min.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-4160 - SMF-4160-rcqx-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4160 - 20260508-FX276.lcb
样品瓶号 : 1-19
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2026/05/08 15:30:16 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2026/05/09 08:44:53 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 225nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.629	272635	100.000	56320	6944	1.092	--
总计		272635	100.000	56320			

图9 艾托格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026032321批-均一性1-pH6.8介质-篮法-100转-5min-片3
供试品溶液-1



SHIMADZU

LabSolutions


SMF-4160

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱温 : 35°C 波 长: 225nm
数据文件名 : RC\$SMF-4160 - 27-9/27-514-2 - zzp-2026032321p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx1-p4-5min.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-4160 - SMF-4160-rcqx-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4160 - 20260508-FX276.lcb
样品瓶号 : 1-28
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2026/05/08 15:33:40 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2026/05/09 08:44:56 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 225nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.630	250267	100.000	51870	6986	1.092	--
总计		250267	100.000	51870			

图10 艾托格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026032321批-均一性1-pH6.8介质-篮法-100转-5min-片4
供试品溶液-1



SHIMADZU

LabSolutions


SMF-4160

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 35°C 波长: 225nm
数据文件名 : RC\$SMF-4160 - 27-9/27-515-2 - zzp-2026032321p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx1-p5-5min.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-4160 - SMF-4160-rcqx-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4160 - 20260508-FX276.lcb
样品瓶号 : 1-37
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2026/05/08 15:37:07 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2026/05/09 08:44:58 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 225nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.629	274029	100.000	56686	6966	1.092	--
总计		274029	100.000	56686			

图11 艾托格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026032321批-均一性1-pH6.8介质-篮法-100转-5min-片5
供试品溶液-1



SHIMADZU

LabSolutions


SMF-4160

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 35°C 波长: 225nm
数据文件名 : RC\$SMF-4160 - 27-9/27-516-2 - zzp-2026032321p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx1-p6-5min.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-4160 - SMF-4160-rcqx-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4160 - 20260508-FX276.lcb
样品瓶号 : 1-46
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2026/05/08 15:40:31 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2026/05/09 08:45:00 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 225nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.628	258864	100.000	53516	6971	1.092	--
总计		258864	100.000	53516			

图12 艾托格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026032321批-均一性1-pH6.8介质-篮法-100转-5min-片6
供试品溶液-1



SHIMADZU

LabSolutions


SMF-4160

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱温 : 35°C 波 长: 225nm
数据文件名 : RC\$SMF-4160 - 27-9/27-517-2 - zzp-2026032321p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx1-p1-10min.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-4160 - SMF-4160-rcqx-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4160 - 20260508-FX276.lcb
样品瓶号 : 1-2
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2026/05/08 15:43:55 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2026/05/09 08:45:03 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 225nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.626	303455	100.000	62496	6976	1.091	--
总计		303455	100.000	62496			

图13 艾托格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026032321批-均一性1-pH6.8介质-篮法-100转-10min-片1
供试品溶液-1



SHIMADZU

LabSolutions


SMF-4160

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱温 : 35°C 波 长: 225nm
数据文件名 : RC\$SMF-4160 - 27-9/27-518-2 - zzp-2026032321p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx1-p2-10min.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-4160 - SMF-4160-rcqx-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4160 - 20260508-FX276.lcb
样品瓶号 : 1-11
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2026/05/08 15:47:20 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2026/05/09 08:45:05 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 225nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.628	313505	100.000	64783	6971	1.090	--
总计		313505	100.000	64783			

图14 艾托格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026032321批-均一性1-pH6.8介质-篮法-100转-10min-片2
供试品溶液-1



SHIMADZU

LabSolutions


SMF-4160

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱温 : 35°C 波 长: 225nm
数据文件名 : RC\$SMF-4160 - 27-9/27-519-2 - zzp-2026032321p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx1-p3-10min.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-4160 - SMF-4160-rcqx-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4160 - 20260508-FX276.lcb
样品瓶号 : 1-20
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2026/05/08 15:50:44 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2026/05/09 08:45:08 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 225nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.628	321306	100.000	66433	6980	1.090	--
总计		321306	100.000	66433			

图15 艾托格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026032321批-均一性1-pH6.8介质-篮法-100转-10min-片3
供试品溶液-1



SHIMADZU

LabSolutions


SMF-4160

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 35°C 波长: 225nm
数据文件名 : RC\$SMF-4160 - 27-9/27-520-2 - zzp-2026032321p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx1-p4-10min.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-4160 - SMF-4160-rcqx-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4160 - 20260508-FX276.lcb
样品瓶号 : 1-29
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2026/05/08 15:54:10 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2026/05/09 08:45:10 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 225nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.627	302077	100.000	62257	6958	1.090	--
总计		302077	100.000	62257			

图16 艾托格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026032321批-均一性1-pH6.8介质-篮法-100转-10min-片4
供试品溶液-1


 SHIMADZU
LabSolutions SMF-4160

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱温 : 35°C 波 长: 225nm
数据文件名 : RC\$SMF-4160 - 27-9/27-521-2 - zzp-2026032321p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx1-p5-10min.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-4160 - SMF-4160-rcqx-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4160 - 20260508-FX276.lcb
样品瓶号 : 1-38
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2026/05/08 15:57:35 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2026/05/09 08:45:13 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 225nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.626	323814	100.000	66656	6969	1.091	--
总计		323814	100.000	66656			

图17 艾托格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026032321批-均一性1-pH6.8介质-篮法-100转-10min-片5
供试品溶液-1



SHIMADZU

LabSolutions


SMF-4160

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱温 : 35°C 波 长: 225nm
数据文件名 : RC\$SMF-4160 - 27-9/27-522-2 - zzp-2026032321p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx1-p6-10min.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-4160 - SMF-4160-rcqx-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4160 - 20260508-FX276.lcb
样品瓶号 : 1-47
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2026/05/08 16:00:59 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2026/05/09 08:45:15 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 225nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.627	311958	100.000	64174	6958	1.092	--
总计		311958	100.000	64174			

图18 艾托格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026032321批-均一性1-pH6.8介质-篮法-100转-10min-片6
供试品溶液-1



SHIMADZU

LabSolutions


SMF-4160

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱温 : 35°C 波 长: 225nm
数据文件名 : RC\$SMF-4160 - 27-9/27-523-2 - zzp-2026032321p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx1-p1-15min.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-4160 - SMF-4160-rcqx-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4160 - 20260508-FX276.lcb
样品瓶号 : 1-3
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2026/05/08 16:04:24 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2026/05/09 08:45:18 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 225nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.627	320551	100.000	65962	6962	1.091	--
总计		320551	100.000	65962			

图19 艾托格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026032321批-均一性1-pH6.8介质-篮法-100转-15min-片1
供试品溶液-1



SHIMADZU

LabSolutions


SMF-4160

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱温 : 35°C 波 长: 225nm
数据文件名 : RC\$SMF-4160 - 27-9/27-524-2 - zzp-2026032321p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx1-p2-15min.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-4160 - SMF-4160-rcqx-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4160 - 20260508-FX276.lcb
样品瓶号 : 1-12
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2026/05/08 16:07:49 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2026/05/09 08:45:20 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 225nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.626	328890	100.000	67638	6981	1.092	--
总计		328890	100.000	67638			

图20 艾托格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026032321批-均一性1-pH6.8介质-篮法-100转-15min-片2
供试品溶液-1



SHIMADZU

LabSolutions


SMF-4160

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 35°C 波长: 225nm
数据文件名 : RC\$SMF-4160 - 27-9/27-525-2 - zzp-2026032321p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx1-p3-15min.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-4160 - SMF-4160-rcqx-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4160 - 20260508-FX276.lcb
样品瓶号 : 1-21
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2026/05/08 16:11:14 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2026/05/09 08:45:23 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 225nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.627	337668	100.000	69669	6972	1.090	--
总计		337668	100.000	69669			

图21 艾托格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026032321批-均一性1-pH6.8介质-篮法-100转-15min-片3
供试品溶液-1



SHIMADZU

LabSolutions


SMF-4160

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱温 : 35°C 波 长: 225nm
数据文件名 : RC\$SMF-4160 - 27-9/27-526-2 - zzp-2026032321p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx1-p4-15min.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-4160 - SMF-4160-rcqx-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4160 - 20260508-FX276.lcb
样品瓶号 : 1-30
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2026/05/08 16:14:39 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2026/05/09 08:45:25 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 225nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.627	320506	100.000	66064	6970	1.091	--
总计		320506	100.000	66064			

图22 艾托格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026032321批-均一性1-pH6.8介质-篮法-100转-15min-片4
供试品溶液-1



SHIMADZU

LabSolutions


SMF-4160

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱温 : 35°C 波 长: 225nm
数据文件名 : RC\$SMF-4160 - 27-9/27-527-2 - zzp-2026032321p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx1-p5-15min.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-4160 - SMF-4160-rcqx-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4160 - 20260508-FX276.lcb
样品瓶号 : 1-39
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2026/05/08 16:18:04 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2026/05/09 08:45:27 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 225nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.626	341715	100.000	70287	6977	1.091	--
总计		341715	100.000	70287			

图23 艾托格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026032321批-均一性1-pH6.8介质-篮法-100转-15min-片5
供试品溶液-1



SHIMADZU

LabSolutions


SMF-4160

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱温 : 35°C 波 长: 225nm
数据文件名 : RC\$SMF-4160 - 27-9/27-528-2 - zzp-2026032321p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx1-p6-15min.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-4160 - SMF-4160-rcqx-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4160 - 20260508-FX276.lcb
样品瓶号 : 1-48
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2026/05/08 16:21:28 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2026/05/09 08:45:30 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 225nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.627	332035	100.000	68474	7005	1.090	--
总计		332035	100.000	68474			

图24 艾托格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026032321批-均一性1-pH6.8介质-篮法-100转-15min-片6
供试品溶液-1



SHIMADZU

LabSolutions


SMF-4160

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱温 : 35°C 波 长: 225nm
数据文件名 : RC\$SMF-4160 - 27-9/27-529-2 - zzp-2026032321p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx1-p1-20min.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-4160 - SMF-4160-rcqx-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4160 - 20260508-FX276.lcb
样品瓶号 : 1-4
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2026/05/08 16:24:53 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2026/05/09 08:45:32 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 225nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.626	327416	100.000	67273	6972	1.090	--
总计		327416	100.000	67273			

图25 艾托格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026032321批-均一性1-pH6.8介质-篮法-100转-20min-片1
供试品溶液-1



SHIMADZU

LabSolutions


SMF-4160

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱温 : 35°C 波 长: 225nm
数据文件名 : RC\$SMF-4160 - 27-9/27-530-2 - zzp-2026032321p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx1-p2-20min.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-4160 - SMF-4160-rcqx-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4160 - 20260508-FX276.lcb
样品瓶号 : 1-13
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2026/05/08 16:28:17 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2026/05/09 08:45:35 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 225nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.626	338052	100.000	69375	6967	1.091	--
总计		338052	100.000	69375			

图26 艾托格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026032321批-均一性1-pH6.8介质-篮法-100转-20min-片2
供试品溶液-1



SHIMADZU

LabSolutions


SMF-4160

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 35°C 波长: 225nm
数据文件名 : RC\$SMF-4160 - 27-9/27-531-2 - zzp-2026032321p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx1-p3-20min.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-4160 - SMF-4160-rcqx-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4160 - 20260508-FX276.lcb
样品瓶号 : 1-22
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2026/05/08 16:31:43 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2026/05/09 08:45:38 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 225nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.627	345631	100.000	71125	6973	1.091	--
总计		345631	100.000	71125			

图27 艾托格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026032321批-均一性1-pH6.8介质-篮法-100转-20min-片3
供试品溶液-1



SHIMADZU

LabSolutions


SMF-4160

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱温 : 35°C 波 长: 225nm
数据文件名 : RC\$SMF-4160 - 27-9/27-532-2 - zzp-2026032321p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx1-p4-20min.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-4160 - SMF-4160-rcqx-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4160 - 20260508-FX276.lcb
样品瓶号 : 1-31
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2026/05/08 16:35:08 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2026/05/09 08:45:41 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 225nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.627	327095	100.000	67358	6982	1.091	--
总计		327095	100.000	67358			

图28 艾托格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026032321批-均一性1-pH6.8介质-篮法-100转-20min-片4
供试品溶液-1



SHIMADZU

LabSolutions


SMF-4160

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱温 : 35°C 波 长: 225nm
数据文件名 : RC\$SMF-4160 - 27-9/27-533-2 - zzp-2026032321p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx1-p5-20min.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-4160 - SMF-4160-rcqx-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4160 - 20260508-FX276.lcb
样品瓶号 : 1-40
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2026/05/08 16:38:33 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2026/05/09 08:45:43 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 225nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.626	350166	100.000	71928	6977	1.090	--
总计		350166	100.000	71928			

图29 艾托格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026032321批-均一性1-pH6.8介质-篮法-100转-20min-片5
供试品溶液-1



SHIMADZU

LabSolutions


SMF-4160

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱温 : 35°C 波 长: 225nm
数据文件名 : RC\$SMF-4160 - 27-9/27-534-2 - zzp-2026032321p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx1-p6-20min.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-4160 - SMF-4160-rcqx-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4160 - 20260508-FX276.lcb
样品瓶号 : 1-49
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2026/05/08 16:41:59 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2026/05/09 08:45:46 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 225nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.626	337840	100.000	69325	6957	1.091	--
总计		337840	100.000	69325			

图30 艾托格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026032321批-均一性1-pH6.8介质-篮法-100转-20min-片6
供试品溶液-1



SHIMADZU

LabSolutions


SMF-4160

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱温 : 35°C 波 长: 225nm
数据文件名 : RC\$SMF-4160 - 27-9/27-535-2 - zzp-2026032321p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx1-p1-30min.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-4160 - SMF-4160-rcqx-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4160 - 20260508-FX276.lcb
样品瓶号 : 1-5
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2026/05/08 16:45:23 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2026/05/09 08:45:48 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 225nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.625	335693	100.000	68982	6962	1.090	--
总计		335693	100.000	68982			

图31 艾托格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026032321批-均一性1-pH6.8介质-篮法-100转-30min-片1
供试品溶液-1



SHIMADZU

LabSolutions


SMF-4160

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱温 : 35°C 波 长: 225nm
数据文件名 : RC\$SMF-4160 - 27-9/27-536-2 - zzp-2026032321p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx1-p2-30min.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-4160 - SMF-4160-rcqx-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4160 - 20260508-FX276.lcb
样品瓶号 : 1-14
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2026/05/08 16:48:49 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2026/05/09 08:45:50 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 225nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.625	346370	100.000	71242	6962	1.089	--
总计		346370	100.000	71242			

图32 艾托格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026032321批-均一性1-pH6.8介质-篮法-100转-30min-片2
供试品溶液-1



SHIMADZU

LabSolutions


SMF-4160

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱温 : 35°C 波 长: 225nm
数据文件名 : RC\$SMF-4160 - 27-9/27-537-2 - zzp-2026032321p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx1-p3-30min.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-4160 - SMF-4160-rcqx-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4160 - 20260508-FX276.lcb
样品瓶号 : 1-23
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2026/05/08 16:52:14 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2026/05/09 08:45:53 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 225nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.627	355057	100.000	73130	6981	1.089	--
总计		355057	100.000	73130			

图33 艾托格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026032321批-均一性1-pH6.8介质-篮法-100转-30min-片3
供试品溶液-1



SHIMADZU

LabSolutions


SMF-4160

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱温 : 35°C 波 长: 225nm
数据文件名 : RC\$SMF-4160 - 27-9/27-538-2 - zzp-2026032321p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx1-p4-30min.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-4160 - SMF-4160-rcqx-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4160 - 20260508-FX276.lcb
样品瓶号 : 1-32
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2026/05/08 16:55:39 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2026/05/09 08:45:55 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 225nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.626	336194	100.000	69037	6976	1.090	--
总计		336194	100.000	69037			

图34 艾托格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026032321批-均一性1-pH6.8介质-篮法-100转-30min-片4
供试品溶液-1



SHIMADZU

LabSolutions


SMF-4160

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱温 : 35°C 波 长: 225nm
数据文件名 : RC\$SMF-4160 - 27-9/27-539-2 - zzp-2026032321p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx1-p5-30min.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-4160 - SMF-4160-rcqx-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4160 - 20260508-FX276.lcb
样品瓶号 : 1-41
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2026/05/08 16:59:06 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2026/05/09 08:45:58 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 225nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.627	359922	100.000	74003	6967	1.089	--
总计		359922	100.000	74003			

图35 艾托格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026032321批-均一性1-pH6.8介质-篮法-100转-30min-片5
供试品溶液-1



SHIMADZU

LabSolutions


SMF-4160

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱温 : 35°C 波 长: 225nm
数据文件名 : RC\$SMF-4160 - 27-9/27-540-2 - zzp-2026032321p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx1-p6-30min.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-4160 - SMF-4160-rcqx-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4160 - 20260508-FX276.lcb
样品瓶号 : 1-50
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2026/05/08 17:02:31 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2026/05/09 08:46:00 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 225nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.626	346741	100.000	71317	6970	1.090	--
总计		346741	100.000	71317			

图36 艾托格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026032321批-均一性1-pH6.8介质-篮法-100转-30min-片6
供试品溶液-1



SHIMADZU

LabSolutions


SMF-4160

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱温 : 35°C 波 长: 225nm
数据文件名 : RC\$SMF-4160 - 27-9/27-541-2 - zzp-2026032321p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx1-p1-45min.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-4160 - SMF-4160-rcqx-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4160 - 20260508-FX276.lcb
样品瓶号 : 1-6
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2026/05/08 17:05:56 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2026/05/09 08:46:03 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 225nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.625	339476	100.000	69846	6968	1.090	--
总计		339476	100.000	69846			

图37 艾托格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026032321批-均一性1-pH6.8介质-篮法-100转-45min-片1
供试品溶液-1



SHIMADZU

LabSolutions


SMF-4160

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱温 : 35°C 波 长: 225nm
数据文件名 : RC\$SMF-4160 - 27-9/27-542-2 - zzp-2026032321p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx1-p2-45min.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-4160 - SMF-4160-rcqx-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4160 - 20260508-FX276.lcb
样品瓶号 : 1-15
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2026/05/08 17:09:21 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2026/05/09 08:46:05 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 225nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.626	353398	100.000	72454	6954	1.091	--
总计		353398	100.000	72454			

图38 艾托格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026032321批-均一性1-pH6.8介质-篮法-100转-45min-片2
供试品溶液-1



SHIMADZU

LabSolutions


SMF-4160

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱温 : 35°C 波 长: 225nm
数据文件名 : RC\$SMF-4160 - 27-9/27-543-2 - zzp-2026032321p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx1-p3-45min.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-4160 - SMF-4160-rcqx-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4160 - 20260508-FX276.lcb
样品瓶号 : 1-24
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2026/05/08 17:12:46 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2026/05/09 08:46:08 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 225nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.625	360652	100.000	74238	6947	1.092	--
总计		360652	100.000	74238			

图39 艾托格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026032321批-均一性1-pH6.8介质-篮法-100转-45min-片3
供试品溶液-1



SHIMADZU

LabSolutions


SMF-4160

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱温 : 35°C 波 长: 225nm
数据文件名 : RC\$SMF-4160 - 27-9/27-544-2 - zzp-2026032321p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx1-p4-45min.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-4160 - SMF-4160-rcqx-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4160 - 20260508-FX276.lcb
样品瓶号 : 1-33
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2026/05/08 17:16:10 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2026/05/09 08:46:10 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 225nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.627	341931	100.000	70422	6964	1.091	--
总计		341931	100.000	70422			

图40 艾托格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026032321批-均一性1-pH6.8介质-篮法-100转-45min-片4
供试品溶液-1



SHIMADZU

LabSolutions


SMF-4160

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 35°C 波长: 225nm
数据文件名 : RC\$SMF-4160 - 27-9/27-545-2 - zzp-2026032321p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx1-p5-45min.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-4160 - SMF-4160-rcqx-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4160 - 20260508-FX276.lcb
样品瓶号 : 1-42
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2026/05/08 17:19:37 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2026/05/09 08:46:12 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 225nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.626	363670	100.000	74656	6959	1.091	--
总计		363670	100.000	74656			

图41 艾托格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026032321批-均一性1-pH6.8介质-篮法-100转-45min-片5
供试品溶液-1



SHIMADZU

LabSolutions


SMF-4160

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱温 : 35°C 波 长: 225nm
数据文件名 : RC\$SMF-4160 - 27-9/27-546-2 - zzp-2026032321p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx1-p6-45min.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-4160 - SMF-4160-rcqx-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4160 - 20260508-FX276.lcb
样品瓶号 : 1-51
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2026/05/08 17:23:02 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2026/05/09 08:46:15 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 225nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.626	352495	100.000	72450	6958	1.092	--
总计		352495	100.000	72450			

图42 艾托格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026032321批-均一性1-pH6.8介质-篮法-100转-45min-片6
供试品溶液-1



SHIMADZU

LabSolutions


SMF-4160

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱温 : 35°C 波 长: 225nm
数据文件名 : RC\$SMF-4160 - 27-9/27-547-2 - zzp-2026032321p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx1-p1-60min.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-4160 - SMF-4160-rcqx-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4160 - 20260508-FX276.lcb
样品瓶号 : 1-7
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2026/05/08 17:26:27 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2026/05/09 08:46:17 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 225nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.626	342541	100.000	70344	6958	1.092	--
总计		342541	100.000	70344			

图43 艾托格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026032321批-均一性1-pH6.8介质-篮法-100转-60min-片1
供试品溶液-1



SHIMADZU

LabSolutions


SMF-4160

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱温 : 35°C 波 长: 225nm
数据文件名 : RC\$SMF-4160 - 27-9/27-548-2 - zzp-2026032321p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx1-p2-60min.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-4160 - SMF-4160-rcqx-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4160 - 20260508-FX276.lcb
样品瓶号 : 1-16
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2026/05/08 17:29:52 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2026/05/09 08:46:20 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 225nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.625	353864	100.000	72701	6958	1.091	--
总计		353864	100.000	72701			

图44 艾托格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026032321批-均一性1-pH6.8介质-篮法-100转-60min-片2
供试品溶液-1



SHIMADZU

LabSolutions


SMF-4160

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱温 : 35°C 波 长: 225nm
数据文件名 : RC\$SMF-4160 - 27-9/27-549-2 - zzp-2026032321p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx1-p3-60min.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-4160 - SMF-4160-rcqx-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4160 - 20260508-FX276.lcb
样品瓶号 : 1-25
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2026/05/08 17:33:17 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2026/05/09 08:46:22 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 225nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.625	361859	100.000	74351	6960	1.091	--
总计		361859	100.000	74351			

图45 艾托格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026032321批-均一性1-pH6.8介质-篮法-100转-60min-片3
供试品溶液-1


 SHIMADZU
LabSolutions **SMF-4160**

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱温 : 35°C 波 长: 225nm
数据文件名 : RC\$SMF-4160 - 27-9/27-550-2 - zzp-2026032321p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx1-p4-60min.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-4160 - SMF-4160-rcqx-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4160 - 20260508-FX276.lcb
样品瓶号 : 1-34
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2026/05/08 17:36:42 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2026/05/09 08:46:25 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 225nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.625	342315	100.000	70478	6968	1.092	--
总计		342315	100.000	70478			

图46 艾托格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026032321批-均一性1-pH6.8介质-篮法-100转-60min-片4
供试品溶液-1



SHIMADZU

LabSolutions


SMF-4160

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱温 : 35°C 波 长: 225nm
数据文件名 : RC\$SMF-4160 - 27-9/27-551-2 - zzp-2026032321p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx1-p5-60min.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-4160 - SMF-4160-rcqx-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4160 - 20260508-FX276.lcb
样品瓶号 : 1-43
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2026/05/08 17:40:07 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2026/05/09 08:46:27 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 225nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.626	365228	100.000	74975	6961	1.091	--
总计		365228	100.000	74975			

图47 艾托格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026032321批-均一性1-pH6.8介质-篮法-100转-60min-片5
供试品溶液-1



SHIMADZU

LabSolutions


SMF-4160

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱温 : 35°C 波 长: 225nm
数据文件名 : RC\$SMF-4160 - 27-9/27-552-2 - zzp-2026032321p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx1-p6-60min.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-4160 - SMF-4160-rcqx-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4160 - 20260508-FX276.lcb
样品瓶号 : 1-52
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2026/05/08 17:43:32 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2026/05/09 08:46:30 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 225nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.625	354341	100.000	72982	6968	1.092	--
总计		354341	100.000	72982			

图48 艾托格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026032321批-均一性1-pH6.8介质-篮法-100转-60min-片6
供试品溶液-1



SHIMADZU LabSolutions SMF-4160

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)

柱温 : 35°C

数据文件名 : RC\$SMF-4160 - 27-9/27-553-2 - zzp-2026032321p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx1-p1-jxzs.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4160 - SMF-4160-rcqx-FX276.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4160 - 20260508-FX276.lcb

样品瓶号 : 1-8

进样体积 : 50 μl

进样时间 : 2026/05/08 17:46:58

处理时间(V2) : 2026/05/09 08:46:32

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 2.0ml/min


波 长: 225nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 225nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.626	343990	100.000	70624	6965	1.093	--
总计		343990	100.000	70624			

图49 艾托格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026032321批-均一性1-pH6.8介质-篮法-100转-极限转速-片1
供试品溶液-1



SHIMADZU

LabSolutions


SMF-4160

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱温 : 35°C 波 长: 225nm
数据文件名 : RC\$SMF-4160 - 27-9/27-554-2 - zzp-2026032321p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx1-p2-jxzs.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-4160 - SMF-4160-rcqx-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4160 - 20260508-FX276.lcb
样品瓶号 : 1-17
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2026/05/08 17:50:23 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2026/05/09 08:46:35 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 225nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.626	357159	100.000	73281	6965	1.092	--
总计		357159	100.000	73281			

图50 艾托格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026032321批-均一性1-pH6.8介质-篮法-100转-极限转速-片2
供试品溶液-1



SHIMADZU

LabSolutions


SMF-4160

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱温 : 35°C 波 长: 225nm
数据文件名 : RC\$SMF-4160 - 27-9/27-555-2 - zzp-2026032321p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx1-p3-jxzs.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-4160 - SMF-4160-rcqx-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4160 - 20260508-FX276.lcb
样品瓶号 : 1-26
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2026/05/08 17:53:50 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2026/05/09 08:46:37 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 225nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.626	363567	100.000	74710	6971	1.091	--
总计		363567	100.000	74710			

图51 艾托格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026032321批-均一性1-pH6.8介质-篮法-100转-极限转速-片3
供试品溶液-1



SHIMADZU

LabSolutions


SMF-4160

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱温 : 35°C 波 长: 225nm
数据文件名 : RC\$SMF-4160 - 27-9/27-556-2 - zzp-2026032321p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx1-p4-jxzs.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-4160 - SMF-4160-rcqx-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4160 - 20260508-FX276.lcb
样品瓶号 : 1-35
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2026/05/08 17:57:15 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2026/05/09 08:46:39 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 225nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.626	342896	100.000	70458	6964	1.091	--
总计		342896	100.000	70458			

图52 艾托格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026032321批-均一性1-pH6.8介质-篮法-100转-极限转速-片4
供试品溶液-1



SHIMADZU

LabSolutions


SMF-4160

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱温 : 35°C 波 长: 225nm
数据文件名 : RC\$SMF-4160 - 27-9/27-557-2 - zzp-2026032321p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx1-p5-jxzs.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-4160 - SMF-4160-rcqx-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4160 - 20260508-FX276.lcb
样品瓶号 : 1-44
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2026/05/08 18:00:41 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2026/05/09 08:46:42 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 225nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.626	367735	100.000	75457	6957	1.092	--
总计		367735	100.000	75457			

图53 艾托格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026032321批-均一性1-pH6.8介质-篮法-100转-极限转速-片5
供试品溶液-1



SHIMADZU

LabSolutions


SMF-4160

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱温 : 35°C 波 长: 225nm
数据文件名 : RC\$SMF-4160 - 27-9/27-558-2 - zzp-2026032321p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx1-p6-jxzs.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-4160 - SMF-4160-rcqx-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4160 - 20260508-FX276.lcb
样品瓶号 : 1-53
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2026/05/08 18:04:07 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2026/05/09 08:46:44 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 225nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.625	354959	100.000	72933	6951	1.091	--
总计		354959	100.000	72933			

图54 艾托格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026032321批-均一性1-pH6.8介质-篮法-100转-极限转速-片6
供试品溶液-1



SHIMADZU

LabSolutions


SMF-4160

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 35°C 波长: 225nm
数据文件名 : RC\$SMF-4160 - 27-9/27-559-2 - zzp-2026032321p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx1-dz2-1.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-4160 - SMF-4160-rcqx-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4160 - 20260508-FX276.lcb
样品瓶号 : 1-27
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2026/05/08 18:07:33 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2026/05/09 08:46:47 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 225nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.611	369944	100.000	74991	6641	1.104	--
总计		369944	100.000	74991			

图55 艾托格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026032321批-均一性1-pH6.8介质-篮法-100转
对照品溶液-2-1



SHIMADZU

LabSolutions


SMF-4160

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱温 : 35°C 波 长: 225nm
数据文件名 : RC\$SMF-4160 - 27-9/27-560-2 - zzp-2026032321p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx1-dz2-2.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-4160 - SMF-4160-rcqx-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4160 - 20260508-FX276.lcb
样品瓶号 : 1-27
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2026/05/08 18:10:58 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2026/05/09 08:46:49 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 225nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.610	369320	100.000	74466	6621	1.105	--
总计		369320	100.000	74466			

图56 艾托格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026032321批-均一性1-pH6.8介质-篮法-100转
对照品溶液-2-2



SHIMADZU

LabSolutions


SMF-4160

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱温 : 35°C 波 长: 225nm
数据文件名 : RC\$SMF-4160 - 27-9/27-561-2 - zzp-2026032421p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx1-rj.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-4160 - SMF-4160-rcqx-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4160 - 20260508-FX276.lcb
样品瓶号 : 2-9
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2026/05/08 18:14:25 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2026/05/09 08:46:51 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 225nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图57 艾托格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026032421批-均一性1-pH6.8介质-篮法-100转
溶剂



SHIMADZU

LabSolutions


SMF-4160

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱温 : 35°C 波 长: 225nm
数据文件名 : RC\$SMF-4160 - 27-9/27-562-2 - zzp-2026032421p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx1-dz1-1.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-4160 - SMF-4160-rcqx-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4160 - 20260508-FX276.lcb
样品瓶号 : 2-18
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2026/05/08 18:17:51 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2026/05/09 08:46:54 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 225nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.609	370233	100.000	74678	6634	1.104	--
总计		370233	100.000	74678			

图58 艾托格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026032421批-均一性1-pH6.8介质-篮法-100转
对照品溶液-1-1



SHIMADZU

LabSolutions


SMF-4160

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱温 : 35°C 波 长: 225nm
数据文件名 : RC\$SMF-4160 - 27-9/27-563-2 - zzp-2026032421p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx1-dz1-2.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-4160 - SMF-4160-rcqx-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4160 - 20260508-FX276.lcb
样品瓶号 : 2-18
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2026/05/08 18:21:19 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2026/05/09 08:46:56 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 225nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.610	370467	100.000	74906	6635	1.102	--
总计		370467	100.000	74906			

图59 艾托格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026032421批-均一性1-pH6.8介质-篮法-100转
对照品溶液-1-2



SHIMADZU

LabSolutions


SMF-4160

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱温 : 35°C 波 长: 225nm
数据文件名 : RC\$SMF-4160 - 27-9/27-564-2 - zzp-2026032421p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx1-dz1-3.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-4160 - SMF-4160-rcqx-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4160 - 20260508-FX276.lcb
样品瓶号 : 2-18
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2026/05/08 18:24:46 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2026/05/09 08:46:59 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 225nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.609	369796	100.000	74684	6653	1.103	--
总计		369796	100.000	74684			

图60 艾托格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026032421批-均一性1-pH6.8介质-篮法-100转
对照品溶液-1-3



SHIMADZU

LabSolutions


SMF-4160

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 35°C 波长: 225nm
数据文件名 : RC\$SMF-4160 - 27-9/27-565-2 - zzp-2026032421p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx1-dz1-4.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-4160 - SMF-4160-rcqx-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4160 - 20260508-FX276.lcb
样品瓶号 : 2-18
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2026/05/08 18:28:13 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2026/05/09 08:47:01 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 225nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.610	370112	100.000	75035	6662	1.102	--
总计		370112	100.000	75035			

图61 艾托格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026032421批-均一性1-pH6.8介质-篮法-100转
对照品溶液-1-4



SHIMADZU

LabSolutions


SMF-4160

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱温 : 35°C 波 长: 225nm
数据文件名 : RC\$SMF-4160 - 27-9/27-566-2 - zzp-2026032421p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx1-dz1-5.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-4160 - SMF-4160-rcqx-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4160 - 20260508-FX276.lcb
样品瓶号 : 2-18
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2026/05/08 18:31:40 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2026/05/09 08:47:03 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 225nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.610	370155	100.000	74911	6662	1.102	--
总计		370155	100.000	74911			

图62 艾托格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026032421批-均一性1-pH6.8介质-篮法-100转
对照品溶液-1-5



SHIMADZU

LabSolutions


SMF-4160

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱温 : 35°C 波 长: 225nm
数据文件名 : RC\$SMF-4160 - 27-9/27-567-2 - zzp-2026032421p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx1-p1-5min.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-4160 - SMF-4160-rcqx-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4160 - 20260508-FX276.lcb
样品瓶号 : 2-1
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2026/05/08 18:35:05 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2026/05/09 08:47:06 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 225nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.624	264752	100.000	54720	6950	1.091	--
总计		264752	100.000	54720			

图63 艾托格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026032421批-均一性1-pH6.8介质-篮法-100转-5min-片1
供试品溶液-1



SHIMADZU

LabSolutions


SMF-4160

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 35°C 波长: 225nm
数据文件名 : RC\$SMF-4160 - 27-9/27-568-2 - zzp-2026032421p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx1-p2-5min.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-4160 - SMF-4160-rcqx-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4160 - 20260508-FX276.lcb
样品瓶号 : 2-10
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2026/05/08 18:38:32 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2026/05/09 08:47:08 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 225nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.624	256004	100.000	52926	6956	1.092	--
总计		256004	100.000	52926			

图64 艾托格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026032421批-均一性1-pH6.8介质-篮法-100转-5min-片2
供试品溶液-1



SHIMADZU

LabSolutions


SMF-4160

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 35°C 波长: 225nm
数据文件名 : RC\$SMF-4160 - 27-9/27-569-2 - zzp-2026032421p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx1-p3-5min.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-4160 - SMF-4160-rcqx-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4160 - 20260508-FX276.lcb
样品瓶号 : 2-19
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2026/05/08 18:41:57 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2026/05/09 08:47:11 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 225nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.622	256754	100.000	53198	6954	1.091	--
总计		256754	100.000	53198			

图65 艾托格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026032421批-均一性1-pH6.8介质-篮法-100转-5min-片3
供试品溶液-1



SHIMADZU

LabSolutions


SMF-4160

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱温 : 35°C 波 长: 225nm
数据文件名 : RC\$SMF-4160 - 27-9/27-570-2 - zzp-2026032421p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx1-p4-5min.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-4160 - SMF-4160-rcqx-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4160 - 20260508-FX276.lcb
样品瓶号 : 2-28
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2026/05/08 18:45:23 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2026/05/09 08:47:13 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 225nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.624	262940	100.000	54386	6961	1.092	--
总计		262940	100.000	54386			

图66 艾托格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026032421批-均一性1-pH6.8介质-篮法-100转-5min-片4
供试品溶液-1



SHIMADZU

LabSolutions


SMF-4160

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱温 : 35°C 波 长: 225nm
数据文件名 : RC\$SMF-4160 - 27-9/27-571-2 - zzp-2026032421p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx1-p5-5min.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-4160 - SMF-4160-rcqx-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4160 - 20260508-FX276.lcb
样品瓶号 : 2-37
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2026/05/08 18:48:49 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2026/05/09 08:47:16 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 225nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.622	256529	100.000	53140	6950	1.091	--
总计		256529	100.000	53140			

图67 艾托格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026032421批-均一性1-pH6.8介质-篮法-100转-5min-片5
供试品溶液-1



SHIMADZU

LabSolutions


SMF-4160

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱温 : 35°C 波 长: 225nm
数据文件名 : RC\$SMF-4160 - 27-9/27-572-2 - zzp-2026032421p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx1-p6-5min.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-4160 - SMF-4160-rcqx-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4160 - 20260508-FX276.lcb
样品瓶号 : 2-46
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2026/05/08 18:52:15 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2026/05/09 08:47:18 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 225nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.623	253814	100.000	52536	6955	1.091	--
总计		253814	100.000	52536			

图68 艾托格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026032421批-均一性1-pH6.8介质-篮法-100转-5min-片6
供试品溶液-1



SHIMADZU

LabSolutions


SMF-4160

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱温 : 35°C 波 长: 225nm
数据文件名 : RC\$SMF-4160 - 27-9/27-573-2 - zzp-2026032421p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx1-p1-10min.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-4160 - SMF-4160-rcqx-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4160 - 20260508-FX276.lcb
样品瓶号 : 2-2
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2026/05/08 18:55:41 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2026/05/09 08:47:20 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 225nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.623	315102	100.000	65252	6954	1.090	--
总计		315102	100.000	65252			

图69 艾托格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026032421批-均一性1-pH6.8介质-篮法-100转-10min-片1
供试品溶液-1



SHIMADZU

LabSolutions


SMF-4160

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱温 : 35°C 波 长: 225nm
数据文件名 : RC\$SMF-4160 - 27-9/27-574-2 - zzp-2026032421p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx1-p2-10min.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-4160 - SMF-4160-rcqx-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4160 - 20260508-FX276.lcb
样品瓶号 : 2-11
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2026/05/08 18:59:07 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2026/05/09 08:47:23 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 225nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.623	311037	100.000	64331	6938	1.091	--
总计		311037	100.000	64331			

图70 艾托格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026032421批-均一性1-pH6.8介质-篮法-100转-10min-片2
供试品溶液-1



SHIMADZU

LabSolutions


SMF-4160

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱温 : 35°C 波 长: 225nm
数据文件名 : RC\$SMF-4160 - 27-9/27-575-2 - zzp-2026032421p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx1-p3-10min.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-4160 - SMF-4160-rcqx-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4160 - 20260508-FX276.lcb
样品瓶号 : 2-20
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2026/05/08 19:02:32 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2026/05/09 08:47:25 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 225nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.623	311981	100.000	64539	6944	1.089	--
总计		311981	100.000	64539			

图71 艾托格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026032421批-均一性1-pH6.8介质-篮法-100转-10min-片3
供试品溶液-1



SHIMADZU

LabSolutions


SMF-4160

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱温 : 35°C 波 长: 225nm
数据文件名 : RC\$SMF-4160 - 27-9/27-576-2 - zzp-2026032421p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx1-p4-10min.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-4160 - SMF-4160-rcqx-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4160 - 20260508-FX276.lcb
样品瓶号 : 2-29
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2026/05/08 19:05:59 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2026/05/09 08:47:28 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 225nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.624	314272	100.000	64946	6955	1.090	--
总计		314272	100.000	64946			

图72 艾托格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026032421批-均一性1-pH6.8介质-篮法-100转-10min-片4
供试品溶液-1



SHIMADZU

LabSolutions


SMF-4160

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱温 : 35°C 波 长: 225nm
数据文件名 : RC\$SMF-4160 - 27-9/27-577-2 - zzp-2026032421p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx1-p5-10min.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-4160 - SMF-4160-rcqx-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4160 - 20260508-FX276.lcb
样品瓶号 : 2-38
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2026/05/08 19:09:24 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2026/05/09 08:47:30 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 225nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.623	302894	100.000	62612	6953	1.090	--
总计		302894	100.000	62612			

图73 艾托格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026032421批-均一性1-pH6.8介质-篮法-100转-10min-片5
供试品溶液-1



SHIMADZU

LabSolutions


SMF-4160

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱温 : 35°C 波 长: 225nm
数据文件名 : RC\$SMF-4160 - 27-9/27-578-2 - zzp-2026032421p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx1-p6-10min.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-4160 - SMF-4160-rcqx-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4160 - 20260508-FX276.lcb
样品瓶号 : 2-47
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2026/05/08 19:12:50 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2026/05/09 08:47:32 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 225nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.623	312249	100.000	64545	6932	1.090	--
总计		312249	100.000	64545			

图74 艾托格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026032421批-均一性1-pH6.8介质-篮法-100转-10min-片6
供试品溶液-1



SHIMADZU

LabSolutions


SMF-4160

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱温 : 35°C 波 长: 225nm
数据文件名 : RC\$SMF-4160 - 27-9/27-579-2 - zzp-2026032421p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx1-p1-15min.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-4160 - SMF-4160-rcqx-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4160 - 20260508-FX276.lcb
样品瓶号 : 2-3
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2026/05/08 19:16:16 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2026/05/09 08:47:35 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 225nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.624	332324	100.000	68481	6941	1.092	--
总计		332324	100.000	68481			

图75 艾托格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026032421批-均一性1-pH6.8介质-篮法-100转-15min-片1
供试品溶液-1



SHIMADZU

LabSolutions


SMF-4160

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 35°C 波长: 225nm
数据文件名 : RC\$SMF-4160 - 27-9/27-580-2 - zzp-2026032421p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx1-p2-15min.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-4160 - SMF-4160-rcqx-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4160 - 20260508-FX276.lcb
样品瓶号 : 2-12
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2026/05/08 19:19:42 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2026/05/09 08:47:38 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 225nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.624	329392	100.000	68027	6941	1.090	--
总计		329392	100.000	68027			

图76 艾托格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026032421批-均一性1-pH6.8介质-篮法-100转-15min-片2
供试品溶液-1



SHIMADZU

LabSolutions


SMF-4160

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱温 : 35°C 波 长: 225nm
数据文件名 : RC\$SMF-4160 - 27-9/27-581-2 - zzp-2026032421p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx1-p3-15min.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-4160 - SMF-4160-rcqx-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4160 - 20260508-FX276.lcb
样品瓶号 : 2-21
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2026/05/08 19:23:07 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2026/05/09 08:47:40 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 225nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.624	329313	100.000	68018	6947	1.090	--
总计		329313	100.000	68018			

图77 艾托格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026032421批-均一性1-pH6.8介质-篮法-100转-15min-片3
供试品溶液-1



SHIMADZU

LabSolutions


SMF-4160

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱温 : 35°C 波 长: 225nm
数据文件名 : RC\$SMF-4160 - 27-9/27-582-2 - zzp-2026032421p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx1-p4-15min.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-4160 - SMF-4160-rcqx-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4160 - 20260508-FX276.lcb
样品瓶号 : 2-30
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2026/05/08 19:26:33 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2026/05/09 08:47:43 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 225nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.624	332745	100.000	68626	6933	1.091	--
总计		332745	100.000	68626			

图78 艾托格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026032421批-均一性1-pH6.8介质-篮法-100转-15min-片4
供试品溶液-1



SHIMADZU

LabSolutions


SMF-4160

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 35°C 波长: 225nm
数据文件名 : RC\$SMF-4160 - 27-9/27-583-2 - zzp-2026032421p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx1-p5-15min.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-4160 - SMF-4160-rcqx-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4160 - 20260508-FX276.lcb
样品瓶号 : 2-39
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2026/05/08 19:29:59 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2026/05/09 08:47:45 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 225nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.623	321349	100.000	66403	6926	1.090	--
总计		321349	100.000	66403			

图79 艾托格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026032421批-均一性1-pH6.8介质-篮法-100转-15min-片5
供试品溶液-1



SHIMADZU

LabSolutions


SMF-4160

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱温 : 35°C 波 长: 225nm
数据文件名 : RC\$SMF-4160 - 27-9/27-584-2 - zzp-2026032421p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx1-p6-15min.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-4160 - SMF-4160-rcqx-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4160 - 20260508-FX276.lcb
样品瓶号 : 2-48
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2026/05/08 19:33:25 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2026/05/09 08:47:48 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 225nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.623	331338	100.000	68413	6935	1.090	--
总计		331338	100.000	68413			

图80 艾托格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026032421批-均一性1-pH6.8介质-篮法-100转-15min-片6
供试品溶液-1



SHIMADZU

LabSolutions


SMF-4160

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱温 : 35°C 波 长: 225nm
数据文件名 : RC\$SMF-4160 - 27-9/27-585-2 - zzp-2026032421p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx1-p1-20min.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-4160 - SMF-4160-rcqx-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4160 - 20260508-FX276.lcb
样品瓶号 : 2-4
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2026/05/08 19:36:52 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2026/05/09 08:47:50 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 225nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.623	341214	100.000	70426	6936	1.091	--
总计		341214	100.000	70426			

图81 艾托格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026032421批-均一性1-pH6.8介质-篮法-100转-20min-片1
供试品溶液-1



SHIMADZU

LabSolutions


SMF-4160

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱温 : 35°C 波 长: 225nm
数据文件名 : RC\$SMF-4160 - 27-9/27-586-2 - zzp-2026032421p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx1-p2-20min.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-4160 - SMF-4160-rcqx-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4160 - 20260508-FX276.lcb
样品瓶号 : 2-13
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2026/05/08 19:40:18 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2026/05/09 08:47:52 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 225nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.624	337698	100.000	69645	6933	1.091	--
总计		337698	100.000	69645			

图82 艾托格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026032421批-均一性1-pH6.8介质-篮法-100转-20min-片2
供试品溶液-1



SHIMADZU

LabSolutions


SMF-4160

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱温 : 35°C 波 长: 225nm
数据文件名 : RC\$SMF-4160 - 27-9/27-587-2 - zzp-2026032421p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx1-p3-20min.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-4160 - SMF-4160-rcqx-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4160 - 20260508-FX276.lcb
样品瓶号 : 2-22
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2026/05/08 19:43:45 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2026/05/09 08:47:55 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 225nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.623	337825	100.000	69808	6947	1.090	--
总计		337825	100.000	69808			

图83 艾托格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026032421批-均一性1-pH6.8介质-篮法-100转-20min-片3
供试品溶液-1



SHIMADZU

LabSolutions


SMF-4160

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱温 : 35°C 波 长: 225nm
数据文件名 : RC\$SMF-4160 - 27-9/27-588-2 - zzp-2026032421p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx1-p4-20min.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-4160 - SMF-4160-rcqx-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4160 - 20260508-FX276.lcb
样品瓶号 : 2-31
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2026/05/08 19:47:12 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2026/05/09 08:47:57 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 225nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.624	339987	100.000	70072	6934	1.091	--
总计		339987	100.000	70072			

图84 艾托格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026032421批-均一性1-pH6.8介质-篮法-100转-20min-片4
供试品溶液-1



SHIMADZU

LabSolutions


SMF-4160

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱温 : 35°C 波 长: 225nm
数据文件名 : RC\$SMF-4160 - 27-9/27-589-2 - zzp-2026032421p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx1-p5-20min.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-4160 - SMF-4160-rcqx-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4160 - 20260508-FX276.lcb
样品瓶号 : 2-40
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2026/05/08 19:50:38 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2026/05/09 08:48:00 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 225nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.623	329873	100.000	68190	6954	1.090	--
总计		329873	100.000	68190			

图85 艾托格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026032421批-均一性1-pH6.8介质-篮法-100转-20min-片5
供试品溶液-1



SHIMADZU

LabSolutions


SMF-4160

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱温 : 35°C 波 长: 225nm
数据文件名 : RC\$SMF-4160 - 27-9/27-590-2 - zzp-2026032421p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx1-p6-20min.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-4160 - SMF-4160-rcqx-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4160 - 20260508-FX276.lcb
样品瓶号 : 2-49
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2026/05/08 19:54:04 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2026/05/09 08:48:02 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 225nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.623	339670	100.000	70181	6931	1.089	--
总计		339670	100.000	70181			

图86 艾托格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026032421批-均一性1-pH6.8介质-篮法-100转-20min-片6
供试品溶液-1



SHIMADZU

LabSolutions


SMF-4160

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱温 : 35°C 波 长: 225nm
数据文件名 : RC\$SMF-4160 - 27-9/27-591-2 - zzp-2026032421p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx1-p1-30min.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-4160 - SMF-4160-rcqx-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4160 - 20260508-FX276.lcb
样品瓶号 : 2-5
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2026/05/08 19:57:30 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2026/05/09 08:48:04 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 225nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.624	349217	100.000	72006	6935	1.089	--
总计		349217	100.000	72006			

图87 艾托格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026032421批-均一性1-pH6.8介质-篮法-100转-30min-片1
供试品溶液-1



SHIMADZU

LabSolutions


SMF-4160

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱温 : 35°C 波 长: 225nm
数据文件名 : RC\$SMF-4160 - 27-9/27-592-2 - zzp-2026032421p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx1-p2-30min.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-4160 - SMF-4160-rcqx-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4160 - 20260508-FX276.lcb
样品瓶号 : 2-14
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2026/05/08 20:00:56 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2026/05/09 08:48:07 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 225nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.622	350420	100.000	72452	6930	1.090	--
总计		350420	100.000	72452			

图88 艾托格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026032421批-均一性1-pH6.8介质-篮法-100转-30min-片2
供试品溶液-1



SHIMADZU

LabSolutions


SMF-4160

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱温 : 35°C 波 长: 225nm
数据文件名 : RC\$SMF-4160 - 27-9/27-593-2 - zzp-2026032421p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx1-p3-30min.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-4160 - SMF-4160-rcqx-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4160 - 20260508-FX276.lcb
样品瓶号 : 2-23
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2026/05/08 20:04:22 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2026/05/09 08:48:09 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 225nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.623	345136	100.000	71361	6933	1.090	--
总计		345136	100.000	71361			

图89 艾托格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026032421批-均一性1-pH6.8介质-篮法-100转-30min-片3
供试品溶液-1



SHIMADZU

LabSolutions


SMF-4160

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 35°C 波长: 225nm
数据文件名 : RC\$SMF-4160 - 27-9/27-594-2 - zzp-2026032421p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx1-p4-30min.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-4160 - SMF-4160-rcqx-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4160 - 20260508-FX276.lcb
样品瓶号 : 2-32
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2026/05/08 20:07:48 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2026/05/09 08:48:12 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 225nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.623	348160	100.000	71927	6930	1.091	--
总计		348160	100.000	71927			

图90 艾托格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026032421批-均一性1-pH6.8介质-篮法-100转-30min-片4
供试品溶液-1



SHIMADZU

LabSolutions


SMF-4160

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱温 : 35°C 波 长: 225nm
数据文件名 : RC\$SMF-4160 - 27-9/27-595-2 - zzp-2026032421p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx1-p5-30min.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-4160 - SMF-4160-rcqx-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4160 - 20260508-FX276.lcb
样品瓶号 : 2-41
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2026/05/08 20:11:14 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2026/05/09 08:48:15 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 225nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.622	339283	100.000	70208	6937	1.089	--
总计		339283	100.000	70208			

图91 艾托格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026032421批-均一性1-pH6.8介质-篮法-100转-30min-片5
供试品溶液-1



SHIMADZU

LabSolutions


SMF-4160

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱温 : 35°C 波 长: 225nm
数据文件名 : RC\$SMF-4160 - 27-9/27-596-2 - zzp-2026032421p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx1-p6-30min.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-4160 - SMF-4160-rcqx-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4160 - 20260508-FX276.lcb
样品瓶号 : 2-50
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2026/05/08 20:14:40 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2026/05/09 08:48:17 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 225nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.623	349008	100.000	72104	6927	1.090	--
总计		349008	100.000	72104			

图92 艾托格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026032421批-均一性1-pH6.8介质-篮法-100转-30min-片6
供试品溶液-1



SHIMADZU

LabSolutions


SMF-4160

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱温 : 35°C 波 长: 225nm
数据文件名 : RC\$SMF-4160 - 27-9/27-597-2 - zzp-2026032421p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx1-p1-45min.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-4160 - SMF-4160-rcqx-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4160 - 20260508-FX276.lcb
样品瓶号 : 2-6
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2026/05/08 20:18:07 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2026/05/09 08:48:19 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 225nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.623	354039	100.000	73106	6929	1.090	--
总计		354039	100.000	73106			

图93 艾托格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026032421批-均一性1-pH6.8介质-篮法-100转-45min-片1
供试品溶液-1



SHIMADZU

LabSolutions


SMF-4160

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱温 : 35°C 波 长: 225nm
数据文件名 : RC\$SMF-4160 - 27-9/27-598-2 - zzp-2026032421p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx1-p2-45min.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-4160 - SMF-4160-rcqx-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4160 - 20260508-FX276.lcb
样品瓶号 : 2-15
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2026/05/08 20:21:34 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2026/05/09 08:48:22 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 225nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.623	355149	100.000	73349	6929	1.089	--
总计		355149	100.000	73349			

图94 艾托格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026032421批-均一性1-pH6.8介质-篮法-100转-45min-片2
供试品溶液-1



SHIMADZU

LabSolutions


SMF-4160

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱温 : 35°C 波 长: 225nm
数据文件名 : RC\$SMF-4160 - 27-9/27-599-2 - zzp-2026032421p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx1-p3-45min.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-4160 - SMF-4160-rcqx-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4160 - 20260508-FX276.lcb
样品瓶号 : 2-24
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2026/05/08 20:25:00 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2026/05/09 08:48:24 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 225nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.623	349946	100.000	72290	6925	1.089	--
总计		349946	100.000	72290			

图95 艾托格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026032421批-均一性1-pH6.8介质-篮法-100转-45min-片3
供试品溶液-1



SHIMADZU

LabSolutions


SMF-4160

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱温 : 35°C 波 长: 225nm
数据文件名 : RC\$SMF-4160 - 27-9/27-600-2 - zzp-2026032421p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx1-p4-45min.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-4160 - SMF-4160-rcqx-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4160 - 20260508-FX276.lcb
样品瓶号 : 2-33
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2026/05/08 20:28:26 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2026/05/09 08:48:27 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 225nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.622	352596	100.000	72843	6922	1.091	--
总计		352596	100.000	72843			

图96 艾托格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026032421批-均一性1-pH6.8介质-篮法-100转-45min-片4
供试品溶液-1



SHIMADZU

LabSolutions


SMF-4160

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱温 : 35°C 波 长: 225nm
数据文件名 : RC\$SMF-4160 - 27-9/27-601-2 - zzp-2026032421p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx1-p5-45min.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-4160 - SMF-4160-rcqx-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4160 - 20260508-FX276.lcb
样品瓶号 : 2-42
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2026/05/08 20:31:53 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2026/05/09 08:48:29 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 225nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.622	344708	100.000	71236	6923	1.090	--
总计		344708	100.000	71236			

图97 艾托格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026032421批-均一性1-pH6.8介质-篮法-100转-45min-片5
供试品溶液-1



SHIMADZU

LabSolutions


SMF-4160

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱温 : 35°C 波 长: 225nm
数据文件名 : RC\$SMF-4160 - 27-9/27-602-2 - zzp-2026032421p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx1-p6-45min.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-4160 - SMF-4160-rcqx-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4160 - 20260508-FX276.lcb
样品瓶号 : 2-51
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2026/05/08 20:35:19 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2026/05/09 08:48:32 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 225nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.622	353944	100.000	73125	6919	1.089	--
总计		353944	100.000	73125			

图98 艾托格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026032421批-均一性1-pH6.8介质-篮法-100转-45min-片6
供试品溶液-1



SHIMADZU

LabSolutions


SMF-4160

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱温 : 35°C 波 长: 225nm
数据文件名 : RC\$SMF-4160 - 27-9/27-603-2 - zzp-2026032421p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx1-p1-60min.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-4160 - SMF-4160-rcqx-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4160 - 20260508-FX276.lcb
样品瓶号 : 2-7
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2026/05/08 20:38:46 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2026/05/09 08:48:34 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 225nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.623	353893	100.000	73052	6932	1.090	--
总计		353893	100.000	73052			

图99 艾托格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026032421批-均一性1-pH6.8介质-篮法-100转-60min-片1
供试品溶液-1



SHIMADZU

LabSolutions


SMF-4160

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱温 : 35°C 波 长: 225nm
数据文件名 : RC\$SMF-4160 - 27-9/27-604-2 - zzp-2026032421p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx1-p2-60min.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-4160 - SMF-4160-rcqx-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4160 - 20260508-FX276.lcb
样品瓶号 : 2-16
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2026/05/08 20:42:13 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2026/05/09 08:48:37 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 225nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.623	356994	100.000	73643	6929	1.089	--
总计		356994	100.000	73643			

图100 艾托格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026032421批-均一性1-pH6.8介质-篮法-100转-60min-片2
供试品溶液-1



SHIMADZU

LabSolutions


SMF-4160

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱温 : 35°C 波 长: 225nm
数据文件名 : RC\$SMF-4160 - 27-9/27-605-2 - zzp-2026032421p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx1-p3-60min.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-4160 - SMF-4160-rcqx-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4160 - 20260508-FX276.lcb
样品瓶号 : 2-25
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2026/05/08 20:45:39 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2026/05/09 08:48:39 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 225nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.623	350233	100.000	72308	6923	1.090	--
总计		350233	100.000	72308			

图101 艾托格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026032421批-均一性1-pH6.8介质-篮法-100转-60min-片3
供试品溶液-1



SHIMADZU

LabSolutions


SMF-4160

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱温 : 35°C 波 长: 225nm
数据文件名 : RC\$SMF-4160 - 27-9/27-606-2 - zzp-2026032421p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx1-p4-60min.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-4160 - SMF-4160-rcqx-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4160 - 20260508-FX276.lcb
样品瓶号 : 2-34
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2026/05/08 20:49:05 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2026/05/09 08:48:42 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 225nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.623	354744	100.000	73174	6913	1.089	--
总计		354744	100.000	73174			

图102 艾托格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026032421批-均一性1-pH6.8介质-篮法-100转-60min-片4
供试品溶液-1



SHIMADZU

LabSolutions


SMF-4160

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱温 : 35°C 波 长: 225nm
数据文件名 : RC\$SMF-4160 - 27-9/27-607-2 - zzp-2026032421p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx1-p5-60min.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-4160 - SMF-4160-rcqx-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4160 - 20260508-FX276.lcb
样品瓶号 : 2-43
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2026/05/08 20:52:33 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2026/05/09 08:48:44 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 225nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.622	345205	100.000	71372	6928	1.089	--
总计		345205	100.000	71372			

图103 艾托格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026032421批-均一性1-pH6.8介质-篮法-100转-60min-片5
供试品溶液-1



SHIMADZU

LabSolutions


SMF-4160

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱温 : 35°C 波 长: 225nm
数据文件名 : RC\$SMF-4160 - 27-9/27-608-2 - zzp-2026032421p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx1-p6-60min.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-4160 - SMF-4160-rcqx-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4160 - 20260508-FX276.lcb
样品瓶号 : 2-52
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2026/05/08 20:56:00 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2026/05/09 08:48:46 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 225nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.624	357423	100.000	73701	6939	1.089	--
总计		357423	100.000	73701			

图104 艾托格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026032421批-均一性1-pH6.8介质-篮法-100转-60min-片6
供试品溶液-1



SHIMADZU

LabSolutions


SMF-4160

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱温 : 35°C 波 长: 225nm
数据文件名 : RC\$SMF-4160 - 27-9/27-609-2 - zzp-2026032421p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx1-p1-jxzs.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-4160 - SMF-4160-rcqx-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4160 - 20260508-FX276.lcb
样品瓶号 : 2-8
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2026/05/08 20:59:27 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2026/05/09 08:48:49 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 225nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.622	355201	100.000	73471	6938	1.087	--
总计		355201	100.000	73471			



SHIMADZU

LabSolutions


SMF-4160

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱温 : 35°C 波 长: 225nm
数据文件名 : RC\$SMF-4160 - 27-9/27-610-2 - zzp-2026032421p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx1-p2-jxzs.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-4160 - SMF-4160-rcqx-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4160 - 20260508-FX276.lcb
样品瓶号 : 2-17
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2026/05/08 21:02:55 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2026/05/09 08:48:51 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 225nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.622	357276	100.000	73866	6930	1.086	--
总计		357276	100.000	73866			

图106 艾托格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026032421批-均一性1-pH6.8介质-篮法-100转-极限转速-片2
供试品溶液-1



SHIMADZU

LabSolutions


SMF-4160

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱温 : 35°C 波 长: 225nm
数据文件名 : RC\$SMF-4160 - 27-9/27-611-2 - zzp-2026032421p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx1-p3-jxzs.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-4160 - SMF-4160-rcqx-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4160 - 20260508-FX276.lcb
样品瓶号 : 2-26
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2026/05/08 21:06:22 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2026/05/09 08:48:54 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 225nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.623	351039	100.000	72526	6929	1.087	--
总计		351039	100.000	72526			

图107 艾托格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026032421批-均一性1-pH6.8介质-篮法-100转-极限转速-片3
供试品溶液-1



SHIMADZU

LabSolutions


SMF-4160

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱温 : 35°C 波 长: 225nm
数据文件名 : RC\$SMF-4160 - 27-9/27-612-2 - zzp-2026032421p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx1-p4-jxzs.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-4160 - SMF-4160-rcqx-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4160 - 20260508-FX276.lcb
样品瓶号 : 2-35
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2026/05/08 21:09:50 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2026/05/09 08:48:56 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 225nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.623	356726	100.000	73695	6926	1.088	--
总计		356726	100.000	73695			

图108 艾托格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026032421批-均一性1-pH6.8介质-篮法-100转-极限转速-片4
供试品溶液-1



SHIMADZU

LabSolutions


SMF-4160

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱温 : 35°C 波 长: 225nm
数据文件名 : RC\$SMF-4160 - 27-9/27-613-2 - zzp-2026032421p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx1-p5-jxzs.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-4160 - SMF-4160-rcqx-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4160 - 20260508-FX276.lcb
样品瓶号 : 2-44
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2026/05/08 21:13:17 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2026/05/09 08:48:59 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 225nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.623	347231	100.000	71752	6928	1.087	--
总计		347231	100.000	71752			

图109 艾托格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026032421批-均一性1-pH6.8介质-篮法-100转-极限转速-片5
供试品溶液-1



SHIMADZU

LabSolutions


SMF-4160

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱温 : 35°C 波 长: 225nm
数据文件名 : RC\$SMF-4160 - 27-9/27-614-2 - zzp-2026032421p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx1-p6-jxzs.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-4160 - SMF-4160-rcqx-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4160 - 20260508-FX276.lcb
样品瓶号 : 2-53
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2026/05/08 21:16:44 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2026/05/09 08:49:01 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 225nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.623	359479	100.000	74232	6933	1.087	--
总计		359479	100.000	74232			

图110 艾托格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026032421批-均一性1-pH6.8介质-篮法-100转-极限转速-片6
供试品溶液-1



SHIMADZU

LabSolutions


SMF-4160

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱温 : 35°C 波 长: 225nm
数据文件名 : RC\$SMF-4160 - 27-9/27-615-2 - zzp-2026032421p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx1-dz2-1.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-4160 - SMF-4160-rcqx-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4160 - 20260508-FX276.lcb
样品瓶号 : 2-27
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2026/05/08 21:20:10 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2026/05/09 08:49:04 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 225nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.608	368027	100.000	74426	6619	1.101	--
总计		368027	100.000	74426			

图111 艾托格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026032421批-均一性1-pH6.8介质-篮法-100转
对照品溶液-2-1



SHIMADZU

LabSolutions


SMF-4160

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱温 : 35°C 波 长: 225nm
数据文件名 : RC\$SMF-4160 - 27-9/27-616-2 - zzp-2026032421p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx1-dz2-2.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-4160 - SMF-4160-rcqx-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4160 - 20260508-FX276.lcb
样品瓶号 : 2-27
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2026/05/08 21:23:37 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2026/05/09 08:49:06 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 225nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.609	368168	100.000	74265	6631	1.101	--
总计		368168	100.000	74265			

图112 艾托格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026032421批-均一性1-pH6.8介质-篮法-100转
对照品溶液-2-2



SHIMADZU

LabSolutions


SMF-4160

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 35°C 波长: 225nm
数据文件名 : RC\$SMF-4160 - 27-9/27-617-2 - zzp-2026032521p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx1-rj.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-4160 - SMF-4160-rcqx-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4160 - 20260508-FX276.lcb
样品瓶号 : 3-9
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2026/05/08 21:27:02 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2026/05/09 08:49:09 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 225nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图113 艾托格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026032521批-均一性1-pH6.8介质-篮法-100转
溶剂



SHIMADZU

LabSolutions


SMF-4160

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱温 : 35°C 波 长: 225nm
数据文件名 : RC\$SMF-4160 - 27-9/27-618-2 - zzp-2026032521p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx1-dz1-1.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-4160 - SMF-4160-rcqx-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4160 - 20260508-FX276.lcb
样品瓶号 : 3-18
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2026/05/08 21:30:27 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2026/05/09 08:49:11 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 225nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.608	367690	100.000	74295	6614	1.101	--
总计		367690	100.000	74295			

图114 艾托格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026032521批-均一性1-pH6.8介质-篮法-100转
对照品溶液-1-1



SHIMADZU

LabSolutions


SMF-4160

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱温 : 35°C 波 长: 225nm
数据文件名 : RC\$SMF-4160 - 27-9/27-619-2 - zzp-2026032521p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx1-dz1-2.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-4160 - SMF-4160-rcqx-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4160 - 20260508-FX276.lcb
样品瓶号 : 3-18
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2026/05/08 21:33:52 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2026/05/09 08:49:14 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 225nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.608	367419	100.000	74341	6626	1.101	--
总计		367419	100.000	74341			

图115 艾托格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026032521批-均一性1-pH6.8介质-篮法-100转
对照品溶液-1-2



SHIMADZU

LabSolutions


SMF-4160

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱温 : 35°C 波 长: 225nm
数据文件名 : RC\$SMF-4160 - 27-9/27-620-2 - zzp-2026032521p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx1-dz1-3.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-4160 - SMF-4160-rcqx-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4160 - 20260508-FX276.lcb
样品瓶号 : 3-18
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2026/05/08 21:37:18 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2026/05/09 08:49:16 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 225nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.609	367280	100.000	74182	6626	1.101	--
总计		367280	100.000	74182			

图116 艾托格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026032521批-均一性1-pH6.8介质-篮法-100转
对照品溶液-1-3



SHIMADZU

LabSolutions


SMF-4160

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱温 : 35°C 波 长: 225nm
数据文件名 : RC\$SMF-4160 - 27-9/27-621-2 - zzp-2026032521p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx1-dz1-4.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-4160 - SMF-4160-rcqx-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4160 - 20260508-FX276.lcb
样品瓶号 : 3-18
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2026/05/08 21:40:44 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2026/05/09 08:49:19 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 225nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.608	367549	100.000	74301	6625	1.101	--
总计		367549	100.000	74301			

图117 艾托格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026032521批-均一性1-pH6.8介质-篮法-100转
对照品溶液-1-4



SHIMADZU

LabSolutions


SMF-4160

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱温 : 35°C 波 长: 225nm
数据文件名 : RC\$SMF-4160 - 27-9/27-622-2 - zzp-2026032521p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx1-dz1-5.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-4160 - SMF-4160-rcqx-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4160 - 20260508-FX276.lcb
样品瓶号 : 3-18
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2026/05/08 21:44:10 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2026/05/09 08:49:21 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 225nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.608	367589	100.000	74386	6634	1.100	--
总计		367589	100.000	74386			

图118 艾托格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026032521批-均一性1-pH6.8介质-篮法-100转
对照品溶液-1-5



SHIMADZU

LabSolutions


SMF-4160

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱温 : 35°C 波 长: 225nm
数据文件名 : RC\$SMF-4160 - 27-9/27-623-2 - zzp-2026032521p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx1-p1-5min.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-4160 - SMF-4160-rcqx-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4160 - 20260508-FX276.lcb
样品瓶号 : 3-1
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2026/05/08 21:47:34 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2026/05/09 08:49:23 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 225nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.622	270429	100.000	55994	6945	1.086	--
总计		270429	100.000	55994			

图119 艾托格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026032521批-均一性1-pH6.8介质-篮法-100转-5min-片1
供试品溶液-1



SHIMADZU

LabSolutions


SMF-4160

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱温 : 35°C 波 长: 225nm
数据文件名 : RC\$SMF-4160 - 27-9/27-624-2 - zzp-2026032521p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx1-p2-5min.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-4160 - SMF-4160-rcqx-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4160 - 20260508-FX276.lcb
样品瓶号 : 3-10
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2026/05/08 21:50:59 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2026/05/09 08:49:26 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 225nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.622	268576	100.000	55628	6959	1.086	--
总计		268576	100.000	55628			

图120 艾托格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026032521批-均一性1-pH6.8介质-篮法-100转-5min-片2
供试品溶液-1



SHIMADZU

LabSolutions


SMF-4160

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱温 : 35°C 波 长: 225nm
数据文件名 : RC\$SMF-4160 - 27-9/27-625-2 - zzp-2026032521p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx1-p3-5min.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-4160 - SMF-4160-rcqx-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4160 - 20260508-FX276.lcb
样品瓶号 : 3-19
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2026/05/08 21:54:24 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2026/05/09 08:49:28 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 225nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.622	271884	100.000	56311	6956	1.086	--
总计		271884	100.000	56311			

图121 艾托格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026032521批-均一性1-pH6.8介质-篮法-100转-5min-片3
供试品溶液-1



SHIMADZU

LabSolutions


SMF-4160

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱温 : 35°C 波 长: 225nm
数据文件名 : RC\$SMF-4160 - 27-9/27-626-2 - zzp-2026032521p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx1-p4-5min.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-4160 - SMF-4160-rcqx-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4160 - 20260508-FX276.lcb
样品瓶号 : 3-28
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2026/05/08 21:57:48 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2026/05/09 08:49:31 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 225nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.623	259855	100.000	53802	6961	1.086	--
总计		259855	100.000	53802			

图122 艾托格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026032521批-均一性1-pH6.8介质-篮法-100转-5min-片4
供试品溶液-1



SHIMADZU

LabSolutions


SMF-4160

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱温 : 35°C 波 长: 225nm
数据文件名 : RC\$SMF-4160 - 27-9/27-627-2 - zzp-2026032521p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx1-p5-5min.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-4160 - SMF-4160-rcqx-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4160 - 20260508-FX276.lcb
样品瓶号 : 3-37
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2026/05/08 22:01:13 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2026/05/09 08:49:33 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 225nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.622	275177	100.000	57001	6954	1.086	--
总计		275177	100.000	57001			

图123 艾托格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026032521批-均一性1-pH6.8介质-篮法-100转-5min-片5
供试品溶液-1



SHIMADZU

LabSolutions


SMF-4160

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱温 : 35°C 波 长: 225nm
数据文件名 : RC\$SMF-4160 - 27-9/27-628-2 - zzp-2026032521p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx1-p6-5min.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-4160 - SMF-4160-rcqx-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4160 - 20260508-FX276.lcb
样品瓶号 : 3-46
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2026/05/08 22:04:38 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2026/05/09 08:49:36 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 225nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.622	259832	100.000	53847	6964	1.086	--
总计		259832	100.000	53847			

图124 艾托格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026032521批-均一性1-pH6.8介质-篮法-100转-5min-片6
供试品溶液-1



SHIMADZU

LabSolutions


SMF-4160

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱温 : 35°C 波 长: 225nm
数据文件名 : RC\$SMF-4160 - 27-9/27-629-2 - zzp-2026032521p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx1-p1-10min.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-4160 - SMF-4160-rcqx-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4160 - 20260508-FX276.lcb
样品瓶号 : 3-2
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2026/05/08 22:08:03 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2026/05/09 08:49:39 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 225nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.622	320093	100.000	66329	6966	1.085	--
总计		320093	100.000	66329			

图125 艾托格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026032521批-均一性1-pH6.8介质-篮法-100转-10min-片1
供试品溶液-1



SHIMADZU

LabSolutions


SMF-4160

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱温 : 35°C 波 长: 225nm
数据文件名 : RC\$SMF-4160 - 27-9/27-630-2 - zzp-2026032521p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx1-p2-10min.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-4160 - SMF-4160-rcqx-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4160 - 20260508-FX276.lcb
样品瓶号 : 3-11
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2026/05/08 22:11:28 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2026/05/09 08:49:41 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 225nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.622	314555	100.000	65159	6960	1.086	--
总计		314555	100.000	65159			

图126 艾托格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026032521批-均一性1-pH6.8介质-篮法-100转-10min-片2
供试品溶液-1



SHIMADZU

LabSolutions


SMF-4160

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱温 : 35°C 波 长: 225nm
数据文件名 : RC\$SMF-4160 - 27-9/27-631-2 - zzp-2026032521p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx1-p3-10min.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-4160 - SMF-4160-rcqx-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4160 - 20260508-FX276.lcb
样品瓶号 : 3-20
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2026/05/08 22:14:53 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2026/05/09 08:49:44 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 225nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.623	318101	100.000	65844	6952	1.085	--
总计		318101	100.000	65844			

图127 艾托格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026032521批-均一性1-pH6.8介质-篮法-100转-10min-片3
供试品溶液-1



SHIMADZU

LabSolutions


SMF-4160

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱温 : 35°C 波 长: 225nm
数据文件名 : RC\$SMF-4160 - 27-9/27-632-2 - zzp-2026032521p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx1-p4-10min.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-4160 - SMF-4160-rcqx-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4160 - 20260508-FX276.lcb
样品瓶号 : 3-29
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2026/05/08 22:18:18 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2026/05/09 08:49:46 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 225nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.622	305659	100.000	63307	6959	1.086	--
总计		305659	100.000	63307			

图128 艾托格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026032521批-均一性1-pH6.8介质-篮法-100转-10min-片4
供试品溶液-1



SHIMADZU

LabSolutions


SMF-4160

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱温 : 35°C 波 长: 225nm
数据文件名 : RC\$SMF-4160 - 27-9/27-633-2 - zzp-2026032521p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx1-p5-10min.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-4160 - SMF-4160-rcqx-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4160 - 20260508-FX276.lcb
样品瓶号 : 3-38
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2026/05/08 22:21:42 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2026/05/09 08:49:48 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 225nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.622	317858	100.000	65853	6958	1.086	--
总计		317858	100.000	65853			

图129 艾托格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026032521批-均一性1-pH6.8介质-篮法-100转-10min-片5
供试品溶液-1



SHIMADZU

LabSolutions


SMF-4160

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱温 : 35°C 波 长: 225nm
数据文件名 : RC\$SMF-4160 - 27-9/27-634-2 - zzp-2026032521p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx1-p6-10min.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-4160 - SMF-4160-rcqx-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4160 - 20260508-FX276.lcb
样品瓶号 : 3-47
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2026/05/08 22:25:06 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2026/05/09 08:49:51 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 225nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.622	305694	100.000	63287	6952	1.086	--
总计		305694	100.000	63287			

图130 艾托格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026032521批-均一性1-pH6.8介质-篮法-100转-10min-片6
供试品溶液-1



SHIMADZU

LabSolutions


SMF-4160

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 35°C 波长: 225nm
数据文件名 : RC\$SMF-4160 - 27-9/27-635-2 - zzp-2026032521p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx1-p1-15min.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-4160 - SMF-4160-rcqx-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4160 - 20260508-FX276.lcb
样品瓶号 : 3-3
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2026/05/08 22:28:31 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2026/05/09 08:49:53 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 225nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.622	336480	100.000	69642	6953	1.085	--
总计		336480	100.000	69642			

图131 艾托格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026032521批-均一性1-pH6.8介质-篮法-100转-15min-片1
供试品溶液-1



SHIMADZU

LabSolutions


SMF-4160

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 35°C 波长: 225nm
数据文件名 : RC\$SMF-4160 - 27-9/27-636-2 - zzp-2026032521p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx1-p2-15min.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-4160 - SMF-4160-rcqx-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4160 - 20260508-FX276.lcb
样品瓶号 : 3-12
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2026/05/08 22:31:55 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2026/05/09 08:49:56 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 225nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.622	327077	100.000	67600	6931	1.086	--
总计		327077	100.000	67600			

图132 艾托格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026032521批-均一性1-pH6.8介质-篮法-100转-15min-片2
供试品溶液-1



SHIMADZU

LabSolutions


SMF-4160

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱温 : 35°C 波 长: 225nm
数据文件名 : RC\$SMF-4160 - 27-9/27-637-2 - zzp-2026032521p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx1-p3-15min.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-4160 - SMF-4160-rcqx-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4160 - 20260508-FX276.lcb
样品瓶号 : 3-21
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2026/05/08 22:35:20 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2026/05/09 08:49:58 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 225nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.623	332093	100.000	68596	6949	1.086	--
总计		332093	100.000	68596			

图133 艾托格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026032521批-均一性1-pH6.8介质-篮法-100转-15min-片3
供试品溶液-1



SHIMADZU

LabSolutions


SMF-4160

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 35°C 波长: 225nm
数据文件名 : RC\$SMF-4160 - 27-9/27-638-2 - zzp-2026032521p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx1-p4-15min.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-4160 - SMF-4160-rcqx-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4160 - 20260508-FX276.lcb
样品瓶号 : 3-30
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2026/05/08 22:38:44 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2026/05/09 08:50:00 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 225nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.623	319693	100.000	66134	6951	1.086	--
总计		319693	100.000	66134			

图134 艾托格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026032521批-均一性1-pH6.8介质-篮法-100转-15min-片4
供试品溶液-1



SHIMADZU

LabSolutions


SMF-4160

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱温 : 35°C 波 长: 225nm
数据文件名 : RC\$SMF-4160 - 27-9/27-639-2 - zzp-2026032521p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx1-p5-15min.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-4160 - SMF-4160-rcqx-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4160 - 20260508-FX276.lcb
样品瓶号 : 3-39
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2026/05/08 22:42:08 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2026/05/09 08:50:03 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 225nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.623	331147	100.000	68433	6942	1.087	--
总计		331147	100.000	68433			

图135 艾托格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026032521批-均一性1-pH6.8介质-篮法-100转-15min-片5
供试品溶液-1



SHIMADZU

LabSolutions


SMF-4160

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱温 : 35°C 波 长: 225nm
数据文件名 : RC\$SMF-4160 - 27-9/27-640-2 - zzp-2026032521p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx1-p6-15min.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-4160 - SMF-4160-rcqx-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4160 - 20260508-FX276.lcb
样品瓶号 : 3-48
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2026/05/08 22:45:33 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2026/05/09 08:50:05 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 225nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.624	318996	100.000	65872	6947	1.087	--
总计		318996	100.000	65872			

图136 艾托格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026032521批-均一性1-pH6.8介质-篮法-100转-15min-片6
供试品溶液-1



SHIMADZU

LabSolutions


SMF-4160

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 35°C 波长: 225nm
数据文件名 : RC\$SMF-4160 - 27-9/27-641-2 - zzp-2026032521p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx1-p1-20min.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-4160 - SMF-4160-rcqx-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4160 - 20260508-FX276.lcb
样品瓶号 : 3-4
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2026/05/08 22:48:57 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2026/05/09 08:50:08 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 225nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.622	344129	100.000	71238	6948	1.086	--
总计		344129	100.000	71238			

图137 艾托格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026032521批-均一性1-pH6.8介质-篮法-100转-20min-片1
供试品溶液-1



SHIMADZU

LabSolutions


SMF-4160

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱温 : 35°C 波 长: 225nm
数据文件名 : RC\$SMF-4160 - 27-9/27-642-2 - zzp-2026032521p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx1-p2-20min.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-4160 - SMF-4160-rcqx-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4160 - 20260508-FX276.lcb
样品瓶号 : 3-13
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2026/05/08 22:52:21 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2026/05/09 08:50:10 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 225nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.622	333457	100.000	69055	6957	1.087	--
总计		333457	100.000	69055			

图138 艾托格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026032521批-均一性1-pH6.8介质-篮法-100转-20min-片2
供试品溶液-1



SHIMADZU

LabSolutions


SMF-4160

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱温 : 35°C 波 长: 225nm
数据文件名 : RC\$SMF-4160 - 27-9/27-643-2 - zzp-2026032521p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx1-p3-20min.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-4160 - SMF-4160-rcqx-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4160 - 20260508-FX276.lcb
样品瓶号 : 3-22
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2026/05/08 22:55:45 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2026/05/09 08:50:12 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 225nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.622	338090	100.000	70003	6954	1.086	--
总计		338090	100.000	70003			

图139 艾托格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026032521批-均一性1-pH6.8介质-篮法-100转-20min-片3
供试品溶液-1



SHIMADZU

LabSolutions


SMF-4160

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 35°C 波长: 225nm
数据文件名 : RC\$SMF-4160 - 27-9/27-644-2 - zzp-2026032521p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx1-p4-20min.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-4160 - SMF-4160-rcqx-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4160 - 20260508-FX276.lcb
样品瓶号 : 3-31
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2026/05/08 22:59:09 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2026/05/09 08:50:15 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 225nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.622	326501	100.000	67630	6955	1.085	--
总计		326501	100.000	67630			

图140 艾托格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026032521批-均一性1-pH6.8介质-篮法-100转-20min-片4
供试品溶液-1



SHIMADZU

LabSolutions


SMF-4160

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱温 : 35°C 波 长: 225nm
数据文件名 : RC\$SMF-4160 - 27-9/27-645-2 - zzp-2026032521p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx1-p5-20min.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-4160 - SMF-4160-rcqx-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4160 - 20260508-FX276.lcb
样品瓶号 : 3-40
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2026/05/08 23:02:33 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2026/05/09 08:50:17 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 225nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.623	338148	100.000	69971	6952	1.085	--
总计		338148	100.000	69971			

图141 艾托格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026032521批-均一性1-pH6.8介质-篮法-100转-20min-片5
供试品溶液-1



SHIMADZU

LabSolutions


SMF-4160

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 35°C 波长: 225nm
数据文件名 : RC\$SMF-4160 - 27-9/27-646-2 - zzp-2026032521p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx1-p6-20min.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-4160 - SMF-4160-rcqx-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4160 - 20260508-FX276.lcb
样品瓶号 : 3-49
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2026/05/08 23:05:57 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2026/05/09 08:50:20 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 225nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.622	326462	100.000	67595	6953	1.084	--
总计		326462	100.000	67595			

图142 艾托格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026032521批-均一性1-pH6.8介质-篮法-100转-20min-片6
供试品溶液-1



SHIMADZU

LabSolutions


SMF-4160

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱温 : 35°C 波 长: 225nm
数据文件名 : RC\$SMF-4160 - 27-9/27-647-2 - zzp-2026032521p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx1-p1-30min.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-4160 - SMF-4160-rcqx-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4160 - 20260508-FX276.lcb
样品瓶号 : 3-5
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2026/05/08 23:09:21 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2026/05/09 08:50:22 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 225nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.622	352309	100.000	72900	6946	1.085	--
总计		352309	100.000	72900			

图143 艾托格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026032521批-均一性1-pH6.8介质-篮法-100转-30min-片1
供试品溶液-1



SHIMADZU

LabSolutions


SMF-4160

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱温 : 35°C 波 长: 225nm
数据文件名 : RC\$SMF-4160 - 27-9/27-648-2 - zzp-2026032521p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx1-p2-30min.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-4160 - SMF-4160-rcqx-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4160 - 20260508-FX276.lcb
样品瓶号 : 3-14
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2026/05/08 23:12:46 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2026/05/09 08:50:24 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 225nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.622	341505	100.000	70658	6943	1.086	--
总计		341505	100.000	70658			

图144 艾托格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026032521批-均一性1-pH6.8介质-篮法-100转-30min-片2
供试品溶液-1



SHIMADZU

LabSolutions


SMF-4160

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 35°C 波长: 225nm
数据文件名 : RC\$SMF-4160 - 27-9/27-649-2 - zzp-2026032521p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx1-p3-30min.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-4160 - SMF-4160-rcqx-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4160 - 20260508-FX276.lcb
样品瓶号 : 3-23
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2026/05/08 23:16:10 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2026/05/09 08:50:27 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 225nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.622	344541	100.000	71339	6953	1.086	--
总计		344541	100.000	71339			

图145 艾托格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026032521批-均一性1-pH6.8介质-篮法-100转-30min-片3
供试品溶液-1



SHIMADZU

LabSolutions


SMF-4160

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱温 : 35°C 波 长: 225nm
数据文件名 : RC\$SMF-4160 - 27-9/27-650-2 - zzp-2026032521p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx1-p4-30min.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-4160 - SMF-4160-rcqx-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4160 - 20260508-FX276.lcb
样品瓶号 : 3-32
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2026/05/08 23:19:34 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2026/05/09 08:50:29 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 225nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.622	334697	100.000	69318	6953	1.086	--
总计		334697	100.000	69318			

图146 艾托格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026032521批-均一性1-pH6.8介质-篮法-100转-30min-片4
供试品溶液-1



SHIMADZU

LabSolutions


SMF-4160

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱温 : 35°C 波 长: 225nm
数据文件名 : RC\$SMF-4160 - 27-9/27-651-2 - zzp-2026032521p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx1-p5-30min.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-4160 - SMF-4160-rcqx-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4160 - 20260508-FX276.lcb
样品瓶号 : 3-41
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2026/05/08 23:22:58 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2026/05/09 08:50:32 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 225nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.623	345064	100.000	71436	6956	1.087	--
总计		345064	100.000	71436			

图147 艾托格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026032521批-均一性1-pH6.8介质-篮法-100转-30min-片5
供试品溶液-1



SHIMADZU

LabSolutions


SMF-4160

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱温 : 35°C 波 长: 225nm
数据文件名 : RC\$SMF-4160 - 27-9/27-652-2 - zzp-2026032521p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx1-p6-30min.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-4160 - SMF-4160-rcqx-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4160 - 20260508-FX276.lcb
样品瓶号 : 3-50
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2026/05/08 23:26:23 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2026/05/09 08:50:35 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 225nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.622	333278	100.000	69041	6960	1.087	--
总计		333278	100.000	69041			

图148 艾托格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026032521批-均一性1-pH6.8介质-篮法-100转-30min-片6
供试品溶液-1



SHIMADZU

LabSolutions


SMF-4160

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 35°C 波长: 225nm
数据文件名 : RC\$SMF-4160 - 27-9/27-653-2 - zzp-2026032521p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx1-p1-45min.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-4160 - SMF-4160-rcqx-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4160 - 20260508-FX276.lcb
样品瓶号 : 3-6
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2026/05/08 23:29:46 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2026/05/09 08:50:38 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 225nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.622	358754	100.000	74204	6937	1.087	--
总计		358754	100.000	74204			

图149 艾托格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026032521批-均一性1-pH6.8介质-篮法-100转-45min-片1
供试品溶液-1



SHIMADZU

LabSolutions


SMF-4160

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 35°C 波长: 225nm
数据文件名 : RC\$SMF-4160 - 27-9/27-654-2 - zzp-2026032521p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx1-p2-45min.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-4160 - SMF-4160-rcqx-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4160 - 20260508-FX276.lcb
样品瓶号 : 3-15
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2026/05/08 23:33:10 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2026/05/09 08:50:41 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 225nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.623	346151	100.000	71624	6950	1.088	--
总计		346151	100.000	71624			

图150 艾托格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026032521批-均一性1-pH6.8介质-篮法-100转-45min-片2
供试品溶液-1



SHIMADZU

LabSolutions


SMF-4160

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱温 : 35°C 波 长: 225nm
数据文件名 : RC\$SMF-4160 - 27-9/27-655-2 - zzp-2026032521p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx1-p3-45min.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-4160 - SMF-4160-rcqx-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4160 - 20260508-FX276.lcb
样品瓶号 : 3-24
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2026/05/08 23:36:34 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2026/05/09 08:50:43 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 225nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.622	347013	100.000	71851	6957	1.087	--
总计		347013	100.000	71851			

图151 艾托格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026032521批-均一性1-pH6.8介质-篮法-100转-45min-片3
供试品溶液-1



SHIMADZU

LabSolutions


SMF-4160

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱温 : 35°C 波 长: 225nm
数据文件名 : RC\$SMF-4160 - 27-9/27-656-2 - zzp-2026032521p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx1-p4-45min.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-4160 - SMF-4160-rcqx-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4160 - 20260508-FX276.lcb
样品瓶号 : 3-33
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2026/05/08 23:39:58 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2026/05/09 08:50:46 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 225nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.623	340547	100.000	70426	6948	1.087	--
总计		340547	100.000	70426			

图152 艾托格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026032521批-均一性1-pH6.8介质-篮法-100转-45min-片4
供试品溶液-1



SHIMADZU

LabSolutions


SMF-4160

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 35°C 波长: 225nm
数据文件名 : RC\$SMF-4160 - 27-9/27-657-2 - zzp-2026032521p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx1-p5-45min.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-4160 - SMF-4160-rcqx-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4160 - 20260508-FX276.lcb
样品瓶号 : 3-42
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2026/05/08 23:43:21 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2026/05/09 08:50:49 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 225nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.623	351451	100.000	72731	6952	1.087	--
总计		351451	100.000	72731			

图153 艾托格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026032521批-均一性1-pH6.8介质-篮法-100转-45min-片5
供试品溶液-1



SHIMADZU

LabSolutions


SMF-4160

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱温 : 35°C 波 长: 225nm
数据文件名 : RC\$SMF-4160 - 27-9/27-658-2 - zzp-2026032521p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx1-p6-45min.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-4160 - SMF-4160-rcqx-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4160 - 20260508-FX276.lcb
样品瓶号 : 3-51
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2026/05/08 23:46:45 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2026/05/09 08:50:52 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 225nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.622	339223	100.000	70192	6941	1.086	--
总计		339223	100.000	70192			

图154 艾托格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026032521批-均一性1-pH6.8介质-篮法-100转-45min-片6
供试品溶液-1



SHIMADZU

LabSolutions


SMF-4160

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱温 : 35°C 波 长: 225nm
数据文件名 : RC\$SMF-4160 - 27-9/27-659-2 - zzp-2026032521p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx1-p1-60min.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-4160 - SMF-4160-rcqx-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4160 - 20260508-FX276.lcb
样品瓶号 : 3-7
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2026/05/08 23:50:09 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2026/05/09 08:50:55 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 225nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.623	360409	100.000	74473	6935	1.088	--
总计		360409	100.000	74473			

图155 艾托格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026032521批-均一性1-pH6.8介质-篮法-100转-60min-片1
供试品溶液-1



SHIMADZU

LabSolutions


SMF-4160

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 35°C 波长: 225nm
数据文件名 : RC\$SMF-4160 - 27-9/27-660-2 - zzp-2026032521p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx1-p2-60min.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-4160 - SMF-4160-rcqx-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4160 - 20260508-FX276.lcb
样品瓶号 : 3-16
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2026/05/08 23:53:33 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2026/05/09 08:50:57 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 225nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.623	348171	100.000	72024	6947	1.087	--
总计		348171	100.000	72024			

图156 艾托格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026032521批-均一性1-pH6.8介质-篮法-100转-60min-片2
供试品溶液-1



SHIMADZU

LabSolutions


SMF-4160

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱温 : 35°C 波 长: 225nm
数据文件名 : RC\$SMF-4160 - 27-9/27-661-2 - zzp-2026032521p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx1-p3-60min.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-4160 - SMF-4160-rcqx-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4160 - 20260508-FX276.lcb
样品瓶号 : 3-25
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2026/05/08 23:56:57 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2026/05/09 08:51:00 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 225nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.622	350513	100.000	72527	6944	1.088	--
总计		350513	100.000	72527			

图157 艾托格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026032521批-均一性1-pH6.8介质-篮法-100转-60min-片3
供试品溶液-1



SHIMADZU

LabSolutions


SMF-4160

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱温 : 35°C 波 长: 225nm
数据文件名 : RC\$SMF-4160 - 27-9/27-662-2 - zzp-2026032521p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx1-p4-60min.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-4160 - SMF-4160-rcqx-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4160 - 20260508-FX276.lcb
样品瓶号 : 3-34
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2026/05/09 00:00:21 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2026/05/09 08:51:02 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 225nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.624	344095	100.000	71063	6954	1.087	--
总计		344095	100.000	71063			

图158 艾托格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026032521批-均一性1-pH6.8介质-篮法-100转-60min-片4
供试品溶液-1



SHIMADZU

LabSolutions


SMF-4160

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱温 : 35°C 波 长: 225nm
数据文件名 : RC\$SMF-4160 - 27-9/27-663-2 - zzp-2026032521p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx1-p5-60min.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-4160 - SMF-4160-rcqx-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4160 - 20260508-FX276.lcb
样品瓶号 : 3-43
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2026/05/09 00:03:45 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2026/05/09 08:51:05 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 225nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.623	353909	100.000	73171	6944	1.088	--
总计		353909	100.000	73171			

图159 艾托格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026032521批-均一性1-pH6.8介质-篮法-100转-60min-片5
供试品溶液-1



SHIMADZU

LabSolutions


SMF-4160

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱温 : 35°C 波 长: 225nm
数据文件名 : RC\$SMF-4160 - 27-9/27-664-2 - zzp-2026032521p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx1-p6-60min.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-4160 - SMF-4160-rcqx-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4160 - 20260508-FX276.lcb
样品瓶号 : 3-52
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2026/05/09 00:07:09 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2026/05/09 08:51:08 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 225nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.623	343404	100.000	71040	6945	1.088	--
总计		343404	100.000	71040			

图160 艾托格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026032521批-均一性1-pH6.8介质-篮法-100转-60min-片6
供试品溶液-1



SHIMADZU

LabSolutions


SMF-4160

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱温 : 35°C 波 长: 225nm
数据文件名 : RC\$SMF-4160 - 27-9/27-665-2 - zzp-2026032521p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx1-p1-jxzs.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-4160 - SMF-4160-rcqx-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4160 - 20260508-FX276.lcb
样品瓶号 : 3-8
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2026/05/09 00:10:34 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2026/05/09 08:51:10 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 225nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.624	360317	100.000	74448	6960	1.088	--
总计		360317	100.000	74448			

图161 艾托格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026032521批-均一性1-pH6.8介质-篮法-100转-极限转速-片1
供试品溶液-1



SHIMADZU

LabSolutions


SMF-4160

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱温 : 35°C 波 长: 225nm
数据文件名 : RC\$SMF-4160 - 27-9/27-666-2 - zzp-2026032521p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx1-p2-jxzs.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-4160 - SMF-4160-rcqx-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4160 - 20260508-FX276.lcb
样品瓶号 : 3-17
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2026/05/09 00:13:59 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2026/05/09 08:51:13 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 225nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.623	350329	100.000	72485	6958	1.087	--
总计		350329	100.000	72485			

图162 艾托格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026032521批-均一性1-pH6.8介质-篮法-100转-极限转速-片2
供试品溶液-1



SHIMADZU

LabSolutions


SMF-4160

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱温 : 35°C 波 长: 225nm
数据文件名 : RC\$SMF-4160 - 27-9/27-667-2 - zzp-2026032521p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx1-p3-jxzs.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-4160 - SMF-4160-rcqx-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4160 - 20260508-FX276.lcb
样品瓶号 : 3-26
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2026/05/09 00:17:24 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2026/05/09 08:51:16 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 225nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.623	352649	100.000	72981	6957	1.087	--
总计		352649	100.000	72981			

图163 艾托格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026032521批-均一性1-pH6.8介质-篮法-100转-极限转速-片3
供试品溶液-1



SHIMADZU

LabSolutions


SMF-4160

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱温 : 35°C 波 长: 225nm
数据文件名 : RC\$SMF-4160 - 27-9/27-668-2 - zzp-2026032521p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx1-p4-jxzs.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-4160 - SMF-4160-rcqx-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4160 - 20260508-FX276.lcb
样品瓶号 : 3-35
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2026/05/09 00:20:49 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2026/05/09 08:51:18 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 225nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.624	346638	100.000	71582	6955	1.087	--
总计		346638	100.000	71582			

图164 艾托格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026032521批-均一性1-pH6.8介质-篮法-100转-极限转速-片4
供试品溶液-1



SHIMADZU

LabSolutions


SMF-4160

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱温 : 35°C 波 长: 225nm
数据文件名 : RC\$SMF-4160 - 27-9/27-669-2 - zzp-2026032521p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx1-p5-jxzs.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-4160 - SMF-4160-rcqx-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4160 - 20260508-FX276.lcb
样品瓶号 : 3-44
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2026/05/09 00:24:13 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2026/05/09 08:51:21 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 225nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.623	354205	100.000	73198	6941	1.086	--
总计		354205	100.000	73198			

图165 艾托格列净片溶出曲线测定HPLC图谱

自制品-2026032521批-均一性1-pH6.8介质-篮法-100转-极限转速-片5
供试品溶液-1



SHIMADZU

LabSolutions


SMF-4160

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱温 : 35°C 波 长: 225nm
数据文件名 : RC\$SMF-4160 - 27-9/27-670-2 - zzp-2026032521p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx1-p6-jxzs.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-4160 - SMF-4160-rcqx-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4160 - 20260508-FX276.lcb
样品瓶号 : 3-53
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2026/05/09 00:27:37 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2026/05/09 08:51:24 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 225nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.622	344282	100.000	71249	6951	1.087	--
总计		344282	100.000	71249			

图166 艾托格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026032521批-均一性1-pH6.8介质-篮法-100转-极限转速-片6
供试品溶液-1

 SHIMADZU
LabSolutions


SMF-4160

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱温 : 35°C 波 长: 225nm
数据文件名 : RC\$SMF-4160 - 27-9/27-671-2 - zzp-2026032521p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx1-dz2-1.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-4160 - SMF-4160-rcqx-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4160 - 20260508-FX276.lcb
样品瓶号 : 3-27
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2026/05/09 00:31:02 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2026/05/09 08:51:26 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 225nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.610	367849	100.000	74296	6646	1.101	--
总计		367849	100.000	74296			

图167 艾托格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026032521批-均一性1-pH6.8介质-篮法-100转
对照品溶液-2-1



SHIMADZU

LabSolutions


SMF-4160

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱温 : 35°C 波 长: 225nm
数据文件名 : RC\$SMF-4160 - 27-9/27-672-2 - zzp-2026032521p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx1-dz2-2.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-4160 - SMF-4160-rcqx-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4160 - 20260508-FX276.lcb
样品瓶号 : 3-27
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2026/05/09 00:34:27 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2026/05/09 08:51:29 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 225nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.608	367985	100.000	74471	6622	1.100	--
总计		367985	100.000	74471			

图168 艾托格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026032521批-均一性1-pH6.8介质-篮法-100转
对照品溶液-2-2