



布洛芬混悬液项目信息

介质体积(ml)	900	取样体积(ml)	5	补液体积(ml)	0
对照品批号	100179-202308	对照品来源	中检院	对照品使用方法	直接使用
对照品含量(%)	99.9	对照品水分(%)	0	对照品稀释倍数	50
标示量(mg)	200	供试品稀释倍数	1	系数	1

对照品溶液

序号	称样量(mg)	A ₁	A ₂	A ₃	A ₄	A ₅	A _{平均}	RSD%
1	11.03	2613188	2615847	2615329	2610102	2615280	2613949	0.10
2	10.94	2612090	2601241				2606666	0.30

单位质量响应值		RSD%	判断
236985.40	238269.29	0.39	数据可信



操作者:

日期: 2026-09-11

复核者:

未审阅版本



加速6月-供试品溶液-2025103151批-pH7.2

时间 (分钟)	样品	A ₁	A ₂	A _{平均}	溶出量(%)	平均(%)	RSD%	累计溶 出量(%)	平均(%)	RSD%
5min	1	2654286	-	2654286	100.430	99.17	0.74	100.43	99.16	0.74
	2	2624474	-	2624474	99.302			99.30		
	3	2615945	-	2615945	98.979			98.98		
	4	2611287	-	2611287	98.803			98.80		
	5	2622584	-	2622584	99.230			99.23		
	6	2596689	-	2596689	98.250			98.25		
10min	1	2641350	-	2641350	99.940	99.25	0.78	100.50	99.80	0.78
	2	2652657	-	2652657	100.368			100.92		
	3	2625969	-	2625969	99.358			99.91		
	4	2608924	-	2608924	98.713			99.26		
	5	2603829	-	2603829	98.521			99.07		
	6	2606140	-	2606140	98.608			99.15		
15min	1	2641790	-	2641790	99.957	98.87	0.93	101.07	99.97	0.92
	2	2604649	-	2604649	98.552			99.66		
	3	2634201	-	2634201	99.670			100.77		
	4	2613600	-	2613600	98.890			99.99		
	5	2610089	-	2610089	98.757			99.86		
	6	2573782	-	2573782	97.384			98.48		
20min	1	2610561	-	2610561	98.775	98.01	0.74	100.44	99.66	0.74
	2	2600187	-	2600187	98.383			100.04		
	3	2608179	-	2608179	98.685			100.34		
	4	2569830	-	2569830	97.234			98.88		
	5	2586375	-	2586375	97.860			99.51		
	6	2566602	-	2566602	97.112			98.75		
30min	1	2587156	-	2587156	97.890	97.42	0.59	100.11	99.61	0.59
	2	2595268	-	2595268	98.197			100.40		
	3	2579952	-	2579952	97.617			99.82		
	4	2563705	-	2563705	97.002			99.19		
	5	2564179	-	2564179	97.020			99.21		
	6	2557524	-	2557524	96.769			98.94		
极限	1	2591745	-	2591745	98.063	97.03	1.26	100.82	99.77	1.24
	2	2606644	-	2606644	98.627			101.38		
	3	2553632	-	2553632	96.621			99.37		
	4	2535724	-	2535724	95.944			98.67		
	5	2574585	-	2574585	97.414			100.14		
	6	2524398	-	2524398	95.515			98.23		



操作者:

日期: 2026-09-11

复核者:

未审阅版本



布洛芬混悬液项目信息

介质体积(ml)	900	取样体积(ml)	5	补液体积(ml)	0
对照品批号	100179-202308	对照品来源	中检院	对照品使用方法	直接使用
对照品含量(%)	99.9	对照品水分(%)	0	对照品稀释倍数	50
标示量(mg)	200	供试品稀释倍数	1	系数	1

对照品溶液

序号	称样量(mg)	A ₁	A ₂	A ₃	A ₄	A ₅	A _{平均}	RSD%
1	11.03	2605845	2611286	2613883	2608232	2607950	2609439	0.13
2	10.94	2610472	2611349				2610910	0.03
单位质量响应值				RSD%	判断			
236576.52				0.62	数据可信			



操作者:

日期: 2026-09-11

复核者:

未审阅版本



加速6月-供试品溶液-2025110151批-pH7.2

时间 (分钟)	样品	A ₁	A ₂	A _{平均}	溶出量(%)	平均(%)	RSD%	累计溶 出量(%)	平均(%)	RSD%
5min	1	2559109	-	2559109	96.834	97.78	0.81	96.83	97.78	0.81
	2	2600610	-	2600610	98.404			98.40		
	3	2614538	-	2614538	98.931			98.93		
	4	2588923	-	2588923	97.962			97.96		
	5	2570646	-	2570646	97.271			97.27		
	6	2571293	-	2571293	97.295			97.30		
10min	1	2610556	-	2610556	98.781	98.37	0.48	99.32	98.91	0.47
	2	2605071	-	2605071	98.573			99.12		
	3	2611203	-	2611203	98.805			99.35		
	4	2602106	-	2602106	98.461			99.01		
	5	2585218	-	2585218	97.822			98.36		
	6	2583829	-	2583829	97.769			98.31		
15min	1	2579666	-	2579666	97.612	97.79	0.57	98.70	98.89	0.56
	2	2577045	-	2577045	97.513			98.61		
	3	2609241	-	2609241	98.731			99.83		
	4	2592782	-	2592782	98.108			99.20		
	5	2580194	-	2580194	97.632			98.72		
	6	2568059	-	2568059	97.173			98.26		
20min	1	2596202	-	2596202	98.238	97.58	0.75	99.87	99.21	0.75
	2	2585642	-	2585642	97.838			99.47		
	3	2600467	-	2600467	98.399			100.05		
	4	2577014	-	2577014	97.511			99.15		
	5	2561661	-	2561661	96.931			98.56		
	6	2551511	-	2551511	96.546			98.17		
30min	1	2564660	-	2564660	97.044	97.13	0.40	99.22	99.30	0.40
	2	2570263	-	2570263	97.256			99.44		
	3	2584813	-	2584813	97.807			100.00		
	4	2560278	-	2560278	96.878			99.06		
	5	2555009	-	2555009	96.679			98.84		
	6	2566412	-	2566412	97.110			99.27		
极限	1	2557828	-	2557828	96.786	96.56	0.33	99.50	99.27	0.33
	2	2558086	-	2558086	96.795			99.52		
	3	2556072	-	2556072	96.719			99.46		
	4	2553556	-	2553556	96.624			99.34		
	5	2548593	-	2548593	96.436			99.14		
	6	2536358	-	2536358	95.973			98.67		



操作者:

日期: 2026-09-11

复核者:

未审阅版本



布洛芬混悬液项目信息

介质体积(ml)	900	取样体积(ml)	5	补液体积(ml)	0
对照品批号	100179-202308	对照品来源	中检院	对照品使用方法	直接使用
对照品含量(%)	99.9	对照品水分(%)	0	对照品稀释倍数	50
标示量(mg)	200	供试品稀释倍数	1	系数	1

对照品溶液

序号	称样量(mg)	A ₁	A ₂	A ₃	A ₄	A ₅	A _{平均}	RSD%
1	11.03	2613010	2611958	2608926	2609744	2608720	2610472	0.08
2	10.94	2603430	2600811				2602120	0.08
单位质量响应值			RSD%	判断				
236670.17			0.36	数据可信				



操作者:

日期: 2026-09-11

复核者:

未审阅版本



加速6月-供试品溶液-2025110251批-pH7.2

时间 (分钟)	样品	A ₁	A ₂	A _{平均}	溶出量(%)	平均(%)	RSD%	累计溶 出量(%)	平均(%)	RSD%
5min	1	2609181	-	2609181	98.875	97.41	1.11	98.88	97.41	1.11
	2	2588180	-	2588180	98.079			98.08		
	3	2577162	-	2577162	97.662			97.66		
	4	2571200	-	2571200	97.436			97.44		
	5	2546899	-	2546899	96.515			96.51		
	6	2530608	-	2530608	95.898			95.90		
10min	1	2614943	-	2614943	99.093	97.62	0.88	99.64	98.16	0.88
	2	2585695	-	2585695	97.985			98.53		
	3	2573079	-	2573079	97.507			98.05		
	4	2573155	-	2573155	97.510			98.05		
	5	2557456	-	2557456	96.915			97.45		
	6	2552159	-	2552159	96.714			97.25		
15min	1	2596658	-	2596658	98.401	97.00	0.96	99.50	98.08	0.96
	2	2579216	-	2579216	97.740			98.83		
	3	2536289	-	2536289	96.113			97.20		
	4	2563126	-	2563126	97.130			98.21		
	5	2544510	-	2544510	96.424			97.50		
	6	2538256	-	2538256	96.187			97.26		
20min	1	2585565	-	2585565	97.980	96.03	1.47	99.63	97.65	1.46
	2	2567765	-	2567765	97.306			98.94		
	3	2510192	-	2510192	95.124			96.74		
	4	2539928	-	2539928	96.251			97.87		
	5	2511305	-	2511305	95.166			96.78		
	6	2489662	-	2489662	94.346			95.95		
30min	1	2558227	-	2558227	96.944	95.73	0.82	99.13	97.88	0.82
	2	2537495	-	2537495	96.159			98.33		
	3	2519112	-	2519112	95.462			97.61		
	4	2529879	-	2529879	95.870			98.03		
	5	2512121	-	2512121	95.197			97.34		
	6	2499512	-	2499512	94.719			96.85		
极限	1	2548185	-	2548185	96.564	95.27	1.02	99.29	97.95	1.01
	2	2516849	-	2516849	95.376			98.08		
	3	2516608	-	2516608	95.367			98.04		
	4	2532524	-	2532524	95.970			98.66		
	5	2488214	-	2488214	94.291			96.96		
	6	2481595	-	2481595	94.040			96.69		



操作者:

日期: 2026-09-11

复核者:

未审阅版本




QTL-4141

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱 温:35°C
数据文件名: RC\$QTL-4141 - 29-13/27-761-2 - zzp-2025103151p-js6y-rcqx-pH7.2jz-rj.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4141 - QTL-4141-rcqx-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4141 - 20260519-FX276.lcb
样品瓶号: 1-9
进样体积: 10 μl
进样时间: 2026/05/19 17:14:25
处理时间 (V2) : 2026/05/20 08:59:47
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速:2.0ml/min
波长:220nm
版本号:6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图1 布洛芬混悬液溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-2025103151批-pH7.2介质
溶剂




QTL-4141

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱 温:35°C
数据文件名: RC\$QTL-4141 - 29-13/27-762-2 - zzp-2025103151p-js6y-rcqx-pH7.2jz-dz1-1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4141 - QTL-4141-rcqx-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4141 - 20260519-FX276.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 10 μl
进样时间: 2026/05/19 17:17:49
处理时间 (V2) : 2026/05/20 08:59:55
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速:2.0ml/min
波长:220nm
版本号:6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 220nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.150	2613188	100.000	609527	5864	1.048	--
总计		2613188	100.000	609527			

图2 布洛芬混悬液溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-2025103151批-pH7.2介质
对照品溶液-1-1




QTL-4141

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱 温:35°C
数据文件名: RC\$QTL-4141 - 29-13/27-763-2 - zzp-2025103151p-js6y-rcqx-pH7.2jz-dz1-2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4141 - QTL-4141-rcqx-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4141 - 20260519-FX276.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 10 μl
进样时间: 2026/05/19 17:21:11
处理时间 (V2) : 2026/05/20 08:59:58
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速:2.0ml/min
波长:220nm
版本号:6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 220nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.150	2615847	100.000	609714	5861	1.048	--
总计		2615847	100.000	609714			

图3 布洛芬混悬液溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-2025103151批-pH7.2介质
对照品溶液-1-2



QTL-4141

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)

柱 温:35°C

数据文件名: RC\$QTL-4141 - 29-13/27-764-2 - zzp-2025103151p-js6y-rcqx-pH7.2jz-dz1-3.lcd

方法文件名: RC\$QTL-4141 - QTL-4141-rcqx-FX276.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-4141 - 20260519-FX276.lcb

样品瓶号: 1-18

进样体积: 10 μl

进样时间: 2026/05/19 17:24:34

处理时间 (V2) : 2026/05/20 09:00:01

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速:2.0ml/min


波长:220nm

版本号:6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 220nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.149	2615329	100.000	610647	5864	1.048	--
总计		2615329	100.000	610647			

图4 布洛芬混悬液溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-2025103151批-pH7.2介质
对照品溶液-1-3




QTL-4141

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱 温:35°C
数据文件名: RC\$QTL-4141 - 29-13/27-765-2 - zzp-2025103151p-js6y-rcqx-pH7.2jz-dz1-4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4141 - QTL-4141-rcqx-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4141 - 20260519-FX276.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 10 μl
进样时间: 2026/05/19 17:27:58
处理时间 (V2) : 2026/05/20 09:00:04
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速:2.0ml/min
波长:220nm
版本号:6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 220nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.150	2610102	100.000	609156	5869	1.049	--
总计		2610102	100.000	609156			

图5 布洛芬混悬液溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-2025103151批-pH7.2介质
对照品溶液-1-4



QTL-4141

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)

柱 温:35°C

数据文件名: RC\$QTL-4141 - 29-13/27-766-2 - zzp-2025103151p-js6y-rcqx-pH7.2jz-dz1-5.lcd

方法文件名: RC\$QTL-4141 - QTL-4141-rcqx-FX276.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-4141 - 20260519-FX276.lcb

样品瓶号: 1-18

进样体积: 10 μl

进样时间: 2026/05/19 17:31:21

处理时间 (V2) : 2026/05/20 09:00:07

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速:2.0ml/min


波长:220nm

版本号:6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 220nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.150	2615280	100.000	610031	5864	1.048	--
总计		2615280	100.000	610031			

图6 布洛芬混悬液溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-2025103151批-pH7.2介质
对照品溶液-1-5




QTL-4141

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱 温:35°C
数据文件名: RC\$QTL-4141 - 29-13/27-767-2 - zzp-2025103151p-js6y-rcqx-pH7.2jz-5min-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4141 - QTL-4141-rcqx-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4141 - 20260519-FX276.lcb
样品瓶号: 1-1
进样体积: 10 μl
进样时间: 2026/05/19 17:34:42
处理时间 (V2) : 2026/05/20 09:00:10
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速:2.0ml/min
波长:220nm
版本号:6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 220nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.150	2654286	100.000	619517	5882	1.046	--
总计		2654286	100.000	619517			

图7 布洛芬混悬液溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-2025103151批-pH7.2介质-5min-片1
供试品溶液-1




QTL-4141

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱 温:35°C
数据文件名: RC\$QTL-4141 - 29-13/27-768-2 - zzp-2025103151p-js6y-rcqx-pH7.2jz-5min-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4141 - QTL-4141-rcqx-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4141 - 20260519-FX276.lcb
样品瓶号: 1-10
进样体积: 10 μl
进样时间: 2026/05/19 17:38:03
处理时间 (V2) : 2026/05/20 09:00:12
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速:2.0ml/min
波长:220nm
版本号:6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 220nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.149	2624474	100.000	614095	5878	1.046	--
总计		2624474	100.000	614095			

图8 布洛芬混悬液溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-2025103151批-pH7.2介质-5min-片2
供试品溶液-1




QTL-4141

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱 温:35°C
数据文件名: RC\$QTL-4141 - 29-13/27-769-2 - zzp-2025103151p-js6y-rcqx-pH7.2jz-5min-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4141 - QTL-4141-rcqx-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4141 - 20260519-FX276.lcb
样品瓶号: 1-19
进样体积: 10 μl
进样时间: 2026/05/19 17:41:25
处理时间 (V2) : 2026/05/20 09:00:15
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速:2.0ml/min
波长:220nm
版本号:6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 220nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.149	2615945	100.000	611688	5877	1.046	--
总计		2615945	100.000	611688			

图9 布洛芬混悬液溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-2025103151批-pH7.2介质-5min-片3
供试品溶液-1




QTL-4141

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱 温:35°C
数据文件名: RC\$QTL-4141 - 29-13/27-770-2 - zzp-2025103151p-js6y-rcqx-pH7.2jz-5min-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4141 - QTL-4141-rcqx-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4141 - 20260519-FX276.lcb
样品瓶号: 1-28
进样体积: 10 μl
进样时间: 2026/05/19 17:44:48
处理时间 (V2) : 2026/05/20 09:00:17
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速:2.0ml/min
波长:220nm
版本号:6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 220nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.149	2611287	100.000	611379	5881	1.047	--
总计		2611287	100.000	611379			

图10 布洛芬混悬液溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-2025103151批-pH7.2介质-5min-片4
供试品溶液-1




QTL-4141

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱 温:35°C
数据文件名: RC\$QTL-4141 - 29-13/27-771-2 - zzp-2025103151p-js6y-rcqx-pH7.2jz-5min-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4141 - QTL-4141-rcqx-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4141 - 20260519-FX276.lcb
样品瓶号: 1-37
进样体积: 10 μl
进样时间: 2026/05/19 17:48:09
处理时间 (V2) : 2026/05/20 09:00:20
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速:2.0ml/min
波长:220nm
版本号:6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 220nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.148	2622584	100.000	615586	5877	1.047	--
总计		2622584	100.000	615586			

图11 布洛芬混悬液溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-2025103151批-pH7.2介质-5min-片5
供试品溶液-1




QTL-4141

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱 温:35°C
数据文件名: RC\$QTL-4141 - 29-13/27-772-2 - zzp-2025103151p-js6y-rcqx-pH7.2jz-5min-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4141 - QTL-4141-rcqx-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4141 - 20260519-FX276.lcb
样品瓶号: 1-46
进样体积: 10 μl
进样时间: 2026/05/19 17:51:31
处理时间 (V2) : 2026/05/20 09:00:23
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速:2.0ml/min
波长:220nm
版本号:6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 220nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.148	2596689	100.000	609664	5888	1.047	--
总计		2596689	100.000	609664			

图12 布洛芬混悬液溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-2025103151批-pH7.2介质-5min-片6
供试品溶液-1



QTL-4141

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)

柱 温:35°C

数据文件名: RC\$QTL-4141 - 29-13/27-773-2 - zzp-2025103151p-js6y-rcqx-pH7.2jz-10min-P1.lcd

方法文件名: RC\$QTL-4141 - QTL-4141-rcqx-FX276.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-4141 - 20260519-FX276.lcb

样品瓶号: 1-2

进样体积: 10 μl

进样时间: 2026/05/19 17:54:54

处理时间 (V2) : 2026/05/20 09:00:25

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速:2.0ml/min


波长:220nm

版本号:6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 220nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.149	2641350	100.000	619254	5899	1.047	--
总计		2641350	100.000	619254			

图13 布洛芬混悬液溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-2025103151批-pH7.2介质-10min-片1
供试品溶液-1



QTL-4141

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)

流速:2.0ml/min

柱 温:35°C

波长:220nm

数据文件名: RC\$QTL-4141 - 29-13/27-774-2 - zzp-2025103151p-js6y-rcqx-pH7.2jz-10min-P2.lcd

方法文件名: RC\$QTL-4141 - QTL-4141-rcqx-FX276.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-4141 - 20260519-FX276.lcb

样品瓶号: 1-11

进样体积: 10 μl

进样时间: 2026/05/19 17:58:15

处理时间 (V2) : 2026/05/20 09:00:28


仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

版本号:6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 220nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.148	2652657	100.000	622770	5876	1.047	--
总计		2652657	100.000	622770			

图14 布洛芬混悬液溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-2025103151批-pH7.2介质-10min-片2
供试品溶液-1



QTL-4141

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)

柱 温:35°C

数据文件名: RC\$QTL-4141 - 29-13/27-775-2 - zzp-2025103151p-js6y-rcqx-pH7.2jz-10min-P3.lcd

方法文件名: RC\$QTL-4141 - QTL-4141-rcqx-FX276.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-4141 - 20260519-FX276.lcb

样品瓶号: 1-20

进样体积: 10 μl

进样时间: 2026/05/19 18:01:37

处理时间 (V2) : 2026/05/20 09:00:30

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速:2.0ml/min


波长:220nm

版本号:6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 220nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.149	2625969	100.000	615044	5894	1.048	--
总计		2625969	100.000	615044			

图15 布洛芬混悬液溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-2025103151批-pH7.2介质-10min-片3
供试品溶液-1




QTL-4141

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱 温:35°C
数据文件名: RC\$QTL-4141 - 29-13/27-776-2 - zzp-2025103151p-js6y-rcqx-pH7.2jz-10min-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4141 - QTL-4141-rcqx-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4141 - 20260519-FX276.lcb
样品瓶号: 1-29
进样体积: 10 μl
进样时间: 2026/05/19 18:04:58
处理时间 (V2) : 2026/05/20 09:00:33
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速:2.0ml/min
波长:220nm
版本号:6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 220nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.149	2608924	100.000	610889	5883	1.047	--
总计		2608924	100.000	610889			

图16 布洛芬混悬液溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-2025103151批-pH7.2介质-10min-片4
供试品溶液-1




QTL-4141

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱 温:35°C
数据文件名: RC\$QTL-4141 - 29-13/27-777-2 - zzp-2025103151p-js6y-rcqx-pH7.2jz-10min-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4141 - QTL-4141-rcqx-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4141 - 20260519-FX276.lcb
样品瓶号: 1-38
进样体积: 10 μl
进样时间: 2026/05/19 18:08:21
处理时间 (V2) : 2026/05/20 09:00:35
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速:2.0ml/min
波长:220nm
版本号:6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 220nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.149	2603829	100.000	611085	5900	1.048	--
总计		2603829	100.000	611085			

图17 布洛芬混悬液溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-2025103151批-pH7.2介质-10min-片5
供试品溶液-1




QTL-4141

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱 温:35°C
数据文件名: RC\$QTL-4141 - 29-13/27-778-2 - zzp-2025103151p-js6y-rcqx-pH7.2jz-10min-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4141 - QTL-4141-rcqx-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4141 - 20260519-FX276.lcb
样品瓶号: 1-47
进样体积: 10 μl
进样时间: 2026/05/19 18:11:42
处理时间 (V2) : 2026/05/20 09:00:37
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速:2.0ml/min
波长:220nm
版本号:6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 220nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.149	2606140	100.000	611047	5907	1.049	--
总计		2606140	100.000	611047			

图18 布洛芬混悬液溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-2025103151批-pH7.2介质-10min-片6
供试品溶液-1



QTL-4141

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)

柱 温:35°C

数据文件名: RC\$QTL-4141 - 29-13/27-779-2 - zzp-2025103151p-js6y-rcqx-pH7.2jz-15min-P1.lcd

方法文件名: RC\$QTL-4141 - QTL-4141-rcqx-FX276.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-4141 - 20260519-FX276.lcb

样品瓶号: 1-3

进样体积: 10 μl

进样时间: 2026/05/19 18:15:05

处理时间 (V2) : 2026/05/20 09:00:40

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速:2.0ml/min


波长:220nm

版本号:6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 220nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.148	2641790	100.000	621218	5898	1.049	--
总计		2641790	100.000	621218			

图19 布洛芬混悬液溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-2025103151批-pH7.2介质-15min-片1
供试品溶液-1




QTL-4141

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱 温:35°C
数据文件名: RC\$QTL-4141 - 29-13/27-780-2 - zzp-2025103151p-js6y-rcqx-pH7.2jz-15min-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4141 - QTL-4141-rcqx-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4141 - 20260519-FX276.lcb
样品瓶号: 1-12
进样体积: 10 μl
进样时间: 2026/05/19 18:18:26
处理时间 (V2) : 2026/05/20 09:00:42
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速:2.0ml/min
波长:220nm
版本号:6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 220nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.148	2604649	100.000	612225	5899	1.049	--
总计		2604649	100.000	612225			

图20 布洛芬混悬液溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-2025103151批-pH7.2介质-15min-片2
供试品溶液-1




QTL-4141

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱 温:35°C
数据文件名: RC\$QTL-4141 - 29-13/27-781-2 - zzp-2025103151p-js6y-rcqx-pH7.2jz-15min-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4141 - QTL-4141-rcqx-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4141 - 20260519-FX276.lcb
样品瓶号: 1-21
进样体积: 10 μl
进样时间: 2026/05/19 18:21:49
处理时间 (V2) : 2026/05/20 09:00:44
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速:2.0ml/min
波长:220nm
版本号:6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 220nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.148	2634201	100.000	618764	5890	1.048	--
总计		2634201	100.000	618764			

图21 布洛芬混悬液溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-2025103151批-pH7.2介质-15min-片3
供试品溶液-1



QTL-4141

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)

柱 温:35°C

数据文件名: RC\$QTL-4141 - 29-13/27-782-2 - zzp-2025103151p-js6y-rcqx-pH7.2jz-15min-P4.lcd

方法文件名: RC\$QTL-4141 - QTL-4141-rcqx-FX276.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-4141 - 20260519-FX276.lcb

样品瓶号: 1-30

进样体积: 10 μl

进样时间: 2026/05/19 18:25:10

处理时间 (V2) : 2026/05/20 09:00:47

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速:2.0ml/min


波长:220nm

版本号:6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 220nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.148	2613600	100.000	614281	5894	1.049	--
总计		2613600	100.000	614281			

图22 布洛芬混悬液溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-2025103151批-pH7.2介质-15min-片4
供试品溶液-1



QTL-4141

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)

柱 温:35°C

数据文件名: RC\$QTL-4141 - 29-13/27-783-2 - zzp-2025103151p-js6y-rcqx-pH7.2jz-15min-P5.lcd

方法文件名: RC\$QTL-4141 - QTL-4141-rcqx-FX276.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-4141 - 20260519-FX276.lcb

样品瓶号: 1-39

进样体积: 10 μl

进样时间: 2026/05/19 18:28:33

处理时间 (V2) : 2026/05/20 09:00:49

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速:2.0ml/min


波长:220nm

版本号:6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 220nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.148	2610089	100.000	614125	5908	1.049	--
总计		2610089	100.000	614125			

图23 布洛芬混悬液溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-2025103151批-pH7.2介质-15min-片5
供试品溶液-1




QTL-4141

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱 温:35°C
数据文件名: RC\$QTL-4141 - 29-13/27-784-2 - zzp-2025103151p-js6y-rcqx-pH7.2jz-15min-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4141 - QTL-4141-rcqx-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4141 - 20260519-FX276.lcb
样品瓶号: 1-48
进样体积: 10 μl
进样时间: 2026/05/19 18:31:54
处理时间 (V2) : 2026/05/20 09:00:52
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速:2.0ml/min
波长:220nm
版本号:6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 220nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.149	2573782	100.000	603449	5915	1.049	--
总计		2573782	100.000	603449			

图24 布洛芬混悬液溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-2025103151批-pH7.2介质-15min-片6
供试品溶液-1




QTL-4141

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱 温:35°C
数据文件名: RC\$QTL-4141 - 29-13/27-785-2 - zzp-2025103151p-js6y-rcqx-pH7.2jz-20min-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4141 - QTL-4141-rcqx-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4141 - 20260519-FX276.lcb
样品瓶号: 1-4
进样体积: 10 μl
进样时间: 2026/05/19 18:35:15
处理时间 (V2) : 2026/05/20 09:00:54
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速:2.0ml/min
波长:220nm
版本号:6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 220nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.148	2610561	100.000	613795	5904	1.049	--
总计		2610561	100.000	613795			

图25 布洛芬混悬液溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-2025103151批-pH7.2介质-20min-片1
供试品溶液-1




QTL-4141

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱 温:35°C
数据文件名: RC\$QTL-4141 - 29-13/27-786-2 - zzp-2025103151p-js6y-rcqx-pH7.2jz-20min-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4141 - QTL-4141-rcqx-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4141 - 20260519-FX276.lcb
样品瓶号: 1-13
进样体积: 10 μl
进样时间: 2026/05/19 18:38:38
处理时间 (V2) : 2026/05/20 09:00:57
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速:2.0ml/min
波长:220nm
版本号:6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 220nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.148	2600187	100.000	611300	5904	1.049	--
总计		2600187	100.000	611300			

图26 布洛芬混悬液溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-2025103151批-pH7.2介质-20min-片2
供试品溶液-1



QTL-4141

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)

柱 温:35°C

数据文件名: RC\$QTL-4141 - 29-13/27-787-2 - zzp-2025103151p-js6y-rcqx-pH7.2jz-20min-P3.lcd

方法文件名: RC\$QTL-4141 - QTL-4141-rcqx-FX276.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-4141 - 20260519-FX276.lcb

样品瓶号: 1-22

进样体积: 10 μl

进样时间: 2026/05/19 18:42:00

处理时间 (V2) : 2026/05/20 09:00:59

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速:2.0ml/min


波长:220nm

版本号:6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 220nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.148	2608179	100.000	612996	5896	1.049	--
总计		2608179	100.000	612996			

图27 布洛芬混悬液溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-2025103151批-pH7.2介质-20min-片3
供试品溶液-1



QTL-4141

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)

流速:2.0ml/min

柱 温:35°C

波长:220nm

数据文件名: RC\$QTL-4141 - 29-13/27-788-2 - zzp-2025103151p-js6y-rcqx-pH7.2jz-20min-P4.lcd

方法文件名: RC\$QTL-4141 - QTL-4141-rcqx-FX276.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-4141 - 20260519-FX276.lcb

样品瓶号: 1-31

进样体积: 10 μl

进样时间: 2026/05/19 18:45:22

处理时间 (V2) : 2026/05/20 09:01:01


仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

版本号:6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 220nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.148	2569830	100.000	604263	5904	1.049	--
总计		2569830	100.000	604263			

图28 布洛芬混悬液溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-2025103151批-pH7.2介质-20min-片4
供试品溶液-1




QTL-4141

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱 温:35°C
数据文件名: RC\$QTL-4141 - 29-13/27-789-2 - zzp-2025103151p-js6y-rcqx-pH7.2jz-20min-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4141 - QTL-4141-rcqx-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4141 - 20260519-FX276.lcb
样品瓶号: 1-40
进样体积: 10 μl
进样时间: 2026/05/19 18:48:44
处理时间 (V2) : 2026/05/20 09:01:04
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速:2.0ml/min
波长:220nm
版本号:6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 220nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.148	2586375	100.000	607759	5891	1.049	--
总计		2586375	100.000	607759			

图29 布洛芬混悬液溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-2025103151批-pH7.2介质-20min-片5
供试品溶液-1



QTL-4141

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)

柱 温:35°C

数据文件名: RC\$QTL-4141 - 29-13/27-790-2 - zzp-2025103151p-js6y-rcqx-pH7.2jz-20min-P6.lcd

方法文件名: RC\$QTL-4141 - QTL-4141-rcqx-FX276.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-4141 - 20260519-FX276.lcb

样品瓶号: 1-49

进样体积: 10 μl

进样时间: 2026/05/19 18:52:05

处理时间 (V2) : 2026/05/20 09:01:06

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速:2.0ml/min


波长:220nm

版本号:6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 220nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.148	2566602	100.000	603537	5904	1.049	--
总计		2566602	100.000	603537			

图30 布洛芬混悬液溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-2025103151批-pH7.2介质-20min-片6
供试品溶液-1



QTL-4141

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)

柱 温:35°C

数据文件名: RC\$QTL-4141 - 29-13/27-791-2 - zzp-2025103151p-js6y-rcqx-pH7.2jz-30min-P1.lcd

方法文件名: RC\$QTL-4141 - QTL-4141-rcqx-FX276.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-4141 - 20260519-FX276.lcb

样品瓶号: 1-5

进样体积: 10 μl

进样时间: 2026/05/19 18:55:28

处理时间 (V2) : 2026/05/20 09:01:08

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速:2.0ml/min


波长:220nm

版本号:6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 220nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.149	2587156	100.000	606680	5907	1.049	--
总计		2587156	100.000	606680			

图31 布洛芬混悬液溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-2025103151批-pH7.2介质-30min-片1
供试品溶液-1



QTL-4141

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)

柱 温:35°C

数据文件名: RC\$QTL-4141 - 29-13/27-792-2 - zzp-2025103151p-js6y-rcqx-pH7.2jz-30min-P2.lcd

方法文件名: RC\$QTL-4141 - QTL-4141-rcqx-FX276.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-4141 - 20260519-FX276.lcb

样品瓶号: 1-14

进样体积: 10 μl

进样时间: 2026/05/19 18:58:50

处理时间 (V2) : 2026/05/20 09:01:11

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速:2.0ml/min


波长:220nm

版本号:6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 220nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.149	2595268	100.000	609096	5904	1.049	--
总计		2595268	100.000	609096			

图32 布洛芬混悬液溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-2025103151批-pH7.2介质-30min-片2
供试品溶液-1




QTL-4141

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱 温:35°C
数据文件名: RC\$QTL-4141 - 29-13/27-793-2 - zzp-2025103151p-js6y-rcqx-pH7.2jz-30min-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4141 - QTL-4141-rcqx-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4141 - 20260519-FX276.lcb
样品瓶号: 1-23
进样体积: 10 μl
进样时间: 2026/05/19 19:02:11
处理时间 (V2) : 2026/05/20 09:01:14
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速:2.0ml/min
波长:220nm
版本号:6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 220nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.148	2579952	100.000	607102	5906	1.049	--
总计		2579952	100.000	607102			

图33 布洛芬混悬液溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-2025103151批-pH7.2介质-30min-片3
供试品溶液-1



QTL-4141

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)

柱 温:35°C

数据文件名: RC\$QTL-4141 - 29-13/27-794-2 - zzp-2025103151p-js6y-rcqx-pH7.2jz-30min-P4.lcd

方法文件名: RC\$QTL-4141 - QTL-4141-rcqx-FX276.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-4141 - 20260519-FX276.lcb

样品瓶号: 1-32

进样体积: 10 μl

进样时间: 2026/05/19 19:05:34

处理时间 (V2) : 2026/05/20 09:01:16

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速:2.0ml/min


波长:220nm

版本号:6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 220nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.148	2563705	100.000	603219	5901	1.049	--
总计		2563705	100.000	603219			

图34 布洛芬混悬液溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-2025103151批-pH7.2介质-30min-片4
供试品溶液-1




QTL-4141

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱 温:35°C
数据文件名: RC\$QTL-4141 - 29-13/27-795-2 - zzp-2025103151p-js6y-rcqx-pH7.2jz-30min-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4141 - QTL-4141-rcqx-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4141 - 20260519-FX276.lcb
样品瓶号: 1-41
进样体积: 10 μl
进样时间: 2026/05/19 19:08:57
处理时间 (V2) : 2026/05/20 09:01:19
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速:2.0ml/min
波长:220nm
版本号:6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 220nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.149	2564179	100.000	601322	5905	1.049	--
总计		2564179	100.000	601322			

图35 布洛芬混悬液溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-2025103151批-pH7.2介质-30min-片5
供试品溶液-1



QTL-4141

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)

流速:2.0ml/min

柱 温:35°C

波长:220nm

数据文件名: RC\$QTL-4141 - 29-13/27-796-2 - zzp-2025103151p-js6y-rcqx-pH7.2jz-30min-P6.lcd

方法文件名: RC\$QTL-4141 - QTL-4141-rcqx-FX276.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-4141 - 20260519-FX276.lcb

样品瓶号: 1-50

进样体积: 10 μl

进样时间: 2026/05/19 19:12:19

版本号:6.115


实验者: jiangjinwei

处理时间 (V2) : 2026/05/20 09:01:21

处理者: jiangjinwei

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 220nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.148	2557524	100.000	601938	5908	1.050	--
总计		2557524	100.000	601938			

图36 布洛芬混悬液溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-2025103151批-pH7.2介质-30min-片6
供试品溶液-1



QTL-4141

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)

柱 温:35°C

数据文件名: RC\$QTL-4141 - 29-13/27-797-2 - zzp-2025103151p-js6y-rcqx-pH7.2jz-jxzs-P1.lcd

方法文件名: RC\$QTL-4141 - QTL-4141-rcqx-FX276.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-4141 - 20260519-FX276.lcb

样品瓶号: 1-6

进样体积: 10 μl

进样时间: 2026/05/19 19:15:41

处理时间 (V2) : 2026/05/20 09:01:23

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速:2.0ml/min


波长:220nm

版本号:6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 220nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.149	2591745	100.000	608477	5915	1.050	--
总计		2591745	100.000	608477			

图37 布洛芬混悬液溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-2025103151批-pH7.2介质-极限转速-片1
供试品溶液-1



QTL-4141

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)

柱 温:35°C

数据文件名: RC\$QTL-4141 - 29-13/27-798-2 - zzp-2025103151p-js6y-rcqx-pH7.2jz-jxzs-P2.lcd

方法文件名: RC\$QTL-4141 - QTL-4141-rcqx-FX276.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-4141 - 20260519-FX276.lcb

样品瓶号: 1-15

进样体积: 10 μl

进样时间: 2026/05/19 19:19:04

处理时间 (V2) : 2026/05/20 09:01:26

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速:2.0ml/min


波长:220nm

版本号:6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 220nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.149	2606644	100.000	612053	5907	1.049	--
总计		2606644	100.000	612053			

图38 布洛芬混悬液溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-2025103151批-pH7.2介质-极限转速-片2
供试品溶液-1




QTL-4141

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱 温:35°C
数据文件名: RC\$QTL-4141 - 29-13/27-799-2 - zzp-2025103151p-js6y-rcqx-pH7.2jz-jxzs-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4141 - QTL-4141-rcqx-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4141 - 20260519-FX276.lcb
样品瓶号: 1-24
进样体积: 10 μl
进样时间: 2026/05/19 19:22:25
处理时间 (V2) : 2026/05/20 09:01:28
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速:2.0ml/min
波长:220nm
版本号:6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 220nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.149	2553632	100.000	600358	5923	1.050	--
总计		2553632	100.000	600358			

图39 布洛芬混悬液溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-2025103151批-pH7.2介质-极限转速-片3
供试品溶液-1



QTL-4141

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)

柱 温:35°C

数据文件名: RC\$QTL-4141 - 29-13/27-800-2 - zzp-2025103151p-js6y-rcqx-pH7.2jz-jxzs-P4.lcd

方法文件名: RC\$QTL-4141 - QTL-4141-rcqx-FX276.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-4141 - 20260519-FX276.lcb

样品瓶号: 1-33

进样体积: 10 μl

进样时间: 2026/05/19 19:25:47

处理时间 (V2) : 2026/05/20 09:01:31

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速:2.0ml/min


波长:220nm

版本号:6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 220nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.148	2535724	100.000	596884	5912	1.050	--
总计		2535724	100.000	596884			

图40 布洛芬混悬液溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-2025103151批-pH7.2介质-极限转速-片4
供试品溶液-1




QTL-4141

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱 温:35°C
数据文件名: RC\$QTL-4141 - 29-13/27-801-2 - zzp-2025103151p-js6y-rcqx-pH7.2jz-jxzs-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4141 - QTL-4141-rcqx-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4141 - 20260519-FX276.lcb
样品瓶号: 1-42
进样体积: 10 μl
进样时间: 2026/05/19 19:29:09
处理时间 (V2) : 2026/05/20 09:01:33
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速:2.0ml/min
波长:220nm
版本号:6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 220nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.148	2574585	100.000	605460	5902	1.050	--
总计		2574585	100.000	605460			

图41 布洛芬混悬液溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-2025103151批-pH7.2介质-极限转速-片5
供试品溶液-1




QTL-4141

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱 温:35°C
数据文件名: RC\$QTL-4141 - 29-13/27-802-2 - zzp-2025103151p-js6y-rcqx-pH7.2jz-jxzs-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4141 - QTL-4141-rcqx-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4141 - 20260519-FX276.lcb
样品瓶号: 1-51
进样体积: 10 μl
进样时间: 2026/05/19 19:32:30
处理时间 (V2) : 2026/05/20 09:01:35
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速:2.0ml/min
波长:220nm
版本号:6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 220nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.148	2524398	100.000	594790	5922	1.050	--
总计		2524398	100.000	594790			

图42 布洛芬混悬液溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-2025103151批-pH7.2介质-极限转速-片6
供试品溶液-1




QTL-4141

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱 温:35°C
数据文件名: RC\$QTL-4141 - 29-13/27-803-2 - zzp-2025103151p-js6y-rcqx-pH7.2jz-dz2-1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4141 - QTL-4141-rcqx-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4141 - 20260519-FX276.lcb
样品瓶号: 1-27
进样体积: 10 μl
进样时间: 2026/05/19 19:35:54
处理时间 (V2) : 2026/05/20 09:01:38
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速:2.0ml/min
波长:220nm
版本号:6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.148	2612090	100.000	614181	5898	1.051	--
总计		2612090	100.000	614181			

图43 布洛芬混悬液溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-2025103151批-pH7.2介质
对照品溶液-2-1



QTL-4141

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)

流速:2.0ml/min

柱 温:35°C

波长:220nm

数据文件名: RC\$QTL-4141 - 29-13/27-804-2 - zzp-2025103151p-js6y-rcqx-pH7.2jz-dz2-2.lcd

方法文件名: RC\$QTL-4141 - QTL-4141-rcqx-FX276.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-4141 - 20260519-FX276.lcb

样品瓶号: 1-27

进样体积: 10 μl

进样时间: 2026/05/19 19:39:17

版本号:6.115


实验者: jiangjinwei

处理时间 (V2) : 2026/05/20 09:01:40

处理者: jiangjinwei

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 220nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.148	2601241	100.000	612133	5903	1.052	--
总计		2601241	100.000	612133			

图44 布洛芬混悬液溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-2025103151批-pH7.2介质
对照品溶液-2-2




QTL-4141

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱 温:35°C
数据文件名: RC\$QTL-4141 - 29-13/27-805-2 - zzp-2025110151p-js6y-rcqx-pH7.2jz-rj.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4141 - QTL-4141-rcqx-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4141 - 20260519-FX276.lcb
样品瓶号: 2-9
进样体积: 10 μl
进样时间: 2026/05/19 19:42:40
处理时间 (V2) : 2026/05/20 09:01:42
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速:2.0ml/min
波长:220nm
版本号:6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 220nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图45 布洛芬混悬液溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-2025110151批-pH7.2介质
溶剂



QTL-4141

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)

柱 温:35°C

数据文件名: RC\$QTL-4141 - 29-13/27-806-2 - zzp-2025110151p-js6y-rcqx-pH7.2jz-dz1-1.lcd

方法文件名: RC\$QTL-4141 - QTL-4141-rcqx-FX276.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-4141 - 20260519-FX276.lcb

样品瓶号: 2-18

进样体积: 10 μl

进样时间: 2026/05/19 19:46:04

处理时间 (V2) : 2026/05/20 09:01:45

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速:2.0ml/min


波长:220nm

版本号:6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 220nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.149	2605845	100.000	611901	5901	1.052	--
总计		2605845	100.000	611901			

图46 布洛芬混悬液溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-2025110151批-pH7.2介质
对照品溶液-1-1




QTL-4141

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱 温:35°C
数据文件名: RC\$QTL-4141 - 29-13/27-807-2 - zzp-2025110151p-js6y-rcqx-pH7.2jz-dz1-2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4141 - QTL-4141-rcqx-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4141 - 20260519-FX276.lcb
样品瓶号: 2-18
进样体积: 10 μl
进样时间: 2026/05/19 19:49:29
处理时间 (V2) : 2026/05/20 09:01:47
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速:2.0ml/min
波长:220nm
版本号:6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 220nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.148	2611286	100.000	613365	5886	1.052	--
总计		2611286	100.000	613365			

图47 布洛芬混悬液溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-2025110151批-pH7.2介质
对照品溶液-1-2



QTL-4141

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)

柱 温:35°C

数据文件名: RC\$QTL-4141 - 29-13/27-808-2 - zzp-2025110151p-js6y-rcqx-pH7.2jz-dz1-3.lcd

方法文件名: RC\$QTL-4141 - QTL-4141-rcqx-FX276.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-4141 - 20260519-FX276.lcb

样品瓶号: 2-18

进样体积: 10 μl

进样时间: 2026/05/19 19:52:53

处理时间 (V2) : 2026/05/20 09:01:50

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速:2.0ml/min


波长:220nm

版本号:6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 220nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.149	2613883	100.000	613022	5886	1.051	--
总计		2613883	100.000	613022			

图48 布洛芬混悬液溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-2025110151批-pH7.2介质
对照品溶液-1-3




QTL-4141

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱 温:35°C
数据文件名: RC\$QTL-4141 - 29-13/27-809-2 - zzp-2025110151p-js6y-rcqx-pH7.2jz-dz1-4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4141 - QTL-4141-rcqx-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4141 - 20260519-FX276.lcb
样品瓶号: 2-18
进样体积: 10 μl
进样时间: 2026/05/19 19:56:17
处理时间 (V2) : 2026/05/20 09:01:52
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速:2.0ml/min
波长:220nm
版本号:6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 220nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.148	2608232	100.000	613009	5891	1.052	--
总计		2608232	100.000	613009			

图49 布洛芬混悬液溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-2025110151批-pH7.2介质
对照品溶液-1-4




QTL-4141

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱 温:35°C
数据文件名: RC\$QTL-4141 - 29-13/27-810-2 - zzp-2025110151p-js6y-rcqx-pH7.2jz-dz1-5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4141 - QTL-4141-rcqx-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4141 - 20260519-FX276.lcb
样品瓶号: 2-18
进样体积: 10 μl
进样时间: 2026/05/19 19:59:41
处理时间 (V2) : 2026/05/20 09:01:54
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速:2.0ml/min
波长:220nm
版本号:6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 220nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.149	2607950	100.000	612488	5890	1.052	--
总计		2607950	100.000	612488			

图50 布洛芬混悬液溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-2025110151批-pH7.2介质
对照品溶液-1-5




QTL-4141

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱 温:35°C
数据文件名: RC\$QTL-4141 - 29-13/27-811-2 - zzp-2025110151p-js6y-rcqx-pH7.2jz-5min-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4141 - QTL-4141-rcqx-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4141 - 20260519-FX276.lcb
样品瓶号: 2-1
进样体积: 10 μl
进样时间: 2026/05/19 20:03:05
处理时间 (V2) : 2026/05/20 09:01:57
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速:2.0ml/min
波长:220nm
版本号:6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 220nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.148	2559109	100.000	601562	5896	1.050	--
总计		2559109	100.000	601562			

图51 布洛芬混悬液溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-2025110151批-pH7.2介质-5min-片1
供试品溶液-1




QTL-4141

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱 温:35°C
数据文件名: RC\$QTL-4141 - 29-13/27-812-2 - zzp-2025110151p-js6y-rcqx-pH7.2jz-5min-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4141 - QTL-4141-rcqx-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4141 - 20260519-FX276.lcb
样品瓶号: 2-10
进样体积: 10 μl
进样时间: 2026/05/19 20:06:28
处理时间 (V2) : 2026/05/20 09:01:59
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速:2.0ml/min
波长:220nm
版本号:6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 220nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.148	2600610	100.000	612174	5905	1.051	--
总计		2600610	100.000	612174			

图52 布洛芬混悬液溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-2025110151批-pH7.2介质-5min-片2
供试品溶液-1




QTL-4141

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱 温:35°C
数据文件名: RC\$QTL-4141 - 29-13/27-813-2 - zzp-2025110151p-js6y-rcqx-pH7.2jz-5min-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4141 - QTL-4141-rcqx-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4141 - 20260519-FX276.lcb
样品瓶号: 2-19
进样体积: 10 μl
进样时间: 2026/05/19 20:09:51
处理时间 (V2) : 2026/05/20 09:02:01
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速:2.0ml/min
波长:220nm
版本号:6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 220nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.148	2614538	100.000	615353	5908	1.050	--
总计		2614538	100.000	615353			

图53 布洛芬混悬液溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-2025110151批-pH7.2介质-5min-片3
供试品溶液-1




QTL-4141

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱 温:35°C
数据文件名: RC\$QTL-4141 - 29-13/27-814-2 - zzp-2025110151p-js6y-rcqx-pH7.2jz-5min-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4141 - QTL-4141-rcqx-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4141 - 20260519-FX276.lcb
样品瓶号: 2-28
进样体积: 10 μl
进样时间: 2026/05/19 20:13:16
处理时间 (V2) : 2026/05/20 09:02:04
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速:2.0ml/min
波长:220nm
版本号:6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 220nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.148	2588923	100.000	609475	5911	1.050	--
总计		2588923	100.000	609475			

图54 布洛芬混悬液溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-2025110151批-pH7.2介质-5min-片4
供试品溶液-1




QTL-4141

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱 温:35°C
数据文件名: RC\$QTL-4141 - 29-13/27-815-2 - zzp-2025110151p-js6y-rcqx-pH7.2jz-5min-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4141 - QTL-4141-rcqx-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4141 - 20260519-FX276.lcb
样品瓶号: 2-37
进样体积: 10 μl
进样时间: 2026/05/19 20:16:38
处理时间 (V2) : 2026/05/20 09:02:06
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速:2.0ml/min
波长:220nm
版本号:6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 220nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.148	2570646	100.000	604876	5907	1.050	--
总计		2570646	100.000	604876			

图55 布洛芬混悬液溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-2025110151批-pH7.2介质-5min-片5
供试品溶液-1



QTL-4141

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)

柱 温:35°C

数据文件名: RC\$QTL-4141 - 29-13/27-816-2 - zzp-2025110151p-js6y-rcqx-pH7.2jz-5min-P6.lcd

方法文件名: RC\$QTL-4141 - QTL-4141-rcqx-FX276.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-4141 - 20260519-FX276.lcb

样品瓶号: 2-46

进样体积: 10 μl

进样时间: 2026/05/19 20:20:01

处理时间 (V2) : 2026/05/20 09:02:09

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速:2.0ml/min


波长:220nm

版本号:6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 220nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.148	2571293	100.000	604631	5902	1.050	--
总计		2571293	100.000	604631			

图56 布洛芬混悬液溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-2025110151批-pH7.2介质-5min-片6
供试品溶液-1



QTL-4141

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)

柱 温:35°C

数据文件名: RC\$QTL-4141 - 29-13/27-817-2 - zzp-2025110151p-js6y-rcqx-pH7.2jz-10min-P1.lcd

方法文件名: RC\$QTL-4141 - QTL-4141-rcqx-FX276.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-4141 - 20260519-FX276.lcb

样品瓶号: 2-2

进样体积: 10 μl

进样时间: 2026/05/19 20:23:25

处理时间 (V2) : 2026/05/20 09:02:11

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速:2.0ml/min


波长:220nm

版本号:6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 220nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.149	2610556	100.000	613055	5909	1.051	--
总计		2610556	100.000	613055			

图57 布洛芬混悬液溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-2025110151批-pH7.2介质-10min-片1
供试品溶液-1




QTL-4141

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱 温:35°C
数据文件名: RC\$QTL-4141 - 29-13/27-818-2 - zzp-2025110151p-js6y-rcqx-pH7.2jz-10min-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4141 - QTL-4141-rcqx-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4141 - 20260519-FX276.lcb
样品瓶号: 2-11
进样体积: 10 μl
进样时间: 2026/05/19 20:26:48
处理时间 (V2) : 2026/05/20 09:02:14
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速:2.0ml/min
波长:220nm
版本号:6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 220nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.149	2605071	100.000	611827	5921	1.051	--
总计		2605071	100.000	611827			

图58 布洛芬混悬液溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-2025110151批-pH7.2介质-10min-片2
供试品溶液-1



QTL-4141

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)

流速:2.0ml/min

柱 温:35°C

波长:220nm

数据文件名: RC\$QTL-4141 - 29-13/27-819-2 - zzp-2025110151p-js6y-rcqx-pH7.2jz-10min-P3.lcd

方法文件名: RC\$QTL-4141 - QTL-4141-rcqx-FX276.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-4141 - 20260519-FX276.lcb

样品瓶号: 2-20

进样体积: 10 μl

进样时间: 2026/05/19 20:30:11

版本号:6.115


处理时间 (V2) : 2026/05/20 09:02:17

实验者: jiangjinwei

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 220nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.149	2611203	100.000	612931	5914	1.050	--
总计		2611203	100.000	612931			

图59 布洛芬混悬液溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-2025110151批-pH7.2介质-10min-片3
供试品溶液-1




QTL-4141

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱 温:35°C
数据文件名: RC\$QTL-4141 - 29-13/27-820-2 - zzp-2025110151p-js6y-rcqx-pH7.2jz-10min-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4141 - QTL-4141-rcqx-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4141 - 20260519-FX276.lcb
样品瓶号: 2-29
进样体积: 10 μl
进样时间: 2026/05/19 20:33:34
处理时间 (V2) : 2026/05/20 09:02:19
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速:2.0ml/min
波长:220nm
版本号:6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 220nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.148	2602106	100.000	612524	5907	1.051	--
总计		2602106	100.000	612524			

图60 布洛芬混悬液溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-2025110151批-pH7.2介质-10min-片4
供试品溶液-1




QTL-4141

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱 温:35°C
数据文件名: RC\$QTL-4141 - 29-13/27-821-2 - zzp-2025110151p-js6y-rcqx-pH7.2jz-10min-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4141 - QTL-4141-rcqx-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4141 - 20260519-FX276.lcb
样品瓶号: 2-38
进样体积: 10 μl
进样时间: 2026/05/19 20:36:58
处理时间 (V2) : 2026/05/20 09:02:21
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速:2.0ml/min
波长:220nm
版本号:6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 220nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.148	2585218	100.000	608127	5903	1.050	--
总计		2585218	100.000	608127			

图61 布洛芬混悬液溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-2025110151批-pH7.2介质-10min-片5
供试品溶液-1



QTL-4141

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)

柱 温:35°C

数据文件名: RC\$QTL-4141 - 29-13/27-822-2 - zzp-2025110151p-js6y-rcqx-pH7.2jz-10min-P6.lcd

方法文件名: RC\$QTL-4141 - QTL-4141-rcqx-FX276.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-4141 - 20260519-FX276.lcb

样品瓶号: 2-47

进样体积: 10 μl

进样时间: 2026/05/19 20:40:22

处理时间 (V2) : 2026/05/20 09:02:24

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速:2.0ml/min


波长:220nm

版本号:6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 220nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.149	2583829	100.000	607396	5900	1.051	--
总计		2583829	100.000	607396			

图62 布洛芬混悬液溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-2025110151批-pH7.2介质-10min-片6
供试品溶液-1



QTL-4141

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)

流速:2.0ml/min

柱 温:35°C

波长:220nm

数据文件名: RC\$QTL-4141 - 29-13/27-823-2 - zzp-2025110151p-js6y-rcqx-pH7.2jz-15min-P1.lcd

方法文件名: RC\$QTL-4141 - QTL-4141-rcqx-FX276.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-4141 - 20260519-FX276.lcb

样品瓶号: 2-3

进样体积: 10 μl

进样时间: 2026/05/19 20:43:46

处理时间 (V2) : 2026/05/20 09:02:26


仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

版本号:6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 220nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.149	2579666	100.000	606723	5917	1.051	--
总计		2579666	100.000	606723			

图63 布洛芬混悬液溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-2025110151批-pH7.2介质-15min-片1
供试品溶液-1




QTL-4141

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱 温:35°C
数据文件名: RC\$QTL-4141 - 29-13/27-824-2 - zzp-2025110151p-js6y-rcqx-pH7.2jz-15min-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4141 - QTL-4141-rcqx-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4141 - 20260519-FX276.lcb
样品瓶号: 2-12
进样体积: 10 μl
进样时间: 2026/05/19 20:47:09
处理时间 (V2) : 2026/05/20 09:02:29
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速:2.0ml/min
波长:220nm
版本号:6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 220nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.149	2577045	100.000	604338	5921	1.051	--
总计		2577045	100.000	604338			

图64 布洛芬混悬液溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-2025110151批-pH7.2介质-15min-片2
供试品溶液-1



QTL-4141

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)

流速:2.0ml/min

柱 温:35°C

波长:220nm

数据文件名: RC\$QTL-4141 - 29-13/27-825-2 - zzp-2025110151p-js6y-rcqx-pH7.2jz-15min-P3.lcd

方法文件名: RC\$QTL-4141 - QTL-4141-rcqx-FX276.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-4141 - 20260519-FX276.lcb

样品瓶号: 2-21

进样体积: 10 μl

进样时间: 2026/05/19 20:50:34

版本号:6.115


实验者: jiangjinwei

处理时间 (V2) : 2026/05/20 09:02:31

处理者: jiangjinwei

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 220nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.148	2609241	100.000	614052	5908	1.051	--
总计		2609241	100.000	614052			

图65 布洛芬混悬液溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-2025110151批-pH7.2介质-15min-片3
供试品溶液-1



QTL-4141

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)

柱 温:35°C

数据文件名: RC\$QTL-4141 - 29-13/27-826-2 - zzp-2025110151p-js6y-rcqx-pH7.2jz-15min-P4.lcd

方法文件名: RC\$QTL-4141 - QTL-4141-rcqx-FX276.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-4141 - 20260519-FX276.lcb

样品瓶号: 2-30

进样体积: 10 μl

进样时间: 2026/05/19 20:53:57

处理时间 (V2) : 2026/05/20 09:02:33

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速:2.0ml/min


波长:220nm

版本号:6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 220nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.149	2592782	100.000	608730	5909	1.051	--
总计		2592782	100.000	608730			

图66 布洛芬混悬液溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-2025110151批-pH7.2介质-15min-片4
供试品溶液-1




QTL-4141

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱 温:35°C
数据文件名: RC\$QTL-4141 - 29-13/27-827-2 - zzp-2025110151p-js6y-rcqx-pH7.2jz-15min-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4141 - QTL-4141-rcqx-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4141 - 20260519-FX276.lcb
样品瓶号: 2-39
进样体积: 10 μl
进样时间: 2026/05/19 20:57:21
处理时间 (V2) : 2026/05/20 09:02:36
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速:2.0ml/min
波长:220nm
版本号:6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 220nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.149	2580194	100.000	606801	5928	1.051	--
总计		2580194	100.000	606801			

图67 布洛芬混悬液溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-2025110151批-pH7.2介质-15min-片5
供试品溶液-1



QTL-4141

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)

流速:2.0ml/min

柱 温:35°C

波长:220nm

数据文件名: RC\$QTL-4141 - 29-13/27-828-2 - zzp-2025110151p-js6y-rcqx-pH7.2jz-15min-P6.lcd

方法文件名: RC\$QTL-4141 - QTL-4141-rcqx-FX276.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-4141 - 20260519-FX276.lcb

样品瓶号: 2-48

进样体积: 10 μl

进样时间: 2026/05/19 21:00:44

处理时间 (V2) : 2026/05/20 09:02:38


仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

版本号:6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 220nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.150	2568059	100.000	600493	5909	1.051	--
总计		2568059	100.000	600493			

图68 布洛芬混悬液溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-2025110151批-pH7.2介质-15min-片6
供试品溶液-1




QTL-4141

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱 温:35°C
数据文件名: RC\$QTL-4141 - 29-13/27-829-2 - zzp-2025110151p-js6y-rcqx-pH7.2jz-20min-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4141 - QTL-4141-rcqx-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4141 - 20260519-FX276.lcb
样品瓶号: 2-4
进样体积: 10 μl
进样时间: 2026/05/19 21:04:08
处理时间 (V2) : 2026/05/20 09:02:41
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速:2.0ml/min
波长:220nm
版本号:6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 220nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.148	2596202	100.000	610803	5907	1.051	--
总计		2596202	100.000	610803			

图69 布洛芬混悬液溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-2025110151批-pH7.2介质-20min-片1
供试品溶液-1



QTL-4141

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)

流速:2.0ml/min

柱 温:35°C

波长:220nm

数据文件名: RC\$QTL-4141 - 29-13/27-830-2 - zzp-2025110151p-js6y-rcqx-pH7.2jz-20min-P2.lcd

方法文件名: RC\$QTL-4141 - QTL-4141-rcqx-FX276.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-4141 - 20260519-FX276.lcb

样品瓶号: 2-13

进样体积: 10 μl

进样时间: 2026/05/19 21:07:31

处理时间 (V2) : 2026/05/20 09:02:43


仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

版本号:6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 220nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.149	2585642	100.000	607430	5916	1.051	--
总计		2585642	100.000	607430			

图70 布洛芬混悬液溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-2025110151批-pH7.2介质-20min-片2
供试品溶液-1




QTL-4141

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱 温:35°C
数据文件名: RC\$QTL-4141 - 29-13/27-831-2 - zzp-2025110151p-js6y-rcqx-pH7.2jz-20min-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4141 - QTL-4141-rcqx-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4141 - 20260519-FX276.lcb
样品瓶号: 2-22
进样体积: 10 μl
进样时间: 2026/05/19 21:10:55
处理时间 (V2) : 2026/05/20 09:02:45
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速:2.0ml/min
波长:220nm
版本号:6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 220nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.149	2600467	100.000	611205	5909	1.051	--
总计		2600467	100.000	611205			

图71 布洛芬混悬液溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-2025110151批-pH7.2介质-20min-片3
供试品溶液-1



QTL-4141

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)

流速:2.0ml/min

柱 温:35°C

波长:220nm

数据文件名: RC\$QTL-4141 - 29-13/27-832-2 - zzp-2025110151p-js6y-rcqx-pH7.2jz-20min-P4.lcd

方法文件名: RC\$QTL-4141 - QTL-4141-rcqx-FX276.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-4141 - 20260519-FX276.lcb

样品瓶号: 2-31

进样体积: 10 μl

进样时间: 2026/05/19 21:14:19

处理时间 (V2) : 2026/05/20 09:02:48


仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

版本号:6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 220nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.149	2577014	100.000	605982	5906	1.051	--
总计		2577014	100.000	605982			

图72 布洛芬混悬液溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-2025110151批-pH7.2介质-20min-片4
供试品溶液-1




QTL-4141

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱 温:35°C
数据文件名: RC\$QTL-4141 - 29-13/27-833-2 - zzp-2025110151p-js6y-rcqx-pH7.2jz-20min-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4141 - QTL-4141-rcqx-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4141 - 20260519-FX276.lcb
样品瓶号: 2-40
进样体积: 10 μl
进样时间: 2026/05/19 21:17:42
处理时间 (V2) : 2026/05/20 09:02:51
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速:2.0ml/min
波长:220nm
版本号:6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 220nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.150	2561661	100.000	599893	5922	1.052	--
总计		2561661	100.000	599893			

图73 布洛芬混悬液溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-2025110151批-pH7.2介质-20min-片5
供试品溶液-1



QTL-4141

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)

流速:2.0ml/min

柱 温:35°C

波长:220nm

数据文件名: RC\$QTL-4141 - 29-13/27-834-2 - zzp-2025110151p-js6y-rcqx-pH7.2jz-20min-P6.lcd

方法文件名: RC\$QTL-4141 - QTL-4141-rcqx-FX276.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-4141 - 20260519-FX276.lcb

样品瓶号: 2-49

进样体积: 10 μl

进样时间: 2026/05/19 21:21:06

处理时间 (V2) : 2026/05/20 09:02:53


仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

版本号:6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 220nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.149	2551511	100.000	598726	5926	1.052	--
总计		2551511	100.000	598726			

图74 布洛芬混悬液溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-2025110151批-pH7.2介质-20min-片6
供试品溶液-1



QTL-4141

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)

流速:2.0ml/min

柱 温:35°C

波长:220nm

数据文件名: RC\$QTL-4141 - 29-13/27-835-2 - zzp-2025110151p-js6y-rcqx-pH7.2jz-30min-P1.lcd

方法文件名: RC\$QTL-4141 - QTL-4141-rcqx-FX276.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-4141 - 20260519-FX276.lcb

样品瓶号: 2-5

进样体积: 10 μl

进样时间: 2026/05/19 21:24:30

版本号:6.115


实验者: jiangjinwei

处理时间 (V2) : 2026/05/20 09:02:56

处理者: jiangjinwei

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 220nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.149	2564660	100.000	603118	5908	1.052	--
总计		2564660	100.000	603118			

图75 布洛芬混悬液溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-2025110151批-pH7.2介质-30min-片1
供试品溶液-1




QTL-4141

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱 温:35°C
数据文件名: RC\$QTL-4141 - 29-13/27-836-2 - zzp-2025110151p-js6y-rcqx-pH7.2jz-30min-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4141 - QTL-4141-rcqx-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4141 - 20260519-FX276.lcb
样品瓶号: 2-14
进样体积: 10 μl
进样时间: 2026/05/19 21:27:54
处理时间 (V2) : 2026/05/20 09:02:58
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速:2.0ml/min
波长:220nm
版本号:6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 220nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.149	2570263	100.000	604256	5917	1.052	--
总计		2570263	100.000	604256			

图76 布洛芬混悬液溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-2025110151批-pH7.2介质-30min-片2
供试品溶液-1




QTL-4141

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱 温:35°C
数据文件名: RC\$QTL-4141 - 29-13/27-837-2 - zzp-2025110151p-js6y-rcqx-pH7.2jz-30min-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4141 - QTL-4141-rcqx-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4141 - 20260519-FX276.lcb
样品瓶号: 2-23
进样体积: 10 μl
进样时间: 2026/05/19 21:31:17
处理时间 (V2) : 2026/05/20 09:03:01
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速:2.0ml/min
波长:220nm
版本号:6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 220nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.149	2584813	100.000	608043	5920	1.052	--
总计		2584813	100.000	608043			

图77 布洛芬混悬液溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-2025110151批-pH7.2介质-30min-片3
供试品溶液-1




QTL-4141

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱 温:35°C
数据文件名: RC\$QTL-4141 - 29-13/27-838-2 - zzp-2025110151p-js6y-rcqx-pH7.2jz-30min-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4141 - QTL-4141-rcqx-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4141 - 20260519-FX276.lcb
样品瓶号: 2-32
进样体积: 10 μl
进样时间: 2026/05/19 21:34:42
处理时间 (V2) : 2026/05/20 09:03:03
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速:2.0ml/min
波长:220nm
版本号:6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 220nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.149	2560278	100.000	602480	5913	1.052	--
总计		2560278	100.000	602480			

图78 布洛芬混悬液溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-2025110151批-pH7.2介质-30min-片4
供试品溶液-1




QTL-4141

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱 温:35°C
数据文件名: RC\$QTL-4141 - 29-13/27-839-2 - zzp-2025110151p-js6y-rcqx-pH7.2jz-30min-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4141 - QTL-4141-rcqx-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4141 - 20260519-FX276.lcb
样品瓶号: 2-41
进样体积: 10 μl
进样时间: 2026/05/19 21:38:04
处理时间 (V2) : 2026/05/20 09:03:06
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速:2.0ml/min
波长:220nm
版本号:6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 220nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.149	2555009	100.000	600881	5917	1.052	--
总计		2555009	100.000	600881			

图79 布洛芬混悬液溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-2025110151批-pH7.2介质-30min-片5
供试品溶液-1




QTL-4141

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱 温:35°C
数据文件名: RC\$QTL-4141 - 29-13/27-840-2 - zzp-2025110151p-js6y-rcqx-pH7.2jz-30min-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4141 - QTL-4141-rcqx-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4141 - 20260519-FX276.lcb
样品瓶号: 2-50
进样体积: 10 μl
进样时间: 2026/05/19 21:41:28
处理时间 (V2) : 2026/05/20 09:03:08
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速:2.0ml/min
波长:220nm
版本号:6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 220nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.149	2566412	100.000	602769	5903	1.051	--
总计		2566412	100.000	602769			

图80 布洛芬混悬液溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-2025110151批-pH7.2介质-30min-片6
供试品溶液-1



QTL-4141

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)

柱 温:35°C

数据文件名: RC\$QTL-4141 - 29-13/27-841-2 - zzp-2025110151p-js6y-rcqx-pH7.2jz-jxzs-P1.lcd

方法文件名: RC\$QTL-4141 - QTL-4141-rcqx-FX276.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-4141 - 20260519-FX276.lcb

样品瓶号: 2-6

进样体积: 10 μl

进样时间: 2026/05/19 21:44:52

处理时间 (V2) : 2026/05/20 09:03:11

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速:2.0ml/min


波长:220nm

版本号:6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 220nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.149	2557828	100.000	600608	5907	1.052	--
总计		2557828	100.000	600608			

图81 布洛芬混悬液溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-2025110151批-pH7.2介质-极限转速-片1
供试品溶液-1



QTL-4141

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)

柱 温:35°C

数据文件名: RC\$QTL-4141 - 29-13/27-842-2 - zzp-2025110151p-js6y-rcqx-pH7.2jz-jxzs-P2.lcd

方法文件名: RC\$QTL-4141 - QTL-4141-rcqx-FX276.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-4141 - 20260519-FX276.lcb

样品瓶号: 2-15

进样体积: 10 μl

进样时间: 2026/05/19 21:48:16

处理时间 (V2) : 2026/05/20 09:03:13

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速:2.0ml/min


波长:220nm

版本号:6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 220nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.149	2558086	100.000	600999	5916	1.052	--
总计		2558086	100.000	600999			

图82 布洛芬混悬液溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-2025110151批-pH7.2介质-极限转速-片2
供试品溶液-1




QTL-4141

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱 温:35°C
数据文件名: RC\$QTL-4141 - 29-13/27-843-2 - zzp-2025110151p-js6y-rcqx-pH7.2jz-jxzs-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4141 - QTL-4141-rcqx-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4141 - 20260519-FX276.lcb
样品瓶号: 2-24
进样体积: 10 μl
进样时间: 2026/05/19 21:51:40
处理时间 (V2) : 2026/05/20 09:03:15
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速:2.0ml/min
波长:220nm
版本号:6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 220nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.149	2556072	100.000	600804	5913	1.052	--
总计		2556072	100.000	600804			

图83 布洛芬混悬液溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-2025110151批-pH7.2介质-极限转速-片3
供试品溶液-1



QTL-4141

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)

柱 温:35°C

数据文件名: RC\$QTL-4141 - 29-13/27-844-2 - zzp-2025110151p-js6y-rcqx-pH7.2jz-jxzs-P4.lcd

方法文件名: RC\$QTL-4141 - QTL-4141-rcqx-FX276.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-4141 - 20260519-FX276.lcb

样品瓶号: 2-33

进样体积: 10 μl

进样时间: 2026/05/19 21:55:03

处理时间 (V2) : 2026/05/20 09:03:18

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速:2.0ml/min


波长:220nm

版本号:6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 220nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.149	2553556	100.000	600645	5916	1.052	--
总计		2553556	100.000	600645			

图84 布洛芬混悬液溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-2025110151批-pH7.2介质-极限转速-片4
供试品溶液-1



QTL-4141

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)

柱 温:35°C

数据文件名: RC\$QTL-4141 - 29-13/27-845-2 - zzp-2025110151p-js6y-rcqx-pH7.2jz-jxzs-P5.lcd

方法文件名: RC\$QTL-4141 - QTL-4141-rcqx-FX276.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-4141 - 20260519-FX276.lcb

样品瓶号: 2-42

进样体积: 10 μl

进样时间: 2026/05/19 21:58:27

处理时间 (V2) : 2026/05/20 09:03:20

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速:2.0ml/min


波长:220nm

版本号:6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 220nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.149	2548593	100.000	598844	5914	1.052	--
总计		2548593	100.000	598844			

图85 布洛芬混悬液溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-2025110151批-pH7.2介质-极限转速-片5
供试品溶液-1




QTL-4141

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱 温:35°C
数据文件名: RC\$QTL-4141 - 29-13/27-846-2 - zzp-2025110151p-js6y-rcqx-pH7.2jz-jxzs-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4141 - QTL-4141-rcqx-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4141 - 20260519-FX276.lcb
样品瓶号: 2-51
进样体积: 10 μl
进样时间: 2026/05/19 22:01:50
处理时间 (V2) : 2026/05/20 09:03:23
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速:2.0ml/min
波长:220nm
版本号:6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 220nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.148	2536358	100.000	596734	5911	1.052	--
总计		2536358	100.000	596734			

图86 布洛芬混悬液溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-2025110151批-pH7.2介质-极限转速-片6
供试品溶液-1




QTL-4141

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱 温:35°C
数据文件名: RC\$QTL-4141 - 29-13/27-847-2 - zzp-2025110151p-js6y-rcqx-pH7.2jz-dz2-1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4141 - QTL-4141-rcqx-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4141 - 20260519-FX276.lcb
样品瓶号: 2-27
进样体积: 10 μl
进样时间: 2026/05/19 22:05:14
处理时间 (V2) : 2026/05/20 09:03:25
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速:2.0ml/min
波长:220nm
版本号:6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.148	2610472	100.000	613304	5884	1.054	--
总计		2610472	100.000	613304			

图87 布洛芬混悬液溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-2025110151批-pH7.2介质
对照品溶液-2-1




QTL-4141

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱 温:35°C
数据文件名: RC\$QTL-4141 - 29-13/27-848-2 - zzp-2025110151p-js6y-rcqx-pH7.2jz-dz2-2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4141 - QTL-4141-rcqx-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4141 - 20260519-FX276.lcb
样品瓶号: 2-27
进样体积: 10 μl
进样时间: 2026/05/19 22:08:38
处理时间 (V2) : 2026/05/20 09:03:27
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速:2.0ml/min
波长:220nm
版本号:6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 220nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.148	2611349	100.000	614504	5901	1.054	--
总计		2611349	100.000	614504			

图88 布洛芬混悬液溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-2025110151批-pH7.2介质
对照品溶液-2-2




QTL-4141

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱 温:35°C
数据文件名: RC\$QTL-4141 - 29-13/27-849-2 - zzp-2025110251p-js6y-rcqx-pH7.2jz-rj.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4141 - QTL-4141-rcqx-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4141 - 20260519-FX276.lcb
样品瓶号: 3-9
进样体积: 10 μl
进样时间: 2026/05/19 22:12:00
处理时间 (V2) : 2026/05/20 09:03:30
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速:2.0ml/min
波长:220nm
版本号:6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 220nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图89 布洛芬混悬液溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-2025110251批-pH7.2介质
溶剂




QTL-4141

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱 温:35°C
数据文件名: RC\$QTL-4141 - 29-13/27-850-2 - zzp-2025110251p-js6y-rcqx-pH7.2jz-dz1-1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4141 - QTL-4141-rcqx-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4141 - 20260519-FX276.lcb
样品瓶号: 3-18
进样体积: 10 μl
进样时间: 2026/05/19 22:15:23
处理时间 (V2) : 2026/05/20 09:03:32
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速:2.0ml/min
波长:220nm
版本号:6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 220nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.149	2613010	100.000	612400	5903	1.054	--
总计		2613010	100.000	612400			

图90 布洛芬混悬液溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-2025110251批-pH7.2介质
对照品溶液-1-1



QTL-4141

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)

柱 温:35°C

数据文件名: RC\$QTL-4141 - 29-13/27-851-2 - zzp-2025110251p-js6y-rcqx-pH7.2jz-dz1-2.lcd

方法文件名: RC\$QTL-4141 - QTL-4141-rcqx-FX276.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-4141 - 20260519-FX276.lcb

样品瓶号: 3-18

进样体积: 10 μl

进样时间: 2026/05/19 22:18:45

处理时间 (V2) : 2026/05/20 09:03:35

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速:2.0ml/min


波长:220nm

版本号:6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 220nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.149	2611958	100.000	612811	5903	1.054	--
总计		2611958	100.000	612811			

图91 布洛芬混悬液溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-2025110251批-pH7.2介质
对照品溶液-1-2



QTL-4141

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)

柱 温:35°C

数据文件名: RC\$QTL-4141 - 29-13/27-852-2 - zzp-2025110251p-js6y-rcqx-pH7.2jz-dz1-3.lcd

方法文件名: RC\$QTL-4141 - QTL-4141-rcqx-FX276.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-4141 - 20260519-FX276.lcb

样品瓶号: 3-18

进样体积: 10 μl

进样时间: 2026/05/19 22:22:06

处理时间 (V2) : 2026/05/20 09:03:37

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速:2.0ml/min


波长:220nm

版本号:6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 220nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.149	2608926	100.000	611818	5903	1.054	--
总计		2608926	100.000	611818			

图92 布洛芬混悬液溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-2025110251批-pH7.2介质
对照品溶液-1-3




QTL-4141

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱 温:35°C
数据文件名: RC\$QTL-4141 - 29-13/27-853-2 - zzp-2025110251p-js6y-rcqx-pH7.2jz-dz1-4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4141 - QTL-4141-rcqx-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4141 - 20260519-FX276.lcb
样品瓶号: 3-18
进样体积: 10 μl
进样时间: 2026/05/19 22:25:29
处理时间 (V2) : 2026/05/20 09:03:39
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速:2.0ml/min
波长:220nm
版本号:6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 220nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.149	2609744	100.000	612356	5903	1.054	--
总计		2609744	100.000	612356			

图93 布洛芬混悬液溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-2025110251批-pH7.2介质
对照品溶液-1-4



QTL-4141

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)

柱 温:35°C

数据文件名: RC\$QTL-4141 - 29-13/27-854-2 - zzp-2025110251p-js6y-rcqx-pH7.2jz-dz1-5.lcd

方法文件名: RC\$QTL-4141 - QTL-4141-rcqx-FX276.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-4141 - 20260519-FX276.lcb

样品瓶号: 3-18

进样体积: 10 μl

进样时间: 2026/05/19 22:28:52

处理时间 (V2) : 2026/05/20 09:03:42

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速:2.0ml/min


波长:220nm

版本号:6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 220nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.149	2608720	100.000	611278	5901	1.054	--
总计		2608720	100.000	611278			

图94 布洛芬混悬液溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-2025110251批-pH7.2介质
对照品溶液-1-5



QTL-4141

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)

柱 温:35°C

数据文件名: RC\$QTL-4141 - 29-13/27-855-2 - zzp-2025110251p-js6y-rcqx-pH7.2jz-5min-P1.lcd

方法文件名: RC\$QTL-4141 - QTL-4141-rcqx-FX276.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-4141 - 20260519-FX276.lcb

样品瓶号: 3-1

进样体积: 10 μl

进样时间: 2026/05/19 22:32:14

处理时间 (V2) : 2026/05/20 09:03:44

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速:2.0ml/min


波长:220nm

版本号:6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 220nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.150	2609181	100.000	611141	5919	1.053	--
总计		2609181	100.000	611141			

图95 布洛芬混悬液溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-2025110251批-pH7.2介质-5min-片1
供试品溶液-1




QTL-4141

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱 温:35°C
数据文件名: RC\$QTL-4141 - 29-13/27-856-2 - zzp-2025110251p-js6y-rcqx-pH7.2jz-5min-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4141 - QTL-4141-rcqx-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4141 - 20260519-FX276.lcb
样品瓶号: 3-10
进样体积: 10 μl
进样时间: 2026/05/19 22:35:36
处理时间 (V2) : 2026/05/20 09:03:47
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速:2.0ml/min
波长:220nm
版本号:6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 220nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.150	2588180	100.000	606465	5924	1.053	--
总计		2588180	100.000	606465			

图96 布洛芬混悬液溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-2025110251批-pH7.2介质-5min-片2
供试品溶液-1



QTL-4141

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)

柱 温:35°C

数据文件名: RC\$QTL-4141 - 29-13/27-857-2 - zzp-2025110251p-js6y-rcqx-pH7.2jz-5min-P3.lcd

方法文件名: RC\$QTL-4141 - QTL-4141-rcqx-FX276.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-4141 - 20260519-FX276.lcb

样品瓶号: 3-19

进样体积: 10 μl

进样时间: 2026/05/19 22:38:57

处理时间 (V2) : 2026/05/20 09:03:49

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速:2.0ml/min


波长:220nm

版本号:6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 220nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.150	2577162	100.000	604577	5927	1.053	--
总计		2577162	100.000	604577			

图97 布洛芬混悬液溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-2025110251批-pH7.2介质-5min-片3
供试品溶液-1



QTL-4141

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)

柱 温:35°C

数据文件名: RC\$QTL-4141 - 29-13/27-858-2 - zzp-2025110251p-js6y-rcqx-pH7.2jz-5min-P4.lcd

方法文件名: RC\$QTL-4141 - QTL-4141-rcqx-FX276.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-4141 - 20260519-FX276.lcb

样品瓶号: 3-28

进样体积: 10 μl

进样时间: 2026/05/19 22:42:19

处理时间 (V2) : 2026/05/20 09:03:51

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速:2.0ml/min


波长:220nm

版本号:6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.150	2571200	100.000	602402	5927	1.053	--
总计		2571200	100.000	602402			

图98 布洛芬混悬液溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-2025110251批-pH7.2介质-5min-片4
供试品溶液-1




QTL-4141

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱 温:35°C
数据文件名: RC\$QTL-4141 - 29-13/27-859-2 - zzp-2025110251p-js6y-rcqx-pH7.2jz-5min-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4141 - QTL-4141-rcqx-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4141 - 20260519-FX276.lcb
样品瓶号: 3-37
进样体积: 10 μl
进样时间: 2026/05/19 22:45:42
处理时间 (V2) : 2026/05/20 09:03:54
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速:2.0ml/min
波长:220nm
版本号:6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 220nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.150	2546899	100.000	595999	5917	1.053	--
总计		2546899	100.000	595999			

图99 布洛芬混悬液溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-2025110251批-pH7.2介质-5min-片5
供试品溶液-1




QTL-4141

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱 温:35°C
数据文件名: RC\$QTL-4141 - 29-13/27-860-2 - zzp-2025110251p-js6y-rcqx-pH7.2jz-5min-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4141 - QTL-4141-rcqx-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4141 - 20260519-FX276.lcb
样品瓶号: 3-46
进样体积: 10 μl
进样时间: 2026/05/19 22:49:03
处理时间 (V2) : 2026/05/20 09:03:56
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速:2.0ml/min
波长:220nm
版本号:6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 220nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.150	2530608	100.000	591799	5916	1.052	--
总计		2530608	100.000	591799			

图100 布洛芬混悬液溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-2025110251批-pH7.2介质-5min-片6
供试品溶液-1



QTL-4141

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)

流速:2.0ml/min

柱温:35°C

波长:220nm

数据文件名: RC\$QTL-4141 - 29-13/27-861-2 - zzp-2025110251p-js6y-rcqx-pH7.2jz-10min-P1.lcd

方法文件名: RC\$QTL-4141 - QTL-4141-rcqx-FX276.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-4141 - 20260519-FX276.lcb

样品瓶号: 3-2

进样体积: 10 μl

进样时间: 2026/05/19 22:52:25

处理时间 (V2) : 2026/05/20 09:03:58


仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

版本号:6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 220nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.150	2614943	100.000	612451	5921	1.053	--
总计		2614943	100.000	612451			

图101 布洛芬混悬液溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-2025110251批-pH7.2介质-10min-片1
供试品溶液-1



QTL-4141

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)

流速:2.0ml/min

柱 温:35°C

波长:220nm

数据文件名: RC\$QTL-4141 - 29-13/27-862-2 - zzp-2025110251p-js6y-rcqx-pH7.2jz-10min-P2.lcd

方法文件名: RC\$QTL-4141 - QTL-4141-rcqx-FX276.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-4141 - 20260519-FX276.lcb

样品瓶号: 3-11

进样体积: 10 μl

进样时间: 2026/05/19 22:55:47

处理时间 (V2) : 2026/05/20 09:04:01


仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

版本号:6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 220nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.150	2585695	100.000	606275	5927	1.053	--
总计		2585695	100.000	606275			

图102 布洛芬混悬液溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-2025110251批-pH7.2介质-10min-片2
供试品溶液-1



QTL-4141

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)

柱 温:35°C

数据文件名: RC\$QTL-4141 - 29-13/27-863-2 - zzp-2025110251p-js6y-rcqx-pH7.2jz-10min-P3.lcd

方法文件名: RC\$QTL-4141 - QTL-4141-rcqx-FX276.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-4141 - 20260519-FX276.lcb

样品瓶号: 3-20

进样体积: 10 μl

进样时间: 2026/05/19 22:59:08

处理时间 (V2) : 2026/05/20 09:04:03

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速:2.0ml/min


波长:220nm

版本号:6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 220nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.150	2573079	100.000	602314	5917	1.053	--
总计		2573079	100.000	602314			

图103 布洛芬混悬液溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-2025110251批-pH7.2介质-10min-片3
供试品溶液-1



QTL-4141

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)

柱 温:35°C

数据文件名: RC\$QTL-4141 - 29-13/27-864-2 - zzp-2025110251p-js6y-rcqx-pH7.2jz-10min-P4.lcd

方法文件名: RC\$QTL-4141 - QTL-4141-rcqx-FX276.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-4141 - 20260519-FX276.lcb

样品瓶号: 3-29

进样体积: 10 μl

进样时间: 2026/05/19 23:02:30

处理时间 (V2) : 2026/05/20 09:04:05

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速:2.0ml/min


波长:220nm

版本号:6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 220nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.150	2573155	100.000	602323	5921	1.053	--
总计		2573155	100.000	602323			

图104 布洛芬混悬液溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-2025110251批-pH7.2介质-10min-片4
供试品溶液-1



QTL-4141

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)

流速:2.0ml/min

柱 温:35°C

波长:220nm

数据文件名: RC\$QTL-4141 - 29-13/27-865-2 - zzp-2025110251p-js6y-rcqx-pH7.2jz-10min-P5.lcd

方法文件名: RC\$QTL-4141 - QTL-4141-rcqx-FX276.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-4141 - 20260519-FX276.lcb

样品瓶号: 3-38

进样体积: 10 μl

进样时间: 2026/05/19 23:05:51

处理时间 (V2) : 2026/05/20 09:04:08


仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

版本号:6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 220nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.150	2557456	100.000	599356	5922	1.053	--
总计		2557456	100.000	599356			

图105 布洛芬混悬液溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-2025110251批-pH7.2介质-10min-片5
供试品溶液-1



QTL-4141

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)

柱 温:35°C

数据文件名: RC\$QTL-4141 - 29-13/27-866-2 - zzp-2025110251p-js6y-rcqx-pH7.2jz-10min-P6.lcd

方法文件名: RC\$QTL-4141 - QTL-4141-rcqx-FX276.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-4141 - 20260519-FX276.lcb

样品瓶号: 3-47

进样体积: 10 μl

进样时间: 2026/05/19 23:09:13

处理时间 (V2) : 2026/05/20 09:04:10

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速:2.0ml/min


波长:220nm

版本号:6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 220nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.150	2552159	100.000	597823	5927	1.053	--
总计		2552159	100.000	597823			

图106 布洛芬混悬液溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-2025110251批-pH7.2介质-10min-片6
供试品溶液-1



QTL-4141

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)

流速:2.0ml/min

柱 温:35°C

波长:220nm

数据文件名: RC\$QTL-4141 - 29-13/27-867-2 - zzp-2025110251p-js6y-rcqx-pH7.2jz-15min-P1.lcd

方法文件名: RC\$QTL-4141 - QTL-4141-rcqx-FX276.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-4141 - 20260519-FX276.lcb

样品瓶号: 3-3

进样体积: 10 μl

进样时间: 2026/05/19 23:12:35

版本号:6.115


实验者: jiangjinwei

处理时间 (V2) : 2026/05/20 09:04:12

处理者: jiangjinwei

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 220nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.150	2596658	100.000	608391	5928	1.053	--
总计		2596658	100.000	608391			

图107 布洛芬混悬液溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-2025110251批-pH7.2介质-15min-片1
供试品溶液-1




QTL-4141

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱 温:35°C
数据文件名: RC\$QTL-4141 - 29-13/27-868-2 - zzp-2025110251p-js6y-rcqx-pH7.2jz-15min-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4141 - QTL-4141-rcqx-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4141 - 20260519-FX276.lcb
样品瓶号: 3-12
进样体积: 10 μl
进样时间: 2026/05/19 23:15:56
处理时间 (V2) : 2026/05/20 09:04:15
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速:2.0ml/min
波长:220nm
版本号:6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 220nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.150	2579216	100.000	604660	5930	1.053	--
总计		2579216	100.000	604660			

图108 布洛芬混悬液溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-2025110251批-pH7.2介质-15min-片2
供试品溶液-1



QTL-4141

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)

流速:2.0ml/min

柱 温:35°C

波长:220nm

数据文件名: RC\$QTL-4141 - 29-13/27-869-2 - zzp-2025110251p-js6y-rcqx-pH7.2jz-15min-P3.lcd

方法文件名: RC\$QTL-4141 - QTL-4141-rcqx-FX276.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-4141 - 20260519-FX276.lcb

样品瓶号: 3-21

进样体积: 10 μl

进样时间: 2026/05/19 23:19:18

版本号:6.115


实验者: jiangjinwei

处理时间 (V2) : 2026/05/20 09:04:17

处理者: jiangjinwei

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 220nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.149	2536289	100.000	596264	5929	1.053	--
总计		2536289	100.000	596264			

图109 布洛芬混悬液溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-2025110251批-pH7.2介质-15min-片3
供试品溶液-1



QTL-4141

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)

柱温:35°C

数据文件名: RC\$QTL-4141 - 29-13/27-870-2 - zzp-2025110251p-js6y-rcqx-pH7.2jz-15min-P4.lcd

方法文件名: RC\$QTL-4141 - QTL-4141-rcqx-FX276.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-4141 - 20260519-FX276.lcb

样品瓶号: 3-30

进样体积: 10 μl

进样时间: 2026/05/19 23:22:40

处理时间 (V2) : 2026/05/20 09:04:20

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速:2.0ml/min


波长:220nm

版本号:6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 220nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.150	2563126	100.000	599952	5927	1.054	--
总计		2563126	100.000	599952			

图110 布洛芬混悬液溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-2025110251批-pH7.2介质-15min-片4
供试品溶液-1



QTL-4141

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)

流速:2.0ml/min

柱 温:35°C

波长:220nm

数据文件名: RC\$QTL-4141 - 29-13/27-871-2 - zzp-2025110251p-js6y-rcqx-pH7.2jz-15min-P5.lcd

方法文件名: RC\$QTL-4141 - QTL-4141-rcqx-FX276.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-4141 - 20260519-FX276.lcb

样品瓶号: 3-39

进样体积: 10 μl

进样时间: 2026/05/19 23:26:02

处理时间 (V2) : 2026/05/20 09:04:22


仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

版本号:6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 220nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.150	2544510	100.000	596607	5938	1.053	--
总计		2544510	100.000	596607			

图111 布洛芬混悬液溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-2025110251批-pH7.2介质-15min-片5
供试品溶液-1




QTL-4141

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱 温:35°C
数据文件名: RC\$QTL-4141 - 29-13/27-872-2 - zzp-2025110251p-js6y-rcqx-pH7.2jz-15min-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4141 - QTL-4141-rcqx-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4141 - 20260519-FX276.lcb
样品瓶号: 3-48
进样体积: 10 μl
进样时间: 2026/05/19 23:29:23
处理时间 (V2) : 2026/05/20 09:04:25
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速:2.0ml/min
波长:220nm
版本号:6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 220nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.150	2538256	100.000	595277	5933	1.053	--
总计		2538256	100.000	595277			

图112 布洛芬混悬液溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-2025110251批-pH7.2介质-15min-片6
供试品溶液-1




QTL-4141

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱 温:35°C
数据文件名: RC\$QTL-4141 - 29-13/27-873-2 - zzp-2025110251p-js6y-rcqx-pH7.2jz-20min-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4141 - QTL-4141-rcqx-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4141 - 20260519-FX276.lcb
样品瓶号: 3-4
进样体积: 10 μl
进样时间: 2026/05/19 23:32:45
处理时间 (V2) : 2026/05/20 09:04:27
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速:2.0ml/min
波长:220nm
版本号:6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 220nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.150	2585565	100.000	606220	5931	1.054	--
总计		2585565	100.000	606220			

图113 布洛芬混悬液溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-2025110251批-pH7.2介质-20min-片1
供试品溶液-1



QTL-4141

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)

流速:2.0ml/min

柱温:35°C

波长:220nm

数据文件名: RC\$QTL-4141 - 29-13/27-874-2 - zzp-2025110251p-js6y-rcqx-pH7.2jz-20min-P2.lcd

方法文件名: RC\$QTL-4141 - QTL-4141-rcqx-FX276.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-4141 - 20260519-FX276.lcb

样品瓶号: 3-13

进样体积: 10 μl

进样时间: 2026/05/19 23:36:06

处理时间 (V2) : 2026/05/20 09:04:29


仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

版本号:6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 220nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.149	2567765	100.000	603918	5932	1.054	--
总计		2567765	100.000	603918			

图114 布洛芬混悬液溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-2025110251批-pH7.2介质-20min-片2
供试品溶液-1



QTL-4141

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)

流速:2.0ml/min

柱 温:35°C

波长:220nm

数据文件名: RC\$QTL-4141 - 29-13/27-875-2 - zzp-2025110251p-js6y-rcqx-pH7.2jz-20min-P3.lcd

方法文件名: RC\$QTL-4141 - QTL-4141-rcqx-FX276.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-4141 - 20260519-FX276.lcb

样品瓶号: 3-22

进样体积: 10 μl

进样时间: 2026/05/19 23:39:29

处理时间 (V2) : 2026/05/20 09:04:32


仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

版本号:6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 220nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.149	2510192	100.000	590367	5935	1.054	--
总计		2510192	100.000	590367			

图115 布洛芬混悬液溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-2025110251批-pH7.2介质-20min-片3
供试品溶液-1




QTL-4141

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱 温:35°C
数据文件名: RC\$QTL-4141 - 29-13/27-876-2 - zzp-2025110251p-js6y-rcqx-pH7.2jz-20min-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4141 - QTL-4141-rcqx-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4141 - 20260519-FX276.lcb
样品瓶号: 3-31
进样体积: 10 μl
进样时间: 2026/05/19 23:42:51
处理时间 (V2) : 2026/05/20 09:04:34
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速:2.0ml/min
波长:220nm
版本号:6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 220nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.149	2539928	100.000	597693	5940	1.054	--
总计		2539928	100.000	597693			

图116 布洛芬混悬液溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-2025110251批-pH7.2介质-20min-片4
供试品溶液-1




QTL-4141

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱 温:35°C
数据文件名: RC\$QTL-4141 - 29-13/27-877-2 - zzp-2025110251p-js6y-rcqx-pH7.2jz-20min-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4141 - QTL-4141-rcqx-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4141 - 20260519-FX276.lcb
样品瓶号: 3-40
进样体积: 10 μl
进样时间: 2026/05/19 23:46:13
处理时间 (V2) : 2026/05/20 09:04:36
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速:2.0ml/min
波长:220nm
版本号:6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 220nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.149	2511305	100.000	591349	5937	1.054	--
总计		2511305	100.000	591349			

图117 布洛芬混悬液溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-2025110251批-pH7.2介质-20min-片5
供试品溶液-1




QTL-4141

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱 温:35°C
数据文件名: RC\$QTL-4141 - 29-13/27-878-2 - zzp-2025110251p-js6y-rcqx-pH7.2jz-20min-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4141 - QTL-4141-rcqx-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4141 - 20260519-FX276.lcb
样品瓶号: 3-49
进样体积: 10 μl
进样时间: 2026/05/19 23:49:34
处理时间 (V2) : 2026/05/20 09:04:39
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速:2.0ml/min
波长:220nm
版本号:6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 220nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.149	2489662	100.000	585118	5944	1.055	--
总计		2489662	100.000	585118			

图118 布洛芬混悬液溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-2025110251批-pH7.2介质-20min-片6
供试品溶液-1



QTL-4141

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)

柱 温:35°C

数据文件名: RC\$QTL-4141 - 29-13/27-879-2 - zzp-2025110251p-js6y-rcqx-pH7.2jz-30min-P1.lcd

方法文件名: RC\$QTL-4141 - QTL-4141-rcqx-FX276.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-4141 - 20260519-FX276.lcb

样品瓶号: 3-5

进样体积: 10 μl

进样时间: 2026/05/19 23:52:57

处理时间 (V2) : 2026/05/20 09:04:42

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速:2.0ml/min


波长:220nm

版本号:6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 220nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.149	2558227	100.000	601646	5943	1.055	--
总计		2558227	100.000	601646			

图119 布洛芬混悬液溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-2025110251批-pH7.2介质-30min-片1
供试品溶液-1




QTL-4141

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱 温:35°C
数据文件名: RC\$QTL-4141 - 29-13/27-880-2 - zzp-2025110251p-js6y-rcqx-pH7.2jz-30min-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4141 - QTL-4141-rcqx-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4141 - 20260519-FX276.lcb
样品瓶号: 3-14
进样体积: 10 μl
进样时间: 2026/05/19 23:56:18
处理时间 (V2) : 2026/05/20 09:04:44
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速:2.0ml/min
波长:220nm
版本号:6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 220nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.149	2537495	100.000	596730	5937	1.055	--
总计		2537495	100.000	596730			

图120 布洛芬混悬液溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-2025110251批-pH7.2介质-30min-片2
供试品溶液-1




QTL-4141

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱 温:35°C
数据文件名: RC\$QTL-4141 - 29-13/27-881-2 - zzp-2025110251p-js6y-rcqx-pH7.2jz-30min-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4141 - QTL-4141-rcqx-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4141 - 20260519-FX276.lcb
样品瓶号: 3-23
进样体积: 10 μl
进样时间: 2026/05/19 23:59:41
处理时间 (V2) : 2026/05/20 09:04:47
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速:2.0ml/min
波长:220nm
版本号:6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 220nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.149	2519112	100.000	592255	5943	1.054	--
总计		2519112	100.000	592255			

图121 布洛芬混悬液溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-2025110251批-pH7.2介质-30min-片3
供试品溶液-1




QTL-4141

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱 温:35°C
数据文件名: RC\$QTL-4141 - 29-13/27-882-2 - zzp-2025110251p-js6y-rcqx-pH7.2jz-30min-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4141 - QTL-4141-rcqx-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4141 - 20260519-FX276.lcb
样品瓶号: 3-32
进样体积: 10 μl
进样时间: 2026/05/20 00:03:03
处理时间 (V2) : 2026/05/20 09:04:49
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速:2.0ml/min
波长:220nm
版本号:6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 220nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.149	2529879	100.000	595311	5928	1.055	--
总计		2529879	100.000	595311			

图122 布洛芬混悬液溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-2025110251批-pH7.2介质-30min-片4
供试品溶液-1




QTL-4141

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱 温:35°C
数据文件名: RC\$QTL-4141 - 29-13/27-883-2 - zzp-2025110251p-js6y-rcqx-pH7.2jz-30min-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4141 - QTL-4141-rcqx-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4141 - 20260519-FX276.lcb
样品瓶号: 3-41
进样体积: 10 μl
进样时间: 2026/05/20 00:06:24
处理时间 (V2) : 2026/05/20 09:04:52
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速:2.0ml/min
波长:220nm
版本号:6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 220nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.149	2512121	100.000	590936	5939	1.055	--
总计		2512121	100.000	590936			

图123 布洛芬混悬液溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-2025110251批-pH7.2介质-30min-片5
供试品溶液-1



QTL-4141

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)

柱 温:35°C

数据文件名: RC\$QTL-4141 - 29-13/27-884-2 - zzp-2025110251p-js6y-rcqx-pH7.2jz-30min-P6.lcd

方法文件名: RC\$QTL-4141 - QTL-4141-rcqx-FX276.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-4141 - 20260519-FX276.lcb

样品瓶号: 3-50

进样体积: 10 μl

进样时间: 2026/05/20 00:09:46

处理时间 (V2) : 2026/05/20 09:04:54

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速:2.0ml/min


波长:220nm

版本号:6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 220nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.149	2499512	100.000	588865	5948	1.055	--
总计		2499512	100.000	588865			

图124 布洛芬混悬液溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-2025110251批-pH7.2介质-30min-片6
供试品溶液-1




QTL-4141

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱 温:35°C
数据文件名: RC\$QTL-4141 - 29-13/27-885-2 - zzp-2025110251p-js6y-rcqx-pH7.2jz-jxzs-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4141 - QTL-4141-rcqx-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4141 - 20260519-FX276.lcb
样品瓶号: 3-6
进样体积: 10 μl
进样时间: 2026/05/20 00:13:07
处理时间 (V2) : 2026/05/20 09:04:57
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速:2.0ml/min
波长:220nm
版本号:6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 220nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.150	2548185	100.000	597988	5940	1.055	--
总计		2548185	100.000	597988			

图125 布洛芬混悬液溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-2025110251批-pH7.2介质-极限转速-片1
供试品溶液-1



QTL-4141

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)

柱 温:35°C

数据文件名: RC\$QTL-4141 - 29-13/27-886-2 - zzp-2025110251p-js6y-rcqx-pH7.2jz-jxzs-P2.lcd

方法文件名: RC\$QTL-4141 - QTL-4141-rcqx-FX276.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-4141 - 20260519-FX276.lcb

样品瓶号: 3-15

进样体积: 10 μl

进样时间: 2026/05/20 00:16:29

处理时间 (V2) : 2026/05/20 09:04:59

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速:2.0ml/min


波长:220nm

版本号:6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 220nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.150	2516849	100.000	589182	5947	1.055	--
总计		2516849	100.000	589182			

图126 布洛芬混悬液溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-2025110251批-pH7.2介质-极限转速-片2
供试品溶液-1




QTL-4141

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱 温:35°C
数据文件名: RC\$QTL-4141 - 29-13/27-887-2 - zzp-2025110251p-js6y-rcqx-pH7.2jz-jxzs-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4141 - QTL-4141-rcqx-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4141 - 20260519-FX276.lcb
样品瓶号: 3-24
进样体积: 10 μl
进样时间: 2026/05/20 00:19:49
处理时间 (V2) : 2026/05/20 09:05:01
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速:2.0ml/min
波长:220nm
版本号:6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 220nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.150	2516608	100.000	589563	5941	1.054	--
总计		2516608	100.000	589563			

图127 布洛芬混悬液溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-2025110251批-pH7.2介质-极限转速-片3
供试品溶液-1




QTL-4141

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱 温:35°C
数据文件名: RC\$QTL-4141 - 29-13/27-888-2 - zzp-2025110251p-js6y-rcqx-pH7.2jz-jxzs-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4141 - QTL-4141-rcqx-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4141 - 20260519-FX276.lcb
样品瓶号: 3-33
进样体积: 10 μl
进样时间: 2026/05/20 00:23:11
处理时间 (V2) : 2026/05/20 09:05:04
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速:2.0ml/min
波长:220nm
版本号:6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 220nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.150	2532524	100.000	593555	5937	1.055	--
总计		2532524	100.000	593555			

图128 布洛芬混悬液溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-2025110251批-pH7.2介质-极限转速-片4
供试品溶液-1




QTL-4141

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱 温:35°C
数据文件名: RC\$QTL-4141 - 29-13/27-889-2 - zzp-2025110251p-js6y-rcqx-pH7.2jz-jxzs-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4141 - QTL-4141-rcqx-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4141 - 20260519-FX276.lcb
样品瓶号: 3-42
进样体积: 10 μl
进样时间: 2026/05/20 00:26:33
处理时间 (V2) : 2026/05/20 09:05:06
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速:2.0ml/min
波长:220nm
版本号:6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 220nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.150	2488214	100.000	583892	5948	1.055	--
总计		2488214	100.000	583892			

图129 布洛芬混悬液溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-2025110251批-pH7.2介质-极限转速-片5
供试品溶液-1



QTL-4141

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)

柱 温:35°C

数据文件名: RC\$QTL-4141 - 29-13/27-890-2 - zzp-2025110251p-js6y-rcqx-pH7.2jz-jxzs-P6.lcd

方法文件名: RC\$QTL-4141 - QTL-4141-rcqx-FX276.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-4141 - 20260519-FX276.lcb

样品瓶号: 3-51

进样体积: 10 μl

进样时间: 2026/05/20 00:29:53

处理时间 (V2) : 2026/05/20 09:05:09

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速:2.0ml/min


波长:220nm

版本号:6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 220nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.150	2481595	100.000	581814	5939	1.055	--
总计		2481595	100.000	581814			

图130 布洛芬混悬液溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-2025110251批-pH7.2介质-极限转速-片6
供试品溶液-1




QTL-4141

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱 温:35°C
数据文件名: RC\$QTL-4141 - 29-13/27-891-2 - zzp-2025110251p-js6y-rcqx-pH7.2jz-dz2-1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4141 - QTL-4141-rcqx-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4141 - 20260519-FX276.lcb
样品瓶号: 3-27
进样体积: 10 μl
进样时间: 2026/05/20 00:33:17
处理时间 (V2) : 2026/05/20 09:05:11
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速:2.0ml/min
波长:220nm
版本号:6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 220nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.149	2603430	100.000	610937	5921	1.056	--
总计		2603430	100.000	610937			

图131 布洛芬混悬液溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-2025110251批-pH7.2介质
对照品溶液-2-1



QTL-4141

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)

柱 温:35°C

数据文件名: RC\$QTL-4141 - 29-13/27-892-2 - zzp-2025110251p-js6y-rcqx-pH7.2jz-dz2-2.lcd

方法文件名: RC\$QTL-4141 - QTL-4141-rcqx-FX276.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-4141 - 20260519-FX276.lcb

样品瓶号: 3-27

进样体积: 10 μl

进样时间: 2026/05/20 00:36:39

处理时间 (V2) : 2026/05/20 09:05:13

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速:2.0ml/min


波长:220nm

版本号:6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 220nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.149	2600811	100.000	611671	5923	1.055	--
总计		2600811	100.000	611671			

图132 布洛芬混悬液溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-2025110251批-pH7.2介质
对照品溶液-2-2