



熊去氧胆酸口服混悬液项目信息

介质体积(ml)	900	取样体积(ml)	5	补液体积(ml)	5
对照品批号	110755-202306	对照品来源	中检所	对照品使用方法	直接使用
对照品含量(%)	99.6	对照品水分(%)	0	对照品稀释倍数	50
标示量(mg)	250	供试品稀释倍数	1	系数	1

对照品溶液

序号	称样量(mg)	A ₁	A ₂	A ₃	A ₄	A ₅	A _{平均}	RSD%
1	13.85	53777	53790	53935	53616	53925	53809	0.25
2	13.90	53781	53816				53798	0.05

单位质量响应值		RSD%	判断
3885.13	3870.36	0.27	数据可信



操作者:

日期: 2026-09-11

复核者:

未审阅版本



供试品溶液-2025121551批-pH1.2

时间 (分钟)	样品	A ₁	A ₂	A _{平均}	溶出量(%)	平均(%)	RSD%	累计溶 出量(%)	平均(%)	RSD%
5min	1		-		0.000	0.00	-	0.00	0.00	-
	2		-		0.000			0.00		
	3		-		0.000			0.00		
	4		-		0.000			0.00		
	5		-		0.000			0.00		
	6		-		0.000			0.00		
10min	1		-		0.000	0.00	-	0.00	0.00	-
	2		-		0.000			0.00		
	3		-		0.000			0.00		
	4		-		0.000			0.00		
	5		-		0.000			0.00		
	6		-		0.000			0.00		
15min	1		-		0.000	0.00	-	0.00	0.00	-
	2		-		0.000			0.00		
	3		-		0.000			0.00		
	4		-		0.000			0.00		
	5		-		0.000			0.00		
	6		-		0.000			0.00		
20min	1		-		0.000	0.00	-	0.00	0.00	-
	2		-		0.000			0.00		
	3		-		0.000			0.00		
	4		-		0.000			0.00		
	5		-		0.000			0.00		
	6		-		0.000			0.00		
30min	1		-		0.000	0.00	-	0.00	0.00	-
	2		-		0.000			0.00		
	3		-		0.000			0.00		
	4		-		0.000			0.00		
	5		-		0.000			0.00		
	6		-		0.000			0.00		
45min	1		-		0.000	0.00	-	0.00	0.00	-
	2		-		0.000			0.00		
	3		-		0.000			0.00		
	4		-		0.000			0.00		
	5		-		0.000			0.00		
	6		-		0.000			0.00		
60min	1		-		0.000	0.00	-	0.00	0.00	-
	2		-		0.000			0.00		
	3		-		0.000			0.00		
	4		-		0.000			0.00		
	5		-		0.000			0.00		
	6		-		0.000			0.00		
极限	1		-		0.000	0.00	-	0.00	0.00	-
	2		-		0.000			0.00		
	3		-		0.000			0.00		
	4		-		0.000			0.00		
	5		-		0.000			0.00		
	6		-		0.000			0.00		



操作者:

日期: 2026-09-11

复核者:

未审阅版本



熊去氧胆酸口服混悬液项目信息

介质体积(ml)	900	取样体积(ml)	5	补液体积(ml)	5
对照品批号	110755-202306	对照品来源	中检所	对照品使用方法	直接使用
对照品含量(%)	99.6	对照品水分(%)	0	对照品稀释倍数	50
标示量(mg)	250	供试品稀释倍数	1	系数	1

对照品溶液

序号	称样量(mg)	A ₁	A ₂	A ₃	A ₄	A ₅	A _{平均}	RSD%
1	13.85	53895	54124	54223	53957	54104	54061	0.25
2	13.90	54101	54077				54089	0.04
单位质量响应值			RSD%	判断				
3903.32			0.22	数据可信				



操作者:

日期: 2026-09-11

复核者:

未审阅版本



供试品溶液-2025121651批-pH1.2

时间 (分钟)	样品	A ₁	A ₂	A _{平均}	溶出量(%)	平均(%)	RSD%	累计溶 出量(%)	平均(%)	RSD%
5min	1		-		0.000	0.00	-	0.00	0.00	-
	2		-		0.000			0.00		
	3		-		0.000			0.00		
	4		-		0.000			0.00		
	5		-		0.000			0.00		
	6		-		0.000			0.00		
10min	1		-		0.000	0.00	-	0.00	0.00	-
	2		-		0.000			0.00		
	3		-		0.000			0.00		
	4		-		0.000			0.00		
	5		-		0.000			0.00		
	6		-		0.000			0.00		
15min	1		-		0.000	0.00	-	0.00	0.00	-
	2		-		0.000			0.00		
	3		-		0.000			0.00		
	4		-		0.000			0.00		
	5		-		0.000			0.00		
	6		-		0.000			0.00		
20min	1		-		0.000	0.00	-	0.00	0.00	-
	2		-		0.000			0.00		
	3		-		0.000			0.00		
	4		-		0.000			0.00		
	5		-		0.000			0.00		
	6		-		0.000			0.00		
30min	1		-		0.000	0.00	-	0.00	0.00	-
	2		-		0.000			0.00		
	3		-		0.000			0.00		
	4		-		0.000			0.00		
	5		-		0.000			0.00		
	6		-		0.000			0.00		
45min	1		-		0.000	0.00	-	0.00	0.00	-
	2		-		0.000			0.00		
	3		-		0.000			0.00		
	4		-		0.000			0.00		
	5		-		0.000			0.00		
	6		-		0.000			0.00		
60min	1		-		0.000	0.00	-	0.00	0.00	-
	2		-		0.000			0.00		
	3		-		0.000			0.00		
	4		-		0.000			0.00		
	5		-		0.000			0.00		
	6		-		0.000			0.00		
极限	1		-		0.000	0.00	-	0.00	0.00	-
	2		-		0.000			0.00		
	3		-		0.000			0.00		
	4		-		0.000			0.00		
	5		-		0.000			0.00		
	6		-		0.000			0.00		



操作者:

日期: 2026-09-11

复核者:

未审阅版本



熊去氧胆酸口服混悬液项目信息

介质体积(ml)	900	取样体积(ml)	5	补液体积(ml)	5
对照品批号	110755-202306	对照品来源	中检所	对照品使用方法	直接使用
对照品含量(%)	99.6	对照品水分(%)	0	对照品稀释倍数	50
标示量(mg)	250	供试品稀释倍数	1	系数	1

对照品溶液

序号	称样量(mg)	A ₁	A ₂	A ₃	A ₄	A ₅	A _{平均}	RSD%
1	13.85	53931	54261	54153	54113	53819	54055	0.33
2	13.90	54847	54349				54598	0.65
单位质量响应值			RSD%	判断				
3902.89			0.46	数据可信				



操作者:

日期: 2026-09-11

复核者:

未审阅版本



供试品溶液-2025121851批-pH1.2

时间 (分钟)	样品	A ₁	A ₂	A _{平均}	溶出量(%)	平均(%)	RSD%	累计溶 出量(%)	平均(%)	RSD%
5min	1		-		0.000	0.00	-	0.00	0.00	-
	2		-		0.000			0.00		
	3		-		0.000			0.00		
	4		-		0.000			0.00		
	5		-		0.000			0.00		
	6		-		0.000			0.00		
10min	1		-		0.000	0.00	-	0.00	0.00	-
	2		-		0.000			0.00		
	3		-		0.000			0.00		
	4		-		0.000			0.00		
	5		-		0.000			0.00		
	6		-		0.000			0.00		
15min	1		-		0.000	0.00	-	0.00	0.00	-
	2		-		0.000			0.00		
	3		-		0.000			0.00		
	4		-		0.000			0.00		
	5		-		0.000			0.00		
	6		-		0.000			0.00		
20min	1		-		0.000	0.00	-	0.00	0.00	-
	2		-		0.000			0.00		
	3		-		0.000			0.00		
	4		-		0.000			0.00		
	5		-		0.000			0.00		
	6		-		0.000			0.00		
30min	1		-		0.000	0.00	-	0.00	0.00	-
	2		-		0.000			0.00		
	3		-		0.000			0.00		
	4		-		0.000			0.00		
	5		-		0.000			0.00		
	6		-		0.000			0.00		
45min	1		-		0.000	0.00	-	0.00	0.00	-
	2		-		0.000			0.00		
	3		-		0.000			0.00		
	4		-		0.000			0.00		
	5		-		0.000			0.00		
	6		-		0.000			0.00		
60min	1		-		0.000	0.00	-	0.00	0.00	-
	2		-		0.000			0.00		
	3		-		0.000			0.00		
	4		-		0.000			0.00		
	5		-		0.000			0.00		
	6		-		0.000			0.00		
极限	1		-		0.000	0.00	-	0.00	0.00	-
	2		-		0.000			0.00		
	3		-		0.000			0.00		
	4		-		0.000			0.00		
	5		-		0.000			0.00		
	6		-		0.000			0.00		



操作者:

日 期: 2026-09-11

复核者:

未审阅版本



熊去氧胆酸口服混悬液项目信息

介质体积(ml)	900	取样体积(ml)	5	补液体积(ml)	5
对照品批号	110755-202306	对照品来源	中检所	对照品使用方法	直接使用
对照品含量(%)	99.6	对照品水分(%)	0	对照品稀释倍数	50
标示量(mg)	250	供试品稀释倍数	1	系数	1

对照品溶液

序号	称样量(mg)	A ₁	A ₂	A ₃	A ₄	A ₅	A _{平均}	RSD%
1	13.85	54049	54112	54380	54465	54097	54221	0.35
2	13.90	54676	54803				54740	0.17
单位质量响应值				RSD%	判断			
3914.87				0.42	数据可信			



操作者:

日期: 2026-09-11

复核者:

未审阅版本



供试品溶液-00637A批-pH1.2

时间 (分钟)	样品	A ₁	A ₂	A _{平均}	溶出量(%)	平均(%)	RSD%	累计溶 出量(%)	平均(%)	RSD%
5min	1		-		0.000	0.00	-	0.00	0.00	-
	2		-		0.000			0.00		
	3		-		0.000			0.00		
	4		-		0.000			0.00		
	5		-		0.000			0.00		
	6		-		0.000			0.00		
10min	1		-		0.000	0.00	-	0.00	0.00	-
	2		-		0.000			0.00		
	3		-		0.000			0.00		
	4		-		0.000			0.00		
	5		-		0.000			0.00		
	6		-		0.000			0.00		
15min	1		-		0.000	0.00	-	0.00	0.00	-
	2		-		0.000			0.00		
	3		-		0.000			0.00		
	4		-		0.000			0.00		
	5		-		0.000			0.00		
	6		-		0.000			0.00		
20min	1		-		0.000	0.00	-	0.00	0.00	-
	2		-		0.000			0.00		
	3		-		0.000			0.00		
	4		-		0.000			0.00		
	5		-		0.000			0.00		
	6		-		0.000			0.00		
30min	1		-		0.000	0.00	-	0.00	0.00	-
	2		-		0.000			0.00		
	3		-		0.000			0.00		
	4		-		0.000			0.00		
	5		-		0.000			0.00		
	6		-		0.000			0.00		
45min	1		-		0.000	0.00	-	0.00	0.00	-
	2		-		0.000			0.00		
	3		-		0.000			0.00		
	4		-		0.000			0.00		
	5		-		0.000			0.00		
	6		-		0.000			0.00		
60min	1		-		0.000	0.00	-	0.00	0.00	-
	2		-		0.000			0.00		
	3		-		0.000			0.00		
	4		-		0.000			0.00		
	5		-		0.000			0.00		
	6		-		0.000			0.00		
极限	1		-		0.000	0.00	-	0.00	0.00	-
	2		-		0.000			0.00		
	3		-		0.000			0.00		
	4		-		0.000			0.00		
	5		-		0.000			0.00		
	6		-		0.000			0.00		



操作者:

日期: 2026-09-11

复核者:

未审阅版本



熊去氧胆酸口服混悬液项目信息

介质体积(ml)	900	取样体积(ml)	5	补液体积(ml)	5
对照品批号	110755-202306	对照品来源	中检所	对照品使用方法	直接使用
对照品含量(%)	99.6	对照品水分(%)	0	对照品稀释倍数	50
标示量(mg)	250	供试品稀释倍数	1	系数	1

对照品溶液

序号	称样量(mg)	A ₁	A ₂	A ₃	A ₄	A ₅	A _{平均}	RSD%
1	13.85	53212	53560	53873	54147	54064	53771	0.72
2	13.90	54046	54017				54032	0.04
单位质量响应值			RSD%	判断				
3882.38			0.09	数据可信				



操作者:

日期: 2026-09-11

复核者:

未审阅版本



供试品溶液-00287A批-pH1.2

时间 (分钟)	样品	A ₁	A ₂	A _{平均}	溶出量(%)	平均(%)	RSD%	累计溶 出量(%)	平均(%)	RSD%
5min	1		-		0.000	0.00	-	0.00	0.00	-
	2		-		0.000			0.00		
	3		-		0.000			0.00		
	4		-		0.000			0.00		
	5		-		0.000			0.00		
	6		-		0.000			0.00		
10min	1		-		0.000	0.00	-	0.00	0.00	-
	2		-		0.000			0.00		
	3		-		0.000			0.00		
	4		-		0.000			0.00		
	5		-		0.000			0.00		
	6		-		0.000			0.00		
15min	1		-		0.000	0.00	-	0.00	0.00	-
	2		-		0.000			0.00		
	3		-		0.000			0.00		
	4		-		0.000			0.00		
	5		-		0.000			0.00		
	6		-		0.000			0.00		
20min	1		-		0.000	0.00	-	0.00	0.00	-
	2		-		0.000			0.00		
	3		-		0.000			0.00		
	4		-		0.000			0.00		
	5		-		0.000			0.00		
	6		-		0.000			0.00		
30min	1		-		0.000	0.00	-	0.00	0.00	-
	2		-		0.000			0.00		
	3		-		0.000			0.00		
	4		-		0.000			0.00		
	5		-		0.000			0.00		
	6		-		0.000			0.00		
45min	1		-		0.000	0.00	-	0.00	0.00	-
	2		-		0.000			0.00		
	3		-		0.000			0.00		
	4		-		0.000			0.00		
	5		-		0.000			0.00		
	6		-		0.000			0.00		
60min	1		-		0.000	0.00	-	0.00	0.00	-
	2		-		0.000			0.00		
	3		-		0.000			0.00		
	4		-		0.000			0.00		
	5		-		0.000			0.00		
	6		-		0.000			0.00		
极限	1		-		0.000	0.00	-	0.00	0.00	-
	2		-		0.000			0.00		
	3		-		0.000			0.00		
	4		-		0.000			0.00		
	5		-		0.000			0.00		
	6		-		0.000			0.00		



操作者:

日期: 2026-09-11

复核者:

未审阅版本



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 28-17/10-1108-2 - zzp-2025121551p-rcqx-1-pH1.2jz-jf50z-rj.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260526-FX259.lcb

样品瓶号 : 1-9

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/05/26 11:53:51

处理时间 (V2) : 2026/05/27 08:57:43

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图1 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025121551批-pH1.2介质-桨法-50转
溶剂



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 28-17/10-1109-2 - zzp-2025121551p-rcqx-1-pH1.2jz-jf50z-dz1-1.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260526-FX259.lcb

样品瓶号 : 1-18

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/05/26 11:57:15

处理时间 (V2) : 2026/05/27 08:57:47

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.015	53777	100.000	8114	2273	1.213	--
总计		53777	100.000	8114			

图2 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025121551批-pH1.2介质-桨法-50转
对照品溶液-1-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 28-17/10-1110-2 - zzp-2025121551p-rcqx-1-pH1.2jz-jf50z-dz1-2.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260526-FX259.lcb

样品瓶号 : 1-18

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/05/26 12:00:39

处理时间 (V2) : 2026/05/27 08:57:49

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.015	53790	100.000	8112	2267	1.204	--
总计		53790	100.000	8112			

图3 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025121551批-pH1.2介质-桨法-50转
对照品溶液-1-2



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 28-17/10-1111-2 - zzp-2025121551p-rcqx-1-pH1.2jz-jf50z-dz1-3.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260526-FX259.lcb

样品瓶号 : 1-18

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/05/26 12:04:02

处理时间 (V2) : 2026/05/27 08:57:52

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.016	53935	100.000	8126	2271	1.211	--
总计		53935	100.000	8126			

图4 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025121551批-pH1.2介质-桨法-50转
对照品溶液-1-3



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30℃

数据文件名: RC\$QTL-392 - 28-17/10-1112-2 - zzp-2025121551p-rcqx-1-pH1.2jz-jf50z-dz1-4.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260526-FX259.lcb

样品瓶号 : 1-18

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/05/26 12:07:25

处理时间 (V2) : 2026/05/27 08:57:55

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.015	53616	100.000	8114	2271	1.203	--
总计		53616	100.000	8114			

图5 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025121551批-pH1.2介质-桨法-50转
对照品溶液-1-4



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 28-17/10-1113-2 - zzp-2025121551p-rcqx-1-pH1.2jz-jf50z-dz1-5.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260526-FX259.lcb

样品瓶号 : 1-18

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/05/26 12:10:50

处理时间 (V2) : 2026/05/27 08:57:57

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.016	53925	100.000	8110	2262	1.204	--
总计		53925	100.000	8110			

图6 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025121551批-pH1.2介质-桨法-50转
对照品溶液-1-5



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 28-17/10-1114-2 - zzp-2025121551p-rcqx-1-pH1.2jz-jf50z-p1-5min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260526-FX259.lcb

样品瓶号 : 1-1

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/05/26 12:14:13

处理时间 (V2) : 2026/05/27 08:58:00

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图7 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025121551批-pH1.2介质-桨法-50转-5min-片1
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 28-17/10-1115-2 - zzp-2025121551p-rcqx-1-pH1.2jz-jf50z-p2-5min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260526-FX259.lcb

样品瓶号 : 1-10

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/05/26 12:17:36

处理时间 (V2) : 2026/05/27 08:58:02

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图8 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025121551批-pH1.2介质-桨法-50转-5min-片2
供试品溶液-1




QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温 : 30°C
数据文件名: RC\$QTL-392 - 28-17/10-1116-2 - zzp-2025121551p-rcqx-1-pH1.2jz-jf50z-p3-5min.lcd
方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260526-FX259.lcb
样品瓶号 : 1-19
进样体积 : 20μl
进样时间 : 2026/05/26 12:20:58
处理时间 (V2) : 2026/05/27 08:58:05
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者:xiexinhui
处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图9 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025121551批-pH1.2介质-浆法-50转-5min-片3
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 28-17/10-1117-2 - zzp-2025121551p-rcqx-1-pH1.2jz-jf50z-p4-5min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260526-FX259.lcb

样品瓶号 : 1-28

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/05/26 12:24:21

处理时间 (V2) : 2026/05/27 08:58:07

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图10 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025121551批-pH1.2介质-浆法-50转-5min-片4
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 28-17/10-1118-2 - zzp-2025121551p-rcqx-1-pH1.2jz-jf50z-p5-5min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260526-FX259.lcb

样品瓶号 : 1-37

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/05/26 12:27:45

处理时间 (V2) : 2026/05/27 08:58:10

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图11 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025121551批-pH1.2介质-浆法-50转-5min-片5
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 28-17/10-1119-2 - zzp-2025121551p-rcqx-1-pH1.2jz-jf50z-p6-5min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260526-FX259.lcb

样品瓶号 : 1-46

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/05/26 12:31:07

处理时间 (V2) : 2026/05/27 08:58:12

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图12 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025121551批-pH1.2介质-桨法-50转-5min-片6
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 28-17/10-1120-2 - zzp-2025121551p-rcqx-1-pH1.2jz-jf50z-p1-10min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260526-FX259.lcb

样品瓶号 : 1-2

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/05/26 12:34:30

处理时间 (V2) : 2026/05/27 08:58:15

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图13 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025121551批-pH1.2介质-浆法-50转-10min-片1
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 28-17/10-1121-2 - zzp-2025121551p-rcqx-1-pH1.2jz-jf50z-p2-10min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260526-FX259.lcb

样品瓶号 : 1-11

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/05/26 12:37:53

处理时间 (V2) : 2026/05/27 08:58:17

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图14 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025121551批-pH1.2介质-浆法-50转-10min-片2
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 28-17/10-1122-2 - zzp-2025121551p-rcqx-1-pH1.2jz-jf50z-p3-10min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260526-FX259.lcb

样品瓶号 : 1-20

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/05/26 12:41:16

处理时间 (V2) : 2026/05/27 08:58:20

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图15 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025121551批-pH1.2介质-浆法-50转-10min-片3
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 28-17/10-1123-2 - zzp-2025121551p-rcqx-1-pH1.2jz-jf50z-p4-10min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260526-FX259.lcb

样品瓶号 : 1-29

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/05/26 12:44:39

处理时间 (V2) : 2026/05/27 08:58:22

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图16 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025121551批-pH1.2介质-浆法-50转-10min-片4
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 28-17/10-1124-2 - zzp-2025121551p-rcqx-1-pH1.2jz-jf50z-p5-10min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260526-FX259.lcb

样品瓶号 : 1-38

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/05/26 12:48:02

处理时间 (V2) : 2026/05/27 08:58:25

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图17 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025121551批-pH1.2介质-浆法-50转-10min-片5
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 28-17/10-1125-2 - zzp-2025121551p-rcqx-1-pH1.2jz-jf50z-p6-10min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260526-FX259.lcb

样品瓶号 : 1-47

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/05/26 12:51:26

处理时间 (V2) : 2026/05/27 08:58:28

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图18 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025121551批-pH1.2介质-浆法-50转-10min-片6
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 28-17/10-1126-2 - zzp-2025121551p-rcqx-1-pH1.2jz-jf50z-p1-15min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260526-FX259.lcb

样品瓶号 : 1-3

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/05/26 12:54:48

处理时间 (V2) : 2026/05/27 08:58:30

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图19 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025121551批-pH1.2介质-浆法-50转-15min-片1
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 28-17/10-1127-2 - zzp-2025121551p-rcqx-1-pH1.2jz-jf50z-p2-15min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260526-FX259.lcb

样品瓶号 : 1-12

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/05/26 12:58:12

处理时间 (V2) : 2026/05/27 08:58:32

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图20 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025121551批-pH1.2介质-浆法-50转-15min-片2
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 28-17/10-1128-2 - zzp-2025121551p-rcqx-1-pH1.2jz-jf50z-p3-15min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260526-FX259.lcb

样品瓶号 : 1-21

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/05/26 13:01:35

处理时间 (V2) : 2026/05/27 08:58:35

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图21 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025121551批-pH1.2介质-浆法-50转-15min-片3
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 28-17/10-1129-2 - zzp-2025121551p-rcqx-1-pH1.2jz-jf50z-p4-15min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260526-FX259.lcb

样品瓶号 : 1-30

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/05/26 13:04:57

处理时间 (V2) : 2026/05/27 08:58:38

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图22 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025121551批-pH1.2介质-浆法-50转-15min-片4
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 28-17/10-1130-2 - zzp-2025121551p-rcqx-1-pH1.2jz-jf50z-p5-15min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260526-FX259.lcb

样品瓶号 : 1-39

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/05/26 13:08:21

处理时间 (V2) : 2026/05/27 08:58:40

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图23 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025121551批-pH1.2介质-浆法-50转-15min-片5
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 28-17/10-1131-2 - zzp-2025121551p-rcqx-1-pH1.2jz-jf50z-p6-15min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260526-FX259.lcb

样品瓶号 : 1-48

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/05/26 13:11:42

处理时间 (V2) : 2026/05/27 08:58:42

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图24 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025121551批-pH1.2介质-浆法-50转-15min-片6
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 28-17/10-1132-2 - zzp-2025121551p-rcqx-1-pH1.2jz-jf50z-p1-20min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260526-FX259.lcb

样品瓶号 : 1-4

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/05/26 13:15:06

处理时间 (V2) : 2026/05/27 08:58:45

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图25 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025121551批-pH1.2介质-浆法-50转-20min-片1
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 28-17/10-1133-2 - zzp-2025121551p-rcqx-1-pH1.2jz-jf50z-p2-20min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260526-FX259.lcb

样品瓶号 : 1-13

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/05/26 13:18:28

处理时间 (V2) : 2026/05/27 08:58:47

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图26 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025121551批-pH1.2介质-浆法-50转-20min-片2
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 28-17/10-1134-2 - zzp-2025121551p-rcqx-1-pH1.2jz-jf50z-p3-20min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260526-FX259.lcb

样品瓶号 : 1-22

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/05/26 13:21:51

处理时间 (V2) : 2026/05/27 08:58:50

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图27 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025121551批-pH1.2介质-浆法-50转-20min-片3
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 28-17/10-1135-2 - zzp-2025121551p-rcqx-1-pH1.2jz-jf50z-p4-20min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260526-FX259.lcb

样品瓶号 : 1-31

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/05/26 13:25:15

处理时间 (V2) : 2026/05/27 08:58:52

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图28 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025121551批-pH1.2介质-浆法-50转-20min-片4
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 28-17/10-1136-2 - zzp-2025121551p-rcqx-1-pH1.2jz-jf50z-p5-20min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260526-FX259.lcb

样品瓶号 : 1-40

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/05/26 13:28:37

处理时间 (V2) : 2026/05/27 08:58:55

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图29 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025121551批-pH1.2介质-浆法-50转-20min-片5
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 28-17/10-1137-2 - zzp-2025121551p-rcqx-1-pH1.2jz-jf50z-p6-20min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260526-FX259.lcb

样品瓶号 : 1-49

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/05/26 13:31:59

处理时间 (V2) : 2026/05/27 08:58:58

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图30 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025121551批-pH1.2介质-浆法-50转-20min-片6
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 28-17/10-1138-2 - zzp-2025121551p-rcqx-1-pH1.2jz-jf50z-p1-30min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260526-FX259.lcb

样品瓶号 : 1-5

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/05/26 13:35:23

处理时间 (V2) : 2026/05/27 08:59:00

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图31 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025121551批-pH1.2介质-浆法-50转-30min-片1
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 28-17/10-1139-2 - zzp-2025121551p-rcqx-1-pH1.2jz-jf50z-p2-30min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260526-FX259.lcb

样品瓶号 : 1-14

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/05/26 13:38:45

处理时间 (V2) : 2026/05/27 08:59:03

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图32 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025121551批-pH1.2介质-浆法-50转-30min-片2
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 28-17/10-1140-2 - zzp-2025121551p-rcqx-1-pH1.2jz-jf50z-p3-30min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260526-FX259.lcb

样品瓶号 : 1-23

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/05/26 13:42:09

处理时间 (V2) : 2026/05/27 08:59:05

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图33 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025121551批-pH1.2介质-浆法-50转-30min-片3
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 28-17/10-1141-2 - zzp-2025121551p-rcqx-1-pH1.2jz-jf50z-p4-30min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260526-FX259.lcb

样品瓶号 : 1-32

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/05/26 13:45:31

处理时间 (V2) : 2026/05/27 08:59:08

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图34 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025121551批-pH1.2介质-浆法-50转-30min-片4
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 28-17/10-1142-2 - zzp-2025121551p-rcqx-1-pH1.2jz-jf50z-p5-30min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260526-FX259.lcb

样品瓶号 : 1-41

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/05/26 13:48:53

处理时间 (V2) : 2026/05/27 08:59:10

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图35 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025121551批-pH1.2介质-浆法-50转-30min-片5
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 28-17/10-1143-2 - zzp-2025121551p-rcqx-1-pH1.2jz-jf50z-p6-30min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260526-FX259.lcb

样品瓶号 : 1-50

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/05/26 13:52:16

处理时间 (V2) : 2026/05/27 08:59:13

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图36 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025121551批-pH1.2介质-浆法-50转-30min-片6
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 28-17/10-1144-2 - zzp-2025121551p-rcqx-1-pH1.2jz-jf50z-p1-45min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260526-FX259.lcb

样品瓶号 : 1-6

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/05/26 13:55:40

处理时间 (V2) : 2026/05/27 08:59:16

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图37 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025121551批-pH1.2介质-浆法-50转-45min-片1
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 28-17/10-1145-2 - zzp-2025121551p-rcqx-1-pH1.2jz-jf50z-p2-45min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260526-FX259.lcb

样品瓶号 : 1-15

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/05/26 13:59:02

处理时间 (V2) : 2026/05/27 08:59:18

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图38 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025121551批-pH1.2介质-浆法-50转-45min-片2
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 28-17/10-1146-2 - zzp-2025121551p-rcqx-1-pH1.2jz-jf50z-p3-45min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260526-FX259.lcb

样品瓶号 : 1-24

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/05/26 14:02:26

处理时间 (V2) : 2026/05/27 08:59:21

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图39 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025121551批-pH1.2介质-浆法-50转-45min-片3
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 28-17/10-1147-2 - zzp-2025121551p-rcqx-1-pH1.2jz-jf50z-p4-45min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260526-FX259.lcb

样品瓶号 : 1-33

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/05/26 14:05:48

处理时间 (V2) : 2026/05/27 08:59:23

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图40 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025121551批-pH1.2介质-浆法-50转-45min-片4
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 28-17/10-1148-2 - zzp-2025121551p-rcqx-1-pH1.2jz-jf50z-p5-45min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260526-FX259.lcb

样品瓶号 : 1-42

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/05/26 14:09:10

处理时间 (V2) : 2026/05/27 08:59:26

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图41 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025121551批-pH1.2介质-浆法-50转-45min-片5
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 28-17/10-1149-2 - zzp-2025121551p-rcqx-1-pH1.2jz-jf50z-p6-45min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260526-FX259.lcb

样品瓶号 : 1-51

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/05/26 14:12:33

处理时间 (V2) : 2026/05/27 08:59:28

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图42 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025121551批-pH1.2介质-浆法-50转-45min-片6
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 28-17/10-1150-2 - zzp-2025121551p-rcqx-1-pH1.2jz-jf50z-p1-60min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260526-FX259.lcb

样品瓶号 : 1-7

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/05/26 14:15:57

处理时间 (V2) : 2026/05/27 08:59:31

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图43 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025121551批-pH1.2介质-浆法-50转-60min-片1
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 28-17/10-1151-2 - zzp-2025121551p-rcqx-1-pH1.2jz-jf50z-p2-60min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260526-FX259.lcb

样品瓶号 : 1-16

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/05/26 14:19:22

处理时间 (V2) : 2026/05/27 08:59:33

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图44 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025121551批-pH1.2介质-浆法-50转-60min-片2
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 28-17/10-1152-2 - zzp-2025121551p-rcqx-1-pH1.2jz-jf50z-p3-60min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260526-FX259.lcb

样品瓶号 : 1-25

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/05/26 14:22:44

处理时间 (V2) : 2026/05/27 08:59:36

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图45 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025121551批-pH1.2介质-浆法-50转-60min-片3
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 28-17/10-1153-2 - zzp-2025121551p-rcqx-1-pH1.2jz-jf50z-p4-60min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260526-FX259.lcb

样品瓶号 : 1-34

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/05/26 14:26:07

处理时间 (V2) : 2026/05/27 08:59:38

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图46 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025121551批-pH1.2介质-浆法-50转-60min-片4
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 28-17/10-1154-2 - zzp-2025121551p-rcqx-1-pH1.2jz-jf50z-p5-60min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260526-FX259.lcb

样品瓶号 : 1-43

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/05/26 14:29:29

处理时间 (V2) : 2026/05/27 08:59:41

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图47 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025121551批-pH1.2介质-浆法-50转-60min-片5
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 28-17/10-1155-2 - zzp-2025121551p-rcqx-1-pH1.2jz-jf50z-p6-60min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260526-FX259.lcb

样品瓶号 : 1-52

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/05/26 14:32:52

处理时间 (V2) : 2026/05/27 08:59:43

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图48 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025121551批-pH1.2介质-浆法-50转-60min-片6
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 28-17/10-1156-2 - zzp-2025121551p-rcqx-1-pH1.2jz-jf50z-p1-jx.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260526-FX259.lcb

样品瓶号 : 1-8

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/05/26 14:36:17

处理时间 (V2) : 2026/05/27 08:59:46

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图49 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025121551批-pH1.2介质-桨法-50转-极限转速-片1
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 28-17/10-1157-2 - zzp-2025121551p-rcqx-1-pH1.2jz-jf50z-p2-jx.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260526-FX259.lcb

样品瓶号 : 1-17

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/05/26 14:39:40

处理时间 (V2) : 2026/05/27 08:59:48

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图50 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025121551批-pH1.2介质-桨法-50转-极限转速-片2
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 28-17/10-1158-2 - zzp-2025121551p-rcqx-1-pH1.2jz-jf50z-p3-jx.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260526-FX259.lcb

样品瓶号 : 1-26

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/05/26 14:43:03

处理时间 (V2) : 2026/05/27 08:59:51

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图51 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025121551批-pH1.2介质-桨法-50转-极限转速-片3
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 28-17/10-1159-2 - zzp-2025121551p-rcqx-1-pH1.2jz-jf50z-p4-jx.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260526-FX259.lcb

样品瓶号 : 1-35

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/05/26 14:46:27

处理时间 (V2) : 2026/05/27 08:59:53

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图52 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025121551批-pH1.2介质-桨法-50转-极限转速-片4
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 28-17/10-1160-2 - zzp-2025121551p-rcqx-1-pH1.2jz-jf50z-p5-jx.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260526-FX259.lcb

样品瓶号 : 1-44

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/05/26 14:49:51

处理时间 (V2) : 2026/05/27 08:59:56

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图53 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025121551批-pH1.2介质-桨法-50转-极限转速-片5
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 28-17/10-1161-2 - zzp-2025121551p-rcqx-1-pH1.2jz-jf50z-p6-jx.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260526-FX259.lcb

样品瓶号 : 1-53

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/05/26 14:53:15

处理时间 (V2) : 2026/05/27 08:59:58

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图54 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025121551批-pH1.2介质-桨法-50转-极限转速-片6
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 28-17/10-1162-2 - zzp-2025121551p-rcqx-1-pH1.2jz-jf50z-dz2-1.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260526-FX259.lcb

样品瓶号 : 1-27

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/05/26 14:56:38

处理时间 (V2) : 2026/05/27 09:00:01

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.017	53781	100.000	8116	2294	1.204	--
总计		53781	100.000	8116			

图55 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025121551批-pH1.2介质-桨法-50转
对照品溶液-2-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 28-17/10-1163-2 - zzp-2025121551p-rcqx-1-pH1.2jz-jf50z-dz2-2.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260526-FX259.lcb

样品瓶号 : 1-27

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/05/26 15:00:01

处理时间 (V2) : 2026/05/27 09:00:03

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.016	53816	100.000	8141	2286	1.200	--
总计		53816	100.000	8141			

图56 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025121551批-pH1.2介质-桨法-50转
对照品溶液-2-2



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 28-17/10-1164-2 - zzp-2025121651p-rcqx-1-pH1.2jz-jf50z-rj.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260526-FX259.lcb

样品瓶号 : 2-9

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/05/26 15:03:26

处理时间 (V2) : 2026/05/27 09:00:06

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图57 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025121651批-pH1.2介质-桨法-50转
溶剂



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 28-17/10-1165-2 - zzp-2025121651p-rcqx-1-pH1.2jz-jf50z-dz1-1.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260526-FX259.lcb

样品瓶号 : 2-18

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/05/26 15:06:51

处理时间 (V2) : 2026/05/27 09:00:08

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.016	53895	100.000	8179	2301	1.195	--
总计		53895	100.000	8179			

图58 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025121651批-pH1.2介质-桨法-50转
对照品溶液-1-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 28-17/10-1166-2 - zzp-2025121651p-rcqx-1-pH1.2jz-jf50z-dz1-2.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260526-FX259.lcb

样品瓶号 : 2-18

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/05/26 15:10:16

处理时间 (V2) : 2026/05/27 09:00:11

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.016	54124	100.000	8207	2293	1.194	--
总计		54124	100.000	8207			

图59 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025121651批-pH1.2介质-桨法-50转
对照品溶液-1-2



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 28-17/10-1167-2 - zzp-2025121651p-rcqx-1-pH1.2jz-jf50z-dz1-3.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260526-FX259.lcb

样品瓶号 : 2-18

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/05/26 15:13:42

处理时间 (V2) : 2026/05/27 09:00:13

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.016	54223	100.000	8221	2298	1.201	--
总计		54223	100.000	8221			

图60 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025121651批-pH1.2介质-桨法-50转
对照品溶液-1-3



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 28-17/10-1168-2 - zzp-2025121651p-rcqx-1-pH1.2jz-jf50z-dz1-4.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260526-FX259.lcb

样品瓶号 : 2-18

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/05/26 15:17:07

处理时间 (V2) : 2026/05/27 09:00:16

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.017	53957	100.000	8192	2294	1.195	--
总计		53957	100.000	8192			

图61 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025121651批-pH1.2介质-桨法-50转
对照品溶液-1-4



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 28-17/10-1169-2 - zzp-2025121651p-rcqx-1-pH1.2jz-jf50z-dz1-5.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260526-FX259.lcb

样品瓶号 : 2-18

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/05/26 15:20:31

处理时间 (V2) : 2026/05/27 09:00:19

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.017	54104	100.000	8191	2300	1.200	--
总计		54104	100.000	8191			

图62 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025121651批-pH1.2介质-桨法-50转
对照品溶液-1-5



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 28-17/10-1170-2 - zzp-2025121651p-rcqx-1-pH1.2jz-jf50z-p1-5min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260526-FX259.lcb

样品瓶号 : 2-1

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/05/26 15:23:57

处理时间 (V2) : 2026/05/27 09:00:21

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图63 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025121651批-pH1.2介质-浆法-50转-5min-片1
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 28-17/10-1171-2 - zzp-2025121651p-rcqx-1-pH1.2jz-jf50z-p2-5min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260526-FX259.lcb

样品瓶号 : 2-10

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/05/26 15:27:20

处理时间 (V2) : 2026/05/27 09:00:24

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图64 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025121651批-pH1.2介质-浆法-50转-5min-片2
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 28-17/10-1172-2 - zzp-2025121651p-rcqx-1-pH1.2jz-jf50z-p3-5min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260526-FX259.lcb

样品瓶号 : 2-19

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/05/26 15:30:45

处理时间 (V2) : 2026/05/27 09:00:26

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图65 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025121651批-pH1.2介质-浆法-50转-5min-片3
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 28-17/10-1173-2 - zzp-2025121651p-rcqx-1-pH1.2jz-jf50z-p4-5min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260526-FX259.lcb

样品瓶号 : 2-28

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/05/26 15:34:09

处理时间 (V2) : 2026/05/27 09:00:29

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图66 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025121651批-pH1.2介质-浆法-50转-5min-片4
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 28-17/10-1174-2 - zzp-2025121651p-rcqx-1-pH1.2jz-jf50z-p5-5min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260526-FX259.lcb

样品瓶号 : 2-37

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/05/26 15:37:33

处理时间 (V2) : 2026/05/27 09:00:31

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图67 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025121651批-pH1.2介质-浆法-50转-5min-片5
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 28-17/10-1175-2 - zzp-2025121651p-rcqx-1-pH1.2jz-jf50z-p6-5min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260526-FX259.lcb

样品瓶号 : 2-46

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/05/26 15:40:57

处理时间 (V2) : 2026/05/27 09:00:34

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图68 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025121651批-pH1.2介质-浆法-50转-5min-片6
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 28-17/10-1176-2 - zzp-2025121651p-rcqx-1-pH1.2jz-jf50z-p1-10min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260526-FX259.lcb

样品瓶号 : 2-2

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/05/26 15:44:21

处理时间 (V2) : 2026/05/27 09:00:36

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图69 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025121651批-pH1.2介质-浆法-50转-10min-片1
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 28-17/10-1177-2 - zzp-2025121651p-rcqx-1-pH1.2jz-jf50z-p2-10min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260526-FX259.lcb

样品瓶号 : 2-11

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/05/26 15:47:45

处理时间 (V2) : 2026/05/27 09:00:39

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图70 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025121651批-pH1.2介质-浆法-50转-10min-片2
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 28-17/10-1178-2 - zzp-2025121651p-rcqx-1-pH1.2jz-jf50z-p3-10min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260526-FX259.lcb

样品瓶号 : 2-20

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/05/26 15:51:09

处理时间 (V2) : 2026/05/27 09:00:42

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图71 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025121651批-pH1.2介质-浆法-50转-10min-片3
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 28-17/10-1179-2 - zzp-2025121651p-rcqx-1-pH1.2jz-jf50z-p4-10min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260526-FX259.lcb

样品瓶号 : 2-29

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/05/26 15:54:33

处理时间 (V2) : 2026/05/27 09:00:44

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图72 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025121651批-pH1.2介质-浆法-50转-10min-片4
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 28-17/10-1180-2 - zzp-2025121651p-rcqx-1-pH1.2jz-jf50z-p5-10min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260526-FX259.lcb

样品瓶号 : 2-38

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/05/26 15:57:57

处理时间 (V2) : 2026/05/27 09:00:47

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图73 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025121651批-pH1.2介质-浆法-50转-10min-片5
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 28-17/10-1181-2 - zzp-2025121651p-rcqx-1-pH1.2jz-jf50z-p6-10min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260526-FX259.lcb

样品瓶号 : 2-47

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/05/26 16:01:21

处理时间 (V2) : 2026/05/27 09:00:49

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图74 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025121651批-pH1.2介质-浆法-50转-10min-片6
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 28-17/10-1182-2 - zzp-2025121651p-rcqx-1-pH1.2jz-jf50z-p1-15min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260526-FX259.lcb

样品瓶号 : 2-3

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/05/26 16:04:45

处理时间 (V2) : 2026/05/27 09:00:52

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图75 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025121651批-pH1.2介质-浆法-50转-15min-片1
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 28-17/10-1183-2 - zzp-2025121651p-rcqx-1-pH1.2jz-jf50z-p2-15min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260526-FX259.lcb

样品瓶号 : 2-12

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/05/26 16:08:09

处理时间 (V2) : 2026/05/27 09:00:54

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图76 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025121651批-pH1.2介质-浆法-50转-15min-片2
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 28-17/10-1184-2 - zzp-2025121651p-rcqx-1-pH1.2jz-jf50z-p3-15min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260526-FX259.lcb

样品瓶号 : 2-21

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/05/26 16:11:33

处理时间 (V2) : 2026/05/27 09:00:57

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图77 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025121651批-pH1.2介质-浆法-50转-15min-片3
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 28-17/10-1185-2 - zzp-2025121651p-rcqx-1-pH1.2jz-jf50z-p4-15min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260526-FX259.lcb

样品瓶号 : 2-30

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/05/26 16:14:57

处理时间 (V2) : 2026/05/27 09:01:00

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图78 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025121651批-pH1.2介质-浆法-50转-15min-片4
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 28-17/10-1186-2 - zzp-2025121651p-rcqx-1-pH1.2jz-jf50z-p5-15min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260526-FX259.lcb

样品瓶号 : 2-39

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/05/26 16:18:21

处理时间 (V2) : 2026/05/27 09:01:03

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图79 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025121651批-pH1.2介质-浆法-50转-15min-片5
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 28-17/10-1187-2 - zzp-2025121651p-rcqx-1-pH1.2jz-jf50z-p6-15min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260526-FX259.lcb

样品瓶号 : 2-48

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/05/26 16:21:45

处理时间 (V2) : 2026/05/27 09:01:05

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图80 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025121651批-pH1.2介质-浆法-50转-15min-片6
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 28-17/10-1188-2 - zzp-2025121651p-rcqx-1-pH1.2jz-jf50z-p1-20min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260526-FX259.lcb

样品瓶号 : 2-4

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/05/26 16:25:09

处理时间 (V2) : 2026/05/27 09:01:08

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图81 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025121651批-pH1.2介质-浆法-50转-20min-片1
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 28-17/10-1189-2 - zzp-2025121651p-rcqx-1-pH1.2jz-jf50z-p2-20min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260526-FX259.lcb

样品瓶号 : 2-13

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/05/26 16:28:33

处理时间 (V2) : 2026/05/27 09:01:10

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图82 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025121651批-pH1.2介质-浆法-50转-20min-片2
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 28-17/10-1190-2 - zzp-2025121651p-rcqx-1-pH1.2jz-jf50z-p3-20min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260526-FX259.lcb

样品瓶号 : 2-22

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/05/26 16:31:58

处理时间 (V2) : 2026/05/27 09:01:13

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图83 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025121651批-pH1.2介质-浆法-50转-20min-片3
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 28-17/10-1191-2 - zzp-2025121651p-rcqx-1-pH1.2jz-jf50z-p4-20min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260526-FX259.lcb

样品瓶号 : 2-31

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/05/26 16:35:23

处理时间 (V2) : 2026/05/27 09:01:16

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图84 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025121651批-pH1.2介质-浆法-50转-20min-片4
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 28-17/10-1192-2 - zzp-2025121651p-rcqx-1-pH1.2jz-jf50z-p5-20min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260526-FX259.lcb

样品瓶号 : 2-40

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/05/26 16:38:47

处理时间 (V2) : 2026/05/27 09:01:18

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图85 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025121651批-pH1.2介质-浆法-50转-20min-片5
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 28-17/10-1193-2 - zzp-2025121651p-rcqx-1-pH1.2jz-jf50z-p6-20min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260526-FX259.lcb

样品瓶号 : 2-49

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/05/26 16:42:11

处理时间 (V2) : 2026/05/27 09:01:21

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图86 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025121651批-pH1.2介质-浆法-50转-20min-片6
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 28-17/10-1194-2 - zzp-2025121651p-rcqx-1-pH1.2jz-jf50z-p1-30min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260526-FX259.lcb

样品瓶号 : 2-5

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/05/26 16:45:35

处理时间 (V2) : 2026/05/27 09:01:23

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图87 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025121651批-pH1.2介质-浆法-50转-30min-片1
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 28-17/10-1195-2 - zzp-2025121651p-rcqx-1-pH1.2jz-jf50z-p2-30min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260526-FX259.lcb

样品瓶号 : 2-14

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/05/26 16:49:01

处理时间 (V2) : 2026/05/27 09:01:26

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图88 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025121651批-pH1.2介质-浆法-50转-30min-片2
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 28-17/10-1196-2 - zzp-2025121651p-rcqx-1-pH1.2jz-jf50z-p3-30min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260526-FX259.lcb

样品瓶号 : 2-23

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/05/26 16:52:26

处理时间 (V2) : 2026/05/27 09:01:28

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图89 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025121651批-pH1.2介质-浆法-50转-30min-片3
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 28-17/10-1197-2 - zzp-2025121651p-rcqx-1-pH1.2jz-jf50z-p4-30min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260526-FX259.lcb

样品瓶号 : 2-32

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/05/26 16:55:50

处理时间 (V2) : 2026/05/27 09:01:31

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图90 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025121651批-pH1.2介质-浆法-50转-30min-片4
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 28-17/10-1198-2 - zzp-2025121651p-rcqx-1-pH1.2jz-jf50z-p5-30min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260526-FX259.lcb

样品瓶号 : 2-41

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/05/26 16:59:15

处理时间 (V2) : 2026/05/27 09:01:33

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图91 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025121651批-pH1.2介质-浆法-50转-30min-片5
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 28-17/10-1199-2 - zzp-2025121651p-rcqx-1-pH1.2jz-jf50z-p6-30min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260526-FX259.lcb

样品瓶号 : 2-50

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/05/26 17:02:39

处理时间 (V2) : 2026/05/27 09:01:36

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图92 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025121651批-pH1.2介质-浆法-50转-30min-片6
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 28-17/10-1200-2 - zzp-2025121651p-rcqx-1-pH1.2jz-jf50z-p1-45min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260526-FX259.lcb

样品瓶号 : 2-6

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/05/26 17:06:03

处理时间 (V2) : 2026/05/27 09:01:38

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图93 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025121651批-pH1.2介质-浆法-50转-45min-片1
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 28-17/10-1201-2 - zzp-2025121651p-rcqx-1-pH1.2jz-jf50z-p2-45min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260526-FX259.lcb

样品瓶号 : 2-15

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/05/26 17:09:27

处理时间 (V2) : 2026/05/27 09:01:41

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图94 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025121651批-pH1.2介质-浆法-50转-45min-片2
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 28-17/10-1202-2 - zzp-2025121651p-rcqx-1-pH1.2jz-jf50z-p3-45min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260526-FX259.lcb

样品瓶号 : 2-24

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/05/26 17:12:52

处理时间 (V2) : 2026/05/27 09:01:43

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图95 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025121651批-pH1.2介质-浆法-50转-45min-片3
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 28-17/10-1203-2 - zzp-2025121651p-rcqx-1-pH1.2jz-jf50z-p4-45min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260526-FX259.lcb

样品瓶号 : 2-33

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/05/26 17:16:17

处理时间 (V2) : 2026/05/27 09:01:46

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图96 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025121651批-pH1.2介质-浆法-50转-45min-片4
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 28-17/10-1204-2 - zzp-2025121651p-rcqx-1-pH1.2jz-jf50z-p5-45min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260526-FX259.lcb

样品瓶号 : 2-42

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/05/26 17:19:41

处理时间 (V2) : 2026/05/27 09:01:48

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图97 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025121651批-pH1.2介质-浆法-50转-45min-片5
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 28-17/10-1205-2 - zzp-2025121651p-rcqx-1-pH1.2jz-jf50z-p6-45min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260526-FX259.lcb

样品瓶号 : 2-51

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/05/26 17:23:05

处理时间 (V2) : 2026/05/27 09:01:51

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图98 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025121651批-pH1.2介质-浆法-50转-45min-片6
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 28-17/10-1206-2 - zzp-2025121651p-rcqx-1-pH1.2jz-jf50z-p1-60min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260526-FX259.lcb

样品瓶号 : 2-7

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/05/26 17:26:30

处理时间 (V2) : 2026/05/27 09:01:53

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图99 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025121651批-pH1.2介质-浆法-50转-60min-片1
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 28-17/10-1207-2 - zzp-2025121651p-rcqx-1-pH1.2jz-jf50z-p2-60min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260526-FX259.lcb

样品瓶号 : 2-16

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/05/26 17:29:55

处理时间 (V2) : 2026/05/27 09:01:56

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图100 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025121651批-pH1.2介质-浆法-50转-60min-片2
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 28-17/10-1208-2 - zzp-2025121651p-rcqx-1-pH1.2jz-jf50z-p3-60min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260526-FX259.lcb

样品瓶号 : 2-25

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/05/26 17:33:20

处理时间 (V2) : 2026/05/27 09:01:58

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图101 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025121651批-pH1.2介质-浆法-50转-60min-片3
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 28-17/10-1209-2 - zzp-2025121651p-rcqx-1-pH1.2jz-jf50z-p4-60min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260526-FX259.lcb

样品瓶号 : 2-34

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/05/26 17:36:45

处理时间 (V2) : 2026/05/27 09:02:01

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图102 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025121651批-pH1.2介质-浆法-50转-60min-片4
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 28-17/10-1210-2 - zzp-2025121651p-rcqx-1-pH1.2jz-jf50z-p5-60min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260526-FX259.lcb

样品瓶号 : 2-43

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/05/26 17:40:09

处理时间 (V2) : 2026/05/27 09:02:03

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图103 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025121651批-pH1.2介质-浆法-50转-60min-片5
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 28-17/10-1211-2 - zzp-2025121651p-rcqx-1-pH1.2jz-jf50z-p6-60min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260526-FX259.lcb

样品瓶号 : 2-52

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/05/26 17:43:33

处理时间 (V2) : 2026/05/27 09:02:06

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图104 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025121651批-pH1.2介质-浆法-50转-60min-片6
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 28-17/10-1212-2 - zzp-2025121651p-rcqx-1-pH1.2jz-jf50z-p1-jx.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260526-FX259.lcb

样品瓶号 : 2-8

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/05/26 17:46:58

处理时间 (V2) : 2026/05/27 09:02:08

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图105 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025121651批-pH1.2介质-桨法-50转-极限转速-片1
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 28-17/10-1213-2 - zzp-2025121651p-rcqx-1-pH1.2jz-jf50z-p2-jx.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260526-FX259.lcb

样品瓶号 : 2-17

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/05/26 17:50:23

处理时间 (V2) : 2026/05/27 09:02:11

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图106 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025121651批-pH1.2介质-桨法-50转-极限转速-片2
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 28-17/10-1214-2 - zzp-2025121651p-rcqx-1-pH1.2jz-jf50z-p3-jx.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260526-FX259.lcb

样品瓶号 : 2-26

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/05/26 17:53:47

处理时间 (V2) : 2026/05/27 09:02:13

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图107 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025121651批-pH1.2介质-桨法-50转-极限转速-片3
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 28-17/10-1215-2 - zzp-2025121651p-rcqx-1-pH1.2jz-jf50z-p4-jx.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260526-FX259.lcb

样品瓶号 : 2-35

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/05/26 17:57:12

处理时间 (V2) : 2026/05/27 09:02:16

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图108 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025121651批-pH1.2介质-桨法-50转-极限转速-片4
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 28-17/10-1216-2 - zzp-2025121651p-rcqx-1-pH1.2jz-jf50z-p5-jx.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260526-FX259.lcb

样品瓶号 : 2-44

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/05/26 18:00:36

处理时间 (V2) : 2026/05/27 09:02:19

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图109 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025121651批-pH1.2介质-桨法-50转-极限转速-片5
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 28-17/10-1217-2 - zzp-2025121651p-rcqx-1-pH1.2jz-jf50z-p6-jx.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260526-FX259.lcb

样品瓶号 : 2-53

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/05/26 18:04:01

处理时间 (V2) : 2026/05/27 09:02:21

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图110 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025121651批-pH1.2介质-桨法-50转-极限转速-片6
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 28-17/10-1218-2 - zzp-2025121651p-rcqx-1-pH1.2jz-jf50z-dz2-1.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260526-FX259.lcb

样品瓶号 : 2-27

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/05/26 18:07:26

处理时间 (V2) : 2026/05/27 09:02:24

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.017	54101	100.000	8162	2280	1.196	--
总计		54101	100.000	8162			

图111 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025121651批-pH1.2介质-桨法-50转
对照品溶液-2-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 28-17/10-1219-2 - zzp-2025121651p-rcqx-1-pH1.2jz-jf50z-dz2-2.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260526-FX259.lcb

样品瓶号 : 2-27

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/05/26 18:10:51

处理时间 (V2) : 2026/05/27 09:02:26

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.017	54077	100.000	8164	2275	1.188	--
总计		54077	100.000	8164			

图112 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025121651批-pH1.2介质-桨法-50转
对照品溶液-2-2



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 28-17/10-1220-2 - zzp-2025121851p-rcqx-1-pH1.2jz-jf50z-rj.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260526-FX259.lcb

样品瓶号 : 3-9

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/05/26 18:14:14

处理时间 (V2) : 2026/05/27 09:02:29

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图113 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025121851批-pH1.2介质-桨法-50转
溶剂



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 28-17/10-1221-2 - zzp-2025121851p-rcqx-1-pH1.2jz-jf50z-dz1-1.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260526-FX259.lcb

样品瓶号 : 3-18

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/05/26 18:17:37

处理时间 (V2) : 2026/05/27 09:02:32

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.018	53931	100.000	8143	2285	1.193	--
总计		53931	100.000	8143			

图114 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025121851批-pH1.2介质-桨法-50转
对照品溶液-1-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 28-17/10-1222-2 - zzp-2025121851p-rcqx-1-pH1.2jz-jf50z-dz1-2.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260526-FX259.lcb

样品瓶号 : 3-18

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/05/26 18:21:01

处理时间 (V2) : 2026/05/27 09:02:34

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.018	54261	100.000	8159	2266	1.195	--
总计		54261	100.000	8159			

图115 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025121851批-pH1.2介质-桨法-50转
对照品溶液-1-2



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 28-17/10-1223-2 - zzp-2025121851p-rcqx-1-pH1.2jz-jf50z-dz1-3.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260526-FX259.lcb

样品瓶号 : 3-18

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/05/26 18:24:25

处理时间 (V2) : 2026/05/27 09:02:37

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.018	54153	100.000	8165	2270	1.189	--
总计		54153	100.000	8165			

图116 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025121851批-pH1.2介质-桨法-50转
对照品溶液-1-3



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 28-17/10-1224-2 - zzp-2025121851p-rcqx-1-pH1.2jz-jf50z-dz1-4.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260526-FX259.lcb

样品瓶号 : 3-18

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/05/26 18:27:49

处理时间 (V2) : 2026/05/27 09:02:39

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.017	54113	100.000	8151	2266	1.190	--
总计		54113	100.000	8151			

图117 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025121851批-pH1.2介质-桨法-50转
对照品溶液-1-4



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 28-17/10-1225-2 - zzp-2025121851p-rcqx-1-pH1.2jz-jf50z-dz1-5.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260526-FX259.lcb

样品瓶号 : 3-18

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/05/26 18:31:12

处理时间 (V2) : 2026/05/27 09:02:42

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.017	53819	100.000	8156	2278	1.192	--
总计		53819	100.000	8156			

图118 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025121851批-pH1.2介质-桨法-50转
对照品溶液-1-5



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 28-17/10-1226-2 - zzp-2025121851p-rcqx-1-pH1.2jz-jf50z-p1-5min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260526-FX259.lcb

样品瓶号 : 3-1

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/05/26 18:34:34

处理时间 (V2) : 2026/05/27 09:02:44

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图119 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025121851批-pH1.2介质-浆法-50转-5min-片1
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 28-17/10-1227-2 - zzp-2025121851p-rcqx-1-pH1.2jz-jf50z-p2-5min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260526-FX259.lcb

样品瓶号 : 3-10

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/05/26 18:37:57

处理时间 (V2) : 2026/05/27 09:02:47

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图120 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025121851批-pH1.2介质-桨法-50转-5min-片2
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 28-17/10-1228-2 - zzp-2025121851p-rcqx-1-pH1.2jz-jf50z-p3-5min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260526-FX259.lcb

样品瓶号 : 3-19

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/05/26 18:41:20

处理时间 (V2) : 2026/05/27 09:02:49

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图121 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025121851批-pH1.2介质-浆法-50转-5min-片3
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 28-17/10-1229-2 - zzp-2025121851p-rcqx-1-pH1.2jz-jf50z-p4-5min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260526-FX259.lcb

样品瓶号 : 3-28

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/05/26 18:44:43

处理时间 (V2) : 2026/05/27 09:02:52

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图122 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025121851批-pH1.2介质-浆法-50转-5min-片4
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30℃

数据文件名: RC\$QTL-392 - 28-17/10-1230-2 - zzp-2025121851p-rcqx-1-pH1.2jz-jf50z-p5-5min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260526-FX259.lcb

样品瓶号 : 3-37

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/05/26 18:48:05

处理时间 (V2) : 2026/05/27 09:02:54

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图123 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025121851批-pH1.2介质-浆法-50转-5min-片5
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 28-17/10-1231-2 - zzp-2025121851p-rcqx-1-pH1.2jz-jf50z-p6-5min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260526-FX259.lcb

样品瓶号 : 3-46

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/05/26 18:51:29

处理时间 (V2) : 2026/05/27 09:02:57

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图124 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025121851批-pH1.2介质-浆法-50转-5min-片6
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 28-17/10-1232-2 - zzp-2025121851p-rcqx-1-pH1.2jz-jf50z-p1-10min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260526-FX259.lcb

样品瓶号 : 3-2

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/05/26 18:54:52

处理时间 (V2) : 2026/05/27 09:03:00

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图125 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025121851批-pH1.2介质-浆法-50转-10min-片1
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 28-17/10-1233-2 - zzp-2025121851p-rcqx-1-pH1.2jz-jf50z-p2-10min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260526-FX259.lcb

样品瓶号 : 3-11

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/05/26 18:58:14

处理时间 (V2) : 2026/05/27 09:03:03

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图126 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025121851批-pH1.2介质-浆法-50转-10min-片2
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 28-17/10-1234-2 - zzp-2025121851p-rcqx-1-pH1.2jz-jf50z-p3-10min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260526-FX259.lcb

样品瓶号 : 3-20

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/05/26 19:01:36

处理时间 (V2) : 2026/05/27 09:03:05

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图127 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025121851批-pH1.2介质-浆法-50转-10min-片3
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 28-17/10-1235-2 - zzp-2025121851p-rcqx-1-pH1.2jz-jf50z-p4-10min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260526-FX259.lcb

样品瓶号 : 3-29

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/05/26 19:05:00

处理时间 (V2) : 2026/05/27 09:03:08

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图128 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025121851批-pH1.2介质-浆法-50转-10min-片4
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 28-17/10-1236-2 - zzp-2025121851p-rcqx-1-pH1.2jz-jf50z-p5-10min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260526-FX259.lcb

样品瓶号 : 3-38

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/05/26 19:08:22

处理时间 (V2) : 2026/05/27 09:03:11

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图129 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025121851批-pH1.2介质-浆法-50转-10min-片5
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 28-17/10-1237-2 - zzp-2025121851p-rcqx-1-pH1.2jz-jf50z-p6-10min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260526-FX259.lcb

样品瓶号 : 3-47

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/05/26 19:11:45

处理时间 (V2) : 2026/05/27 09:03:14

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图130 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025121851批-pH1.2介质-浆法-50转-10min-片6
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 28-17/10-1238-2 - zzp-2025121851p-rcqx-1-pH1.2jz-jf50z-p1-15min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260526-FX259.lcb

样品瓶号 : 3-3

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/05/26 19:15:07

处理时间 (V2) : 2026/05/27 09:03:16

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图131 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025121851批-pH1.2介质-浆法-50转-15min-片1
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 28-17/10-1239-2 - zzp-2025121851p-rcqx-1-pH1.2jz-jf50z-p2-15min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260526-FX259.lcb

样品瓶号 : 3-12

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/05/26 19:18:29

处理时间 (V2) : 2026/05/27 09:03:19

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图132 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025121851批-pH1.2介质-浆法-50转-15min-片2
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 28-17/10-1240-2 - zzp-2025121851p-rcqx-1-pH1.2jz-jf50z-p3-15min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260526-FX259.lcb

样品瓶号 : 3-21

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/05/26 19:21:52

处理时间 (V2) : 2026/05/27 09:03:21

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图133 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025121851批-pH1.2介质-浆法-50转-15min-片3
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 28-17/10-1241-2 - zzp-2025121851p-rcqx-1-pH1.2jz-jf50z-p4-15min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260526-FX259.lcb

样品瓶号 : 3-30

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/05/26 19:25:15

处理时间 (V2) : 2026/05/27 09:03:24

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图134 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025121851批-pH1.2介质-浆法-50转-15min-片4
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 28-17/10-1242-2 - zzp-2025121851p-rcqx-1-pH1.2jz-jf50z-p5-15min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260526-FX259.lcb

样品瓶号 : 3-39

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/05/26 19:28:37

处理时间 (V2) : 2026/05/27 09:03:27

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图135 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025121851批-pH1.2介质-浆法-50转-15min-片5
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 28-17/10-1243-2 - zzp-2025121851p-rcqx-1-pH1.2jz-jf50z-p6-15min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260526-FX259.lcb

样品瓶号 : 3-48

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/05/26 19:32:00

处理时间 (V2) : 2026/05/27 09:03:29

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图136 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025121851批-pH1.2介质-浆法-50转-15min-片6
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 28-17/10-1244-2 - zzp-2025121851p-rcqx-1-pH1.2jz-jf50z-p1-20min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260526-FX259.lcb

样品瓶号 : 3-4

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/05/26 19:35:23

处理时间 (V2) : 2026/05/27 09:03:32

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图137 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025121851批-pH1.2介质-浆法-50转-20min-片1
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 28-17/10-1245-2 - zzp-2025121851p-rcqx-1-pH1.2jz-jf50z-p2-20min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260526-FX259.lcb

样品瓶号 : 3-13

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/05/26 19:38:45

处理时间 (V2) : 2026/05/27 09:03:34

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图138 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025121851批-pH1.2介质-浆法-50转-20min-片2
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 28-17/10-1246-2 - zzp-2025121851p-rcqx-1-pH1.2jz-jf50z-p3-20min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260526-FX259.lcb

样品瓶号 : 3-22

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/05/26 19:42:07

处理时间 (V2) : 2026/05/27 09:03:37

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图139 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025121851批-pH1.2介质-浆法-50转-20min-片3
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 28-17/10-1247-2 - zzp-2025121851p-rcqx-1-pH1.2jz-jf50z-p4-20min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260526-FX259.lcb

样品瓶号 : 3-31

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/05/26 19:45:28

处理时间 (V2) : 2026/05/27 09:03:39

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图140 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025121851批-pH1.2介质-浆法-50转-20min-片4
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 28-17/10-1248-2 - zzp-2025121851p-rcqx-1-pH1.2jz-jf50z-p5-20min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260526-FX259.lcb

样品瓶号 : 3-40

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/05/26 19:48:51

处理时间 (V2) : 2026/05/27 09:03:42

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图141 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025121851批-pH1.2介质-浆法-50转-20min-片5
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 28-17/10-1249-2 - zzp-2025121851p-rcqx-1-pH1.2jz-jf50z-p6-20min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260526-FX259.lcb

样品瓶号 : 3-49

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/05/26 19:52:13

处理时间 (V2) : 2026/05/27 09:03:45

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图142 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025121851批-pH1.2介质-浆法-50转-20min-片6
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 28-17/10-1250-2 - zzp-2025121851p-rcqx-1-pH1.2jz-jf50z-p1-30min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260526-FX259.lcb

样品瓶号 : 3-5

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/05/26 19:55:35

处理时间 (V2) : 2026/05/27 09:03:47

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图143 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025121851批-pH1.2介质-浆法-50转-30min-片1
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 28-17/10-1251-2 - zzp-2025121851p-rcqx-1-pH1.2jz-jf50z-p2-30min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260526-FX259.lcb

样品瓶号 : 3-14

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/05/26 19:58:58

处理时间 (V2) : 2026/05/27 09:03:50

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图144 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025121851批-pH1.2介质-浆法-50转-30min-片2
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 28-17/10-1252-2 - zzp-2025121851p-rcqx-1-pH1.2jz-jf50z-p3-30min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260526-FX259.lcb

样品瓶号 : 3-23

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/05/26 20:02:21

处理时间 (V2) : 2026/05/27 09:03:52

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图145 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025121851批-pH1.2介质-浆法-50转-30min-片3
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 28-17/10-1253-2 - zzp-2025121851p-rcqx-1-pH1.2jz-jf50z-p4-30min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260526-FX259.lcb

样品瓶号 : 3-32

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/05/26 20:05:43

处理时间 (V2) : 2026/05/27 09:03:54

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图146 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025121851批-pH1.2介质-浆法-50转-30min-片4
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 28-17/10-1254-2 - zzp-2025121851p-rcqx-1-pH1.2jz-jf50z-p5-30min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260526-FX259.lcb

样品瓶号 : 3-41

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/05/26 20:09:06

处理时间 (V2) : 2026/05/27 09:03:57

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图147 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025121851批-pH1.2介质-浆法-50转-30min-片5
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 28-17/10-1255-2 - zzp-2025121851p-rcqx-1-pH1.2jz-jf50z-p6-30min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260526-FX259.lcb

样品瓶号 : 3-50

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/05/26 20:12:29

处理时间 (V2) : 2026/05/27 09:03:59

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图148 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025121851批-pH1.2介质-浆法-50转-30min-片6
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 28-17/10-1256-2 - zzp-2025121851p-rcqx-1-pH1.2jz-jf50z-p1-45min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260526-FX259.lcb

样品瓶号 : 3-6

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/05/26 20:15:52

处理时间 (V2) : 2026/05/27 09:04:02

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图149 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025121851批-pH1.2介质-浆法-50转-45min-片1
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 28-17/10-1257-2 - zzp-2025121851p-rcqx-1-pH1.2jz-jf50z-p2-45min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260526-FX259.lcb

样品瓶号 : 3-15

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/05/26 20:19:13

处理时间 (V2) : 2026/05/27 09:04:04

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图150 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025121851批-pH1.2介质-浆法-50转-45min-片2
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 28-17/10-1258-2 - zzp-2025121851p-rcqx-1-pH1.2jz-jf50z-p3-45min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260526-FX259.lcb

样品瓶号 : 3-24

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/05/26 20:22:36

处理时间 (V2) : 2026/05/27 09:04:07

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图151 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025121851批-pH1.2介质-浆法-50转-45min-片3
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 28-17/10-1259-2 - zzp-2025121851p-rcqx-1-pH1.2jz-jf50z-p4-45min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260526-FX259.lcb

样品瓶号 : 3-33

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/05/26 20:25:58

处理时间 (V2) : 2026/05/27 09:04:09

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图152 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025121851批-pH1.2介质-浆法-50转-45min-片4
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 28-17/10-1260-2 - zzp-2025121851p-rcqx-1-pH1.2jz-jf50z-p5-45min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260526-FX259.lcb

样品瓶号 : 3-42

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/05/26 20:29:21

处理时间 (V2) : 2026/05/27 09:04:12

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图153 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025121851批-pH1.2介质-浆法-50转-45min-片5
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 28-17/10-1261-2 - zzp-2025121851p-rcqx-1-pH1.2jz-jf50z-p6-45min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260526-FX259.lcb

样品瓶号 : 3-51

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/05/26 20:32:43

处理时间 (V2) : 2026/05/27 09:04:14

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图154 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025121851批-pH1.2介质-浆法-50转-45min-片6
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 28-17/10-1262-2 - zzp-2025121851p-rcqx-1-pH1.2jz-jf50z-p1-60min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260526-FX259.lcb

样品瓶号 : 3-7

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/05/26 20:36:05

处理时间 (V2) : 2026/05/27 09:04:17

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图155 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025121851批-pH1.2介质-浆法-50转-60min-片1
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 28-17/10-1263-2 - zzp-2025121851p-rcqx-1-pH1.2jz-jf50z-p2-60min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260526-FX259.lcb

样品瓶号 : 3-16

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/05/26 20:39:27

处理时间 (V2) : 2026/05/27 09:04:19

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图156 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025121851批-pH1.2介质-浆法-50转-60min-片2
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 28-17/10-1264-2 - zzp-2025121851p-rcqx-1-pH1.2jz-jf50z-p3-60min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260526-FX259.lcb

样品瓶号 : 3-25

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/05/26 20:42:50

处理时间 (V2) : 2026/05/27 09:04:22

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图157 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025121851批-pH1.2介质-浆法-50转-60min-片3
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 28-17/10-1265-2 - zzp-2025121851p-rcqx-1-pH1.2jz-jf50z-p4-60min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260526-FX259.lcb

样品瓶号 : 3-34

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/05/26 20:46:12

处理时间 (V2) : 2026/05/27 09:04:24

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图158 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025121851批-pH1.2介质-浆法-50转-60min-片4
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 28-17/10-1266-2 - zzp-2025121851p-rcqx-1-pH1.2jz-jf50z-p5-60min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260526-FX259.lcb

样品瓶号 : 3-43

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/05/26 20:49:35

处理时间 (V2) : 2026/05/27 09:04:27

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图159 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025121851批-pH1.2介质-浆法-50转-60min-片5
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 28-17/10-1267-2 - zzp-2025121851p-rcqx-1-pH1.2jz-jf50z-p6-60min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260526-FX259.lcb

样品瓶号 : 3-52

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/05/26 20:52:57

处理时间 (V2) : 2026/05/27 09:04:29

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图160 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025121851批-pH1.2介质-浆法-50转-60min-片6
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 28-17/10-1268-2 - zzp-2025121851p-rcqx-1-pH1.2jz-jf50z-p1-jx.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260526-FX259.lcb

样品瓶号 : 3-8

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/05/26 20:56:20

处理时间 (V2) : 2026/05/27 09:04:32

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图161 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025121851批-pH1.2介质-桨法-50转-极限转速-片1
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 28-17/10-1269-2 - zzp-2025121851p-rcqx-1-pH1.2jz-jf50z-p2-jx.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260526-FX259.lcb

样品瓶号 : 3-17

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/05/26 20:59:43

处理时间 (V2) : 2026/05/27 09:04:34

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图162 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025121851批-pH1.2介质-桨法-50转-极限转速-片2
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 28-17/10-1270-2 - zzp-2025121851p-rcqx-1-pH1.2jz-jf50z-p3-jx.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260526-FX259.lcb

样品瓶号 : 3-26

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/05/26 21:03:05

处理时间 (V2) : 2026/05/27 09:04:37

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图163 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025121851批-pH1.2介质-桨法-50转-极限转速-片3
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 28-17/10-1271-2 - zzp-2025121851p-rcqx-1-pH1.2jz-jf50z-p4-jx.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260526-FX259.lcb

样品瓶号 : 3-35

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/05/26 21:06:28

处理时间 (V2) : 2026/05/27 09:04:39

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图164 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025121851批-pH1.2介质-桨法-50转-极限转速-片4
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 28-17/10-1272-2 - zzp-2025121851p-rcqx-1-pH1.2jz-jf50z-p5-jx.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260526-FX259.lcb

样品瓶号 : 3-44

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/05/26 21:09:51

处理时间 (V2) : 2026/05/27 09:04:42

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图165 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025121851批-pH1.2介质-桨法-50转-极限转速-片5
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 28-17/10-1273-2 - zzp-2025121851p-rcqx-1-pH1.2jz-jf50z-p6-jx.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260526-FX259.lcb

样品瓶号 : 3-53

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/05/26 21:13:14

处理时间 (V2) : 2026/05/27 09:04:44

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图166 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025121851批-pH1.2介质-桨法-50转-极限转速-片6
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 28-18/10-1274-2 - zzp-2025121851p-rcqx-1-pH1.2jz-jf50z-dz2-1.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260526-FX259.lcb

样品瓶号 : 3-27

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/05/26 21:16:37

处理时间 (V2) : 2026/05/27 09:06:13

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.018	54847	100.000	8311	2257	1.167	--
总计		54847	100.000	8311			

图167 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025121851批-pH1.2介质-桨法-50转
对照品溶液-2-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 28-19/10-1275-2 - zzp-2025121851p-rcqx-1-pH1.2jz-jf50z-dz2-2.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260526-FX259.lcb

样品瓶号 : 3-27

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/05/26 21:20:01

处理时间 (V2) : 2026/05/27 09:06:58

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.018	54349	100.000	8234	2277	1.187	--
总计		54349	100.000	8234			

图168 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025121851批-pH1.2介质-桨法-50转
对照品溶液-2-2



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 28-20/10-1276-2 - cbzj-00637Ap-rcqx-1-pH1.2jz-jf50z-rj.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260526-FX259.lcb

样品瓶号 : 4-9

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/05/26 21:23:25

处理时间 (V2) : 2026/05/27 09:07:45

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图169 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-00637A批-pH1.2介质-桨法-50转
溶剂



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 28-20/10-1277-2 - cbzj-00637Ap-rcqx-1-pH1.2jz-jf50z-dz1-1.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260526-FX259.lcb

样品瓶号 : 4-18

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/05/26 21:26:50

处理时间 (V2) : 2026/05/27 09:07:47

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.018	54049	100.000	8182	2269	1.180	--
总计		54049	100.000	8182			

图170 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-00637A批-pH1.2介质-桨法-50转
对照品溶液-1-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30℃

数据文件名: RC\$QTL-392 - 28-20/10-1278-2 - cbzj-00637Ap-rcqx-1-pH1.2jz-jf50z-dz1-2.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260526-FX259.lcb

样品瓶号 : 4-18

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/05/26 21:30:15

处理时间 (V2) : 2026/05/27 09:07:50

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.018	54112	100.000	8192	2269	1.186	--
总计		54112	100.000	8192			

图171 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-00637A批-pH1.2介质-桨法-50转
对照品溶液-1-2



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 28-20/10-1279-2 - cbzj-00637Ap-rcqx-1-pH1.2jz-jf50z-dz1-3.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260526-FX259.lcb

样品瓶号 : 4-18

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/05/26 21:33:39

处理时间 (V2) : 2026/05/27 09:07:53

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.018	54380	100.000	8193	2263	1.188	--
总计		54380	100.000	8193			

图172 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-00637A批-pH1.2介质-桨法-50转
对照品溶液-1-3



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 28-20/10-1280-2 - cbzj-00637Ap-rcqx-1-pH1.2jz-jf50z-dz1-4.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260526-FX259.lcb

样品瓶号 : 4-18

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/05/26 21:37:03

处理时间 (V2) : 2026/05/27 09:07:56

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.018	54465	100.000	8188	2264	1.193	--
总计		54465	100.000	8188			

图173 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-00637A批-pH1.2介质-桨法-50转
对照品溶液-1-4



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 28-20/10-1281-2 - cbzj-00637Ap-rcqx-1-pH1.2jz-jf50z-dz1-5.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260526-FX259.lcb

样品瓶号 : 4-18

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/05/26 21:40:29

处理时间 (V2) : 2026/05/27 09:07:59

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.018	54097	100.000	8195	2277	1.187	--
总计		54097	100.000	8195			

图174 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-00637A批-pH1.2介质-桨法-50转
对照品溶液-1-5



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 28-20/10-1282-2 - cbzj-00637Ap-rcqx-1-pH1.2jz-jf50z-p1-5min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260526-FX259.lcb

样品瓶号 : 4-1

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/05/26 21:43:51

处理时间 (V2) : 2026/05/27 09:08:01

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图175 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-00637A批-pH1.2介质-桨法-50转-5min-片1
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 28-20/10-1283-2 - cbzj-00637Ap-rcqx-1-pH1.2jz-jf50z-p2-5min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260526-FX259.lcb

样品瓶号 : 4-10

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/05/26 21:47:15

处理时间 (V2) : 2026/05/27 09:08:04

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图176 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-00637A批-pH1.2介质-桨法-50转-5min-片2
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 28-20/10-1284-2 - cbzj-00637Ap-rcqx-1-pH1.2jz-jf50z-p3-5min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260526-FX259.lcb

样品瓶号 : 4-19

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/05/26 21:50:38

处理时间 (V2) : 2026/05/27 09:08:06

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图177 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-00637A批-pH1.2介质-桨法-50转-5min-片3
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 28-20/10-1285-2 - cbzj-00637Ap-rcqx-1-pH1.2jz-jf50z-p4-5min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260526-FX259.lcb

样品瓶号 : 4-28

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/05/26 21:54:01

处理时间 (V2) : 2026/05/27 09:08:09

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图178 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-00637A批-pH1.2介质-桨法-50转-5min-片4
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 28-20/10-1286-2 - cbzj-00637Ap-rcqx-1-pH1.2jz-jf50z-p5-5min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260526-FX259.lcb

样品瓶号 : 4-37

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/05/26 21:57:24

处理时间 (V2) : 2026/05/27 09:08:11

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图179 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-00637A批-pH1.2介质-桨法-50转-5min-片5
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 28-20/10-1287-2 - cbzj-00637Ap-rcqx-1-pH1.2jz-jf50z-p6-5min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260526-FX259.lcb

样品瓶号 : 4-46

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/05/26 22:00:47

处理时间 (V2) : 2026/05/27 09:08:14

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图180 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-00637A批-pH1.2介质-桨法-50转-5min-片6
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 28-20/10-1288-2 - cbzj-00637Ap-rcqx-1-pH1.2jz-jf50z-p1-10min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260526-FX259.lcb

样品瓶号 : 4-2

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/05/26 22:04:10

处理时间 (V2) : 2026/05/27 09:08:16

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图181 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-00637A批-pH1.2介质-浆法-50转-10min-片1
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 28-20/10-1289-2 - cbzj-00637Ap-rcqx-1-pH1.2jz-jf50z-p2-10min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260526-FX259.lcb

样品瓶号 : 4-11

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/05/26 22:07:34

处理时间 (V2) : 2026/05/27 09:08:19

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图182 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-00637A批-pH1.2介质-浆法-50转-10min-片2
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 28-20/10-1290-2 - cbzj-00637Ap-rcqx-1-pH1.2jz-jf50z-p3-10min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260526-FX259.lcb

样品瓶号 : 4-20

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/05/26 22:10:58

处理时间 (V2) : 2026/05/27 09:08:22

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图183 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-00637A批-pH1.2介质-浆法-50转-10min-片3
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 28-20/10-1291-2 - cbzj-00637Ap-rcqx-1-pH1.2jz-jf50z-p4-10min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260526-FX259.lcb

样品瓶号 : 4-29

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/05/26 22:14:21

处理时间 (V2) : 2026/05/27 09:08:24

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图184 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-00637A批-pH1.2介质-浆法-50转-10min-片4
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 28-20/10-1292-2 - cbzj-00637Ap-rcqx-1-pH1.2jz-jf50z-p5-10min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260526-FX259.lcb

样品瓶号 : 4-38

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/05/26 22:17:44

处理时间 (V2) : 2026/05/27 09:08:27

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图185 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-00637A批-pH1.2介质-浆法-50转-10min-片5
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 28-20/10-1293-2 - cbzj-00637Ap-rcqx-1-pH1.2jz-jf50z-p6-10min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260526-FX259.lcb

样品瓶号 : 4-47

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/05/26 22:21:07

处理时间 (V2) : 2026/05/27 09:08:29

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图186 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-00637A批-pH1.2介质-浆法-50转-10min-片6
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 28-20/10-1294-2 - cbzj-00637Ap-rcqx-1-pH1.2jz-jf50z-p1-15min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260526-FX259.lcb

样品瓶号 : 4-3

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/05/26 22:24:30

处理时间 (V2) : 2026/05/27 09:08:32

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图187 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-00637A批-pH1.2介质-浆法-50转-15min-片1
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30℃

数据文件名: RC\$QTL-392 - 28-20/10-1295-2 - cbzj-00637Ap-rcqx-1-pH1.2jz-jf50z-p2-15min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260526-FX259.lcb

样品瓶号 : 4-12

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/05/26 22:27:54

处理时间 (V2) : 2026/05/27 09:08:35

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图188 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-00637A批-pH1.2介质-浆法-50转-15min-片2
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 28-20/10-1296-2 - cbzj-00637Ap-rcqx-1-pH1.2jz-jf50z-p3-15min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260526-FX259.lcb

样品瓶号 : 4-21

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/05/26 22:31:18

处理时间 (V2) : 2026/05/27 09:08:38

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图189 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-00637A批-pH1.2介质-浆法-50转-15min-片3
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 28-20/10-1297-2 - cbzj-00637Ap-rcqx-1-pH1.2jz-jf50z-p4-15min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260526-FX259.lcb

样品瓶号 : 4-30

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/05/26 22:34:41

处理时间 (V2) : 2026/05/27 09:08:40

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图190 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-00637A批-pH1.2介质-浆法-50转-15min-片4
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 28-20/10-1298-2 - cbzj-00637Ap-rcqx-1-pH1.2jz-jf50z-p5-15min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260526-FX259.lcb

样品瓶号 : 4-39

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/05/26 22:38:04

处理时间 (V2) : 2026/05/27 09:08:43

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图191 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-00637A批-pH1.2介质-浆法-50转-15min-片5
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 28-20/10-1299-2 - cbzj-00637Ap-rcqx-1-pH1.2jz-jf50z-p6-15min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260526-FX259.lcb

样品瓶号 : 4-48

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/05/26 22:41:27

处理时间 (V2) : 2026/05/27 09:08:46

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图192 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-00637A批-pH1.2介质-浆法-50转-15min-片6
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 28-20/10-1300-2 - cbzj-00637Ap-rcqx-1-pH1.2jz-jf50z-p1-20min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260526-FX259.lcb

样品瓶号 : 4-4

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/05/26 22:44:51

处理时间 (V2) : 2026/05/27 09:08:48

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图193 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-00637A批-pH1.2介质-浆法-50转-20min-片1
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 28-20/10-1301-2 - cbzj-00637Ap-rcqx-1-pH1.2jz-jf50z-p2-20min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260526-FX259.lcb

样品瓶号 : 4-13

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/05/26 22:48:15

处理时间 (V2) : 2026/05/27 09:08:51

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图194 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-00637A批-pH1.2介质-浆法-50转-20min-片2
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 28-20/10-1302-2 - cbzj-00637Ap-rcqx-1-pH1.2jz-jf50z-p3-20min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260526-FX259.lcb

样品瓶号 : 4-22

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/05/26 22:51:39

处理时间 (V2) : 2026/05/27 09:08:54

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图195 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-00637A批-pH1.2介质-浆法-50转-20min-片3
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 28-20/10-1303-2 - cbzj-00637Ap-rcqx-1-pH1.2jz-jf50z-p4-20min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260526-FX259.lcb

样品瓶号 : 4-31

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/05/26 22:55:03

处理时间 (V2) : 2026/05/27 09:08:57

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图196 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-00637A批-pH1.2介质-浆法-50转-20min-片4
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 28-20/10-1304-2 - cbzj-00637Ap-rcqx-1-pH1.2jz-jf50z-p5-20min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260526-FX259.lcb

样品瓶号 : 4-40

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/05/26 22:58:26

处理时间 (V2) : 2026/05/27 09:08:59

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图197 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-00637A批-pH1.2介质-浆法-50转-20min-片5
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 28-20/10-1305-2 - cbzj-00637Ap-rcqx-1-pH1.2jz-jf50z-p6-20min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260526-FX259.lcb

样品瓶号 : 4-49

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/05/26 23:01:49

处理时间 (V2) : 2026/05/27 09:09:02

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图198 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-00637A批-pH1.2介质-浆法-50转-20min-片6
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 28-20/10-1306-2 - cbzj-00637Ap-rcqx-1-pH1.2jz-jf50z-p1-30min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260526-FX259.lcb

样品瓶号 : 4-5

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/05/26 23:05:13

处理时间 (V2) : 2026/05/27 09:09:04

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图199 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-00637A批-pH1.2介质-浆法-50转-30min-片1
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 28-20/10-1307-2 - cbzj-00637Ap-rcqx-1-pH1.2jz-jf50z-p2-30min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260526-FX259.lcb

样品瓶号 : 4-14

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/05/26 23:08:37

处理时间 (V2) : 2026/05/27 09:09:07

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图200 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-00637A批-pH1.2介质-浆法-50转-30min-片2
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 28-20/10-1308-2 - cbzj-00637Ap-rcqx-1-pH1.2jz-jf50z-p3-30min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260526-FX259.lcb

样品瓶号 : 4-23

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/05/26 23:12:02

处理时间 (V2) : 2026/05/27 09:09:09

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图201 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-00637A批-pH1.2介质-浆法-50转-30min-片3
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30℃

数据文件名: RC\$QTL-392 - 28-20/10-1309-2 - cbzj-00637Ap-rcqx-1-pH1.2jz-jf50z-p4-30min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260526-FX259.lcb

样品瓶号 : 4-32

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/05/26 23:15:26

处理时间 (V2) : 2026/05/27 09:09:12

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图202 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-00637A批-pH1.2介质-浆法-50转-30min-片4
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30℃

数据文件名: RC\$QTL-392 - 28-20/10-1310-2 - cbzj-00637Ap-rcqx-1-pH1.2jz-jf50z-p5-30min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260526-FX259.lcb

样品瓶号 : 4-41

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/05/26 23:18:50

处理时间 (V2) : 2026/05/27 09:09:15

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图203 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-00637A批-pH1.2介质-浆法-50转-30min-片5
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 28-20/10-1311-2 - cbzj-00637Ap-rcqx-1-pH1.2jz-jf50z-p6-30min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260526-FX259.lcb

样品瓶号 : 4-50

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/05/26 23:22:14

处理时间 (V2) : 2026/05/27 09:09:17

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图204 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-00637A批-pH1.2介质-浆法-50转-30min-片6
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 28-20/10-1312-2 - cbzj-00637Ap-rcqx-1-pH1.2jz-jf50z-p1-45min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260526-FX259.lcb

样品瓶号 : 4-6

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/05/26 23:25:38

处理时间 (V2) : 2026/05/27 09:09:20

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图205 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-00637A批-pH1.2介质-浆法-50转-45min-片1
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 28-20/10-1313-2 - cbzj-00637Ap-rcqx-1-pH1.2jz-jf50z-p2-45min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260526-FX259.lcb

样品瓶号 : 4-15

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/05/26 23:29:02

处理时间 (V2) : 2026/05/27 09:09:22

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图206 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-00637A批-pH1.2介质-浆法-50转-45min-片2
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 28-20/10-1314-2 - cbzj-00637Ap-rcqx-1-pH1.2jz-jf50z-p3-45min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260526-FX259.lcb

样品瓶号 : 4-24

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/05/26 23:32:26

处理时间 (V2) : 2026/05/27 09:09:25

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图207 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-00637A批-pH1.2介质-浆法-50转-45min-片3
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 28-20/10-1315-2 - cbzj-00637Ap-rcqx-1-pH1.2jz-jf50z-p4-45min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260526-FX259.lcb

样品瓶号 : 4-33

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/05/26 23:35:50

处理时间 (V2) : 2026/05/27 09:09:27

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图208 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-00637A批-pH1.2介质-浆法-50转-45min-片4
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 28-20/10-1316-2 - cbzj-00637Ap-rcqx-1-pH1.2jz-jf50z-p5-45min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260526-FX259.lcb

样品瓶号 : 4-42

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/05/26 23:39:14

处理时间 (V2) : 2026/05/27 09:09:30

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图209 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-00637A批-pH1.2介质-浆法-50转-45min-片5
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 28-20/10-1317-2 - cbzj-00637Ap-rcqx-1-pH1.2jz-jf50z-p6-45min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260526-FX259.lcb

样品瓶号 : 4-51

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/05/26 23:42:38

处理时间 (V2) : 2026/05/27 09:09:32

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图210 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-00637A批-pH1.2介质-浆法-50转-45min-片6
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 28-20/10-1318-2 - cbzj-00637Ap-rcqx-1-pH1.2jz-jf50z-p1-60min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260526-FX259.lcb

样品瓶号 : 4-7

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/05/26 23:46:03

处理时间 (V2) : 2026/05/27 09:09:35

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图211 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-00637A批-pH1.2介质-浆法-50转-60min-片1
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 28-20/10-1319-2 - cbzj-00637Ap-rcqx-1-pH1.2jz-jf50z-p2-60min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260526-FX259.lcb

样品瓶号 : 4-16

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/05/26 23:49:28

处理时间 (V2) : 2026/05/27 09:09:38

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图212 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-00637A批-pH1.2介质-浆法-50转-60min-片2
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 28-20/10-1320-2 - cbzj-00637Ap-rcqx-1-pH1.2jz-jf50z-p3-60min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260526-FX259.lcb

样品瓶号 : 4-25

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/05/26 23:52:52

处理时间 (V2) : 2026/05/27 09:09:40

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图213 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-00637A批-pH1.2介质-浆法-50转-60min-片3
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 28-20/10-1321-2 - cbzj-00637Ap-rcqx-1-pH1.2jz-jf50z-p4-60min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260526-FX259.lcb

样品瓶号 : 4-34

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/05/26 23:56:17

处理时间 (V2) : 2026/05/27 09:09:43

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图214 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-00637A批-pH1.2介质-浆法-50转-60min-片4
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 28-20/10-1322-2 - cbzj-00637Ap-rcqx-1-pH1.2jz-jf50z-p5-60min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260526-FX259.lcb

样品瓶号 : 4-43

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/05/26 23:59:41

处理时间 (V2) : 2026/05/27 09:09:45

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图215 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-00637A批-pH1.2介质-浆法-50转-60min-片5
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 28-20/10-1323-2 - cbzj-00637Ap-rcqx-1-pH1.2jz-jf50z-p6-60min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260526-FX259.lcb

样品瓶号 : 4-52

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/05/27 00:03:05

处理时间 (V2) : 2026/05/27 09:09:48

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图216 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-00637A批-pH1.2介质-浆法-50转-60min-片6
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30℃

数据文件名: RC\$QTL-392 - 28-20/10-1324-2 - cbzj-00637Ap-rcqx-1-pH1.2jz-jf50z-p1-jx.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260526-FX259.lcb

样品瓶号 : 4-8

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/05/27 00:06:29

处理时间 (V2) : 2026/05/27 09:09:50

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图217 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-00637A批-pH1.2介质-桨法-50转-极限转速-片1
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 28-20/10-1325-2 - cbzj-00637Ap-rcqx-1-pH1.2jz-jf50z-p2-jx.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260526-FX259.lcb

样品瓶号 : 4-17

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/05/27 00:09:53

处理时间 (V2) : 2026/05/27 09:09:53

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图218 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-00637A批-pH1.2介质-桨法-50转-极限转速-片2
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 28-20/10-1326-2 - cbzj-00637Ap-rcqx-1-pH1.2jz-jf50z-p3-jx.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260526-FX259.lcb

样品瓶号 : 4-26

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/05/27 00:13:18

处理时间 (V2) : 2026/05/27 09:09:56

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图219 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-00637A批-pH1.2介质-桨法-50转-极限转速-片3
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 28-20/10-1327-2 - cbzj-00637Ap-rcqx-1-pH1.2jz-jf50z-p4-jx.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260526-FX259.lcb

样品瓶号 : 4-35

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/05/27 00:16:43

处理时间 (V2) : 2026/05/27 09:09:58

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图220 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-00637A批-pH1.2介质-桨法-50转-极限转速-片4
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 28-20/10-1328-2 - cbzj-00637Ap-rcqx-1-pH1.2jz-jf50z-p5-jx.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260526-FX259.lcb

样品瓶号 : 4-44

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/05/27 00:20:07

处理时间 (V2) : 2026/05/27 09:10:01

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图221 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-00637A批-pH1.2介质-桨法-50转-极限转速-片5
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 28-20/10-1329-2 - cbzj-00637Ap-rcqx-1-pH1.2jz-jf50z-p6-jx.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260526-FX259.lcb

样品瓶号 : 4-53

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/05/27 00:23:32

处理时间 (V2) : 2026/05/27 09:10:03

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图222 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-00637A批-pH1.2介质-桨法-50转-极限转速-片6
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30℃

数据文件名: RC\$QTL-392 - 28-20/10-1330-2 - cbzj-00637Ap-rcqx-1-pH1.2jz-jf50z-dz2-1.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260526-FX259.lcb

样品瓶号 : 4-27

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/05/27 00:26:56

处理时间 (V2) : 2026/05/27 09:10:06

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.019	54676	100.000	8281	2284	1.187	--
总计		54676	100.000	8281			

图223 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-00637A批-pH1.2介质-桨法-50转
对照品溶液-2-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30℃

数据文件名: RC\$QTL-392 - 28-20/10-1331-2 - cbzj-00637Ap-rcqx-1-pH1.2jz-jf50z-dz2-2.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260526-FX259.lcb

样品瓶号 : 4-27

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/05/27 00:30:20

处理时间 (V2) : 2026/05/27 09:10:08

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.019	54803	100.000	8294	2281	1.191	--
总计		54803	100.000	8294			

图224 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-00637A批-pH1.2介质-桨法-50转
对照品溶液-2-2



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 28-20/10-1332-2 - cbzj-00287Ap-rcqx-1-pH1.2jz-jf50z-rj.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260526-FX259.lcb

样品瓶号 : 1-9

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/05/27 00:33:44

处理时间 (V2) : 2026/05/27 09:10:11

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图225 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-00287A批-pH1.2介质-桨法-50转
溶剂



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30℃

数据文件名: RC\$QTL-392 - 28-20/10-1333-2 - cbzj-00287Ap-rcqx-1-pH1.2jz-jf50z-dz1-1.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260526-FX259.lcb

样品瓶号 : 1-18

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/05/27 00:37:08

处理时间 (V2) : 2026/05/27 09:10:13

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.019	53212	100.000	8103	2289	1.179	--
总计		53212	100.000	8103			

图226 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-00287A批-pH1.2介质-桨法-50转
对照品溶液-1-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30℃

数据文件名: RC\$QTL-392 - 28-20/10-1334-2 - cbzj-00287Ap-rcqx-1-pH1.2jz-jf50z-dz1-2.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260526-FX259.lcb

样品瓶号 : 1-18

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/05/27 00:40:32

处理时间 (V2) : 2026/05/27 09:10:16

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.019	53560	100.000	8123	2270	1.188	--
总计		53560	100.000	8123			

图227 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-00287A批-pH1.2介质-桨法-50转
对照品溶液-1-2



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30℃

数据文件名: RC\$QTL-392 - 28-20/10-1335-2 - cbzj-00287Ap-rcqx-1-pH1.2jz-jf50z-dz1-3.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260526-FX259.lcb

样品瓶号 : 1-18

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/05/27 00:43:56

处理时间 (V2) : 2026/05/27 09:10:18

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.019	53873	100.000	8135	2263	1.188	--
总计		53873	100.000	8135			

图228 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-00287A批-pH1.2介质-桨法-50转
对照品溶液-1-3



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30℃

数据文件名: RC\$QTL-392 - 28-20/10-1336-2 - cbzj-00287Ap-rcqx-1-pH1.2jz-jf50z-dz1-4.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260526-FX259.lcb

样品瓶号 : 1-18

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/05/27 00:47:20

处理时间 (V2) : 2026/05/27 09:10:21

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.019	54147	100.000	8159	2266	1.185	--
总计		54147	100.000	8159			

图229 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-00287A批-pH1.2介质-桨法-50转
对照品溶液-1-4



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30℃

数据文件名: RC\$QTL-392 - 28-20/10-1337-2 - cbzj-00287Ap-rcqx-1-pH1.2jz-jf50z-dz1-5.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260526-FX259.lcb

样品瓶号 : 1-18

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/05/27 00:50:44

处理时间 (V2) : 2026/05/27 09:10:23

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.019	54064	100.000	8140	2263	1.194	--
总计		54064	100.000	8140			

图230 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-00287A批-pH1.2介质-桨法-50转
对照品溶液-1-5



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 28-20/10-1338-2 - cbzj-00287Ap-rcqx-1-pH1.2jz-jf50z-p1-5min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260526-FX259.lcb

样品瓶号 : 1-1

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/05/27 00:54:07

处理时间 (V2) : 2026/05/27 09:10:26

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图231 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-00287A批-pH1.2介质-桨法-50转-5min-片1
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 28-20/10-1339-2 - cbzj-00287Ap-rcqx-1-pH1.2jz-jf50z-p2-5min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260526-FX259.lcb

样品瓶号 : 1-10

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/05/27 00:57:30

处理时间 (V2) : 2026/05/27 09:10:29

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图232 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-00287A批-pH1.2介质-桨法-50转-5min-片2
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 28-20/10-1340-2 - cbzj-00287Ap-rcqx-1-pH1.2jz-jf50z-p3-5min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260526-FX259.lcb

样品瓶号 : 1-19

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/05/27 01:00:53

处理时间 (V2) : 2026/05/27 09:10:31

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图233 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-00287A批-pH1.2介质-桨法-50转-5min-片3
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 28-20/10-1341-2 - cbzj-00287Ap-rcqx-1-pH1.2jz-jf50z-p4-5min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260526-FX259.lcb

样品瓶号 : 1-28

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/05/27 01:04:16

处理时间 (V2) : 2026/05/27 09:10:34

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图234 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-00287A批-pH1.2介质-桨法-50转-5min-片4
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 28-20/10-1342-2 - cbzj-00287Ap-rcqx-1-pH1.2jz-jf50z-p5-5min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260526-FX259.lcb

样品瓶号 : 1-37

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/05/27 01:07:39

处理时间 (V2) : 2026/05/27 09:10:36

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图235 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-00287A批-pH1.2介质-桨法-50转-5min-片5
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 28-20/10-1343-2 - cbzj-00287Ap-rcqx-1-pH1.2jz-jf50z-p6-5min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260526-FX259.lcb

样品瓶号 : 1-46

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/05/27 01:11:02

处理时间 (V2) : 2026/05/27 09:10:39

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图236 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-00287A批-pH1.2介质-桨法-50转-5min-片6
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 28-20/10-1344-2 - cbzj-00287Ap-rcqx-1-pH1.2jz-jf50z-p1-10min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260526-FX259.lcb

样品瓶号 : 1-2

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/05/27 01:14:25

处理时间 (V2) : 2026/05/27 09:10:41

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图237 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-00287A批-pH1.2介质-浆法-50转-10min-片1
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 28-20/10-1345-2 - cbzj-00287Ap-rcqx-1-pH1.2jz-jf50z-p2-10min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260526-FX259.lcb

样品瓶号 : 1-11

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/05/27 01:17:47

处理时间 (V2) : 2026/05/27 09:10:44

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图238 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-00287A批-pH1.2介质-浆法-50转-10min-片2
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 28-20/10-1346-2 - cbzj-00287Ap-rcqx-1-pH1.2jz-jf50z-p3-10min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260526-FX259.lcb

样品瓶号 : 1-20

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/05/27 01:21:10

处理时间 (V2) : 2026/05/27 09:10:47

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图239 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-00287A批-pH1.2介质-浆法-50转-10min-片3
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 28-20/10-1347-2 - cbzj-00287Ap-rcqx-1-pH1.2jz-jf50z-p4-10min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260526-FX259.lcb

样品瓶号 : 1-29

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/05/27 01:24:33

处理时间 (V2) : 2026/05/27 09:10:50

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图240 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-00287A批-pH1.2介质-浆法-50转-10min-片4
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 28-20/10-1348-2 - cbzj-00287Ap-rcqx-1-pH1.2jz-jf50z-p5-10min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260526-FX259.lcb

样品瓶号 : 1-38

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/05/27 01:27:56

处理时间 (V2) : 2026/05/27 09:10:52

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图241 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-00287A批-pH1.2介质-浆法-50转-10min-片5
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 28-20/10-1349-2 - cbzj-00287Ap-rcqx-1-pH1.2jz-jf50z-p6-10min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260526-FX259.lcb

样品瓶号 : 1-47

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/05/27 01:31:18

处理时间 (V2) : 2026/05/27 09:10:55

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图242 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-00287A批-pH1.2介质-浆法-50转-10min-片6
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 28-20/10-1350-2 - cbzj-00287Ap-rcqx-1-pH1.2jz-jf50z-p1-15min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260526-FX259.lcb

样品瓶号 : 1-3

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/05/27 01:34:41

处理时间 (V2) : 2026/05/27 09:10:57

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图243 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-00287A批-pH1.2介质-浆法-50转-15min-片1
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 28-20/10-1351-2 - cbzj-00287Ap-rcqx-1-pH1.2jz-jf50z-p2-15min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260526-FX259.lcb

样品瓶号 : 1-12

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/05/27 01:38:04

处理时间 (V2) : 2026/05/27 09:11:00

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图244 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-00287A批-pH1.2介质-浆法-50转-15min-片2
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 28-20/10-1352-2 - cbzj-00287Ap-rcqx-1-pH1.2jz-jf50z-p3-15min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260526-FX259.lcb

样品瓶号 : 1-21

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/05/27 01:41:27

处理时间 (V2) : 2026/05/27 09:11:02

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图245 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-00287A批-pH1.2介质-浆法-50转-15min-片3
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 28-20/10-1353-2 - cbzj-00287Ap-rcqx-1-pH1.2jz-jf50z-p4-15min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260526-FX259.lcb

样品瓶号 : 1-30

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/05/27 01:44:50

处理时间 (V2) : 2026/05/27 09:11:05

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图246 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-00287A批-pH1.2介质-浆法-50转-15min-片4
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 28-20/10-1354-2 - cbzj-00287Ap-rcqx-1-pH1.2jz-jf50z-p5-15min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260526-FX259.lcb

样品瓶号 : 1-39

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/05/27 01:48:13

处理时间 (V2) : 2026/05/27 09:11:07

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图247 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-00287A批-pH1.2介质-浆法-50转-15min-片5
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 28-20/10-1355-2 - cbzj-00287Ap-rcqx-1-pH1.2jz-jf50z-p6-15min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260526-FX259.lcb

样品瓶号 : 1-48

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/05/27 01:51:35

处理时间 (V2) : 2026/05/27 09:11:10

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图248 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-00287A批-pH1.2介质-浆法-50转-15min-片6
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 28-20/10-1356-2 - cbzj-00287Ap-rcqx-1-pH1.2jz-jf50z-p1-20min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260526-FX259.lcb

样品瓶号 : 1-4

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/05/27 01:54:58

处理时间 (V2) : 2026/05/27 09:11:12

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图249 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-00287A批-pH1.2介质-浆法-50转-20min-片1
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 28-20/10-1357-2 - cbzj-00287Ap-rcqx-1-pH1.2jz-jf50z-p2-20min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260526-FX259.lcb

样品瓶号 : 1-13

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/05/27 01:58:21

处理时间 (V2) : 2026/05/27 09:11:15

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图250 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-00287A批-pH1.2介质-浆法-50转-20min-片2
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 28-20/10-1358-2 - cbzj-00287Ap-rcqx-1-pH1.2jz-jf50z-p3-20min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260526-FX259.lcb

样品瓶号 : 1-22

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/05/27 02:01:44

处理时间 (V2) : 2026/05/27 09:11:17

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图251 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-00287A批-pH1.2介质-浆法-50转-20min-片3
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 28-20/10-1359-2 - cbzj-00287Ap-rcqx-1-pH1.2jz-jf50z-p4-20min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260526-FX259.lcb

样品瓶号 : 1-31

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/05/27 02:05:07

处理时间 (V2) : 2026/05/27 09:11:20

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图252 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-00287A批-pH1.2介质-浆法-50转-20min-片4
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 28-20/10-1360-2 - cbzj-00287Ap-rcqx-1-pH1.2jz-jf50z-p5-20min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260526-FX259.lcb

样品瓶号 : 1-40

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/05/27 02:08:30

处理时间 (V2) : 2026/05/27 09:11:22

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图253 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-00287A批-pH1.2介质-浆法-50转-20min-片5
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 28-20/10-1361-2 - cbzj-00287Ap-rcqx-1-pH1.2jz-jf50z-p6-20min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260526-FX259.lcb

样品瓶号 : 1-49

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/05/27 02:11:52

处理时间 (V2) : 2026/05/27 09:11:25

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图254 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-00287A批-pH1.2介质-浆法-50转-20min-片6
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 28-20/10-1362-2 - cbzj-00287Ap-rcqx-1-pH1.2jz-jf50z-p1-30min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260526-FX259.lcb

样品瓶号 : 1-5

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/05/27 02:15:14

处理时间 (V2) : 2026/05/27 09:11:28

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图255 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-00287A批-pH1.2介质-浆法-50转-30min-片1
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 28-20/10-1363-2 - cbzj-00287Ap-rcqx-1-pH1.2jz-jf50z-p2-30min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260526-FX259.lcb

样品瓶号 : 1-14

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/05/27 02:18:37

处理时间 (V2) : 2026/05/27 09:11:30

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图256 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-00287A批-pH1.2介质-浆法-50转-30min-片2
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 28-20/10-1364-2 - cbzj-00287Ap-rcqx-1-pH1.2jz-jf50z-p3-30min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260526-FX259.lcb

样品瓶号 : 1-23

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/05/27 02:22:00

处理时间 (V2) : 2026/05/27 09:11:33

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图257 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-00287A批-pH1.2介质-浆法-50转-30min-片3
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 28-20/10-1365-2 - cbzj-00287Ap-rcqx-1-pH1.2jz-jf50z-p4-30min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260526-FX259.lcb

样品瓶号 : 1-32

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/05/27 02:25:23

处理时间 (V2) : 2026/05/27 09:11:35

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图258 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-00287A批-pH1.2介质-浆法-50转-30min-片4
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 28-20/10-1366-2 - cbzj-00287Ap-rcqx-1-pH1.2jz-jf50z-p5-30min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260526-FX259.lcb

样品瓶号 : 1-41

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/05/27 02:28:46

处理时间 (V2) : 2026/05/27 09:11:38

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图259 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-00287A批-pH1.2介质-浆法-50转-30min-片5
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 28-20/10-1367-2 - cbzj-00287Ap-rcqx-1-pH1.2jz-jf50z-p6-30min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260526-FX259.lcb

样品瓶号 : 1-50

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/05/27 02:32:08

处理时间 (V2) : 2026/05/27 09:11:41

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图260 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-00287A批-pH1.2介质-浆法-50转-30min-片6
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 28-20/10-1368-2 - cbzj-00287Ap-rcqx-1-pH1.2jz-jf50z-p1-45min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260526-FX259.lcb

样品瓶号 : 1-6

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/05/27 02:35:31

处理时间 (V2) : 2026/05/27 09:11:43

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图261 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-00287A批-pH1.2介质-浆法-50转-45min-片1
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 28-20/10-1369-2 - cbzj-00287Ap-rcqx-1-pH1.2jz-jf50z-p2-45min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260526-FX259.lcb

样品瓶号 : 1-15

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/05/27 02:38:53

处理时间 (V2) : 2026/05/27 09:11:46

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图262 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-00287A批-pH1.2介质-浆法-50转-45min-片2
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 28-20/10-1370-2 - cbzj-00287Ap-rcqx-1-pH1.2jz-jf50z-p3-45min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260526-FX259.lcb

样品瓶号 : 1-24

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/05/27 02:42:16

处理时间 (V2) : 2026/05/27 09:11:48

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图263 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-00287A批-pH1.2介质-浆法-50转-45min-片3
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 28-20/10-1371-2 - cbzj-00287Ap-rcqx-1-pH1.2jz-jf50z-p4-45min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260526-FX259.lcb

样品瓶号 : 1-33

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/05/27 02:45:39

处理时间 (V2) : 2026/05/27 09:11:51

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图264 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-00287A批-pH1.2介质-浆法-50转-45min-片4
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 28-20/10-1372-2 - cbzj-00287Ap-rcqx-1-pH1.2jz-jf50z-p5-45min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260526-FX259.lcb

样品瓶号 : 1-42

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/05/27 02:49:02

处理时间 (V2) : 2026/05/27 09:11:53

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图265 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-00287A批-pH1.2介质-浆法-50转-45min-片5
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 28-20/10-1373-2 - cbzj-00287Ap-rcqx-1-pH1.2jz-jf50z-p6-45min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260526-FX259.lcb

样品瓶号 : 1-51

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/05/27 02:52:24

处理时间 (V2) : 2026/05/27 09:11:56

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图266 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-00287A批-pH1.2介质-浆法-50转-45min-片6
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 28-20/10-1374-2 - cbzj-00287Ap-rcqx-1-pH1.2jz-jf50z-p1-60min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260526-FX259.lcb

样品瓶号 : 1-7

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/05/27 02:55:47

处理时间 (V2) : 2026/05/27 09:11:58

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图267 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-00287A批-pH1.2介质-浆法-50转-60min-片1
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 28-20/10-1375-2 - cbzj-00287Ap-rcqx-1-pH1.2jz-jf50z-p2-60min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260526-FX259.lcb

样品瓶号 : 1-16

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/05/27 02:59:10

处理时间 (V2) : 2026/05/27 09:12:01

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图268 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-00287A批-pH1.2介质-浆法-50转-60min-片2
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 28-20/10-1376-2 - cbzj-00287Ap-rcqx-1-pH1.2jz-jf50z-p3-60min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260526-FX259.lcb

样品瓶号 : 1-25

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/05/27 03:02:33

处理时间 (V2) : 2026/05/27 09:12:03

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图269 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-00287A批-pH1.2介质-浆法-50转-60min-片3
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 28-20/10-1377-2 - cbzj-00287Ap-rcqx-1-pH1.2jz-jf50z-p4-60min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260526-FX259.lcb

样品瓶号 : 1-34

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/05/27 03:05:56

处理时间 (V2) : 2026/05/27 09:12:06

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图270 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-00287A批-pH1.2介质-浆法-50转-60min-片4
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 28-20/10-1378-2 - cbzj-00287Ap-rcqx-1-pH1.2jz-jf50z-p5-60min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260526-FX259.lcb

样品瓶号 : 1-43

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/05/27 03:09:19

处理时间 (V2) : 2026/05/27 09:12:09

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图271 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-00287A批-pH1.2介质-浆法-50转-60min-片5
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 28-20/10-1379-2 - cbzj-00287Ap-rcqx-1-pH1.2jz-jf50z-p6-60min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260526-FX259.lcb

样品瓶号 : 1-52

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/05/27 03:12:41

处理时间 (V2) : 2026/05/27 09:12:11

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图272 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-00287A批-pH1.2介质-浆法-50转-60min-片6
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 28-20/10-1380-2 - cbzj-00287Ap-rcqx-1-pH1.2jz-jf50z-p1-jx.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260526-FX259.lcb

样品瓶号 : 1-8

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/05/27 03:16:05

处理时间 (V2) : 2026/05/27 09:12:13

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图273 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-00287A批-pH1.2介质-桨法-50转-极限转速-片1
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30℃

数据文件名: RC\$QTL-392 - 28-20/10-1381-2 - cbzj-00287Ap-rcqx-1-pH1.2jz-jf50z-p2-jx.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260526-FX259.lcb

样品瓶号 : 1-17

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/05/27 03:19:29

处理时间 (V2) : 2026/05/27 09:12:16

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图274 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-00287A批-pH1.2介质-桨法-50转-极限转速-片2
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 28-20/10-1382-2 - cbzj-00287Ap-rcqx-1-pH1.2jz-jf50z-p3-jx.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260526-FX259.lcb

样品瓶号 : 1-26

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/05/27 03:23:35

处理时间 (V2) : 2026/05/27 09:12:18

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图275 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-00287A批-pH1.2介质-桨法-50转-极限转速-片3
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 28-20/10-1383-2 - cbzj-00287Ap-rcqx-1-pH1.2jz-jf50z-p4-jx.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260526-FX259.lcb

样品瓶号 : 1-35

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/05/27 03:27:06

处理时间 (V2) : 2026/05/27 09:12:21

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图276 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-00287A批-pH1.2介质-桨法-50转-极限转速-片4
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 28-20/10-1384-2 - cbzj-00287Ap-rcqx-1-pH1.2jz-jf50z-p5-jx.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260526-FX259.lcb

样品瓶号 : 1-44

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/05/27 03:30:28

处理时间 (V2) : 2026/05/27 09:12:24

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图277 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-00287A批-pH1.2介质-桨法-50转-极限转速-片5
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 28-20/10-1385-2 - cbzj-00287Ap-rcqx-1-pH1.2jz-jf50z-p6-jx.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260526-FX259.lcb

样品瓶号 : 1-53

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/05/27 03:33:51

处理时间 (V2) : 2026/05/27 09:12:26

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图278 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-00287A批-pH1.2介质-桨法-50转-极限转速-片6
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30℃

数据文件名: RC\$QTL-392 - 28-20/10-1386-2 - cbzj-00287Ap-rcqx-1-pH1.2jz-jf50z-dz2-1.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260526-FX259.lcb

样品瓶号 : 1-27

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/05/27 03:37:14

处理时间 (V2) : 2026/05/27 09:12:29

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.020	54046	100.000	8168	2270	1.182	--
总计		54046	100.000	8168			

图279 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-00287A批-pH1.2介质-桨法-50转
对照品溶液-2-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30℃

数据文件名: RC\$QTL-392 - 28-20/10-1387-2 - cbzj-00287Ap-rcqx-1-pH1.2jz-jf50z-dz2-2.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260526-FX259.lcb

样品瓶号 : 1-27

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/05/27 03:40:38

处理时间 (V2) : 2026/05/27 09:12:31

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.020	54017	100.000	8175	2262	1.181	--
总计		54017	100.000	8175			

图280 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-00287A批-pH1.2介质-桨法-50转
对照品溶液-2-2