



熊去氧胆酸口服混悬液项目信息

介质体积(ml)	900	取样体积(ml)	5	补液体积(ml)	5
对照品批号	110755-202306	对照品来源	中检所	对照品使用方法	直接使用
对照品含量(%)	99.6	对照品水分(%)	0	对照品稀释倍数	50
标示量(mg)	250	供试品稀释倍数	1	系数	1

对照品溶液

序号	称样量(mg)	A ₁	A ₂	A ₃	A ₄	A ₅	A _{平均}	RSD%
1	13.82	54047	54521	54402	54307	54241	54304	0.33
2	13.90	54592	54431				54512	0.21

单位质量响应值		RSD%	判断
3929.38	3921.73	0.14	数据可信



操作者:

日期: 2026-09-11

复核者:

未审阅版本



供试品溶液-2025121551批-pH1.2

时间 (分钟)	样品	A ₁	A ₂	A _{平均}	溶出量(%)	平均(%)	RSD%	累计溶 出量(%)	平均(%)	RSD%
5min	1		-		0.000	0.00	-	0.00	0.00	-
	2		-		0.000			0.00		
	3		-		0.000			0.00		
	4		-		0.000			0.00		
	5		-		0.000			0.00		
	6		-		0.000			0.00		
10min	1		-		0.000	0.00	-	0.00	0.00	-
	2		-		0.000			0.00		
	3		-		0.000			0.00		
	4		-		0.000			0.00		
	5		-		0.000			0.00		
	6		-		0.000			0.00		
15min	1		-		0.000	0.00	-	0.00	0.00	-
	2		-		0.000			0.00		
	3		-		0.000			0.00		
	4		-		0.000			0.00		
	5		-		0.000			0.00		
	6		-		0.000			0.00		
20min	1		-		0.000	0.00	-	0.00	0.00	-
	2		-		0.000			0.00		
	3		-		0.000			0.00		
	4		-		0.000			0.00		
	5		-		0.000			0.00		
	6		-		0.000			0.00		
30min	1		-		0.000	0.00	-	0.00	0.00	-
	2		-		0.000			0.00		
	3		-		0.000			0.00		
	4		-		0.000			0.00		
	5		-		0.000			0.00		
	6		-		0.000			0.00		
45min	1		-		0.000	0.00	-	0.00	0.00	-
	2		-		0.000			0.00		
	3		-		0.000			0.00		
	4		-		0.000			0.00		
	5		-		0.000			0.00		
	6		-		0.000			0.00		
60min	1		-		0.000	0.00	-	0.00	0.00	-
	2		-		0.000			0.00		
	3		-		0.000			0.00		
	4		-		0.000			0.00		
	5		-		0.000			0.00		
	6		-		0.000			0.00		
极限	1		-		0.000	0.00	-	0.00	0.00	-
	2		-		0.000			0.00		
	3		-		0.000			0.00		
	4		-		0.000			0.00		
	5		-		0.000			0.00		
	6		-		0.000			0.00		



操作者:

日 期: 2026-09-11

复核者:

未审阅版本



熊去氧胆酸口服混悬液项目信息

介质体积(ml)	900	取样体积(ml)	5	补液体积(ml)	5
对照品批号	110755-202306	对照品来源	中检所	对照品使用方法	直接使用
对照品含量(%)	99.6	对照品水分(%)	0	对照品稀释倍数	50
标示量(mg)	250	供试品稀释倍数	1	系数	1

对照品溶液

序号	称样量(mg)	A ₁	A ₂	A ₃	A ₄	A ₅	A _{平均}	RSD%
1	13.82	54792	54803	54496	54903	54342	54667	0.44
2	13.90	54207	54611				54409	0.53
单位质量响应值			RSD%	判断				
3955.64			0.75	数据可信				



操作者:

日期: 2026-09-11

复核者:

未审阅版本



供试品溶液-2025121651批-pH1.2

时间 (分钟)	样品	A ₁	A ₂	A _{平均}	溶出量(%)	平均(%)	RSD%	累计溶 出量(%)	平均(%)	RSD%
5min	1		-		0.000	0.00	-	0.00	0.00	-
	2		-		0.000			0.00		
	3		-		0.000			0.00		
	4		-		0.000			0.00		
	5		-		0.000			0.00		
	6		-		0.000			0.00		
10min	1		-		0.000	0.00	-	0.00	0.00	-
	2		-		0.000			0.00		
	3		-		0.000			0.00		
	4		-		0.000			0.00		
	5		-		0.000			0.00		
	6		-		0.000			0.00		
15min	1		-		0.000	0.00	-	0.00	0.00	-
	2		-		0.000			0.00		
	3		-		0.000			0.00		
	4		-		0.000			0.00		
	5		-		0.000			0.00		
	6		-		0.000			0.00		
20min	1		-		0.000	0.00	-	0.00	0.00	-
	2		-		0.000			0.00		
	3		-		0.000			0.00		
	4		-		0.000			0.00		
	5		-		0.000			0.00		
	6		-		0.000			0.00		
30min	1		-		0.000	0.00	-	0.00	0.00	-
	2		-		0.000			0.00		
	3		-		0.000			0.00		
	4		-		0.000			0.00		
	5		-		0.000			0.00		
	6		-		0.000			0.00		
45min	1		-		0.000	0.00	-	0.00	0.00	-
	2		-		0.000			0.00		
	3		-		0.000			0.00		
	4		-		0.000			0.00		
	5		-		0.000			0.00		
	6		-		0.000			0.00		
60min	1		-		0.000	0.00	-	0.00	0.00	-
	2		-		0.000			0.00		
	3		-		0.000			0.00		
	4		-		0.000			0.00		
	5		-		0.000			0.00		
	6		-		0.000			0.00		
极限	1		-		0.000	0.00	-	0.00	0.00	-
	2		-		0.000			0.00		
	3		-		0.000			0.00		
	4		-		0.000			0.00		
	5		-		0.000			0.00		
	6		-		0.000			0.00		



操作者:

日 期: 2026-09-11

复核者:

未审阅版本



熊去氧胆酸口服混悬液项目信息

介质体积(ml)	900	取样体积(ml)	5	补液体积(ml)	5
对照品批号	110755-202306	对照品来源	中检所	对照品使用方法	直接使用
对照品含量(%)	99.6	对照品水分(%)	0	对照品稀释倍数	50
标示量(mg)	250	供试品稀释倍数	1	系数	1

对照品溶液

序号	称样量(mg)	A ₁	A ₂	A ₃	A ₄	A ₅	A _{平均}	RSD%
1	13.82	54126	54206	53995	53993	53407	53945	0.59
2	13.90	54919	55185				55052	0.35
单位质量响应值				RSD%	判断			
3903.40				1.03	数据可信			



操作者:

日期: 2026-09-11

复核者:

未审阅版本



供试品溶液-2025121851批-pH1.2

时间 (分钟)	样品	A ₁	A ₂	A _{平均}	溶出量(%)	平均(%)	RSD%	累计溶 出量(%)	平均(%)	RSD%
5min	1		-		0.000	0.00	-	0.00	0.00	-
	2		-		0.000			0.00		
	3		-		0.000			0.00		
	4		-		0.000			0.00		
	5		-		0.000			0.00		
	6		-		0.000			0.00		
10min	1		-		0.000	0.00	-	0.00	0.00	-
	2		-		0.000			0.00		
	3		-		0.000			0.00		
	4		-		0.000			0.00		
	5		-		0.000			0.00		
	6		-		0.000			0.00		
15min	1		-		0.000	0.00	-	0.00	0.00	-
	2		-		0.000			0.00		
	3		-		0.000			0.00		
	4		-		0.000			0.00		
	5		-		0.000			0.00		
	6		-		0.000			0.00		
20min	1		-		0.000	0.00	-	0.00	0.00	-
	2		-		0.000			0.00		
	3		-		0.000			0.00		
	4		-		0.000			0.00		
	5		-		0.000			0.00		
	6		-		0.000			0.00		
30min	1		-		0.000	0.00	-	0.00	0.00	-
	2		-		0.000			0.00		
	3		-		0.000			0.00		
	4		-		0.000			0.00		
	5		-		0.000			0.00		
	6		-		0.000			0.00		
45min	1		-		0.000	0.00	-	0.00	0.00	-
	2		-		0.000			0.00		
	3		-		0.000			0.00		
	4		-		0.000			0.00		
	5		-		0.000			0.00		
	6		-		0.000			0.00		
60min	1		-		0.000	0.00	-	0.00	0.00	-
	2		-		0.000			0.00		
	3		-		0.000			0.00		
	4		-		0.000			0.00		
	5		-		0.000			0.00		
	6		-		0.000			0.00		
极限	1		-		0.000	0.00	-	0.00	0.00	-
	2		-		0.000			0.00		
	3		-		0.000			0.00		
	4		-		0.000			0.00		
	5		-		0.000			0.00		
	6		-		0.000			0.00		



操作者:

日期: 2026-09-11

复核者:

未审阅版本



熊去氧胆酸口服混悬液项目信息

介质体积(ml)	900	取样体积(ml)	5	补液体积(ml)	5
对照品批号	110755-202306	对照品来源	中检所	对照品使用方法	直接使用
对照品含量(%)	99.6	对照品水分(%)	0	对照品稀释倍数	50
标示量(mg)	250	供试品稀释倍数	1	系数	1

对照品溶液

序号	称样量(mg)	A ₁	A ₂	A ₃	A ₄	A ₅	A _{平均}	RSD%
1	13.82	54160	54279	54129	54080	54895	54309	0.62
2	13.90	54270	54007				54138	0.35
单位质量响应值			RSD%	判断				
3929.74			0.64	数据可信				



操作者:

日期: 2026-09-11

复核者:

未审阅版本



供试品溶液-00637A批-pH1.2

时间 (分钟)	样品	A ₁	A ₂	A _{平均}	溶出量(%)	平均(%)	RSD%	累计溶 出量(%)	平均(%)	RSD%
5min	1		-		0.000	0.00	-	0.00	0.00	-
	2		-		0.000			0.00		
	3		-		0.000			0.00		
	4		-		0.000			0.00		
	5		-		0.000			0.00		
	6		-		0.000			0.00		
10min	1		-		0.000	0.00	-	0.00	0.00	-
	2		-		0.000			0.00		
	3		-		0.000			0.00		
	4		-		0.000			0.00		
	5		-		0.000			0.00		
	6		-		0.000			0.00		
15min	1		-		0.000	0.00	-	0.00	0.00	-
	2		-		0.000			0.00		
	3		-		0.000			0.00		
	4		-		0.000			0.00		
	5		-		0.000			0.00		
	6		-		0.000			0.00		
20min	1		-		0.000	0.00	-	0.00	0.00	-
	2		-		0.000			0.00		
	3		-		0.000			0.00		
	4		-		0.000			0.00		
	5		-		0.000			0.00		
	6		-		0.000			0.00		
30min	1		-		0.000	0.00	-	0.00	0.00	-
	2		-		0.000			0.00		
	3		-		0.000			0.00		
	4		-		0.000			0.00		
	5		-		0.000			0.00		
	6		-		0.000			0.00		
45min	1		-		0.000	0.00	-	0.00	0.00	-
	2		-		0.000			0.00		
	3		-		0.000			0.00		
	4		-		0.000			0.00		
	5		-		0.000			0.00		
	6		-		0.000			0.00		
60min	1		-		0.000	0.00	-	0.00	0.00	-
	2		-		0.000			0.00		
	3		-		0.000			0.00		
	4		-		0.000			0.00		
	5		-		0.000			0.00		
	6		-		0.000			0.00		
极限	1		-		0.000	0.00	-	0.00	0.00	-
	2		-		0.000			0.00		
	3		-		0.000			0.00		
	4		-		0.000			0.00		
	5		-		0.000			0.00		
	6		-		0.000			0.00		



操作者:

日期: 2026-09-11

复核者:

未审阅版本



熊去氧胆酸口服混悬液项目信息

介质体积(ml)	900	取样体积(ml)	5	补液体积(ml)	5
对照品批号	110755-202306	对照品来源	中检所	对照品使用方法	直接使用
对照品含量(%)	99.6	对照品水分(%)	0	对照品稀释倍数	50
标示量(mg)	250	供试品稀释倍数	1	系数	1

对照品溶液

序号	称样量(mg)	A ₁	A ₂	A ₃	A ₄	A ₅	A _{平均}	RSD%
1	13.82	54433	53871	53879	53901	53766	53970	0.49
2	13.90	53830	53855				53842	0.04
单位质量响应值				RSD%	判断			
3905.21				0.58	数据可信			



操作者:

日期: 2026-09-11

复核者:

未审阅版本



供试品溶液-00287A批-pH1.2

时间 (分钟)	样品	A ₁	A ₂	A _{平均}	溶出量(%)	平均(%)	RSD%	累计溶 出量(%)	平均(%)	RSD%
5min	1		-		0.000	0.00	-	0.00	0.00	-
	2		-		0.000			0.00		
	3		-		0.000			0.00		
	4		-		0.000			0.00		
	5		-		0.000			0.00		
	6		-		0.000			0.00		
10min	1		-		0.000	0.00	-	0.00	0.00	-
	2		-		0.000			0.00		
	3		-		0.000			0.00		
	4		-		0.000			0.00		
	5		-		0.000			0.00		
	6		-		0.000			0.00		
15min	1		-		0.000	0.00	-	0.00	0.00	-
	2		-		0.000			0.00		
	3		-		0.000			0.00		
	4		-		0.000			0.00		
	5		-		0.000			0.00		
	6		-		0.000			0.00		
20min	1		-		0.000	0.00	-	0.00	0.00	-
	2		-		0.000			0.00		
	3		-		0.000			0.00		
	4		-		0.000			0.00		
	5		-		0.000			0.00		
	6		-		0.000			0.00		
30min	1		-		0.000	0.00	-	0.00	0.00	-
	2		-		0.000			0.00		
	3		-		0.000			0.00		
	4		-		0.000			0.00		
	5		-		0.000			0.00		
	6		-		0.000			0.00		
45min	1		-		0.000	0.00	-	0.00	0.00	-
	2		-		0.000			0.00		
	3		-		0.000			0.00		
	4		-		0.000			0.00		
	5		-		0.000			0.00		
	6		-		0.000			0.00		
60min	1		-		0.000	0.00	-	0.00	0.00	-
	2		-		0.000			0.00		
	3		-		0.000			0.00		
	4		-		0.000			0.00		
	5		-		0.000			0.00		
	6		-		0.000			0.00		
极限	1		-		0.000	0.00	-	0.00	0.00	-
	2		-		0.000			0.00		
	3		-		0.000			0.00		
	4		-		0.000			0.00		
	5		-		0.000			0.00		
	6		-		0.000			0.00		



操作者:

日期: 2026-09-11

复核者:

未审阅版本



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 28-21/31-1536-2 - zzp-2025121551p-rcqx-2-pH1.2jz-jf50z-rj.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260526-FX280.lcb

样品瓶号 : 1-9

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/05/26 11:54:19

处理时间 (V2) : 2026/05/27 09:15:16

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图1 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025121551批-pH1.2介质-桨法-50转
溶剂



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30℃

数据文件名: RC\$QTL-392 - 28-21/31-1537-2 - zzp-2025121551p-rcqx-2-pH1.2jz-jf50z-dz1-1.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260526-FX280.lcb

样品瓶号 : 1-18

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/05/26 11:57:41

处理时间 (V2) : 2026/05/27 09:15:20

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.065	54047	100.000	7941	2255	1.195	--
总计		54047	100.000	7941			

图2 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025121551批-pH1.2介质-桨法-50转
对照品溶液-1-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30℃

数据文件名: RC\$QTL-392 - 28-21/31-1538-2 - zzp-2025121551p-rcqx-2-pH1.2jz-jf50z-dz1-2.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260526-FX280.lcb

样品瓶号 : 1-18

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/05/26 12:01:04

处理时间 (V2) : 2026/05/27 09:15:23

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.065	54521	100.000	7955	2255	1.212	--
总计		54521	100.000	7955			

图3 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025121551批-pH1.2介质-桨法-50转
对照品溶液-1-2



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30℃

数据文件名: RC\$QTL-392 - 28-21/31-1539-2 - zzp-2025121551p-rcqx-2-pH1.2jz-jf50z-dz1-3.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260526-FX280.lcb

样品瓶号 : 1-18

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/05/26 12:04:29

处理时间 (V2) : 2026/05/27 09:15:26

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.065	54402	100.000	7960	2265	1.199	--
总计		54402	100.000	7960			

图4 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025121551批-pH1.2介质-浆法-50转
对照品溶液-1-3



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30℃

数据文件名: RC\$QTL-392 - 28-21/31-1540-2 - zzp-2025121551p-rcqx-2-pH1.2jz-jf50z-dz1-4.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260526-FX280.lcb

样品瓶号 : 1-18

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/05/26 12:07:54

处理时间 (V2) : 2026/05/27 09:15:29

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.065	54307	100.000	7959	2259	1.210	--
总计		54307	100.000	7959			

图5 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025121551批-pH1.2介质-桨法-50转
对照品溶液-1-4



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30℃

数据文件名: RC\$QTL-392 - 28-21/31-1541-2 - zzp-2025121551p-rcqx-2-pH1.2jz-jf50z-dz1-5.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260526-FX280.lcb

样品瓶号 : 1-18

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/05/26 12:11:17

处理时间 (V2) : 2026/05/27 09:15:31

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.065	54241	100.000	7958	2259	1.203	--
总计		54241	100.000	7958			

图6 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025121551批-pH1.2介质-桨法-50转
对照品溶液-1-5




QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温 : 30°C
数据文件名: RC\$QTL-392 - 28-21/31-1542-2 - zzp-2025121551p-rcqx-2-pH1.2jz-jf50z-p1-5min.lcd
方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260526-FX280.lcb
样品瓶号 : 1-1
进样体积 : 20μl
进样时间 : 2026/05/26 12:14:40
处理时间 (V2) : 2026/05/27 09:15:34
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者:xiexinhui
处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图7 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025121551批-pH1.2介质-桨法-50转-5min-片1
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 28-21/31-1543-2 - zzp-2025121551p-rcqx-2-pH1.2jz-jf50z-p2-5min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260526-FX280.lcb

样品瓶号 : 1-10

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/05/26 12:18:02

处理时间 (V2) : 2026/05/27 09:15:36

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图8 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025121551批-pH1.2介质-桨法-50转-5min-片2
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 28-21/31-1544-2 - zzp-2025121551p-rcqx-2-pH1.2jz-jf50z-p3-5min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260526-FX280.lcb

样品瓶号 : 1-19

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/05/26 12:21:26

处理时间 (V2) : 2026/05/27 09:15:39

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图9 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025121551批-pH1.2介质-桨法-50转-5min-片3
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 28-21/31-1545-2 - zzp-2025121551p-rcqx-2-pH1.2jz-jf50z-p4-5min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260526-FX280.lcb

样品瓶号 : 1-28

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/05/26 12:24:48

处理时间 (V2) : 2026/05/27 09:15:41

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图10 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025121551批-pH1.2介质-浆法-50转-5min-片4
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 28-21/31-1546-2 - zzp-2025121551p-rcqx-2-pH1.2jz-jf50z-p5-5min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260526-FX280.lcb

样品瓶号 : 1-37

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/05/26 12:28:09

处理时间 (V2) : 2026/05/27 09:15:44

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图11 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025121551批-pH1.2介质-浆法-50转-5min-片5
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 28-21/31-1547-2 - zzp-2025121551p-rcqx-2-pH1.2jz-jf50z-p6-5min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260526-FX280.lcb

样品瓶号 : 1-46

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/05/26 12:31:32

处理时间 (V2) : 2026/05/27 09:15:46

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图12 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025121551批-pH1.2介质-桨法-50转-5min-片6
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 28-21/31-1548-2 - zzp-2025121551p-rcqx-2-pH1.2jz-jf50z-p1-10min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260526-FX280.lcb

样品瓶号 : 1-2

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/05/26 12:34:54

处理时间 (V2) : 2026/05/27 09:15:49

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图13 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025121551批-pH1.2介质-桨法-50转-10min-片1
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 28-21/31-1549-2 - zzp-2025121551p-rcqx-2-pH1.2jz-jf50z-p2-10min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260526-FX280.lcb

样品瓶号 : 1-11

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/05/26 12:38:17

处理时间 (V2) : 2026/05/27 09:15:51

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图14 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025121551批-pH1.2介质-桨法-50转-10min-片2
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 28-21/31-1550-2 - zzp-2025121551p-rcqx-2-pH1.2jz-jf50z-p3-10min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260526-FX280.lcb

样品瓶号 : 1-20

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/05/26 12:41:39

处理时间 (V2) : 2026/05/27 09:15:54

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图15 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025121551批-pH1.2介质-浆法-50转-10min-片3
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 28-21/31-1551-2 - zzp-2025121551p-rcqx-2-pH1.2jz-jf50z-p4-10min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260526-FX280.lcb

样品瓶号 : 1-29

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/05/26 12:45:00

处理时间 (V2) : 2026/05/27 09:15:56

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图16 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025121551批-pH1.2介质-桨法-50转-10min-片4
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 28-21/31-1552-2 - zzp-2025121551p-rcqx-2-pH1.2jz-jf50z-p5-10min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260526-FX280.lcb

样品瓶号 : 1-38

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/05/26 12:48:24

处理时间 (V2) : 2026/05/27 09:15:59

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图17 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025121551批-pH1.2介质-桨法-50转-10min-片5
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 28-21/31-1553-2 - zzp-2025121551p-rcqx-2-pH1.2jz-jf50z-p6-10min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260526-FX280.lcb

样品瓶号 : 1-47

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/05/26 12:51:46

处理时间 (V2) : 2026/05/27 09:16:02

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图18 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025121551批-pH1.2介质-桨法-50转-10min-片6
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 28-21/31-1554-2 - zzp-2025121551p-rcqx-2-pH1.2jz-jf50z-p1-15min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260526-FX280.lcb

样品瓶号 : 1-3

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/05/26 12:55:10

处理时间 (V2) : 2026/05/27 09:16:04

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图19 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025121551批-pH1.2介质-桨法-50转-15min-片1
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 28-21/31-1555-2 - zzp-2025121551p-rcqx-2-pH1.2jz-jf50z-p2-15min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260526-FX280.lcb

样品瓶号 : 1-12

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/05/26 12:58:32

处理时间 (V2) : 2026/05/27 09:16:07

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图20 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025121551批-pH1.2介质-桨法-50转-15min-片2
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 28-21/31-1556-2 - zzp-2025121551p-rcqx-2-pH1.2jz-jf50z-p3-15min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260526-FX280.lcb

样品瓶号 : 1-21

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/05/26 13:01:54

处理时间 (V2) : 2026/05/27 09:16:09

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图21 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025121551批-pH1.2介质-桨法-50转-15min-片3
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 28-21/31-1557-2 - zzp-2025121551p-rcqx-2-pH1.2jz-jf50z-p4-15min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260526-FX280.lcb

样品瓶号 : 1-30

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/05/26 13:05:15

处理时间 (V2) : 2026/05/27 09:16:12

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图22 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025121551批-pH1.2介质-浆法-50转-15min-片4
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 28-21/31-1558-2 - zzp-2025121551p-rcqx-2-pH1.2jz-jf50z-p5-15min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260526-FX280.lcb

样品瓶号 : 1-39

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/05/26 13:08:39

处理时间 (V2) : 2026/05/27 09:16:14

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图23 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025121551批-pH1.2介质-桨法-50转-15min-片5
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 28-21/31-1559-2 - zzp-2025121551p-rcqx-2-pH1.2jz-jf50z-p6-15min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260526-FX280.lcb

样品瓶号 : 1-48

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/05/26 13:12:02

处理时间 (V2) : 2026/05/27 09:16:17

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图24 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025121551批-pH1.2介质-桨法-50转-15min-片6
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 28-21/31-1560-2 - zzp-2025121551p-rcqx-2-pH1.2jz-jf50z-p1-20min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260526-FX280.lcb

样品瓶号 : 1-4

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/05/26 13:15:24

处理时间 (V2) : 2026/05/27 09:16:20

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图25 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025121551批-pH1.2介质-桨法-50转-20min-片1
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 28-21/31-1561-2 - zzp-2025121551p-rcqx-2-pH1.2jz-jf50z-p2-20min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260526-FX280.lcb

样品瓶号 : 1-13

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/05/26 13:18:46

处理时间 (V2) : 2026/05/27 09:16:23

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图26 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025121551批-pH1.2介质-桨法-50转-20min-片2
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 28-21/31-1562-2 - zzp-2025121551p-rcqx-2-pH1.2jz-jf50z-p3-20min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260526-FX280.lcb

样品瓶号 : 1-22

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/05/26 13:22:09

处理时间 (V2) : 2026/05/27 09:16:26

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图27 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025121551批-pH1.2介质-桨法-50转-20min-片3
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 28-21/31-1563-2 - zzp-2025121551p-rcqx-2-pH1.2jz-jf50z-p4-20min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260526-FX280.lcb

样品瓶号 : 1-31

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/05/26 13:25:30

处理时间 (V2) : 2026/05/27 09:16:28

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图28 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025121551批-pH1.2介质-桨法-50转-20min-片4
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 28-21/31-1564-2 - zzp-2025121551p-rcqx-2-pH1.2jz-jf50z-p5-20min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260526-FX280.lcb

样品瓶号 : 1-40

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/05/26 13:28:52

处理时间 (V2) : 2026/05/27 09:16:31

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图29 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025121551批-pH1.2介质-桨法-50转-20min-片5
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 28-21/31-1565-2 - zzp-2025121551p-rcqx-2-pH1.2jz-jf50z-p6-20min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260526-FX280.lcb

样品瓶号 : 1-49

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/05/26 13:32:14

处理时间 (V2) : 2026/05/27 09:16:34

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图30 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025121551批-pH1.2介质-桨法-50转-20min-片6
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 28-21/31-1566-2 - zzp-2025121551p-rcqx-2-pH1.2jz-jf50z-p1-30min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260526-FX280.lcb

样品瓶号 : 1-5

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/05/26 13:35:36

处理时间 (V2) : 2026/05/27 09:16:36

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图31 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025121551批-pH1.2介质-桨法-50转-30min-片1
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 28-21/31-1567-2 - zzp-2025121551p-rcqx-2-pH1.2jz-jf50z-p2-30min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260526-FX280.lcb

样品瓶号 : 1-14

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/05/26 13:38:58

处理时间 (V2) : 2026/05/27 09:16:39

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图32 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025121551批-pH1.2介质-桨法-50转-30min-片2
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 28-21/31-1568-2 - zzp-2025121551p-rcqx-2-pH1.2jz-jf50z-p3-30min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260526-FX280.lcb

样品瓶号 : 1-23

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/05/26 13:42:20

处理时间 (V2) : 2026/05/27 09:16:41

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图33 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025121551批-pH1.2介质-桨法-50转-30min-片3
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 28-21/31-1569-2 - zzp-2025121551p-rcqx-2-pH1.2jz-jf50z-p4-30min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260526-FX280.lcb

样品瓶号 : 1-32

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/05/26 13:45:42

处理时间 (V2) : 2026/05/27 09:16:44

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图34 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025121551批-pH1.2介质-桨法-50转-30min-片4
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 28-21/31-1570-2 - zzp-2025121551p-rcqx-2-pH1.2jz-jf50z-p5-30min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260526-FX280.lcb

样品瓶号 : 1-41

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/05/26 13:49:04

处理时间 (V2) : 2026/05/27 09:16:46

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图35 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025121551批-pH1.2介质-桨法-50转-30min-片5
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 28-21/31-1571-2 - zzp-2025121551p-rcqx-2-pH1.2jz-jf50z-p6-30min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260526-FX280.lcb

样品瓶号 : 1-50

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/05/26 13:52:27

处理时间 (V2) : 2026/05/27 09:16:49

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图36 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025121551批-pH1.2介质-桨法-50转-30min-片6
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 28-21/31-1572-2 - zzp-2025121551p-rcqx-2-pH1.2jz-jf50z-p1-45min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260526-FX280.lcb

样品瓶号 : 1-6

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/05/26 13:55:51

处理时间 (V2) : 2026/05/27 09:16:52

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图37 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025121551批-pH1.2介质-桨法-50转-45min-片1
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 28-21/31-1573-2 - zzp-2025121551p-rcqx-2-pH1.2jz-jf50z-p2-45min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260526-FX280.lcb

样品瓶号 : 1-15

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/05/26 13:59:13

处理时间 (V2) : 2026/05/27 09:16:54

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图38 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025121551批-pH1.2介质-桨法-50转-45min-片2
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 28-21/31-1574-2 - zzp-2025121551p-rcqx-2-pH1.2jz-jf50z-p3-45min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260526-FX280.lcb

样品瓶号 : 1-24

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/05/26 14:02:36

处理时间 (V2) : 2026/05/27 09:16:57

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图39 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025121551批-pH1.2介质-桨法-50转-45min-片3
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 28-21/31-1575-2 - zzp-2025121551p-rcqx-2-pH1.2jz-jf50z-p4-45min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260526-FX280.lcb

样品瓶号 : 1-33

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/05/26 14:05:58

处理时间 (V2) : 2026/05/27 09:16:59

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图40 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025121551批-pH1.2介质-桨法-50转-45min-片4
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 28-21/31-1576-2 - zzp-2025121551p-rcqx-2-pH1.2jz-jf50z-p5-45min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260526-FX280.lcb

样品瓶号 : 1-42

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/05/26 14:09:19

处理时间 (V2) : 2026/05/27 09:17:02

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图41 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025121551批-pH1.2介质-浆法-50转-45min-片5
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 28-21/31-1577-2 - zzp-2025121551p-rcqx-2-pH1.2jz-jf50z-p6-45min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260526-FX280.lcb

样品瓶号 : 1-51

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/05/26 14:12:43

处理时间 (V2) : 2026/05/27 09:17:05

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图42 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025121551批-pH1.2介质-桨法-50转-45min-片6
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 28-21/31-1578-2 - zzp-2025121551p-rcqx-2-pH1.2jz-jf50z-p1-60min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260526-FX280.lcb

样品瓶号 : 1-7

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/05/26 14:16:06

处理时间 (V2) : 2026/05/27 09:17:07

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图43 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025121551批-pH1.2介质-桨法-50转-60min-片1
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 28-21/31-1579-2 - zzp-2025121551p-rcqx-2-pH1.2jz-jf50z-p2-60min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260526-FX280.lcb

样品瓶号 : 1-16

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/05/26 14:19:29

处理时间 (V2) : 2026/05/27 09:17:10

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图44 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025121551批-pH1.2介质-桨法-50转-60min-片2
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 28-21/31-1580-2 - zzp-2025121551p-rcqx-2-pH1.2jz-jf50z-p3-60min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260526-FX280.lcb

样品瓶号 : 1-25

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/05/26 14:22:51

处理时间 (V2) : 2026/05/27 09:17:12

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图45 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025121551批-pH1.2介质-桨法-50转-60min-片3
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 28-21/31-1581-2 - zzp-2025121551p-rcqx-2-pH1.2jz-jf50z-p4-60min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260526-FX280.lcb

样品瓶号 : 1-34

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/05/26 14:26:14

处理时间 (V2) : 2026/05/27 09:17:14

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图46 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025121551批-pH1.2介质-桨法-50转-60min-片4
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 28-21/31-1582-2 - zzp-2025121551p-rcqx-2-pH1.2jz-jf50z-p5-60min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260526-FX280.lcb

样品瓶号 : 1-43

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/05/26 14:29:36

处理时间 (V2) : 2026/05/27 09:17:17

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图47 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025121551批-pH1.2介质-桨法-50转-60min-片5
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 28-21/31-1583-2 - zzp-2025121551p-rcqx-2-pH1.2jz-jf50z-p6-60min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260526-FX280.lcb

样品瓶号 : 1-52

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/05/26 14:33:00

处理时间 (V2) : 2026/05/27 09:17:20

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图48 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025121551批-pH1.2介质-桨法-50转-60min-片6
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 28-21/31-1584-2 - zzp-2025121551p-rcqx-2-pH1.2jz-jf50z-p1-jx.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260526-FX280.lcb

样品瓶号 : 1-8

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/05/26 14:36:23

处理时间 (V2) : 2026/05/27 09:17:22

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图49 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025121551批-pH1.2介质-桨法-50转-极限转速-片1
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 28-21/31-1585-2 - zzp-2025121551p-rcqx-2-pH1.2jz-jf50z-p2-jx.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260526-FX280.lcb

样品瓶号 : 1-17

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/05/26 14:39:47

处理时间 (V2) : 2026/05/27 09:17:24

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图50 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025121551批-pH1.2介质-桨法-50转-极限转速-片2
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 28-21/31-1586-2 - zzp-2025121551p-rcqx-2-pH1.2jz-jf50z-p3-jx.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260526-FX280.lcb

样品瓶号 : 1-26

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/05/26 14:43:10

处理时间 (V2) : 2026/05/27 09:17:27

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图51 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025121551批-pH1.2介质-桨法-50转-极限转速-片3
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 28-21/31-1587-2 - zzp-2025121551p-rcqx-2-pH1.2jz-jf50z-p4-jx.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260526-FX280.lcb

样品瓶号 : 1-35

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/05/26 14:46:33

处理时间 (V2) : 2026/05/27 09:17:29

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图52 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025121551批-pH1.2介质-桨法-50转-极限转速-片4
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 28-21/31-1588-2 - zzp-2025121551p-rcqx-2-pH1.2jz-jf50z-p5-jx.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260526-FX280.lcb

样品瓶号 : 1-44

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/05/26 14:49:56

处理时间 (V2) : 2026/05/27 09:17:32

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图53 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025121551批-pH1.2介质-桨法-50转-极限转速-片5
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 28-21/31-1589-2 - zzp-2025121551p-rcqx-2-pH1.2jz-jf50z-p6-jx.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260526-FX280.lcb

样品瓶号 : 1-53

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/05/26 14:53:19

处理时间 (V2) : 2026/05/27 09:17:34

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图54 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025121551批-pH1.2介质-桨法-50转-极限转速-片6
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30℃

数据文件名: RC\$QTL-392 - 28-21/31-1590-2 - zzp-2025121551p-rcqx-2-pH1.2jz-jf50z-dz2-1.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260526-FX280.lcb

样品瓶号 : 1-27

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/05/26 14:56:42

处理时间 (V2) : 2026/05/27 09:17:37

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.071	54592	100.000	8022	2285	1.191	--
总计		54592	100.000	8022			

图55 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025121551批-pH1.2介质-桨法-50转
对照品溶液-2-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 28-21/31-1591-2 - zzp-2025121551p-rcqx-2-pH1.2jz-jf50z-dz2-2.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260526-FX280.lcb

样品瓶号 : 1-27

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/05/26 15:00:06

处理时间 (V2) : 2026/05/27 09:17:39

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.070	54431	100.000	8017	2276	1.187	--
总计		54431	100.000	8017			

图56 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025121551批-pH1.2介质-桨法-50转
对照品溶液-2-2



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 28-21/31-1592-2 - zzp-2025121651p-rcqx-2-pH1.2jz-jf50z-rj.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260526-FX280.lcb

样品瓶号 : 2-9

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/05/26 15:03:30

处理时间 (V2) : 2026/05/27 09:17:42

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图57 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025121651批-pH1.2介质-桨法-50转
溶剂



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 28-21/31-1593-2 - zzp-2025121651p-rcqx-2-pH1.2jz-jf50z-dz1-1.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260526-FX280.lcb

样品瓶号 : 2-18

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/05/26 15:06:55

处理时间 (V2) : 2026/05/27 09:17:45

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.071	54792	100.000	8037	2264	1.185	--
总计		54792	100.000	8037			

图58 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025121651批-pH1.2介质-桨法-50转
对照品溶液-1-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 28-21/31-1594-2 - zzp-2025121651p-rcqx-2-pH1.2jz-jf50z-dz1-2.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260526-FX280.lcb

样品瓶号 : 2-18

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/05/26 15:10:21

处理时间 (V2) : 2026/05/27 09:17:47

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.069	54803	100.000	8020	2269	1.186	--
总计		54803	100.000	8020			

图59 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025121651批-pH1.2介质-桨法-50转
对照品溶液-1-2



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 28-21/31-1595-2 - zzp-2025121651p-rcqx-2-pH1.2jz-jf50z-dz1-3.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260526-FX280.lcb

样品瓶号 : 2-18

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/05/26 15:13:46

处理时间 (V2) : 2026/05/27 09:17:50

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.070	54496	100.000	8022	2281	1.194	--
总计		54496	100.000	8022			

图60 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025121651批-pH1.2介质-桨法-50转
对照品溶液-1-3



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 28-21/31-1596-2 - zzp-2025121651p-rcqx-2-pH1.2jz-jf50z-dz1-4.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260526-FX280.lcb

样品瓶号 : 2-18

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/05/26 15:17:11

处理时间 (V2) : 2026/05/27 09:17:52

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.066	54903	100.000	8011	2258	1.205	--
总计		54903	100.000	8011			

图61 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025121651批-pH1.2介质-桨法-50转
对照品溶液-1-4



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 28-21/31-1597-2 - zzp-2025121651p-rcqx-2-pH1.2jz-jf50z-dz1-5.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260526-FX280.lcb

样品瓶号 : 2-18

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/05/26 15:20:35

处理时间 (V2) : 2026/05/27 09:17:55

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.066	54342	100.000	7993	2267	1.186	--
总计		54342	100.000	7993			

图62 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025121651批-pH1.2介质-桨法-50转
对照品溶液-1-5



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 28-21/31-1598-2 - zzp-2025121651p-rcqx-2-pH1.2jz-jf50z-p1-5min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260526-FX280.lcb

样品瓶号 : 2-1

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/05/26 15:24:00

处理时间 (V2) : 2026/05/27 09:17:58

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图63 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025121651批-pH1.2介质-浆法-50转-5min-片1
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 28-21/31-1599-2 - zzp-2025121651p-rcqx-2-pH1.2jz-jf50z-p2-5min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260526-FX280.lcb

样品瓶号 : 2-10

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/05/26 15:27:24

处理时间 (V2) : 2026/05/27 09:18:00

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图64 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025121651批-pH1.2介质-浆法-50转-5min-片2
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 28-21/31-1600-2 - zzp-2025121651p-rcqx-2-pH1.2jz-jf50z-p3-5min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260526-FX280.lcb

样品瓶号 : 2-19

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/05/26 15:30:47

处理时间 (V2) : 2026/05/27 09:18:03

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图65 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025121651批-pH1.2介质-浆法-50转-5min-片3
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 28-21/31-1601-2 - zzp-2025121651p-rcqx-2-pH1.2jz-jf50z-p4-5min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260526-FX280.lcb

样品瓶号 : 2-28

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/05/26 15:34:10

处理时间 (V2) : 2026/05/27 09:18:05

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图66 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025121651批-pH1.2介质-浆法-50转-5min-片4
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 28-21/31-1602-2 - zzp-2025121651p-rcqx-2-pH1.2jz-jf50z-p5-5min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260526-FX280.lcb

样品瓶号 : 2-37

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/05/26 15:37:34

处理时间 (V2) : 2026/05/27 09:18:08

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图67 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025121651批-pH1.2介质-浆法-50转-5min-片5
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 28-21/31-1603-2 - zzp-2025121651p-rcqx-2-pH1.2jz-jf50z-p6-5min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260526-FX280.lcb

样品瓶号 : 2-46

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/05/26 15:40:57

处理时间 (V2) : 2026/05/27 09:18:10

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图68 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025121651批-pH1.2介质-桨法-50转-5min-片6
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 28-21/31-1604-2 - zzp-2025121651p-rcqx-2-pH1.2jz-jf50z-p1-10min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260526-FX280.lcb

样品瓶号 : 2-2

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/05/26 15:44:22

处理时间 (V2) : 2026/05/27 09:18:13

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图69 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025121651批-pH1.2介质-桨法-50转-10min-片1
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 28-21/31-1605-2 - zzp-2025121651p-rcqx-2-pH1.2jz-jf50z-p2-10min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260526-FX280.lcb

样品瓶号 : 2-11

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/05/26 15:47:47

处理时间 (V2) : 2026/05/27 09:18:15

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图70 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025121651批-pH1.2介质-桨法-50转-10min-片2
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 28-21/31-1606-2 - zzp-2025121651p-rcqx-2-pH1.2jz-jf50z-p3-10min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260526-FX280.lcb

样品瓶号 : 2-20

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/05/26 15:51:11

处理时间 (V2) : 2026/05/27 09:18:18

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图71 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025121651批-pH1.2介质-桨法-50转-10min-片3
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 28-21/31-1607-2 - zzp-2025121651p-rcqx-2-pH1.2jz-jf50z-p4-10min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260526-FX280.lcb

样品瓶号 : 2-29

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/05/26 15:54:34

处理时间 (V2) : 2026/05/27 09:18:21

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图72 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025121651批-pH1.2介质-桨法-50转-10min-片4
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 28-21/31-1608-2 - zzp-2025121651p-rcqx-2-pH1.2jz-jf50z-p5-10min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260526-FX280.lcb

样品瓶号 : 2-38

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/05/26 15:57:58

处理时间 (V2) : 2026/05/27 09:18:23

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图73 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025121651批-pH1.2介质-桨法-50转-10min-片5
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 28-21/31-1609-2 - zzp-2025121651p-rcqx-2-pH1.2jz-jf50z-p6-10min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260526-FX280.lcb

样品瓶号 : 2-47

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/05/26 16:01:21

处理时间 (V2) : 2026/05/27 09:18:26

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图74 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025121651批-pH1.2介质-桨法-50转-10min-片6
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 28-21/31-1610-2 - zzp-2025121651p-rcqx-2-pH1.2jz-jf50z-p1-15min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260526-FX280.lcb

样品瓶号 : 2-3

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/05/26 16:04:44

处理时间 (V2) : 2026/05/27 09:18:29

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图75 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025121651批-pH1.2介质-桨法-50转-15min-片1
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 28-21/31-1611-2 - zzp-2025121651p-rcqx-2-pH1.2jz-jf50z-p2-15min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260526-FX280.lcb

样品瓶号 : 2-12

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/05/26 16:08:08

处理时间 (V2) : 2026/05/27 09:18:32

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图76 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025121651批-pH1.2介质-桨法-50转-15min-片2
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 28-21/31-1612-2 - zzp-2025121651p-rcqx-2-pH1.2jz-jf50z-p3-15min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260526-FX280.lcb

样品瓶号 : 2-21

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/05/26 16:11:31

处理时间 (V2) : 2026/05/27 09:18:34

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图77 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025121651批-pH1.2介质-桨法-50转-15min-片3
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 28-21/31-1613-2 - zzp-2025121651p-rcqx-2-pH1.2jz-jf50z-p4-15min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260526-FX280.lcb

样品瓶号 : 2-30

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/05/26 16:14:55

处理时间 (V2) : 2026/05/27 09:18:37

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图78 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025121651批-pH1.2介质-浆法-50转-15min-片4
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 28-21/31-1614-2 - zzp-2025121651p-rcqx-2-pH1.2jz-jf50z-p5-15min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260526-FX280.lcb

样品瓶号 : 2-39

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/05/26 16:18:18

处理时间 (V2) : 2026/05/27 09:18:40

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图79 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025121651批-pH1.2介质-桨法-50转-15min-片5
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 28-21/31-1615-2 - zzp-2025121651p-rcqx-2-pH1.2jz-jf50z-p6-15min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260526-FX280.lcb

样品瓶号 : 2-48

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/05/26 16:21:41

处理时间 (V2) : 2026/05/27 09:18:42

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图80 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025121651批-pH1.2介质-浆法-50转-15min-片6
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 28-21/31-1616-2 - zzp-2025121651p-rcqx-2-pH1.2jz-jf50z-p1-20min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260526-FX280.lcb

样品瓶号 : 2-4

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/05/26 16:25:04

处理时间 (V2) : 2026/05/27 09:18:45

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图81 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025121651批-pH1.2介质-桨法-50转-20min-片1
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 28-21/31-1617-2 - zzp-2025121651p-rcqx-2-pH1.2jz-jf50z-p2-20min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260526-FX280.lcb

样品瓶号 : 2-13

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/05/26 16:28:29

处理时间 (V2) : 2026/05/27 09:18:47

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图82 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025121651批-pH1.2介质-桨法-50转-20min-片2
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 28-21/31-1618-2 - zzp-2025121651p-rcqx-2-pH1.2jz-jf50z-p3-20min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260526-FX280.lcb

样品瓶号 : 2-22

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/05/26 16:31:51

处理时间 (V2) : 2026/05/27 09:18:50

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图83 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025121651批-pH1.2介质-桨法-50转-20min-片3
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 28-21/31-1619-2 - zzp-2025121651p-rcqx-2-pH1.2jz-jf50z-p4-20min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260526-FX280.lcb

样品瓶号 : 2-31

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/05/26 16:35:15

处理时间 (V2) : 2026/05/27 09:18:52

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图84 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025121651批-pH1.2介质-浆法-50转-20min-片4
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 28-21/31-1620-2 - zzp-2025121651p-rcqx-2-pH1.2jz-jf50z-p5-20min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260526-FX280.lcb

样品瓶号 : 2-40

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/05/26 16:38:40

处理时间 (V2) : 2026/05/27 09:18:55

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图85 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025121651批-pH1.2介质-桨法-50转-20min-片5
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 28-21/31-1621-2 - zzp-2025121651p-rcqx-2-pH1.2jz-jf50z-p6-20min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260526-FX280.lcb

样品瓶号 : 2-49

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/05/26 16:42:03

处理时间 (V2) : 2026/05/27 09:18:57

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图86 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025121651批-pH1.2介质-桨法-50转-20min-片6
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 28-21/31-1622-2 - zzp-2025121651p-rcqx-2-pH1.2jz-jf50z-p1-30min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260526-FX280.lcb

样品瓶号 : 2-5

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/05/26 16:45:27

处理时间 (V2) : 2026/05/27 09:19:00

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图87 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025121651批-pH1.2介质-桨法-50转-30min-片1
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 28-21/31-1623-2 - zzp-2025121651p-rcqx-2-pH1.2jz-jf50z-p2-30min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260526-FX280.lcb

样品瓶号 : 2-14

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/05/26 16:48:51

处理时间 (V2) : 2026/05/27 09:19:02

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图88 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025121651批-pH1.2介质-浆法-50转-30min-片2
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 28-21/31-1624-2 - zzp-2025121651p-rcqx-2-pH1.2jz-jf50z-p3-30min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260526-FX280.lcb

样品瓶号 : 2-23

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/05/26 16:52:16

处理时间 (V2) : 2026/05/27 09:19:05

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图89 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025121651批-pH1.2介质-桨法-50转-30min-片3
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 28-21/31-1625-2 - zzp-2025121651p-rcqx-2-pH1.2jz-jf50z-p4-30min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260526-FX280.lcb

样品瓶号 : 2-32

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/05/26 16:55:40

处理时间 (V2) : 2026/05/27 09:19:08

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图90 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025121651批-pH1.2介质-桨法-50转-30min-片4
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 28-21/31-1626-2 - zzp-2025121651p-rcqx-2-pH1.2jz-jf50z-p5-30min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260526-FX280.lcb

样品瓶号 : 2-41

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/05/26 16:59:03

处理时间 (V2) : 2026/05/27 09:19:10

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图91 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025121651批-pH1.2介质-桨法-50转-30min-片5
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 28-21/31-1627-2 - zzp-2025121651p-rcqx-2-pH1.2jz-jf50z-p6-30min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260526-FX280.lcb

样品瓶号 : 2-50

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/05/26 17:02:27

处理时间 (V2) : 2026/05/27 09:19:12

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图92 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025121651批-pH1.2介质-桨法-50转-30min-片6
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 28-21/31-1628-2 - zzp-2025121651p-rcqx-2-pH1.2jz-jf50z-p1-45min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260526-FX280.lcb

样品瓶号 : 2-6

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/05/26 17:05:50

处理时间 (V2) : 2026/05/27 09:19:15

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图93 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025121651批-pH1.2介质-桨法-50转-45min-片1
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 28-21/31-1629-2 - zzp-2025121651p-rcqx-2-pH1.2jz-jf50z-p2-45min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260526-FX280.lcb

样品瓶号 : 2-15

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/05/26 17:09:15

处理时间 (V2) : 2026/05/27 09:19:17

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图94 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025121651批-pH1.2介质-桨法-50转-45min-片2
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 28-21/31-1630-2 - zzp-2025121651p-rcqx-2-pH1.2jz-jf50z-p3-45min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260526-FX280.lcb

样品瓶号 : 2-24

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/05/26 17:12:39

处理时间 (V2) : 2026/05/27 09:19:20

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图95 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025121651批-pH1.2介质-桨法-50转-45min-片3
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 28-21/31-1631-2 - zzp-2025121651p-rcqx-2-pH1.2jz-jf50z-p4-45min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260526-FX280.lcb

样品瓶号 : 2-33

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/05/26 17:16:03

处理时间 (V2) : 2026/05/27 09:19:22

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图96 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025121651批-pH1.2介质-桨法-50转-45min-片4
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 28-21/31-1632-2 - zzp-2025121651p-rcqx-2-pH1.2jz-jf50z-p5-45min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260526-FX280.lcb

样品瓶号 : 2-42

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/05/26 17:19:27

处理时间 (V2) : 2026/05/27 09:19:25

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图97 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025121651批-pH1.2介质-桨法-50转-45min-片5
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 28-21/31-1633-2 - zzp-2025121651p-rcqx-2-pH1.2jz-jf50z-p6-45min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260526-FX280.lcb

样品瓶号 : 2-51

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/05/26 17:22:51

处理时间 (V2) : 2026/05/27 09:19:27

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图98 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025121651批-pH1.2介质-桨法-50转-45min-片6
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 28-21/31-1634-2 - zzp-2025121651p-rcqx-2-pH1.2jz-jf50z-p1-60min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260526-FX280.lcb

样品瓶号 : 2-7

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/05/26 17:26:15

处理时间 (V2) : 2026/05/27 09:19:30

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图99 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025121651批-pH1.2介质-桨法-50转-60min-片1
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 28-21/31-1635-2 - zzp-2025121651p-rcqx-2-pH1.2jz-jf50z-p2-60min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260526-FX280.lcb

样品瓶号 : 2-16

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/05/26 17:29:39

处理时间 (V2) : 2026/05/27 09:19:32

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图100 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025121651批-pH1.2介质-浆法-50转-60min-片2
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 28-21/31-1636-2 - zzp-2025121651p-rcqx-2-pH1.2jz-jf50z-p3-60min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260526-FX280.lcb

样品瓶号 : 2-25

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/05/26 17:33:03

处理时间 (V2) : 2026/05/27 09:19:35

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图101 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025121651批-pH1.2介质-浆法-50转-60min-片3
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 28-21/31-1637-2 - zzp-2025121651p-rcqx-2-pH1.2jz-jf50z-p4-60min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260526-FX280.lcb

样品瓶号 : 2-34

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/05/26 17:36:27

处理时间 (V2) : 2026/05/27 09:19:37

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图102 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025121651批-pH1.2介质-浆法-50转-60min-片4
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 28-21/31-1638-2 - zzp-2025121651p-rcqx-2-pH1.2jz-jf50z-p5-60min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260526-FX280.lcb

样品瓶号 : 2-43

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/05/26 17:39:52

处理时间 (V2) : 2026/05/27 09:19:40

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图103 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025121651批-pH1.2介质-浆法-50转-60min-片5
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 28-21/31-1639-2 - zzp-2025121651p-rcqx-2-pH1.2jz-jf50z-p6-60min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260526-FX280.lcb

样品瓶号 : 2-52

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/05/26 17:43:16

处理时间 (V2) : 2026/05/27 09:19:42

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图104 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025121651批-pH1.2介质-桨法-50转-60min-片6
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30℃

数据文件名: RC\$QTL-392 - 28-21/31-1640-2 - zzp-2025121651p-rcqx-2-pH1.2jz-jf50z-p1-jx.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260526-FX280.lcb

样品瓶号 : 2-8

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/05/26 17:46:41

处理时间 (V2) : 2026/05/27 09:19:45

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图105 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025121651批-pH1.2介质-桨法-50转-极限转速-片1
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 28-21/31-1641-2 - zzp-2025121651p-rcqx-2-pH1.2jz-jf50z-p2-jx.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260526-FX280.lcb

样品瓶号 : 2-17

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/05/26 17:50:05

处理时间 (V2) : 2026/05/27 09:19:47

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图106 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025121651批-pH1.2介质-桨法-50转-极限转速-片2
供试品溶液-1




QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温 : 30°C
数据文件名: RC\$QTL-392 - 28-21/31-1642-2 - zzp-2025121651p-rcqx-2-pH1.2jz-jf50z-p3-jx.lcd
方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260526-FX280.lcb
样品瓶号 : 2-26
进样体积 : 20μl
进样时间 : 2026/05/26 17:53:30
处理时间 (V2) : 2026/05/27 09:19:50
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者:xiexinhui
处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图107 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025121651批-pH1.2介质-桨法-50转-极限转速-片3
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 28-21/31-1643-2 - zzp-2025121651p-rcqx-2-pH1.2jz-jf50z-p4-jx.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260526-FX280.lcb

样品瓶号 : 2-35

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/05/26 17:56:55

处理时间 (V2) : 2026/05/27 09:19:52

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图108 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025121651批-pH1.2介质-桨法-50转-极限转速-片4
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 28-21/31-1644-2 - zzp-2025121651p-rcqx-2-pH1.2jz-jf50z-p5-jx.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260526-FX280.lcb

样品瓶号 : 2-44

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/05/26 18:00:20

处理时间 (V2) : 2026/05/27 09:19:55

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图109 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025121651批-pH1.2介质-桨法-50转-极限转速-片5
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 28-21/31-1645-2 - zzp-2025121651p-rcqx-2-pH1.2jz-jf50z-p6-jx.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260526-FX280.lcb

样品瓶号 : 2-53

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/05/26 18:03:44

处理时间 (V2) : 2026/05/27 09:19:57

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图110 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025121651批-pH1.2介质-桨法-50转-极限转速-片6
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 28-21/31-1646-2 - zzp-2025121651p-rcqx-2-pH1.2jz-jf50z-dz2-1.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260526-FX280.lcb

样品瓶号 : 2-27

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/05/26 18:07:09

处理时间 (V2) : 2026/05/27 09:20:00

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.066	54207	100.000	7946	2262	1.189	--
总计		54207	100.000	7946			

图111 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025121651批-pH1.2介质-桨法-50转
对照品溶液-2-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 28-21/31-1647-2 - zzp-2025121651p-rcqx-2-pH1.2jz-jf50z-dz2-2.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260526-FX280.lcb

样品瓶号 : 2-27

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/05/26 18:10:34

处理时间 (V2) : 2026/05/27 09:20:02

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.066	54611	100.000	7975	2259	1.199	--
总计		54611	100.000	7975			

图112 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025121651批-pH1.2介质-桨法-50转
对照品溶液-2-2



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 28-21/31-1648-2 - zzp-2025121851p-rcqx-2-pH1.2jz-jf50z-rj.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260526-FX280.lcb

样品瓶号 : 3-9

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/05/26 18:13:56

处理时间 (V2) : 2026/05/27 09:20:05

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图113 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025121851批-pH1.2介质-桨法-50转
溶剂



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30℃

数据文件名: RC\$QTL-392 - 28-21/31-1649-2 - zzp-2025121851p-rcqx-2-pH1.2jz-jf50z-dz1-1.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260526-FX280.lcb

样品瓶号 : 3-18

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/05/26 18:17:20

处理时间 (V2) : 2026/05/27 09:20:07

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.071	54126	100.000	7883	2244	1.191	--
总计		54126	100.000	7883			

图114 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025121851批-pH1.2介质-桨法-50转
对照品溶液-1-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 28-21/31-1650-2 - zzp-2025121851p-rcqx-2-pH1.2jz-jf50z-dz1-2.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260526-FX280.lcb

样品瓶号 : 3-18

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/05/26 18:20:42

处理时间 (V2) : 2026/05/27 09:20:10

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.070	54206	100.000	7868	2239	1.203	--
总计		54206	100.000	7868			

图115 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025121851批-pH1.2介质-桨法-50转
对照品溶液-1-2



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30℃

数据文件名: RC\$QTL-392 - 28-21/31-1651-2 - zzp-2025121851p-rcqx-2-pH1.2jz-jf50z-dz1-3.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260526-FX280.lcb

样品瓶号 : 3-18

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/05/26 18:24:07

处理时间 (V2) : 2026/05/27 09:20:12

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.071	53995	100.000	7879	2255	1.195	--
总计		53995	100.000	7879			

图116 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025121851批-pH1.2介质-桨法-50转
对照品溶液-1-3



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 28-21/31-1652-2 - zzp-2025121851p-rcqx-2-pH1.2jz-jf50z-dz1-4.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260526-FX280.lcb

样品瓶号 : 3-18

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/05/26 18:27:30

处理时间 (V2) : 2026/05/27 09:20:15

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.066	53993	100.000	7873	2245	1.193	--
总计		53993	100.000	7873			

图117 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025121851批-pH1.2介质-桨法-50转
对照品溶液-1-4



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 28-21/31-1653-2 - zzp-2025121851p-rcqx-2-pH1.2jz-jf50z-dz1-5.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260526-FX280.lcb

样品瓶号 : 3-18

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/05/26 18:30:53

处理时间 (V2) : 2026/05/27 09:20:17

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.066	53407	100.000	7849	2253	1.181	--
总计		53407	100.000	7849			

图118 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025121851批-pH1.2介质-桨法-50转
对照品溶液-1-5



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 28-21/31-1654-2 - zzp-2025121851p-rcqx-2-pH1.2jz-jf50z-p1-5min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260526-FX280.lcb

样品瓶号 : 3-1

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/05/26 18:34:16

处理时间 (V2) : 2026/05/27 09:20:20

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图119 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025121851批-pH1.2介质-浆法-50转-5min-片1
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 28-21/31-1655-2 - zzp-2025121851p-rcqx-2-pH1.2jz-jf50z-p2-5min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260526-FX280.lcb

样品瓶号 : 3-10

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/05/26 18:37:39

处理时间 (V2) : 2026/05/27 09:20:23

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图120 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025121851批-pH1.2介质-浆法-50转-5min-片2
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 28-21/31-1656-2 - zzp-2025121851p-rcqx-2-pH1.2jz-jf50z-p3-5min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260526-FX280.lcb

样品瓶号 : 3-19

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/05/26 18:41:01

处理时间 (V2) : 2026/05/27 09:20:25

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图121 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025121851批-pH1.2介质-桨法-50转-5min-片3
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 28-21/31-1657-2 - zzp-2025121851p-rcqx-2-pH1.2jz-jf50z-p4-5min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260526-FX280.lcb

样品瓶号 : 3-28

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/05/26 18:44:24

处理时间 (V2) : 2026/05/27 09:20:28

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图122 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025121851批-pH1.2介质-浆法-50转-5min-片4
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 28-21/31-1658-2 - zzp-2025121851p-rcqx-2-pH1.2jz-jf50z-p5-5min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260526-FX280.lcb

样品瓶号 : 3-37

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/05/26 18:47:46

处理时间 (V2) : 2026/05/27 09:20:31

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图123 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025121851批-pH1.2介质-浆法-50转-5min-片5
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 28-21/31-1659-2 - zzp-2025121851p-rcqx-2-pH1.2jz-jf50z-p6-5min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260526-FX280.lcb

样品瓶号 : 3-46

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/05/26 18:51:08

处理时间 (V2) : 2026/05/27 09:20:34

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图124 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025121851批-pH1.2介质-桨法-50转-5min-片6
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 28-21/31-1660-2 - zzp-2025121851p-rcqx-2-pH1.2jz-jf50z-p1-10min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260526-FX280.lcb

样品瓶号 : 3-2

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/05/26 18:54:30

处理时间 (V2) : 2026/05/27 09:20:37

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图125 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025121851批-pH1.2介质-桨法-50转-10min-片1
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 28-21/31-1661-2 - zzp-2025121851p-rcqx-2-pH1.2jz-jf50z-p2-10min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260526-FX280.lcb

样品瓶号 : 3-11

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/05/26 18:57:53

处理时间 (V2) : 2026/05/27 09:20:39

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图126 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025121851批-pH1.2介质-桨法-50转-10min-片2
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 28-21/31-1662-2 - zzp-2025121851p-rcqx-2-pH1.2jz-jf50z-p3-10min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260526-FX280.lcb

样品瓶号 : 3-20

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/05/26 19:01:16

处理时间 (V2) : 2026/05/27 09:20:41

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图127 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025121851批-pH1.2介质-浆法-50转-10min-片3
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 28-21/31-1663-2 - zzp-2025121851p-rcqx-2-pH1.2jz-jf50z-p4-10min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260526-FX280.lcb

样品瓶号 : 3-29

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/05/26 19:04:39

处理时间 (V2) : 2026/05/27 09:20:44

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图128 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025121851批-pH1.2介质-桨法-50转-10min-片4
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 28-21/31-1664-2 - zzp-2025121851p-rcqx-2-pH1.2jz-jf50z-p5-10min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260526-FX280.lcb

样品瓶号 : 3-38

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/05/26 19:08:00

处理时间 (V2) : 2026/05/27 09:20:46

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图129 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025121851批-pH1.2介质-浆法-50转-10min-片5
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 28-21/31-1665-2 - zzp-2025121851p-rcqx-2-pH1.2jz-jf50z-p6-10min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260526-FX280.lcb

样品瓶号 : 3-47

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/05/26 19:11:23

处理时间 (V2) : 2026/05/27 09:20:49

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图130 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025121851批-pH1.2介质-浆法-50转-10min-片6
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 28-21/31-1666-2 - zzp-2025121851p-rcqx-2-pH1.2jz-jf50z-p1-15min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260526-FX280.lcb

样品瓶号 : 3-3

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/05/26 19:14:46

处理时间 (V2) : 2026/05/27 09:20:51

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图131 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025121851批-pH1.2介质-浆法-50转-15min-片1
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 28-21/31-1667-2 - zzp-2025121851p-rcqx-2-pH1.2jz-jf50z-p2-15min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260526-FX280.lcb

样品瓶号 : 3-12

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/05/26 19:18:08

处理时间 (V2) : 2026/05/27 09:20:54

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图132 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025121851批-pH1.2介质-浆法-50转-15min-片2
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 28-21/31-1668-2 - zzp-2025121851p-rcqx-2-pH1.2jz-jf50z-p3-15min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260526-FX280.lcb

样品瓶号 : 3-21

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/05/26 19:21:31

处理时间 (V2) : 2026/05/27 09:20:56

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图133 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025121851批-pH1.2介质-桨法-50转-15min-片3
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 28-21/31-1669-2 - zzp-2025121851p-rcqx-2-pH1.2jz-jf50z-p4-15min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260526-FX280.lcb

样品瓶号 : 3-30

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/05/26 19:24:53

处理时间 (V2) : 2026/05/27 09:20:59

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图134 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025121851批-pH1.2介质-浆法-50转-15min-片4
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 28-21/31-1670-2 - zzp-2025121851p-rcqx-2-pH1.2jz-jf50z-p5-15min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260526-FX280.lcb

样品瓶号 : 3-39

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/05/26 19:28:15

处理时间 (V2) : 2026/05/27 09:21:01

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图135 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025121851批-pH1.2介质-浆法-50转-15min-片5
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 28-21/31-1671-2 - zzp-2025121851p-rcqx-2-pH1.2jz-jf50z-p6-15min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260526-FX280.lcb

样品瓶号 : 3-48

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/05/26 19:31:38

处理时间 (V2) : 2026/05/27 09:21:04

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图136 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025121851批-pH1.2介质-浆法-50转-15min-片6
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 28-21/31-1672-2 - zzp-2025121851p-rcqx-2-pH1.2jz-jf50z-p1-20min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260526-FX280.lcb

样品瓶号 : 3-4

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/05/26 19:35:00

处理时间 (V2) : 2026/05/27 09:21:06

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图137 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025121851批-pH1.2介质-浆法-50转-20min-片1
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 28-21/31-1673-2 - zzp-2025121851p-rcqx-2-pH1.2jz-jf50z-p2-20min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260526-FX280.lcb

样品瓶号 : 3-13

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/05/26 19:38:22

处理时间 (V2) : 2026/05/27 09:21:09

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图138 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025121851批-pH1.2介质-桨法-50转-20min-片2
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 28-21/31-1674-2 - zzp-2025121851p-rcqx-2-pH1.2jz-jf50z-p3-20min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260526-FX280.lcb

样品瓶号 : 3-22

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/05/26 19:41:44

处理时间 (V2) : 2026/05/27 09:21:11

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图139 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025121851批-pH1.2介质-桨法-50转-20min-片3
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 28-21/31-1675-2 - zzp-2025121851p-rcqx-2-pH1.2jz-jf50z-p4-20min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260526-FX280.lcb

样品瓶号 : 3-31

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/05/26 19:45:05

处理时间 (V2) : 2026/05/27 09:21:14

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图140 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025121851批-pH1.2介质-浆法-50转-20min-片4
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 28-21/31-1676-2 - zzp-2025121851p-rcqx-2-pH1.2jz-jf50z-p5-20min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260526-FX280.lcb

样品瓶号 : 3-40

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/05/26 19:48:27

处理时间 (V2) : 2026/05/27 09:21:16

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图141 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025121851批-pH1.2介质-桨法-50转-20min-片5
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 28-21/31-1677-2 - zzp-2025121851p-rcqx-2-pH1.2jz-jf50z-p6-20min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260526-FX280.lcb

样品瓶号 : 3-49

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/05/26 19:51:49

处理时间 (V2) : 2026/05/27 09:21:19

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图142 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025121851批-pH1.2介质-浆法-50转-20min-片6
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 28-21/31-1678-2 - zzp-2025121851p-rcqx-2-pH1.2jz-jf50z-p1-30min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260526-FX280.lcb

样品瓶号 : 3-5

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/05/26 19:55:11

处理时间 (V2) : 2026/05/27 09:21:21

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图143 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025121851批-pH1.2介质-浆法-50转-30min-片1
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 28-21/31-1679-2 - zzp-2025121851p-rcqx-2-pH1.2jz-jf50z-p2-30min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260526-FX280.lcb

样品瓶号 : 3-14

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/05/26 19:58:33

处理时间 (V2) : 2026/05/27 09:21:24

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图144 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025121851批-pH1.2介质-浆法-50转-30min-片2
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 28-21/31-1680-2 - zzp-2025121851p-rcqx-2-pH1.2jz-jf50z-p3-30min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260526-FX280.lcb

样品瓶号 : 3-23

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/05/26 20:01:55

处理时间 (V2) : 2026/05/27 09:21:26

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图145 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025121851批-pH1.2介质-浆法-50转-30min-片3
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 28-21/31-1681-2 - zzp-2025121851p-rcqx-2-pH1.2jz-jf50z-p4-30min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260526-FX280.lcb

样品瓶号 : 3-32

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/05/26 20:05:17

处理时间 (V2) : 2026/05/27 09:21:29

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图146 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025121851批-pH1.2介质-浆法-50转-30min-片4
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 28-21/31-1682-2 - zzp-2025121851p-rcqx-2-pH1.2jz-jf50z-p5-30min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260526-FX280.lcb

样品瓶号 : 3-41

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/05/26 20:08:39

处理时间 (V2) : 2026/05/27 09:21:31

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图147 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025121851批-pH1.2介质-桨法-50转-30min-片5
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 28-21/31-1683-2 - zzp-2025121851p-rcqx-2-pH1.2jz-jf50z-p6-30min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260526-FX280.lcb

样品瓶号 : 3-50

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/05/26 20:12:01

处理时间 (V2) : 2026/05/27 09:21:34

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图148 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025121851批-pH1.2介质-浆法-50转-30min-片6
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 28-21/31-1684-2 - zzp-2025121851p-rcqx-2-pH1.2jz-jf50z-p1-45min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260526-FX280.lcb

样品瓶号 : 3-6

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/05/26 20:15:23

处理时间 (V2) : 2026/05/27 09:21:37

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图149 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025121851批-pH1.2介质-浆法-50转-45min-片1
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 28-21/31-1685-2 - zzp-2025121851p-rcqx-2-pH1.2jz-jf50z-p2-45min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260526-FX280.lcb

样品瓶号 : 3-15

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/05/26 20:18:46

处理时间 (V2) : 2026/05/27 09:21:39

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图150 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025121851批-pH1.2介质-浆法-50转-45min-片2
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 28-21/31-1686-2 - zzp-2025121851p-rcqx-2-pH1.2jz-jf50z-p3-45min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260526-FX280.lcb

样品瓶号 : 3-24

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/05/26 20:22:08

处理时间 (V2) : 2026/05/27 09:21:42

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图151 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025121851批-pH1.2介质-浆法-50转-45min-片3
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 28-21/31-1687-2 - zzp-2025121851p-rcqx-2-pH1.2jz-jf50z-p4-45min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260526-FX280.lcb

样品瓶号 : 3-33

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/05/26 20:25:30

处理时间 (V2) : 2026/05/27 09:21:44

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图152 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025121851批-pH1.2介质-浆法-50转-45min-片4
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 28-21/31-1688-2 - zzp-2025121851p-rcqx-2-pH1.2jz-jf50z-p5-45min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260526-FX280.lcb

样品瓶号 : 3-42

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/05/26 20:28:52

处理时间 (V2) : 2026/05/27 09:21:47

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图153 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025121851批-pH1.2介质-浆法-50转-45min-片5
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 28-21/31-1689-2 - zzp-2025121851p-rcqx-2-pH1.2jz-jf50z-p6-45min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260526-FX280.lcb

样品瓶号 : 3-51

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/05/26 20:32:14

处理时间 (V2) : 2026/05/27 09:21:49

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图154 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025121851批-pH1.2介质-桨法-50转-45min-片6
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 28-21/31-1690-2 - zzp-2025121851p-rcqx-2-pH1.2jz-jf50z-p1-60min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260526-FX280.lcb

样品瓶号 : 3-7

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/05/26 20:35:36

处理时间 (V2) : 2026/05/27 09:21:52

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图155 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025121851批-pH1.2介质-桨法-50转-60min-片1
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 28-21/31-1691-2 - zzp-2025121851p-rcqx-2-pH1.2jz-jf50z-p2-60min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260526-FX280.lcb

样品瓶号 : 3-16

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/05/26 20:38:58

处理时间 (V2) : 2026/05/27 09:21:54

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图156 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025121851批-pH1.2介质-桨法-50转-60min-片2
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 28-21/31-1692-2 - zzp-2025121851p-rcqx-2-pH1.2jz-jf50z-p3-60min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260526-FX280.lcb

样品瓶号 : 3-25

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/05/26 20:42:20

处理时间 (V2) : 2026/05/27 09:21:57

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图157 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025121851批-pH1.2介质-浆法-50转-60min-片3
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 28-21/31-1693-2 - zzp-2025121851p-rcqx-2-pH1.2jz-jf50z-p4-60min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260526-FX280.lcb

样品瓶号 : 3-34

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/05/26 20:45:42

处理时间 (V2) : 2026/05/27 09:21:59

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图158 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025121851批-pH1.2介质-浆法-50转-60min-片4
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 28-21/31-1694-2 - zzp-2025121851p-rcqx-2-pH1.2jz-jf50z-p5-60min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260526-FX280.lcb

样品瓶号 : 3-43

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/05/26 20:49:04

处理时间 (V2) : 2026/05/27 09:22:02

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图159 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025121851批-pH1.2介质-浆法-50转-60min-片5
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 28-21/31-1695-2 - zzp-2025121851p-rcqx-2-pH1.2jz-jf50z-p6-60min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260526-FX280.lcb

样品瓶号 : 3-52

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/05/26 20:52:26

处理时间 (V2) : 2026/05/27 09:22:04

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图160 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025121851批-pH1.2介质-浆法-50转-60min-片6
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 28-21/31-1696-2 - zzp-2025121851p-rcqx-2-pH1.2jz-jf50z-p1-jx.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260526-FX280.lcb

样品瓶号 : 3-8

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/05/26 20:55:48

处理时间 (V2) : 2026/05/27 09:22:07

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图161 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025121851批-pH1.2介质-桨法-50转-极限转速-片1
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 28-21/31-1697-2 - zzp-2025121851p-rcqx-2-pH1.2jz-jf50z-p2-jx.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260526-FX280.lcb

样品瓶号 : 3-17

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/05/26 20:59:11

处理时间 (V2) : 2026/05/27 09:22:09

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图162 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025121851批-pH1.2介质-桨法-50转-极限转速-片2
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 28-21/31-1698-2 - zzp-2025121851p-rcqx-2-pH1.2jz-jf50z-p3-jx.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260526-FX280.lcb

样品瓶号 : 3-26

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/05/26 21:02:34

处理时间 (V2) : 2026/05/27 09:22:12

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图163 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025121851批-pH1.2介质-桨法-50转-极限转速-片3
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 28-21/31-1699-2 - zzp-2025121851p-rcqx-2-pH1.2jz-jf50z-p4-jx.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260526-FX280.lcb

样品瓶号 : 3-35

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/05/26 21:05:57

处理时间 (V2) : 2026/05/27 09:22:14

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图164 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025121851批-pH1.2介质-桨法-50转-极限转速-片4
供试品溶液-1




QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温 : 30°C
数据文件名: RC\$QTL-392 - 28-21/31-1700-2 - zzp-2025121851p-rcqx-2-pH1.2jz-jf50z-p5-jx.lcd
方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260526-FX280.lcb
样品瓶号 : 3-44
进样体积 : 20μl
进样时间 : 2026/05/26 21:09:20
处理时间 (V2) : 2026/05/27 09:22:17
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者:xiexinhui
处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图165 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025121851批-pH1.2介质-桨法-50转-极限转速-片5
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 28-21/31-1701-2 - zzp-2025121851p-rcqx-2-pH1.2jz-jf50z-p6-jx.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260526-FX280.lcb

样品瓶号 : 3-53

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/05/26 21:12:42

处理时间 (V2) : 2026/05/27 09:22:20

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图166 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025121851批-pH1.2介质-桨法-50转-极限转速-片6
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 28-21/31-1702-2 - zzp-2025121851p-rcqx-2-pH1.2jz-jf50z-dz2-1.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260526-FX280.lcb

样品瓶号 : 3-27

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/05/26 21:16:05

处理时间 (V2) : 2026/05/27 09:22:22

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.070	54919	100.000	8087	2272	1.177	--
总计		54919	100.000	8087			

图167 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025121851批-pH1.2介质-桨法-50转
对照品溶液-2-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 28-21/31-1703-2 - zzp-2025121851p-rcqx-2-pH1.2jz-jf50z-dz2-2.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260526-FX280.lcb

样品瓶号 : 3-27

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/05/26 21:19:28

处理时间 (V2) : 2026/05/27 09:22:25

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.071	55185	100.000	8098	2279	1.188	--
总计		55185	100.000	8098			

图168 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025121851批-pH1.2介质-桨法-50转
对照品溶液-2-2



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 28-21/31-1704-2 - cbzj-00637Ap-rcqx-2-pH1.2jz-jf50z-rj.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260526-FX280.lcb

样品瓶号 : 4-9

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/05/26 21:22:52

处理时间 (V2) : 2026/05/27 09:22:28

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图169 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-00637A批-pH1.2介质-桨法-50转
溶剂



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30℃

数据文件名: RC\$QTL-392 - 28-21/31-1705-2 - cbzj-00637Ap-rcqx-2-pH1.2jz-jf50z-dz1-1.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260526-FX280.lcb

样品瓶号 : 4-18

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/05/26 21:26:17

处理时间 (V2) : 2026/05/27 09:22:31

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.071	54160	100.000	7995	2276	1.180	--
总计		54160	100.000	7995			

图170 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-00637A批-pH1.2介质-桨法-50转
对照品溶液-1-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30℃

数据文件名: RC\$QTL-392 - 28-21/31-1706-2 - cbzj-00637Ap-rcqx-2-pH1.2jz-jf50z-dz1-2.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260526-FX280.lcb

样品瓶号 : 4-18

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/05/26 21:29:41

处理时间 (V2) : 2026/05/27 09:22:33

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.069	54279	100.000	7984	2274	1.185	--
总计		54279	100.000	7984			

图171 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-00637A批-pH1.2介质-桨法-50转
对照品溶液-1-2



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30℃

数据文件名: RC\$QTL-392 - 28-21/31-1707-2 - cbzj-00637Ap-rcqx-2-pH1.2jz-jf50z-dz1-3.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260526-FX280.lcb

样品瓶号 : 4-18

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/05/26 21:33:04

处理时间 (V2) : 2026/05/27 09:22:36

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.069	54129	100.000	7971	2275	1.181	--
总计		54129	100.000	7971			

图172 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-00637A批-pH1.2介质-桨法-50转
对照品溶液-1-3



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 28-21/31-1708-2 - cbzj-00637Ap-rcqx-2-pH1.2jz-jf50z-dz1-4.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260526-FX280.lcb

样品瓶号 : 4-18

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/05/26 21:36:27

处理时间 (V2) : 2026/05/27 09:22:38

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.068	54080	100.000	7980	2283	1.177	--
总计		54080	100.000	7980			

图173 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-00637A批-pH1.2介质-桨法-50转
对照品溶液-1-4



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30℃

数据文件名: RC\$QTL-392 - 28-21/31-1709-2 - cbzj-00637Ap-rcqx-2-pH1.2jz-jf50z-dz1-5.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260526-FX280.lcb

样品瓶号 : 4-18

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/05/26 21:39:51

处理时间 (V2) : 2026/05/27 09:22:41

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.073	54895	100.000	8005	2268	1.196	--
总计		54895	100.000	8005			

图174 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-00637A批-pH1.2介质-桨法-50转
对照品溶液-1-5



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 28-21/31-1710-2 - cbzj-00637Ap-rcqx-2-pH1.2jz-jf50z-p1-5min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260526-FX280.lcb

样品瓶号 : 4-1

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/05/26 21:43:14

处理时间 (V2) : 2026/05/27 09:22:43

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图175 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-00637A批-pH1.2介质-桨法-50转-5min-片1
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 28-21/31-1711-2 - cbzj-00637Ap-rcqx-2-pH1.2jz-jf50z-p2-5min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260526-FX280.lcb

样品瓶号 : 4-10

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/05/26 21:46:35

处理时间 (V2) : 2026/05/27 09:22:46

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图176 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-00637A批-pH1.2介质-桨法-50转-5min-片2
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 28-21/31-1712-2 - cbzj-00637Ap-rcqx-2-pH1.2jz-jf50z-p3-5min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260526-FX280.lcb

样品瓶号 : 4-19

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/05/26 21:49:59

处理时间 (V2) : 2026/05/27 09:22:48

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图177 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-00637A批-pH1.2介质-桨法-50转-5min-片3
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 28-21/31-1713-2 - cbzj-00637Ap-rcqx-2-pH1.2jz-jf50z-p4-5min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260526-FX280.lcb

样品瓶号 : 4-28

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/05/26 21:53:22

处理时间 (V2) : 2026/05/27 09:22:51

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图178 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-00637A批-pH1.2介质-桨法-50转-5min-片4
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 28-21/31-1714-2 - cbzj-00637Ap-rcqx-2-pH1.2jz-jf50z-p5-5min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260526-FX280.lcb

样品瓶号 : 4-37

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/05/26 21:56:44

处理时间 (V2) : 2026/05/27 09:22:53

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图179 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-00637A批-pH1.2介质-桨法-50转-5min-片5
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 28-21/31-1715-2 - cbzj-00637Ap-rcqx-2-pH1.2jz-jf50z-p6-5min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260526-FX280.lcb

样品瓶号 : 4-46

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/05/26 22:00:06

处理时间 (V2) : 2026/05/27 09:22:56

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图180 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-00637A批-pH1.2介质-桨法-50转-5min-片6
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 28-21/31-1716-2 - cbzj-00637Ap-rcqx-2-pH1.2jz-jf50z-p1-10min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260526-FX280.lcb

样品瓶号 : 4-2

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/05/26 22:03:28

处理时间 (V2) : 2026/05/27 09:22:58

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图181 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-00637A批-pH1.2介质-浆法-50转-10min-片1
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 28-21/31-1717-2 - cbzj-00637Ap-rcqx-2-pH1.2jz-jf50z-p2-10min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260526-FX280.lcb

样品瓶号 : 4-11

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/05/26 22:06:51

处理时间 (V2) : 2026/05/27 09:23:01

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图182 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-00637A批-pH1.2介质-浆法-50转-10min-片2
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 28-21/31-1718-2 - cbzj-00637Ap-rcqx-2-pH1.2jz-jf50z-p3-10min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260526-FX280.lcb

样品瓶号 : 4-20

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/05/26 22:10:14

处理时间 (V2) : 2026/05/27 09:23:03

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图183 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-00637A批-pH1.2介质-浆法-50转-10min-片3
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 28-21/31-1719-2 - cbzj-00637Ap-rcqx-2-pH1.2jz-jf50z-p4-10min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260526-FX280.lcb

样品瓶号 : 4-29

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/05/26 22:13:36

处理时间 (V2) : 2026/05/27 09:23:06

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图184 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-00637A批-pH1.2介质-浆法-50转-10min-片4
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 28-21/31-1720-2 - cbzj-00637Ap-rcqx-2-pH1.2jz-jf50z-p5-10min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260526-FX280.lcb

样品瓶号 : 4-38

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/05/26 22:16:59

处理时间 (V2) : 2026/05/27 09:23:08

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图185 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-00637A批-pH1.2介质-浆法-50转-10min-片5
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 28-21/31-1721-2 - cbzj-00637Ap-rcqx-2-pH1.2jz-jf50z-p6-10min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260526-FX280.lcb

样品瓶号 : 4-47

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/05/26 22:20:22

处理时间 (V2) : 2026/05/27 09:23:11

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图186 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-00637A批-pH1.2介质-浆法-50转-10min-片6
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 28-21/31-1722-2 - cbzj-00637Ap-rcqx-2-pH1.2jz-jf50z-p1-15min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260526-FX280.lcb

样品瓶号 : 4-3

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/05/26 22:23:45

处理时间 (V2) : 2026/05/27 09:23:13

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图187 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-00637A批-pH1.2介质-浆法-50转-15min-片1
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 28-21/31-1723-2 - cbzj-00637Ap-rcqx-2-pH1.2jz-jf50z-p2-15min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260526-FX280.lcb

样品瓶号 : 4-12

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/05/26 22:27:07

处理时间 (V2) : 2026/05/27 09:23:16

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图188 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-00637A批-pH1.2介质-浆法-50转-15min-片2
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 28-21/31-1724-2 - cbzj-00637Ap-rcqx-2-pH1.2jz-jf50z-p3-15min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260526-FX280.lcb

样品瓶号 : 4-21

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/05/26 22:30:31

处理时间 (V2) : 2026/05/27 09:23:18

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图189 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-00637A批-pH1.2介质-浆法-50转-15min-片3
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 28-21/31-1725-2 - cbzj-00637Ap-rcqx-2-pH1.2jz-jf50z-p4-15min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260526-FX280.lcb

样品瓶号 : 4-30

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/05/26 22:33:54

处理时间 (V2) : 2026/05/27 09:23:21

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图190 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-00637A批-pH1.2介质-浆法-50转-15min-片4
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 28-21/31-1726-2 - cbzj-00637Ap-rcqx-2-pH1.2jz-jf50z-p5-15min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260526-FX280.lcb

样品瓶号 : 4-39

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/05/26 22:37:16

处理时间 (V2) : 2026/05/27 09:23:23

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图191 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-00637A批-pH1.2介质-浆法-50转-15min-片5
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 28-21/31-1727-2 - cbzj-00637Ap-rcqx-2-pH1.2jz-jf50z-p6-15min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260526-FX280.lcb

样品瓶号 : 4-48

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/05/26 22:40:40

处理时间 (V2) : 2026/05/27 09:23:26

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图192 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-00637A批-pH1.2介质-浆法-50转-15min-片6
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 28-21/31-1728-2 - cbzj-00637Ap-rcqx-2-pH1.2jz-jf50z-p1-20min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260526-FX280.lcb

样品瓶号 : 4-4

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/05/26 22:44:03

处理时间 (V2) : 2026/05/27 09:23:28

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图193 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-00637A批-pH1.2介质-浆法-50转-20min-片1
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 28-21/31-1729-2 - cbzj-00637Ap-rcqx-2-pH1.2jz-jf50z-p2-20min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260526-FX280.lcb

样品瓶号 : 4-13

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/05/26 22:47:26

处理时间 (V2) : 2026/05/27 09:23:31

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图194 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-00637A批-pH1.2介质-浆法-50转-20min-片2
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 28-21/31-1730-2 - cbzj-00637Ap-rcqx-2-pH1.2jz-jf50z-p3-20min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260526-FX280.lcb

样品瓶号 : 4-22

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/05/26 22:50:50

处理时间 (V2) : 2026/05/27 09:23:34

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图195 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-00637A批-pH1.2介质-浆法-50转-20min-片3
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 28-21/31-1731-2 - cbzj-00637Ap-rcqx-2-pH1.2jz-jf50z-p4-20min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260526-FX280.lcb

样品瓶号 : 4-31

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/05/26 22:54:13

处理时间 (V2) : 2026/05/27 09:23:36

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图196 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-00637A批-pH1.2介质-浆法-50转-20min-片4
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 28-21/31-1732-2 - cbzj-00637Ap-rcqx-2-pH1.2jz-jf50z-p5-20min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260526-FX280.lcb

样品瓶号 : 4-40

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/05/26 22:57:37

处理时间 (V2) : 2026/05/27 09:23:39

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图197 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-00637A批-pH1.2介质-浆法-50转-20min-片5
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 28-21/31-1733-2 - cbzj-00637Ap-rcqx-2-pH1.2jz-jf50z-p6-20min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260526-FX280.lcb

样品瓶号 : 4-49

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/05/26 23:01:00

处理时间 (V2) : 2026/05/27 09:23:41

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图198 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-00637A批-pH1.2介质-浆法-50转-20min-片6
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 28-21/31-1734-2 - cbzj-00637Ap-rcqx-2-pH1.2jz-jf50z-p1-30min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260526-FX280.lcb

样品瓶号 : 4-5

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/05/26 23:04:24

处理时间 (V2) : 2026/05/27 09:23:44

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图199 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-00637A批-pH1.2介质-浆法-50转-30min-片1
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 28-21/31-1735-2 - cbzj-00637Ap-rcqx-2-pH1.2jz-jf50z-p2-30min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260526-FX280.lcb

样品瓶号 : 4-14

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/05/26 23:07:48

处理时间 (V2) : 2026/05/27 09:23:46

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图200 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-00637A批-pH1.2介质-浆法-50转-30min-片2
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 28-21/31-1736-2 - cbzj-00637Ap-rcqx-2-pH1.2jz-jf50z-p3-30min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260526-FX280.lcb

样品瓶号 : 4-23

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/05/26 23:11:11

处理时间 (V2) : 2026/05/27 09:23:48

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图201 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-00637A批-pH1.2介质-浆法-50转-30min-片3
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30℃

数据文件名: RC\$QTL-392 - 28-21/31-1737-2 - cbzj-00637Ap-rcqx-2-pH1.2jz-jf50z-p4-30min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260526-FX280.lcb

样品瓶号 : 4-32

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/05/26 23:14:35

处理时间 (V2) : 2026/05/27 09:23:51

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图202 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-00637A批-pH1.2介质-浆法-50转-30min-片4
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 28-21/31-1738-2 - cbzj-00637Ap-rcqx-2-pH1.2jz-jf50z-p5-30min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260526-FX280.lcb

样品瓶号 : 4-41

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/05/26 23:17:59

处理时间 (V2) : 2026/05/27 09:23:53

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图203 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-00637A批-pH1.2介质-浆法-50转-30min-片5
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 28-21/31-1739-2 - cbzj-00637Ap-rcqx-2-pH1.2jz-jf50z-p6-30min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260526-FX280.lcb

样品瓶号 : 4-50

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/05/26 23:21:22

处理时间 (V2) : 2026/05/27 09:23:56

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图204 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-00637A批-pH1.2介质-浆法-50转-30min-片6
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 28-21/31-1740-2 - cbzj-00637Ap-rcqx-2-pH1.2jz-jf50z-p1-45min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260526-FX280.lcb

样品瓶号 : 4-6

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/05/26 23:24:45

处理时间 (V2) : 2026/05/27 09:23:58

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图205 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-00637A批-pH1.2介质-浆法-50转-45min-片1
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 28-21/31-1741-2 - cbzj-00637Ap-rcqx-2-pH1.2jz-jf50z-p2-45min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260526-FX280.lcb

样品瓶号 : 4-15

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/05/26 23:28:09

处理时间 (V2) : 2026/05/27 09:24:01

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图206 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-00637A批-pH1.2介质-浆法-50转-45min-片2
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 28-21/31-1742-2 - cbzj-00637Ap-rcqx-2-pH1.2jz-jf50z-p3-45min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260526-FX280.lcb

样品瓶号 : 4-24

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/05/26 23:31:32

处理时间 (V2) : 2026/05/27 09:24:03

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图207 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-00637A批-pH1.2介质-浆法-50转-45min-片3
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 28-21/31-1743-2 - cbzj-00637Ap-rcqx-2-pH1.2jz-jf50z-p4-45min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260526-FX280.lcb

样品瓶号 : 4-33

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/05/26 23:34:55

处理时间 (V2) : 2026/05/27 09:24:06

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图208 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-00637A批-pH1.2介质-浆法-50转-45min-片4
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 28-21/31-1744-2 - cbzj-00637Ap-rcqx-2-pH1.2jz-jf50z-p5-45min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260526-FX280.lcb

样品瓶号 : 4-42

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/05/26 23:38:19

处理时间 (V2) : 2026/05/27 09:24:09

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图209 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-00637A批-pH1.2介质-浆法-50转-45min-片5
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 28-21/31-1745-2 - cbzj-00637Ap-rcqx-2-pH1.2jz-jf50z-p6-45min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260526-FX280.lcb

样品瓶号 : 4-51

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/05/26 23:41:42

处理时间 (V2) : 2026/05/27 09:24:11

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图210 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-00637A批-pH1.2介质-浆法-50转-45min-片6
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 28-21/31-1746-2 - cbzj-00637Ap-rcqx-2-pH1.2jz-jf50z-p1-60min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260526-FX280.lcb

样品瓶号 : 4-7

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/05/26 23:45:05

处理时间 (V2) : 2026/05/27 09:24:14

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图211 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-00637A批-pH1.2介质-浆法-50转-60min-片1
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 28-21/31-1747-2 - cbzj-00637Ap-rcqx-2-pH1.2jz-jf50z-p2-60min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260526-FX280.lcb

样品瓶号 : 4-16

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/05/26 23:48:28

处理时间 (V2) : 2026/05/27 09:24:17

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图212 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-00637A批-pH1.2介质-浆法-50转-60min-片2
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 28-21/31-1748-2 - cbzj-00637Ap-rcqx-2-pH1.2jz-jf50z-p3-60min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260526-FX280.lcb

样品瓶号 : 4-25

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/05/26 23:51:51

处理时间 (V2) : 2026/05/27 09:24:20

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图213 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-00637A批-pH1.2介质-浆法-50转-60min-片3
供试品溶液-1



QTL-392

＜样品信息＞

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30℃

数据文件名: RC\$QTL-392 - 28-21/31-1749-2 - cbzj-00637Ap-rcqx-2-pH1.2jz-jf50z-p4-60min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260526-FX280.lcb

样品瓶号 : 4-34

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/05/26 23:55:15

处理时间 (V2) : 2026/05/27 09:24:22

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图214 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-00637A批-pH1.2介质-浆法-50转-60min-片4
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 28-21/31-1750-2 - cbzj-00637Ap-rcqx-2-pH1.2jz-jf50z-p5-60min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260526-FX280.lcb

样品瓶号 : 4-43

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/05/26 23:58:39

处理时间 (V2) : 2026/05/27 09:24:25

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图215 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-00637A批-pH1.2介质-浆法-50转-60min-片5
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 28-21/31-1751-2 - cbzj-00637Ap-rcqx-2-pH1.2jz-jf50z-p6-60min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260526-FX280.lcb

样品瓶号 : 4-52

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/05/27 00:02:03

处理时间 (V2) : 2026/05/27 09:24:28

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图216 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-00637A批-pH1.2介质-浆法-50转-60min-片6
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 28-21/31-1752-2 - cbzj-00637Ap-rcqx-2-pH1.2jz-jf50z-p1-jx.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260526-FX280.lcb

样品瓶号 : 4-8

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/05/27 00:05:28

处理时间 (V2) : 2026/05/27 09:24:30

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图217 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-00637A批-pH1.2介质-桨法-50转-极限转速-片1
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 28-21/31-1753-2 - cbzj-00637Ap-rcqx-2-pH1.2jz-jf50z-p2-jx.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260526-FX280.lcb

样品瓶号 : 4-17

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/05/27 00:08:52

处理时间 (V2) : 2026/05/27 09:24:33

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图218 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-00637A批-pH1.2介质-桨法-50转-极限转速-片2
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 28-21/31-1754-2 - cbzj-00637Ap-rcqx-2-pH1.2jz-jf50z-p3-jx.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260526-FX280.lcb

样品瓶号 : 4-26

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/05/27 00:12:16

处理时间 (V2) : 2026/05/27 09:24:35

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图219 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-00637A批-pH1.2介质-桨法-50转-极限转速-片3
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 28-21/31-1755-2 - cbzj-00637Ap-rcqx-2-pH1.2jz-jf50z-p4-jx.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260526-FX280.lcb

样品瓶号 : 4-35

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/05/27 00:15:39

处理时间 (V2) : 2026/05/27 09:24:38

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图220 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-00637A批-pH1.2介质-桨法-50转-极限转速-片4
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 28-21/31-1756-2 - cbzj-00637Ap-rcqx-2-pH1.2jz-jf50z-p5-jx.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260526-FX280.lcb

样品瓶号 : 4-44

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/05/27 00:19:04

处理时间 (V2) : 2026/05/27 09:24:40

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图221 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-00637A批-pH1.2介质-桨法-50转-极限转速-片5
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 28-21/31-1757-2 - cbzj-00637Ap-rcqx-2-pH1.2jz-jf50z-p6-jx.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260526-FX280.lcb

样品瓶号 : 4-53

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/05/27 00:22:28

处理时间 (V2) : 2026/05/27 09:24:43

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图222 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-00637A批-pH1.2介质-桨法-50转-极限转速-片6
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30℃

数据文件名: RC\$QTL-392 - 28-21/31-1758-2 - cbzj-00637Ap-rcqx-2-pH1.2jz-jf50z-dz2-1.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260526-FX280.lcb

样品瓶号 : 4-27

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/05/27 00:25:52

处理时间 (V2) : 2026/05/27 09:24:45

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.067	54270	100.000	7991	2275	1.174	--
总计		54270	100.000	7991			

图223 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-00637A批-pH1.2介质-桨法-50转
对照品溶液-2-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30℃

数据文件名: RC\$QTL-392 - 28-21/31-1759-2 - cbzj-00637Ap-rcqx-2-pH1.2jz-jf50z-dz2-2.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260526-FX280.lcb

样品瓶号 : 4-27

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/05/27 00:29:16

处理时间 (V2) : 2026/05/27 09:24:48

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.068	54007	100.000	7931	2287	1.193	--
总计		54007	100.000	7931			

图224 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-00637A批-pH1.2介质-桨法-50转
对照品溶液-2-2



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 28-21/31-1760-2 - cbzj-00287Ap-rcqx-2-pH1.2jz-jf50z-rj.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260526-FX280.lcb

样品瓶号 : 1-9

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/05/27 00:32:40

处理时间 (V2) : 2026/05/27 09:24:50

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图225 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-00287A批-pH1.2介质-桨法-50转
溶剂



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 28-22/31-1761-2 - cbzj-00287Ap-rcqx-2-pH1.2jz-jf50z-dz1-1.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260526-FX280.lcb

样品瓶号 : 1-18

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/05/27 00:36:04

处理时间 (V2) : 2026/05/27 09:47:52

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.070	54433	100.000	8123	2298	1.162	--
总计		54433	100.000	8123			

图226 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-00287A批-pH1.2介质-桨法-50转
对照品溶液-1-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 28-22/31-1762-2 - cbzj-00287Ap-rcqx-2-pH1.2jz-jf50z-dz1-2.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260526-FX280.lcb

样品瓶号 : 1-18

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/05/27 00:39:29

处理时间 (V2) : 2026/05/27 09:47:55

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.070	53871	100.000	8060	2299	1.162	--
总计		53871	100.000	8060			

图227 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-00287A批-pH1.2介质-桨法-50转
对照品溶液-1-2



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30℃

数据文件名: RC\$QTL-392 - 28-22/31-1763-2 - cbzj-00287Ap-rcqx-2-pH1.2jz-jf50z-dz1-3.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260526-FX280.lcb

样品瓶号 : 1-18

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/05/27 00:42:53

处理时间 (V2) : 2026/05/27 09:47:58

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.068	53879	100.000	8022	2302	1.169	--
总计		53879	100.000	8022			

图228 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-00287A批-pH1.2介质-桨法-50转
对照品溶液-1-3



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 28-22/31-1764-2 - cbzj-00287Ap-rcqx-2-pH1.2jz-jf50z-dz1-4.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260526-FX280.lcb

样品瓶号 : 1-18

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/05/27 00:46:17

处理时间 (V2) : 2026/05/27 09:48:00

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.068	53901	100.000	8022	2296	1.167	--
总计		53901	100.000	8022			

图229 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-00287A批-pH1.2介质-桨法-50转
对照品溶液-1-4



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30℃

数据文件名: RC\$QTL-392 - 28-22/31-1765-2 - cbzj-00287Ap-rcqx-2-pH1.2jz-jf50z-dz1-5.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260526-FX280.lcb

样品瓶号 : 1-18

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/05/27 00:49:40

处理时间 (V2) : 2026/05/27 09:48:03

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.068	53766	100.000	8021	2303	1.168	--
总计		53766	100.000	8021			

图230 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-00287A批-pH1.2介质-桨法-50转
对照品溶液-1-5



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 28-23/31-1766-2 - cbzj-00287Ap-rcqx-2-pH1.2jz-jf50z-p1-5min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260526-FX280.lcb

样品瓶号 : 1-1

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/05/27 00:53:04

处理时间 (V2) : 2026/05/27 09:49:26

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图231 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-00287A批-pH1.2介质-桨法-50转-5min-片1
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 28-23/31-1767-2 - cbzj-00287Ap-rcqx-2-pH1.2jz-jf50z-p2-5min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260526-FX280.lcb

样品瓶号 : 1-10

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/05/27 00:56:27

处理时间 (V2) : 2026/05/27 09:49:29

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图232 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-00287A批-pH1.2介质-桨法-50转-5min-片2
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 28-23/31-1768-2 - cbzj-00287Ap-rcqx-2-pH1.2jz-jf50z-p3-5min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260526-FX280.lcb

样品瓶号 : 1-19

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/05/27 00:59:49

处理时间 (V2) : 2026/05/27 09:49:32

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图233 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-00287A批-pH1.2介质-桨法-50转-5min-片3
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 28-23/31-1769-2 - cbzj-00287Ap-rcqx-2-pH1.2jz-jf50z-p4-5min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260526-FX280.lcb

样品瓶号 : 1-28

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/05/27 01:03:12

处理时间 (V2) : 2026/05/27 09:49:34

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图234 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-00287A批-pH1.2介质-桨法-50转-5min-片4
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 28-23/31-1770-2 - cbzj-00287Ap-rcqx-2-pH1.2jz-jf50z-p5-5min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260526-FX280.lcb

样品瓶号 : 1-37

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/05/27 01:06:35

处理时间 (V2) : 2026/05/27 09:49:37

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图235 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-00287A批-pH1.2介质-桨法-50转-5min-片5
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 28-23/31-1771-2 - cbzj-00287Ap-rcqx-2-pH1.2jz-jf50z-p6-5min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260526-FX280.lcb

样品瓶号 : 1-46

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/05/27 01:09:58

处理时间 (V2) : 2026/05/27 09:49:40

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图236 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-00287A批-pH1.2介质-桨法-50转-5min-片6
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 28-23/31-1772-2 - cbzj-00287Ap-rcqx-2-pH1.2jz-jf50z-p1-10min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260526-FX280.lcb

样品瓶号 : 1-2

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/05/27 01:13:21

处理时间 (V2) : 2026/05/27 09:49:42

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图237 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-00287A批-pH1.2介质-浆法-50转-10min-片1
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 28-23/31-1773-2 - cbzj-00287Ap-rcqx-2-pH1.2jz-jf50z-p2-10min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260526-FX280.lcb

样品瓶号 : 1-11

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/05/27 01:16:45

处理时间 (V2) : 2026/05/27 09:49:45

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图238 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-00287A批-pH1.2介质-浆法-50转-10min-片2
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 28-23/31-1774-2 - cbzj-00287Ap-rcqx-2-pH1.2jz-jf50z-p3-10min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260526-FX280.lcb

样品瓶号 : 1-20

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/05/27 01:20:07

处理时间 (V2) : 2026/05/27 09:49:47

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图239 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-00287A批-pH1.2介质-浆法-50转-10min-片3
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30℃

数据文件名: RC\$QTL-392 - 28-23/31-1775-2 - cbzj-00287Ap-rcqx-2-pH1.2jz-jf50z-p4-10min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260526-FX280.lcb

样品瓶号 : 1-29

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/05/27 01:23:30

处理时间 (V2) : 2026/05/27 09:49:50

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图240 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-00287A批-pH1.2介质-浆法-50转-10min-片4
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 28-23/31-1776-2 - cbzj-00287Ap-rcqx-2-pH1.2jz-jf50z-p5-10min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260526-FX280.lcb

样品瓶号 : 1-38

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/05/27 01:26:53

处理时间 (V2) : 2026/05/27 09:49:52

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图241 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-00287A批-pH1.2介质-浆法-50转-10min-片5
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 28-23/31-1777-2 - cbzj-00287Ap-rcqx-2-pH1.2jz-jf50z-p6-10min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260526-FX280.lcb

样品瓶号 : 1-47

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/05/27 01:30:16

处理时间 (V2) : 2026/05/27 09:49:55

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图242 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-00287A批-pH1.2介质-浆法-50转-10min-片6
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 28-23/31-1778-2 - cbzj-00287Ap-rcqx-2-pH1.2jz-jf50z-p1-15min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260526-FX280.lcb

样品瓶号 : 1-3

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/05/27 01:33:38

处理时间 (V2) : 2026/05/27 09:49:57

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图243 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-00287A批-pH1.2介质-浆法-50转-15min-片1
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 28-23/31-1779-2 - cbzj-00287Ap-rcqx-2-pH1.2jz-jf50z-p2-15min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260526-FX280.lcb

样品瓶号 : 1-12

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/05/27 01:37:00

处理时间 (V2) : 2026/05/27 09:50:00

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图244 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-00287A批-pH1.2介质-浆法-50转-15min-片2
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30℃

数据文件名: RC\$QTL-392 - 28-23/31-1780-2 - cbzj-00287Ap-rcqx-2-pH1.2jz-jf50z-p3-15min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260526-FX280.lcb

样品瓶号 : 1-21

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/05/27 01:40:23

处理时间 (V2) : 2026/05/27 09:50:03

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图245 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-00287A批-pH1.2介质-浆法-50转-15min-片3
供试品溶液-1




QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温 : 30°C
数据文件名: RC\$QTL-392 - 28-23/31-1781-2 - cbzj-00287Ap-rcqx-2-pH1.2jz-jf50z-p4-15min.lcd
方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260526-FX280.lcb
样品瓶号 : 1-30
进样体积 : 20μl
进样时间 : 2026/05/27 01:43:46
处理时间 (V2) : 2026/05/27 09:50:05
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者:xiexinhui
处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图246 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-00287A批-pH1.2介质-浆法-50转-15min-片4
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 28-23/31-1782-2 - cbzj-00287Ap-rcqx-2-pH1.2jz-jf50z-p5-15min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260526-FX280.lcb

样品瓶号 : 1-39

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/05/27 01:47:09

处理时间 (V2) : 2026/05/27 09:50:08

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图247 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-00287A批-pH1.2介质-浆法-50转-15min-片5
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 28-23/31-1783-2 - cbzj-00287Ap-rcqx-2-pH1.2jz-jf50z-p6-15min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260526-FX280.lcb

样品瓶号 : 1-48

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/05/27 01:50:33

处理时间 (V2) : 2026/05/27 09:50:11

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图248 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-00287A批-pH1.2介质-浆法-50转-15min-片6
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 28-23/31-1784-2 - cbzj-00287Ap-rcqx-2-pH1.2jz-jf50z-p1-20min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260526-FX280.lcb

样品瓶号 : 1-4

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/05/27 01:53:55

处理时间 (V2) : 2026/05/27 09:50:13

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图249 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-00287A批-pH1.2介质-浆法-50转-20min-片1
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 28-23/31-1785-2 - cbzj-00287Ap-rcqx-2-pH1.2jz-jf50z-p2-20min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260526-FX280.lcb

样品瓶号 : 1-13

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/05/27 01:57:19

处理时间 (V2) : 2026/05/27 09:50:16

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图250 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-00287A批-pH1.2介质-浆法-50转-20min-片2
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 28-23/31-1786-2 - cbzj-00287Ap-rcqx-2-pH1.2jz-jf50z-p3-20min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260526-FX280.lcb

样品瓶号 : 1-22

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/05/27 02:00:41

处理时间 (V2) : 2026/05/27 09:50:18

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图251 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-00287A批-pH1.2介质-浆法-50转-20min-片3
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 28-23/31-1787-2 - cbzj-00287Ap-rcqx-2-pH1.2jz-jf50z-p4-20min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260526-FX280.lcb

样品瓶号 : 1-31

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/05/27 02:04:04

处理时间 (V2) : 2026/05/27 09:50:21

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图252 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-00287A批-pH1.2介质-浆法-50转-20min-片4
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 28-23/31-1788-2 - cbzj-00287Ap-rcqx-2-pH1.2jz-jf50z-p5-20min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260526-FX280.lcb

样品瓶号 : 1-40

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/05/27 02:07:27

处理时间 (V2) : 2026/05/27 09:50:23

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图253 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-00287A批-pH1.2介质-浆法-50转-20min-片5
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 28-23/31-1789-2 - cbzj-00287Ap-rcqx-2-pH1.2jz-jf50z-p6-20min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260526-FX280.lcb

样品瓶号 : 1-49

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/05/27 02:10:50

处理时间 (V2) : 2026/05/27 09:50:26

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图254 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-00287A批-pH1.2介质-浆法-50转-20min-片6
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 28-23/31-1790-2 - cbzj-00287Ap-rcqx-2-pH1.2jz-jf50z-p1-30min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260526-FX280.lcb

样品瓶号 : 1-5

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/05/27 02:14:13

处理时间 (V2) : 2026/05/27 09:50:29

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图255 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-00287A批-pH1.2介质-浆法-50转-30min-片1
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 28-23/31-1791-2 - cbzj-00287Ap-rcqx-2-pH1.2jz-jf50z-p2-30min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260526-FX280.lcb

样品瓶号 : 1-14

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/05/27 02:17:36

处理时间 (V2) : 2026/05/27 09:50:31

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图256 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-00287A批-pH1.2介质-浆法-50转-30min-片2
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 28-23/31-1792-2 - cbzj-00287Ap-rcqx-2-pH1.2jz-jf50z-p3-30min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260526-FX280.lcb

样品瓶号 : 1-23

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/05/27 02:20:59

处理时间 (V2) : 2026/05/27 09:50:34

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图257 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-00287A批-pH1.2介质-浆法-50转-30min-片3
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 28-23/31-1793-2 - cbzj-00287Ap-rcqx-2-pH1.2jz-jf50z-p4-30min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260526-FX280.lcb

样品瓶号 : 1-32

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/05/27 02:24:22

处理时间 (V2) : 2026/05/27 09:50:36

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图258 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-00287A批-pH1.2介质-浆法-50转-30min-片4
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 28-23/31-1794-2 - cbzj-00287Ap-rcqx-2-pH1.2jz-jf50z-p5-30min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260526-FX280.lcb

样品瓶号 : 1-41

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/05/27 02:27:44

处理时间 (V2) : 2026/05/27 09:50:39

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图259 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-00287A批-pH1.2介质-浆法-50转-30min-片5
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 28-23/31-1795-2 - cbzj-00287Ap-rcqx-2-pH1.2jz-jf50z-p6-30min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260526-FX280.lcb

样品瓶号 : 1-50

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/05/27 02:31:07

处理时间 (V2) : 2026/05/27 09:50:41

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图260 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-00287A批-pH1.2介质-浆法-50转-30min-片6
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 28-23/31-1796-2 - cbzj-00287Ap-rcqx-2-pH1.2jz-jf50z-p1-45min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260526-FX280.lcb

样品瓶号 : 1-6

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/05/27 02:34:31

处理时间 (V2) : 2026/05/27 09:50:45

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图261 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-00287A批-pH1.2介质-浆法-50转-45min-片1
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 28-23/31-1797-2 - cbzj-00287Ap-rcqx-2-pH1.2jz-jf50z-p2-45min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260526-FX280.lcb

样品瓶号 : 1-15

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/05/27 02:37:54

处理时间 (V2) : 2026/05/27 09:50:47

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图262 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-00287A批-pH1.2介质-浆法-50转-45min-片2
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30℃

数据文件名: RC\$QTL-392 - 28-23/31-1798-2 - cbzj-00287Ap-rcqx-2-pH1.2jz-jf50z-p3-45min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260526-FX280.lcb

样品瓶号 : 1-24

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/05/27 02:41:17

处理时间 (V2) : 2026/05/27 09:50:50

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图263 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-00287A批-pH1.2介质-浆法-50转-45min-片3
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30℃

数据文件名: RC\$QTL-392 - 28-23/31-1799-2 - cbzj-00287Ap-rcqx-2-pH1.2jz-jf50z-p4-45min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260526-FX280.lcb

样品瓶号 : 1-33

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/05/27 02:44:39

处理时间 (V2) : 2026/05/27 09:50:52

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图264 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-00287A批-pH1.2介质-浆法-50转-45min-片4
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 28-23/31-1800-2 - cbzj-00287Ap-rcqx-2-pH1.2jz-jf50z-p5-45min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260526-FX280.lcb

样品瓶号 : 1-42

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/05/27 02:48:01

处理时间 (V2) : 2026/05/27 09:50:55

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图265 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-00287A批-pH1.2介质-浆法-50转-45min-片5
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 28-23/31-1801-2 - cbzj-00287Ap-rcqx-2-pH1.2jz-jf50z-p6-45min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260526-FX280.lcb

样品瓶号 : 1-51

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/05/27 02:51:24

处理时间 (V2) : 2026/05/27 09:50:58

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图266 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-00287A批-pH1.2介质-浆法-50转-45min-片6
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 28-23/31-1802-2 - cbzj-00287Ap-rcqx-2-pH1.2jz-jf50z-p1-60min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260526-FX280.lcb

样品瓶号 : 1-7

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/05/27 02:54:47

处理时间 (V2) : 2026/05/27 09:51:01

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图267 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-00287A批-pH1.2介质-浆法-50转-60min-片1
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 28-23/31-1803-2 - cbzj-00287Ap-rcqx-2-pH1.2jz-jf50z-p2-60min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260526-FX280.lcb

样品瓶号 : 1-16

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/05/27 02:58:11

处理时间 (V2) : 2026/05/27 09:51:03

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图268 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-00287A批-pH1.2介质-浆法-50转-60min-片2
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 28-23/31-1804-2 - cbzj-00287Ap-rcqx-2-pH1.2jz-jf50z-p3-60min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260526-FX280.lcb

样品瓶号 : 1-25

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/05/27 03:01:34

处理时间 (V2) : 2026/05/27 09:51:06

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图269 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-00287A批-pH1.2介质-浆法-50转-60min-片3
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 28-23/31-1805-2 - cbzj-00287Ap-rcqx-2-pH1.2jz-jf50z-p4-60min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260526-FX280.lcb

样品瓶号 : 1-34

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/05/27 03:04:56

处理时间 (V2) : 2026/05/27 09:51:08

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图270 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-00287A批-pH1.2介质-浆法-50转-60min-片4
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 28-23/31-1806-2 - cbzj-00287Ap-rcqx-2-pH1.2jz-jf50z-p5-60min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260526-FX280.lcb

样品瓶号 : 1-43

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/05/27 03:08:19

处理时间 (V2) : 2026/05/27 09:51:11

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图271 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-00287A批-pH1.2介质-浆法-50转-60min-片5
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 28-23/31-1807-2 - cbzj-00287Ap-rcqx-2-pH1.2jz-jf50z-p6-60min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260526-FX280.lcb

样品瓶号 : 1-52

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/05/27 03:11:42

处理时间 (V2) : 2026/05/27 09:51:14

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图272 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-00287A批-pH1.2介质-浆法-50转-60min-片6
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 28-23/31-1808-2 - cbzj-00287Ap-rcqx-2-pH1.2jz-jf50z-p1-jx.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260526-FX280.lcb

样品瓶号 : 1-8

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/05/27 03:15:06

处理时间 (V2) : 2026/05/27 09:51:16

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图273 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-00287A批-pH1.2介质-桨法-50转-极限转速-片1
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 28-23/31-1809-2 - cbzj-00287Ap-rcqx-2-pH1.2jz-jf50z-p2-jx.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260526-FX280.lcb

样品瓶号 : 1-17

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/05/27 03:18:30

处理时间 (V2) : 2026/05/27 09:51:19

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图274 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-00287A批-pH1.2介质-桨法-50转-极限转速-片2
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 28-23/31-1810-2 - cbzj-00287Ap-rcqx-2-pH1.2jz-jf50z-p3-jx.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260526-FX280.lcb

样品瓶号 : 1-26

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/05/27 03:21:54

处理时间 (V2) : 2026/05/27 09:51:21

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图275 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-00287A批-pH1.2介质-桨法-50转-极限转速-片3
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 28-23/31-1811-2 - cbzj-00287Ap-rcqx-2-pH1.2jz-jf50z-p4-jx.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260526-FX280.lcb

样品瓶号 : 1-35

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/05/27 03:25:17

处理时间 (V2) : 2026/05/27 09:51:24

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图276 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-00287A批-pH1.2介质-桨法-50转-极限转速-片4
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 28-23/31-1812-2 - cbzj-00287Ap-rcqx-2-pH1.2jz-jf50z-p5-jx.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260526-FX280.lcb

样品瓶号 : 1-44

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/05/27 03:28:40

处理时间 (V2) : 2026/05/27 09:51:26

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图277 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-00287A批-pH1.2介质-桨法-50转-极限转速-片5
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 28-23/31-1813-2 - cbzj-00287Ap-rcqx-2-pH1.2jz-jf50z-p6-jx.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260526-FX280.lcb

样品瓶号 : 1-53

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/05/27 03:32:03

处理时间 (V2) : 2026/05/27 09:51:29

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图278 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-00287A批-pH1.2介质-桨法-50转-极限转速-片6
供试品溶液-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30℃

数据文件名: RC\$QTL-392 - 28-23/31-1814-2 - cbzj-00287Ap-rcqx-2-pH1.2jz-jf50z-dz2-1.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260526-FX280.lcb

样品瓶号 : 1-27

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/05/27 03:35:27

处理时间 (V2) : 2026/05/27 09:51:32

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.069	53830	100.000	7912	2282	1.188	--
总计		53830	100.000	7912			

图279 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-00287A批-pH1.2介质-桨法-50转
对照品溶液-2-1



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 28-23/31-1815-2 - cbzj-00287Ap-rcqx-2-pH1.2jz-jf50z-dz2-2.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rc-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20260526-FX280.lcb

样品瓶号 : 1-27

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2026/05/27 03:38:50

处理时间 (V2) : 2026/05/27 09:51:34

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.069	53855	100.000	7930	2277	1.183	--
总计		53855	100.000	7930			

图280 熊去氧胆酸口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-00287A批-pH1.2介质-桨法-50转
对照品溶液-2-2