



非布司他多替诺雷片项目信息

介质体积(ml)	900	取样体积(ml)	1.5	补液体积(ml)	1.5
对照品批号	241101	对照品来源	ZZ	对照品使用方法	直接使用
对照品含量(%)	99.69	对照品水分(%)	0	对照品稀释倍数	5000
标示量(mg)	2	供试品稀释倍数	1	系数	1

对照品溶液

序号	称样量(mg)	A ₁	A ₂	A ₃	A ₄	A ₅	A _{平均}	RSD%
1	10.99	70726	70711	70420	70718	70405	70596	0.24
2	10.99	71406	71704				71555	0.30

单位质量响应值		RSD%	判断
6423.66	6510.92	0.96	数据可信



操作者:

日期: 2026-09-11

复核者:

未审阅版本



供试品溶液-6042201批-多替诺雷-pH1.2

时间 (分钟)	样品	A ₁	A ₂	A _{平均}	溶出量(%)	平均(%)	RSD%	累计溶 出量(%)	平均(%)	RSD%
5min	1	10042	-	10042	13.932	13.06	6.23	13.93	13.06	6.23
	2	8356	-	8356	11.593			11.59		
	3	9263	-	9263	12.851			12.85		
	4	9389	-	9389	13.026			13.03		
	5	9730	-	9730	13.499			13.50		
	6	9695	-	9695	13.451			13.45		
10min	1	17451	-	17451	24.211	23.56	3.10	24.23	23.58	3.10
	2	16125	-	16125	22.371			22.39		
	3	16547	-	16547	22.957			22.98		
	4	17183	-	17183	23.839			23.86		
	5	17381	-	17381	24.114			24.14		
	6	17184	-	17184	23.841			23.86		
15min	1	21812	-	21812	30.261	29.64	1.97	30.32	29.70	1.96
	2	20661	-	20661	28.664			28.72		
	3	21190	-	21190	29.398			29.46		
	4	21741	-	21741	30.163			30.22		
	5	21455	-	21455	29.766			29.83		
	6	21332	-	21332	29.595			29.66		
20min	1	24674	-	24674	34.232	33.89	1.66	34.35	34.00	1.66
	2	24007	-	24007	33.307			33.41		
	3	24524	-	24524	34.024			34.13		
	4	24937	-	24937	34.597			34.71		
	5	24556	-	24556	34.068			34.18		
	6	23885	-	23885	33.137			33.25		
30min	1	28500	-	28500	39.540	39.45	1.41	39.71	39.62	1.41
	2	27685	-	27685	38.409			38.57		
	3	28638	-	28638	39.731			39.90		
	4	28680	-	28680	39.790			39.96		
	5	28775	-	28775	39.922			40.09		
	6	28321	-	28321	39.292			39.46		
45min	1	32714	-	32714	45.386	45.24	0.75	45.62	45.47	0.75
	2	32398	-	32398	44.948			45.17		
	3	32751	-	32751	45.438			45.67		
	4	32646	-	32646	45.292			45.53		
	5	32247	-	32247	44.738			44.97		
	6	32906	-	32906	45.653			45.88		
60min	1	35488	-	35488	49.235	49.00	0.75	49.55	49.31	0.76
	2	34866	-	34866	48.372			48.67		
	3	35576	-	35576	49.357			49.66		
	4	35383	-	35383	49.089			49.40		
	5	35155	-	35155	48.773			49.08		
	6	35454	-	35454	49.188			49.50		
90min	1	39093	-	39093	54.236	53.85	0.59	54.63	54.24	0.59
	2	38610	-	38610	53.566			53.95		
	3	38644	-	38644	53.613			54.00		
	4	38741	-	38741	53.748			54.14		
	5	39101	-	39101	54.247			54.64		
	6	38681	-	38681	53.665			54.06		
120min	1	41375	-	41375	57.402	57.13	0.58	57.89	57.62	0.58
	2	40732	-	40732	56.510			56.98		
	3	41365	-	41365	57.388			57.87		
	4	41207	-	41207	57.169			57.65		
	5	41169	-	41169	57.117			57.60		
	6	41242	-	41242	57.218			57.70		



操作者:

日期: 2026-09-11

复核者:

未审阅版本



时间 (分钟)	样品	A ₁	A ₂	A _{平均}	溶出量(%)	平均(%)	RSD%	累计溶 出量(%)	平均(%)	RSD%
极限	1	41914	-	41914	58.150	58.15	0.48	58.73	58.72	0.48
	2	41762	-	41762	57.939			58.50		
	3	42288	-	42288	58.669			59.24		
	4	41834	-	41834	58.039			58.62		
	5	41740	-	41740	57.909			58.49		
	6	41943	-	41943	58.190			58.77		



操作者:

日期: 2026-09-11

复核者:

未审阅版本



非布司他多替诺雷片项目信息

介质体积(ml)	900	取样体积(ml)	1.5	补液体积(ml)	1.5
对照品批号	101278-202405	对照品来源	中检所	对照品使用方法	直接使用
对照品含量(%)	99.9	对照品水分(%)	0	对照品稀释倍数	250
标示量(mg)	40	供试品稀释倍数	1	系数	1

对照品溶液

序号	称样量(mg)	A ₁	A ₂	A ₃	A ₄	A ₅	A _{平均}	RSD%
1	10.21	480745	480784	480596	480976	479170	480454	0.16
2	10.35	496993	496816				496904	0.03

单位质量响应值		RSD%	判断
47057.20	48010.05	1.42	数据可信



操作者:

日期: 2026-09-11

复核者:

未审阅版本



供试品溶液-6042201批-非布司他-pH1.2

时间 (分钟)	样品	A ₁	A ₂	A _{平均}	溶出量(%)	平均(%)	RSD%	累计溶 出量(%)	平均(%)	RSD%
5min	1	4366	-	4366	0.826	0.81	8.71	0.83	0.82	8.62
	2	3627	-	3627	0.686			0.69		
	3	4174	-	4174	0.790			0.79		
	4	4433	-	4433	0.839			0.84		
	5	4693	-	4693	0.888			0.89		
	6	4536	-	4536	0.858			0.86		
10min	1	4901	-	4901	0.927	1.01	10.31	0.93	1.01	10.06
	2	5075	-	5075	0.960			0.96		
	3	5054	-	5054	0.956			0.96		
	4	4993	-	4993	0.945			0.95		
	5	5808	-	5808	1.099			1.10		
	6	6255	-	6255	1.183			1.18		
15min	1	4908	-	4908	0.928	0.95	1.74	0.93	0.95	1.72
	2	5068	-	5068	0.959			0.96		
	3	5138	-	5138	0.972			0.97		
	4	5106	-	5106	0.966			0.97		
	5	4972	-	4972	0.941			0.94		
	6	5004	-	5004	0.947			0.95		
20min	1	4867	-	4867	0.921	1.03	20.08	0.93	1.04	20.21
	2	4655	-	4655	0.881			0.88		
	3	5954	-	5954	1.126			1.13		
	4	7461	-	7461	1.411			1.42		
	5	4632	-	4632	0.876			0.88		
	6	5176	-	5176	0.979			0.98		
30min	1	4908	-	4908	0.928	0.92	5.99	0.93	0.93	6.13
	2	4484	-	4484	0.848			0.85		
	3	5251	-	5251	0.993			1.00		
	4	4726	-	4726	0.894			0.90		
	5	5189	-	5189	0.982			0.99		
	6	4766	-	4766	0.902			0.91		
45min	1	4423	-	4423	0.837	0.94	6.55	0.84	0.94	6.66
	2	5131	-	5131	0.971			0.98		
	3	5400	-	5400	1.022			1.03		
	4	4952	-	4952	0.937			0.95		
	5	4852	-	4852	0.918			0.93		
	6	4927	-	4927	0.932			0.94		
60min	1	4929	-	4929	0.932	0.93	3.75	0.94	0.94	3.86
	2	5004	-	5004	0.947			0.96		
	3	5120	-	5120	0.969			0.98		
	4	4754	-	4754	0.899			0.91		
	5	4615	-	4615	0.873			0.88		
	6	4964	-	4964	0.939			0.95		
90min	1	4668	-	4668	0.883	0.92	3.72	0.89	0.93	3.76
	2	4873	-	4873	0.922			0.93		
	3	4941	-	4941	0.935			0.95		
	4	4630	-	4630	0.876			0.89		
	5	5115	-	5115	0.968			0.98		
	6	4852	-	4852	0.918			0.93		
120min	1	4935	-	4935	0.934	0.91	4.59	0.95	0.92	4.54
	2	4626	-	4626	0.875			0.89		
	3	4603	-	4603	0.871			0.88		
	4	4830	-	4830	0.914			0.93		
	5	5134	-	5134	0.971			0.98		
	6	4596	-	4596	0.869			0.88		



操作者:

日期: 2026-09-11

复核者:

未审阅版本



时间 (分钟)	样品	A ₁	A ₂	A _{平均}	溶出量(%)	平均(%)	RSD%	累计溶 出量(%)	平均(%)	RSD%
极限	1	5038	-	5038	0.953	0.93	3.68	0.97	0.94	3.77
	2	4991	-	4991	0.944			0.96		
	3	5087	-	5087	0.962			0.98		
	4	4618	-	4618	0.874			0.89		
	5	4887	-	4887	0.924			0.94		
	6	4750	-	4750	0.899			0.91		



操作者:

日 期: 2026-09-11

复核者:

未审阅版本



非布司他多替诺雷片项目信息

介质体积(ml)	900	取样体积(ml)	1.5	补液体积(ml)	1.5
对照品批号	241101	对照品来源	ZZ	对照品使用方法	直接使用
对照品含量(%)	99.69	对照品水分(%)	0	对照品稀释倍数	5000
标示量(mg)	2	供试品稀释倍数	1	系数	1

对照品溶液

序号	称样量(mg)	A ₁	A ₂	A ₃	A ₄	A ₅	A _{平均}	RSD%
1	10.99	72134	72010	72439	72194	72378	72231	0.25
2	10.99	72733	72874				72804	0.14
单位质量响应值				RSD%	判断			
6572.43				0.56	数据可信			



操作者:

日期: 2026-09-11

复核者:

未审阅版本



供试品溶液-6042201批-多替诺雷-pH1.2

时间 (分钟)	样品	A ₁	A ₂	A _{平均}	溶出量(%)	平均(%)	RSD%	累计溶出量(%)	平均(%)	RSD%
5min	1	9311	-	9311	12.661	13.18	7.54	12.66	13.18	7.53
	2	11137	-	11137	15.143			15.14		
	3	9508	-	9508	12.928			12.93		
	4	9595	-	9595	13.047			13.05		
	5	9527	-	9527	12.954			12.95		
	6	9088	-	9088	12.357			12.36		
10min	1	17012	-	17012	23.132	23.77	4.21	23.15	23.79	4.21
	2	18775	-	18775	25.529			25.55		
	3	17375	-	17375	23.625			23.65		
	4	17844	-	17844	24.263			24.28		
	5	17166	-	17166	23.341			23.36		
	6	16726	-	16726	22.743			22.76		
15min	1	21635	-	21635	29.418	29.92	2.81	29.48	29.98	2.81
	2	22905	-	22905	31.145			31.21		
	3	22083	-	22083	30.027			30.09		
	4	22515	-	22515	30.615			30.68		
	5	21629	-	21629	29.410			29.47		
	6	21259	-	21259	28.907			28.97		
20min	1	24785	-	24785	33.701	34.03	2.30	33.81	34.14	2.31
	2	25840	-	25840	35.136			35.26		
	3	25010	-	25010	34.007			34.12		
	4	25427	-	25427	34.574			34.69		
	5	24924	-	24924	33.890			34.00		
	6	24157	-	24157	32.847			32.95		
30min	1	28609	-	28609	38.901	39.68	2.54	39.07	39.85	2.54
	2	30523	-	30523	41.503			41.68		
	3	29090	-	29090	39.555			39.72		
	4	29483	-	29483	40.089			40.26		
	5	28860	-	28860	39.242			39.41		
	6	28542	-	28542	38.810			38.97		
45min	1	32779	-	32779	44.571	44.64	1.14	44.80	44.88	1.15
	2	33081	-	33081	44.982			45.23		
	3	32943	-	32943	44.794			45.03		
	4	33252	-	33252	45.214			45.45		
	5	32775	-	32775	44.565			44.80		
	6	32168	-	32168	43.740			43.97		
60min	1	35302	-	35302	48.002	48.28	0.80	48.31	48.59	0.80
	2	35611	-	35611	48.422			48.74		
	3	35608	-	35608	48.418			48.73		
	4	35967	-	35967	48.906			49.22		
	5	35383	-	35383	48.112			48.42		
	6	35182	-	35182	47.838			48.14		
90min	1	38797	-	38797	52.754	52.98	0.81	53.14	53.37	0.82
	2	39131	-	39131	53.208			53.61		
	3	39213	-	39213	53.319			53.71		
	4	39272	-	39272	53.400			53.79		
	5	38922	-	38922	52.924			53.31		
	6	38435	-	38435	52.262			52.64		
120min	1	41322	-	41322	56.187	55.90	0.57	56.66	56.37	0.55
	2	40727	-	40727	55.378			55.87		
	3	41057	-	41057	55.827			56.30		
	4	41091	-	41091	55.873			56.36		
	5	41375	-	41375	56.259			56.73		
	6	41075	-	41075	55.851			56.32		



操作者:

日期: 2026-09-11

复核者:

未审阅版本



时间 (分钟)	样品	A ₁	A ₂	A _{平均}	溶出量(%)	平均(%)	RSD%	累计溶 出量(%)	平均(%)	RSD%
极限	1	41902	-	41902	56.976	56.80	0.77	57.54	57.37	0.75
	2	41462	-	41462	56.378			56.96		
	3	42238	-	42238	57.433			58.00		
	4	41429	-	41429	56.333			56.91		
	5	41640	-	41640	56.620			57.19		
	6	41982	-	41982	57.085			57.64		



操作者:

日期: 2026-09-11

复核者:

未审阅版本



非布司他多替诺雷片项目信息

介质体积(ml)	900	取样体积(ml)	1.5	补液体积(ml)	1.5
对照品批号	101278-202405	对照品来源	中检所	对照品使用方法	直接使用
对照品含量(%)	99.9	对照品水分(%)	0	对照品稀释倍数	250
标示量(mg)	40	供试品稀释倍数	1	系数	1

对照品溶液

序号	称样量(mg)	A ₁	A ₂	A ₃	A ₄	A ₅	A _{平均}	RSD%
1	10.21	496396	497508	496909	496405	497899	497023	0.14
2	10.35	505323	504847				505085	0.07
单位质量响应值				RSD%	判断			
48680.02				0.18	数据可信			



操作者:

日期: 2026-09-11

复核者:

未审阅版本



供试品溶液-6042201批-非布司他-pH1.2

时间 (分钟)	样品	A ₁	A ₂	A _{平均}	溶出量(%)	平均(%)	RSD%	累计溶 出量(%)	平均(%)	RSD%
5min	1	4335	-	4335	0.800	0.79	2.57	0.80	0.79	2.48
	2	4391	-	4391	0.810			0.81		
	3	4214	-	4214	0.777			0.78		
	4	4121	-	4121	0.760			0.76		
	5	4394	-	4394	0.811			0.81		
	6	4341	-	4341	0.801			0.80		
10min	1	4447	-	4447	0.820	0.88	6.48	0.82	0.88	6.40
	2	4484	-	4484	0.827			0.83		
	3	4596	-	4596	0.848			0.85		
	4	5164	-	5164	0.953			0.95		
	5	5023	-	5023	0.927			0.93		
	6	4973	-	4973	0.917			0.92		
15min	1	5133	-	5133	0.947	0.99	15.71	0.95	0.99	15.72
	2	5104	-	5104	0.942			0.94		
	3	7040	-	7040	1.299			1.30		
	4	4802	-	4802	0.886			0.89		
	5	4941	-	4941	0.911			0.91		
	6	5050	-	5050	0.932			0.93		
20min	1	5058	-	5058	0.933	0.94	7.39	0.94	0.94	7.42
	2	4793	-	4793	0.884			0.89		
	3	4811	-	4811	0.887			0.89		
	4	5068	-	5068	0.935			0.94		
	5	5815	-	5815	1.073			1.08		
	6	4996	-	4996	0.922			0.93		
30min	1	4763	-	4763	0.879	1.02	25.76	0.88	1.02	25.85
	2	8414	-	8414	1.552			1.56		
	3	5121	-	5121	0.945			0.95		
	4	4855	-	4855	0.896			0.90		
	5	4864	-	4864	0.897			0.90		
	6	5126	-	5126	0.946			0.95		
45min	1	4675	-	4675	0.862	0.91	4.02	0.87	0.92	3.71
	2	4938	-	4938	0.911			0.92		
	3	5014	-	5014	0.925			0.93		
	4	4705	-	4705	0.868			0.88		
	5	5188	-	5188	0.957			0.96		
	6	5002	-	5002	0.923			0.93		
60min	1	4767	-	4767	0.879	0.87	4.03	0.89	0.88	3.76
	2	4720	-	4720	0.871			0.88		
	3	5014	-	5014	0.925			0.93		
	4	4837	-	4837	0.892			0.90		
	5	4543	-	4543	0.838			0.85		
	6	4498	-	4498	0.830			0.84		
90min	1	4944	-	4944	0.912	0.93	13.68	0.92	0.94	13.49
	2	4553	-	4553	0.840			0.85		
	3	4875	-	4875	0.899			0.91		
	4	4308	-	4308	0.795			0.81		
	5	5194	-	5194	0.958			0.97		
	6	6278	-	6278	1.158			1.17		
120min	1	4347	-	4347	0.802	0.84	6.26	0.81	0.86	6.23
	2	4491	-	4491	0.828			0.84		
	3	4600	-	4600	0.849			0.86		
	4	4802	-	4802	0.886			0.90		
	5	4980	-	4980	0.919			0.93		
	6	4213	-	4213	0.777			0.79		



操作者:

日期: 2026-09-11

复核者:

未审阅版本



时间 (分钟)	样品	A ₁	A ₂	A _{平均}	溶出量(%)	平均(%)	RSD%	累计溶 出量(%)	平均(%)	RSD%
极限	1	3933	-	3933	0.726	0.86	9.26	0.74	0.88	9.03
	2	5039	-	5039	0.930			0.94		
	3	4916	-	4916	0.907			0.92		
	4	4382	-	4382	0.808			0.82		
	5	4985	-	4985	0.920			0.93		
	6	4780	-	4780	0.882			0.90		



操作者:

日 期: 2026-09-11

复核者:

未审阅版本



非布司他多替诺雷片项目信息

介质体积(ml)	900	取样体积(ml)	1.5	补液体积(ml)	1.5
对照品批号	241101	对照品来源	ZZ	对照品使用方法	直接使用
对照品含量(%)	99.69	对照品水分(%)	0	对照品稀释倍数	5000
标示量(mg)	2	供试品稀释倍数	1	系数	1

对照品溶液

序号	称样量(mg)	A ₁	A ₂	A ₃	A ₄	A ₅	A _{平均}	RSD%
1	10.99	71676	71980	72241	71979	71943	71964	0.28
2	10.99	72438	72549				72494	0.11
单位质量响应值			RSD%	判断				
6548.13			0.52	数据可信				



操作者:

日期: 2026-09-11

复核者:

未审阅版本



供试品溶液-6042401批-多替诺雷-pH1.2

时间 (分钟)	样品	A ₁	A ₂	A _{平均}	溶出量(%)	平均(%)	RSD%	累计溶出量(%)	平均(%)	RSD%
5min	1	7976	-	7976	10.889	11.12	10.27	10.89	11.12	10.26
	2	9619	-	9619	13.132			13.13		
	3	8108	-	8108	11.069			11.07		
	4	8379	-	8379	11.439			11.44		
	5	7161	-	7161	9.776			9.78		
	6	7624	-	7624	10.408			10.41		
10min	1	16645	-	16645	22.723	22.63	3.27	22.74	22.65	3.28
	2	17187	-	17187	23.463			23.49		
	3	15996	-	15996	21.837			21.86		
	4	17226	-	17226	23.516			23.54		
	5	16038	-	16038	21.895			21.91		
	6	16378	-	16378	22.359			22.38		
15min	1	21503	-	21503	29.355	29.15	1.47	29.41	29.20	1.47
	2	21603	-	21603	29.492			29.55		
	3	20840	-	20840	28.450			28.50		
	4	21620	-	21620	29.515			29.57		
	5	21104	-	21104	28.811			28.86		
	6	21431	-	21431	29.257			29.31		
20min	1	24616	-	24616	33.605	33.42	1.20	33.71	33.52	1.21
	2	24878	-	24878	33.963			34.07		
	3	24449	-	24449	33.377			33.48		
	4	24634	-	24634	33.630			33.74		
	5	24100	-	24100	32.901			33.00		
	6	24188	-	24188	33.021			33.12		
30min	1	28945	-	28945	39.515	39.00	0.98	39.68	39.16	0.99
	2	28776	-	28776	39.284			39.45		
	3	28496	-	28496	38.902			39.06		
	4	28640	-	28640	39.098			39.26		
	5	28188	-	28188	38.481			38.64		
	6	28344	-	28344	38.694			38.85		
45min	1	32856	-	32856	44.854	44.42	0.86	45.08	44.65	0.86
	2	32746	-	32746	44.704			44.94		
	3	32401	-	32401	44.233			44.46		
	4	32669	-	32669	44.599			44.83		
	5	32479	-	32479	44.339			44.56		
	6	32091	-	32091	43.810			44.03		
60min	1	35716	-	35716	48.758	48.12	1.00	49.06	48.42	1.00
	2	35239	-	35239	48.107			48.41		
	3	35232	-	35232	48.098			48.39		
	4	35362	-	35362	48.275			48.58		
	5	35296	-	35296	48.185			48.48		
	6	34632	-	34632	47.278			47.57		
90min	1	39014	-	39014	53.261	52.79	0.66	53.64	53.17	0.65
	2	38684	-	38684	52.810			53.20		
	3	38696	-	38696	52.827			53.20		
	4	38683	-	38683	52.809			53.19		
	5	38702	-	38702	52.835			53.21		
	6	38223	-	38223	52.181			52.56		
120min	1	41229	-	41229	56.285	55.87	0.68	56.76	56.34	0.68
	2	40901	-	40901	55.837			56.31		
	3	40982	-	40982	55.947			56.41		
	4	40870	-	40870	55.794			56.27		
	5	41118	-	41118	56.133			56.60		
	6	40432	-	40432	55.196			55.66		



操作者:

日期: 2026-09-11

复核者:

未审阅版本



时间 (分钟)	样品	A ₁	A ₂	A _{平均}	溶出量(%)	平均(%)	RSD%	累计溶 出量(%)	平均(%)	RSD%
极限	1	41820	-	41820	57.091	56.92	0.83	57.66	57.48	0.82
	2	41424	-	41424	56.551			57.12		
	3	42084	-	42084	57.452			58.01		
	4	41166	-	41166	56.198			56.76		
	5	41708	-	41708	56.938			57.49		
	6	41959	-	41959	57.281			57.83		



操作者:

日 期: 2026-09-11

复核者:

未审阅版本



非布司他多替诺雷片项目信息

介质体积(ml)	900	取样体积(ml)	1.5	补液体积(ml)	1.5
对照品批号	101278-202405	对照品来源	中检所	对照品使用方法	直接使用
对照品含量(%)	99.9	对照品水分(%)	0	对照品稀释倍数	250
标示量(mg)	40	供试品稀释倍数	1	系数	1

对照品溶液

序号	称样量(mg)	A ₁	A ₂	A ₃	A ₄	A ₅	A _{平均}	RSD%
1	10.21	500467	500090	500009	500196	500723	500297	0.06
2	10.35	511671	511839				511755	0.03
单位质量响应值				RSD%	判断			
49000.69				0.64	数据可信			



操作者:

日期: 2026-09-11

复核者:

未审阅版本



供试品溶液-6042401批-非布司他-pH1.2

时间 (分钟)	样品	A ₁	A ₂	A _{平均}	溶出量(%)	平均(%)	RSD%	累计溶 出量(%)	平均(%)	RSD%
5min	1	3135	-	3135	0.573	0.59	13.73	0.57	0.58	13.71
	2	3675	-	3675	0.671			0.67		
	3	3829	-	3829	0.699			0.70		
	4	2859	-	2859	0.522			0.52		
	5	2830	-	2830	0.517			0.52		
	6	2896	-	2896	0.529			0.53		
10min	1	4479	-	4479	0.818	0.83	3.57	0.82	0.83	3.62
	2	4506	-	4506	0.823			0.82		
	3	4800	-	4800	0.877			0.88		
	4	4376	-	4376	0.799			0.80		
	5	4486	-	4486	0.819			0.82		
	6	4712	-	4712	0.861			0.86		
15min	1	5010	-	5010	0.915	0.88	7.72	0.92	0.89	7.81
	2	5236	-	5236	0.956			0.96		
	3	4606	-	4606	0.841			0.84		
	4	5027	-	5027	0.918			0.92		
	5	4204	-	4204	0.768			0.77		
	6	4981	-	4981	0.910			0.91		
20min	1	4323	-	4323	0.790	0.88	14.20	0.79	0.89	14.20
	2	5557	-	5557	1.015			1.02		
	3	5849	-	5849	1.068			1.07		
	4	4663	-	4663	0.852			0.86		
	5	4480	-	4480	0.818			0.82		
	6	4200	-	4200	0.767			0.77		
30min	1	4529	-	4529	0.827	0.82	5.12	0.83	0.83	5.12
	2	4928	-	4928	0.900			0.91		
	3	4332	-	4332	0.791			0.80		
	4	4276	-	4276	0.781			0.79		
	5	4493	-	4493	0.821			0.83		
	6	4451	-	4451	0.813			0.82		
45min	1	4415	-	4415	0.806	0.85	9.91	0.81	0.86	9.87
	2	4619	-	4619	0.844			0.85		
	3	4426	-	4426	0.808			0.82		
	4	5595	-	5595	1.022			1.03		
	5	4547	-	4547	0.831			0.84		
	6	4408	-	4408	0.805			0.81		
60min	1	4371	-	4371	0.798	0.88	15.61	0.81	0.88	15.23
	2	4342	-	4342	0.793			0.80		
	3	4965	-	4965	0.907			0.92		
	4	4643	-	4643	0.848			0.86		
	5	6218	-	6218	1.136			1.14		
	6	4220	-	4220	0.771			0.78		
90min	1	4544	-	4544	0.830	0.88	11.30	0.84	0.88	11.39
	2	4880	-	4880	0.891			0.90		
	3	4571	-	4571	0.835			0.84		
	4	4580	-	4580	0.837			0.85		
	5	5845	-	5845	1.068			1.08		
	6	4352	-	4352	0.795			0.80		
120min	1	4438	-	4438	0.811	0.80	6.73	0.82	0.82	6.89
	2	4416	-	4416	0.807			0.82		
	3	4737	-	4737	0.865			0.88		
	4	4047	-	4047	0.739			0.75		
	5	4701	-	4701	0.859			0.87		
	6	4072	-	4072	0.744			0.75		



操作者:

日期: 2026-09-11

复核者:

未审阅版本



时间 (分钟)	样品	A ₁	A ₂	A _{平均}	溶出量(%)	平均(%)	RSD%	累计溶 出量(%)	平均(%)	RSD%
极限	1	4748	-	4748	0.867	0.86	6.04	0.88	0.88	5.85
	2	5128	-	5128	0.937			0.95		
	3	4821	-	4821	0.881			0.89		
	4	4241	-	4241	0.775			0.79		
	5	4765	-	4765	0.870			0.88		
	6	4695	-	4695	0.858			0.87		



操作者:

日 期: 2026-09-11

复核者:

未审阅版本



QTL-235


<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 0-39/18-61-2 - 6042201p-zzp-1-rcqx-pH1.2jz-40mg2mg-rj.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx267.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260515-FX267.lcb
样品瓶号: 1-9
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/15 15:38:14
处理时间(V2): 2026/05/18 11:36:42
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX267)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm

版本号: 6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图1 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042201批(40mg/2mg规格)-pH1.2介质
溶剂




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 0-39/18-62-2 - 6042201p-zzp-1-rcqx-pH1.2jz-40mg2mg-dz1-1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx267.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260515-FX267.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/15 15:43:39
处理时间(V2): 2026/05/18 11:36:46
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX267)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.353	70726	12.825	13434	1553	1.239	--
2	3.537	480745	87.175	46840	2853	1.201	10.861
总计		551471	100.000	60274			

图2 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042201批(40mg/2mg规格)-pH1.2介质
对照品溶液-1-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 0-39/18-63-2 - 6042201p-zzp-1-rcqx-pH1.2jz-40mg2mg-dz1-2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx267.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260515-FX267.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/15 15:49:03
处理时间(V2): 2026/05/18 11:36:50
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX267)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.355	70711	12.822	13458	1553	1.239	--
2	3.553	480784	87.178	46616	2851	1.208	10.893
总计		551495	100.000	60074			

图3 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042201批(40mg/2mg规格)-pH1.2介质
对照品溶液-1-2




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 0-39/18-64-2 - 6042201p-zzp-1-rcqx-pH1.2jz-40mg2mg-dz1-3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx267.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260515-FX267.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/15 15:54:27
处理时间(V2): 2026/05/18 11:36:53
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX267)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.356	70420	12.780	13442	1559	1.237	--
2	3.569	480596	87.220	46362	2844	1.217	10.927
总计		551016	100.000	59804			

图4 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042201批(40mg/2mg规格)-pH1.2介质
对照品溶液-1-3




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$QTL-235 - 0-39/18-65-2 - 6042201p-zzp-1-rcqx-pH1.2jz-40mg2mg-dz1-4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx267.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260515-FX267.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/15 15:59:51
处理时间(V2): 2026/05/18 11:36:56
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX267)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.357	70718	12.818	13426	1564	1.238	--
2	3.584	480976	87.182	46107	2842	1.228	10.963
总计		551694	100.000	59533			

图5 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042201批(40mg/2mg规格)-pH1.2介质
对照品溶液-1-4



QTL-235


<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$QTL-235 - 0-39/18-66-2 - 6042201p-zzp-1-rcqx-pH1.2jz-40mg2mg-dz1-5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx267.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260515-FX267.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/15 16:05:15
处理时间(V2): 2026/05/18 11:36:59
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX267)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm

版本号: 6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.359	70405	12.811	13364	1569	1.240	--
2	3.598	479170	87.189	45880	2836	1.235	10.993
总计		549575	100.000	59244			

图6 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042201批(40mg/2mg规格)-pH1.2介质
对照品溶液-1-5




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 0-39/18-67-2 - 6042201p-zzp-1-rcqx-pH1.2jz-40mg2mg-5min-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx267.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260515-FX267.lcb
样品瓶号: 1-1
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/15 16:10:39
处理时间(V2): 2026/05/18 11:37:02
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX267)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.381	10042	69.695	2162	2120	1.264	--
2	3.668	4366	30.305	439	3454	1.214	12.376
总计		14408	100.000	2601			

图7 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042201批(40mg/2mg规格)-pH1.2介质-5min-片1
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 0-39/18-68-2 - 6042201p-zzp-1-rcqx-pH1.2jz-40mg2mg-5min-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx267.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260515-FX267.lcb
样品瓶号: 1-10
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/15 16:16:03
处理时间(V2): 2026/05/18 11:37:05
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX267)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.381	8356	69.735	1853	2151	1.222	--
2	3.683	3627	30.265	382	3537	1.107	12.552
总计		11983	100.000	2235			

图8 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042201批(40mg/2mg规格)-pH1.2介质-5min-片2
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 0-39/18-69-2 - 6042201p-zzp-1-rcqx-pH1.2jz-40mg2mg-5min-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx267.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260515-FX267.lcb
样品瓶号: 1-19
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/15 16:21:26
处理时间(V2): 2026/05/18 11:37:08
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX267)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.382	9263	68.937	1996	2115	1.305	--
2	3.697	4174	31.063	419	3475	1.029	12.479
总计		13437	100.000	2414			

图9 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042201批(40mg/2mg规格)-pH1.2介质-5min-片3
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$QTL-235 - 0-39/18-70-2 - 6042201p-zzp-1-rcqx-pH1.2jz-40mg2mg-5min-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx267.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260515-FX267.lcb
样品瓶号: 1-28
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/15 16:26:50
处理时间(V2): 2026/05/18 11:37:11
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX267)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.382	9389	67.929	2060	2157	1.237	--
2	3.711	4433	32.071	451	3258	1.080	12.289
总计		13821	100.000	2511			

图10 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042201批(40mg/2mg规格)-pH1.2介质-5min-片4
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 0-39/18-71-2 - 6042201p-zzp-1-rcqx-pH1.2jz-40mg2mg-5min-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx267.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260515-FX267.lcb
样品瓶号: 1-37
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/15 16:32:14
处理时间(V2): 2026/05/18 11:37:14
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX267)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.383	9730	67.464	2128	2146	1.259	--
2	3.723	4693	32.536	483	3266	1.065	12.319
总计		14423	100.000	2611			

图11 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042201批(40mg/2mg规格)-pH1.2介质-5min-片5
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 0-39/18-72-2 - 6042201p-zzp-1-rcqx-pH1.2jz-40mg2mg-5min-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx267.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260515-FX267.lcb
样品瓶号: 1-46
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/15 16:37:37
处理时间(V2): 2026/05/18 11:37:17
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX267)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.383	9695	68.127	2100	2157	1.263	--
2	3.736	4536	31.873	444	3591	1.130	12.771
总计		14231	100.000	2544			

图12 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042201批(40mg/2mg规格)-pH1.2介质-5min-片6
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 0-39/18-73-2 - 6042201p-zzp-1-rcqx-pH1.2jz-40mg2mg-10min-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx267.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260515-FX267.lcb
样品瓶号: 1-2
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/15 16:43:00
处理时间(V2): 2026/05/18 11:37:20
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX267)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.383	17451	78.074	3775	2154	1.259	--
2	3.750	4901	21.926	508	3253	1.033	12.384
总计		22352	100.000	4282			

图13 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042201批(40mg/2mg规格)-pH1.2介质-10min-片1
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 0-39/18-74-2 - 6042201p-zzp-1-rcqx-pH1.2jz-40mg2mg-10min-P2.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx267.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260515-FX267.lcb

样品瓶号: 1-11

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/15 16:48:23

处理时间(V2): 2026/05/18 11:37:23

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX267)

流 速: 1.5ml/min


波 长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: wangdan

处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.384	16125	76.061	3501	2159	1.248	--
2	3.756	5075	23.939	495	3164	1.159	12.288
总计		21200	100.000	3996			

图14 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042201批(40mg/2mg规格)-pH1.2介质-10min-片2
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 0-39/18-75-2 - 6042201p-zzp-1-rcqx-pH1.2jz-40mg2mg-10min-P3.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx267.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260515-FX267.lcb

样品瓶号: 1-20

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/15 16:53:46

处理时间(V2): 2026/05/18 11:37:26

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX267)

流 速: 1.5ml/min


波 长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: wangdan

处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.384	16547	76.602	3587	2162	1.260	--
2	3.771	5054	23.398	505	3505	1.061	12.772
总计		21601	100.000	4093			

图15 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042201批(40mg/2mg规格)-pH1.2介质-10min-片3
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 0-39/18-76-2 - 6042201p-zzp-1-rcqx-pH1.2jz-40mg2mg-10min-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx267.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260515-FX267.lcb
样品瓶号: 1-29
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/15 16:59:09
处理时间(V2): 2026/05/18 11:37:29
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX267)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.384	17183	77.484	3698	2159	1.263	--
2	3.773	4993	22.516	484	3188	1.121	12.367
总计		22176	100.000	4182			

图16 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042201批(40mg/2mg规格)-pH1.2介质-10min-片4
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 0-39/18-77-2 - 6042201p-zzp-1-rcqx-pH1.2jz-40mg2mg-10min-P5.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx267.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260515-FX267.lcb

样品瓶号: 1-38

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/15 17:04:33

处理时间(V2): 2026/05/18 11:37:33

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX267)

流 速: 1.5ml/min


波 长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: wangdan

处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.385	17381	74.954	3751	2154	1.264	--
2	3.786	5808	25.046	572	3414	1.077	12.690
总计		23189	100.000	4323			

图17 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042201批(40mg/2mg规格)-pH1.2介质-10min-片5
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 0-39/18-78-2 - 6042201p-zzp-1-rcqx-pH1.2jz-40mg2mg-10min-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx267.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260515-FX267.lcb
样品瓶号: 1-47
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/15 17:09:56
处理时间(V2): 2026/05/18 11:37:36
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX267)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.384	17184	73.314	3706	2157	1.264	--
2	3.790	6255	26.686	628	3359	1.194	12.633
总计		23439	100.000	4334			

图18 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042201批(40mg/2mg规格)-pH1.2介质-10min-片6
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 0-39/18-79-2 - 6042201p-zzp-1-rcqx-pH1.2jz-40mg2mg-15min-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx267.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260515-FX267.lcb
样品瓶号: 1-3
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/15 17:15:19
处理时间(V2): 2026/05/18 11:37:39
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX267)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.384	21812	81.633	4697	2160	1.272	--
2	3.796	4908	18.367	495	3351	1.105	12.649
总计		26720	100.000	5192			

图19 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042201批(40mg/2mg规格)-pH1.2介质-15min-片1
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 0-39/18-80-2 - 6042201p-zzp-1-rcqx-pH1.2jz-40mg2mg-15min-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx267.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260515-FX267.lcb
样品瓶号: 1-12
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/15 17:20:42
处理时间(V2): 2026/05/18 11:37:43
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX267)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.385	20661	80.303	4450	2149	1.248	--
2	3.803	5068	19.697	497	2998	1.166	12.170
总计		25728	100.000	4947			

图20 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042201批(40mg/2mg规格)-pH1.2介质-15min-片2
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 0-39/18-81-2 - 6042201p-zzp-1-rcqx-pH1.2jz-40mg2mg-15min-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx267.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260515-FX267.lcb
样品瓶号: 1-21
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/15 17:26:05
处理时间(V2): 2026/05/18 11:37:46
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX267)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.384	21190	80.486	4568	2159	1.261	--
2	3.809	5138	19.514	509	3341	1.136	12.670
总计		26328	100.000	5077			

图21 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042201批(40mg/2mg规格)-pH1.2介质-15min-片3
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 0-39/18-82-2 - 6042201p-zzp-1-rcqx-pH1.2jz-40mg2mg-15min-P4.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx267.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260515-FX267.lcb

样品瓶号: 1-30

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/15 17:31:27

处理时间(V2): 2026/05/18 11:37:50

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX267)

流 速: 1.5ml/min


波 长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: wangdan

处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.384	21741	80.981	4683	2154	1.267	--
2	3.804	5106	19.019	503	3442	1.205	12.781
总计		26847	100.000	5187			

图22 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042201批(40mg/2mg规格)-pH1.2介质-15min-片4
供试品溶液-1



QTL-235


<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$QTL-235 - 0-39/18-83-2 - 6042201p-zzp-1-rcqx-pH1.2jz-40mg2mg-15min-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx267.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260515-FX267.lcb
样品瓶号: 1-39
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/15 17:36:50
处理时间(V2): 2026/05/18 11:37:54
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX267)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm

版本号: 6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.384	21455	81.186	4633	2156	1.262	--
2	3.812	4972	18.814	492	3173	1.117	12.451
总计		26427	100.000	5126			

图23 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042201批(40mg/2mg规格)-pH1.2介质-15min-片5
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 0-39/18-84-2 - 6042201p-zzp-1-rcqx-pH1.2jz-40mg2mg-15min-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx267.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260515-FX267.lcb
样品瓶号: 1-48
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/15 17:42:13
处理时间(V2): 2026/05/18 11:37:57
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX267)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.385	21332	80.999	4569	2156	1.279	--
2	3.818	5004	19.001	503	3407	1.119	12.772
总计		26337	100.000	5073			

图24 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042201批(40mg/2mg规格)-pH1.2介质-15min-片6
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 0-39/18-85-2 - 6042201p-zzp-1-rcqx-pH1.2jz-40mg2mg-20min-P1.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx267.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260515-FX267.lcb

样品瓶号: 1-4

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/15 17:47:37

处理时间(V2): 2026/05/18 11:38:00

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX267)

流 速: 1.5ml/min


波 长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: wangdan

处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.385	24674	83.525	5331	2150	1.260	--
2	3.818	4867	16.475	489	3489	1.157	12.870
总计		29541	100.000	5820			

图25 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042201批(40mg/2mg规格)-pH1.2介质-20min-片1
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 0-39/18-86-2 - 6042201p-zzp-1-rcqx-pH1.2jz-40mg2mg-20min-P2.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx267.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260515-FX267.lcb

样品瓶号: 1-13

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/15 17:53:00

处理时间(V2): 2026/05/18 11:38:03

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX267)

流 速: 1.5ml/min


波 长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: wangdan

处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.386	24007	83.760	5141	2145	1.265	--
2	3.821	4655	16.240	473	3109	1.063	12.369
总计		28661	100.000	5615			

图26 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042201批(40mg/2mg规格)-pH1.2介质-20min-片2
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 0-39/18-87-2 - 6042201p-zzp-1-rcqx-pH1.2jz-40mg2mg-20min-P3.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx267.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260515-FX267.lcb

样品瓶号: 1-22

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/15 17:58:24

处理时间(V2): 2026/05/18 11:38:06

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX267)

流 速: 1.5ml/min


波 长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: wangdan

处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.386	24524	80.466	5324	2164	1.258	--
2	3.822	5954	19.534	592	3332	1.165	12.687
总计		30478	100.000	5916			

图27 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042201批(40mg/2mg规格)-pH1.2介质-20min-片3
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 0-39/18-88-2 - 6042201p-zzp-1-rcqx-pH1.2jz-40mg2mg-20min-P4.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx267.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260515-FX267.lcb

样品瓶号: 1-31

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/15 18:03:47

处理时间(V2): 2026/05/18 11:38:09

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX267)

流 速: 1.5ml/min


波 长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: wangdan

处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.385	24937	76.971	5403	2158	1.257	--
2	3.822	7461	23.029	720	3104	1.126	12.383
总计		32398	100.000	6122			

图28 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042201批(40mg/2mg规格)-pH1.2介质-20min-片4
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 0-39/18-89-2 - 6042201p-zzp-1-rcqx-pH1.2jz-40mg2mg-20min-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx267.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260515-FX267.lcb
样品瓶号: 1-40
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/15 18:09:10
处理时间(V2): 2026/05/18 11:38:13
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX267)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.385	24556	84.130	5306	2153	1.257	--
2	3.824	4632	15.870	480	3695	1.181	13.150
总计		29188	100.000	5786			

图29 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042201批(40mg/2mg规格)-pH1.2介质-20min-片5
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 0-39/18-90-2 - 6042201p-zzp-1-rcqx-pH1.2jz-40mg2mg-20min-P6.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx267.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260515-FX267.lcb

样品瓶号: 1-49

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/15 18:14:33

处理时间(V2): 2026/05/18 11:38:16

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX267)

流 速: 1.5ml/min


波 长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: wangdan

处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.385	23885	82.190	5167	2154	1.258	--
2	3.823	5176	17.810	522	3355	1.077	12.720
总计		29061	100.000	5689			

图30 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042201批(40mg/2mg规格)-pH1.2介质-20min-片6
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 0-39/18-91-2 - 6042201p-zzp-1-rcqx-pH1.2jz-40mg2mg-30min-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx267.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260515-FX267.lcb
样品瓶号: 1-5
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/15 18:19:57
处理时间(V2): 2026/05/18 11:38:19
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX267)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.386	28500	85.310	6192	2158	1.251	--
2	3.831	4908	14.690	488	3504	1.075	12.928
总计		33407	100.000	6679			

图31 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042201批(40mg/2mg规格)-pH1.2介质-30min-片1
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 0-39/18-92-2 - 6042201p-zzp-1-rcqx-pH1.2jz-40mg2mg-30min-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx267.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260515-FX267.lcb
样品瓶号: 1-14
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/15 18:25:21
处理时间(V2): 2026/05/18 11:38:22
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX267)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.386	27685	86.062	5985	2150	1.259	--
2	3.825	4484	13.938	464	3568	0.994	12.985
总计		32168	100.000	6449			

图32 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042201批(40mg/2mg规格)-pH1.2介质-30min-片2
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 0-39/18-93-2 - 6042201p-zzp-1-rcqx-pH1.2jz-40mg2mg-30min-P3.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx267.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260515-FX267.lcb

样品瓶号: 1-23

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/15 18:30:45

处理时间(V2): 2026/05/18 11:38:25

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX267)

流 速: 1.5ml/min


波 长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: wangdan

处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.386	28638	84.507	6207	2154	1.263	--
2	3.829	5251	15.493	521	3209	1.119	12.532
总计		33889	100.000	6728			

图33 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042201批(40mg/2mg规格)-pH1.2介质-30min-片3
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 0-39/18-94-2 - 6042201p-zzp-1-rcqx-pH1.2jz-40mg2mg-30min-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx267.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260515-FX267.lcb
样品瓶号: 1-32
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/15 18:36:08
处理时间(V2): 2026/05/18 11:38:28
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX267)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.385	28680	85.853	6208	2162	1.266	--
2	3.828	4726	14.147	480	3535	1.165	12.970
总计		33406	100.000	6689			

图34 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042201批(40mg/2mg规格)-pH1.2介质-30min-片4
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 0-39/18-95-2 - 6042201p-zzp-1-rcqx-pH1.2jz-40mg2mg-30min-P5.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx267.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260515-FX267.lcb

样品瓶号: 1-41

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/15 18:41:31

处理时间(V2): 2026/05/18 11:38:32

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX267)

流 速: 1.5ml/min


波 长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: wangdan

处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.385	28775	84.721	6182	2157	1.263	--
2	3.823	5189	15.279	482	3146	1.149	12.441
总计		33964	100.000	6664			

图35 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042201批(40mg/2mg规格)-pH1.2介质-30min-片5
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 0-39/18-96-2 - 6042201p-zzp-1-rcqx-pH1.2jz-40mg2mg-30min-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx267.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260515-FX267.lcb
样品瓶号: 1-50
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/15 18:46:54
处理时间(V2): 2026/05/18 11:38:35
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX267)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.385	28321	85.594	6112	2146	1.260	--
2	3.822	4766	14.406	506	3634	1.068	13.061
总计		33087	100.000	6618			

图36 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042201批(40mg/2mg规格)-pH1.2介质-30min-片6
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 0-39/18-97-2 - 6042201p-zzp-1-rcqx-pH1.2jz-40mg2mg-45min-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx267.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260515-FX267.lcb
样品瓶号: 1-6
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/15 18:52:17
处理时间(V2): 2026/05/18 11:38:38
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX267)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.385	32714	88.090	7055	2152	1.257	--
2	3.828	4423	11.910	474	3871	1.048	13.363
总计		37137	100.000	7528			

图37 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042201批(40mg/2mg规格)-pH1.2介质-45min-片1
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 0-39/18-98-2 - 6042201p-zzp-1-rcqx-pH1.2jz-40mg2mg-45min-P2.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx267.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260515-FX267.lcb

样品瓶号: 1-15

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/15 18:57:41

处理时间(V2): 2026/05/18 11:38:41

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX267)

流 速: 1.5ml/min


波 长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: wangdan

处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.386	32398	86.329	6971	2149	1.273	--
2	3.830	5131	13.671	493	2863	1.266	12.039
总计		37529	100.000	7465			

图38 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042201批(40mg/2mg规格)-pH1.2介质-45min-片2
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 0-39/18-99-2 - 6042201p-zzp-1-rcqx-pH1.2jz-40mg2mg-45min-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx267.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260515-FX267.lcb
样品瓶号: 1-24
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/15 19:03:04
处理时间(V2): 2026/05/18 11:38:44
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX267)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.386	32751	85.846	7073	2150	1.265	--
2	3.828	5400	14.154	515	3281	1.105	12.623
总计		38151	100.000	7588			

图39 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042201批(40mg/2mg规格)-pH1.2介质-45min-片3
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 0-39/18-100-2 - 6042201p-zzp-1-rcqx-pH1.2jz-40mg2mg-45min-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx267.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260515-FX267.lcb
样品瓶号: 1-33
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/15 19:08:28
处理时间(V2): 2026/05/18 11:38:47
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX267)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.386	32646	86.830	7071	2159	1.256	--
2	3.827	4952	13.170	482	3340	1.281	12.704
总计		37597	100.000	7553			

图40 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042201批(40mg/2mg规格)-pH1.2介质-45min-片4
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 0-39/18-101-2 - 6042201p-zzp-1-rcqx-pH1.2jz-40mg2mg-45min-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx267.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260515-FX267.lcb
样品瓶号: 1-42
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/15 19:13:51
处理时间(V2): 2026/05/18 11:38:50
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX267)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.385	32247	86.921	6965	2160	1.260	--
2	3.832	4852	13.079	469	3528	1.031	12.973
总计		37099	100.000	7434			

图41 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042201批(40mg/2mg规格)-pH1.2介质-45min-片5
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 0-39/18-102-2 - 6042201p-zzp-1-rcqx-pH1.2jz-40mg2mg-45min-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx267.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260515-FX267.lcb
样品瓶号: 1-51
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/15 19:19:14
处理时间(V2): 2026/05/18 11:38:53
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX267)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.385	32906	86.977	7067	2152	1.261	--
2	3.829	4927	13.023	484	3458	1.063	12.865
总计		37833	100.000	7550			

图42 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042201批(40mg/2mg规格)-pH1.2介质-45min-片6
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 0-39/18-103-2 - 6042201p-zzp-1-rcqx-pH1.2jz-40mg2mg-60min-P1.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx267.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260515-FX267.lcb

样品瓶号: 1-7

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/15 19:24:38

处理时间(V2): 2026/05/18 11:38:57

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX267)

流 速: 1.5ml/min


波 长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: wangdan

处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.386	35488	87.804	7663	2150	1.258	--
2	3.830	4929	12.196	488	3596	1.095	13.037
总计		40417	100.000	8151			

图43 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042201批(40mg/2mg规格)-pH1.2介质-60min-片1
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 0-39/18-104-2 - 6042201p-zzp-1-rcqx-pH1.2jz-40mg2mg-60min-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx267.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260515-FX267.lcb
样品瓶号: 1-16
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/15 19:30:01
处理时间(V2): 2026/05/18 11:39:00
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX267)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.386	34866	87.448	7538	2156	1.262	--
2	3.826	5004	12.552	501	3725	1.178	13.179
总计		39871	100.000	8040			

图44 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042201批(40mg/2mg规格)-pH1.2介质-60min-片2
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 0-39/18-105-2 - 6042201p-zzp-1-rcqx-pH1.2jz-40mg2mg-60min-P3.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx267.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260515-FX267.lcb

样品瓶号: 1-25

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/15 19:35:24

处理时间(V2): 2026/05/18 11:39:03

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX267)

流 速: 1.5ml/min


波 长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: wangdan

处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.387	35576	87.419	7668	2163	1.266	--
2	3.825	5120	12.581	499	3532	1.300	12.946
总计		40695	100.000	8167			

图45 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042201批(40mg/2mg规格)-pH1.2介质-60min-片3
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$QTL-235 - 0-39/18-106-2 - 6042201p-zzp-1-rcqx-pH1.2jz-40mg2mg-60min-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx267.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260515-FX267.lcb
样品瓶号: 1-34
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/15 19:40:47
处理时间(V2): 2026/05/18 11:39:06
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX267)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.387	35383	88.157	7652	2157	1.261	--
2	3.828	4754	11.843	457	3546	1.177	12.967
总计		40136	100.000	8109			

图46 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042201批(40mg/2mg规格)-pH1.2介质-60min-片4
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$QTL-235 - 0-39/18-107-2 - 6042201p-zzp-1-rcqx-pH1.2jz-40mg2mg-60min-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx267.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260515-FX267.lcb
样品瓶号: 1-43
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/15 19:46:10
处理时间(V2): 2026/05/18 11:39:09
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX267)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.387	35155	88.397	7647	2173	1.257	--
2	3.824	4615	11.603	484	3334	1.089	12.698
总计		39769	100.000	8132			

图47 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042201批(40mg/2mg规格)-pH1.2介质-60min-片5
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 0-39/18-108-2 - 6042201p-zzp-1-rcqx-pH1.2jz-40mg2mg-60min-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx267.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260515-FX267.lcb
样品瓶号: 1-52
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/15 19:51:33
处理时间(V2): 2026/05/18 11:39:12
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX267)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.387	35454	87.717	7663	2159	1.265	--
2	3.823	4964	12.283	503	3594	1.066	13.012
总计		40418	100.000	8166			

图48 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042201批(40mg/2mg规格)-pH1.2介质-60min-片6
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 0-39/18-109-2 - 6042201p-zzp-1-rcqx-pH1.2jz-40mg2mg-90min-P1.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx267.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260515-FX267.lcb

样品瓶号: 1-8

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/15 19:56:56

处理时间(V2): 2026/05/18 11:39:16

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX267)

流 速: 1.5ml/min


波 长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: wangdan

处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.386	39093	89.333	8443	2164	1.259	--
2	3.826	4668	10.667	479	3347	1.111	12.718
总计		43761	100.000	8921			

图49 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042201批(40mg/2mg规格)-pH1.2介质-90min-片1
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 0-39/18-110-2 - 6042201p-zzp-1-rcqx-pH1.2jz-40mg2mg-90min-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx267.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260515-FX267.lcb
样品瓶号: 1-17
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/15 20:02:22
处理时间(V2): 2026/05/18 11:39:19
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX267)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.386	38610	88.794	8365	2160	1.258	--
2	3.822	4873	11.206	476	3377	1.252	12.744
总计		43482	100.000	8841			

图50 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042201批(40mg/2mg规格)-pH1.2介质-90min-片2
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 0-39/18-111-2 - 6042201p-zzp-1-rcqx-pH1.2jz-40mg2mg-90min-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx267.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260515-FX267.lcb
样品瓶号: 1-26
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/15 20:07:46
处理时间(V2): 2026/05/18 11:39:22
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX267)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.386	38644	88.664	8393	2162	1.255	--
2	3.820	4941	11.336	477	3323	1.291	12.668
总计		43585	100.000	8870			

图51 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042201批(40mg/2mg规格)-pH1.2介质-90min-片3
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 0-39/18-112-2 - 6042201p-zzp-1-rcqx-pH1.2jz-40mg2mg-90min-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx267.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260515-FX267.lcb
样品瓶号: 1-35
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/15 20:13:09
处理时间(V2): 2026/05/18 11:39:25
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX267)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.386	38741	89.324	8357	2160	1.255	--
2	3.829	4630	10.676	464	3313	1.052	12.679
总计		43371	100.000	8821			

图52 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042201批(40mg/2mg规格)-pH1.2介质-90min-片4
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 0-39/18-113-2 - 6042201p-zzp-1-rcqx-pH1.2jz-40mg2mg-90min-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx267.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260515-FX267.lcb
样品瓶号: 1-44
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/15 20:18:33
处理时间(V2): 2026/05/18 11:39:28
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX267)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.386	39101	88.431	8427	2154	1.255	--
2	3.827	5115	11.569	495	3489	1.218	12.892
总计		44217	100.000	8922			

图53 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042201批(40mg/2mg规格)-pH1.2介质-90min-片5
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 0-39/18-114-2 - 6042201p-zzp-1-rcqx-pH1.2jz-40mg2mg-90min-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx267.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260515-FX267.lcb
样品瓶号: 1-53
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/15 20:23:57
处理时间(V2): 2026/05/18 11:39:32
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX267)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.386	38681	88.854	8376	2154	1.259	--
2	3.820	4852	11.146	484	3216	1.162	12.518
总计		43533	100.000	8860			

图54 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042201批(40mg/2mg规格)-pH1.2介质-90min-片6
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 0-39/18-115-2 - 6042201p-zzp-1-rcqx-pH1.2jz-40mg2mg-120min-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx267.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260515-FX267.lcb
样品瓶号: 4-1
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/15 20:29:21
处理时间(V2): 2026/05/18 11:39:35
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX267)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.387	41375	89.344	8963	2165	1.260	--
2	3.827	4935	10.656	486	3844	1.204	13.328
总计		46310	100.000	9449			

图55 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042201批(40mg/2mg规格)-pH1.2介质-120min-片1
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 0-39/18-116-2 - 6042201p-zzp-1-rcqx-pH1.2jz-40mg2mg-120min-P2.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx267.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260515-FX267.lcb

样品瓶号: 4-10

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/15 20:34:45

处理时间(V2): 2026/05/18 11:39:38

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX267)

流 速: 1.5ml/min


波 长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: wangdan

处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.386	40732	89.802	8848	2164	1.249	--
2	3.826	4626	10.198	463	3561	1.063	12.991
总计		45358	100.000	9311			

图56 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042201批(40mg/2mg规格)-pH1.2介质-120min-片2
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 0-39/18-117-2 - 6042201p-zzp-1-rcqx-pH1.2jz-40mg2mg-120min-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx267.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260515-FX267.lcb
样品瓶号: 4-19
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/15 20:40:09
处理时间(V2): 2026/05/18 11:39:41
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX267)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.386	41365	89.987	8896	2155	1.269	--
2	3.823	4603	10.013	467	3608	1.096	13.032
总计		45968	100.000	9363			

图57 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042201批(40mg/2mg规格)-pH1.2介质-120min-片3
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 0-39/18-118-2 - 6042201p-zzp-1-rcqx-pH1.2jz-40mg2mg-120min-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx267.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260515-FX267.lcb
样品瓶号: 4-28
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/15 20:45:33
处理时间(V2): 2026/05/18 11:39:45
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX267)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.386	41207	89.508	8892	2156	1.258	--
2	3.820	4830	10.492	481	3101	1.137	12.363
总计		46037	100.000	9373			

图58 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042201批(40mg/2mg规格)-pH1.2介质-120min-片4
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 0-39/18-119-2 - 6042201p-zzp-1-rcqx-pH1.2jz-40mg2mg-120min-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx267.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260515-FX267.lcb
样品瓶号: 4-37
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/15 20:50:56
处理时间(V2): 2026/05/18 11:39:48
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX267)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.386	41169	88.912	8911	2165	1.257	--
2	3.819	5134	11.088	487	3273	1.364	12.598
总计		46304	100.000	9398			

图59 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042201批(40mg/2mg规格)-pH1.2介质-120min-片5
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 0-39/18-120-2 - 6042201p-zzp-1-rcqx-pH1.2jz-40mg2mg-120min-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx267.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260515-FX267.lcb
样品瓶号: 4-46
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/15 20:56:19
处理时间(V2): 2026/05/18 11:39:51
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX267)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.387	41242	89.974	8926	2165	1.259	--
2	3.816	4596	10.026	448	3170	1.276	12.441
总计		45837	100.000	9373			

图60 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042201批(40mg/2mg规格)-pH1.2介质-120min-片6
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 0-39/18-121-2 - 6042201p-zzp-1-rcqx-pH1.2jz-40mg2mg-JX-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx267.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260515-FX267.lcb
样品瓶号: 4-2
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/15 21:01:43
处理时间(V2): 2026/05/18 11:39:54
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX267)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.387	41914	89.269	9074	2161	1.256	--
2	3.823	5038	10.731	492	3336	1.169	12.686
总计		46952	100.000	9565			

图61 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042201批(40mg/2mg规格)-pH1.2介质-极限转速-片1
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 0-39/18-122-2 - 6042201p-zzp-1-rcqx-pH1.2jz-40mg2mg-JX-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx267.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260515-FX267.lcb
样品瓶号: 4-11
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/15 21:07:07
处理时间(V2): 2026/05/18 11:39:58
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX267)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.387	41762	89.325	9036	2171	1.254	--
2	3.827	4991	10.675	499	3332	1.060	12.700
总计		46753	100.000	9535			

图62 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042201批(40mg/2mg规格)-pH1.2介质-极限转速-片2
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 0-39/18-123-2 - 6042201p-zzp-1-rcqx-pH1.2jz-40mg2mg-JX-P3.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx267.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260515-FX267.lcb

样品瓶号: 4-20

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/15 21:12:31

处理时间(V2): 2026/05/18 11:40:01

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX267)

流 速: 1.5ml/min


波 长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: wangdan

处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.387	42288	89.263	9136	2167	1.258	--
2	3.826	5087	10.737	507	3075	1.139	12.346
总计		47375	100.000	9643			

图63 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042201批(40mg/2mg规格)-pH1.2介质-极限转速-片3
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 0-39/18-124-2 - 6042201p-zzp-1-rcqx-pH1.2jz-40mg2mg-JX-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx267.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260515-FX267.lcb
样品瓶号: 4-29
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/15 21:17:53
处理时间(V2): 2026/05/18 11:40:04
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX267)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.387	41834	90.059	9054	2174	1.259	--
2	3.828	4618	9.941	438	3231	1.037	12.569
总计		46451	100.000	9492			

图64 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042201批(40mg/2mg规格)-pH1.2介质-极限转速-片4
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 0-39/18-125-2 - 6042201p-zzp-1-rcqx-pH1.2jz-40mg2mg-JX-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx267.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260515-FX267.lcb
样品瓶号: 4-38
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/15 21:23:16
处理时间(V2): 2026/05/18 11:40:07
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX267)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.387	41740	89.518	9093	2174	1.252	--
2	3.823	4887	10.482	491	3444	1.113	12.832
总计		46628	100.000	9583			

图65 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042201批(40mg/2mg规格)-pH1.2介质-极限转速-片5
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 0-39/18-126-2 - 6042201p-zzp-1-rcqx-pH1.2jz-40mg2mg-JX-P6.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx267.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260515-FX267.lcb

样品瓶号: 4-47

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/15 21:28:39

处理时间(V2): 2026/05/18 11:40:10

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX267)

流 速: 1.5ml/min


波 长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: wangdan

处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.387	41943	89.827	9115	2173	1.255	--
2	3.821	4750	10.173	477	3827	1.059	13.297
总计		46693	100.000	9592			

图66 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042201批(40mg/2mg规格)-pH1.2介质-极限转速-片6
供试品溶液-1



QTL-235


<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 0-39/18-127-2 - 6042201p-zzp-1-rcqx-pH1.2jz-40mg2mg-dz2-1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx267.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260515-FX267.lcb
样品瓶号: 1-27
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/15 21:34:04
处理时间(V2): 2026/05/18 11:40:13
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX267)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm

版本号: 6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.377	71406	12.563	13662	1637	1.235	--
2	3.746	496993	87.437	44561	2690	1.367	11.149
总计		568399	100.000	58223			

图67 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042201批(40mg/2mg规格)-pH1.2介质
对照品溶液-2-1



QTL-235


<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 0-39/18-128-2 - 6042201p-zzp-1-rcqx-pH1.2jz-40mg2mg-dz2-2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx267.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260515-FX267.lcb
样品瓶号: 1-27
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/15 21:39:28
处理时间(V2): 2026/05/18 11:40:16
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX267)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm

版本号: 6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.376	71704	12.612	13690	1634	1.233	--
2	3.742	496816	87.388	44528	2684	1.368	11.131
总计		568520	100.000	58218			

图68 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042201批(40mg/2mg规格)-pH1.2介质
对照品溶液-2-2




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 0-39/18-129-2 - 6042201p-zzp-2-rcqx-pH1.2jz-40mg2mg-rj.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx267.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260515-FX267.lcb
样品瓶号: 2-9
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/15 21:44:52
处理时间(V2): 2026/05/18 11:40:19
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX267)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图69 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042201批(40mg/2mg规格)-pH1.2介质
溶剂




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 0-39/18-130-2 - 6042201p-zzp-2-rcqx-pH1.2jz-40mg2mg-dz1-1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx267.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260515-FX267.lcb
样品瓶号: 2-18
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/15 21:50:18
处理时间(V2): 2026/05/18 11:40:23
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX267)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.376	72134	12.688	13730	1628	1.240	--
2	3.743	496396	87.312	44573	2691	1.367	11.139
总计		568530	100.000	58302			

图70 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042201批(40mg/2mg规格)-pH1.2介质
对照品溶液-1-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 0-39/18-131-2 - 6042201p-zzp-2-rcqx-pH1.2jz-40mg2mg-dz1-2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx267.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260515-FX267.lcb
样品瓶号: 2-18
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/15 21:55:43
处理时间(V2): 2026/05/18 11:40:26
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX267)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.376	72010	12.644	13748	1632	1.235	--
2	3.740	497508	87.356	44659	2685	1.366	11.128
总计		569518	100.000	58407			

图71 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042201批(40mg/2mg规格)-pH1.2介质
对照品溶液-1-2




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 0-39/18-132-2 - 6042201p-zzp-2-rcqx-pH1.2jz-40mg2mg-dz1-3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx267.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260515-FX267.lcb
样品瓶号: 2-18
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/15 22:01:08
处理时间(V2): 2026/05/18 11:40:29
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX267)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.375	72439	12.723	13790	1631	1.240	--
2	3.738	496909	87.277	44720	2685	1.364	11.125
总计		569347	100.000	58510			

图72 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042201批(40mg/2mg规格)-pH1.2介质
对照品溶液-1-3



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 0-39/18-133-2 - 6042201p-zzp-2-rcqx-pH1.2jz-40mg2mg-dz1-4.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx267.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260515-FX267.lcb

样品瓶号: 2-18

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/15 22:06:34

处理时间(V2): 2026/05/18 11:40:33

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX267)

流 速: 1.5ml/min


波 长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: wangdan

处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.376	72194	12.697	13773	1637	1.240	--
2	3.738	496405	87.303	44719	2695	1.361	11.139
总计		568599	100.000	58492			

图73 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042201批(40mg/2mg规格)-pH1.2介质
对照品溶液-1-4




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 0-39/18-134-2 - 6042201p-zzp-2-rcqx-pH1.2jz-40mg2mg-dz1-5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx267.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260515-FX267.lcb
样品瓶号: 2-18
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/15 22:11:59
处理时间(V2): 2026/05/18 11:40:36
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX267)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.375	72378	12.692	13787	1631	1.238	--
2	3.736	497899	87.308	44712	2688	1.365	11.124
总计		570277	100.000	58499			

图74 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042201批(40mg/2mg规格)-pH1.2介质
对照品溶液-1-5




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 0-39/18-135-2 - 6042201p-zzp-2-rcqx-pH1.2jz-40mg2mg-5min-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx267.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260515-FX267.lcb
样品瓶号: 2-1
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/15 22:17:23
处理时间(V2): 2026/05/18 11:40:39
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX267)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.388	9311	68.232	2031	2156	1.254	--
2	3.816	4335	31.768	430	3164	1.035	12.418
总计		13646	100.000	2461			

图75 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042201批(40mg/2mg规格)-pH1.2介质-5min-片1
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 0-39/18-136-2 - 6042201p-zzp-2-rcqx-pH1.2jz-40mg2mg-5min-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx267.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260515-FX267.lcb
样品瓶号: 2-10
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/15 22:22:48
处理时间(V2): 2026/05/18 11:40:42
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX267)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.388	11137	71.722	2435	2162	1.235	--
2	3.825	4391	28.278	434	3644	1.142	13.067
总计		15528	100.000	2869			

图76 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042201批(40mg/2mg规格)-pH1.2介质-5min-片2
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 0-39/18-137-2 - 6042201p-zzp-2-rcqx-pH1.2jz-40mg2mg-5min-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx267.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260515-FX267.lcb
样品瓶号: 2-19
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/15 22:28:12
处理时间(V2): 2026/05/18 11:40:45
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX267)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.389	9508	69.288	2059	2151	1.272	--
2	3.819	4214	30.712	438	3484	1.055	12.840
总计		13723	100.000	2497			

图77 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042201批(40mg/2mg规格)-pH1.2介质-5min-片3
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 0-39/18-138-2 - 6042201p-zzp-2-rcqx-pH1.2jz-40mg2mg-5min-P4.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx267.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260515-FX267.lcb

样品瓶号: 2-28

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/15 22:33:36

处理时间(V2): 2026/05/18 11:40:48

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX267)

流 速: 1.5ml/min


波 长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: wangdan

处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.389	9595	69.954	2114	2195	1.234	--
2	3.817	4121	30.046	420	3429	1.121	12.805
总计		13716	100.000	2533			

图78 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042201批(40mg/2mg规格)-pH1.2介质-5min-片4
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 0-39/18-139-2 - 6042201p-zzp-2-rcqx-pH1.2jz-40mg2mg-5min-P5.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx267.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260515-FX267.lcb

样品瓶号: 2-37

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/15 22:39:00

处理时间(V2): 2026/05/18 11:40:51

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX267)

流 速: 1.5ml/min


波 长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: wangdan

处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.388	9527	68.437	2032	2102	1.271	--
2	3.818	4394	31.563	424	3555	1.204	12.881
总计		13921	100.000	2456			

图79 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042201批(40mg/2mg规格)-pH1.2介质-5min-片5
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 0-39/18-140-2 - 6042201p-zzp-2-rcqx-pH1.2jz-40mg2mg-5min-P6.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx267.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260515-FX267.lcb

样品瓶号: 2-46

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/15 22:44:23

处理时间(V2): 2026/05/18 11:40:54

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX267)

流 速: 1.5ml/min


波 长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: wangdan

处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.388	9088	67.674	1979	2183	1.263	--
2	3.825	4341	32.326	423	3253	1.207	12.587
总计		13429	100.000	2402			

图80 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042201批(40mg/2mg规格)-pH1.2介质-5min-片6
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 0-39/18-141-2 - 6042201p-zzp-2-rcqx-pH1.2jz-40mg2mg-10min-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx267.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260515-FX267.lcb
样品瓶号: 2-2
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/15 22:49:48
处理时间(V2): 2026/05/18 11:40:57
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX267)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.388	17012	79.276	3706	2183	1.255	--
2	3.819	4447	20.724	460	3924	1.122	13.410
总计		21460	100.000	4166			

图81 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042201批(40mg/2mg规格)-pH1.2介质-10min-片1
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 0-39/18-142-2 - 6042201p-zzp-2-rcqx-pH1.2jz-40mg2mg-10min-P2.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx267.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260515-FX267.lcb

样品瓶号: 2-11

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/15 22:55:12

处理时间(V2): 2026/05/18 11:41:00

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX267)

流 速: 1.5ml/min


波 长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: wangdan

处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.388	18775	80.720	4073	2155	1.248	--
2	3.817	4484	19.280	475	3764	1.106	13.179
总计		23259	100.000	4548			

图82 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042201批(40mg/2mg规格)-pH1.2介质-10min-片2
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 0-39/18-143-2 - 6042201p-zzp-2-rcqx-pH1.2jz-40mg2mg-10min-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx267.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260515-FX267.lcb
样品瓶号: 2-20
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/15 23:00:37
处理时间(V2): 2026/05/18 11:41:03
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX267)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.388	17375	79.080	3794	2167	1.246	--
2	3.819	4596	20.920	455	3799	1.207	13.240
总计		21971	100.000	4249			

图83 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042201批(40mg/2mg规格)-pH1.2介质-10min-片3
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 0-39/18-144-2 - 6042201p-zzp-2-rcqx-pH1.2jz-40mg2mg-10min-P4.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx267.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260515-FX267.lcb

样品瓶号: 2-29

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/15 23:06:01

处理时间(V2): 2026/05/18 11:41:07

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX267)

流 速: 1.5ml/min


波 长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: wangdan

处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.388	17844	77.556	3882	2168	1.260	--
2	3.820	5164	22.444	503	3484	1.205	12.861
总计		23008	100.000	4385			

图84 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042201批(40mg/2mg规格)-pH1.2介质-10min-片4
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 0-39/18-145-2 - 6042201p-zzp-2-rcqx-pH1.2jz-40mg2mg-10min-P5.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx267.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260515-FX267.lcb

样品瓶号: 2-38

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/15 23:11:25

处理时间(V2): 2026/05/18 11:41:09

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX267)

流 速: 1.5ml/min


波 长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: wangdan

处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.388	17166	77.362	3744	2174	1.254	--
2	3.820	5023	22.638	490	2916	1.098	12.098
总计		22190	100.000	4233			

图85 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042201批(40mg/2mg规格)-pH1.2介质-10min-片5
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 0-39/18-146-2 - 6042201p-zzp-2-rcqx-pH1.2jz-40mg2mg-10min-P6.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx267.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260515-FX267.lcb

样品瓶号: 2-47

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/15 23:16:50

处理时间(V2): 2026/05/18 11:41:12

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX267)

流 速: 1.5ml/min


波 长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: wangdan

处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.388	16726	77.081	3644	2175	1.257	--
2	3.819	4973	22.919	495	3703	1.202	13.142
总计		21699	100.000	4139			

图86 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042201批(40mg/2mg规格)-pH1.2介质-10min-片6
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 0-39/18-147-2 - 6042201p-zzp-2-rcqx-pH1.2jz-40mg2mg-15min-P1.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx267.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260515-FX267.lcb

样品瓶号: 2-3

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/15 23:22:14

处理时间(V2): 2026/05/18 11:41:16

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX267)

流 速: 1.5ml/min


波 长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: wangdan

处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.388	21635	80.826	4698	2165	1.263	--
2	3.821	5133	19.174	498	3313	1.262	12.647
总计		26768	100.000	5197			

图87 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042201批(40mg/2mg规格)-pH1.2介质-15min-片1
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 0-39/18-148-2 - 6042201p-zzp-2-rcqx-pH1.2jz-40mg2mg-15min-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx267.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260515-FX267.lcb
样品瓶号: 2-12
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/15 23:27:38
处理时间(V2): 2026/05/18 11:41:19
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX267)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.387	22905	81.776	4986	2174	1.247	--
2	3.818	5104	18.224	501	3733	1.076	13.175
总计		28010	100.000	5487			

图88 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042201批(40mg/2mg规格)-pH1.2介质-15min-片2
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 0-39/18-149-2 - 6042201p-zzp-2-rcqx-pH1.2jz-40mg2mg-15min-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx267.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260515-FX267.lcb
样品瓶号: 2-21
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/15 23:33:02
处理时间(V2): 2026/05/18 11:41:22
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX267)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.387	22083	75.827	4824	2180	1.252	--
2	3.815	7040	24.173	687	3269	1.062	12.585
总计		29123	100.000	5512			

图89 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042201批(40mg/2mg规格)-pH1.2介质-15min-片3
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 0-39/18-150-2 - 6042201p-zzp-2-rcqx-pH1.2jz-40mg2mg-15min-P4.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx267.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260515-FX267.lcb

样品瓶号: 2-30

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/15 23:38:26

处理时间(V2): 2026/05/18 11:41:25

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX267)

流 速: 1.5ml/min


波 长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: wangdan

处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.388	22515	82.420	4858	2156	1.258	--
2	3.817	4802	17.580	485	3374	1.074	12.707
总计		27318	100.000	5343			

图90 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042201批(40mg/2mg规格)-pH1.2介质-15min-片4
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 0-39/18-151-2 - 6042201p-zzp-2-rcqx-pH1.2jz-40mg2mg-15min-P5.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx267.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260515-FX267.lcb

样品瓶号: 2-39

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/15 23:43:50

处理时间(V2): 2026/05/18 11:41:28

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX267)

流 速: 1.5ml/min


波 长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: wangdan

处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.388	21629	81.403	4714	2165	1.242	--
2	3.816	4941	18.597	491	3245	1.019	12.543
总计		26571	100.000	5206			

图91 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042201批(40mg/2mg规格)-pH1.2介质-15min-片5
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 0-39/18-152-2 - 6042201p-zzp-2-rcqx-pH1.2jz-40mg2mg-15min-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx267.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260515-FX267.lcb
样品瓶号: 2-48
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/15 23:49:14
处理时间(V2): 2026/05/18 11:41:31
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX267)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.387	21259	80.806	4613	2170	1.260	--
2	3.819	5050	19.194	502	3200	1.193	12.496
总计		26308	100.000	5115			

图92 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042201批(40mg/2mg规格)-pH1.2介质-15min-片6
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 0-39/18-153-2 - 6042201p-zzp-2-rcqx-pH1.2jz-40mg2mg-20min-P1.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx267.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260515-FX267.lcb

样品瓶号: 2-4

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/15 23:54:38

处理时间(V2): 2026/05/18 11:41:34

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX267)

流 速: 1.5ml/min


波 长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: wangdan

处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.388	24785	83.053	5385	2175	1.256	--
2	3.814	5058	16.947	493	3681	1.147	13.098
总计		29843	100.000	5878			

图93 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042201批(40mg/2mg规格)-pH1.2介质-20min-片1
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 0-39/18-154-2 - 6042201p-zzp-2-rcqx-pH1.2jz-40mg2mg-20min-P2.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx267.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260515-FX267.lcb

样品瓶号: 2-13

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/16 00:00:03

处理时间(V2): 2026/05/18 11:41:38

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX267)

流 速: 1.5ml/min


波 长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: wangdan

处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.388	25840	84.353	5606	2172	1.253	--
2	3.821	4793	15.647	486	3192	1.083	12.490
总计		30633	100.000	6093			

图94 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042201批(40mg/2mg规格)-pH1.2介质-20min-片2
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 0-39/18-155-2 - 6042201p-zzp-2-rcqx-pH1.2jz-40mg2mg-20min-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx267.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260515-FX267.lcb
样品瓶号: 2-22
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/16 00:05:28
处理时间(V2): 2026/05/18 11:41:41
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX267)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.387	25010	83.868	5464	2178	1.245	--
2	3.818	4811	16.132	482	3318	1.077	12.658
总计		29820	100.000	5946			

图95 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042201批(40mg/2mg规格)-pH1.2介质-20min-片3
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 0-39/18-156-2 - 6042201p-zzp-2-rcqx-pH1.2jz-40mg2mg-20min-P4.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx267.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260515-FX267.lcb

样品瓶号: 2-31

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/16 00:10:52

处理时间(V2): 2026/05/18 11:41:45

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX267)

流 速: 1.5ml/min


波 长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: wangdan

处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.388	25427	83.382	5524	2173	1.256	--
2	3.816	5068	16.618	506	3275	1.163	12.587
总计		30495	100.000	6030			

图96 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042201批(40mg/2mg规格)-pH1.2介质-20min-片4
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 0-39/18-157-2 - 6042201p-zzp-2-rcqx-pH1.2jz-40mg2mg-20min-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx267.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260515-FX267.lcb
样品瓶号: 2-40
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/16 00:16:16
处理时间(V2): 2026/05/18 11:41:48
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX267)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.388	24924	81.082	5469	2182	1.248	--
2	3.818	5815	18.918	576	3286	1.086	12.615
总计		30739	100.000	6045			

图97 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042201批(40mg/2mg规格)-pH1.2介质-20min-片5
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 0-39/18-158-2 - 6042201p-zzp-2-rcqx-pH1.2jz-40mg2mg-20min-P6.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx267.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260515-FX267.lcb

样品瓶号: 2-49

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/16 00:21:40

处理时间(V2): 2026/05/18 11:41:51

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX267)

流 速: 1.5ml/min


波 长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: wangdan

处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.388	24157	82.862	5291	2183	1.246	--
2	3.811	4996	17.138	499	3238	1.196	12.531
总计		29153	100.000	5790			

图98 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042201批(40mg/2mg规格)-pH1.2介质-20min-片6
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 0-39/18-159-2 - 6042201p-zzp-2-rcqx-pH1.2jz-40mg2mg-30min-P1.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx267.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260515-FX267.lcb

样品瓶号: 2-5

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/16 00:27:05

处理时间(V2): 2026/05/18 11:41:54

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX267)

流 速: 1.5ml/min


波 长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: wangdan

处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.388	28609	85.727	6232	2168	1.250	--
2	3.820	4763	14.273	478	3355	1.093	12.699
总计		33372	100.000	6710			

图99 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042201批(40mg/2mg规格)-pH1.2介质-30min-片1
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 0-39/18-160-2 - 6042201p-zzp-2-rcqx-pH1.2jz-40mg2mg-30min-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx267.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260515-FX267.lcb
样品瓶号: 2-14
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/16 00:32:29
处理时间(V2): 2026/05/18 11:41:57
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX267)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.388	30523	78.390	6604	2169	1.259	--
2	3.817	8414	21.610	814	3253	1.240	12.561
总计		38937	100.000	7418			

图100 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042201批(40mg/2mg规格)-pH1.2介质-30min-片2
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 0-39/18-161-2 - 6042201p-zzp-2-rcqx-pH1.2jz-40mg2mg-30min-P3.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx267.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260515-FX267.lcb

样品瓶号: 2-23

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/16 00:37:53

处理时间(V2): 2026/05/18 11:42:00

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX267)

流 速: 1.5ml/min


波 长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: wangdan

处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.388	29090	85.032	6313	2165	1.253	--
2	3.817	5121	14.968	483	3354	1.079	12.682
总计		34210	100.000	6796			

图101 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042201批(40mg/2mg规格)-pH1.2介质-30min-片3
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 0-39/18-162-2 - 6042201p-zzp-2-rcqx-pH1.2jz-40mg2mg-30min-P4.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx267.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260515-FX267.lcb

样品瓶号: 2-32

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/16 00:43:17

处理时间(V2): 2026/05/18 11:42:03

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX267)

流 速: 1.5ml/min


波 长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: wangdan

处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.388	29483	85.861	6409	2173	1.261	--
2	3.810	4855	14.139	482	3356	1.073	12.678
总计		34338	100.000	6890			

图102 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042201批(40mg/2mg规格)-pH1.2介质-30min-片4
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 0-39/18-163-2 - 6042201p-zzp-2-rcqx-pH1.2jz-40mg2mg-30min-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx267.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260515-FX267.lcb
样品瓶号: 2-41
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/16 00:48:41
处理时间(V2): 2026/05/18 11:42:06
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX267)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.388	28860	85.577	6282	2171	1.251	--
2	3.811	4864	14.423	474	3351	1.212	12.667
总计		33724	100.000	6756			

图103 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042201批(40mg/2mg规格)-pH1.2介质-30min-片5
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 0-39/18-164-2 - 6042201p-zzp-2-rcqx-pH1.2jz-40mg2mg-30min-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx267.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260515-FX267.lcb
样品瓶号: 2-50
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/16 00:54:05
处理时间(V2): 2026/05/18 11:42:10
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX267)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.388	28542	84.775	6179	2173	1.261	--
2	3.818	5126	15.225	489	3425	1.158	12.784
总计		33668	100.000	6668			

图104 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042201批(40mg/2mg规格)-pH1.2介质-30min-片6
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 0-39/18-165-2 - 6042201p-zzp-2-rcqx-pH1.2jz-40mg2mg-45min-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx267.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260515-FX267.lcb
样品瓶号: 2-6
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/16 00:59:30
处理时间(V2): 2026/05/18 11:42:13
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX267)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.389	32779	87.517	7098	2176	1.259	--
2	3.813	4675	12.483	470	3631	1.206	13.028
总计		37454	100.000	7568			

图105 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042201批(40mg/2mg规格)-pH1.2介质-45min-片1
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 0-39/18-166-2 - 6042201p-zzp-2-rcqx-pH1.2jz-40mg2mg-45min-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx267.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260515-FX267.lcb
样品瓶号: 2-15
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/16 01:04:55
处理时间(V2): 2026/05/18 11:42:16
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX267)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.389	33081	87.013	7233	2185	1.261	--
2	3.821	4938	12.987	490	3450	1.084	12.832
总计		38019	100.000	7724			

图106 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042201批(40mg/2mg规格)-pH1.2介质-45min-片2
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 0-39/18-167-2 - 6042201p-zzp-2-rcqx-pH1.2jz-40mg2mg-45min-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx267.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260515-FX267.lcb
样品瓶号: 2-24
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/16 01:10:19
处理时间(V2): 2026/05/18 11:42:19
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX267)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.388	32943	86.791	7190	2181	1.253	--
2	3.817	5014	13.209	504	3505	1.108	12.889
总计		37957	100.000	7694			

图107 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042201批(40mg/2mg规格)-pH1.2介质-45min-片3
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 0-39/18-168-2 - 6042201p-zzp-2-rcqx-pH1.2jz-40mg2mg-45min-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx267.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260515-FX267.lcb
样品瓶号: 2-33
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/16 01:15:44
处理时间(V2): 2026/05/18 11:42:22
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX267)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.389	33252	87.603	7246	2178	1.252	--
2	3.819	4705	12.397	474	3589	1.166	12.996
总计		37958	100.000	7720			

图108 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042201批(40mg/2mg规格)-pH1.2介质-45min-片4
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$QTL-235 - 0-39/18-169-2 - 6042201p-zzp-2-rcqx-pH1.2jz-40mg2mg-45min-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx267.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260515-FX267.lcb
样品瓶号: 2-42
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/16 01:21:09
处理时间(V2): 2026/05/18 11:42:26
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX267)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.389	32775	86.335	7122	2179	1.251	--
2	3.813	5188	13.665	505	2976	1.049	12.165
总计		37962	100.000	7627			

图109 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042201批(40mg/2mg规格)-pH1.2介质-45min-片5
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 0-39/18-170-2 - 6042201p-zzp-2-rcqx-pH1.2jz-40mg2mg-45min-P6.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx267.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260515-FX267.lcb

样品瓶号: 2-51

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/16 01:26:33

处理时间(V2): 2026/05/18 11:42:29

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX267)

流 速: 1.5ml/min


波 长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: wangdan

处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.389	32168	86.543	6995	2176	1.250	--
2	3.813	5002	13.457	488	3643	1.289	13.042
总计		37170	100.000	7483			

图110 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042201批(40mg/2mg规格)-pH1.2介质-45min-片6
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 0-39/18-171-2 - 6042201p-zzp-2-rcqx-pH1.2jz-40mg2mg-60min-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx267.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260515-FX267.lcb
样品瓶号: 2-7
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/16 01:31:57
处理时间(V2): 2026/05/18 11:42:32
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX267)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.388	35302	88.103	7655	2172	1.259	--
2	3.815	4767	11.897	479	3571	1.078	12.962
总计		40069	100.000	8135			

图111 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042201批(40mg/2mg规格)-pH1.2介质-60min-片1
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 0-39/18-172-2 - 6042201p-zzp-2-rcqx-pH1.2jz-40mg2mg-60min-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx267.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260515-FX267.lcb
样品瓶号: 2-16
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/16 01:37:21
处理时间(V2): 2026/05/18 11:42:35
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX267)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.388	35611	88.297	7791	2179	1.251	--
2	3.821	4720	11.703	458	3348	1.214	12.703
总计		40331	100.000	8249			

图112 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042201批(40mg/2mg规格)-pH1.2介质-60min-片2
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 0-39/18-173-2 - 6042201p-zzp-2-rcqx-pH1.2jz-40mg2mg-60min-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx267.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260515-FX267.lcb
样品瓶号: 2-25
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/16 01:42:46
处理时间(V2): 2026/05/18 11:42:39
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX267)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.388	35608	87.658	7741	2172	1.251	--
2	3.819	5014	12.342	488	3210	1.098	12.507
总计		40621	100.000	8229			

图113 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042201批(40mg/2mg规格)-pH1.2介质-60min-片3
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 0-39/18-174-2 - 6042201p-zzp-2-rcqx-pH1.2jz-40mg2mg-60min-P4.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx267.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260515-FX267.lcb

样品瓶号: 2-34

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/16 01:48:10

处理时间(V2): 2026/05/18 11:42:42

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX267)

流 速: 1.5ml/min


波 长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: wangdan

处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.387	35967	88.145	7798	2170	1.253	--
2	3.810	4837	11.855	482	3268	1.249	12.562
总计		40805	100.000	8280			

图114 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042201批(40mg/2mg规格)-pH1.2介质-60min-片4
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 0-39/18-175-2 - 6042201p-zzp-2-rcqx-pH1.2jz-40mg2mg-60min-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx267.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260515-FX267.lcb
样品瓶号: 2-43
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/16 01:53:34
处理时间(V2): 2026/05/18 11:42:45
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX267)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.388	35383	88.620	7687	2171	1.250	--
2	3.817	4543	11.380	460	3192	1.135	12.477
总计		39927	100.000	8147			

图115 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042201批(40mg/2mg规格)-pH1.2介质-60min-片5
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 0-39/18-176-2 - 6042201p-zzp-2-rcqx-pH1.2jz-40mg2mg-60min-P6.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx267.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260515-FX267.lcb

样品瓶号: 2-52

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/16 01:58:59

处理时间(V2): 2026/05/18 11:42:48

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX267)

流 速: 1.5ml/min


波 长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: wangdan

处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.388	35182	88.665	7595	2172	1.262	--
2	3.815	4498	11.335	457	3877	1.193	13.328
总计		39680	100.000	8051			

图116 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042201批(40mg/2mg规格)-pH1.2介质-60min-片6
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 0-39/18-177-2 - 6042201p-zzp-2-rcqx-pH1.2jz-40mg2mg-90min-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx267.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260515-FX267.lcb
样品瓶号: 2-8
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/16 02:04:25
处理时间(V2): 2026/05/18 11:42:51
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX267)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.388	38797	88.696	8441	2172	1.255	--
2	3.818	4944	11.304	484	3325	1.126	12.659
总计		43741	100.000	8925			

图117 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042201批(40mg/2mg规格)-pH1.2介质-90min-片1
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 0-39/18-178-2 - 6042201p-zzp-2-rcqx-pH1.2jz-40mg2mg-90min-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx267.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260515-FX267.lcb
样品瓶号: 2-17
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/16 02:09:50
处理时间(V2): 2026/05/18 11:42:55
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX267)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.388	39131	89.577	8531	2175	1.246	--
2	3.813	4553	10.423	451	3256	1.046	12.555
总计		43684	100.000	8982			

图118 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042201批(40mg/2mg规格)-pH1.2介质-90min-片2
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 0-39/18-179-2 - 6042201p-zzp-2-rcqx-pH1.2jz-40mg2mg-90min-P3.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx267.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260515-FX267.lcb

样品瓶号: 2-26

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/16 02:15:15

处理时间(V2): 2026/05/18 11:42:58

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX267)

流 速: 1.5ml/min


波 长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: wangdan

处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.388	39213	88.943	8494	2169	1.257	--
2	3.816	4875	11.057	478	3097	1.208	12.344
总计		44087	100.000	8972			

图119 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042201批(40mg/2mg规格)-pH1.2介质-90min-片3
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 0-39/18-180-2 - 6042201p-zzp-2-rcqx-pH1.2jz-40mg2mg-90min-P4.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx267.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260515-FX267.lcb

样品瓶号: 2-35

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/16 02:20:40

处理时间(V2): 2026/05/18 11:43:01

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX267)

流 速: 1.5ml/min


波 长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: wangdan

处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.388	39272	90.115	8545	2180	1.254	--
2	3.815	4308	9.885	451	3827	1.077	13.282
总计		43580	100.000	8996			

图120 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042201批(40mg/2mg规格)-pH1.2介质-90min-片4
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 0-39/18-181-2 - 6042201p-zzp-2-rcqx-pH1.2jz-40mg2mg-90min-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx267.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260515-FX267.lcb
样品瓶号: 2-44
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/16 02:26:04
处理时间(V2): 2026/05/18 11:43:04
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX267)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.388	38922	88.227	8440	2169	1.256	--
2	3.817	5194	11.773	517	3411	1.065	12.764
总计		44116	100.000	8957			

图121 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042201批(40mg/2mg规格)-pH1.2介质-90min-片5
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 0-39/18-182-2 - 6042201p-zzp-2-rcqx-pH1.2jz-40mg2mg-90min-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx267.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260515-FX267.lcb
样品瓶号: 2-53
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/16 02:31:29
处理时间(V2): 2026/05/18 11:43:08
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX267)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.388	38435	85.960	8362	2174	1.257	--
2	3.814	6278	14.040	634	3175	1.166	12.446
总计		44713	100.000	8996			

图122 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042201批(40mg/2mg规格)-pH1.2介质-90min-片6
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$QTL-235 - 0-39/18-183-2 - 6042201p-zzp-2-rcqx-pH1.2jz-40mg2mg-120min-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx267.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260515-FX267.lcb
样品瓶号: 4-3
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/16 02:36:53
处理时间(V2): 2026/05/18 11:43:11
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX267)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.388	41322	90.481	8979	2170	1.254	--
2	3.815	4347	9.519	448	3251	1.087	12.548
总计		45669	100.000	9427			

图123 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042201批(40mg/2mg规格)-pH1.2介质-120min-片1
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 0-39/18-184-2 - 6042201p-zzp-2-rcqx-pH1.2jz-40mg2mg-120min-P2.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx267.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260515-FX267.lcb

样品瓶号: 4-10

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/16 02:42:16

处理时间(V2): 2026/05/18 11:43:14

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX267)

流 速: 1.5ml/min


波 长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: wangdan

处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.388	40727	90.068	8882	2178	1.253	--
2	3.809	4491	9.932	442	3417	1.258	12.758
总计		45218	100.000	9324			

图124 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042201批(40mg/2mg规格)-pH1.2介质-120min-片2
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 0-39/18-185-2 - 6042201p-zzp-2-rcqx-pH1.2jz-40mg2mg-120min-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx267.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260515-FX267.lcb
样品瓶号: 4-19
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/16 02:47:40
处理时间(V2): 2026/05/18 11:43:17
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX267)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.389	41057	89.924	8945	2183	1.256	--
2	3.812	4600	10.076	466	3891	1.218	13.337
总计		45657	100.000	9411			

图125 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042201批(40mg/2mg规格)-pH1.2介质-120min-片3
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 0-39/18-186-2 - 6042201p-zzp-2-rcqx-pH1.2jz-40mg2mg-120min-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx267.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260515-FX267.lcb
样品瓶号: 4-28
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/16 02:53:04
处理时间(V2): 2026/05/18 11:43:21
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX267)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.388	41091	89.536	8940	2176	1.253	--
2	3.815	4802	10.464	464	3192	1.162	12.470
总计		45894	100.000	9404			

图126 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042201批(40mg/2mg规格)-pH1.2介质-120min-片4
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 0-39/18-187-2 - 6042201p-zzp-2-rcqx-pH1.2jz-40mg2mg-120min-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx267.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260515-FX267.lcb
样品瓶号: 4-37
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/16 02:58:27
处理时间(V2): 2026/05/18 11:43:24
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX267)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.389	41375	89.257	8955	2174	1.254	--
2	3.815	4980	10.743	490	3318	1.060	12.636
总计		46354	100.000	9445			

图127 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042201批(40mg/2mg规格)-pH1.2介质-120min-片5
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 0-39/18-188-2 - 6042201p-zzp-2-rcqx-pH1.2jz-40mg2mg-120min-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx267.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260515-FX267.lcb
样品瓶号: 4-46
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/16 03:03:50
处理时间(V2): 2026/05/18 11:43:27
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX267)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.389	41075	90.697	8915	2177	1.253	--
2	3.817	4213	9.303	431	3563	0.960	12.959
总计		45288	100.000	9347			

图128 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042201批(40mg/2mg规格)-pH1.2介质-120min-片6
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 0-39/18-189-2 - 6042201p-zzp-2-rcqx-pH1.2jz-40mg2mg-JX-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx267.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260515-FX267.lcb
样品瓶号: 4-4
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/16 03:09:14
处理时间(V2): 2026/05/18 11:43:30
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX267)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.388	41902	91.420	9116	2180	1.251	--
2	3.819	3933	8.580	420	4009	1.088	13.494
总计		45835	100.000	9535			

图129 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042201批(40mg/2mg规格)-pH1.2介质-极限转速-片1
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 0-39/18-190-2 - 6042201p-zzp-2-rcqx-pH1.2jz-40mg2mg-JX-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx267.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260515-FX267.lcb
样品瓶号: 4-11
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/16 03:14:37
处理时间(V2): 2026/05/18 11:43:33
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX267)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.389	41462	89.164	9027	2172	1.255	--
2	3.819	5039	10.836	495	3544	1.131	12.933
总计		46501	100.000	9521			

图130 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042201批(40mg/2mg规格)-pH1.2介质-极限转速-片2
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 0-39/18-191-2 - 6042201p-zzp-2-rcqx-pH1.2jz-40mg2mg-JX-P3.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx267.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260515-FX267.lcb

样品瓶号: 4-20

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/16 03:20:00

处理时间(V2): 2026/05/18 11:43:37

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX267)

流 速: 1.5ml/min


波 长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: wangdan

处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.388	42238	89.574	9141	2163	1.253	--
2	3.814	4916	10.426	484	3401	1.168	12.736
总计		47155	100.000	9624			

图131 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042201批(40mg/2mg规格)-pH1.2介质-极限转速-片3
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 0-39/18-192-2 - 6042201p-zzp-2-rcqx-pH1.2jz-40mg2mg-JX-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx267.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260515-FX267.lcb
样品瓶号: 4-29
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/16 03:25:24
处理时间(V2): 2026/05/18 11:43:40
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX267)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.388	41429	90.434	9040	2176	1.247	--
2	3.811	4382	9.566	442	3333	1.139	12.651
总计		45811	100.000	9482			

图132 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042201批(40mg/2mg规格)-pH1.2介质-极限转速-片4
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 0-39/18-193-2 - 6042201p-zzp-2-rcqx-pH1.2jz-40mg2mg-JX-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx267.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260515-FX267.lcb
样品瓶号: 4-38
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/16 03:30:48
处理时间(V2): 2026/05/18 11:43:44
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX267)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.388	41640	89.309	9088	2177	1.250	--
2	3.810	4985	10.691	489	3382	1.198	12.712
总计		46624	100.000	9577			

图133 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042201批(40mg/2mg规格)-pH1.2介质-极限转速-片5
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 0-39/18-194-2 - 6042201p-zzp-2-rcqx-pH1.2jz-40mg2mg-JX-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx267.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260515-FX267.lcb
样品瓶号: 4-47
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/16 03:36:12
处理时间(V2): 2026/05/18 11:43:47
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX267)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.388	41982	89.778	9114	2171	1.255	--
2	3.818	4780	10.222	471	3748	1.089	13.183
总计		46762	100.000	9584			

图134 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042201批(40mg/2mg规格)-pH1.2介质-极限转速-片6
供试品溶液-1



QTL-235


<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 0-39/18-195-2 - 6042201p-zzp-2-rcqx-pH1.2jz-40mg2mg-dz2-1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx267.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260515-FX267.lcb
样品瓶号: 2-27
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/16 03:41:36
处理时间(V2): 2026/05/18 11:43:50
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX267)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm

版本号: 6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.376	72733	12.582	13931	1646	1.238	--
2	3.728	505323	87.418	45537	2687	1.366	11.113
总计		578056	100.000	59467			

图135 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042201批(40mg/2mg规格)-pH1.2介质
对照品溶液-2-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 0-39/18-196-2 - 6042201p-zzp-2-rcqx-pH1.2jz-40mg2mg-dz2-2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx267.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260515-FX267.lcb
样品瓶号: 2-27
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/16 03:47:01
处理时间(V2): 2026/05/18 11:43:54
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX267)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.376	72874	12.614	13911	1638	1.236	--
2	3.726	504847	87.386	45461	2689	1.364	11.103
总计		577721	100.000	59372			

图136 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042201批(40mg/2mg规格)-pH1.2介质
对照品溶液-2-2




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 0-39/18-197-2 - 6042401p-zzp-1-rcqx-pH1.2jz-40mg2mg-rj.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx267.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260515-FX267.lcb
样品瓶号: 3-9
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/16 03:52:24
处理时间(V2): 2026/05/18 11:43:57
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX267)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图137 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042401批(40mg/2mg规格)-pH1.2介质
溶剂



QTL-235


<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$QTL-235 - 0-39/18-198-2 - 6042401p-zzp-1-rcqx-pH1.2jz-40mg2mg-dz1-1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx267.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260515-FX267.lcb
样品瓶号: 3-18
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/16 03:57:47
处理时间(V2): 2026/05/18 11:44:00
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX267)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm

版本号: 6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.376	71676	12.528	13693	1635	1.238	--
2	3.727	500467	87.472	45087	2687	1.363	11.097
总计		572143	100.000	58779			

图138 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042401批(40mg/2mg规格)-pH1.2介质
对照品溶液-1-1



QTL-235


<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$QTL-235 - 0-39/18-199-2 - 6042401p-zzp-1-rcqx-pH1.2jz-40mg2mg-dz1-2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx267.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260515-FX267.lcb
样品瓶号: 3-18
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/16 04:03:10
处理时间(V2): 2026/05/18 11:44:03
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX267)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm

版本号: 6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.376	71980	12.582	13735	1640	1.236	--
2	3.725	500090	87.418	45133	2695	1.359	11.109
总计		572070	100.000	58869			

图139 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042401批(40mg/2mg规格)-pH1.2介质
对照品溶液-1-2



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 0-39/18-200-2 - 6042401p-zzp-1-rcqx-pH1.2jz-40mg2mg-dz1-3.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx267.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260515-FX267.lcb

样品瓶号: 3-18

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/16 04:08:33

处理时间(V2): 2026/05/18 11:44:07

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX267)

流 速: 1.5ml/min


波 长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: wangdan

处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.376	72241	12.624	13781	1640	1.235	--
2	3.723	500009	87.376	45192	2696	1.360	11.108
总计		572249	100.000	58973			

图140 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042401批(40mg/2mg规格)-pH1.2介质
对照品溶液-1-3



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 0-39/18-201-2 - 6042401p-zzp-1-rcqx-pH1.2jz-40mg2mg-dz1-4.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx267.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260515-FX267.lcb

样品瓶号: 3-18

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/16 04:13:56

处理时间(V2): 2026/05/18 11:44:10

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX267)

流速: 1.5ml/min


波长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: wangdan

处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.376	71979	12.580	13754	1639	1.233	--
2	3.723	500196	87.420	45195	2698	1.361	11.104
总计		572175	100.000	58949			

图141 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042401批(40mg/2mg规格)-pH1.2介质
对照品溶液-1-4



QTL-235


<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 0-39/18-202-2 - 6042401p-zzp-1-rcqx-pH1.2jz-40mg2mg-dz1-5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx267.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260515-FX267.lcb
样品瓶号: 3-18
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/16 04:19:19
处理时间(V2): 2026/05/18 11:44:13
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX267)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm

版本号: 6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.376	71943	12.563	13764	1643	1.236	--
2	3.722	500723	87.437	45237	2700	1.360	11.109
总计		572666	100.000	59000			

图142 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042401批(40mg/2mg规格)-pH1.2介质
对照品溶液-1-5




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 0-39/18-203-2 - 6042401p-zzp-1-rcqx-pH1.2jz-40mg2mg-5min-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx267.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260515-FX267.lcb
样品瓶号: 3-1
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/16 04:24:42
处理时间(V2): 2026/05/18 11:44:16
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX267)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.389	7976	71.783	1746	2176	1.222	--
2	3.808	3135	28.217	326	3670	1.065	13.058
总计		11112	100.000	2072			

图143 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042401批(40mg/2mg规格)-pH1.2介质-5min-片1
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 0-39/18-204-2 - 6042401p-zzp-1-rcqx-pH1.2jz-40mg2mg-5min-P2.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx267.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260515-FX267.lcb

样品瓶号: 3-10

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/16 04:30:04

处理时间(V2): 2026/05/18 11:44:19

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX267)

流 速: 1.5ml/min


波 长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: wangdan

处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.389	9619	72.357	2092	2167	1.230	--
2	3.811	3675	27.643	373	3578	1.180	12.946
总计		13294	100.000	2465			

图144 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042401批(40mg/2mg规格)-pH1.2介质-5min-片2
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 0-39/18-205-2 - 6042401p-zzp-1-rcqx-pH1.2jz-40mg2mg-5min-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx267.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260515-FX267.lcb
样品瓶号: 3-19
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/16 04:35:27
处理时间(V2): 2026/05/18 11:44:23
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX267)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.389	8108	67.923	1790	2195	1.232	--
2	3.816	3829	32.077	396	3727	1.045	13.168
总计		11937	100.000	2187			

图145 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042401批(40mg/2mg规格)-pH1.2介质-5min-片3
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 0-39/18-206-2 - 6042401p-zzp-1-rcqx-pH1.2jz-40mg2mg-5min-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx267.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260515-FX267.lcb
样品瓶号: 3-28
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/16 04:40:50
处理时间(V2): 2026/05/18 11:44:26
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX267)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.389	8379	74.560	1818	2156	1.251	--
2	3.812	2859	25.440	291	3337	1.258	12.635
总计		11238	100.000	2109			

图146 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042401批(40mg/2mg规格)-pH1.2介质-5min-片4
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 0-39/18-207-2 - 6042401p-zzp-1-rcqx-pH1.2jz-40mg2mg-5min-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx267.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260515-FX267.lcb
样品瓶号: 3-37
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/16 04:46:13
处理时间(V2): 2026/05/18 11:44:29
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX267)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.389	7161	71.676	1591	2203	1.232	--
2	3.809	2830	28.324	286	3546	1.138	12.932
总计		9991	100.000	1877			

图147 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042401批(40mg/2mg规格)-pH1.2介质-5min-片5
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 0-39/18-208-2 - 6042401p-zzp-1-rcqx-pH1.2jz-40mg2mg-5min-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx267.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260515-FX267.lcb
样品瓶号: 3-46
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/16 04:51:36
处理时间(V2): 2026/05/18 11:44:32
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX267)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.389	7624	72.472	1658	2160	1.246	--
2	3.815	2896	27.528	293	3617	1.146	12.998
总计		10520	100.000	1951			

图148 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042401批(40mg/2mg规格)-pH1.2介质-5min-片6
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 0-39/18-209-2 - 6042401p-zzp-1-rcqx-pH1.2jz-40mg2mg-10min-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx267.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260515-FX267.lcb
样品瓶号: 3-2
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/16 04:56:58
处理时间(V2): 2026/05/18 11:44:35
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX267)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.389	16645	78.797	3618	2158	1.240	--
2	3.816	4479	21.203	453	3242	1.094	12.519
总计		21124	100.000	4071			

图149 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042401批(40mg/2mg规格)-pH1.2介质-10min-片1
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 0-39/18-210-2 - 6042401p-zzp-1-rcqx-pH1.2jz-40mg2mg-10min-P2.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx267.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260515-FX267.lcb

样品瓶号: 3-11

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/16 05:02:21

处理时间(V2): 2026/05/18 11:44:38

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX267)

流 速: 1.5ml/min


波 长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: wangdan

处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.389	17187	79.227	3766	2178	1.246	--
2	3.817	4506	20.773	449	3442	1.158	12.804
总计		21693	100.000	4215			

图150 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042401批(40mg/2mg规格)-pH1.2介质-10min-片2
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 0-39/18-211-2 - 6042401p-zzp-1-rcqx-pH1.2jz-40mg2mg-10min-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx267.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260515-FX267.lcb
样品瓶号: 3-20
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/16 05:07:44
处理时间(V2): 2026/05/18 11:44:41
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX267)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.389	15996	76.917	3480	2154	1.239	--
2	3.816	4800	23.083	474	3492	1.023	12.841
总计		20797	100.000	3954			

图151 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042401批(40mg/2mg规格)-pH1.2介质-10min-片3
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 0-39/18-212-2 - 6042401p-zzp-1-rcqx-pH1.2jz-40mg2mg-10min-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx267.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260515-FX267.lcb
样品瓶号: 3-29
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/16 05:13:06
处理时间(V2): 2026/05/18 11:44:45
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX267)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.389	17226	79.743	3681	2170	1.259	--
2	3.805	4376	20.257	429	3322	1.264	12.607
总计		21602	100.000	4110			

图152 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042401批(40mg/2mg规格)-pH1.2介质-10min-片4
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 0-39/18-213-2 - 6042401p-zzp-1-rcqx-pH1.2jz-40mg2mg-10min-P5.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx267.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260515-FX267.lcb

样品瓶号: 3-38

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/16 05:18:29

处理时间(V2): 2026/05/18 11:44:48

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX267)

流速: 1.5ml/min


波长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: wangdan

处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.390	16038	78.142	3466	2158	1.259	--
2	3.819	4486	21.858	442	3505	1.086	12.865
总计		20524	100.000	3908			

图153 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042401批(40mg/2mg规格)-pH1.2介质-10min-片5
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 0-39/18-214-2 - 6042401p-zzp-1-rcqx-pH1.2jz-40mg2mg-10min-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx267.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260515-FX267.lcb
样品瓶号: 3-47
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/16 05:23:51
处理时间(V2): 2026/05/18 11:44:51
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX267)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.390	16378	77.658	3566	2176	1.245	--
2	3.814	4712	22.342	447	3061	1.185	12.275
总计		21090	100.000	4013			

图154 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042401批(40mg/2mg规格)-pH1.2介质-10min-片6
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 0-39/18-215-2 - 6042401p-zzp-1-rcqx-pH1.2jz-40mg2mg-15min-P1.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx267.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260515-FX267.lcb

样品瓶号: 3-3

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/16 05:29:14

处理时间(V2): 2026/05/18 11:44:54

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX267)

流 速: 1.5ml/min


波 长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: wangdan

处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.389	21503	81.103	4679	2174	1.256	--
2	3.812	5010	18.897	483	3353	1.228	12.675
总计		26513	100.000	5162			

图155 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042401批(40mg/2mg规格)-pH1.2介质-15min-片1
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$QTL-235 - 0-39/18-216-2 - 6042401p-zzp-1-rcqx-pH1.2jz-40mg2mg-15min-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx267.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260515-FX267.lcb
样品瓶号: 3-12
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/16 05:34:36
处理时间(V2): 2026/05/18 11:44:57
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX267)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.389	21603	80.491	4696	2165	1.257	--
2	3.814	5236	19.509	512	3190	1.214	12.449
总计		26839	100.000	5208			

图156 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042401批(40mg/2mg规格)-pH1.2介质-15min-片2
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 0-39/18-217-2 - 6042401p-zzp-1-rcqx-pH1.2jz-40mg2mg-15min-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx267.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260515-FX267.lcb
样品瓶号: 3-21
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/16 05:39:58
处理时间(V2): 2026/05/18 11:45:00
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX267)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.389	20840	81.898	4530	2173	1.251	--
2	3.821	4606	18.102	454	3015	0.991	12.232
总计		25446	100.000	4984			

图157 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042401批(40mg/2mg规格)-pH1.2介质-15min-片3
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 0-39/18-218-2 - 6042401p-zzp-1-rcqx-pH1.2jz-40mg2mg-15min-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx267.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260515-FX267.lcb
样品瓶号: 3-30
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/16 05:45:21
处理时间(V2): 2026/05/18 11:45:03
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX267)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.389	21620	81.135	4685	2174	1.258	--
2	3.814	5027	18.865	497	3556	1.118	12.930
总计		26646	100.000	5182			

图158 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042401批(40mg/2mg规格)-pH1.2介质-15min-片4
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 0-39/18-219-2 - 6042401p-zzp-1-rcqx-pH1.2jz-40mg2mg-15min-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx267.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260515-FX267.lcb
样品瓶号: 3-39
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/16 05:50:43
处理时间(V2): 2026/05/18 11:45:06
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX267)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.389	21104	83.389	4569	2168	1.254	--
2	3.818	4204	16.611	427	3664	1.050	13.071
总计		25308	100.000	4996			

图159 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042401批(40mg/2mg规格)-pH1.2介质-15min-片5
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 0-39/18-220-2 - 6042401p-zzp-1-rcqx-pH1.2jz-40mg2mg-15min-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx267.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260515-FX267.lcb
样品瓶号: 3-48
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/16 05:56:06
处理时间(V2): 2026/05/18 11:45:09
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX267)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.389	21431	81.140	4648	2176	1.256	--
2	3.818	4981	18.860	514	3516	0.996	12.895
总计		26412	100.000	5161			

图160 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042401批(40mg/2mg规格)-pH1.2介质-15min-片6
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 0-39/18-221-2 - 6042401p-zzp-1-rcqx-pH1.2jz-40mg2mg-20min-P1.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx267.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260515-FX267.lcb

样品瓶号: 3-4

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/16 06:01:28

处理时间(V2): 2026/05/18 11:45:13

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX267)

流 速: 1.5ml/min


波 长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: wangdan

处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.388	24616	85.061	5362	2164	1.258	--
2	3.812	4323	14.939	456	3417	1.081	12.750
总计		28939	100.000	5819			

图161 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042401批(40mg/2mg规格)-pH1.2介质-20min-片1
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 0-39/18-222-2 - 6042401p-zzp-1-rcqx-pH1.2jz-40mg2mg-20min-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx267.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260515-FX267.lcb
样品瓶号: 3-13
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/16 06:06:50
处理时间(V2): 2026/05/18 11:45:16
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX267)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.389	24878	81.743	5447	2175	1.251	--
2	3.815	5557	18.257	535	3188	1.225	12.463
总计		30435	100.000	5982			

图162 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042401批(40mg/2mg规格)-pH1.2介质-20min-片2
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 0-39/18-223-2 - 6042401p-zzp-1-rcqx-pH1.2jz-40mg2mg-20min-P3.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx267.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260515-FX267.lcb

样品瓶号: 3-22

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/16 06:12:12

处理时间(V2): 2026/05/18 11:45:19

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX267)

流 速: 1.5ml/min


波 长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: wangdan

处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.389	24449	80.694	5326	2173	1.263	--
2	3.817	5849	19.306	589	3474	0.975	12.842
总计		30298	100.000	5914			

图163 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042401批(40mg/2mg规格)-pH1.2介质-20min-片3
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 0-39/18-224-2 - 6042401p-zzp-1-rcqx-pH1.2jz-40mg2mg-20min-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx267.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260515-FX267.lcb
样品瓶号: 3-31
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/16 06:17:34
处理时间(V2): 2026/05/18 11:45:22
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX267)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.389	24634	84.085	5345	2186	1.255	--
2	3.820	4663	15.915	461	3449	1.158	12.830
总计		29297	100.000	5806			

图164 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042401批(40mg/2mg规格)-pH1.2介质-20min-片4
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 0-39/18-225-2 - 6042401p-zzp-1-rcqx-pH1.2jz-40mg2mg-20min-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx267.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260515-FX267.lcb
样品瓶号: 3-40
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/16 06:22:57
处理时间(V2): 2026/05/18 11:45:25
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX267)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.388	24100	84.325	5247	2179	1.261	--
2	3.815	4480	15.675	444	3021	1.113	12.238
总计		28579	100.000	5692			

图165 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042401批(40mg/2mg规格)-pH1.2介质-20min-片5
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 0-39/18-226-2 - 6042401p-zzp-1-rcqx-pH1.2jz-40mg2mg-20min-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx267.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260515-FX267.lcb
样品瓶号: 3-49
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/16 06:28:19
处理时间(V2): 2026/05/18 11:45:28
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX267)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.388	24188	85.204	5274	2180	1.249	--
2	3.817	4200	14.796	431	3469	1.137	12.846
总计		28388	100.000	5705			

图166 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042401批(40mg/2mg规格)-pH1.2介质-20min-片6
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 0-39/18-227-2 - 6042401p-zzp-1-rcqx-pH1.2jz-40mg2mg-30min-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx267.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260515-FX267.lcb
样品瓶号: 3-5
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/16 06:33:41
处理时间(V2): 2026/05/18 11:45:31
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX267)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.388	28945	86.470	6281	2181	1.255	--
2	3.815	4529	13.530	459	3813	1.116	13.258
总计		33474	100.000	6740			

图167 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042401批(40mg/2mg规格)-pH1.2介质-30min-片1
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 0-39/18-228-2 - 6042401p-zzp-1-rcqx-pH1.2jz-40mg2mg-30min-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx267.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260515-FX267.lcb
样品瓶号: 3-14
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/16 06:39:04
处理时间(V2): 2026/05/18 11:45:34
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX267)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.388	28776	85.379	6272	2180	1.247	--
2	3.811	4928	14.621	472	3254	1.166	12.546
总计		33704	100.000	6745			

图168 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042401批(40mg/2mg规格)-pH1.2介质-30min-片2
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 0-39/18-229-2 - 6042401p-zzp-1-rcqx-pH1.2jz-40mg2mg-30min-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx267.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260515-FX267.lcb
样品瓶号: 3-23
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/16 06:44:26
处理时间(V2): 2026/05/18 11:45:38
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX267)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.388	28496	86.805	6190	2169	1.249	--
2	3.811	4332	13.195	450	3404	1.056	12.733
总计		32827	100.000	6639			

图169 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042401批(40mg/2mg规格)-pH1.2介质-30min-片3
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 0-39/18-230-2 - 6042401p-zzp-1-rcqx-pH1.2jz-40mg2mg-30min-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx267.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260515-FX267.lcb
样品瓶号: 3-32
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/16 06:49:48
处理时间(V2): 2026/05/18 11:45:41
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX267)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.388	28640	87.008	6228	2171	1.247	--
2	3.809	4276	12.992	438	3253	1.109	12.533
总计		32916	100.000	6666			

图170 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042401批(40mg/2mg规格)-pH1.2介质-30min-片4
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 0-39/18-231-2 - 6042401p-zzp-1-rcqx-pH1.2jz-40mg2mg-30min-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx267.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260515-FX267.lcb
样品瓶号: 3-41
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/16 06:55:10
处理时间(V2): 2026/05/18 11:45:44
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX267)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.388	28188	86.251	6146	2188	1.248	--
2	3.812	4493	13.749	450	3497	1.099	12.871
总计		32681	100.000	6595			

图171 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042401批(40mg/2mg规格)-pH1.2介质-30min-片5
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 0-39/18-232-2 - 6042401p-zzp-1-rcqx-pH1.2jz-40mg2mg-30min-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx267.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260515-FX267.lcb
样品瓶号: 3-50
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/16 07:00:32
处理时间(V2): 2026/05/18 11:45:47
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX267)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.388	28344	86.428	6162	2183	1.258	--
2	3.814	4451	13.572	444	3552	1.028	12.942
总计		32794	100.000	6606			

图172 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042401批(40mg/2mg规格)-pH1.2介质-30min-片6
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 0-39/18-233-2 - 6042401p-zzp-1-rcqx-pH1.2jz-40mg2mg-45min-P1.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx267.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260515-FX267.lcb

样品瓶号: 3-6

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/16 07:05:55

处理时间(V2): 2026/05/18 11:45:50

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX267)

流 速: 1.5ml/min


波 长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: wangdan

处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.388	32856	88.155	7146	2170	1.251	--
2	3.817	4415	11.845	446	3521	0.977	12.902
总计		37271	100.000	7592			

图173 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042401批(40mg/2mg规格)-pH1.2介质-45min-片1
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 0-39/18-234-2 - 6042401p-zzp-1-rcqx-pH1.2jz-40mg2mg-45min-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx267.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260515-FX267.lcb
样品瓶号: 3-15
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/16 07:11:17
处理时间(V2): 2026/05/18 11:45:53
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX267)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.388	32746	87.639	7123	2178	1.251	--
2	3.814	4619	12.361	462	3370	1.148	12.705
总计		37365	100.000	7585			

图174 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042401批(40mg/2mg规格)-pH1.2介质-45min-片2
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 0-39/18-235-2 - 6042401p-zzp-1-rcqx-pH1.2jz-40mg2mg-45min-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx267.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260515-FX267.lcb
样品瓶号: 3-24
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/16 07:16:39
处理时间(V2): 2026/05/18 11:45:56
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX267)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.388	32401	87.983	7082	2184	1.252	--
2	3.807	4426	12.017	454	3250	1.181	12.534
总计		36827	100.000	7536			

图175 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042401批(40mg/2mg规格)-pH1.2介质-45min-片3
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$QTL-235 - 0-39/18-236-2 - 6042401p-zzp-1-rcqx-pH1.2jz-40mg2mg-45min-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx267.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260515-FX267.lcb
样品瓶号: 3-33
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/16 07:22:01
处理时间(V2): 2026/05/18 11:46:00
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX267)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.388	32669	85.377	7119	2185	1.252	--
2	3.814	5595	14.623	563	3307	1.132	12.629
总计		38265	100.000	7682			

图176 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042401批(40mg/2mg规格)-pH1.2介质-45min-片4
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 0-39/18-237-2 - 6042401p-zzp-1-rcqx-pH1.2jz-40mg2mg-45min-P5.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx267.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260515-FX267.lcb

样品瓶号: 3-42

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/16 07:27:22

处理时间(V2): 2026/05/18 11:46:03

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX267)

流 速: 1.5ml/min


波 长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: wangdan

处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.389	32479	87.720	7043	2181	1.254	--
2	3.817	4547	12.280	456	3531	1.113	12.915
总计		37025	100.000	7498			

图177 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042401批(40mg/2mg规格)-pH1.2介质-45min-片5
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 0-39/18-238-2 - 6042401p-zzp-1-rcqx-pH1.2jz-40mg2mg-45min-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx267.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260515-FX267.lcb
样品瓶号: 3-51
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/16 07:32:44
处理时间(V2): 2026/05/18 11:46:06
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX267)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.389	32091	87.924	6976	2180	1.251	--
2	3.814	4408	12.076	445	3365	1.139	12.695
总计		36498	100.000	7421			

图178 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042401批(40mg/2mg规格)-pH1.2介质-45min-片6
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 0-39/18-239-2 - 6042401p-zzp-1-rcqx-pH1.2jz-40mg2mg-60min-P1.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx267.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260515-FX267.lcb

样品瓶号: 3-7

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/16 07:38:06

处理时间(V2): 2026/05/18 11:46:09

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX267)

流 速: 1.5ml/min


波 长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: wangdan

处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.389	35716	89.096	7765	2181	1.254	--
2	3.816	4371	10.904	437	3383	1.058	12.726
总计		40087	100.000	8202			

图179 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042401批(40mg/2mg规格)-pH1.2介质-60min-片1
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 0-39/18-240-2 - 6042401p-zzp-1-rcqx-pH1.2jz-40mg2mg-60min-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx267.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260515-FX267.lcb
样品瓶号: 3-16
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/16 07:43:28
处理时间(V2): 2026/05/18 11:46:12
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX267)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.389	35239	89.029	7691	2179	1.246	--
2	3.811	4342	10.971	449	3275	1.112	12.571
总计		39581	100.000	8139			

图180 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042401批(40mg/2mg规格)-pH1.2介质-60min-片2
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 0-39/18-241-2 - 6042401p-zzp-1-rcqx-pH1.2jz-40mg2mg-60min-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx267.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260515-FX267.lcb
样品瓶号: 3-25
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/16 07:48:50
处理时间(V2): 2026/05/18 11:46:15
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX267)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.389	35232	87.649	7647	2178	1.255	--
2	3.815	4965	12.351	492	3583	1.149	12.972
总计		40197	100.000	8139			

图181 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042401批(40mg/2mg规格)-pH1.2介质-60min-片3
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$QTL-235 - 0-39/18-242-2 - 6042401p-zzp-1-rcqx-pH1.2jz-40mg2mg-60min-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx267.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260515-FX267.lcb
样品瓶号: 3-34
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/16 07:54:12
处理时间(V2): 2026/05/18 11:46:18
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX267)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.388	35362	88.394	7682	2182	1.252	--
2	3.818	4643	11.606	465	3471	1.165	12.854
总计		40006	100.000	8147			

图182 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042401批(40mg/2mg规格)-pH1.2介质-60min-片4
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 0-39/18-243-2 - 6042401p-zzp-1-rcqx-pH1.2jz-40mg2mg-60min-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx267.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260515-FX267.lcb
样品瓶号: 3-43
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/16 07:59:35
处理时间(V2): 2026/05/18 11:46:21
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX267)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.389	35296	85.022	7695	2184	1.256	--
2	3.815	6218	14.978	598	3352	1.156	12.687
总计		41514	100.000	8293			

图183 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042401批(40mg/2mg规格)-pH1.2介质-60min-片5
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 0-39/18-244-2 - 6042401p-zzp-1-rcqx-pH1.2jz-40mg2mg-60min-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx267.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260515-FX267.lcb
样品瓶号: 3-52
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/16 08:04:56
处理时间(V2): 2026/05/18 11:46:24
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX267)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.389	34632	89.137	7550	2190	1.253	--
2	3.808	4220	10.863	413	3147	1.229	12.395
总计		38852	100.000	7963			

图184 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042401批(40mg/2mg规格)-pH1.2介质-60min-片6
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 0-39/18-245-2 - 6042401p-zzp-1-rcqx-pH1.2jz-40mg2mg-90min-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx267.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260515-FX267.lcb
样品瓶号: 3-8
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/16 08:10:18
处理时间(V2): 2026/05/18 11:46:28
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX267)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.388	39014	89.567	8532	2187	1.249	--
2	3.811	4544	10.433	451	3514	1.149	12.888
总计		43559	100.000	8983			

图185 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042401批(40mg/2mg规格)-pH1.2介质-90min-片1
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 0-39/18-246-2 - 6042401p-zzp-1-rcqx-pH1.2jz-40mg2mg-90min-P2.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx267.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260515-FX267.lcb

样品瓶号: 3-17

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/16 08:15:41

处理时间(V2): 2026/05/18 11:46:31

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX267)

流 速: 1.5ml/min


波 长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: wangdan

处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.388	38684	88.798	8451	2190	1.253	--
2	3.812	4880	11.202	505	3647	1.106	13.058
总计		43564	100.000	8955			

图186 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042401批(40mg/2mg规格)-pH1.2介质-90min-片2
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 0-39/18-247-2 - 6042401p-zzp-1-rcqx-pH1.2jz-40mg2mg-90min-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx267.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260515-FX267.lcb
样品瓶号: 3-26
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/16 08:21:04
处理时间(V2): 2026/05/18 11:46:34
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX267)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.389	38696	89.435	8418	2180	1.245	--
2	3.819	4571	10.565	449	3344	1.033	12.680
总计		43267	100.000	8867			

图187 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042401批(40mg/2mg规格)-pH1.2介质-90min-片3
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 0-39/18-248-2 - 6042401p-zzp-1-rcqx-pH1.2jz-40mg2mg-90min-P4.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx267.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260515-FX267.lcb

样品瓶号: 3-35

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/16 08:26:27

处理时间(V2): 2026/05/18 11:46:37

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX267)

流 速: 1.5ml/min


波 长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: wangdan

处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.389	38683	89.413	8444	2184	1.253	--
2	3.808	4580	10.587	462	3390	1.079	12.714
总计		43264	100.000	8906			

图188 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042401批(40mg/2mg规格)-pH1.2介质-90min-片4
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 0-39/18-249-2 - 6042401p-zzp-1-rcqx-pH1.2jz-40mg2mg-90min-P5.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx267.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260515-FX267.lcb

样品瓶号: 3-44

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/16 08:31:50

处理时间(V2): 2026/05/18 11:46:40

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX267)

流 速: 1.5ml/min


波 长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: wangdan

处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.389	38702	86.879	8433	2180	1.249	--
2	3.810	5845	13.121	574	3141	1.016	12.385
总计		44547	100.000	9007			

图189 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042401批(40mg/2mg规格)-pH1.2介质-90min-片5
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 0-39/18-250-2 - 6042401p-zzp-1-rcqx-pH1.2jz-40mg2mg-90min-P6.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx267.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260515-FX267.lcb

样品瓶号: 3-53

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/16 08:37:13

处理时间(V2): 2026/05/18 11:46:43

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX267)

流 速: 1.5ml/min


波 长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: wangdan

处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.388	38223	89.778	8345	2181	1.248	--
2	3.814	4352	10.222	451	3530	1.024	12.915
总计		42574	100.000	8796			

图190 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042401批(40mg/2mg规格)-pH1.2介质-90min-片6
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 0-39/18-251-2 - 6042401p-zzp-1-rcqx-pH1.2jz-40mg2mg-120min-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx267.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260515-FX267.lcb
样品瓶号: 4-5
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/16 08:42:37
处理时间(V2): 2026/05/18 11:46:46
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX267)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.389	41229	90.282	9006	2192	1.249	--
2	3.812	4438	9.718	450	3381	1.167	12.721
总计		45667	100.000	9457			

图191 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042401批(40mg/2mg规格)-pH1.2介质-120min-片1
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 0-39/18-252-2 - 6042401p-zzp-1-rcqx-pH1.2jz-40mg2mg-120min-P2.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx267.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260515-FX267.lcb

样品瓶号: 4-10

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/16 08:48:00

处理时间(V2): 2026/05/18 11:46:50

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX267)

流 速: 1.5ml/min


波 长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: wangdan

处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.389	40901	90.255	8876	2174	1.255	--
2	3.813	4416	9.745	442	3218	1.146	12.490
总计		45317	100.000	9318			

图192 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042401批(40mg/2mg规格)-pH1.2介质-120min-片2
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 0-39/18-253-2 - 6042401p-zzp-1-rcqx-pH1.2jz-40mg2mg-120min-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx267.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260515-FX267.lcb
样品瓶号: 4-19
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/16 08:53:23
处理时间(V2): 2026/05/18 11:46:53
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX267)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.389	40982	89.638	8932	2185	1.254	--
2	3.818	4737	10.362	460	3351	1.101	12.693
总计		45719	100.000	9392			

图193 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042401批(40mg/2mg规格)-pH1.2介质-120min-片3
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$QTL-235 - 0-39/18-254-2 - 6042401p-zzp-1-rcqx-pH1.2jz-40mg2mg-120min-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx267.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260515-FX267.lcb
样品瓶号: 4-28
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/16 08:58:46
处理时间(V2): 2026/05/18 11:46:56
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX267)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.389	40870	90.991	8920	2195	1.255	--
2	3.818	4047	9.009	419	3769	1.091	13.222
总计		44916	100.000	9339			

图194 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042401批(40mg/2mg规格)-pH1.2介质-120min-片4
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 0-39/18-255-2 - 6042401p-zzp-1-rcqx-pH1.2jz-40mg2mg-120min-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx267.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260515-FX267.lcb
样品瓶号: 4-37
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/16 09:04:09
处理时间(V2): 2026/05/18 11:46:59
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX267)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.389	41118	89.740	8944	2179	1.254	--
2	3.811	4701	10.260	462	3599	1.114	12.981
总计		45819	100.000	9406			

图195 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042401批(40mg/2mg规格)-pH1.2介质-120min-片5
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 0-39/18-256-2 - 6042401p-zzp-1-rcqx-pH1.2jz-40mg2mg-120min-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx267.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260515-FX267.lcb
样品瓶号: 4-46
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/16 09:09:31
处理时间(V2): 2026/05/18 11:47:03
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX267)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.389	40432	90.850	8832	2194	1.256	--
2	3.812	4072	9.150	401	3546	1.201	12.932
总计		44504	100.000	9234			

图196 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042401批(40mg/2mg规格)-pH1.2介质-120min-片6
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 0-39/18-257-2 - 6042401p-zzp-1-rcqx-pH1.2jz-40mg2mg-JX-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx267.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260515-FX267.lcb
样品瓶号: 4-6
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/16 09:14:55
处理时间(V2): 2026/05/18 11:47:06
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX267)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.389	41820	89.805	9132	2187	1.248	--
2	3.815	4748	10.195	480	3765	1.190	13.205
总计		46568	100.000	9612			

图197 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042401批(40mg/2mg规格)-pH1.2介质-极限转速-片1
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 0-39/18-258-2 - 6042401p-zzp-1-rcqx-pH1.2jz-40mg2mg-JX-P2.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx267.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260515-FX267.lcb

样品瓶号: 4-11

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/16 09:20:18

处理时间(V2): 2026/05/18 11:47:09

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX267)

流 速: 1.5ml/min


波 长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: wangdan

处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.389	41424	88.985	9023	2180	1.254	--
2	3.807	5128	11.015	506	3209	1.230	12.469
总计		46552	100.000	9529			

图198 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042401批(40mg/2mg规格)-pH1.2介质-极限转速-片2
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 0-39/18-259-2 - 6042401p-zzp-1-rcqx-pH1.2jz-40mg2mg-JX-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx267.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260515-FX267.lcb
样品瓶号: 4-20
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/16 09:25:41
处理时间(V2): 2026/05/18 11:47:12
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX267)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.389	42084	89.722	9134	2181	1.249	--
2	3.815	4821	10.278	484	3608	1.165	13.006
总计		46905	100.000	9618			

图199 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042401批(40mg/2mg规格)-pH1.2介质-极限转速-片3
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 0-39/18-260-2 - 6042401p-zzp-1-rcqx-pH1.2jz-40mg2mg-JX-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx267.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260515-FX267.lcb
样品瓶号: 4-29
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/16 09:31:04
处理时间(V2): 2026/05/18 11:47:15
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX267)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.389	41166	90.660	9014	2189	1.244	--
2	3.816	4241	9.340	427	3549	1.258	12.943
总计		45407	100.000	9440			

图200 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042401批(40mg/2mg规格)-pH1.2介质-极限转速-片4
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 0-39/18-261-2 - 6042401p-zzp-1-rcqx-pH1.2jz-40mg2mg-JX-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx267.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260515-FX267.lcb
样品瓶号: 4-38
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/16 09:36:27
处理时间(V2): 2026/05/18 11:47:18
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX267)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.389	41708	89.747	9087	2187	1.253	--
2	3.812	4765	10.253	461	3513	1.130	12.882
总计		46473	100.000	9548			

图201 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042401批(40mg/2mg规格)-pH1.2介质-极限转速-片5
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 0-39/18-262-2 - 6042401p-zzp-1-rcqx-pH1.2jz-40mg2mg-JX-P6.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx267.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260515-FX267.lcb

样品瓶号: 4-47

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/16 09:41:50

处理时间(V2): 2026/05/18 11:47:21

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX267)

流 速: 1.5ml/min


波 长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: wangdan

处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.388	41959	89.936	9116	2181	1.251	--
2	3.815	4695	10.064	456	3491	1.142	12.866
总计		46654	100.000	9572			

图202 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042401批(40mg/2mg规格)-pH1.2介质-极限转速-片6
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 0-39/18-263-2 - 6042401p-zzp-1-rcqx-pH1.2jz-40mg2mg-dz2-1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx267.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260515-FX267.lcb
样品瓶号: 3-27
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/16 09:47:13
处理时间(V2): 2026/05/18 11:47:24
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX267)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.375	72438	12.401	13932	1651	1.231	--
2	3.704	511671	87.599	46304	2673	1.368	11.037
总计		584109	100.000	60236			

图203 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042401批(40mg/2mg规格)-pH1.2介质
对照品溶液-2-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 0-39/18-264-2 - 6042401p-zzp-1-rcqx-pH1.2jz-40mg2mg-dz2-2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx267.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260515-FX267.lcb
样品瓶号: 3-27
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/16 09:52:37
处理时间(V2): 2026/05/18 11:47:27
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX267)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.374	72549	12.415	13974	1650	1.235	--
2	3.701	511839	87.585	46279	2674	1.369	11.037
总计		584388	100.000	60253			

图204 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042401批(40mg/2mg规格)-pH1.2介质
对照品溶液-2-2