



非布司他多替诺雷片项目信息

介质体积(ml)	900	取样体积(ml)	1.5	补液体积(ml)	1.5
对照品批号	241101	对照品来源	ZZ	对照品使用方法	直接使用
对照品含量(%)	99.69	对照品水分(%)	0	对照品稀释倍数	5000
标示量(mg)	2	供试品稀释倍数	1	系数	1

对照品溶液

序号	称样量(mg)	A ₁	A ₂	A ₃	A ₄	A ₅	A _{平均}	RSD%
1	10.99	70093	70127	70198	70284	70393	70219	0.18
2	10.99	71509	71564				71536	0.06

单位质量响应值		RSD%	判断
6389.35	6509.19	1.32	数据可信



操作者:

日期: 2026-09-11

复核者:

未审阅版本



供试品溶液-6041601批-多替诺雷-pH1.2

时间 (分钟)	样品	A ₁	A ₂	A _{平均}	溶出量(%)	平均(%)	RSD%	累计溶 出量(%)	平均(%)	RSD%
5min	1	8968	-	8968	12.477	12.59	4.08	12.48	12.59	4.09
	2	8687	-	8687	12.086			12.09		
	3	9678	-	9678	13.465			13.47		
	4	8718	-	8718	12.129			12.13		
	5	8996	-	8996	12.516			12.52		
	6	9234	-	9234	12.847			12.85		
10min	1	16596	-	16596	23.090	23.09	1.20	23.11	23.11	1.21
	2	16211	-	16211	22.554			22.57		
	3	16706	-	16706	23.243			23.27		
	4	16631	-	16631	23.139			23.16		
	5	16777	-	16777	23.342			23.36		
	6	16649	-	16649	23.164			23.19		
15min	1	20810	-	20810	28.953	28.91	0.76	29.01	28.97	0.75
	2	20706	-	20706	28.808			28.87		
	3	20781	-	20781	28.913			28.97		
	4	21015	-	21015	29.238			29.30		
	5	20539	-	20539	28.576			28.64		
	6	20836	-	20836	28.989			29.05		
20min	1	23928	-	23928	33.291	33.10	0.69	33.40	33.20	0.69
	2	23536	-	23536	32.746			32.85		
	3	23844	-	23844	33.174			33.28		
	4	23953	-	23953	33.326			33.43		
	5	23813	-	23813	33.131			33.24		
	6	23650	-	23650	32.904			33.01		
30min	1	27903	-	27903	38.821	38.73	0.78	38.98	38.89	0.77
	2	27583	-	27583	38.376			38.54		
	3	28022	-	28022	38.987			39.15		
	4	28083	-	28083	39.072			39.23		
	5	27867	-	27867	38.771			38.93		
	6	27577	-	27577	38.368			38.53		
45min	1	32072	-	32072	44.622	44.31	0.67	44.85	44.53	0.67
	2	31641	-	31641	44.022			44.25		
	3	31814	-	31814	44.263			44.49		
	4	32063	-	32063	44.609			44.84		
	5	31913	-	31913	44.401			44.63		
	6	31566	-	31566	43.918			44.14		
60min	1	34693	-	34693	48.268	47.99	1.13	48.57	48.29	1.13
	2	34128	-	34128	47.482			47.78		
	3	34302	-	34302	47.724			48.03		
	4	34992	-	34992	48.684			48.99		
	5	34795	-	34795	48.410			48.71		
	6	34038	-	34038	47.357			47.66		
90min	1	37990	-	37990	52.856	53.01	0.62	53.24	53.39	0.61
	2	38243	-	38243	53.207			53.58		
	3	38273	-	38273	53.249			53.63		
	4	38229	-	38229	53.188			53.57		
	5	38198	-	38198	53.145			53.53		
	6	37672	-	37672	52.413			52.79		
120min	1	41475	-	41475	57.704	57.28	0.74	58.17	57.75	0.73
	2	40633	-	40633	56.533			57.00		
	3	41275	-	41275	57.426			57.90		
	4	41397	-	41397	57.596			58.07		
	5	41067	-	41067	57.137			57.61		
	6	41164	-	41164	57.271			57.74		



操作者:

日期: 2026-09-11

复核者:

未审阅版本



时间 (分钟)	样品	A ₁	A ₂	A _{平均}	溶出量(%)	平均(%)	RSD%	累计溶 出量(%)	平均(%)	RSD%
极限	1	42245	-	42245	58.775	58.58	0.87	59.34	59.14	0.87
	2	41486	-	41486	57.719			58.28		
	3	41884	-	41884	58.273			58.84		
	4	42444	-	42444	59.052			59.62		
	5	42154	-	42154	58.649			59.21		
	6	42419	-	42419	59.018			59.58		



操作者:

日期: 2026-09-11

复核者:

未审阅版本



非布司他多替诺雷片项目信息

介质体积(ml)	900	取样体积(ml)	1.5	补液体积(ml)	1.5
对照品批号	101278-202405	对照品来源	中检所	对照品使用方法	直接使用
对照品含量(%)	99.9	对照品水分(%)	0	对照品稀释倍数	250
标示量(mg)	40	供试品稀释倍数	1	系数	1

对照品溶液

序号	称样量(mg)	A ₁	A ₂	A ₃	A ₄	A ₅	A _{平均}	RSD%
1	10.21	497348	497861	499072	498463	498027	498154	0.14
2	10.35	511278	512436				511857	0.16

单位质量响应值		RSD%	判断
48790.79	49454.78	0.96	数据可信



操作者:

日期: 2026-09-11

复核者:

未审阅版本



供试品溶液-6041601批-非布司他-pH1.2

时间 (分钟)	样品	A ₁	A ₂	A _{平均}	溶出量(%)	平均(%)	RSD%	累计溶 出量(%)	平均(%)	RSD%
5min	1	4726	-	4726	0.865	0.81	6.63	0.87	0.81	6.63
	2	4144	-	4144	0.759			0.76		
	3	4778	-	4778	0.875			0.87		
	4	4116	-	4116	0.753			0.75		
	5	4309	-	4309	0.789			0.79		
	6	4604	-	4604	0.843			0.84		
10min	1	4965	-	4965	0.909	1.00	13.74	0.91	1.00	13.51
	2	5383	-	5383	0.985			0.99		
	3	5061	-	5061	0.926			0.93		
	4	5110	-	5110	0.935			0.94		
	5	6949	-	6949	1.272			1.27		
	6	5232	-	5232	0.958			0.96		
15min	1	5268	-	5268	0.964	0.94	2.48	0.97	0.95	2.56
	2	5074	-	5074	0.929			0.93		
	3	5323	-	5323	0.974			0.98		
	4	5185	-	5185	0.949			0.95		
	5	5046	-	5046	0.924			0.93		
	6	5003	-	5003	0.916			0.92		
20min	1	5319	-	5319	0.974	0.96	3.72	0.98	0.96	3.81
	2	5503	-	5503	1.007			1.01		
	3	5104	-	5104	0.934			0.94		
	4	5082	-	5082	0.930			0.93		
	5	5384	-	5384	0.985			0.99		
	6	5015	-	5015	0.918			0.92		
30min	1	5242	-	5242	0.959	0.95	2.38	0.97	0.96	2.51
	2	4949	-	4949	0.906			0.91		
	3	5288	-	5288	0.968			0.97		
	4	5242	-	5242	0.959			0.97		
	5	5198	-	5198	0.951			0.96		
	6	5250	-	5250	0.961			0.97		
45min	1	5289	-	5289	0.968	0.96	2.25	0.98	0.97	2.30
	2	5343	-	5343	0.978			0.99		
	3	5217	-	5217	0.955			0.96		
	4	5201	-	5201	0.952			0.96		
	5	5404	-	5404	0.989			1.00		
	6	5072	-	5072	0.928			0.94		
60min	1	4922	-	4922	0.901	0.92	3.81	0.91	0.94	3.99
	2	5006	-	5006	0.916			0.93		
	3	5077	-	5077	0.929			0.94		
	4	5076	-	5076	0.929			0.94		
	5	5398	-	5398	0.988			1.00		
	6	4839	-	4839	0.886			0.89		
90min	1	5103	-	5103	0.934	0.98	14.18	0.94	0.98	14.05
	2	6840	-	6840	1.252			1.26		
	3	5139	-	5139	0.941			0.95		
	4	4759	-	4759	0.871			0.88		
	5	5248	-	5248	0.961			0.97		
	6	4930	-	4930	0.902			0.91		
120min	1	4841	-	4841	0.886	0.86	5.39	0.90	0.87	5.11
	2	4668	-	4668	0.854			0.87		
	3	5087	-	5087	0.931			0.94		
	4	4733	-	4733	0.866			0.88		
	5	4475	-	4475	0.819			0.83		
	6	4388	-	4388	0.803			0.82		



操作者:

日期: 2026-09-11

复核者:

未审阅版本



时间 (分钟)	样品	A ₁	A ₂	A _{平均}	溶出量(%)	平均(%)	RSD%	累计溶 出量(%)	平均(%)	RSD%
极限	1	4787	-	4787	0.876	0.95	18.40	0.89	0.96	18.24
	2	4650	-	4650	0.851			0.87		
	3	5247	-	5247	0.960			0.97		
	4	4646	-	4646	0.850			0.86		
	5	4658	-	4658	0.853			0.87		
	6	7059	-	7059	1.292			1.31		



操作者:

日 期: 2026-09-11

复核者:

未审阅版本



非布司他多替诺雷片项目信息

介质体积(ml)	900	取样体积(ml)	1.5	补液体积(ml)	1.5
对照品批号	241101	对照品来源	ZZ	对照品使用方法	直接使用
对照品含量(%)	99.69	对照品水分(%)	0	对照品稀释倍数	5000
标示量(mg)	2	供试品稀释倍数	1	系数	1

对照品溶液

序号	称样量(mg)	A ₁	A ₂	A ₃	A ₄	A ₅	A _{平均}	RSD%
1	10.99	71761	71923	71946	71995	72123	71950	0.19
2	10.99	72596	72748				72672	0.15
单位质量响应值				RSD%	判断			
6546.86		6612.56		0.71	数据可信			



操作者:

日期: 2026-09-11

复核者:

未审阅版本



供试品溶液-6041601批-多替诺雷-pH1.2

时间 (分钟)	样品	A ₁	A ₂	A _{平均}	溶出量(%)	平均(%)	RSD%	累计溶 出量(%)	平均(%)	RSD%
5min	1	9904	-	9904	13.505	12.55	10.69	13.51	12.55	10.69
	2	9244	-	9244	12.605			12.61		
	3	7312	-	7312	9.971			9.97		
	4	10048	-	10048	13.702			13.70		
	5	9404	-	9404	12.824			12.82		
	6	9289	-	9289	12.667			12.67		
10min	1	16948	-	16948	23.111	22.36	5.05	23.13	22.38	5.04
	2	16304	-	16304	22.233			22.25		
	3	14828	-	14828	20.220			20.24		
	4	17154	-	17154	23.392			23.41		
	5	16569	-	16569	22.594			22.62		
	6	16597	-	16597	22.632			22.65		
15min	1	21399	-	21399	29.180	28.28	4.19	29.24	28.34	4.19
	2	20991	-	20991	28.624			28.68		
	3	19015	-	19015	25.930			25.98		
	4	21198	-	21198	28.906			28.97		
	5	21010	-	21010	28.650			28.71		
	6	20805	-	20805	28.370			28.43		
20min	1	24437	-	24437	33.323	32.44	3.56	33.43	32.55	3.56
	2	23880	-	23880	32.564			32.67		
	3	22136	-	22136	30.185			30.28		
	4	24357	-	24357	33.214			33.32		
	5	23866	-	23866	32.545			32.65		
	6	24068	-	24068	32.820			32.93		
30min	1	28208	-	28208	38.465	37.75	2.60	38.63	37.91	2.61
	2	27954	-	27954	38.119			38.28		
	3	26243	-	26243	35.786			35.93		
	4	27781	-	27781	37.883			38.05		
	5	27957	-	27957	38.123			38.28		
	6	27966	-	27966	38.135			38.30		
45min	1	31999	-	31999	43.635	43.14	1.36	43.86	43.36	1.37
	2	31972	-	31972	43.598			43.82		
	3	30829	-	30829	42.040			42.24		
	4	31647	-	31647	43.155			43.38		
	5	31783	-	31783	43.340			43.56		
	6	31579	-	31579	43.062			43.29		
60min	1	34816	-	34816	47.476	46.92	0.82	47.78	47.22	0.83
	2	34687	-	34687	47.300			47.60		
	3	34100	-	34100	46.500			46.77		
	4	34248	-	34248	46.702			47.00		
	5	34334	-	34334	46.819			47.12		
	6	34262	-	34262	46.721			47.02		
90min	1	38420	-	38420	52.391	51.85	0.63	52.77	52.22	0.63
	2	38191	-	38191	52.079			52.45		
	3	37809	-	37809	51.558			51.91		
	4	37856	-	37856	51.622			52.00		
	5	37890	-	37890	51.668			52.04		
	6	37967	-	37967	51.773			52.15		
120min	1	40572	-	40572	55.325	55.89	0.83	55.79	56.34	0.82
	2	40614	-	40614	55.383			55.84		
	3	41057	-	41057	55.987			56.42		
	4	41454	-	41454	56.528			56.99		
	5	41037	-	41037	55.960			56.42		
	6	41165	-	41165	56.134			56.59		



操作者:

日期: 2026-09-11

复核者:

未审阅版本



时间 (分钟)	样品	A ₁	A ₂	A _{平均}	溶出量(%)	平均(%)	RSD%	累计溶 出量(%)	平均(%)	RSD%
极限	1	41144	-	41144	56.105	56.91	1.19	56.67	57.46	1.19
	2	41338	-	41338	56.370			56.92		
	3	41581	-	41581	56.701			57.23		
	4	42245	-	42245	57.607			58.17		
	5	41693	-	41693	56.854			57.41		
	6	42398	-	42398	57.815			58.37		



操作者:

日期: 2026-09-11

复核者:

未审阅版本



非布司他多替诺雷片项目信息

介质体积(ml)	900	取样体积(ml)	1.5	补液体积(ml)	1.5
对照品批号	101278-202405	对照品来源	中检所	对照品使用方法	直接使用
对照品含量(%)	99.9	对照品水分(%)	0	对照品稀释倍数	250
标示量(mg)	40	供试品稀释倍数	1	系数	1

对照品溶液

序号	称样量(mg)	A ₁	A ₂	A ₃	A ₄	A ₅	A _{平均}	RSD%
1	10.21	516079	515393	515993	513510	514431	515081	0.22
2	10.35	523836	524346				524091	0.07
单位质量响应值				RSD%	判断			
50448.68				0.27	数据可信			



操作者:

日期: 2026-09-11

复核者:

未审阅版本



供试品溶液-6041601批-非布司他-pH1.2

时间 (分钟)	样品	A ₁	A ₂	A _{平均}	溶出量(%)	平均(%)	RSD%	累计溶 出量(%)	平均(%)	RSD%
5min	1	4235	-	4235	0.753	0.75	6.71	0.75	0.75	6.86
	2	4497	-	4497	0.800			0.80		
	3	3820	-	3820	0.680			0.68		
	4	4500	-	4500	0.801			0.80		
	5	3962	-	3962	0.705			0.70		
	6	4366	-	4366	0.777			0.78		
10min	1	4822	-	4822	0.858	0.94	13.70	0.86	0.94	13.89
	2	5014	-	5014	0.892			0.89		
	3	6723	-	6723	1.196			1.20		
	4	5178	-	5178	0.921			0.92		
	5	5051	-	5051	0.899			0.90		
	6	4850	-	4850	0.863			0.86		
15min	1	5190	-	5190	0.923	0.91	4.44	0.93	0.92	4.52
	2	5493	-	5493	0.977			0.98		
	3	4986	-	4986	0.887			0.89		
	4	4833	-	4833	0.860			0.86		
	5	5189	-	5189	0.923			0.93		
	6	5020	-	5020	0.893			0.90		
20min	1	4897	-	4897	0.871	0.88	3.11	0.88	0.88	3.02
	2	4829	-	4829	0.859			0.86		
	3	5225	-	5225	0.929			0.93		
	4	4899	-	4899	0.871			0.88		
	5	5051	-	5051	0.899			0.90		
	6	4837	-	4837	0.860			0.86		
30min	1	4898	-	4898	0.871	0.89	4.42	0.88	0.89	4.35
	2	4923	-	4923	0.876			0.88		
	3	4936	-	4936	0.878			0.88		
	4	4949	-	4949	0.880			0.89		
	5	5423	-	5423	0.965			0.97		
	6	4799	-	4799	0.854			0.86		
45min	1	4917	-	4917	0.875	0.89	3.87	0.88	0.90	3.78
	2	5218	-	5218	0.928			0.94		
	3	4894	-	4894	0.871			0.88		
	4	5041	-	5041	0.897			0.90		
	5	4726	-	4726	0.841			0.85		
	6	5215	-	5215	0.928			0.93		
60min	1	4573	-	4573	0.813	0.84	3.15	0.82	0.85	3.14
	2	4806	-	4806	0.855			0.86		
	3	4562	-	4562	0.812			0.82		
	4	4710	-	4710	0.838			0.85		
	5	4950	-	4950	0.881			0.89		
	6	4677	-	4677	0.832			0.84		
90min	1	4459	-	4459	0.793	0.90	10.17	0.80	0.90	10.13
	2	5016	-	5016	0.892			0.90		
	3	5325	-	5325	0.947			0.96		
	4	4443	-	4443	0.790			0.80		
	5	5247	-	5247	0.933			0.94		
	6	5740	-	5740	1.021			1.03		
120min	1	4761	-	4761	0.847	0.84	7.68	0.86	0.85	7.51
	2	5008	-	5008	0.891			0.90		
	3	5137	-	5137	0.914			0.93		
	4	4586	-	4586	0.816			0.83		
	5	4132	-	4132	0.735			0.75		
	6	4545	-	4545	0.809			0.82		



操作者:

日期: 2026-09-11

复核者:

未审阅版本



时间 (分钟)	样品	A ₁	A ₂	A _{平均}	溶出量(%)	平均(%)	RSD%	累计溶 出量(%)	平均(%)	RSD%
极限	1	4808	-	4808	0.855	0.89	11.10	0.87	0.90	10.98
	2	4562	-	4562	0.812			0.82		
	3	5168	-	5168	0.919			0.93		
	4	4910	-	4910	0.873			0.89		
	5	4496	-	4496	0.800			0.81		
	6	6007	-	6007	1.069			1.08		



操作者:

日 期: 2026-09-11

复核者:

未审阅版本



非布司他多替诺雷片项目信息

介质体积(ml)	900	取样体积(ml)	1.5	补液体积(ml)	1.5
对照品批号	241101	对照品来源	ZZ	对照品使用方法	直接使用
对照品含量(%)	99.69	对照品水分(%)	0	对照品稀释倍数	5000
标示量(mg)	2	供试品稀释倍数	1	系数	1

对照品溶液

序号	称样量(mg)	A ₁	A ₂	A ₃	A ₄	A ₅	A _{平均}	RSD%
1	10.99	72527	72619	72787	72501	72577	72602	0.16
2	10.99	69737	69597				69667	0.15
单位质量响应值			RSD%		判断			
6606.19			2.92		数据不可信!(响应值差异过大,请重新称样测定!)			



操作者:

日期: 2026-09-11

复核者:

未审阅版本



供试品溶液-6042401批-多替诺雷-pH1.2

时间 (分钟)	样品	A ₁	A ₂	A _{平均}	溶出量(%)	平均(%)	RSD%	累计溶 出量(%)	平均(%)	RSD%
5min	1	8836	-	8836	12.253	12.69	5.02	12.25	12.69	5.02
	2	9565	-	9565	13.264			13.26		
	3	8478	-	8478	11.757			11.76		
	4	9171	-	9171	12.718			12.72		
	5	9134	-	9134	12.667			12.67		
	6	9726	-	9726	13.487			13.49		
10min	1	17142	-	17142	23.772	23.96	1.82	23.79	23.98	1.82
	2	17384	-	17384	24.107			24.13		
	3	16891	-	16891	23.423			23.44		
	4	17230	-	17230	23.894			23.91		
	5	17183	-	17183	23.828			23.85		
	6	17826	-	17826	24.720			24.74		
15min	1	21767	-	21767	30.185	30.31	0.50	30.25	30.37	0.50
	2	21881	-	21881	30.343			30.41		
	3	21759	-	21759	30.174			30.23		
	4	21789	-	21789	30.216			30.28		
	5	21906	-	21906	30.378			30.44		
	6	22038	-	22038	30.561			30.62		
20min	1	24831	-	24831	34.434	34.52	0.61	34.54	34.62	0.61
	2	24699	-	24699	34.251			34.36		
	3	24773	-	24773	34.354			34.46		
	4	24918	-	24918	34.555			34.67		
	5	25097	-	25097	34.803			34.91		
	6	25018	-	25018	34.694			34.81		
30min	1	28917	-	28917	40.100	39.99	0.46	40.27	40.16	0.45
	2	28608	-	28608	39.672			39.84		
	3	28896	-	28896	40.071			40.24		
	4	28955	-	28955	40.153			40.32		
	5	28882	-	28882	40.052			40.22		
	6	28759	-	28759	39.881			40.05		
45min	1	32668	-	32668	45.302	45.49	0.88	45.54	45.72	0.88
	2	32318	-	32318	44.817			45.05		
	3	32927	-	32927	45.661			45.89		
	4	33176	-	33176	46.007			46.24		
	5	32885	-	32885	45.603			45.84		
	6	32829	-	32829	45.525			45.76		
60min	1	35414	-	35414	49.110	48.82	0.74	49.42	49.14	0.73
	2	34864	-	34864	48.347			48.66		
	3	35070	-	35070	48.633			48.94		
	4	35566	-	35566	49.321			49.63		
	5	35259	-	35259	48.895			49.21		
	6	35068	-	35068	48.630			48.95		
90min	1	39051	-	39051	54.154	53.82	0.75	54.55	54.22	0.75
	2	38361	-	38361	53.197			53.59		
	3	38857	-	38857	53.885			54.27		
	4	39180	-	39180	54.333			54.73		
	5	38693	-	38693	53.657			54.05		
	6	38729	-	38729	53.707			54.10		
120min	1	40831	-	40831	56.622	56.84	0.53	57.10	57.32	0.53
	2	40725	-	40725	56.475			56.96		
	3	41078	-	41078	56.965			57.44		
	4	41328	-	41328	57.311			57.80		
	5	40897	-	40897	56.714			57.20		
	6	41078	-	41078	56.965			57.45		



操作者:

日期: 2026-09-11

复核者:

未审阅版本



时间 (分钟)	样品	A ₁	A ₂	A _{平均}	溶出量(%)	平均(%)	RSD%	累计溶 出量(%)	平均(%)	RSD%
极限	1	41609	-	41609	57.701	57.92	0.98	58.28	58.50	0.98
	2	41164	-	41164	57.084			57.66		
	3	41747	-	41747	57.892			58.47		
	4	42313	-	42313	58.677			59.26		
	5	41633	-	41633	57.734			58.31		
	6	42125	-	42125	58.417			59.00		



操作者:

日 期: 2026-09-11

复核者:

未审阅版本



非布司他多替诺雷片项目信息

介质体积(ml)	900	取样体积(ml)	1.5	补液体积(ml)	1.5
对照品批号	101278-202405	对照品来源	中检所	对照品使用方法	直接使用
对照品含量(%)	99.9	对照品水分(%)	0	对照品稀释倍数	250
标示量(mg)	40	供试品稀释倍数	1	系数	1

对照品溶液

序号	称样量(mg)	A ₁	A ₂	A ₃	A ₄	A ₅	A _{平均}	RSD%
1	10.21	522406	522552	522553	522799	521530	522368	0.10
2	10.35	496590	496584				496587	0.01
单位质量响应值				RSD%	判断			
51162.39		47979.42		4.55	数据不可信!(响应值差异过大,请重新称样测定!)			



操作者:

日期: 2026-09-11

复核者:

未审阅版本



供试品溶液-6042401批-非布司他-pH1.2

时间 (分钟)	样品	A ₁	A ₂	A _{平均}	溶出量(%)	平均(%)	RSD%	累计溶 出量(%)	平均(%)	RSD%
5min	1	3489	-	3489	0.633	0.62	2.16	0.63	0.62	2.14
	2	3528	-	3528	0.641			0.64		
	3	3318	-	3318	0.602			0.60		
	4	3411	-	3411	0.619			0.62		
	5	3442	-	3442	0.625			0.62		
	6	3407	-	3407	0.619			0.62		
10min	1	4865	-	4865	0.883	0.85	4.87	0.88	0.86	4.83
	2	5039	-	5039	0.915			0.92		
	3	4787	-	4787	0.869			0.87		
	4	4456	-	4456	0.809			0.81		
	5	4603	-	4603	0.836			0.84		
	6	4487	-	4487	0.815			0.82		
15min	1	4622	-	4622	0.839	0.88	6.24	0.84	0.88	6.27
	2	5083	-	5083	0.923			0.93		
	3	5116	-	5116	0.929			0.93		
	4	5115	-	5115	0.929			0.93		
	5	4581	-	4581	0.832			0.83		
	6	4482	-	4482	0.814			0.82		
20min	1	4766	-	4766	0.865	0.89	6.83	0.87	0.90	6.83
	2	5544	-	5544	1.007			1.01		
	3	4798	-	4798	0.871			0.88		
	4	4982	-	4982	0.905			0.91		
	5	4823	-	4823	0.876			0.88		
	6	4575	-	4575	0.831			0.83		
30min	1	5021	-	5021	0.912	0.90	7.30	0.92	0.90	7.16
	2	5140	-	5140	0.933			0.94		
	3	5214	-	5214	0.947			0.95		
	4	5337	-	5337	0.969			0.97		
	5	4451	-	4451	0.808			0.81		
	6	4574	-	4574	0.830			0.84		
45min	1	4700	-	4700	0.853	0.88	9.59	0.86	0.89	9.27
	2	4877	-	4877	0.885			0.89		
	3	5655	-	5655	1.027			1.03		
	4	5022	-	5022	0.912			0.92		
	5	4300	-	4300	0.781			0.79		
	6	4572	-	4572	0.830			0.84		
60min	1	4669	-	4669	0.848	0.84	5.85	0.86	0.85	6.03
	2	5013	-	5013	0.910			0.92		
	3	4805	-	4805	0.872			0.88		
	4	4610	-	4610	0.837			0.85		
	5	4334	-	4334	0.787			0.79		
	6	4314	-	4314	0.783			0.79		
90min	1	4476	-	4476	0.813	0.83	7.11	0.82	0.84	7.22
	2	5167	-	5167	0.938			0.95		
	3	4635	-	4635	0.842			0.85		
	4	4205	-	4205	0.763			0.77		
	5	4471	-	4471	0.812			0.82		
	6	4458	-	4458	0.809			0.82		
120min	1	4499	-	4499	0.817	0.81	8.44	0.83	0.82	8.50
	2	5062	-	5062	0.919			0.93		
	3	4665	-	4665	0.847			0.86		
	4	4450	-	4450	0.808			0.82		
	5	3934	-	3934	0.714			0.72		
	6	4281	-	4281	0.777			0.79		



操作者:

日期: 2026-09-11

复核者:

未审阅版本



时间 (分钟)	样品	A ₁	A ₂	A _{平均}	溶出量(%)	平均(%)	RSD%	累计溶 出量(%)	平均(%)	RSD%
极限	1	4466	-	4466	0.811	0.88	11.72	0.82	0.90	11.48
	2	4662	-	4662	0.846			0.86		
	3	4988	-	4988	0.906			0.92		
	4	4917	-	4917	0.893			0.91		
	5	4291	-	4291	0.779			0.79		
	6	5906	-	5906	1.072			1.08		



操作者:

日 期: 2026-09-11

复核者:

未审阅版本




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 0-40/26-230-2 - 6041601p-zzp-1-rcqx-pH1.2jz-40mg2mg-rj.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx275.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260515-FX275.lcb
样品瓶号: 1-9
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/15 15:38:36
处理时间(V2): 2026/05/18 13:10:28
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX275)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图1 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6041601批(40mg/2mg规格)-pH1.2介质
溶剂



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 0-40/26-231-2 - 6041601p-zzp-1-rcqx-pH1.2jz-40mg2mg-dz1-1.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx275.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260515-FX275.lcb

样品瓶号: 1-18

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/15 15:44:00

处理时间(V2): 2026/05/18 13:10:33

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX275)

流速: 1.5ml/min


波长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: wangdan

处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.345	70093	12.352	14540	1789	1.145	--
2	3.334	497348	87.648	57034	3414	1.069	11.196
总计		567441	100.000	71574			

图2 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6041601批(40mg/2mg规格)-pH1.2介质
对照品溶液-1-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 0-40/26-232-2 - 6041601p-zzp-1-rcqx-pH1.2jz-40mg2mg-dz1-2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx275.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260515-FX275.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/15 15:49:23
处理时间(V2): 2026/05/18 13:10:36
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX275)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.345	70127	12.347	14535	1787	1.145	--
2	3.336	497861	87.653	57114	3416	1.069	11.202
总计		567988	100.000	71649			

图3 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6041601批(40mg/2mg规格)-pH1.2介质
对照品溶液-1-2




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 0-40/26-233-2 - 6041601p-zzp-1-rcqx-pH1.2jz-40mg2mg-dz1-3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx275.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260515-FX275.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/15 15:54:46
处理时间(V2): 2026/05/18 13:10:40
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX275)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.344	70198	12.331	14529	1786	1.141	--
2	3.336	499072	87.669	57213	3413	1.069	11.204
总计		569270	100.000	71743			

图4 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6041601批(40mg/2mg规格)-pH1.2介质
对照品溶液-1-3




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 0-40/26-234-2 - 6041601p-zzp-1-rcqx-pH1.2jz-40mg2mg-dz1-4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx275.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260515-FX275.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/15 16:00:10
处理时间(V2): 2026/05/18 13:10:43
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX275)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.346	70284	12.358	14603	1792	1.146	--
2	3.339	498463	87.642	57214	3417	1.068	11.209
总计		568747	100.000	71817			

图5 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6041601批(40mg/2mg规格)-pH1.2介质
对照品溶液-1-4




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 0-40/26-235-2 - 6041601p-zzp-1-rcqx-pH1.2jz-40mg2mg-dz1-5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx275.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260515-FX275.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/15 16:05:34
处理时间(V2): 2026/05/18 13:10:46
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX275)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.346	70393	12.384	14599	1791	1.144	--
2	3.340	498027	87.616	57146	3416	1.069	11.210
总计		568420	100.000	71745			

图6 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6041601批(40mg/2mg规格)-pH1.2介质
对照品溶液-1-5




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 0-40/26-236-2 - 6041601p-zzp-1-rcqx-pH1.2jz-40mg2mg-5min-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx275.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260515-FX275.lcb
样品瓶号: 1-1
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/15 16:10:57
处理时间(V2): 2026/05/18 13:10:49
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX275)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.372	8968	65.486	2235	2683	1.111	--
2	3.408	4726	34.514	577	4096	1.006	12.771
总计		13694	100.000	2812			

图7 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6041601批(40mg/2mg规格)-pH1.2介质-5min-片1
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 0-40/26-237-2 - 6041601p-zzp-1-rcqx-pH1.2jz-40mg2mg-5min-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx275.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260515-FX275.lcb
样品瓶号: 1-10
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/15 16:16:19
处理时间(V2): 2026/05/18 13:10:52
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX275)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.373	8687	67.705	2153	2659	1.136	--
2	3.418	4144	32.295	522	4547	0.995	13.227
总计		12831	100.000	2674			

图8 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6041601批(40mg/2mg规格)-pH1.2介质-5min-片2
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 0-40/26-238-2 - 6041601p-zzp-1-rcqx-pH1.2jz-40mg2mg-5min-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx275.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260515-FX275.lcb
样品瓶号: 1-19
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/15 16:21:42
处理时间(V2): 2026/05/18 13:10:55
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX275)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.373	9678	66.948	2376	2641	1.126	--
2	3.415	4778	33.052	603	4018	1.003	12.669
总计		14455	100.000	2979			

图9 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6041601批(40mg/2mg规格)-pH1.2介质-5min-片3
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 0-40/26-239-2 - 6041601p-zzp-1-rcqx-pH1.2jz-40mg2mg-5min-P4.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx275.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260515-FX275.lcb

样品瓶号: 1-28

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/15 16:27:05

处理时间(V2): 2026/05/18 13:10:58

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX275)

流 速: 1.5ml/min


波 长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: wangdan

处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.373	8718	67.928	2179	2718	1.128	--
2	3.422	4116	32.072	517	4186	1.043	12.927
总计		12835	100.000	2696			

图10 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6041601批(40mg/2mg规格)-pH1.2介质-5min-片4
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 0-40/26-240-2 - 6041601p-zzp-1-rcqx-pH1.2jz-40mg2mg-5min-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx275.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260515-FX275.lcb
样品瓶号: 1-37
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/15 16:32:28
处理时间(V2): 2026/05/18 13:11:01
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX275)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.374	8996	67.612	2216	2695	1.115	--
2	3.423	4309	32.388	542	4539	1.023	13.261
总计		13305	100.000	2757			

图11 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6041601批(40mg/2mg规格)-pH1.2介质-5min-片5
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 0-40/26-241-2 - 6041601p-zzp-1-rcqx-pH1.2jz-40mg2mg-5min-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx275.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260515-FX275.lcb
样品瓶号: 1-46
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/15 16:37:50
处理时间(V2): 2026/05/18 13:11:04
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX275)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.373	9234	66.728	2292	2694	1.125	--
2	3.421	4604	33.272	570	4104	1.038	12.822
总计		13839	100.000	2862			

图12 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6041601批(40mg/2mg规格)-pH1.2介质-5min-片6
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 0-40/26-242-2 - 6041601p-zzp-1-rcqx-pH1.2jz-40mg2mg-10min-P1.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx275.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260515-FX275.lcb

样品瓶号: 1-2

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/15 16:43:13

处理时间(V2): 2026/05/18 13:11:07

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX275)

流 速: 1.5ml/min


波 长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: wangdan

处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.373	16596	76.972	4090	2661	1.122	--
2	3.423	4965	23.028	628	4210	1.050	12.909
总计		21561	100.000	4719			

图13 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6041601批(40mg/2mg规格)-pH1.2介质-10min-片1
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 0-40/26-243-2 - 6041601p-zzp-1-rcqx-pH1.2jz-40mg2mg-10min-P2.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx275.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260515-FX275.lcb

样品瓶号: 1-11

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/15 16:48:36

处理时间(V2): 2026/05/18 13:11:10

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX275)

流速: 1.5ml/min


波长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: wangdan

处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.372	16211	75.072	4017	2681	1.126	--
2	3.425	5383	24.928	646	3849	1.019	12.559
总计		21594	100.000	4663			

图14 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6041601批(40mg/2mg规格)-pH1.2介质-10min-片2
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 0-40/26-244-2 - 6041601p-zzp-1-rcqx-pH1.2jz-40mg2mg-10min-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx275.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260515-FX275.lcb
样品瓶号: 1-20
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/15 16:54:04
处理时间(V2): 2026/05/18 13:11:13
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX275)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.373	16706	76.750	4151	2687	1.125	--
2	3.424	5061	23.250	642	4198	0.995	12.928
总计		21767	100.000	4793			

图15 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6041601批(40mg/2mg规格)-pH1.2介质-10min-片3
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 0-40/26-245-2 - 6041601p-zzp-1-rcqx-pH1.2jz-40mg2mg-10min-P4.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx275.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260515-FX275.lcb

样品瓶号: 1-29

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/15 16:59:22

处理时间(V2): 2026/05/18 13:11:17

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX275)

流 速: 1.5ml/min


波 长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: wangdan

处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.373	16631	76.496	4113	2668	1.108	--
2	3.426	5110	23.504	633	4040	0.979	12.758
总计		21741	100.000	4746			

图16 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6041601批(40mg/2mg规格)-pH1.2介质-10min-片4
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 0-40/26-246-2 - 6041601p-zzp-1-rcqx-pH1.2jz-40mg2mg-10min-P5.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx275.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260515-FX275.lcb

样品瓶号: 1-38

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/15 17:04:45

处理时间(V2): 2026/05/18 13:11:20

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX275)

流 速: 1.5ml/min


波 长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: wangdan

处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.374	16777	70.710	4157	2681	1.135	--
2	3.429	6949	29.290	849	4037	0.999	12.765
总计		23726	100.000	5006			

图17 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6041601批(40mg/2mg规格)-pH1.2介质-10min-片5
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 0-40/26-247-2 - 6041601p-zzp-1-rcqx-pH1.2jz-40mg2mg-10min-P6.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx275.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260515-FX275.lcb

样品瓶号: 1-47

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/15 17:10:07

处理时间(V2): 2026/05/18 13:11:23

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX275)

流速: 1.5ml/min


波长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: wangdan

处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.374	16649	76.091	4101	2670	1.119	--
2	3.432	5232	23.909	653	4282	1.023	13.023
总计		21881	100.000	4754			

图18 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6041601批(40mg/2mg规格)-pH1.2介质-10min-片6
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 0-40/26-248-2 - 6041601p-zzp-1-rcqx-pH1.2jz-40mg2mg-15min-P1.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx275.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260515-FX275.lcb

样品瓶号: 1-3

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/15 17:15:30

处理时间(V2): 2026/05/18 13:11:26

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX275)

流 速: 1.5ml/min


波 长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: wangdan

处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.373	20810	79.800	5138	2688	1.118	--
2	3.431	5268	20.200	641	3930	1.104	12.670
总计		26078	100.000	5779			

图19 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6041601批(40mg/2mg规格)-pH1.2介质-15min-片1
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 0-40/26-249-2 - 6041601p-zzp-1-rcqx-pH1.2jz-40mg2mg-15min-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx275.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260515-FX275.lcb
样品瓶号: 1-12
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/15 17:20:53
处理时间(V2): 2026/05/18 13:11:29
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX275)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.373	20706	80.317	5123	2674	1.112	--
2	3.431	5074	19.683	634	4192	1.057	12.940
总计		25780	100.000	5757			

图20 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6041601批(40mg/2mg规格)-pH1.2介质-15min-片2
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 0-40/26-250-2 - 6041601p-zzp-1-rcqx-pH1.2jz-40mg2mg-15min-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx275.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260515-FX275.lcb
样品瓶号: 1-21
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/15 17:26:16
处理时间(V2): 2026/05/18 13:11:32
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX275)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.373	20781	79.607	5128	2671	1.114	--
2	3.435	5323	20.393	656	4116	1.055	12.867
总计		26104	100.000	5784			

图21 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6041601批(40mg/2mg规格)-pH1.2介质-15min-片3
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 0-40/26-251-2 - 6041601p-zzp-1-rcqx-pH1.2jz-40mg2mg-15min-P4.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx275.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260515-FX275.lcb

样品瓶号: 1-30

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/15 17:31:39

处理时间(V2): 2026/05/18 13:11:36

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX275)

流 速: 1.5ml/min


波 长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: wangdan

处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.374	21015	80.211	5174	2674	1.113	--
2	3.437	5185	19.789	639	4272	1.066	13.029
总计		26200	100.000	5813			

图22 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6041601批(40mg/2mg规格)-pH1.2介质-15min-片4
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 0-40/26-252-2 - 6041601p-zzp-1-rcqx-pH1.2jz-40mg2mg-15min-P5.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx275.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260515-FX275.lcb

样品瓶号: 1-39

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/15 17:37:02

处理时间(V2): 2026/05/18 13:11:39

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX275)

流速: 1.5ml/min


波长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: wangdan

处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.375	20539	80.279	5028	2669	1.127	--
2	3.438	5046	19.721	632	4151	0.998	12.899
总计		25585	100.000	5661			

图23 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6041601批(40mg/2mg规格)-pH1.2介质-15min-片5
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 0-40/26-253-2 - 6041601p-zzp-1-rcqx-pH1.2jz-40mg2mg-15min-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx275.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260515-FX275.lcb
样品瓶号: 1-48
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/15 17:42:24
处理时间(V2): 2026/05/18 13:11:43
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX275)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.374	20836	80.638	5132	2668	1.121	--
2	3.438	5003	19.362	618	4319	1.021	13.081
总计		25838	100.000	5750			

图24 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6041601批(40mg/2mg规格)-pH1.2介质-15min-片6
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 0-40/26-254-2 - 6041601p-zzp-1-rcqx-pH1.2jz-40mg2mg-20min-P1.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx275.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260515-FX275.lcb

样品瓶号: 1-4

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/15 17:47:47

处理时间(V2): 2026/05/18 13:11:46

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX275)

流 速: 1.5ml/min


波 长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: wangdan

处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.373	23928	81.813	5912	2676	1.121	--
2	3.434	5319	18.187	650	4061	1.069	12.810
总计		29247	100.000	6562			

图25 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6041601批(40mg/2mg规格)-pH1.2介质-20min-片1
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 0-40/26-255-2 - 6041601p-zzp-1-rcqx-pH1.2jz-40mg2mg-20min-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx275.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260515-FX275.lcb
样品瓶号: 1-13
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/15 17:53:10
处理时间(V2): 2026/05/18 13:11:49
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX275)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.373	23536	81.051	5837	2685	1.120	--
2	3.436	5503	18.949	651	3997	1.046	12.757
总计		29038	100.000	6488			

图26 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6041601批(40mg/2mg规格)-pH1.2介质-20min-片2
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 0-40/26-256-2 - 6041601p-zzp-1-rcqx-pH1.2jz-40mg2mg-20min-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx275.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260515-FX275.lcb
样品瓶号: 1-22
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/15 17:58:32
处理时间(V2): 2026/05/18 13:11:52
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX275)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.374	23844	82.368	5891	2683	1.130	--
2	3.440	5104	17.632	635	4256	1.037	13.035
总计		28948	100.000	6527			

图27 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6041601批(40mg/2mg规格)-pH1.2介质-20min-片3
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 0-40/26-257-2 - 6041601p-zzp-1-rcqx-pH1.2jz-40mg2mg-20min-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx275.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260515-FX275.lcb
样品瓶号: 1-31
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/15 18:03:55
处理时间(V2): 2026/05/18 13:11:55
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX275)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.373	23953	82.496	5904	2666	1.121	--
2	3.439	5082	17.504	630	4000	1.005	12.755
总计		29036	100.000	6534			

图28 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6041601批(40mg/2mg规格)-pH1.2介质-20min-片4
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 0-40/26-258-2 - 6041601p-zzp-1-rcqx-pH1.2jz-40mg2mg-20min-P5.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx275.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260515-FX275.lcb

样品瓶号: 1-40

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/15 18:09:18

处理时间(V2): 2026/05/18 13:11:59

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX275)

流速: 1.5ml/min


波长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: wangdan

处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.375	23813	81.559	5820	2674	1.124	--
2	3.441	5384	18.441	661	3859	1.019	12.604
总计		29197	100.000	6481			

图29 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6041601批(40mg/2mg规格)-pH1.2介质-20min-片5
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 0-40/26-259-2 - 6041601p-zzp-1-rcqx-pH1.2jz-40mg2mg-20min-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx275.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260515-FX275.lcb
样品瓶号: 1-49
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/15 18:14:40
处理时间(V2): 2026/05/18 13:12:02
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX275)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.374	23650	82.506	5821	2680	1.119	--
2	3.442	5015	17.494	618	4185	1.013	12.962
总计		28665	100.000	6439			

图30 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6041601批(40mg/2mg规格)-pH1.2介质-20min-片6
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 0-40/26-260-2 - 6041601p-zzp-1-rcqx-pH1.2jz-40mg2mg-30min-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx275.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260515-FX275.lcb
样品瓶号: 1-5
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/15 18:20:03
处理时间(V2): 2026/05/18 13:12:05
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX275)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.374	27903	84.186	6883	2669	1.114	--
2	3.442	5242	15.814	652	4005	1.050	12.770
总计		33145	100.000	7534			

图31 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6041601批(40mg/2mg规格)-pH1.2介质-30min-片1
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 0-40/26-261-2 - 6041601p-zzp-1-rcqx-pH1.2jz-40mg2mg-30min-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx275.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260515-FX275.lcb
样品瓶号: 1-14
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/15 18:25:26
处理时间(V2): 2026/05/18 13:12:08
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX275)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.374	27583	84.787	6797	2673	1.118	--
2	3.441	4949	15.213	610	4169	1.015	12.940
总计		32532	100.000	7407			

图32 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6041601批(40mg/2mg规格)-pH1.2介质-30min-片2
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 0-40/26-262-2 - 6041601p-zzp-1-rcqx-pH1.2jz-40mg2mg-30min-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx275.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260515-FX275.lcb
样品瓶号: 1-23
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/15 18:30:49
处理时间(V2): 2026/05/18 13:12:11
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX275)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.375	28022	84.124	6857	2657	1.121	--
2	3.445	5288	15.876	644	4178	1.048	12.945
总计		33310	100.000	7501			

图33 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6041601批(40mg/2mg规格)-pH1.2介质-30min-片3
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 0-40/26-263-2 - 6041601p-zzp-1-rcqx-pH1.2jz-40mg2mg-30min-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx275.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260515-FX275.lcb
样品瓶号: 1-32
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/15 18:36:12
处理时间(V2): 2026/05/18 13:12:14
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX275)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.374	28083	84.271	6904	2678	1.122	--
2	3.444	5242	15.729	641	4076	1.039	12.857
总计		33325	100.000	7544			

图34 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6041601批(40mg/2mg规格)-pH1.2介质-30min-片4
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 0-40/26-264-2 - 6041601p-zzp-1-rcqx-pH1.2jz-40mg2mg-30min-P5.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx275.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260515-FX275.lcb

样品瓶号: 1-41

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/15 18:41:35

处理时间(V2): 2026/05/18 13:12:17

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX275)

流速: 1.5ml/min


波长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: wangdan

处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.376	27867	84.279	6803	2683	1.123	--
2	3.448	5198	15.721	645	4012	1.007	12.793
总计		33065	100.000	7448			

图35 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6041601批(40mg/2mg规格)-pH1.2介质-30min-片5
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 0-40/26-265-2 - 6041601p-zzp-1-rcqx-pH1.2jz-40mg2mg-30min-P6.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx275.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260515-FX275.lcb

样品瓶号: 1-50

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/15 18:46:57

处理时间(V2): 2026/05/18 13:12:20

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX275)

流 速: 1.5ml/min


波 长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: wangdan

处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.376	27577	84.007	6731	2677	1.118	--
2	3.448	5250	15.993	646	4026	1.091	12.801
总计		32827	100.000	7377			

图36 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6041601批(40mg/2mg规格)-pH1.2介质-30min-片6
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 0-40/26-266-2 - 6041601p-zzp-1-rcqx-pH1.2jz-40mg2mg-45min-P1.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx275.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260515-FX275.lcb

样品瓶号: 1-6

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/15 18:52:20

处理时间(V2): 2026/05/18 13:12:24

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX275)

流 速: 1.5ml/min


波 长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: wangdan

处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.375	32072	85.844	7801	2663	1.121	--
2	3.447	5289	14.156	623	3927	1.083	12.685
总计		37360	100.000	8425			

图37 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6041601批(40mg/2mg规格)-pH1.2介质-45min-片1
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 0-40/26-267-2 - 6041601p-zzp-1-rcqx-pH1.2jz-40mg2mg-45min-P2.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx275.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260515-FX275.lcb

样品瓶号: 1-15

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/15 18:57:43

处理时间(V2): 2026/05/18 13:12:27

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX275)

流 速: 1.5ml/min


波 长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: wangdan

处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.374	31641	85.553	7771	2673	1.113	--
2	3.448	5343	14.447	634	3789	0.986	12.552
总计		36984	100.000	8405			

图38 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6041601批(40mg/2mg规格)-pH1.2介质-45min-片2
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 0-40/26-268-2 - 6041601p-zzp-1-rcqx-pH1.2jz-40mg2mg-45min-P3.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx275.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260515-FX275.lcb

样品瓶号: 1-24

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/15 19:03:06

处理时间(V2): 2026/05/18 13:12:30

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX275)

流 速: 1.5ml/min


波 长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: wangdan

处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.375	31814	85.912	7773	2673	1.118	--
2	3.448	5217	14.088	638	4138	1.044	12.924
总计		37031	100.000	8411			

图39 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6041601批(40mg/2mg规格)-pH1.2介质-45min-片3
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 0-40/26-269-2 - 6041601p-zzp-1-rcqx-pH1.2jz-40mg2mg-45min-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx275.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260515-FX275.lcb
样品瓶号: 1-33
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/15 19:08:29
处理时间(V2): 2026/05/18 13:12:33
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX275)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.375	32063	86.042	7854	2668	1.125	--
2	3.452	5201	13.958	642	4070	1.007	12.867
总计		37265	100.000	8496			

图40 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6041601批(40mg/2mg规格)-pH1.2介质-45min-片4
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 0-40/26-270-2 - 6041601p-zzp-1-rcqx-pH1.2jz-40mg2mg-45min-P5.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx275.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260515-FX275.lcb

样品瓶号: 1-42

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/15 19:13:52

处理时间(V2): 2026/05/18 13:12:36

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX275)

流 速: 1.5ml/min


波 长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: wangdan

处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.376	31913	85.520	7753	2672	1.121	--
2	3.453	5404	14.480	647	4031	1.036	12.820
总计		37317	100.000	8400			

图41 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6041601批(40mg/2mg规格)-pH1.2介质-45min-片5
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 0-40/26-271-2 - 6041601p-zzp-1-rcqx-pH1.2jz-40mg2mg-45min-P6.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx275.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260515-FX275.lcb

样品瓶号: 1-51

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/15 19:19:14

处理时间(V2): 2026/05/18 13:12:39

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX275)

流 速: 1.5ml/min


波 长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: wangdan

处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.376	31566	86.156	7684	2671	1.120	--
2	3.454	5072	13.844	621	4071	1.071	12.863
总计		36638	100.000	8305			

图42 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6041601批(40mg/2mg规格)-pH1.2介质-45min-片6
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 0-40/26-272-2 - 6041601p-zzp-1-rcqx-pH1.2jz-40mg2mg-60min-P1.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx275.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260515-FX275.lcb

样品瓶号: 1-7

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/15 19:24:37

处理时间(V2): 2026/05/18 13:12:42

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX275)

流 速: 1.5ml/min


波 长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: wangdan

处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.375	34693	87.575	8465	2678	1.118	--
2	3.453	4922	12.425	601	4109	0.963	12.914
总计		39615	100.000	9066			

图43 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6041601批(40mg/2mg规格)-pH1.2介质-60min-片1
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 0-40/26-273-2 - 6041601p-zzp-1-rcqx-pH1.2jz-40mg2mg-60min-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx275.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260515-FX275.lcb
样品瓶号: 1-16
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/15 19:30:00
处理时间(V2): 2026/05/18 13:12:46
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX275)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.375	34128	87.208	8345	2678	1.111	--
2	3.450	5006	12.792	622	4177	1.049	12.971
总计		39134	100.000	8967			

图44 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6041601批(40mg/2mg规格)-pH1.2介质-60min-片2
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 0-40/26-274-2 - 6041601p-zzp-1-rcqx-pH1.2jz-40mg2mg-60min-P3.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx275.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260515-FX275.lcb

样品瓶号: 1-25

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/15 19:35:23

处理时间(V2): 2026/05/18 13:12:49

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX275)

流 速: 1.5ml/min


波 长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: wangdan

处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.376	34302	87.108	8375	2682	1.117	--
2	3.453	5077	12.892	623	4032	1.064	12.831
总计		39378	100.000	8999			

图45 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6041601批(40mg/2mg规格)-pH1.2介质-60min-片3
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 0-40/26-275-2 - 6041601p-zzp-1-rcqx-pH1.2jz-40mg2mg-60min-P4.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx275.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260515-FX275.lcb

样品瓶号: 1-34

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/15 19:40:46

处理时间(V2): 2026/05/18 13:12:52

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX275)

流速: 1.5ml/min


波长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: wangdan

处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.375	34992	87.332	8526	2656	1.125	--
2	3.450	5076	12.668	635	4200	1.016	12.984
总计		40068	100.000	9161			

图46 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6041601批(40mg/2mg规格)-pH1.2介质-60min-片4
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 0-40/26-276-2 - 6041601p-zzp-1-rcqx-pH1.2jz-40mg2mg-60min-P5.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx275.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260515-FX275.lcb

样品瓶号: 1-43

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/15 19:46:09

处理时间(V2): 2026/05/18 13:12:56

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX275)

流 速: 1.5ml/min


波 长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: wangdan

处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.376	34795	86.571	8469	2675	1.121	--
2	3.450	5398	13.429	646	3772	1.061	12.530
总计		40193	100.000	9115			

图47 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6041601批(40mg/2mg规格)-pH1.2介质-60min-片5
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 0-40/26-277-2 - 6041601p-zzp-1-rcqx-pH1.2jz-40mg2mg-60min-P6.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx275.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260515-FX275.lcb

样品瓶号: 1-52

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/15 19:51:31

处理时间(V2): 2026/05/18 13:12:59

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX275)

流速: 1.5ml/min


波长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: wangdan

处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.376	34038	87.553	8288	2669	1.114	--
2	3.453	4839	12.447	594	4140	1.090	12.935
总计		38877	100.000	8882			

图48 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6041601批(40mg/2mg规格)-pH1.2介质-60min-片6
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 0-40/26-278-2 - 6041601p-zzp-1-rcqx-pH1.2jz-40mg2mg-90min-P1.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx275.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260515-FX275.lcb

样品瓶号: 1-8

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/15 19:56:55

处理时间(V2): 2026/05/18 13:13:02

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX275)

流 速: 1.5ml/min


波 长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: wangdan

处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.376	37990	88.158	9263	2684	1.115	--
2	3.455	5103	11.842	620	3997	1.063	12.803
总计		43094	100.000	9883			

图49 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6041601批(40mg/2mg规格)-pH1.2介质-90min-片1
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 0-40/26-279-2 - 6041601p-zzp-1-rcqx-pH1.2jz-40mg2mg-90min-P2.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx275.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260515-FX275.lcb

样品瓶号: 1-17

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/15 20:02:19

处理时间(V2): 2026/05/18 13:13:05

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX275)

流 速: 1.5ml/min


波 长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: wangdan

处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.376	38243	84.828	9316	2678	1.111	--
2	3.454	6840	15.172	840	4099	1.044	12.903
总计		45083	100.000	10156			

图50 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6041601批(40mg/2mg规格)-pH1.2介质-90min-片2
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 0-40/26-280-2 - 6041601p-zzp-1-rcqx-pH1.2jz-40mg2mg-90min-P3.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx275.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260515-FX275.lcb

样品瓶号: 1-26

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/15 20:07:42

处理时间(V2): 2026/05/18 13:13:08

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX275)

流 速: 1.5ml/min


波 长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: wangdan

处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.376	38273	88.162	9287	2672	1.123	--
2	3.456	5139	11.838	628	4063	1.006	12.864
总计		43412	100.000	9915			

图51 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6041601批(40mg/2mg规格)-pH1.2介质-90min-片3
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 0-40/26-281-2 - 6041601p-zzp-1-rcqx-pH1.2jz-40mg2mg-90min-P4.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx275.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260515-FX275.lcb

样品瓶号: 1-35

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/15 20:13:05

处理时间(V2): 2026/05/18 13:13:12

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX275)

流 速: 1.5ml/min


波 长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: wangdan

处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.377	38229	88.929	9387	2682	1.117	--
2	3.457	4759	11.071	596	4195	1.087	13.004
总计		42988	100.000	9982			

图52 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6041601批(40mg/2mg规格)-pH1.2介质-90min-片4
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 0-40/26-282-2 - 6041601p-zzp-1-rcqx-pH1.2jz-40mg2mg-90min-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx275.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260515-FX275.lcb
样品瓶号: 1-44
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/15 20:18:28
处理时间(V2): 2026/05/18 13:13:15
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX275)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.377	38198	87.920	9380	2683	1.115	--
2	3.458	5248	12.080	635	3944	1.044	12.743
总计		43446	100.000	10015			

图53 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6041601批(40mg/2mg规格)-pH1.2介质-90min-片5
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 0-40/26-283-2 - 6041601p-zzp-1-rcqx-pH1.2jz-40mg2mg-90min-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx275.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260515-FX275.lcb
样品瓶号: 1-53
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/15 20:23:50
处理时间(V2): 2026/05/18 13:13:18
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX275)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.377	37672	88.428	9220	2674	1.115	--
2	3.454	4930	11.572	604	3981	1.023	12.765
总计		42602	100.000	9824			

图54 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6041601批(40mg/2mg规格)-pH1.2介质-90min-片6
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 0-40/26-284-2 - 6041601p-zzp-1-rcqx-pH1.2jz-40mg2mg-120min-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx275.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260515-FX275.lcb
样品瓶号: 4-1
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/15 20:29:13
处理时间(V2): 2026/05/18 13:13:21
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX275)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.377	41475	89.548	10149	2669	1.112	--
2	3.457	4841	10.452	585	4398	1.096	13.204
总计		46316	100.000	10733			

图55 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6041601批(40mg/2mg规格)-pH1.2介质-120min-片1
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 0-40/26-285-2 - 6041601p-zzp-1-rcqx-pH1.2jz-40mg2mg-120min-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx275.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260515-FX275.lcb
样品瓶号: 4-10
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/15 20:34:36
处理时间(V2): 2026/05/18 13:13:24
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX275)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.376	40633	89.695	9914	2677	1.116	--
2	3.459	4668	10.305	595	4242	0.996	13.067
总计		45301	100.000	10508			

图56 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6041601批(40mg/2mg规格)-pH1.2介质-120min-片2
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 0-40/26-286-2 - 6041601p-zzp-1-rcqx-pH1.2jz-40mg2mg-120min-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx275.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260515-FX275.lcb
样品瓶号: 4-19
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/15 20:40:00
处理时间(V2): 2026/05/18 13:13:27
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX275)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.376	41275	89.028	10025	2669	1.117	--
2	3.459	5087	10.972	632	4183	0.993	12.999
总计		46361	100.000	10657			

图57 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6041601批(40mg/2mg规格)-pH1.2介质-120min-片3
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 0-40/26-287-2 - 6041601p-zzp-1-rcqx-pH1.2jz-40mg2mg-120min-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx275.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260515-FX275.lcb
样品瓶号: 4-28
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/15 20:45:23
处理时间(V2): 2026/05/18 13:13:30
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX275)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.376	41397	89.740	10082	2670	1.119	--
2	3.462	4733	10.260	582	3975	0.996	12.793
总计		46129	100.000	10664			

图58 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6041601批(40mg/2mg规格)-pH1.2介质-120min-片4
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 0-40/26-288-2 - 6041601p-zzp-1-rcqx-pH1.2jz-40mg2mg-120min-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx275.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260515-FX275.lcb
样品瓶号: 4-37
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/15 20:50:45
处理时间(V2): 2026/05/18 13:13:33
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX275)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.375	41067	90.174	10047	2672	1.116	--
2	3.458	4475	9.826	557	4044	0.994	12.861
总计		45542	100.000	10604			

图59 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6041601批(40mg/2mg规格)-pH1.2介质-120min-片5
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 0-40/26-289-2 - 6041601p-zzp-1-rcqx-pH1.2jz-40mg2mg-120min-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx275.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260515-FX275.lcb
样品瓶号: 4-46
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/15 20:56:08
处理时间(V2): 2026/05/18 13:13:36
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX275)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.375	41164	90.368	10028	2662	1.125	--
2	3.456	4388	9.632	567	4205	1.057	13.011
总计		45552	100.000	10595			

图60 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6041601批(40mg/2mg规格)-pH1.2介质-120min-片6
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 0-40/26-290-2 - 6041601p-zzp-1-rcqx-pH1.2jz-40mg2mg-JX-P1.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx275.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260515-FX275.lcb

样品瓶号: 4-2

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/15 21:01:30

处理时间(V2): 2026/05/18 13:13:39

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX275)

流速: 1.5ml/min


波长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: wangdan

处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.376	42245	89.823	10271	2664	1.116	--
2	3.459	4787	10.177	600	4240	1.080	13.050
总计		47031	100.000	10871			

图61 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6041601批(40mg/2mg规格)-pH1.2介质-极限转速-片1
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 0-40/26-291-2 - 6041601p-zzp-1-rcqx-pH1.2jz-40mg2mg-JX-P2.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx275.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260515-FX275.lcb

样品瓶号: 4-11

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/15 21:06:53

处理时间(V2): 2026/05/18 13:13:43

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX275)

流速: 1.5ml/min


波长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: wangdan

处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.375	41486	89.921	10124	2672	1.119	--
2	3.458	4650	10.079	589	4403	0.999	13.231
总计		46136	100.000	10713			

图62 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6041601批(40mg/2mg规格)-pH1.2介质-极限转速-片2
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 0-40/26-292-2 - 6041601p-zzp-1-rcqx-pH1.2jz-40mg2mg-JX-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx275.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260515-FX275.lcb
样品瓶号: 4-20
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/15 21:12:15
处理时间(V2): 2026/05/18 13:13:46
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX275)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.377	41884	88.866	10231	2675	1.115	--
2	3.461	5247	11.134	624	3975	0.980	12.784
总计		47131	100.000	10856			

图63 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6041601批(40mg/2mg规格)-pH1.2介质-极限转速-片3
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 0-40/26-293-2 - 6041601p-zzp-1-rcqx-pH1.2jz-40mg2mg-JX-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx275.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260515-FX275.lcb
样品瓶号: 4-29
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/15 21:17:37
处理时间(V2): 2026/05/18 13:13:49
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX275)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.377	42444	90.133	10375	2669	1.114	--
2	3.460	4646	9.867	566	4201	1.120	13.014
总计		47090	100.000	10940			

图64 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6041601批(40mg/2mg规格)-pH1.2介质-极限转速-片4
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 0-40/26-294-2 - 6041601p-zzp-1-rcqx-pH1.2jz-40mg2mg-JX-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx275.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260515-FX275.lcb
样品瓶号: 4-38
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/15 21:23:00
处理时间(V2): 2026/05/18 13:13:52
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX275)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.378	42154	90.050	10288	2665	1.119	--
2	3.462	4658	9.950	561	3824	1.007	12.609
总计		46812	100.000	10850			

图65 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6041601批(40mg/2mg规格)-pH1.2介质-极限转速-片5
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 0-40/26-295-2 - 6041601p-zzp-1-rcqx-pH1.2jz-40mg2mg-JX-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx275.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260515-FX275.lcb
样品瓶号: 4-47
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/15 21:28:22
处理时间(V2): 2026/05/18 13:13:55
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.376	42419	85.732	10332	2669	1.123	--
2	3.460	7059	14.268	845	3718	1.052	12.498
总计		49479	100.000	11177			

图66 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6041601批(40mg/2mg规格)-pH1.2介质-极限转速-片6
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 0-40/26-296-2 - 6041601p-zzp-1-rcqx-pH1.2jz-40mg2mg-dz2-1.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx275.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260515-FX275.lcb

样品瓶号: 1-27

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/15 21:33:46

处理时间(V2): 2026/05/18 13:13:58

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX275)

流速: 1.5ml/min


波长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: wangdan

处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.350	71509	12.270	14844	1829	1.142	--
2	3.384	511278	87.730	57869	3431	1.071	11.379
总计		582787	100.000	72713			

图67 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6041601批(40mg/2mg规格)-pH1.2介质
对照品溶液-2-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 0-40/26-297-2 - 6041601p-zzp-1-rcqx-pH1.2jz-40mg2mg-dz2-2.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx275.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260515-FX275.lcb

样品瓶号: 1-27

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/15 21:39:10

处理时间(V2): 2026/05/18 13:14:01

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX275)

流 速: 1.5ml/min


波 长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: wangdan

处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.351	71564	12.254	14869	1834	1.142	--
2	3.385	512436	87.746	57951	3429	1.069	11.378
总计		584001	100.000	72820			

图68 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6041601批(40mg/2mg规格)-pH1.2介质
对照品溶液-2-2



QTL-235


<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 0-40/26-298-2 - 6041601p-zzp-2-rcqx-pH1.2jz-40mg2mg-rj.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx275.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260515-FX275.lcb
样品瓶号: 2-9
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/15 21:44:34
处理时间(V2): 2026/05/18 13:14:04
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX275)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm

版本号: 6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图69 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6041601批(40mg/2mg规格)-pH1.2介质
溶剂



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 0-40/26-299-2 - 6041601p-zzp-2-rcqx-pH1.2jz-40mg2mg-dz1-1.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx275.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260515-FX275.lcb

样品瓶号: 2-18

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/15 21:49:58

处理时间(V2): 2026/05/18 13:14:07

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX275)

流 速: 1.5ml/min


波 长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: wangdan

处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.351	71761	12.208	14893	1831	1.139	--
2	3.384	516079	87.792	58245	3421	1.071	11.365
总计		587840	100.000	73138			

图70 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6041601批(40mg/2mg规格)-pH1.2介质
对照品溶液-1-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 0-40/26-300-2 - 6041601p-zzp-2-rcqx-pH1.2jz-40mg2mg-dz1-2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx275.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260515-FX275.lcb
样品瓶号: 2-18
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/15 21:55:23
处理时间(V2): 2026/05/18 13:14:10
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX275)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.351	71923	12.246	14919	1831	1.143	--
2	3.383	515393	87.754	58327	3420	1.070	11.363
总计		587316	100.000	73246			

图71 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6041601批(40mg/2mg规格)-pH1.2介质
对照品溶液-1-2




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 0-40/26-301-2 - 6041601p-zzp-2-rcqx-pH1.2jz-40mg2mg-dz1-3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx275.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260515-FX275.lcb
样品瓶号: 2-18
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/15 22:00:48
处理时间(V2): 2026/05/18 13:14:14
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX275)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.351	71946	12.237	14925	1828	1.144	--
2	3.383	515993	87.763	58369	3422	1.071	11.362
总计		587939	100.000	73294			

图72 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6041601批(40mg/2mg规格)-pH1.2介质
对照品溶液-1-3




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 0-40/26-302-2 - 6041601p-zzp-2-rcqx-pH1.2jz-40mg2mg-dz1-4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx275.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260515-FX275.lcb
样品瓶号: 2-18
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/15 22:06:13
处理时间(V2): 2026/05/18 13:14:17
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX275)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.351	71995	12.296	14932	1828	1.140	--
2	3.382	513510	87.704	58214	3431	1.070	11.365
总计		585505	100.000	73146			

图73 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6041601批(40mg/2mg规格)-pH1.2介质
对照品溶液-1-4



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 0-40/26-303-2 - 6041601p-zzp-2-rcqx-pH1.2jz-40mg2mg-dz1-5.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx275.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260515-FX275.lcb

样品瓶号: 2-18

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/15 22:11:38

处理时间(V2): 2026/05/18 13:14:20

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX275)

流速: 1.5ml/min


波长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: wangdan

处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.350	72123	12.296	14971	1824	1.140	--
2	3.381	514431	87.704	58258	3416	1.070	11.351
总计		586555	100.000	73229			

图74 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6041601批(40mg/2mg规格)-pH1.2介质
对照品溶液-1-5




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 0-40/26-304-2 - 6041601p-zzp-2-rcqx-pH1.2jz-40mg2mg-5min-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx275.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260515-FX275.lcb
样品瓶号: 2-1
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/15 22:17:02
处理时间(V2): 2026/05/18 13:14:23
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX275)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.378	9904	70.050	2407	2651	1.102	--
2	3.460	4235	29.950	533	4220	1.038	13.011
总计		14139	100.000	2940			

图75 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6041601批(40mg/2mg规格)-pH1.2介质-5min-片1
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 0-40/26-305-2 - 6041601p-zzp-2-rcqx-pH1.2jz-40mg2mg-5min-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx275.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260515-FX275.lcb
样品瓶号: 2-10
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/15 22:22:26
处理时间(V2): 2026/05/18 13:14:26
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX275)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.376	9244	67.273	2256	2685	1.145	--
2	3.460	4497	32.727	560	4291	1.036	13.125
总计		13741	100.000	2816			

图76 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6041601批(40mg/2mg规格)-pH1.2介质-5min-片2
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 0-40/26-306-2 - 6041601p-zzp-2-rcqx-pH1.2jz-40mg2mg-5min-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx275.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260515-FX275.lcb
样品瓶号: 2-19
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/15 22:27:50
处理时间(V2): 2026/05/18 13:14:29
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX275)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.377	7312	65.686	1768	2645	1.120	--
2	3.461	3820	34.314	473	4295	1.148	13.089
总计		11132	100.000	2241			

图77 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6041601批(40mg/2mg规格)-pH1.2介质-5min-片3
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 0-40/26-307-2 - 6041601p-zzp-2-rcqx-pH1.2jz-40mg2mg-5min-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx275.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260515-FX275.lcb
样品瓶号: 2-28
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/15 22:33:14
处理时间(V2): 2026/05/18 13:14:32
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX275)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.377	10048	69.066	2427	2653	1.122	--
2	3.464	4500	30.934	561	4092	1.019	12.898
总计		14548	100.000	2988			

图78 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6041601批(40mg/2mg规格)-pH1.2介质-5min-片4
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 0-40/26-308-2 - 6041601p-zzp-2-rcqx-pH1.2jz-40mg2mg-5min-P5.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx275.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260515-FX275.lcb

样品瓶号: 2-37

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/15 22:38:38

处理时间(V2): 2026/05/18 13:14:36

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX275)

流 速: 1.5ml/min


波 长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: wangdan

处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.377	9404	70.358	2275	2643	1.127	--
2	3.466	3962	29.642	478	4029	1.030	12.835
总计		13366	100.000	2753			

图79 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6041601批(40mg/2mg规格)-pH1.2介质-5min-片5
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 0-40/26-309-2 - 6041601p-zzp-2-rcqx-pH1.2jz-40mg2mg-5min-P6.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx275.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260515-FX275.lcb

样品瓶号: 2-46

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/15 22:44:01

处理时间(V2): 2026/05/18 13:14:39

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX275)

流 速: 1.5ml/min


波 长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: wangdan

处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.377	9289	68.027	2243	2636	1.113	--
2	3.466	4366	31.973	532	4204	1.049	13.013
总计		13654	100.000	2775			

图80 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6041601批(40mg/2mg规格)-pH1.2介质-5min-片6
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 0-40/26-310-2 - 6041601p-zzp-2-rcqx-pH1.2jz-40mg2mg-10min-P1.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx275.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260515-FX275.lcb

样品瓶号: 2-2

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/15 22:49:25

处理时间(V2): 2026/05/18 13:14:42

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX275)

流 速: 1.5ml/min


波 长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: wangdan

处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.378	16948	77.852	4172	2682	1.117	--
2	3.465	4822	22.148	591	4179	1.063	13.008
总计		21770	100.000	4762			

图81 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6041601批(40mg/2mg规格)-pH1.2介质-10min-片1
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 0-40/26-311-2 - 6041601p-zzp-2-rcqx-pH1.2jz-40mg2mg-10min-P2.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx275.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260515-FX275.lcb

样品瓶号: 2-11

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/15 22:54:50

处理时间(V2): 2026/05/18 13:14:45

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX275)

流 速: 1.5ml/min


波 长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: wangdan

处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.378	16304	76.480	4005	2676	1.114	--
2	3.466	5014	23.520	609	4264	0.988	13.097
总计		21319	100.000	4614			

图82 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6041601批(40mg/2mg规格)-pH1.2介质-10min-片2
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 0-40/26-312-2 - 6041601p-zzp-2-rcqx-pH1.2jz-40mg2mg-10min-P3.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx275.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260515-FX275.lcb

样品瓶号: 2-20

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/15 23:00:14

处理时间(V2): 2026/05/18 13:14:48

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX275)

流 速: 1.5ml/min


波 长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: wangdan

处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.377	14828	68.804	3618	2677	1.116	--
2	3.465	6723	31.196	814	4213	0.990	13.050
总计		21551	100.000	4432			

图83 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6041601批(40mg/2mg规格)-pH1.2介质-10min-片3
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 0-40/26-313-2 - 6041601p-zzp-2-rcqx-pH1.2jz-40mg2mg-10min-P4.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx275.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260515-FX275.lcb

样品瓶号: 2-29

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/15 23:05:38

处理时间(V2): 2026/05/18 13:14:51

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX275)

流 速: 1.5ml/min


波 长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: wangdan

处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.377	17154	76.812	4179	2660	1.118	--
2	3.463	5178	23.188	627	4040	0.999	12.847
总计		22333	100.000	4805			

图84 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6041601批(40mg/2mg规格)-pH1.2介质-10min-片4
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 0-40/26-314-2 - 6041601p-zzp-2-rcqx-pH1.2jz-40mg2mg-10min-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx275.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260515-FX275.lcb
样品瓶号: 2-38
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/15 23:11:02
处理时间(V2): 2026/05/18 13:14:55
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX275)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.377	16569	76.639	4063	2669	1.118	--
2	3.465	5051	23.361	621	4193	1.034	13.019
总计		21620	100.000	4684			

图85 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6041601批(40mg/2mg规格)-pH1.2介质-10min-片5
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 0-40/26-315-2 - 6041601p-zzp-2-rcqx-pH1.2jz-40mg2mg-10min-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx275.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260515-FX275.lcb
样品瓶号: 2-47
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/15 23:16:25
处理时间(V2): 2026/05/18 13:14:58
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX275)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.378	16597	77.385	4069	2659	1.120	--
2	3.465	4850	22.615	600	4048	0.984	12.855
总计		21448	100.000	4669			

图86 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6041601批(40mg/2mg规格)-pH1.2介质-10min-片6
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 0-40/26-316-2 - 6041601p-zzp-2-rcqx-pH1.2jz-40mg2mg-15min-P1.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx275.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260515-FX275.lcb

样品瓶号: 2-3

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/15 23:21:50

处理时间(V2): 2026/05/18 13:15:01

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX275)

流速: 1.5ml/min


波长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: wangdan

处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.377	21399	80.479	5225	2661	1.115	--
2	3.465	5190	19.521	630	4133	1.030	12.955
总计		26590	100.000	5856			

图87 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6041601批(40mg/2mg规格)-pH1.2介质-15min-片1
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 0-40/26-317-2 - 6041601p-zzp-2-rcqx-pH1.2jz-40mg2mg-15min-P2.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx275.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260515-FX275.lcb

样品瓶号: 2-12

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/15 23:27:14

处理时间(V2): 2026/05/18 13:15:04

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX275)

流 速: 1.5ml/min


波 长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: wangdan

处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.378	20991	79.258	5128	2660	1.107	--
2	3.466	5493	20.742	664	3981	0.995	12.789
总计		26484	100.000	5792			

图88 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6041601批(40mg/2mg规格)-pH1.2介质-15min-片2
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 0-40/26-318-2 - 6041601p-zzp-2-rcqx-pH1.2jz-40mg2mg-15min-P3.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx275.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260515-FX275.lcb

样品瓶号: 2-21

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/15 23:32:38

处理时间(V2): 2026/05/18 13:15:08

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX275)

流 速: 1.5ml/min


波 长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: wangdan

处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.378	19015	79.226	4632	2668	1.117	--
2	3.463	4986	20.774	636	4308	1.014	13.129
总计		24001	100.000	5268			

图89 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6041601批(40mg/2mg规格)-pH1.2介质-15min-片3
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 0-40/26-319-2 - 6041601p-zzp-2-rcqx-pH1.2jz-40mg2mg-15min-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx275.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260515-FX275.lcb
样品瓶号: 2-30
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/15 23:38:02
处理时间(V2): 2026/05/18 13:15:11
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX275)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.378	21198	81.435	5206	2682	1.121	--
2	3.467	4833	18.565	619	4135	1.060	12.973
总计		26031	100.000	5825			

图90 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6041601批(40mg/2mg规格)-pH1.2介质-15min-片4
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 0-40/26-320-2 - 6041601p-zzp-2-rcqx-pH1.2jz-40mg2mg-15min-P5.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx275.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260515-FX275.lcb

样品瓶号: 2-39

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/15 23:43:26

处理时间(V2): 2026/05/18 13:15:14

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX275)

流 速: 1.5ml/min


波 长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: wangdan

处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.378	21010	80.192	5122	2650	1.115	--
2	3.468	5189	19.808	613	3917	1.015	12.717
总计		26199	100.000	5735			

图91 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6041601批(40mg/2mg规格)-pH1.2介质-15min-片5
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 0-40/26-321-2 - 6041601p-zzp-2-rcqx-pH1.2jz-40mg2mg-15min-P6.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx275.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260515-FX275.lcb

样品瓶号: 2-48

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/15 23:48:49

处理时间(V2): 2026/05/18 13:15:17

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX275)

流 速: 1.5ml/min


波 长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: wangdan

处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.378	20805	80.560	5122	2683	1.112	--
2	3.465	5020	19.440	623	4093	1.115	12.918
总计		25825	100.000	5744			

图92 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6041601批(40mg/2mg规格)-pH1.2介质-15min-片6
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 0-40/26-322-2 - 6041601p-zzp-2-rcqx-pH1.2jz-40mg2mg-20min-P1.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx275.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260515-FX275.lcb

样品瓶号: 2-4

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/15 23:54:13

处理时间(V2): 2026/05/18 13:15:21

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX275)

流 速: 1.5ml/min


波 长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: wangdan

处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.376	24437	83.307	5933	2659	1.116	--
2	3.465	4897	16.693	609	4211	1.001	13.043
总计		29334	100.000	6542			

图93 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6041601批(40mg/2mg规格)-pH1.2介质-20min-片1
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 0-40/26-323-2 - 6041601p-zzp-2-rcqx-pH1.2jz-40mg2mg-20min-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx275.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260515-FX275.lcb
样品瓶号: 2-13
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/15 23:59:38
处理时间(V2): 2026/05/18 13:15:24
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX275)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.378	23880	83.178	5843	2671	1.117	--
2	3.466	4829	16.822	612	4068	1.079	12.889
总计		28709	100.000	6455			

图94 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6041601批(40mg/2mg规格)-pH1.2介质-20min-片2
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 0-40/26-324-2 - 6041601p-zzp-2-rcqx-pH1.2jz-40mg2mg-20min-P3.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx275.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260515-FX275.lcb

样品瓶号: 2-22

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/16 00:05:02

处理时间(V2): 2026/05/18 13:15:27

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX275)

流 速: 1.5ml/min


波 长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: wangdan

处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.377	22136	80.904	5398	2664	1.115	--
2	3.468	5225	19.096	651	4238	1.022	13.077
总计		27361	100.000	6049			

图95 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6041601批(40mg/2mg规格)-pH1.2介质-20min-片3
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 0-40/26-325-2 - 6041601p-zzp-2-rcqx-pH1.2jz-40mg2mg-20min-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx275.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260515-FX275.lcb
样品瓶号: 2-31
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/16 00:10:26
处理时间(V2): 2026/05/18 13:15:30
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX275)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.378	24357	83.255	5935	2655	1.110	--
2	3.468	4899	16.745	615	4102	1.057	12.918
总计		29256	100.000	6550			

图96 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6041601批(40mg/2mg规格)-pH1.2介质-20min-片4
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 0-40/26-326-2 - 6041601p-zzp-2-rcqx-pH1.2jz-40mg2mg-20min-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx275.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260515-FX275.lcb
样品瓶号: 2-40
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/16 00:15:50
处理时间(V2): 2026/05/18 13:15:33
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX275)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.377	23866	82.534	5807	2659	1.123	--
2	3.464	5051	17.466	635	4086	1.001	12.902
总计		28917	100.000	6442			

图97 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6041601批(40mg/2mg规格)-pH1.2介质-20min-片5
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 0-40/26-327-2 - 6041601p-zzp-2-rcqx-pH1.2jz-40mg2mg-20min-P6.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx275.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260515-FX275.lcb

样品瓶号: 2-49

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/16 00:21:14

处理时间(V2): 2026/05/18 13:15:36

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX275)

流 速: 1.5ml/min


波 长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: wangdan

处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.377	24068	83.266	5864	2671	1.105	--
2	3.467	4837	16.734	600	4142	1.027	12.973
总计		28905	100.000	6464			

图98 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6041601批(40mg/2mg规格)-pH1.2介质-20min-片6
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$QTL-235 - 0-40/26-328-2 - 6041601p-zzp-2-rcqx-pH1.2jz-40mg2mg-30min-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx275.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260515-FX275.lcb
样品瓶号: 2-5
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/16 00:26:39
处理时间(V2): 2026/05/18 13:15:39
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX275)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.377	28208	85.206	6884	2669	1.113	--
2	3.469	4898	14.794	603	4251	0.996	13.100
总计		33105	100.000	7487			

图99 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6041601批(40mg/2mg规格)-pH1.2介质-30min-片1
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 0-40/26-329-2 - 6041601p-zzp-2-rcqx-pH1.2jz-40mg2mg-30min-P2.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx275.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260515-FX275.lcb

样品瓶号: 2-14

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/16 00:32:03

处理时间(V2): 2026/05/18 13:15:42

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX275)

流速: 1.5ml/min


波长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: wangdan

处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.378	27954	85.025	6874	2690	1.113	--
2	3.470	4923	14.975	595	3949	1.004	12.793
总计		32877	100.000	7469			

图100 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6041601批(40mg/2mg规格)-pH1.2介质-30min-片2
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 0-40/26-330-2 - 6041601p-zzp-2-rcqx-pH1.2jz-40mg2mg-30min-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx275.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260515-FX275.lcb
样品瓶号: 2-23
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/16 00:37:27
处理时间(V2): 2026/05/18 13:15:45
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX275)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.377	26243	84.169	6440	2677	1.109	--
2	3.469	4936	15.831	620	4375	0.963	13.229
总计		31179	100.000	7060			

图101 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6041601批(40mg/2mg规格)-pH1.2介质-30min-片3
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 0-40/26-331-2 - 6041601p-zzp-2-rcqx-pH1.2jz-40mg2mg-30min-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx275.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260515-FX275.lcb
样品瓶号: 2-32
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/16 00:42:51
处理时间(V2): 2026/05/18 13:15:49
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX275)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.378	27781	84.880	6837	2684	1.116	--
2	3.470	4949	15.120	614	4294	1.038	13.144
总计		32729	100.000	7451			

图102 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6041601批(40mg/2mg规格)-pH1.2介质-30min-片4
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 0-40/26-332-2 - 6041601p-zzp-2-rcqx-pH1.2jz-40mg2mg-30min-P5.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx275.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260515-FX275.lcb

样品瓶号: 2-41

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/16 00:48:15

处理时间(V2): 2026/05/18 13:15:52

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX275)

流 速: 1.5ml/min


波 长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: wangdan

处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.378	27957	83.754	6825	2667	1.103	--
2	3.466	5423	16.246	660	4021	1.078	12.840
总计		33380	100.000	7485			

图103 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6041601批(40mg/2mg规格)-pH1.2介质-30min-片5
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 0-40/26-333-2 - 6041601p-zzp-2-rcqx-pH1.2jz-40mg2mg-30min-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx275.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260515-FX275.lcb
样品瓶号: 2-50
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/16 00:53:39
处理时间(V2): 2026/05/18 13:15:55
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX275)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.377	27966	85.352	6802	2659	1.113	--
2	3.470	4799	14.648	584	4150	1.025	12.986
总计		32765	100.000	7386			

图104 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6041601批(40mg/2mg规格)-pH1.2介质-30min-片6
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 0-40/26-334-2 - 6041601p-zzp-2-rcqx-pH1.2jz-40mg2mg-45min-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx275.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260515-FX275.lcb
样品瓶号: 2-6
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/16 00:59:04
处理时间(V2): 2026/05/18 13:15:58
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX275)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.378	31999	86.681	7842	2680	1.115	--
2	3.472	4917	13.319	601	3931	1.077	12.771
总计		36916	100.000	8443			

图105 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6041601批(40mg/2mg规格)-pH1.2介质-45min-片1
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 0-40/26-335-2 - 6041601p-zzp-2-rcqx-pH1.2jz-40mg2mg-45min-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx275.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260515-FX275.lcb
样品瓶号: 2-15
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/16 01:04:28
处理时间(V2): 2026/05/18 13:16:01
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX275)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.378	31972	85.969	7853	2671	1.109	--
2	3.470	5218	14.031	625	4179	1.044	13.016
总计		37190	100.000	8478			

图106 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6041601批(40mg/2mg规格)-pH1.2介质-45min-片2
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 0-40/26-336-2 - 6041601p-zzp-2-rcqx-pH1.2jz-40mg2mg-45min-P3.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx275.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260515-FX275.lcb

样品瓶号: 2-24

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/16 01:09:53

处理时间(V2): 2026/05/18 13:16:04

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX275)

流 速: 1.5ml/min


波 长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: wangdan

处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.377	30829	86.301	7552	2674	1.108	--
2	3.472	4894	13.699	591	3847	0.995	12.678
总计		35723	100.000	8143			

图107 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6041601批(40mg/2mg规格)-pH1.2介质-45min-片3
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 0-40/26-337-2 - 6041601p-zzp-2-rcqx-pH1.2jz-40mg2mg-45min-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx275.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260515-FX275.lcb
样品瓶号: 2-33
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/16 01:15:17
处理时间(V2): 2026/05/18 13:16:07
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX275)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.378	31647	86.260	7768	2672	1.116	--
2	3.470	5041	13.740	626	4034	1.026	12.863
总计		36688	100.000	8393			

图108 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6041601批(40mg/2mg规格)-pH1.2介质-45min-片4
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 0-40/26-338-2 - 6041601p-zzp-2-rcqx-pH1.2jz-40mg2mg-45min-P5.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx275.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260515-FX275.lcb

样品瓶号: 2-42

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/16 01:20:41

处理时间(V2): 2026/05/18 13:16:10

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX275)

流速: 1.5ml/min


波长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: wangdan

处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.378	31783	87.055	7798	2673	1.118	--
2	3.472	4726	12.945	572	3907	1.021	12.738
总计		36509	100.000	8370			

图109 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6041601批(40mg/2mg规格)-pH1.2介质-45min-片5
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 0-40/26-339-2 - 6041601p-zzp-2-rcqx-pH1.2jz-40mg2mg-45min-P6.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx275.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260515-FX275.lcb

样品瓶号: 2-51

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/16 01:26:05

处理时间(V2): 2026/05/18 13:16:13

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX275)

流速: 1.5ml/min


波长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: wangdan

处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.378	31579	85.827	7754	2683	1.115	--
2	3.473	5215	14.173	640	4094	1.014	12.946
总计		36794	100.000	8395			

图110 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6041601批(40mg/2mg规格)-pH1.2介质-45min-片6
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$QTL-235 - 0-40/26-340-2 - 6041601p-zzp-2-rcqx-pH1.2jz-40mg2mg-60min-P1.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx275.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260515-FX275.lcb

样品瓶号: 2-7

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/16 01:31:29

处理时间(V2): 2026/05/18 13:16:16

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX275)

流 速: 1.5ml/min


波 长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: wangdan

处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.379	34816	88.390	8544	2670	1.110	--
2	3.475	4573	11.610	572	4294	1.044	13.148
总计		39389	100.000	9115			

图111 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6041601批(40mg/2mg规格)-pH1.2介质-60min-片1
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$QTL-235 - 0-40/26-341-2 - 6041601p-zzp-2-rcqx-pH1.2jz-40mg2mg-60min-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx275.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260515-FX275.lcb
样品瓶号: 2-16
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/16 01:36:54
处理时间(V2): 2026/05/18 13:16:19
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX275)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.378	34687	87.831	8483	2664	1.113	--
2	3.470	4806	12.169	600	4120	1.091	12.956
总计		39493	100.000	9083			

图112 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6041601批(40mg/2mg规格)-pH1.2介质-60min-片2
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 0-40/26-342-2 - 6041601p-zzp-2-rcqx-pH1.2jz-40mg2mg-60min-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx275.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260515-FX275.lcb
样品瓶号: 2-25
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/16 01:42:18
处理时间(V2): 2026/05/18 13:16:22
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX275)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.378	34100	88.200	8339	2659	1.115	--
2	3.475	4562	11.800	568	4137	1.018	12.981
总计		38662	100.000	8907			

图113 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6041601批(40mg/2mg规格)-pH1.2介质-60min-片3
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 0-40/26-343-2 - 6041601p-zzp-2-rcqx-pH1.2jz-40mg2mg-60min-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx275.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260515-FX275.lcb
样品瓶号: 2-34
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/16 01:47:43
处理时间(V2): 2026/05/18 13:16:25
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX275)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.378	34248	87.910	8396	2685	1.111	--
2	3.471	4710	12.090	572	4066	1.032	12.919
总计		38958	100.000	8968			

图114 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6041601批(40mg/2mg规格)-pH1.2介质-60min-片4
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 0-40/26-344-2 - 6041601p-zzp-2-rcqx-pH1.2jz-40mg2mg-60min-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx275.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260515-FX275.lcb
样品瓶号: 2-43
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/16 01:53:07
处理时间(V2): 2026/05/18 13:16:28
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX275)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.379	34334	87.400	8456	2677	1.116	--
2	3.474	4950	12.600	605	4116	1.061	12.967
总计		39284	100.000	9061			

图115 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6041601批(40mg/2mg规格)-pH1.2介质-60min-片5
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 0-40/26-345-2 - 6041601p-zzp-2-rcqx-pH1.2jz-40mg2mg-60min-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx275.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260515-FX275.lcb
样品瓶号: 2-52
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/16 01:58:31
处理时间(V2): 2026/05/18 13:16:31
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX275)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.378	34262	87.990	8391	2675	1.112	--
2	3.470	4677	12.010	563	3907	1.026	12.735
总计		38939	100.000	8954			

图116 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6041601批(40mg/2mg规格)-pH1.2介质-60min-片6
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 0-40/26-346-2 - 6041601p-zzp-2-rcqx-pH1.2jz-40mg2mg-90min-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx275.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260515-FX275.lcb
样品瓶号: 2-8
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/16 02:03:55
处理时间(V2): 2026/05/18 13:16:34
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX275)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.378	38420	89.601	9433	2675	1.116	--
2	3.473	4459	10.399	565	4205	1.060	13.062
总计		42879	100.000	9999			

图117 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6041601批(40mg/2mg规格)-pH1.2介质-90min-片1
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$QTL-235 - 0-40/26-347-2 - 6041601p-zzp-2-rcqx-pH1.2jz-40mg2mg-90min-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx275.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260515-FX275.lcb
样品瓶号: 2-17
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/16 02:09:19
处理时间(V2): 2026/05/18 13:16:37
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX275)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.377	38191	88.391	9330	2668	1.118	--
2	3.473	5016	11.609	612	4281	1.051	13.139
总计		43206	100.000	9941			

图118 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6041601批(40mg/2mg规格)-pH1.2介质-90min-片2
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 0-40/26-348-2 - 6041601p-zzp-2-rcqx-pH1.2jz-40mg2mg-90min-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx275.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260515-FX275.lcb
样品瓶号: 2-26
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/16 02:14:44
处理时间(V2): 2026/05/18 13:16:40
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX275)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.378	37809	87.655	9257	2668	1.115	--
2	3.473	5325	12.345	608	3913	1.114	12.745
总计		43134	100.000	9865			

图119 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6041601批(40mg/2mg规格)-pH1.2介质-90min-片3
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 0-40/26-349-2 - 6041601p-zzp-2-rcqx-pH1.2jz-40mg2mg-90min-P4.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx275.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260515-FX275.lcb

样品瓶号: 2-35

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/16 02:20:08

处理时间(V2): 2026/05/18 13:16:43

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX275)

流速: 1.5ml/min


波长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: wangdan

处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.377	37856	89.497	9255	2666	1.113	--
2	3.473	4443	10.503	544	4022	1.056	12.864
总计		42299	100.000	9800			

图120 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6041601批(40mg/2mg规格)-pH1.2介质-90min-片4
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 0-40/26-350-2 - 6041601p-zzp-2-rcqx-pH1.2jz-40mg2mg-90min-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx275.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260515-FX275.lcb
样品瓶号: 2-44
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/16 02:25:33
处理时间(V2): 2026/05/18 13:16:46
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX275)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.379	37890	87.837	9328	2675	1.113	--
2	3.479	5247	12.163	625	4086	0.986	12.951
总计		43136	100.000	9953			

图121 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6041601批(40mg/2mg规格)-pH1.2介质-90min-片5
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 0-40/26-351-2 - 6041601p-zzp-2-rcqx-pH1.2jz-40mg2mg-90min-P6.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx275.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260515-FX275.lcb

样品瓶号: 2-53

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/16 02:30:57

处理时间(V2): 2026/05/18 13:16:49

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX275)

流速: 1.5ml/min


波长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: wangdan

处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.379	37967	86.868	9336	2675	1.118	--
2	3.476	5740	13.132	681	4089	0.996	12.945
总计		43707	100.000	10017			

图122 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6041601批(40mg/2mg规格)-pH1.2介质-90min-片6
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$QTL-235 - 0-40/26-352-2 - 6041601p-zzp-2-rcqx-pH1.2jz-40mg2mg-120min-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx275.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260515-FX275.lcb
样品瓶号: 4-3
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/16 02:36:20
处理时间(V2): 2026/05/18 13:16:52
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX275)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.379	40572	89.497	9969	2669	1.116	--
2	3.476	4761	10.503	585	4014	0.988	12.860
总计		45333	100.000	10555			

图123 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6041601批(40mg/2mg规格)-pH1.2介质-120min-片1
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$QTL-235 - 0-40/26-353-2 - 6041601p-zzp-2-rcqx-pH1.2jz-40mg2mg-120min-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx275.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260515-FX275.lcb
样品瓶号: 4-10
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/16 02:41:43
处理时间(V2): 2026/05/18 13:16:56
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX275)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.379	40614	89.022	9986	2672	1.107	--
2	3.477	5008	10.978	617	4023	1.035	12.874
总计		45622	100.000	10603			

图124 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6041601批(40mg/2mg规格)-pH1.2介质-120min-片2
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$QTL-235 - 0-40/26-354-2 - 6041601p-zzp-2-rcqx-pH1.2jz-40mg2mg-120min-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx275.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260515-FX275.lcb
样品瓶号: 4-19
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/16 02:47:06
处理时间(V2): 2026/05/18 13:16:59
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX275)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.377	41057	88.880	10049	2668	1.116	--
2	3.475	5137	11.120	624	4049	0.997	12.903
总计		46194	100.000	10673			

图125 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6041601批(40mg/2mg规格)-pH1.2介质-120min-片3
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 0-40/26-355-2 - 6041601p-zzp-2-rcqx-pH1.2jz-40mg2mg-120min-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx275.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260515-FX275.lcb
样品瓶号: 4-28
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/16 02:52:29
处理时间(V2): 2026/05/18 13:17:02
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX275)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.378	41454	90.039	10154	2678	1.116	--
2	3.473	4586	9.961	554	4052	1.055	12.907
总计		46041	100.000	10708			

图126 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6041601批(40mg/2mg规格)-pH1.2介质-120min-片4
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$QTL-235 - 0-40/26-356-2 - 6041601p-zzp-2-rcqx-pH1.2jz-40mg2mg-120min-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx275.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260515-FX275.lcb
样品瓶号: 4-37
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/16 02:57:52
处理时间(V2): 2026/05/18 13:17:05
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX275)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.377	41037	90.851	10046	2674	1.114	--
2	3.474	4132	9.149	498	4160	1.051	13.025
总计		45170	100.000	10543			

图127 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6041601批(40mg/2mg规格)-pH1.2介质-120min-片5
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 0-40/26-357-2 - 6041601p-zzp-2-rcqx-pH1.2jz-40mg2mg-120min-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx275.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260515-FX275.lcb
样品瓶号: 4-46
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/16 03:03:14
处理时间(V2): 2026/05/18 13:17:08
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX275)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.378	41165	90.056	10087	2669	1.113	--
2	3.477	4545	9.944	554	4199	1.050	13.065
总计		45710	100.000	10641			

图128 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6041601批(40mg/2mg规格)-pH1.2介质-120min-片6
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 0-40/26-358-2 - 6041601p-zzp-2-rcqx-pH1.2jz-40mg2mg-JX-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx275.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260515-FX275.lcb
样品瓶号: 4-4
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/16 03:08:38
处理时间(V2): 2026/05/18 13:17:11
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX275)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.378	41144	89.537	10081	2662	1.106	--
2	3.478	4808	10.463	602	4190	1.044	13.051
总计		45952	100.000	10683			

图129 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6041601批(40mg/2mg规格)-pH1.2介质-极限转速-片1
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 0-40/26-359-2 - 6041601p-zzp-2-rcqx-pH1.2jz-40mg2mg-JX-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx275.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260515-FX275.lcb
样品瓶号: 4-11
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/16 03:14:01
处理时间(V2): 2026/05/18 13:17:14
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX275)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.378	41338	90.061	10128	2671	1.112	--
2	3.477	4562	9.939	568	4174	1.019	13.042
总计		45900	100.000	10696			

图130 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6041601批(40mg/2mg规格)-pH1.2介质-极限转速-片2
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 0-40/26-360-2 - 6041601p-zzp-2-rcqx-pH1.2jz-40mg2mg-JX-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx275.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260515-FX275.lcb
样品瓶号: 4-20
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/16 03:19:25
处理时间(V2): 2026/05/18 13:17:17
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX275)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.378	41581	88.945	10218	2672	1.115	--
2	3.476	5168	11.055	615	4066	1.139	12.921
总计		46748	100.000	10833			

图131 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6041601批(40mg/2mg规格)-pH1.2介质-极限转速-片3
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 0-40/26-361-2 - 6041601p-zzp-2-rcqx-pH1.2jz-40mg2mg-JX-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx275.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260515-FX275.lcb
样品瓶号: 4-29
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/16 03:24:48
处理时间(V2): 2026/05/18 13:17:21
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX275)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.378	42245	89.587	10372	2661	1.114	--
2	3.474	4910	10.413	582	3806	1.071	12.620
总计		47155	100.000	10953			

图132 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6041601批(40mg/2mg规格)-pH1.2介质-极限转速-片4
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 0-40/26-362-2 - 6041601p-zzp-2-rcqx-pH1.2jz-40mg2mg-JX-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx275.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260515-FX275.lcb
样品瓶号: 4-38
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/16 03:30:11
处理时间(V2): 2026/05/18 13:17:24
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX275)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.377	41693	90.267	10205	2662	1.112	--
2	3.475	4496	9.733	556	3958	1.037	12.805
总计		46189	100.000	10761			

图133 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6041601批(40mg/2mg规格)-pH1.2介质-极限转速-片5
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 0-40/26-363-2 - 6041601p-zzp-2-rcqx-pH1.2jz-40mg2mg-JX-P6.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx275.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260515-FX275.lcb

样品瓶号: 4-47

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/16 03:35:34

处理时间(V2): 2026/05/18 13:17:27

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX275)

流 速: 1.5ml/min


波 长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: wangdan

处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.378	42398	87.591	10387	2667	1.114	--
2	3.475	6007	12.409	728	3878	1.011	12.710
总计		48405	100.000	11115			

图134 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6041601批(40mg/2mg规格)-pH1.2介质-极限转速-片6
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 0-40/26-364-2 - 6041601p-zzp-2-rcqx-pH1.2jz-40mg2mg-dz2-1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx275.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260515-FX275.lcb
样品瓶号: 2-27
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/16 03:40:59
处理时间(V2): 2026/05/18 13:17:30
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX275)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.352	72596	12.172	15169	1849	1.137	--
2	3.396	523836	87.828	59222	3434	1.071	11.433
总计		596433	100.000	74391			

图135 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6041601批(40mg/2mg规格)-pH1.2介质
对照品溶液-2-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 0-40/26-365-2 - 6041601p-zzp-2-rcqx-pH1.2jz-40mg2mg-dz2-2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx275.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260515-FX275.lcb
样品瓶号: 2-27
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/16 03:46:24
处理时间(V2): 2026/05/18 13:17:33
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX275)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.352	72748	12.184	15168	1845	1.137	--
2	3.395	524346	87.816	59223	3436	1.072	11.430
总计		597094	100.000	74391			

图136 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6041601批(40mg/2mg规格)-pH1.2介质
对照品溶液-2-2




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 0-40/26-366-2 - 6042401p-zzp-2-rcqx-pH1.2jz-40mg2mg-rj.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx275.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260515-FX275.lcb
样品瓶号: 3-9
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/16 03:51:47
处理时间(V2): 2026/05/18 13:17:36
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX275)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图137 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042401批(40mg/2mg规格)-pH1.2介质
溶剂




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 0-40/26-367-2 - 6042401p-zzp-2-rcqx-pH1.2jz-40mg2mg-dz1-1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx275.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260515-FX275.lcb
样品瓶号: 3-18
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/16 03:57:11
处理时间(V2): 2026/05/18 13:17:39
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX275)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.353	72527	12.191	15154	1844	1.140	--
2	3.396	522406	87.809	59135	3442	1.072	11.431
总计		594934	100.000	74289			

图138 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042401批(40mg/2mg规格)-pH1.2介质
对照品溶液-1-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 0-40/26-368-2 - 6042401p-zzp-2-rcqx-pH1.2jz-40mg2mg-dz1-2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx275.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260515-FX275.lcb
样品瓶号: 3-18
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/16 04:02:35
处理时间(V2): 2026/05/18 13:17:42
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX275)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.353	72619	12.201	15172	1842	1.138	--
2	3.394	522552	87.799	59081	3439	1.072	11.420
总计		595172	100.000	74253			

图139 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042401批(40mg/2mg规格)-pH1.2介质
对照品溶液-1-2




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 0-40/26-369-2 - 6042401p-zzp-2-rcqx-pH1.2jz-40mg2mg-dz1-3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx275.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260515-FX275.lcb
样品瓶号: 3-18
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/16 04:07:59
处理时间(V2): 2026/05/18 13:17:46
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX275)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.353	72787	12.226	15188	1840	1.140	--
2	3.395	522553	87.774	59095	3439	1.072	11.417
总计		595339	100.000	74283			

图140 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042401批(40mg/2mg规格)-pH1.2介质
对照品溶液-1-3




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 0-40/26-370-2 - 6042401p-zzp-2-rcqx-pH1.2jz-40mg2mg-dz1-4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx275.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260515-FX275.lcb
样品瓶号: 3-18
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/16 04:13:22
处理时间(V2): 2026/05/18 13:17:49
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX275)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.353	72501	12.179	15172	1843	1.140	--
2	3.394	522799	87.821	59074	3436	1.072	11.416
总计		595300	100.000	74246			

图141 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042401批(40mg/2mg规格)-pH1.2介质
对照品溶液-1-4




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 0-40/26-371-2 - 6042401p-zzp-2-rcqx-pH1.2jz-40mg2mg-dz1-5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx275.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260515-FX275.lcb
样品瓶号: 3-18
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/16 04:18:45
处理时间(V2): 2026/05/18 13:17:52
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX275)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.353	72577	12.216	15148	1842	1.144	--
2	3.394	521530	87.784	58926	3436	1.072	11.414
总计		594107	100.000	74074			

图142 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042401批(40mg/2mg规格)-pH1.2介质
对照品溶液-1-5




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 0-40/26-372-2 - 6042401p-zzp-2-rcqx-pH1.2jz-40mg2mg-5min-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx275.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260515-FX275.lcb
样品瓶号: 3-1
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/16 04:24:08
处理时间(V2): 2026/05/18 13:17:55
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX275)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.379	8836	71.692	2172	2688	1.131	--
2	3.473	3489	28.308	429	4478	1.071	13.341
总计		12326	100.000	2601			

图143 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042401批(40mg/2mg规格)-pH1.2介质-5min-片1
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 0-40/26-373-2 - 6042401p-zzp-2-rcqx-pH1.2jz-40mg2mg-5min-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx275.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260515-FX275.lcb
样品瓶号: 3-10
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/16 04:29:31
处理时间(V2): 2026/05/18 13:17:58
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX275)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.379	9565	73.051	2317	2658	1.124	--
2	3.476	3528	26.949	434	4301	1.128	13.150
总计		13093	100.000	2751			

图144 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042401批(40mg/2mg规格)-pH1.2介质-5min-片2
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 0-40/26-374-2 - 6042401p-zzp-2-rcqx-pH1.2jz-40mg2mg-5min-P3.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx275.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260515-FX275.lcb

样品瓶号: 3-19

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/16 04:34:54

处理时间(V2): 2026/05/18 13:18:01

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX275)

流 速: 1.5ml/min


波 长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: wangdan

处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.379	8478	71.875	2084	2682	1.120	--
2	3.478	3318	28.125	414	3762	1.003	12.594
总计		11795	100.000	2498			

图145 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042401批(40mg/2mg规格)-pH1.2介质-5min-片3
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 0-40/26-375-2 - 6042401p-zzp-2-rcqx-pH1.2jz-40mg2mg-5min-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx275.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260515-FX275.lcb
样品瓶号: 3-28
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/16 04:40:16
处理时间(V2): 2026/05/18 13:18:04
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX275)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.379	9171	72.889	2243	2643	1.112	--
2	3.478	3411	27.111	415	4108	1.111	12.941
总计		12582	100.000	2658			

图146 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042401批(40mg/2mg规格)-pH1.2介质-5min-片4
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 0-40/26-376-2 - 6042401p-zzp-2-rcqx-pH1.2jz-40mg2mg-5min-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx275.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260515-FX275.lcb
样品瓶号: 3-37
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/16 04:45:39
处理时间(V2): 2026/05/18 13:18:07
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX275)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.379	9134	72.629	2255	2658	1.105	--
2	3.478	3442	27.371	434	3548	1.113	12.327
总计		12576	100.000	2689			

图147 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042401批(40mg/2mg规格)-pH1.2介质-5min-片5
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 0-40/26-377-2 - 6042401p-zzp-2-rcqx-pH1.2jz-40mg2mg-5min-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx275.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260515-FX275.lcb
样品瓶号: 3-46
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/16 04:51:02
处理时间(V2): 2026/05/18 13:18:11
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX275)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.378	9726	74.060	2394	2672	1.109	--
2	3.483	3407	25.940	424	4190	0.977	13.079
总计		13133	100.000	2819			

图148 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042401批(40mg/2mg规格)-pH1.2介质-5min-片6
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 0-40/26-378-2 - 6042401p-zzp-2-rcqx-pH1.2jz-40mg2mg-10min-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx275.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260515-FX275.lcb
样品瓶号: 3-2
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/16 04:56:24
处理时间(V2): 2026/05/18 13:18:14
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX275)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.379	17142	77.894	4207	2662	1.108	--
2	3.480	4865	22.106	585	4084	1.022	12.937
总计		22006	100.000	4792			

图149 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042401批(40mg/2mg规格)-pH1.2介质-10min-片1
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 0-40/26-379-2 - 6042401p-zzp-2-rcqx-pH1.2jz-40mg2mg-10min-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx275.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260515-FX275.lcb
样品瓶号: 3-11
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/16 05:01:47
处理时间(V2): 2026/05/18 13:18:17
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX275)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.379	17384	77.529	4260	2661	1.117	--
2	3.479	5039	22.471	598	4151	1.030	13.011
总计		22423	100.000	4858			

图150 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042401批(40mg/2mg规格)-pH1.2介质-10min-片2
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 0-40/26-380-2 - 6042401p-zzp-2-rcqx-pH1.2jz-40mg2mg-10min-P3.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx275.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260515-FX275.lcb

样品瓶号: 3-20

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/16 05:07:08

处理时间(V2): 2026/05/18 13:18:20

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX275)

流 速: 1.5ml/min


波 长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: wangdan

处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.379	16891	77.919	4156	2673	1.118	--
2	3.478	4787	22.081	588	4136	1.001	12.998
总计		21677	100.000	4745			

图151 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042401批(40mg/2mg规格)-pH1.2介质-10min-片3
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 0-40/26-381-2 - 6042401p-zzp-2-rcqx-pH1.2jz-40mg2mg-10min-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx275.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260515-FX275.lcb
样品瓶号: 3-29
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/16 05:12:30
处理时间(V2): 2026/05/18 13:18:23
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX275)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.379	17230	79.451	4249	2673	1.132	--
2	3.479	4456	20.549	550	4149	1.000	13.014
总计		21686	100.000	4799			

图152 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042401批(40mg/2mg规格)-pH1.2介质-10min-片4
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 0-40/26-382-2 - 6042401p-zzp-2-rcqx-pH1.2jz-40mg2mg-10min-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx275.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260515-FX275.lcb
样品瓶号: 3-38
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/16 05:17:53
处理时间(V2): 2026/05/18 13:18:26
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX275)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.379	17183	78.871	4221	2661	1.118	--
2	3.479	4603	21.129	561	4042	1.060	12.892
总计		21786	100.000	4782			

图153 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042401批(40mg/2mg规格)-pH1.2介质-10min-片5
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 0-40/26-383-2 - 6042401p-zzp-2-rcqx-pH1.2jz-40mg2mg-10min-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx275.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260515-FX275.lcb
样品瓶号: 3-47
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/16 05:23:16
处理时间(V2): 2026/05/18 13:18:29
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX275)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.378	17826	79.893	4353	2652	1.119	--
2	3.480	4487	20.107	554	4247	1.086	13.107
总计		22313	100.000	4907			

图154 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042401批(40mg/2mg规格)-pH1.2介质-10min-片6
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 0-40/26-384-2 - 6042401p-zzp-2-rcqx-pH1.2jz-40mg2mg-15min-P1.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx275.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260515-FX275.lcb

样品瓶号: 3-3

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/16 05:28:38

处理时间(V2): 2026/05/18 13:18:32

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX275)

流 速: 1.5ml/min


波 长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: wangdan

处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.379	21767	82.485	5334	2660	1.111	--
2	3.479	4622	17.515	577	4170	0.995	13.023
总计		26389	100.000	5910			

图155 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042401批(40mg/2mg规格)-pH1.2介质-15min-片1
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 0-40/26-385-2 - 6042401p-zzp-2-rcqx-pH1.2jz-40mg2mg-15min-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx275.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260515-FX275.lcb
样品瓶号: 3-12
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/16 05:34:00
处理时间(V2): 2026/05/18 13:18:36
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX275)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.379	21881	81.150	5372	2678	1.109	--
2	3.482	5083	18.850	620	4065	1.032	12.936
总计		26963	100.000	5992			

图156 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042401批(40mg/2mg规格)-pH1.2介质-15min-片2
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 0-40/26-386-2 - 6042401p-zzp-2-rcqx-pH1.2jz-40mg2mg-15min-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx275.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260515-FX275.lcb
样品瓶号: 3-21
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/16 05:39:22
处理时间(V2): 2026/05/18 13:18:39
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX275)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.379	21759	80.964	5319	2656	1.124	--
2	3.481	5116	19.036	608	3914	1.064	12.759
总计		26875	100.000	5927			

图157 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042401批(40mg/2mg规格)-pH1.2介质-15min-片3
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 0-40/26-387-2 - 6042401p-zzp-2-rcqx-pH1.2jz-40mg2mg-15min-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx275.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260515-FX275.lcb
样品瓶号: 3-30
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/16 05:44:45
处理时间(V2): 2026/05/18 13:18:42
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX275)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.379	21789	80.989	5353	2676	1.113	--
2	3.481	5115	19.011	614	3902	1.034	12.753
总计		26903	100.000	5967			

图158 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042401批(40mg/2mg规格)-pH1.2介质-15min-片4
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 0-40/26-388-2 - 6042401p-zzp-2-rcqx-pH1.2jz-40mg2mg-15min-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx275.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260515-FX275.lcb
样品瓶号: 3-39
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/16 05:50:08
处理时间(V2): 2026/05/18 13:18:45
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX275)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.379	21906	82.705	5348	2646	1.113	--
2	3.482	4581	17.295	558	4227	0.995	13.081
总计		26486	100.000	5907			

图159 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042401批(40mg/2mg规格)-pH1.2介质-15min-片5
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 0-40/26-389-2 - 6042401p-zzp-2-rcqx-pH1.2jz-40mg2mg-15min-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx275.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260515-FX275.lcb
样品瓶号: 3-48
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/16 05:55:30
处理时间(V2): 2026/05/18 13:18:48
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX275)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.379	22038	83.098	5420	2668	1.115	--
2	3.479	4482	16.902	559	4007	1.037	12.859
总计		26521	100.000	5980			

图160 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042401批(40mg/2mg规格)-pH1.2介质-15min-片6
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 0-40/26-390-2 - 6042401p-zzp-2-rcqx-pH1.2jz-40mg2mg-20min-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx275.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260515-FX275.lcb
样品瓶号: 3-4
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/16 06:00:53
处理时间(V2): 2026/05/18 13:18:51
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX275)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.379	24831	83.897	6094	2664	1.118	--
2	3.484	4766	16.103	592	4059	0.993	12.925
总计		29597	100.000	6685			

图161 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042401批(40mg/2mg规格)-pH1.2介质-20min-片1
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 0-40/26-391-2 - 6042401p-zzp-2-rcqx-pH1.2jz-40mg2mg-20min-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx275.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260515-FX275.lcb
样品瓶号: 3-13
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/16 06:06:16
处理时间(V2): 2026/05/18 13:18:54
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX275)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.379	24699	81.670	6045	2649	1.122	--
2	3.483	5544	18.330	653	3786	1.027	12.613
总计		30243	100.000	6698			

图162 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042401批(40mg/2mg规格)-pH1.2介质-20min-片2
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 0-40/26-392-2 - 6042401p-zzp-2-rcqx-pH1.2jz-40mg2mg-20min-P3.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx275.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260515-FX275.lcb

样品瓶号: 3-22

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/16 06:11:38

处理时间(V2): 2026/05/18 13:18:58

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX275)

流 速: 1.5ml/min


波 长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: wangdan

处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.379	24773	83.774	6066	2656	1.113	--
2	3.485	4798	16.226	587	4539	1.055	13.420
总计		29571	100.000	6653			

图163 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042401批(40mg/2mg规格)-pH1.2介质-20min-片3
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 0-40/26-393-2 - 6042401p-zzp-2-rcqx-pH1.2jz-40mg2mg-20min-P4.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx275.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260515-FX275.lcb

样品瓶号: 3-31

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/16 06:17:00

处理时间(V2): 2026/05/18 13:19:01

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX275)

流 速: 1.5ml/min


波 长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: wangdan

处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.379	24918	83.338	6121	2664	1.109	--
2	3.482	4982	16.662	614	4179	0.959	13.045
总计		29900	100.000	6735			

图164 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042401批(40mg/2mg规格)-pH1.2介质-20min-片4
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 0-40/26-394-2 - 6042401p-zzp-2-rcqx-pH1.2jz-40mg2mg-20min-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx275.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260515-FX275.lcb
样品瓶号: 3-40
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/16 06:22:22
处理时间(V2): 2026/05/18 13:19:04
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX275)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.379	25097	83.881	6140	2673	1.109	--
2	3.482	4823	16.119	581	4076	1.101	12.946
总计		29920	100.000	6721			

图165 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042401批(40mg/2mg规格)-pH1.2介质-20min-片5
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 0-40/26-395-2 - 6042401p-zzp-2-rcqx-pH1.2jz-40mg2mg-20min-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx275.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260515-FX275.lcb
样品瓶号: 3-49
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/16 06:27:45
处理时间(V2): 2026/05/18 13:19:07
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX275)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.378	25018	84.541	6144	2661	1.108	--
2	3.479	4575	15.459	556	4148	1.072	13.011
总计		29593	100.000	6700			

图166 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042401批(40mg/2mg规格)-pH1.2介质-20min-片6
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 0-40/26-396-2 - 6042401p-zzp-2-rcqx-pH1.2jz-40mg2mg-30min-P1.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx275.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260515-FX275.lcb

样品瓶号: 3-5

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/16 06:33:07

处理时间(V2): 2026/05/18 13:19:10

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX275)

流 速: 1.5ml/min


波 长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: wangdan

处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.378	28917	85.205	7073	2660	1.116	--
2	3.479	5021	14.795	616	4029	1.085	12.888
总计		33938	100.000	7689			

图167 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042401批(40mg/2mg规格)-pH1.2介质-30min-片1
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 0-40/26-397-2 - 6042401p-zzp-2-rcqx-pH1.2jz-40mg2mg-30min-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx275.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260515-FX275.lcb
样品瓶号: 3-14
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/16 06:38:29
处理时间(V2): 2026/05/18 13:19:13
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX275)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.379	28608	84.769	6996	2655	1.114	--
2	3.482	5140	15.231	622	4041	1.034	12.901
总计		33748	100.000	7618			

图168 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042401批(40mg/2mg规格)-pH1.2介质-30min-片2
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 0-40/26-398-2 - 6042401p-zzp-2-rcqx-pH1.2jz-40mg2mg-30min-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx275.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260515-FX275.lcb
样品瓶号: 3-23
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/16 06:43:51
处理时间(V2): 2026/05/18 13:19:17
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX275)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.379	28896	84.714	7053	2658	1.112	--
2	3.483	5214	15.286	633	3881	1.040	12.731
总计		34110	100.000	7686			

图169 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042401批(40mg/2mg规格)-pH1.2介质-30min-片3
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 0-40/26-399-2 - 6042401p-zzp-2-rcqx-pH1.2jz-40mg2mg-30min-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx275.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260515-FX275.lcb
样品瓶号: 3-32
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/16 06:49:12
处理时间(V2): 2026/05/18 13:19:20
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX275)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.378	28955	84.436	7097	2665	1.116	--
2	3.483	5337	15.564	640	3943	1.011	12.805
总计		34292	100.000	7737			

图170 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042401批(40mg/2mg规格)-pH1.2介质-30min-片4
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$QTL-235 - 0-40/26-400-2 - 6042401p-zzp-2-rcqx-pH1.2jz-40mg2mg-30min-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx275.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260515-FX275.lcb
样品瓶号: 3-41
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/16 06:54:34
处理时间(V2): 2026/05/18 13:19:23
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX275)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.378	28882	86.646	7069	2654	1.117	--
2	3.482	4451	13.354	550	4146	1.017	13.013
总计		33334	100.000	7619			

图171 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042401批(40mg/2mg规格)-pH1.2介质-30min-片5
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 0-40/26-401-2 - 6042401p-zzp-2-rcqx-pH1.2jz-40mg2mg-30min-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx275.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260515-FX275.lcb
样品瓶号: 3-50
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/16 06:59:56
处理时间(V2): 2026/05/18 13:19:26
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX275)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.378	28759	86.278	7058	2665	1.114	--
2	3.483	4574	13.722	562	4283	0.980	13.166
总计		33333	100.000	7620			

图172 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042401批(40mg/2mg规格)-pH1.2介质-30min-片6
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 0-40/26-402-2 - 6042401p-zzp-2-rcqx-pH1.2jz-40mg2mg-45min-P1.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx275.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260515-FX275.lcb

样品瓶号: 3-6

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/16 07:05:18

处理时间(V2): 2026/05/18 13:19:29

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX275)

流速: 1.5ml/min


波长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: wangdan

处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.379	32668	87.422	8010	2650	1.115	--
2	3.483	4700	12.578	578	4081	1.040	12.943
总计		37368	100.000	8588			

图173 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042401批(40mg/2mg规格)-pH1.2介质-45min-片1
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 0-40/26-403-2 - 6042401p-zzp-2-rcqx-pH1.2jz-40mg2mg-45min-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx275.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260515-FX275.lcb
样品瓶号: 3-15
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/16 07:10:40
处理时间(V2): 2026/05/18 13:19:32
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX275)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.378	32318	86.888	7916	2654	1.112	--
2	3.485	4877	13.112	598	4366	0.990	13.251
总计		37195	100.000	8514			

图174 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042401批(40mg/2mg规格)-pH1.2介质-45min-片2
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 0-40/26-404-2 - 6042401p-zzp-2-rcqx-pH1.2jz-40mg2mg-45min-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx275.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260515-FX275.lcb
样品瓶号: 3-24
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/16 07:16:01
处理时间(V2): 2026/05/18 13:19:35
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX275)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.378	32927	85.342	8055	2654	1.118	--
2	3.483	5655	14.658	674	3991	0.983	12.852
总计		38582	100.000	8729			

图175 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042401批(40mg/2mg规格)-pH1.2介质-45min-片3
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 0-40/26-405-2 - 6042401p-zzp-2-rcqx-pH1.2jz-40mg2mg-45min-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx275.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260515-FX275.lcb
样品瓶号: 3-33
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/16 07:21:24
处理时间(V2): 2026/05/18 13:19:38
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX275)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.379	33176	86.853	8101	2656	1.113	--
2	3.483	5022	13.147	597	4066	1.048	12.930
总计		38198	100.000	8698			

图176 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042401批(40mg/2mg规格)-pH1.2介质-45min-片4
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 0-40/26-406-2 - 6042401p-zzp-2-rcqx-pH1.2jz-40mg2mg-45min-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx275.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260515-FX275.lcb
样品瓶号: 3-42
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/16 07:26:44
处理时间(V2): 2026/05/18 13:19:42
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX275)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.377	32885	88.437	8018	2653	1.115	--
2	3.484	4300	11.563	526	3976	1.009	12.846
总计		37185	100.000	8544			

图177 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042401批(40mg/2mg规格)-pH1.2介质-45min-片5
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 0-40/26-407-2 - 6042401p-zzp-2-rcqx-pH1.2jz-40mg2mg-45min-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx275.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260515-FX275.lcb
样品瓶号: 3-51
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/16 07:32:06
处理时间(V2): 2026/05/18 13:19:45
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX275)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.378	32829	87.775	8029	2656	1.113	--
2	3.481	4572	12.225	564	4250	1.112	13.118
总计		37401	100.000	8593			

图178 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042401批(40mg/2mg规格)-pH1.2介质-45min-片6
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 0-40/26-408-2 - 6042401p-zzp-2-rcqx-pH1.2jz-40mg2mg-60min-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx275.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260515-FX275.lcb
样品瓶号: 3-7
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/16 07:37:28
处理时间(V2): 2026/05/18 13:19:48
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX275)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.378	35414	88.352	8681	2661	1.113	--
2	3.485	4669	11.648	574	4342	0.997	13.232
总计		40082	100.000	9256			

图179 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042401批(40mg/2mg规格)-pH1.2介质-60min-片1
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 0-40/26-409-2 - 6042401p-zzp-2-rcqx-pH1.2jz-40mg2mg-60min-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx275.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260515-FX275.lcb
样品瓶号: 3-16
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/16 07:42:50
处理时间(V2): 2026/05/18 13:19:51
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX275)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.378	34864	87.429	8500	2656	1.114	--
2	3.484	5013	12.571	604	3756	1.051	12.599
总计		39877	100.000	9104			

图180 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042401批(40mg/2mg规格)-pH1.2介质-60min-片2
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 0-40/26-410-2 - 6042401p-zzp-2-rcqx-pH1.2jz-40mg2mg-60min-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx275.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260515-FX275.lcb
样品瓶号: 3-25
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/16 07:48:12
处理时间(V2): 2026/05/18 13:19:54
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX275)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.378	35070	87.950	8599	2658	1.117	--
2	3.485	4805	12.050	603	4336	0.998	13.225
总计		39875	100.000	9202			

图181 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042401批(40mg/2mg规格)-pH1.2介质-60min-片3
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$QTL-235 - 0-40/26-411-2 - 6042401p-zzp-2-rcqx-pH1.2jz-40mg2mg-60min-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx275.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260515-FX275.lcb
样品瓶号: 3-34
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/16 07:53:34
处理时间(V2): 2026/05/18 13:19:57
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX275)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.378	35566	88.525	8681	2650	1.110	--
2	3.485	4610	11.475	562	3870	0.995	12.723
总计		40176	100.000	9243			

图182 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042401批(40mg/2mg规格)-pH1.2介质-60min-片4
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 0-40/26-412-2 - 6042401p-zzp-2-rcqx-pH1.2jz-40mg2mg-60min-P5.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx275.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260515-FX275.lcb

样品瓶号: 3-43

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/16 07:58:56

处理时间(V2): 2026/05/18 13:20:01

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX275)

流速: 1.5ml/min


波长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: wangdan

处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.378	35259	89.053	8641	2658	1.116	--
2	3.485	4334	10.947	524	4157	1.037	13.041
总计		39593	100.000	9165			

图183 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042401批(40mg/2mg规格)-pH1.2介质-60min-片5
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 0-40/26-413-2 - 6042401p-zzp-2-rcqx-pH1.2jz-40mg2mg-60min-P6.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx275.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260515-FX275.lcb

样品瓶号: 3-52

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/16 08:04:18

处理时间(V2): 2026/05/18 13:20:04

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX275)

流 速: 1.5ml/min


波 长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: wangdan

处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.378	35068	89.046	8568	2662	1.117	--
2	3.484	4314	10.954	531	3923	1.013	12.793
总计		39382	100.000	9099			

图184 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042401批(40mg/2mg规格)-pH1.2介质-60min-片6
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 0-40/26-414-2 - 6042401p-zzp-2-rcqx-pH1.2jz-40mg2mg-90min-P1.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx275.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260515-FX275.lcb

样品瓶号: 3-8

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/16 08:09:41

处理时间(V2): 2026/05/18 13:20:07

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX275)

流 速: 1.5ml/min


波 长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: wangdan

处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.378	39051	89.717	9523	2644	1.114	--
2	3.486	4476	10.283	552	3920	1.085	12.776
总计		43527	100.000	10075			

图185 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042401批(40mg/2mg规格)-pH1.2介质-90min-片1
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 0-40/26-415-2 - 6042401p-zzp-2-rcqx-pH1.2jz-40mg2mg-90min-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx275.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260515-FX275.lcb
样品瓶号: 3-17
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/16 08:15:04
处理时间(V2): 2026/05/18 13:20:10
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX275)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.378	38361	88.130	9360	2648	1.114	--
2	3.486	5167	11.870	637	4143	1.057	13.017
总计		43528	100.000	9997			

图186 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042401批(40mg/2mg规格)-pH1.2介质-90min-片2
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 0-40/26-416-2 - 6042401p-zzp-2-rcqx-pH1.2jz-40mg2mg-90min-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx275.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260515-FX275.lcb
样品瓶号: 3-26
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/16 08:20:26
处理时间(V2): 2026/05/18 13:20:13
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX275)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.378	38857	89.344	9453	2654	1.118	--
2	3.486	4635	10.656	561	4010	0.992	12.882
总计		43492	100.000	10014			

图187 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042401批(40mg/2mg规格)-pH1.2介质-90min-片3
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 0-40/26-417-2 - 6042401p-zzp-2-rcqx-pH1.2jz-40mg2mg-90min-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx275.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260515-FX275.lcb
样品瓶号: 3-35
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/16 08:25:49
处理时间(V2): 2026/05/18 13:20:16
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX275)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.379	39180	90.308	9572	2655	1.116	--
2	3.484	4205	9.692	524	4523	1.013	13.397
总计		43385	100.000	10097			

图188 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042401批(40mg/2mg规格)-pH1.2介质-90min-片4
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 0-40/26-418-2 - 6042401p-zzp-2-rcqx-pH1.2jz-40mg2mg-90min-P5.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx275.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260515-FX275.lcb

样品瓶号: 3-44

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/16 08:31:11

处理时间(V2): 2026/05/18 13:20:19

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX275)

流速: 1.5ml/min


波长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: wangdan

处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.379	38693	89.643	9482	2650	1.117	--
2	3.487	4471	10.357	541	3900	1.079	12.759
总计		43163	100.000	10023			

图189 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042401批(40mg/2mg规格)-pH1.2介质-90min-片5
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 0-40/26-419-2 - 6042401p-zzp-2-rcqx-pH1.2jz-40mg2mg-90min-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx275.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260515-FX275.lcb
样品瓶号: 3-53
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/16 08:36:34
处理时间(V2): 2026/05/18 13:20:22
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX275)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.379	38729	89.677	9510	2662	1.115	--
2	3.487	4458	10.323	540	4174	1.072	13.064
总计		43187	100.000	10049			

图190 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042401批(40mg/2mg规格)-pH1.2介质-90min-片6
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 0-40/26-420-2 - 6042401p-zzp-2-rcqx-pH1.2jz-40mg2mg-120min-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx275.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260515-FX275.lcb
样品瓶号: 4-5
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/16 08:41:58
处理时间(V2): 2026/05/18 13:20:25
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX275)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.379	40831	90.076	10048	2672	1.112	--
2	3.485	4499	9.924	552	4232	1.022	13.118
总计		45330	100.000	10600			

图191 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042401批(40mg/2mg规格)-pH1.2介质-120min-片1
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$QTL-235 - 0-40/26-421-2 - 6042401p-zzp-2-rcqx-pH1.2jz-40mg2mg-120min-P2.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx275.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260515-FX275.lcb

样品瓶号: 4-10

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/16 08:47:21

处理时间(V2): 2026/05/18 13:20:28

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX275)

流速: 1.5ml/min


波长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: wangdan

处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.379	40725	88.945	9950	2658	1.114	--
2	3.489	5062	11.055	599	3840	1.019	12.707
总计		45787	100.000	10549			

图192 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042401批(40mg/2mg规格)-pH1.2介质-120min-片2
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$QTL-235 - 0-40/26-422-2 - 6042401p-zzp-2-rcqx-pH1.2jz-40mg2mg-120min-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx275.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260515-FX275.lcb
样品瓶号: 4-19
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/16 08:52:44
处理时间(V2): 2026/05/18 13:20:31
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX275)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.378	41078	89.802	10046	2653	1.114	--
2	3.489	4665	10.198	568	4244	1.013	13.137
总计		45743	100.000	10614			

图193 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042401批(40mg/2mg规格)-pH1.2介质-120min-片3
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 0-40/26-423-2 - 6042401p-zzp-2-rcqx-pH1.2jz-40mg2mg-120min-P4.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx275.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260515-FX275.lcb

样品瓶号: 4-28

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/16 08:58:08

处理时间(V2): 2026/05/18 13:20:34

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX275)

流 速: 1.5ml/min


波 长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: wangdan

处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.379	41328	90.279	10140	2666	1.115	--
2	3.487	4450	9.721	534	4213	1.084	13.105
总计		45778	100.000	10673			

图194 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042401批(40mg/2mg规格)-pH1.2介质-120min-片4
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 0-40/26-424-2 - 6042401p-zzp-2-rcqx-pH1.2jz-40mg2mg-120min-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx275.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260515-FX275.lcb
样品瓶号: 4-37
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/16 09:03:29
处理时间(V2): 2026/05/18 13:20:38
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX275)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.379	40897	91.224	10050	2672	1.113	--
2	3.483	3934	8.776	490	4264	1.006	13.144
总计		44832	100.000	10541			

图195 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042401批(40mg/2mg规格)-pH1.2介质-120min-片5
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 0-40/26-425-2 - 6042401p-zzp-2-rcqx-pH1.2jz-40mg2mg-120min-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx275.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260515-FX275.lcb
样品瓶号: 4-46
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/16 09:08:52
处理时间(V2): 2026/05/18 13:20:41
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX275)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.378	41078	90.561	10056	2656	1.112	--
2	3.487	4281	9.439	523	4143	1.026	13.028
总计		45359	100.000	10579			

图196 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042401批(40mg/2mg规格)-pH1.2介质-120min-片6
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 0-40/26-426-2 - 6042401p-zzp-2-rcqx-pH1.2jz-40mg2mg-JX-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx275.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260515-FX275.lcb
样品瓶号: 4-6
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/16 09:14:16
处理时间(V2): 2026/05/18 13:20:44
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX275)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.379	41609	90.308	10190	2657	1.119	--
2	3.490	4466	9.692	547	4265	1.121	13.166
总计		46074	100.000	10737			

图197 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042401批(40mg/2mg规格)-pH1.2介质-极限转速-片1
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 0-40/26-427-2 - 6042401p-zzp-2-rcqx-pH1.2jz-40mg2mg-JX-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx275.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260515-FX275.lcb
样品瓶号: 4-11
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/16 09:19:40
处理时间(V2): 2026/05/18 13:20:47
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX275)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.379	41164	89.827	10110	2661	1.116	--
2	3.487	4662	10.173	569	3977	1.050	12.852
总计		45826	100.000	10679			

图198 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042401批(40mg/2mg规格)-pH1.2介质-极限转速-片2
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 0-40/26-428-2 - 6042401p-zzp-2-rcqx-pH1.2jz-40mg2mg-JX-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx275.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260515-FX275.lcb
样品瓶号: 4-20
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/16 09:25:02
处理时间(V2): 2026/05/18 13:20:50
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX275)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.379	41747	89.327	10204	2652	1.114	--
2	3.492	4988	10.673	598	4212	1.015	13.116
总计		46734	100.000	10802			

图199 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042401批(40mg/2mg规格)-pH1.2介质-极限转速-片3
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 0-40/26-429-2 - 6042401p-zzp-2-rcqx-pH1.2jz-40mg2mg-JX-P4.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx275.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260515-FX275.lcb

样品瓶号: 4-29

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/16 09:30:26

处理时间(V2): 2026/05/18 13:20:53

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX275)

流 速: 1.5ml/min


波 长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: wangdan

处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.379	42313	89.588	10343	2652	1.115	--
2	3.489	4917	10.412	571	3473	1.019	12.272
总计		47230	100.000	10914			

图200 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042401批(40mg/2mg规格)-pH1.2介质-极限转速-片4
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 0-40/26-430-2 - 6042401p-zzp-2-rcqx-pH1.2jz-40mg2mg-JX-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx275.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260515-FX275.lcb
样品瓶号: 4-38
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/16 09:35:48
处理时间(V2): 2026/05/18 13:20:56
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX275)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.378	41633	90.656	10182	2652	1.110	--
2	3.488	4291	9.344	521	4324	1.048	13.221
总计		45925	100.000	10703			

图201 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042401批(40mg/2mg规格)-pH1.2介质-极限转速-片5
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 0-40/26-431-2 - 6042401p-zzp-2-rcqx-pH1.2jz-40mg2mg-JX-P6.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx275.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260515-FX275.lcb

样品瓶号: 4-47

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/16 09:41:11

处理时间(V2): 2026/05/18 13:20:59

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX275)

流速: 1.5ml/min


波长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: wangdan

处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.379	42125	87.704	10352	2665	1.116	--
2	3.489	5906	12.296	728	4264	0.962	13.164
总计		48031	100.000	11080			

图202 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042401批(40mg/2mg规格)-pH1.2介质-极限转速-片6
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 0-40/26-432-2 - 6042401p-zzp-2-rcqx-pH1.2jz-40mg2mg-dz2-1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx275.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260515-FX275.lcb
样品瓶号: 3-27
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/16 09:46:34
处理时间(V2): 2026/05/18 13:21:02
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX275)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.353	69737	12.314	14441	1807	1.137	--
2	3.405	496590	87.686	55795	3410	1.070	11.385
总计		566327	100.000	70235			

图203 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042401批(40mg/2mg规格)-pH1.2介质
对照品溶液-2-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 0-40/26-433-2 - 6042401p-zzp-2-rcqx-pH1.2jz-40mg2mg-dz2-2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx275.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260515-FX275.lcb
样品瓶号: 3-27
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/16 09:51:57
处理时间(V2): 2026/05/18 13:21:06
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.353	69597	12.292	14432	1809	1.141	--
2	3.404	496584	87.708	55832	3414	1.071	11.387
总计		566181	100.000	70264			

图204 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042401批(40mg/2mg规格)-pH1.2介质
对照品溶液-2-2